



# 接豆完

童子韻水翼坐甲唱子飄裳空歌出雲袖  
自駕見而至新鐫百正威瞻保矣即書  
於端君能厚焉乃大山幽遠處云

藏刻于芝蘭新芳之室中

大觀文庫

木

あの接続豆の書ハ家翁碧水先生往年翻譯セし瘡醫新書中的一篇を今春再び増訂一給ナリテ號豆齋と接頭するの良法なり此法小從以他の順痘を取ア此兎小移シ接けハ百人ト施シテ百人を一ト必も輕くノむる簡便の奇術少々近頃門生等ちきは家塾ニ刻シテ世ト傳ム。于時先生是歲齡甫六旬其誕辰を以て予等子弟と俱小奉觴シテ壽宴を開ケ茲ア小四方これを聞クの諸君子詩文若干を國歌及書画りて祝賀シ贈り洽シ。之の若干篇子及至る小子等う喜ひ知シ。一よりて此一編を其諸子小呈シテ報告セラ。ナウ今遍く此便法を施シテ幾億萬の群衆必も其夭札を免キ受得。され天然の壽域ト躋ム益々先生仁術の徳輝をあらバ。今秋耳順の賀筵を催。その本懐ナリ。られ舊傳の種痘とは大異シテ原名ミ對譯シテ新コつぶらがどと新名ナシ施さる捷徑法ナリ所謂種痘と同く視る事なれど云。

文化十三年丙子菊月

男

茂楨

合爪



## 瘡醫新書卷之三十二

## 接花痘篇第十五

按接花痘者。凡小兒當未痘之先。取鐵鍼點破其手足中之一處。作一小孔。或施打膿法。一本書第十九篇。使發膿泡。取他兒順吉痘粒之漿。而挿入于其孔中之一法也。用此法者。先痘之未萌。引導以令感受。則其伏毒纔微動于表部。不深達于裏。特在血分。引其毒包攝圍繞之。始以浮越之於外也。有斯必然之正理。而其證候極輕易。非如傳染發痘之順逆不可預測。知平和穩當避危就安實。

萬全便法。秦西名之曰英覽登杌方經牒盧波更按英覽登杌者接也。卽接法也。方助語。經牒盧者兒也。波更者。疱也。疹也。二言合而兒疹之義。卽痘也。因譯之則接痘也。蓋謂之接者。取猶樹砧在于此接他之奇花者也。其取輕痘之痂漿者似接頭擇奇花者故今假用接花二字譯云爾。檢字書接卽涉切音接續木也。又閑薛鳳翔牡丹八人書養花之家先須以老木分移單裁候發嫩枝為接花母术接奇花云云。又接頭有花銖音之名。譯一名添花字亦有所據云。

醫宗金鑑中。有幼科種痘心法要旨之編。盡其種痘之法矣。此原出于峨眉山之神人云。與本法小同而大異也。彼則挿入鼻孔之法。命之名以種植之義。此則點入。

○血絡名以接法之意矣。且近種諸腦髓神液中與遠接諸經絡血液中霄壤不啻。彼則似捷徑甚。危險。此則似迂濶翻便要。迥異所趣向。其安危之所係匪輕。髓也。血也。種也。接也。固不同其法與名則。不可取以當譯名。人宜莫以種痘視焉。本篇譯說省焉而補記註說於左

○按本篇所說則約略。如有所未盡也。註證則後賢之所追補而考徵極詳悉。余一讀了通編。未遑及譯定姑期他日。又請後生之續譯而已。但概譯其所論述數條。則擇其時候察其兒之稟性為第一要。而年齡早晚之定候。及痘顆撰法及前後調攝法等。亦不可忽也。其接法

則舉古今所用諸法。其法為六種。其第一法則挿入鼻孔之法。卽與漢說同而異。<sup>元氣</sup>痘癰和麝香耳。其論曰。此從來之舊法。試之甚不穩當。每見施之者殆同于罹<sup>下</sup>流行正痘者。此無它。徹入鼻孔之痘毒。直達于腦神經。又由吸息入肺臟。必至發危篤症也。是故今時此法全廢而不取也。因意漢蓋傳<sup>之</sup>西域都兒格國地方原法也。欲奇其術。故稱<sup>之</sup>神人之傳也。但言宋真宗時為<sup>之</sup>丞相王旦之子。種痘而愈。遂傳<sup>於</sup>世。則其所由來舊矣。實距今時七百有餘年。蓋在未傳歐邏巴洲之前也。嘗閱<sup>之</sup>他書。其原自都兒格國始傳。此法於彼洲其年曆則一千七百二

十三年而當我享保七年壬寅<sup>之</sup>。今僅九十有餘年。但彼諸醫漸發明新法者多也。其所舉諸法中。以第三第四第五法為良便也。就其三法中宜擇其適意者施焉。其第一第二第六姑闕譯。第三法曰。取他兒順吉痘癰貼著諸一兒之腕與脚。以下胡桃核半片研磨令平滑者。覆其上置按定巾於其上。以帶繩縛之。第四法曰。就順痘之兒以鍼鍼刺其膿熟之痘粒。附貼其膿汁於針尖。乃以此鍼刺其欲接之小兒皮肉。接其痘氣也。第五法曰。先束細鍼三四箇。刺一下兒之胸腕及胯。其他部皮肉。取他之順痘兒膿汁。以塗擦其創瘍上云。就以上諸法。

中施適意之一法則。其初發熱從而為赤疹。遂發吉痘。顆粒稀疎。不日為落痂也。世或有危懼接法者。蓋自鼻孔施之者。每罹不幸故也。此法大有害。既辨于前。前後關畧譯文。亦得二十年前之新著。幼科全書中。接痘譯說。把讀之。又殊增益新意。極詳悉抄以補記焉。當擇而從之。其說曰。

接痘法。予常以施臂腕為良便也。此以接而他無所妨礙之故也。今時施之者特於一臂上。吾輩施之則要果使感染其膿氣。每於兩臂施焉。通例多皆先於其部位作打膿法。以接膿漿為定式也。

其接法。先就其欲接之小兒臂上。以鍛鍼放開其表皮與皮之間。半拇指橫徑許。其開裂也淺。而不見一滴之血。為度。卽於其創口貼彼他兒輕痘。膿漿塗棉撒絲者。而後置綿絮少許。於其上。又按定其上。以小布片緊束之。以刺絡縛帶也。以膿絲上安定綿絮。故無粘著布片。且貼絲滑脫之患也。

○施後一日或二日。其創口邊圍為紅活。若不見其色。則再當貼他膿絲。倘或不見赤色者。則雖第四日可再三貼之。然大抵接後至翌日。則其創圍必起庠而發赤色。此則發疹之標也。

得他痘兒膿漿之法。則以鉗鍼尖揭其痘痂取其膿以塗其鍼尖之兩面而後其接痘兒之創口以醫之拇指與示指多開以其鍼尖之側面塗入其膿漿以使通徹於其皮中。按此不必要浸綿一法也。其兒之自然正痘者則直取其痘膿漿又接痘兒袁ナキ則取其創口所出之膿也。○接之兒則伴到某痘家於其室中可施焉。或假其隣家於其宅施亦佳也。○此放開接法兩臂相俱施者大抵在小兒則為難以其畏避之甚也。如此者則取芒青膏。按葛上亭長生解者代用殊良。攤綿絮如法作為細長狹小以貼本部此亦為得矣。即夜來貼之翌早視之則發水泡乃剝去其膏及泡皮以軟布拭淨之直

以下所蘸膿漿之撒絲貼其處置綿絮施縛帶等如定式。○一法剖開其發泡皮於見赤肉之處貼痘痂一顆或二顆復覆其泡皮於上以為縛法。此是一箇簡法也。

右初條者我磐水先生續譯瘡醫新書手術部接痘篇第十五譯名義解小序並略抄其註證也後條末尾則補記他說之尤粹者也新書病門一百十一篇全部浩博未脫其稿全備公行之舉不可期幾歲月也夫痘者為生人所不能免但其症順逆多端變更莫測乃所謂造化之殺機兒童之劫數也西哲諸子曰近自起此接痘一法各國諸名醫屢歷試百發百中必免其厄誠宜

研究其法以施於未病之先。此所不可不速告世也。蓋億兆生民古往今來上下縱橫數百年每罹此厄也。苗而不秀秀而不實者為幾多也。今果因此法咸躋其數千萬人之男女兒輩於壽域則可謂報答昊天好生之恩德矣。仁術廣濟之要無急於此。故一日請諸師先姑抄此數條於本篇中舉其約刻家塾以傳同道之士云。人宜就諸法中擇其適意者施焉。如其前後調攝保護諸法則逐一明細詳于榛齋先生所譯幼科全書接痘篇第十四故余等不贅于此。芝蘭堂塾生佐養三結德民等謹錄。

