

洋学文庫
文庫 8
C 26
1





西說內科撰要序

藏書



天文象曆之學至遠西入世窮其幼眇極其密微補周髀宣渾之所未逮決數千年來之疑最加詳覈焉夫人身者一小天地也意者彼於其大者能如此則推諸七尺之軀而論疾病之故

設處療之方亦能如此者必矣
聞彼土醫學有內外二科而鄧
玉函之傳蒸藥取露所論理及
人精微今

我邦特傳瘡腫一科而閱其祝
劑之方不過僅得其粗耳至內
科之術多不知彼土實有之者

焉余同僚月池桂公鑑以瘍科
仕

朝奕世及月池最好西學讀橫
行書颯，如蠶之食葉而驗之
於危險隱惡諸瘡其效尤捷嘗
有海上備要方荷蘭藥選之著
而未及內科以其非顯門也津

山醫官字明卿才敏超卓蚤習
軒岐之道旁為儒者之學與月
池輩講究西說苦刻十稔近譯
定玉函涅斯堙我爾德兒書作
內科撰要十八卷以述其梗槩
因月池而徵余言余公私倥偬
未遑讀而終卷略窺其端緒論

理吊詭遽見之有竦然骨驚者
有茫乎不得涯際者然究其歸
趣如利氏脬豆之喻與所謂大
氣舉之相符則亦與軒岐諸家
之旨將無同邪抑且斷乎別闡
發人身精微之理於五藏六腑
經絡營衛之外設處療之法於


汗吐下和溫之所不及者邪要
之學者宜於異同離合之間質
驗參審以悟軒岐不傳之奇祕
矣若夫篤癘積痾醫經所不載
醫流所不識可籍而得起則生
生之具靡有缺遺嗚呼其切于
在民敵與於天文象曆之學也

則明卿此書並月池所撰其用
豈測驗儀象諸器之比乎寔為
世鴻寶矣朱竹垞嘗謂西洋之
言溺于數之中出于理之外傲
人以所不知豈其然乎豈其然
乎是為序
寬政癸丑差夏

法眼侍醫兼醫學教諭丹波介
後人丹波元簡廉夫撰



植通典書



西說內科撰要序

西洋之於醫術固有內外二科戰
國之時西人縱通夷創者賴以起焉
妙驗昭之在人耳目其來久矣於是
世之苟言外科者不問學之淺深
術之精麁凌以藉口冒名以求其售

則亡論已抑至內科則未嘗有言
之者也其言一一由吾字明卿始
明卿業已從予黨學西字研切七
八年譯定泰西內科方書方將
木鐸天下使人既知其所以又增益
其所能書成謂予曰誰居使晉有

今日之舉者願得一言對諸編首以
取證于世予迺為序曰夫泰西之學
尚實効不屑空論故其為書片
言隻語必體諸己自非達諸天地
而亡內愧質諸鬼神而亡沈疑者
不載策不傳世是以學者解一

內科摘要
行之活斯者一行之用讀一冊之方
斯獲一冊之効予親驗之吾外科
耳延竊以譯內科之與吾外科
開涉相為用者以輔翼其業且以
占世言治之法共之庶幾有濟於會
靈蒼生以答天地煦之生育之萬一
而恒患其力不給今有茲書皆予
所欲為而未遑有志而未及者也夫
然後戒心戚之乎其動性之乎若有
得焉明卿今吾以吾子為弟二
我矣人豈可以無友乎哉
寬政癸丑仲夏

法眼侍醫桂川國瑞公鑑父撰



西說內科撰要序



夫大舜之聖。猶好問而察。邇言舍己。從人。大禹之聖。亦猶拜昌言。古之賢人君子。何獨弗然。迺至以謙虛受人。相下而亾。數芻蕘不遺。下問不耻。詢度咨諏。唯恐其失之。此無故公。平無私。以安天下。愛萬民為本宅。心於仁也。衆人則不然。唯己從。是好不欲聞其過。不問。

可否同己則說煦濡以成之不辨善惡異己
則惡齟齬以毀之截截乎善拒言以自封焉
此無故志不在仁營一己之私而忘天下之
公非衆庶之馮生則商賈眩鬻欲贏重糶之
用心也晉自幼從先人讀姬孔之書學軒岐
之言時童子何知偶聞人之口西洋鑿術也
亦不問其可否與善惡必異而排之唾而罵

之曰逖彼西夷之子缺其舌而左其衽何足
以掛齒牙厠諸中華之學乎幽谷之禽猶知
遷喬可以人而不耻之哉及後介會昌啓謁
月池公公之席上得大玄澤玄澤又延入於
蘭化子之社遂與中淳菴田玄白之輩相周
旋屢聞其說迺始知其學信實明微皆據實
物而爲言未嘗虛設而空論其書也精詳可

曉而術也簡易可從雖以晉之鮮見聞殆從來之所無也於是幡然改曰吾過矣吾過矣今夫鑿也者仁術也操仁術而忘仁者之用心其由焯人而耻割烹弟子而惡受命於先師乎苟其學之益于鑿事將奚所擇焉抑他山之石可以攻玉我取以共追琢吾疾鑿之業庶幾萬一有獲以補壽世之廣施助仁民

之鴻術則愚公至誠終身於箕畚之間亦所弗恤也請諸月池公公出蘭書一編而授焉實是太行王屋人之所未能跡也迺不自圖其力欲道其險塞密勿乎從事於叩墜者十稔于今迄用底績乎一魁父矣此為西說內科撰要唯是其言之徃徃在創聞創見極知其異而排之唾而罵之如晉者衆矣然獨於

其公平無私。宅心於仁。實不背古先聖賢之用心者。儻復有少取於斯夫。

寬政壬子夏四月辛未

津山侍醫東都宇晉謹序



西說內科撰要

凡例

一是編也。蘭書中最簡約而要者。觀其所命可見矣。大玄澤是蘭社巨擘。晉親之如兄。受教如師者也。則謂晉曰。以西洋內科公諸天下。實古今所未聞。然其於以先啓行。非鑿壘之元戎。則學途之前茅。赫赫乎衆屬目焉。苟非奇偉卓絕。明詳精覈。以躋人望。則不可也。獨奈是編殊為要略。恐不足以饜人意。無乃以為黔驢遼豕。所見不稱所聞。而概棄其他。俾嚮往者。裹足服膺者。解體焉乎。其切偲之誼。可謂忠矣。雖然。有一乎此。凡學問之道。精通固

西說內科撰要 凡例

難粗通亦未易自粗入精自易徂難夫燔黍捭豚
汗尊抔飲爲禮之始大輅爲椎輪所成凡物其始
也少略焉耳而人情之安駕乘甘飲食其終也必
珍羞玉饈樊纓鏤錫率性之不可以己也則焉知
今之略不爲後之詳哉且是舉也譬諸作梓材則
爲樸斲若作室家僅是垣墻其稽田服農今在數
菑而責其丹牖乎斯墜茨乎斯修疆畎乎斯計何
大早也况是原書固月池公所賚而晉之於蘭學
亦倣載於此則他有甫田匪我思存雖其種之不
美哉雖其苗之不碩哉晉曷敢不終其畝此其所
以不厭簡約也

一原書是係荷蘭國醫王函涅斯垵我爾德兒所撰
而其鏤版在彼紀元一千七百四十四年實吾
享保十九年矣病門凡五十五篇通三百二十章
篇次以病所屬爲序發無定處爲始頭腦次之頸
項次之胸膈次之腹肚次之尿道次之終以皮表
觀其所屬亦足以領其辜較矣何以言之觀不寐
卒厥譫妄癩瘕等收諸頭腦之部則已知其原因
之所在也今所譯定一依其舊但原本一冊今分
爲十八卷更揭章號於紙端以便緝閱
一通編之譯只以達原文之意爲急以求其所未發
知其所不同爲主故語勢多曲從拗合舍此就彼

者不覺言轉語倒與和漢古今之文例大異如無
檢格然雖曰晉之不嫻乎文辭所致要之其所不
同處卽是主意

一每病門襲舉羅甸名於今所譯如贅疣然然羅甸
名是西洋雅言名物稱謂所原據闔洲共國所通
用學者識之則當博涉荷蘭醫籍之際隨遇卽解
不煩質訪譬猶羈行異域忽逢故舊中野失鄉直
得斗極大有進步之助焉故不厭重複出而示之
以充馬前之車也

一病有不可以漢名對譯者漢之無名也非無病各
病而共分之也此以其命名之義所據不同窮理

之原所見互異有彼所有此不必有而此所無未
必無於彼者有此爲一病而彼爲數病彼爲一病
而此爲數病者有彼以列病門而此則爲証散在
諸病不以揣意彼以爲標証不必執滯而此則儼
成一病者有無相涉分併互雜其不可以一抵一
也固矣然其出入同異正是啓發之田地
一凡名物創見闕書中而經漢人之譯者皆襲用焉
乳麩硝子薔薇露之類是也其他則雖言不雅馴
姑且新譯以俟後賢如白酒赤酒麥酒盃酒石瀉
利鹽動脈血脈門脈腸間膜輸尿道水道脈管神
經厚腸薄腸十二指腸蒸發氣粘稠液稀涼液老

廢液變壞液腐敗液酷厲液肝崩痛利之類是也。其中所有與古來所有同名可疑者又有不可知其為何物者並略引諸書以示其槩自餘可據字而通者及本文有關說者不必註焉又其直譯出漢人之手如洎夫藍沒藥盧會底野迦阿芙蓉舍利別之類皆襲用焉餘則據漢人譯例新製之

一藥物漢籍所不載物性主療等不可得而詳者則月池公所譯和蘭藥選既自昭昭焉就考之可但若其物蘭舶所齎來者有之藥舖所貨賣者有之傳其種子往往藝殖者亦有之恐人眩其名概為遠物置諸不講是以論及

一藥秤名謂彼此各異要分釐準之常有不盡頗覺煩冗是以自錢而下曰幾分錢之幾從簡約也

一器物容量之不可知猶漢人所用盃碗盞鍾等可梗槩而不可覈知也非獲其物則不可也故傳疑以俟後賢

一西醫之術一從是內景而來其論病因亦復爾彼其之子少而習焉其心藏之一聞其論無有壅闕之患若否則遽見而難乎其解是以欲明其義者須讀解體書於舊習之外更建一新局乃為得矣

一譯行是書其意一在為內醫者流創業垂統啓迪後人是以特辟草萊剔柞楫而已固知其杌陘有

不安也。奚暇圖其砥平與髮直哉。覽者其恕諸。

宇晉識

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

西說內科撰要總目

卷一

發無定處

寒熱篇第一

卷二

翁傑達安篤竭意度篇第二

壞液篇第三

卷三

失苟兒陪苦篇第四

聖京健篇第五

伊屈多篇第六

西說內科撰要

内科撰要 總目

卷四

諸氣篇第七

黃疸篇第八

卷五

膽汁敗黑篇第九

煩悶篇第十

痲篇第十一

水腫篇第十二

卷六

病屬頭腦

昏睡篇第十三

不寐篇第十四

卒厥篇第十五

卷七

頭眩眩冒篇第十六

精神錯亂篇第十七

卷八

曷郎布蘇對布的列金屈篇第十八

頭痛篇第十九

病屬頸項

喉風篇第二十

卷九

内科撰要 總目

病屬胃膈

咳嗽篇第二十一

吐血篇第二十二

卷十

刻未

胃腸痛篇第二十三

肺痛篇第二十四

喘急篇第二十五

卷十一

刻未

病屬腹肚

嘔血篇第二十六

惡心乾嘔篇第二十七

西說内科撰要卷一

遠西

玉函涅斯垓我爾德兒著

津山

宇田川玄隨晉譯

日本

鑿官法眼桂川甫周國瑞外閱

發無定處

寒熱篇第一

哥爾都ハ羅甸ニ是ラ歇貌立私ト云。此内因ヨリ

哥爾都ハ羅甸ニ是ラ歇貌立私ト云。此内因ヨリ

シテ生スルノ疾ニシテ、隱伏シテ見ルコト能ハ

ル所ヨリ發ル、初候先ツ惡寒戰慄シテ、面色黯昏

灰白其脉大抵弱ニシテ數ナリ○尋テ大ニ熱シ
身體乾燥シ。多ハ誘シテ渴ヲ發シ。脉寢シテ緊急
ニシテ強ニ。面色始ヨリ萎痺セルヲ改メ。更ニ赤
シテ盈脹ス○爾後大熱始テ減シ。遍體潤澤ヲ生
シ。汗スナハチ出テ。脉緩柔ヲ見ス。○究竟ニ至テ
諸証盡ク解散ストイヘ。尚衰弱ノ証數件ヲ餘
シテ。時月ヲ經ルコト多カラサレハ。常ニ復セサ
ル者ナリ。

右第一章哥爾都ノ大較ヲ論ス

此病大別シテ是ヲ二種ニ分ツ。曰ク真哥爾都。曰
ク類哥爾都。是ナリ。真哥爾都ハ。自ラ其原由アリ

テ。上章ニ說トコロノ諸徵候ヲ見シ。身體ノ諸部
ニ數件ノ諸証ヲ發ス。其諸証本原ノ哥爾都ヲ除
治セサレハ。解散スルコトナシ。其諸証ヲ治セシ
コトヲ要スルモ。治スルコトアタハス。其諸証ノ
發スルコト。病ノ初ヨリ傍ヒ来ルナリ。○類哥爾
都ノ熱ハ。他ノ原由ヲ異ニスル本病有テ。是ヨリ
旁出シテ發ス。例スルニ金刃創傷打撲閃挫湯泡
火傷等ノ類ノ如キ。是ナリ。其病大ナル者ハ。熱モ
亦大ニシテ重シ。其發スル所ノ本原ニ從テ。熱微
甚ヲ為シ。常ニ定テ本病有テ其熱ハ後ヨリ見ル。
真哥爾都ノ始ヨリ諸証ヲ從へ起ルト自別ナリ。

其熱ヲ治セント要スルモ治スルコトアタハス亦解スルコトナシ。右ニ列スル所ノ數件ノ本病ノ治セサル間ハ。是ニ傍ヒ居ルナリ。然トキハ真哥爾都ハ標証ヲ捨テ哥爾都ヲ治シ。類哥爾都ハ直ニ其主病ヲ治スヘキナリ。是治療ノ標本先後宜ク意ヲ用テ仔細ニ從事スヘキ所ナリ。

右第二章哥爾都ノ大別ヲ論ス

人發熱アリテ替雷シテ解セサルヲ蹤蹟スルニ。三種ノ品類アリテ。同カラサルコト有コトヲ見得タリ。○其三種ノ哥爾都第一ヲ替雷熱トイフ。發熱替雷シテ少モ解セス。或ハ三四日。或ハ六七

日。或ハ其餘モ持久シテ。然後ニ盡ク消解スルナリ。○第二種ヲ間歇熱一名往來熱ト云。其熱發作スルトキハ。第一種ノ替雷熱ト一般ナリ。然トモ只其發作シタルノ間一日ヨリ久ク持久スコト有コト稀ナリ。然ハ則チ一日ヨリ長クハ發作ツヅケスシテ全ク醒解カト云ニ。形狀ハ全ク醒解タルニ似タレ也。又從テ再發スルコトアリ。日毎ニ一發スルアリ。二日ニ一發スルアリ。二日ハサニ二三日に一發スルアリ。是故ニ日發熱。間日熱。三日熱ノ諸名アルコトヲ致ス。右ノ中ニテ二日ニ一發スル間日熱ト。二日ハサニ三日ニ一發

スル三日熱トノ二種ハ。共ニ能ク互ニ相乘シテ
其發日復夕齊整十ヲサルニ至ル者亦コレアリ
○第三種ヲ番替熱ト云。其証間歇熱ノ如ク發作
ストイヘ凡。其先次發作シタル熱ノ未盡ク解シ
歇サルニ逮テ。早クモ再ヒ重テ發作スル也。○此
毎ニ多ク第二種ノ間歇熱ノ治セスシテ漸長シ。
重ニ進タル者。是ノ如キ番替熱ニ變シ入ル者十
リ。然トモ他ノ疾ヨリシテモ。亦能ク壞シテ斯ニ
及フ者多シ。此証ノ治ヲ得ルコト稀ナル所以十
リ。
右第三章哥爾都ノ區分ヲ論ス

凡諸熱ノ發スル原由ヲ考ルニ。人身生育スヘキ
天資固有ノ自然ノ諸物ヲ稟テ體中ニ布滿シ。以
テ動靜之為。百爾ノ運営ヲ作シ。身命ヲ長全ス。皆
天稟自然ノ良善ノ諸物ニ賴テナリ。然ルニ若シ
其自然ニ敵スル邪毒ノ酷厲ナル者。體中ニ侵シ
入テ。諸ノ良善液ト混同シ。其最較著ナルハ自然
ノ賦與ニテ。動脈ノ裏面ニ普ク澆溉シ有ル所ノ
液ニ混スルトキハ。動脈彼ニ侵襲刺戟セラレハ
ニ因テ。邪毒ノ迫切スルカ為ニ。運動ヲ增益發起
シテ是ニ膺ラサルコトヲ得サルナリ。○此ハ是
人身中自然ノ良智能ニシテ。滿支體何ノ部ニテ

モ。自然ニ敵スル外物ノ侵刺スルニ於テハ。必其
運動ヲ増發シテ是ニ應リ。以テ是ヲ排擯斥出ス
ルナリ。若シ其侵刺スルコト即時ニ退散セズシ
テ持久スルトキハ。則其諸液中ニ備ル自然ノ良
智能ニ因テ。諸液再ヒ更ニ是ニ隨從シテ。以テ包
摂圍繞シ。遂ニ誘導シテ是ヲ出シ除クナリ。其一
箇ノ液ヲ以テ隨從シ。包摂圍繞シテヨリ。遂ニ誘
導シテ出シ除ク者ハ。即所謂膿汁ナル者。此其形
ノ以テ見ツヘキ者ノニ。諸ヲ譬ルニ猶是竹木刺
ノ如シ。僅々乎トシテ纖小ナリト雖。苟其在所ノ
處ハ。皮膚ノ至淺ナルモ。亦必ス其運動ヲ増發シ

テ。是ヲ誘導シテ出シ除クニイタル。是ヲ以テ竹
木刺ノ皮膚ニ在ル。始ハ熱シ痛シ。夫ヨリ次第ニ
腫起シ。膿ヲ成ニ及テハ。痛モ熱モ去リ膿中ニ其
物ヲ包摂シテ出シ除ク時ハ。其蹟故ノ如クニ瘰
ルヲ見テ推ヘシ。○右ノ如ク兩箇ノ良智能ニテ。
二物カラ戮テ。其自然ニ敵シ生育ヲ害スル邪毒
ヲ。撰持包圍シテ外表ヘ送出スナリ。此其邪毒多
シテ。良善ニ服從セス。齊シク化ニ向サル力故ニ。
爰ニ及フノニ。

右第四章哥爾都ノ内原ヲ論ス
哥爾都ノ外因ヲ原ルニ。右ノ酷厲ナル邪毒ノ人

ノ身體ニ侵入シテ潜藏スル者。偶一時流行ノ傳染スルキ不正ノ氣ノ誘導スルニ會遭シテ内外相契合シテ是ニ應感シテ發シ。或ハ不斷身體ヨリ發升スレトモ。人目ノ見得コト能サル蒸氣ナル者有テ。是ヲ閉塞スルコトアルニ因テ鬱蒸シテ熱ヲ生スルノ變ニ乘シテ發スルナリ。何トナレハ胃才ヨヒ諸腸ノ中ナル腐壞セル液ヨリシテ生スルノ諸熱原爾文皆弱爾都トイフ。或ハ熱トイフ。互ニ示ス。ニ至テハ便ニ隨テ即發シテ。右ノ外因ニ拘ハラス。以テ立定タル次第ヲ保スルコト稀ナリ。是ヲ以テ是ヲ諸病ニ附屬シテ旁發スルノ熱ニ

屬シ。即千類哥爾都ニ係ク。故ニ定テ一例ヲ以テ治シカタシ。素性別ニ一箇ノ本病有テ。夫ヨリシテ此類哥爾都ヲ旁發スト云ニ本モトテ。斯ニ從事シテ廼得此處真假ノ間。標本ノ別。錯誤ヲ致スコト多カラストセス。

右第五章哥爾都ノ外因ヲ論ス

諸真哥爾都ハ各其毒原文ニ是ヲ私私使府トイフ。思アリ。故ニ義譯シテ毒トイフ。中一ヲ製成シテ。究毒毒一物等ノ毒ニ非スト知ヘシ。一面ハ是ヲ汗ヨリ竟是ヲ驅逐シ出シ去ルナリ。一面ハ是ヲ汗ヨリシ。或ハ人目ノ見コトアタハサル。身體ヨリ居フ恒ニ發泄スル蒸氣ヨリシテ排斥シ。ニ来ハ是ヲ小便

ヨリシテ利シ除クナリ。其徴ヲ知ント要セハ。其
旋中ヲ見ヘシ。白塗ノ其中ニ現ル。是其物ノミ。
○是故ニ小水中ニ此白塗アルハ。一箇ノ善徴ナ
リ。若シ是白塗ナキハ。哥爾都ノ毒。泄利スルコト
アタハスシテ。身體中ニ滯鬱スルノ徴ナリ。○只
是諸液ノ腐壞セルヨリシテ發スルノ諸熱ニモ。
亦小便中ニ是ノ如キ白塗ヲ泄スルコトアリ。此
ハ是其腐壞セルノ徴ナリ。然シテ其腐壞ノ証甚
シキ者ハ。白塗モ亦夥シ。其物唯病ノ徴甚ニ隨テ
多少アリ。是故ニ類哥爾都諸病ニ附属シテ旁發
スルノ証ニ。コノ白塗ヲ現スハ。多ハ惡徴トスル

ナリ。○其真哥爾都ノ運行強壯過大ナルノ証。即
是ヲ診スルニ。其脉強ニシテ數駛。身體大ニ熱ス
ル者ニ於テハ。スナハチ膿ヲ製成シテ。以テ是ヲ
誘道シ出シテ。小水中ノ白塗ト為コトナク。只是
ヲ一箇ノ敗血漿ト為ノニシテ。復包摂化醸ス
ルコト能サルカ故ニ。其小水大ニ赤シ。此其敗血
漿ノ染ル所ノミ。其毒ヲ包摂シテ排斥シ除クコ
ト能サルヲ以テ。白塗有シムルコトアタハス。是
ヲ以テ惡徴ト為ナリ。敗血漿原名ヒ格耳マヒ
函ニ曰ク。是ハ水液又水カスリタル血ナリ。金創
ヲヨヒ腫瘍等ニ流灌スト。故ニ今敗血漿ト譯ス
又夫ト引替ヘ運動己微弱ナル者。是ヲ診

内科綱目 卷之二

スルニ。其脉軟弱ヲ見シ。身體熱無シテ惡寒スル
トキハ。迺チ小水ノ色黯澹灰白ニシテ滓渣ナク。
若クハ滓渣有モ凝結セスシテ散渙シ。滿小水一
様ニ彌漫シテ見ヘ。又ハ地上ニ沉着シテ粘滑セ
ルカ如ク見ユルカ。或ハ粉ヲ布カ如クニ見ユル
者ナリ。斯ノ如キノ証ヲ得ルニ臨テハ。是其哥爾
都甚夕長ク稽留シテ解セス。腹中ノ諸藏閉塞シ
テ。其粘滑ノ毒。又原文ノ私粘拂ヲ譯シテ云。所在
ル。重ク是ヲ見ルコトナカレ。所在
ニ凝滯スルコトヲ為易シトス。○其哥爾都ノ毒
右ノ如ク身體中ニ滯留スルトキハ。遂ニ變シテ
腐壞液ト為リ。夫ヨリシテハ他ノ諸般ノ疾ヲ發

シ將出シ来ルコト。毎々是アル証ニシテ。其病毒
元此哥爾都ノ中ニ潜伏シ存スト云コト。以テ知
ルヘキノミ。

右第六章哥爾都ノ毒ヲ論ス

其真哥爾都ニ於ル。ニ般ノ療法アリ。○其一ハ曰
ク。毒ヲ攻治スルノ法ナリ。其哥爾都ノ毒ヲシテ。
身體中ニ潛藏シテ此哥爾都ニ成遂ルホトニ。久
ク止住セザラシムルヤウニ。變シ消スルナリ。此
法ハ是其藥力ニ因テ。盡ク其毒ヲ斥出驅除シ。或
ハ轉シテ美液ト變スルコト。誠ニ奇ニシテ。殆ト
思議スヘカラストス。○其二ハ曰ク。自然ニ從フ

ノ法ナリ。上ニ論スル所ノ自然ノ良智能ノミラ
扶右シテ行フナリ。夫生活ノ運行。其度ヲ失ハサ
ル者ハ。自其運行ノ力ニ因テ。哥爾都ノ毒ヲ包摂
シテ。排斥驅出スルコト。自然ノ良智能ニシテ。他
カラ假ラス。然トモ若シ其運行。或ハ過。或ハ不及
ナルコト有トキハ。スナハキ其自然ノ力。哥爾都
ノ毒ニ抵當シテ。勝利ヲ得コトアタハズ。是ノ時
ニ當テ。此法其弱ニシテ不及ナル者ヲハ。是ヲ増
益シ。其強ニシテ過度ナル者ヲハ。是ヲ減損シテ。
以テ其自然ヲ助テ。度ニ中ラシメ。以テ其疾ニ勝
シムルナリ。

右第七章哥爾都ノ治法ヲ論ス
凡疾ヲ發スルノ諸毒。各各同カラザレハ。發スル
所ノ疾モ。皆其種種ノ毒ニ從テ。其性ヲ異ニス
云ニ論ナシ。其毒同カラザレハ。是ヲ攻治スルノ
法。亦各種ノ區別アラサルコトヲ得サルナリ。是
ヲ以テ此ニ舉ルトコロノ消毒ノ一法。悉クニ諸
種ノ哥爾都ヲ治スベシト謂コトナカレ。○今余
カ歴試明知スルトコロノ者ハ。止ニ哥爾都中ノ
一種ノミ。此其消毒ノ法ニ依テ治スベキ者ナリ。
所謂往來熱是ナリ。往來熱ハ即癩ナリ。イカニ
東西病考ニ詳ニス。何トナレ
バ。其三種ノ中ニテ。替留熱ニ至テハ。イマダ其良

法ヲ得コトアラズ。其番替熱ニ至テハ。其法ヲ得
コトアルコトナシ。此其症多ハ旁出ノ諸症ニシ
テ。諸般ノ性ヲ異ニスル原病アリテ。是ニ傍ヒ来
ルカ故ニ。其原病ニ本ツヒテ是ヲ治スルコトナ
レバ。別ニ自ラ此症ノ治法トテ。門ヲ專ニシタル
法ハナキ所以ナリト知ベシ。

右第八章哥爾都ノ消毒ニテ治スルノ証ヲ
論ス

右ノ間歇熱一名往來熱ヲ治スルニ。法ニ條ニ分
ツナリ。○第一ハ是自然ノ良智能ヲ順調スルニ
在リ。是ヲ順正治法トイフ。宜ク下ニ於テ講明ス

ルニ依テ。斯ニ從事スベシ。第二ハ是消毒ノ法ニ
係ル。○爰ニ宜ク意ヲ用テ熟察スベキハ。自然ノ
原由ヨリ發シ来ラズシテ。他病ヨリシテ旁出ス
ル者有ナリ。例スルニ番替熱ノ如キ是ナリ。若シ
是ヲ辨セガレハ。則チ消毒ノ能ク治スル所ニア
ラス。彼ニ自其原由ノ在コトアリテ然レバナリ。
又外ニ宜ク仔細ニ診察シテ的實ニスベキハ。他
ノ疾ノ體中ニ挾有スル事モアルベシ。左スレバ
此順正治法ニ於テハ。特止其生氣ノ運行ノ力ノ
ミニテ。其毒ヲ驅除シテ。以テ治スルニ至シムル
コトナレバ。少シニテモ側ヨリ其治法ヲ奪ヒ障

内科要略 卷之二

スルコト有トキハ。其哥爾都ノ治ニ於テ。甚害アリトスルガ為ナリ。

右第九章往來熱ヲ論ス

若シ人は是純粹ノ間歇熱ニテ。體中ニ於テ少シモ他ノ疾ノ混雜シ居ル者ナシトイフコトヲ確知シテ。是ヲ治セント思ハバ。其未久ヲ經ガルニ達テ治ラ施スベシ。愈早ケレバ愈宜シ。此其惡候ノ次第ニ生ズルニ至ザルニ先々ツテ。身體ノ衰弊スルコトノ未甚カラサルニ趁ガ為ナリ。此一種ノ哥爾都スナハ千後方ヲ用テ其毒ヲ攻治スベシ。

方

字露非亞尼皮 八錢

和蘭是ヲ哥爾都ニ出ル者ナキカ為ナリ。西都ヲ治スル。其右ニ詳説アリ。又諸術秘藏ニモ專ノ居家纂要ニ餘諸書皆記スルコトヲ明ベシ。月池ノ未シトシ。其樹今此ニ有ルヲ明ベシ。ク形状ノ和蘭ヲ載ス。委

右細末ト為シ。蜜又ハ舍利別ヲ以テ調勻スルコト。昆設ル拂ホドニシ。或ハ達刺俺篤脂ヲ用テ。傑烈易ノ稀稠ニ和シテ丸ト為スベシ。○又右ノ藥末ヲ將テ分テ二十四分ト為シ。酒或ハ麥酒ニテ。其一分ヲ取テ飲服スルモ亦可ナリ。

内科要略 卷之二 十一

内科要略

○又右ノ哥尔都皮即亭露非亞尼皮二十皮。原文
テス。故ス。就ラ酒ニ浸出シテ是ヲ用ヒ。アルヒハ
水ニテ煮ルモ。亦可ナリ。其時ハ宜ク三倍程モ
増益シテ多ク用ベシ。以テ其散ニテ用ルト効
驗ヲ同スルニ取ル。○惣ジテ此方ヲ用ルコト。
一劑ヲ分タル其一分ヲ取テ。半時アルヒハ一
時毎ニ。是ヲ服スルコト其熱ノ發作セザル間
ニ於スベシ。斯ノ如ク是ヲ服スルコト。熱ノ發
ノ次第ニ減少シテ。藥ノ應ジタルコト明白ニ
覺ヘラレ。程ニナリテモ。依舊右ノ藥ヲ渝ヘ
ズ。平常ノ通ノ小便ニナリテ。少モ哥尔都毒ノ

白塗ノナキヤウニナル迄ハ。用ヒ通スベシ。何
トナレハ。其哥尔都毒ノ小便中ニ現ル。白塗
ノ泄スルアヒタハ。明シ是其熱ノ發作スルコ
ト未全ク止ガルノ象ナルコト。斯ノ如クナル
時ハ。夕トヘ一旦愈ルニ倍タリトモ。間モナク
再發スト知ベシ。其哥尔都毒ノ未盡ク服從セ
サル徵アルガ為ナリ。
其間日熱ヲ驅除スルニ至テハ。幾多ノ論說ノ必
己ベカラザル者有テ。茲ニ畧舉スルコトヲ得ス。
只其三日一發ノ熱ヲ治スルニ至テハ。大抵其分
量ヲ二三倍ニシテ是ヲ用テ可ナリ。○哥尔都ノ

内科要略

卷之二

玫瑰花又ハ肉桂ヲ以テ是ニ合和シ。アルヒハ浸シ。
牢達^{ラウダ}扭^{ニウ}謨^ム律^リ規^キ需^{ニウ}謨^ム少許ヲ加テ與ルヲ妙トス。
夫衆人ノ皆一様ニ此字露非亞^{ルビヤ}尼皮^{ニヒ}ヲ惡ミ嫌フ
コト。奈何トモ為ベカラザレハ。和蘭書中ニモ或
ニ遠西名物考アリナラ和蘭藥選並
者。多クハ工夫ヲ為シテ。是ニ調和スルニ他ノ諸
藥ヲ以シテ。香氣ヲ添ヘ。味ヲ美ニシ。色モ亦各種
ノ合和スル所ニ隨テ同クヲザルニイタル。以テ
患人ヲシテ是其物ナルコトヲ知コトナカラシ
ムルガ為ナリ。此等ノ事。嚮徒眩誣ノ為トコロニ
シテ。此處ニ於テ附記シ意ヲ注ヘキニアラザル。

無用ノ事ニ。近キガ如シトイヘドモ。治療ノ道歷
ク事情ニ涉リ。博ク機變ニ通ジテ。其術ヲ運用ス
ルニアラザレハ。變ニ應ジ功ヲ収ルコトアタハ
サル者ナルガ故ニ。意得ノ為ニカクノ如キ事マ
デモ是ヲ説與スルナリ。此字露非亞^{ルビヤ}尼皮^{ニヒ}ノ純正
ナル間歇熱ヲ治スルニ於ル。保シテ千ニ一ヲモ
失ハズ。

右第十章間歇熱ヲ治スル藥方ヲ論ズ
生氣ノ運行ノ自然ニ從テ治療ヲ施ス時ハ。消毒
ノ法ナシ。是ガ為ニ第九章ニ所謂順正治法ヲ為
スコトナリ。以テ其運行ヲシテ大ニ強ナラシム

ルコトナク。又バチ已弱カラシムルコトナク。自能ク其毒ヲ包摂服從シテ。遂ニ是ヲ斥出驅除スルコトヲ得セシムルナリ。○自然ニ從テ施シ行ク順正治法ニシヒテハ。諸般ノ哥コウ尔ル都ニ處スルニ。其不可ナルトコロナシ。且古ヨリ多ク經用シタルトコロニシテ。王道無憂ノ術ナリ。惟其中ニ就テ。過ニ屬スル証アルカ。又ハ不及ニ係ル証アルカ。イツレカ一ツ是非アラハルナリ。因テ其証ニ隨テ。大過ナル者ヲ減損シ。不及ナル者ヲ増益シテ。是ヲ變ジテ過不及ナク。度ニ中テ其毒ヲ驅出スルニ適ニ宜ホドニスルノミナリ。何イカニトナ

レバ。元ヨリ。運行ニ於テ過不及ナキ者ニハ。藥方ニテ更ニ其運行ヲ變易スルコトハ須スザルナリ。右第十一章自然ニ隨フ治法ヲ論ス。若シ夫レ身體壯熱シ。其脉強盛アラハシ。氣息急促ナルノ証ヲ發スルハ。當ニ辨スベシ。是第六章ニ論ズルトコロノ。運行強盛ナル者タルコトヲ。然シテ其身體別ニ其治ノ害ニナル他症有テ挾ムコトナキコトヲ明ニセバ。則チ宜ク刺絡法ヲ施シテ瀉血スベシ。大槻玄澤ノ著ス所。ハ刺絡精要アリ。詳ニ其術ヲ載ス。一次ニテ思フ俛ニ驗アラズハ。再瀉スルモ苦力ラズ。藥ハ宜ク清涼ナル吉ケレ利イ詞ス參テ兒ルヲ用ヘシ

約十異原
卷之二
十二
十五

内科撰要 卷之十一 五

清凉ナル吉利詞參兒方 水一銚入ルテ蒸ノ液ヲ膈中ニ

同下 皆 精大麥 各八錢 木實ノ暗液。詳ニ月池公

答末林度 三錢 和蘭茶選ニ見タリ。

梅那葉 百二十錢

水 右件合シテ是ヲ煮。九十六錢ヲ取り。漉過シ。

蜜 八錢

焔消 一錢

右ノ二味ヲ和シ。温テ是ヲ使用ス。

此ニ亦施用スベキ一方アリ。其胃ヲヨビ膈ヲ淨

除スルニ。一箇ノ清凉ナル下劑ヲ以テスルナリ。

清凉ナル下劑方

梅那葉 二錢

答末林度 四錢

焔消 五分

水 四十八錢

右件合シテ文火ニテ徐々ニ是ヲ煮テ滓ヲ去

リ服ス。宜ク温用スベシ。斯ノ如クニシテ思フ

マニ下利セズハ。其次日ニ至テ少ク梅那葉

ヲ増加シテ用ベシ。

夫運行強盛ニシテ度ニ過ギ。大熱乾燥スルトキ

内科撰要 卷之十一 十六

ハ。患人其水液枯涸スルニ苦渴シテ。其熱燥ニ堪ルコトアタハズ。是時ニ當テハ。逃^ヒ不過^ヒ患人冷水ヲ引テ自救ンコトヲ要シテ。多分水飲ヲ用サルコトアタハズ。便チ是ニ稀薄ニシテ稠粘ナラサル清凉ナル液ヲ與ベシ。其是ヲ與ルコト。多ク飲ント要スルモ。少シ宛^ヅ與テ其望ヲ塞ヘシ。然シテ冷飲セント要スルモ。少ク温テ是ヲ服セシムベシ。此其隨意ニ其欲ニ充テ、多飲スレバ。澁滯シテ腹滿ヲ致シ。冷服セシメテ苟モ口ニ適^キスレハ。熱液ヲシテ脅縮セラレテ凝結シ。解散スルコトヲ得ガラシムルガ為ナリ。百九十八章ニ曰ク。其中意ヲ用テ斯ニ從事

スベキハ。第一ニ冷飲セシムルニハ。暴^ム卒^ニシテ寒^シ冷^シテ投^スズ。若シ是^レ發^ルガ故^ニ凝^リ泣^シテ濃^ク厚^クイタルコトヲ致^スリ。得^テ換^ルハ。是^レラ^ニ飲^ムニムルコト。宜^クトク^クス。以^テ宛^ニ胃^中ニ盈^リ滯^セシラ^メ重^クナラシムルヲ要^スル^ニ其^レ益^ナク^リ。今其宜ク用ベキ諸湯液ノ方二三ヲ舉テ。以テ其例ヲ示ス。

清凉飲ノ方

- 精大麥 八錢
- 蜜 十二錢
- 醋 八錢
- 水 百二十錢

右件是ヲ奄閉セル磁罐中ニ於テ煮コト。麥熟

シ花發スルヲ度トス。

又方

ハニス皮思格古蟄三十二錢

蒸餅ヲ再ヒ焼タルヲ云ナリ

答末林度十二錢

酒石四錢

譯名ナリ。葡萄酒中ニ生スル石鹼ナリ。惡液ヲ下シ。留飲ヲ疏滌ス。和蘭茶選ニ委シ。

水百二十錢

右件是ヲ磁罐中ニ於テ煮用ユ。

又方

酸模根各十六錢

ハニス皮思格古蟄

焔消一錢

水二百錢

右件合シテ磁罐中ニ於テ是ヲ煮テ。細篩ヲ用テ漉過シ聽用ス。

右ノ諸劑ニ必ズ加ベキ者アリ。即是香椽ノ汁ナ

ラビニ覆盆子ノ汁等ヲ和調シテ。少ク砂糖ヲ加

テ其味ヲ添テ最可ナリ。○右ノ如ニシテ。其熱ア

ルノ中少シク衰弱ノ候ヲアラハサバ。宜シク烈

應設酒酒名物考ニ出ス。遠西少許ヲ加ルヲ良トス。○

若シ是ト一齊ニ多ク下利ヲ催スコト有バ。方中

ニ玫瑰花一溢ヲ加テ煮用ユベシ。妙トス。○凡此

諸飲ヲ以テ患者ニ與飲シムルコト。大熱過度ナ

ルノ間ノ之。然シテ須ク諸ノ肉ニテ製造シタル物アルヒハ肉ト共ニ煎煮シタル物ヲ禁ズヘシ。此其右ノ類ノ飲食ヲ用ルトキハ。大熱鬱蒸シテ。臭敗腐壞ニ至リ易キガ為ナリ。

右第十二章運動大過ノ哥尔都ヲ論ス

身體清涼。其脉弱ニシテ遲澁ヲ見シ。氣息勢力ナク。沉怠ナルノ証アルハ。是生氣ノ運動不及ナリト知ベシ。其熱毒ヲ包摂シテ。是ヲ制服シ。以テ排斥驅除スルコト。第六章ニ説ガ如クナルコトアタハズ。其力是ニ勝ニ足ガルナリ。是症ニ臨テハ。一二ノ温煖劑ヲ用ルヲ緊要トスルナリ。其温煖

ラ主ル哥尔都ノ主劑。即チ左ニ列ス。

哥尔都ヲ治スル温煖劑方

工答刺越而發根

茵陳鹽

鹿角霜 各一錢

右件細末ト為シ。合セテ散劑ニ作り。十二ニ分チ。一時アルヒハ一時半毎ニ。湯液ニテ其一分ヲ飲服ス。

又方

煮大麥汁 六十四錢

工答刺越而發根 一錢

六科撰要 卷之一

底野迦 二錢

安質没扭護若波烈蟄屈護

茵蔯鹽 各一錢

沙糖 四錢

右件合シテ調勻シ。半時毎ニ一匙ヲ服スベシ。

通用ノ匙。容盛スルコト四錢ヲ以テ是ヲ密吉

私點刺トイフ。右名ナリ。種類多シ。丸散湯飲

テ譯スベカラズ。

又方

龍膽 各八錢

白芷 各八錢

葛而儒整涅實屈室

茵蔯 各一溢

白酒 二百四十錢

右件合シテ奄閉セル柑和蘭ニ壘ト把イアル或

ハ硝子ノ中ニ封定シ。氣ヲシテ泡出セシメ。其

液ヲ取テ半時又ハ一時半毎ニ爾ルウ篋兒ルウ苴ルウニ一

盃半ヲ飲服ス。名。遠西名物考ニ出ス。

右ニ列スルトコロノ諸方。盡ク一齊ニ是ヲ用ヨ

トイフニアラズ。或ハ此ヲ用ヒ。或ハ彼ヲ服シ。孰

此中ニテ一方ヲ用ルコトナリト知ベシ。其是ヲ

用ルコト。哥尔都ノ生氣ノ運行ニ因テ盡ク解散

内科撰要 卷之一 十四 二十

シ了ルニイタルマデホ。持又シテ渝ズ長服スベシ。
右第十三章運動不及ノ哥尔都ヲ論ス
大允諸病ニ附シテ發スルノ熱ヲ類哥尔都トイフ。此類哥尔都ハ其来多端ナリ。是ヲ以テ予其治法ヲ察シテ尽ク此ヲ舉ルコトアタハス。何トナレハ。此ハ是一箇ノ標症ニシテ。小碎ナル者。復彼真哥尔都ノ自其原由アリテ發スル本病ナル者ト共ニ同ク将来ヘキ者ノ比ニ非レバナリ。○然レドモ其諸件ノ中ヨリ。一二ノ証候ヲ援引シテ。以テ其例ヲ左ニ示ントス。

右第十四章類哥尔都ヲ論ス
夫船中ニ在テ生活スル人衆。オヨビ城邑等ニ住居シテ日ヲ送ルノ輩。常ニ動作運行スルコト稀ナルヲ以テ。多ハ類哥尔都ヲ患ル者ナリ。此皆其胃中充滞シテ。夫ヲ善ク療スルコトヲ為ザルニ因テ。胃中居恒ニ汚穢ニシテ。淨間ナルノ期ナク。以テ其發熱即類哥尔都ノ原因ト為ナリ。○若シ人消化シ難キノ食物ヲ用ルトキハ。隨ハ即生氣ノ運動差減ジテ。身體健ナラザルコトヲ覺フ。以テ其胃中充滞スルガ致ス所ナルコトヲ辨ズルニ足ル。斯ノ如ニシテ治セズ。以テ痼癖ヲ成トキハ。飲

内科異議 卷之一 十五 二七

内科要略 卷之六

食ヲ思ザルノ証ヲ為シ。或ハ全ク飲食スルコト
アタハズ。惡心。膈雜ヲ發シ。中脘疼重シ。暖氣シテ
惡液ヲ吐スルニイタル。是証ニ臨デハ。速ニ吐劑
ヲ用テ。胃中ノ宿滯ヲ除ベシ。

吐劑方

韃而答律斯越默窒屈私

六十分錢之三。吐薬ノ名。製法医学宝函ニ見ユ。

答末林度 四錢

薄荷油 一滴

右件是ヲ合和シ用ユ。劑名是ヲ勃律斯トイフ。

又方

印拂亭格祿古私默怛六倫

八錢 吐薬ノ名。製法医学宝函ニ見タリ。

右件頓ニ是ヲ飲服ス。劑ヲ好私默斯ト名ク。

又方

非波葛格安那根

三分錢之一

白酒 八錢

薄荷油 一滴

右件合和シテ用ユ。劑ヲ好私默斯ト名ク。

凡右諸吐薬ヲ服シテ後ハ。宜ク饒多ニ汁液類ヲ
飲シムベシ。以テ胃中ヲ緩寬ニシテ。吐スルニ便
ナラシムルガ為ナリ。然シテ患人吐ヲ得コトア
ラバ。宜ク復再ビ温暖ナル和緩ノ液ヲ飲シムヘ
シ。以テ其胃中ニ在トコロノ者。先ニ用ル吐劑ノ

内科要略 卷之六

剝餘ト。他ノ飲食汁液。胃ニ滯蓄スルトコロノ汚穢トヲ併テ。悉皆是ヲ吐除シムルナリ。○右ノ如クニシテ。多ノ諸熱。胃中ノ汚穢滯蓄ヨリシテ發スルノ諸証。皆能治スルナリ。更ニ復外他方ヲ求ルコトヲ待ズシテ足レリトス。然トイヘドモ是吐藥ニ因テ。真哥爾都モ治スベシト思コト勿レ。吐藥ニテ治スルハ。類哥爾都ノ。胃中汚穢ノ滯蓄ヨリ起ルノ証ノ之。此等ノ辨。既ニ上章ニ於テ是ヲ説與セリ。

右第十五章胃中ノ腐穢ヨリ發スル類哥爾都ヲ論ス

人若シ長ク連綿テ消磨シガタキノ飲食ヲ為シ。又ハ夥ク暴食縱噉シ。或ハ多ク酒漿ヲ飲コト有トキニシテ。并テ箇ノ身體生氣ノ運動差減衰スルコトヲ覺ヘ。大便澁滯シテ順利セズ。又從テ腹肚重滯シテ脹滿スルノ証ヲ發スルハ。明ニ知ル是其腸中ニ汚穢充滿シテ。残り滯ルコト過多ナルコト。夫既ニ温熱ノ處ニ滯止スルニ因テ。鬱蒸シテ腐敗衰惡シ。夫ヨリシテ新ニ熱ヲ釀シ来ルトイフコトヲ知テ。須ク預圖テ。其諸症ノイマダ發セザルニ先ダツテ。第一ニ便用ナル下劑ヲ以テ。其鬱陳ヲ滌除スベキナリ。

内科綱要 卷之十一

下劑方

旃那葉 二錢

答末林度 四錢

葛縷子 一錢 西洋ノ本草ニ苗香及ヒ蔕蘿ト其功ヲ同クスト載スレハ則代用ニテ可ナリ。

撒兒葛怛爾蟄吉安及立加 一錢五分 即前ノ諸厄利私汚利鹽。

水 六十四錢

右件合シテ藥氣ヲシテ出サシメ頓服ス二日ヲ經テノ後再ビ是ヲ作テ服セシム此其一次ノミニテハ諸腸ノ中悉ク滌除スルニ足ザルガ故ナリ。○宜ク第一次ニ於テ下利スルノ多ク少ク視テ第二次ニ於テ旃那葉ヲ損益シテ度

ニ適シ作り與ヘシ。

若其汚穢スデニ悉ク滌除ストイヘトモ其腐壞ノ致ストコロニ因テ其熱尚能暫留シテ解セザル者アリ。此其腸中ニ鬱滯シテ腐壞スルノ間既ニ其血分ニ淪昏シテ腐壞ノ傷ヲ共ニシ其腸中ノ毒ステニ去テノ後特只波及ノ餘傷イマ夕除スシテ存スルノミ。○斯ノ如キノ因ニテ發スル所ノ熱ニ於テハ其藥方須ク其乳糜下ノ第十八章ニ見タリヲ製造滋益スルノ機ヲ補助シテ血液化生スルノ原ヲ事トシ且其ステニ腐壞スルヲ攻治復正シテ新ヲ迎ヘ故ヲ愈スベキナリ。

内科綱要 卷之十一

方

沒藥

一錢

盧會

五分

工怛刺越而發根

茵陳鹽

各一錢

右件合勻シテ散劑ト為シ。是ヲ十二二分チ。其一
一分ヲ取テ是ヲ服スルコト日ニ三次。餉前午
後ヲヨビ日夕。熱人發作セザル間歇ヲ見テ用
ユ。

又方

龍膽

白芷

各八錢

葛而儒整涅實屈室

茵陳

各一溢

橙皮

撒兒葛怛爾蟄吉安及立加

各四錢

右件合シテ二百六十錢ノ酒。大凡此書中二所

是西洋ニ用ル所ノ酒ニ較テ製造已ニ和漢ノ
物ト同カラス。主能モ亦較異ナリ。字ニ就テ混
同セルコトヲ恐ル。故ニ爰ニ註ス。代用ヲ擬議
スルニ因テハ其製造主一能等。考明セザルコト
アタルニハ。就テ遠考ベシ。又ハ麥酒。亦西洋製
考ルニ載ス。就テ遠考ベシ。又ハ水酒各半ヲ用テ浸シ。藥
皮ナル者。亦遠考ベシ。又ハ水酒各半ヲ用テ浸シ。藥
西名物考ニ載ス。就テ遠考ベシ。又ハ水酒各半ヲ用テ浸シ。藥
氣ヲ引出シ。患人ヲシテ日ニ三次若クハ四次。

斗異要

卷之一

和漢醫方類聚
卷之六

三十五

是ヲ爾茂兒直ニ一灑半ツク服セシム。
上ニ舉ルトコロノ諸藥方。是真哥尔都ヲ治スル
ノ方ニ非レトモ。標証ノ熱ノ由テ起ル所ヲ治ス
レバ。稍其類ヲ同クスルニ似タリ。因テ亦真哥尔
都ヲ治スル諸方法ノ後ニ從ヘテ。算シ得テ此ニ
載ルノ之。○茲ニ畧舉スル一二ノ類哥尔都ノ外。
幾多ノ諸標熱アリテ。此處ニ収載スベキガ如ク
ナレドモ。皆各自ノ本病アリテ。是ニ附シテ發ス
ル者ナレバ。其診察治療。一二其原ニ本ツキテ是
ヲ求テ足レリトスルガ故ニ。余ハ則ココニ贅セ
ズ。皆各門ニ於テ是ヲ出ス。看官就テ是ヲ考索ス

ベキノミ。

右第十六章腸中ノ腐壞ヨリ發スル類哥尔
都ヲ論ス。

内科異要

卷之一

三十五

内科撰要卷一終
卷之二
三十一

西說内科撰要卷一終

西說内科撰要卷二

遠西 玉函涅斯垓我爾德兒著

日本 津山 宇田川玄隨 晉 諱
鑿官法眼 桂川甫周 國瑞 閱

翁傑達安篤竭意度ハ。羅甸ニ是ヲ葛結乞西亞ト
イフ。漢人ノ所謂脾胃虛損。面色萎黃。四支怠惰。飲食減少。精神昏倦。情意不了等ノ証是ナリ。其証候ヲ畧挙スルニ。其人先ツ面色黯慘灰白ニ

内科撰要 卷之二 十七章

内科摘要

シテ。其中ニ黄色ヲ帯ルコト。四支身體ニ遍シテ。満皮皆同ク。神意樂ムコトナク。志好了セズ。少氣乏力。四支怠惰。食ヲ思フノ機虧損シテ。飲食減少シ。大率微熱ヲ伴フコトアリ。或ハ是ナキコトモアリ。是ヲ翁傑達安篤歇意度トイフ。又是ヲ挂獨傑蘇得尔突竭意度ト云ナリ。挂獨ハ惡ナリ。傑蘇得尔突竭意度ト云ナリ。翁傑達安篤歇意度ト云ナリ。是以ノ謂ナリ。兼身體ヲ常ヲ養シ。性命ヲ資テ給スル所ノ疾ナリ。

右第十七章翁傑達安篤竭意度ノ大較ヲ論

食ノ口ニ入ル。是ヲ咀嚼スルノ際。神水漸ヲ以テ

潮溢シ。其咀嚼スル所ノ者ト和糅シ。是ヲ包撰シテ食道ニ送下シ。夫ヨリ胃中ニ入り。又諸腸ニ轉輸スル者。皆以此神水有テ是ヲ助ルヲ以テナリ。是ニ加ルニ胃中ノ液ナラヒニ大機里爾汁。及ヒ膽汁等ヲ以シ。胃ト諸腸トノ各異ノ官能ニテ。是ヲ消磨化熟セシメテ一箇ノ乳糜飲食ノ腸間ニテ化白色。是血液ノイマタ成ザル者。ヲ製造ス。飲食茲詳ニ西洋解體ノ諸昏ニ見タリ。ヲ製造ス。飲食茲ニイタリテ。諸官ノ主能ヲ經テ。糟粕ト相泌別シテ。白液ト成ルコトヲ得ナリ。此ヲ傑乙尔トイフ。夫ヨリシテ此ヲ一箇ノ道路ニ導入ル。其道路是ヲ液道トイフ。諸腸ニ網羅附著セル物同シ。亦以

消化ニ関スル事ニ詳ニ見ルニシテ。其道路是

テ是ヲ血中ニ混淆シ遂ニ是ト偕ニ化シテ血ト
成リ。身體ニ周流シ。内外ニ循環スルニ諸官ノ主
能ト氣息ノ橐籥スルトニ因ルヲ以テ。マタ各
部ノ諸液ヲモ分利化成シ。以テ吾人ノ性命ヲ養
ヒ。運営ニ資給スルコトヲ為ナリ。廼無病平全ノ
人皆然リ。○若シ夫右ニ列スル所ノ諸液マタハ
諸官ノ各能。衰シテ其職ヲ善セサルコトアルカ。
將飲食ヲ縱ニシテ度ニ過絶シ。アルヒハ消化シ
カタキノ物ヲ食用スルトキハ。則チ生糞ニシテ
未成熟セヌ。栄養ニ不利ナルノ液ヲ將出シ来ナ
リ。其未熟不利ノ液ニシテ。依舊諸良血液ト偕ニ

身體ニ周流シ。内外ニ循環シ。經絡ノ諸末。至細至
微ノ處ニ迄マデモ。達セザルトコロナキが故ニ。
其未熟ノ血色皮上ニ透徹シテ。顔面身體。皆此衰
異セル色ヲ發スルナリ。熟成セサルノ液自家ノ
本色黄ヲ帶ルヲ以テ。其發見スルトコロ。亦然ル
ノミ。○此疾ノ由テ起ル所ヲ究ルニ。其原ハナハ
夕衆多ニシテ。何レヨリモ能此疾ヲ發スルニ足
レリトス。何者諸官ノ主能ノ衰廢シテ。製造スル
コトノ減弊シタルヨリシテ。皆此原ト為ヲ以テ。
其因復救奉スヘカラザルノミ。

右第十八章翁傑達安篤敬意度ノ病因ヲ論ス

其官能ノ衰廢シテ。製造スルコト人成終全滿セ
ザルヨリシテ。半生未熟ノ諸液ヲ生シ。因テ其顔
面支體悉ク本色ヲ失テ萎黃ヲ現シ。身重ク。動作
運營怠惰廢弛等ノ證ヲ催シナトスルニ及テハ
早^ハ不^ヤ早前ニ説トコロノ諸証ノ原因。スデニ中ニ
根シ存スルコトヲ為スト知ヘキナリ。原ルニ夫
レ凡ソ諸液ノ生人ノ身體中ニ在ル。悉皆兩箇ノ
常道アリテ。必此ニ從テ敢テ茲ニ外ナルコトア
ルコトアタハス。其兩箇ノ常道トイフハ。其諸液
各自ノ性ヲ成就シ遂ルコトヲ得ル所以人者ハ。
只是一箇ノ生氣ノ運行。是ヲ製造維持スルニ因

テナリ。若シ其生氣ノ運行ヲ離テ。自己ノ性ニ從
トキハ。皆製造ヲ經スシテ各腐壞ニ至ルナリ。從
ヘハ則成リ。從ガレハ則敗ル。此ヲ兩箇ノ常道ト
云ナリ。是故ニ。其半生未熟ノ液。業^ス己ニ生スルト
キハ。此ヲシテ其半生未熟ノ液ニ恒セシムルコ
トアタハズ。何者。製造スルノ原由既ニ然ク衰弱
シテ。官能廢弛スルガ故ニ。其崩壞ヲ維持スルニ
タラス。腐敗ヲ以テ常トスル半生未熟ノ諸液ヲ
シテ。縦ニ其性ニ任テ。渝^タ變ノ勢ヲ逞^タセシムルカ
故ニ。腐壞ニ期セザルコトヲ得サルナリ。○右ノ
如ク半生未熟ノ液ハ。其終ニテ居ラヌ者ニシテ

必愛之テ腐壞ニイタルナリ。然ルトキハ前ノ半
生未熟ノ液ニ比スレハ。其疾害殊ニ多シト為ナ
リ。何トナレハ。其半生未熟ノ液ニシテイマタ腐
壞ニイタラサルノ内ハ。若シ生氣ノ運行強壯十
ルノ功力ニ依頼テハ。庶幾ハ猶能ク再是ヲ復シ
テ良液ニイタラシムヘシ。然ドモ惟其遠ク腐壞
液ニ愛シ遂タルニ及テハ。ナカク生氣ノ運行
強壯ナルノ所為ニテモ。復是ヲ良液ニ愛スルコ
トハ大ラヌ者ナリ。○是故ニ。此病ハ治セズシテ
久シキヲ經ホト。愈治シカタキニイタルト知ヘ
シ。○前ニ説タルカ如ク。生氣ノ運行衰弱スルノ

變ニ乘シテ。諸液ノ自ラ其腐壞ヲ逞スルニ臨テ
ハ。スナハチ其變出スルトコロノ証。各其諸液ノ
性ニ隨テ。一般ナラズト知ヘシ。其一般ナラスコ
ハ。下ノ一篇ニ於テ是ヲ論ス又次ノ壞○惟其定
液ハ。下ノ一篇ニ於テ是ヲ論ス又次ノ壞○惟其定
リテ同シキトコロノ者ハ。生スル所ノ液。身體ヲ
榮養シ。性命ヲ保全スルノ為ニ利ナラス。又諸官
ノ主能ニ從事シテ。其製造ヲ助ルアタハズ。此
スナハチ同キノ之。惟其性ノ同カラザル。酷厲ノ
多キアリ。又多カラザルアリ。因テ別レテ稀涼液
トモナリ。又ハ粘稠液トモ愛シテ固有ノ酷厲ヲ
ナラ挾有スル者アリ。マタ是ナキ者有ナリ。○惣

内科撰要 卷之三 二十

シテ諸液スデニ半生未熟ノ液ヨリ分テ。遠ク諸
般ノ變ヲ旁出スルニ及テハ其身體ニ發スルト
コロノ諸症。千態萬狀。得テ記載スヘカラザルニ
イタルカ為ニ。此ニ是ヲ歷舉スルコトアタハガ
ルノミ。

右第十九章餘義ヲ申明ス

惣シテ胃ヲヨヒ腸中ニ蓄積シタル者ハ。人能ク
吐藥及ヒ下劑ニ因テ除キ去コトヲ知ル。只其血
中ニ混淆スルコト有テ。滿皮皆變異スル色ヲ見
シ。血道ノ末抄。至細至微ノ處マデモ。漫延充溢シ
タルノ微ヲ發スルニ遇ハシ。則チコレニ從事ス

ルコト。先ヅ其無頼ノ惡液ヲ除サレハ。前ニ説ト
コロノ如ク飲食ヲ製造シオヨヒ諸良液ヲ分利
化成スルコトアタハズ。是ヲ以テ此翁傑達安篤
歇意度ヲ治スルニハ。吐利ノ劑ノミニテハ。思ノ
外治シ易カラザル者ナリト知ヘシ。○何者。胃ト
腸トハ是飲食スルトコロノ者ヲ製造化成シテ。
其製造ニアタラザルヲバ。出シ弃ルヲ以テ官能
トストイヘトモ。汁液ノアラシカギリハ。液道へ
導テ漏洩セザランコトヲ求ムルガ故ニ。成熟セ
ザル無益ノ液ヲモ。一同ニ身體へ送ルナリ然ト
モ其飲食ヲ製造シラヨヒ諸良液ヲ分利化成ス

ルコトヲ左右スルハ。只是良液ノ能スル所ニシテ。未成ノ液ノ如キハ。爰ニ用ヲ為ス所ナキノミ。○是故ニ。吐利ノ劑ヲ用ルノミニテハ。身體ニ彌滿シタル不用ノ液。滌除スルコトアタハザルヲ以テ。此症ニ於テハ利益鮮シト知ヘシ。○此翁傑達安篤竭意度ヲ治スルノ法。第一ニ意ヲ用テ胃オヨヒ腸ニ蓄積シタルトコロノ無頼ノ液ヲ湧發瀉利スルニ吐下ノ劑ヲ以テスヘキナリ。方ハ第十五章及ヒ第十六章ニ見タリ。○次ニ須ク飲食ヲ節ニシテ身體ニ稱ヒテ。容易ク消化熟スル程ノ分量ニ越シムベカラズ。其製造ノカヲシテ常ニ其任ニ勝テ餘裕アラシムヘキナリ。然シテ其食饌モ。擇テ消化シ易キ物ノミヲ用ルヲ可ナリトス。○從テ而シテ便利ナル健胃劑ヲ用テ。以テ胃ヲシテ製造ノ主能ヲ強壯ニシ。又大便ノ通利ヲ開達シ。泄瀉ニイタラサラシムルマテニシ以テ飲食シタル所ノ者ヲシテ。鬱滯スルニ因テ腐壞スルノ患ナク。速ニ能ク製造スルコトヲ得セシメ。其餘穢刺汚コレヲ大便ヨリシテ通利驅除シテ。以テ無頼ノ液ノ新ニ生スルノ原ヲ除治スヘキナリ。

健胃散方

内科摘要
卷之六

盧會 五分

沒藥 一錢

高良薑根 二錢

薄荷油 參滴

茵陳鹽 參分錢之一

右件細末トシテ是ヲ調勻シ其劑ヲ十分シ其一分ヲ取テ服用スルコト日々二三回スヘシ
○若シ藥酒ト為シアルヒハ麥酒ニ調シテ是ヲ用ルコトヲ好シ要スル者ハスナハ千次ノ方ヲ用テ可ナリトス。

健胃酒方

英百刺多理亞根 十錢

水楊梅根 各八錢

高良薑根 四錢 一種小者

薄荷葉 各一溢

山龍狀葉 各一溢

盧會 一錢

撒兒葛粗而蟄吉安及里加 參錢

右件諸藥勃的里斯ニニツノ酒アルヒハ麥酒ヲ用テ是ヲ浸シマタハ水酒各半ニスルモ亦可ナリ。○麥酒マタハ水酒各半ニ浸シテ用ルニハ酒ヲ用ルヨリ多クスベシ。○此劑ヲ用ル

内科摘要
卷之六

コト。小ル箴兒ルウメニ一瀝イッツク日ニ三次是ヲ飲服
 スヘシ。只是麥酒ニ浸シタルヲ服スルニハ。小
 ナル麥酒盃ニ一瀝イッツク飲服スヘキナリ。ルウメ
ラヒニ麥酒盃共ニ西洋名物考ニ載ス。○此藥酒等ヲ用ルノ間ハ。
 宜ク是ヲ蹤蹟シ。其服度ヲ増減スルコト無シ
 テ。患人ヲシテ日ニ兩度ツク。例シテ圍ニ上ル
 マテニイタラシムヘシ。妙トス。○右ノ藥ヲ用
 ルノ中ハ。通シテ前方ヲ居スヲクヘシ。但其中ハ
 シツク是ヲ寢シテ易リメノ甚カラケルヤウ
 ニシ。以テ自然ニ馴致シテ治スルニイタラシ
 ムルノ術ヲ為ヘキナリ。則次ニ出ス所ノ丸子

日ヲ用ルモ亦可ナリ。

健胃丸方

沒藥

乳香

蘇甘ス護モ扭ウ母ム

薄荷油

勿ハ擲ナ祭ナ亞バ石ク鹼ク

右件藥合勻シテ每一錢十五丸トシ。日ニ三次
 是ヲ四丸ツク服セシム。
 右等ノ諸藥ヲ持久シテ用ルトキハ。新ニ半生未
 熟ノ液ノ生シテ。身體ニ轉輸スルコトハ過絶ス

内科醫要

卷之三

九

ク。體中ニ存スル者トイヘトモ。血液ノ循環ヨリ
分利シ出サレ。運行ヲ離テ滯止獨立スルトキハ。
定テ寢壞セサルコトアタハサルナリ。其寢壞ス
ルコト。第一種ハ速ニシテ第二種ハ遅ク。第一種
ハ多シテ第二種ハ少シ。且其液。脂油愈多ケレハ
寢壞スルコト愈惡屬ナリ。○生氣ノ運行保持ノ
諸液ヲシテ各自ノ性ノ宜キ所ヲ得テ。寢成ノ常
ヲ失ガラシムルコトアタハザルニ因テ。諸液ノ
疾故ヲ成シ。右ノ所謂諸壞液ノ繇テ生スルコト
ヲ為ナリ。○第三種ハ他物ノ相混淆シ相傳染ス
ルニ出ツ。便是天行疫熱。オヨヒ衆人一般ニ患ル

所ノ疾。各地常トシテ嬰兒所ノ異氣等ノ如キ。皆
其氣ニ觸冒シテ。終ニ傳染シ。或ハ物ヲシテ腐敗
セシムル性有ノ飲食ヲ用ルニ因テ。以テ此症ヲ
成ナリ。

右第二十一章壞液ノ大較ヲ論ス
夫壞液ノ繇テ生スル所三因アルナリ。○其一ハ
是生氣ノ運行ノ強盛太過ナルト。次序ヲ失ヒ常
度ニ順サルトニ出ツ。○其二ハ是腐敗ヲ將來ル
ノ物不正等邪氣。傳染ス。ヘキノ毒。腐敗ヲ來ス。
ルヒハ毒ト譯シ。或ハ物ト譯ス。文ニ混淆スルニ
ニ隨テ宜ニ取ル。其實ハ一ナリ。○其三ハ是生氣ノ運行是ヲ保持スルコト

皆此病門ニ屬スルニ癥瘕ノ類。並ニ次序ヲ失ヒ常

度ニ順ナル運動ニ至テハ見ヨ其多時ナラズシ

テ腐敗ノ液ヲ將出シ来ルコトヲ。此症毎ニ數ア

リ。此症ハ前以テ少シモ其兆ナクシテ。俄ニ變生

スルモノナリ。前ノ一節。運行大過ヲ覆説シ。此一

因。○其敗體臭濁ノ飲食ヲ用ヒ。及ヒ傳染スヘ

キ不正ノ氣ニ觸レ呼吸ヨリシテ是ヲ感受スル

トキハ必ス此証ヲ生スルコト。誠ニ驚異スヘキ

ニイタル。是日々多クアル所ニシテ。恒ニ習知ス

ル所ナリ。是第ニ種ヲ因。及ヒ前章。○又腐敗スベキノ

飲食ヲ未タ曾テ用ルコトアラガルニ。何ヲ以テ

斯ク壞液ノ鬱聚スルコトヲ得ル哉ト。疑怪スル

者常ニ多シ。殊ニ知ラズ生氣ノ運行微弱ニシテ。

吾カ諸液ヲ保護維持スルコトアタハサルニ因

テ。夫ヲシテ尽ク腐敗ニ至ラシムルコトヲ。是故

皆此病門ニ屬スルニ癥瘕ノ類。

並ニ次序ヲ失ヒ常

度ニ順ナル運動ニ至テハ見ヨ其多時ナラズシ

テ腐敗ノ液ヲ將出シ来ルコトヲ。此症毎ニ數ア

リ。此症ハ前以テ少シモ其兆ナクシテ。俄ニ變生

スルモノナリ。前ノ一節。運行大過ヲ覆説シ。此一

因。○其敗體臭濁ノ飲食ヲ用ヒ。及ヒ傳染スヘ

キ不正ノ氣ニ觸レ呼吸ヨリシテ是ヲ感受スル

トキハ必ス此証ヲ生スルコト。誠ニ驚異スヘキ

ニイタル。是日々多クアル所ニシテ。恒ニ習知ス

ル所ナリ。是第ニ種ヲ因。及ヒ前章。○又腐敗スベキノ

飲食ヲ未タ曾テ用ルコトアラガルニ。何ヲ以テ

斯ク壞液ノ鬱聚スルコトヲ得ル哉ト。疑怪スル

者常ニ多シ。殊ニ知ラズ生氣ノ運行微弱ニシテ。

吾カ諸液ヲ保護維持スルコトアタハサルニ因

テ。夫ヲシテ尽ク腐敗ニ至ラシムルコトヲ。是故

ニ諸液ノ腐敗ヲ患フルコト常ニ多ク微弱ノ人

ニ於ス。此其運化微弱ニシテ。彼諸液ヲ保護維持

シテ自ラ變壞スルノ性ヲ防禦スルコトアタハ

ザルガ致ス所ナリト知ヘシ。是第ニ種ヲ論ス。○

諸液自己ヨリノ變壞トイヘトモ。外表ヨリ濕熱

ニテ薰蒸スルニ値トキハ。必ス其變壞ヲシテ迅

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

速ナラシムル者ナリ。是第ニ種ヲ覆説シ。餘波亦前章

内經摘要 卷之三

速ナルコトニ有テ云。○是故ニ温熱ノ土濕瘴ノ地ニ於テハ。疾此ノ壞液ニ出ル者。寒涼高燥ノ地ヨリハ殊ニ衆多ナリトス。前節ヲ受テ亦弟ニ種ハ

右第二十二章壞液ノ病因ヲ論ス

夫壞液ナル者ハ。膿及ヒ不成液ト全然トシテ性ヲ異ニスル者ナリ。何トナレハ。膿ハ元來造化自然ノ良能ニテ。疾ヲ治スルカ為ニ釀シ成シテ。以テ出シ除ク所ノ者ニシテ。畢竟膿ハ是疾ノ治具ナリ。肺ト腎トノ如キ。是尤彰著ナル者ナリ。共ニ自然ノ良法アリテ官能ニ備リ。是ニ因テ以テ其

膿ヲ血中ヨリ分利シテ。其究是ヲ驅除スルコトヲ為スナリ。肺ナレハ都咳嗽自服痛ノ諸篇ヲ備考。不成液モ生氣ノ運行衰シテ強健ナルニ依頼テハ。庶幾ハ再ヒ修テ以テ良液ニ復スベシ。縱ヘ陥テ十分ニ良液ト成コトヲ得ストモ。無用ノ廢液トハナリテ。生運ニ攘斥セラレクニ因テ。除キ去ルコトヲ得ヘシ。然ルニ此壞液ニ至テハ。終ニ良液ニ更始スルコトナシ。生氣運行ノカトイヘトモ。復能ク其腐敗ニ進コトヲ救ヒ免レシムルコト難シ。爰ニ知ル此壞液ニ於テハ。人身中是ヲ良液ヨリ分利シ。又從テ除キ去ルノ器アルコト

初編 卷之三 廿三

ナキコトヲ。是故ニ。諸ノ疾。壞液ニ出ルニ至テハ。危篤ニシテ且救療ヲ為シ難トス。○是ヲ思索スルニ。右ニイフ所ニ止ラズ。何ヲ以テ是ヲ言ハ。夫壞液ノ在トコロハ。スナハチ寔惡ノ勢日ニ增長シ。漸々ニ苛毒ノ性トナリ。自ラ毒シ類ヲ真リ。混淆スルトコロ。良液盡ク淪胥シテ寔壞シ。轉シテ相腐敗ス。夫ヨリシテ諸液漏泄スルコトヲ為トコロ。臭穢稀涼。性ヲ失テ虚廢シ。其色常ナラス。大ニ瀉利スルコトアリトイヘトモ。以シモ差ルコトナク。其治ヲ冀望スヘキコトナキニイタルノ。此皆壞液ノ增長シテ其極ニ臻ル者ナリ。知ス

ハアルヘカラス。

右第二十三章餘義ヲ申明ス

上ニ論スル如ク。我輩從來此壞液ヲ挽回シテ再ヒ良液ト為ノ術ナク。人身中トイヘトモ。亦是ラ良液ノ中ヨリ今利シ出スノ器機有コトナシトイフコトヲ識得スルニ因テ。治術ノ施ス所ハ。獨只藥ヲ用テ既ニ有トコロノ壞液ヲシテ進テ惡液等ニ變セサラシメ。其前行ノ勢ヲ遏止シ。且方ニ生スルノ機ヲ滅絶シテ。舊壞液モ亦漸ヲ以テ稍々ニ平常ノ道路ニ循テ。遂ニ出去シムルコト。是ヲ治術ノ以テ已ヘカラサル所トス。○鑿學ニ

於テ考究論定シタル所。其最彰明ナル者ハ壞液ニ二種ノ同カラサル有ナリ。其一ヲ熱壞液トス。大熱ヲ發ス。而シテ其二ヲ寒壞液トス。必ス惡寒ス。微熱アルコトアリ。マタ全ク熱ナキコトアリ。○自餘各種ノ壞液ノ天行疫熱。及ヒ衆人一般ニ患ル所ノ疾。各土常トシテ嬰兒所ノ異氣等ヨリシテ發スルノ証ニ至リテハ爰ニ載セス。特ニ唯右ノ寒熱ニ壞液ノ証候治法ヲ擧テ。是ヲ示スノ也。

右第二十四章壞液ノ治法ヲ論ス

夫炎熱ノ國。ナラヒニ卑濕鬱蒸ノ地。盛夏溽暑ノ

候。濕運大過ナルニ當テ。人一種ノ熱病ノ得ルアリ。其証熱稽留シテ久ク解セス。且時々發作シテ壯熱ヲ為スコト。定時アルコトナク。自汗シテ大ニ津液ヲ泄シ。下利シテ多ク汁液ヲ瀉スルコトヲ經トイヘトモ。曾テ毫毛差ルコトナク。或ハ出血スル所アリ。又ハ刺絡シテ瀉血スル時ハ。當時ハ夫ニテ宜キカ如ク然ルニ形似スレトモ。旋其増劇ノ証ヲ見スニイタリ。被覆シテ是ヲ温ムレハ。汗大ニ淋漓シ。發揭シテ是ヲ清涼ニスレハ。則チ煩悶ヲ發シ。飲食ヲ惡テ飢ヘズ。羸瘦過度。虛憊衰弱ス。此熱病ノ大ニ進タルニ因テ致ス所ノ

証ナルニ形似シテ。左ニモ想ハル者ナリ。然ト
 毛左ニアラス。皆是諸液腐敗スルノ庶徴ナリト
 知ヘシ。其壞液ノ酷厲ナル。刺戟侵襲シテ。齊ク此
 熱ヲ發起スルノ也。○右ノ如キノ証ニ臨テハ。宜
 ク患者ヲシテ風氣清爽乾淨ノ地ニ移居セシメ。
 其濕氣ヲシテ人目ノ常ニ見ルコトアタハサレ
 人身蒸發ノ氣ヲ壅遏シテ。以テ其腐敗ヲ増益セ
 シムルコト無ルヘシ。然トモ寒涼ニ過サシムヘ
 カラス。亦其蒸發ノ氣ヲ閉塞スル為ナリ。其温煖
 ニ過ルモ。亦能ク其腐敗ヲ助長スル力為ニ。宜ク
 是ヲ禁スヘシ。其宜キ所ノ者ハ。唯其頻ニ變新ノ

氣ヲ引テ良トス。以テ鬱陳ノ氣ヲシテ。更ニ傳染
 感汚スルコトナカラシム。然シテ患者ノ諸肉ニ
 テ製造シタル飲食ヲ用ルコトヲ禁スヘシ。特ニ
 用ヘキハ粉麪ノ類ニテ製造シタル者。又ハ萬首
 酸模等。少シノ脂膏ヲ加ヘ調シテ用ヘシ。且其飲
 食能ク熟セル園圃ノ果實等ニテ造レルヲ用ヒ。
 次ニ出ス所ノ飲ヲ服セシムヘキナリ。
 壞液ヲ治スル清涼飲ノ方

- 玫瑰花 半溢
- 酸模根 八錢
- 精麥 四錢

内科摘要 卷六二

水 八十錢

右件合シテ奄閉セル土罐中ニテ是ヲ煮。麥熟
 シ湯成テ。毛篦ヲ用テ漉過シテ後和スルニ狀
 シノ香椽汁。アルヒハ覆盆子ノ昆設ル拂ヲ以
 シテ。是ヲ飲服ス。○若シ其熱大ニ強壯ナル者
 ハ。是ニ硝石少許ヲ加ヘシ。而シテ大便不利ナ
 ル者ハ。是ニ加ルニ答末林度ヲ用テスベシ。○
 右ノ湯劑ヲ少シク寢セシコトヲ要セハ。大麥
 ニ代ルニ法。歇兒卧尔篤雜穀ヲ以テ是ヲ造ル。詳ナラストイヘトモ。消化ノ易クシテ病客ニ
宜キ者ト見ユ。釋辭ノ書ヲ披閱スルニ。法歇兒
凉即ナハム。トイフテ有。

蒸餅ヲ以テスヘシ。○右ノ湯飲ヲ服スルコト。
 其熱尽ク解シ。虛証ノ治シ復スルマテハ。通シ
 テ是ヲ用ヘシ。斯ノ如クスルトキハ。其壞液。身
 體蒸出ノ氣ニ從テ。終ニ出去ルナリ。○若シ是
 ニ傍テ不寐ノ証多キコトヲ見サハ。宜ク其劑
 ニ加ルニ罌粟苞一顆ヲ以シ。是ヲ煮テ與ヘ服
 セシムヘシ。良トス。○若シ虛衰ノ証。其熱ノ方
 ヲリハ大甚ナルニイタリタラハ。宜ク右ノ湯
 中ニ烈應設酒ヲ合シテ。調シ與ヘシ。
 右ノ術ニテ所謂腐敗熱病ノ初証。方ニ腐敗シ進
 ニトスルノ際ニシテ。大ニ騷擾スルヲ靜止スル

内科摘要 卷六二

コト數是アリキ。然トモ只初ヨリシテ彼力大ニ
騷擾ヲ為コト。即チ西方諸國ニ是アル病直ニ門
脈中ヲ受ク。其起ルノ脈十リ。腹内諸部ニ連テ其血
ノコトク。全形恰モ一樹木ノ如ク。倒懸スルニ侶タリ。
血ヲ受トシ。其血ハ脈ノ如ク。血ヲ出スルコトハ動
脈ノコトク。其血ハ即チ水穀ノ化スル所。能ク其
所屬ヲ養テ。心ニ歸スルコトナク。肝ニ入テ膽汁
ヲ分利スルコトナク。詳ニ解ノ血ニ中傷スル
體新書及ヒ肉景詳説ニ見タリ。血ニ中傷スル
ノ証ノ如キニ遇ハク。則チ治ヲ施スコト愈早ク
ハ愈宜シ。須ク速ニ是ニ次クニ下劑ヲ以シテ。
其腐敗ヲ蕩滌驅出シ。而シテ與ルニ清熱ノ劑ヲ
以スヘシ。方ハ共ニ第十二章ニ見タリ。○右ノ腐
敗病人如キ。其初症是ヲ察スルニ腰イタシ。胃脘

ノ近傍痞滿シ。惡心乾嘔精神疲倦。四支怠惰。皮膚
乾燥小水短少ニシテ赤ク。其脈數ニシテ弱ナル
ヲ以テ其候トス。○其病毒右ノ如キ炎熱濕蒸ノ
國ニ於ルカ如キハ。僅ニ一兩日モ停住シテ除カ
レハ。輒其腐敗スルコト增長熾盛シテ。氣息臭ヲ
為シ。口苦味ヲ發シ。黯緑ナル腐穢ヲ吐シ。舌大ヲ
ヒニ齒牙撲著シテ粘穢腐液アリ。終ニ必ス冷汗
出テ。手足厥シ。身體顫掉シ。嘔シテ穢物ヲ吐スル
コト色黒ク。粘穢ヲ咳咯スルコト亦黒シ。其咳ス
ル時ニ血ニ及ヒ易ク。頭旋昏冒。謔言妄語ヲ發ス
ルニ及テハ。蘇對邊ヲ為シ。終ニ救ハレサルニイ

内科標要 卷之二

タルコトアリ。此其常ニ多ク門脈ニ於テ。腸間膜ノ銷燦焦枯シテ。腐敗黒液及ヒ許多ノ風氣ヲ腸中ニ鬱阻スルニ得タリ。蘇対違ハ前ニ註ス。又百夕前ニ註ス。腸間膜腸ヲ維持スル者。門脈弁一ニ液道。共聚會シテ用テ。新書ニ詳ナリ。○其臭穢ナル腐敗シ進ムノ毒ノ。下利ニ現ルニ遇トキハ。其土ニ於テ是ヲ名テ格々刺亞度ノ疾トイフ。名義第一百四十一大ニ危シ。此証ニ臨テハ。右ノ下劑ノ必ス闕ヘカ。且ザル所ナリ。以テ其腐敗シ進ムコトヲ為ノ毒ヲ下利シテ。滌盪刷除スル時ハ。ナラ幸ニ救コトヲ庶幾スヘキ力為ナリ。然トモ若シ其物快ク下利セスシテ體中ニ止住

スルニ至テハ。則我共死ヲ見ル。右第二十五章熱壞液ヲ論ス。名ハ徒ニ共ニ壞液ノ稱アリトイヘトモ。其治法極テ相反シ。全然トシテ同シカラサル者ハ。爰ニ寒壞液ノ一症アルノニ。○其疾タル増進スルニ漸ラ以シテ。日甚一日陵遲ス。其人身體羸瘦シ。始ニ於テハ人ヲシテ毫モ熱アルコトヲ覺シメス。動スレハ輒チ自汗シ。振寒シテ虚弱ノ証ヲ現シ。迺チ差其微熱アルコトヲ覺フ。然トモ其熱只内熱ノ微ナル者ノニ。此ヲ名テ蘇碌乙布哥尔都トイフ。内熱マ夕勞熱ト翻ス。医学宝函ニ曰ク時ア

初編 卷之二 十六

夫ヨリ其証增長シテ大ニ衰耗羸弱スルニ
及テハ。則是ヲテリ參リ蠲ト云即勞瘵只茲ニ異ナル
コトアリ存ス其咳嗽ナキト痰沫ヲ吐セサルト
ナリ。○右ノ症一ニ是皆壞液ヨリ將出シ来ルカ
為ニ是ヲ此篇ニ収載シテ以テ熱壞液ニ次クナ
リ。○其壞液ノ繇テ来ル所ヲ原ルニ此其人凡飲
食スル所ノ物ヲ化熱製造シテ良液トナシ。又從
テ其諸良液ヲ維持保護シテ衰壞ニイタラサラ
シムルニ必ス仰キ頼ル所ノ生氣ノ運行微弱ナ
ルカ故ニ化熱製造スルコト至ラズシテ飲食ハ
則チ不成ノ液トナリ維持保護スルノ周カラサ

ルヨリ良液ハ則チ化ヲ離テ獨立シ自ラ衰壞ノ
液ト為ナリ。右ノ所因一タヒ崩シテ後長ク復渝
ラズ引續テ時日ヲ経ルニ隨ヒ其壞液漸々ニ増
長シテ遂ニ其証平全ノ時ニ顧比スレバ始テ大
ニ徑庭ヲ覺ルニ至ル。夫ヨリ漸靡シテ稀涼壞液
トナルトキハ復身體ヲ榮養シ諸用ヲ為ノ助ト
ナラズ物ヲ衛護扶持スルノ性ヲ失テ却テ容易
ニ虚池漏脱スルニ便ナルノ一物ト成ナリ。○此
証ニ臨テ若シ投スルニ清熱ノ藥ヲ以スレハ病
勢ヲ助テ害ヲ患者ニ為シ易カラシム何者生氣
ノ運行其清涼ノ劑ヲ得レハ則チ必ス減損ス減損

セル生氣ノ運行。以テ害ヲ拒ムニタラス。遂ニ腐
 敗ラシテ其變ニ進ノ勢ヲ縱ニシテ。弥長大ナル
 ニ至シムレハナリ。又温熱ノ劑ヲ用レハ。則其壞
 液是ニ涌發セラレテ濫流シ。忽ニ熱氣ヲ煽動ス
 ルニ因テ。遂ニ患者ヲシテ其困惡シテ劇ヲ増ス
 ラ以テ。是ヲ服スルコトヲ厭ヒ忌シムルニ至ル
 カ故ニ。二方共ニ與フ中カラサルナリ。○右ノ如
 ク是ヲ治スルニ清涼ヲ以テスレトモ治セヌ。温
 熱ヲ以テスレトモ亦治セヌ。膏ニ治セサルノ
 ナラス。却テ劇ヲ増シ苦ヲ添ルカ故ニ。大率皆術
 コトニ窮シ。己コトヲ得スシテ苟モ患者ノ意ニ

任セ從ヒ。藥ヲ後ニシ。特只其劇ヲ増シ苦ヲ添サ
 ルノ。差安シテ益アルカ如キニ似タルヲ幸トシ
 テ日ヲ消ル者ナリ。皆定劑ヲ右ノ如ク從事スル
 カ故ニ。其究カナラス救ハレサルニイタルト知
 ヘシ。○予ハ則チ此壞液ノ病人ノ呼テ勞瘵ト為
 ス所ノ者ニ遇コトニ。輒チ少シモ擔閣セズシテ。
 速ニ下ニ列スル所ノ法方ニ因テ。屢是ヲ治スル
 コトヲ為セリ。○右ノ寒壞液ヲ治スルノ法。宜ク
 急ニ是ニ與ルニ是ヲ煖ムルノ藥。及ヒ其腐敗シ
 進ムヲ防キ治スルノ劑ヲ以シ。其服度ヲ小ニシ
 テ稍々ニ服用セシムヘシ。斯ノ如クスルトキハ。

是ニ因テ其熱ヲ增益スルコトハナキナリ。右ノ
 如クニシテ續テ是ヲ服スルノ中ニ。漸々ニ其服
 度ヲ增益スルナリ。毎々是ヲ經歷スルニ。次第ニ
 増シテ其服度ヲ三倍ノ大ニシテ用ル一發熱ノ
 害ナキニ至ル。若シ此証能ク斯ノ如ク漸加シテ。
 三倍ノ服度ニ及テ發熱ノ証ナキ程マテニ至リ
 保ツコトヲ得ルハ。則是一大佳事。以テ其治功ヲ
 全シ叔ルニ至ルコトヲ期望スベシトス。○予カ
 治法ノ主トシテ期スル所ハ。方中ニ多ク樹脂類
 ヲ用テ以テ諸液自為ス所ノ衰壞ヲ防キ。且其温
 煖ヲ以テ稍々ニ生氣ノ運行ヲ增益シテ。因テ以

テ良液ヲ製造スルコトヲ得セシムルナリ。

壞液ヲ治スルノ方

乳香

蘇底刺失斯

安息香

沒藥

瓦爾拔奴謨

拔爾撒謨字露非亞尼

右件合和シテ。每一錢二十九ト為シ。橙皮細末
 ヲ衣トス。○右ノ丸子ヲ取テ。一日ニ四次。一丸
 ヲ服シ。次ニ是ヲ益シテ二丸ニイタリ。

夫ヨリ次第ニ増テ。三九或ハ四九ヲ用ルニ
及テハ。始テ其生氣運化ノ故ニ勝ルコトヲ得
ベキナリ。

右第二十六章寒壞液ヲ論ス

夫膿ハ自然良智ノ為トコロニシテ。疾ヲ治スル
カ爲ノ臭ナルコトハ。既ニ明白ナリ。然トイヘト
モ若ク久ク彌延纏綿シテ。速ニ成熟セサルニ至テ
ハ。膿トイヘトモ亦能ク他ノ諸液ト齊ク。腐敗ノ
變ヲ生スルナリ。其變スルニ至テハ。性惡ノ一液
敗血漿原名ヒ格ル。第六ナル者ト現シ。自然ノ變
化ノ如ク。病ヲ治ムルカ爲ノ膿トハ成サレ者ナ

リ。又惡厲ナルニ染汚混淆スルコトアルトキ
ハ。則膿トイヘトモ亦能ク他ノ諸液ト異ナラス。
陷テ腐敗ノ變ヲ生スルナリ。爰ニ至テハ膿有
ヲ以テ病ノ治スル善徵トシテ。恬然トシテ其愈
ルヲ望ムコトヲ得ズ。藥ヲ服シテ以テ其腐敗ス
ルヲ防クヲ以テ緊要トスルアリ。○茲ニ宜ク使
用スヘキハ。左ニ舉ルトコロノ方ヲ良トス。
壞液ヲ治スルノ飲劑ノ方

- 失葛未温撒葉
- 龍芽葉
- 惡實根
- 各一溢

内和指要
卷之三
三十一

葶藶根 各八錢

水 百二十八錢

白酒 六十四錢

右件合シテ密合セル罐内ニ於テ是ヲ煮テ。麥酒盃ニテ一ツ宛。日ニ數回是ヲ温服セシム。膿壞液ノ証。須ク早ニ趁テ是ヲ療スヘシ。愈早ケレハ愈治シ易シ。若シ濡滯スル時ハ。或ハ肺癰腫ヲ為シテ以テ旁療ニイタルコトアリ。或ハ肺癰膿腫ヲ為サシテ直ニ旁療ト變スルコトアリ者ナリ。○毎ニ屢講明スルニ。其膿ヲ吐痰ニ因テ除クカ。又ハ小便ヨリシテ泄利スルヲ宜トス

ルニ因テ。即先ツ第一ニ茲ニ舉ル所ノ飲劑。及ヒ一二ノ丸散等ヲ用ルヲ緊要トス。以テ吐痰ト利尿トヲ助ケ導クヘキナリ。

方 的列並底那 四錢

右一味。先ツ水少許ヲ加テ之ヲ煮ルコト。其稀稠ノ程。將ニ丸スベキニ至ントスルヲ候テ度ト為シ。コレニ加ルニ次ニ列スル所ノ諸品ヲ以テスヘシ。

乳香

沒藥

卷之三
三十七

紅梅要

琥珀

各五分

菘菖根末

適宜

右件調勻シテ。中等ノ大ニ丸シ。甘草ヲ衣トシ。

三四丸ツ。一頓ニ服スルコト。日ニ三次ス。

シ。中等ノ大。今考ベカ。ラ。ス。ト。イ。ヘ。ト。モ。医。学。室。

テ。乾。キ。大。サ。黎。豆。ノ。如。シ。茶。芥。ノ。名。ナ。リ。形。圓。ニ。シ。

ニ。モ。大。小。差。等。ア。ル。ヘ。シ。ト。雖。大。抵。通。用。レ。ハ。其。外。

テ。テ。大。小。キ。ナ。レ。ハ。此。書。中。彼。此。二。散。見。ス。ル。物。ヲ。

又方。シ。文。ナ。シ。知。ル。ヘ。キ。ノ。モ。緊。合。セ。ハ。則。其。中。等。ノ。所。明。

乳香

蘇底刺失斯

各五分

菘菖根末

鹿角霜

各一錢五分

右件合シテ散劑ト為シ。十八ニ分チ。其一分ヲ

取テ是ヲ服スルコト日ニ三次スヘシ。

右第二十七章膿壞ヲ論ス

夫平人ノ身體中ニ在テ。生活ヲ為シ諸用ヲ運営

スルノ良液ト。其變故ノ際ニ生シテ。患害ヲ發シ

疾苦ヲ催スノ惡液トノ外。更ニ尚一箇ノ液アリ。

予輩是ヲ號シテ廢液トイフ。此廢液ナル者ハ其

人平全ノ時ニ於テハ。生氣ノ運化ニ從テ。飲食ヨ

本草綱目卷之八

内科要 卷之二

リシテ生スル所ノ平全ナル良液トシテ。諸用ヲ
運営シ。迺チ定リタル道路ナル大解小解オヨヒ
身體出蒸ノ氣ニ從テ。終ニ人身ヲ謝シ去ナリ此
其普ク周流シテ諸用ヲ成シ遂タル上ニテ。老廢
シテ體中ニ事ナキ液ナリ。○廢液ハ謝シ去ルヲ
以テ道トス。然ルニ猶尚體中ニ鬱滯スルコトア
リ。即チ大便秘結。小水閉塞。オヨヒ人目ノ得コト
アタハサル蒸氣ヲ壅蔽鬱遏スルカ如キハ。其廢
液發洩スルコトアタハスシテ鬱滯シ。漸々ニ腐
敗シ。其一處ニ定止滯著スルト。身體ニ游移越在
セルトヲ問ハズ。皆寢シテ性惡厲ヲ成スナリ。是

ヲ治スルノ法他ナシ。其各自ノ道路ヨリシテ是
ヲ驅除スルノニ。是故ニ病此ノ廢液ニ出ルコト
ヲ察セハ。則茲ニ舉ル所ノ下利ノ劑。驅尿ノ方ナ
ラヒニ發汗ノ藥ヲ用ルコトヲ要トスベシ。

下利劑ノ方

旃那葉 二錢

答末林度 八錢

撒兒葛 爾蟄吉安及立加

茴香子 各一錢

右件合シテ。水四十八錢ヲ用テ是ヲ浸シ。藥氣
ヲ出サシメ。漉過シテ頓ニ服ス。

内科要 卷之二

○内科撰要
卷之三

利尿劑ノ方

琥珀 一錢

鹿角霜 二錢

杜松子油 十滴

右件合シテ散トシ。劑ヲ十分ニ。日ニ其三十分ヲ服ス。

發汗劑ノ方

底野迦 一錢

泊夫藍

安質没扭謨若波烈蟄屈謨

白罌粟舍利別

適宜

各六分錢之一

右件合シテ是ヲ調勻セシメ。毎夕是ヲ服ス。

右第二十八章廢壞液ヲ論ス

西說内科撰要卷二終

○内科撰要

卷之二

三十

内科撰要
卷之三

西説内科撰要卷三

遠西

王函涅斯垓我爾德兒著

日本

津山

宇田川玄隨晉

譯

醫官法眼桂川甫周國瑞 閱

失^シ苟^{ケラ}兒^ル陪^ガ苦^ク篇第四

夫草木ノ品類蕃庶ナルモ其種相亂レス各自其
屬ヲ以テ區ニシテ別形ヲナシ生々シテ其類ヲ
爽^クヘス必ス其初二象ニテ肖サルノ殖物ナク枝

内科撰要

卷之三

廿九章

葉花實根莖ニイタル迄。尽ク其類ヲ以テセスト
云コトナシ。是誰カ為ス所ソ。一ニ皆造物者ノ全
能ニシテ。人其如何ニシテ其レ彼カ如ク。又何ノ
故ニシテ茲ニ至ルト云コトヲ。思議スルコトア
タハス。要之^{ヤウスルニ}只得テ其種子ノ形ヲ以テ其類ヲ分
チ。或ハ其花葉ヲ觀シ。又ハ其根莖ヲ跡シテ。其種
屬ヲ辨別スルノミ。人身ノ疾病有テ多端ナルコ
ト。猶草木ノ品類蕃庶ニシテ。卒ニ^{ニカ}名状スヘカラ
サルカ如ク。吾輩トイヘトモ。其造物者ノ為ス所
其然ル所以ヲ知ルコト能ハス。然トモ亦各其種
屬有テ終始スル者ナレハ。是ヲ論載スルコトモ。

亦猶草木ニ於テ花葉根莖ヲ跡スルカ如ク。形脉
聲色百爾ノ診候ニ因テ是ヲ推サハ。庶幾クハ區
別ノ諸種得テ知ルヘキノミ。○是ノ失^シ苟兒^{ケウエル}陪^{ボイ}苦^ク
ノ病タル。固ヨリ壞液病ト其種ヲ同シテ。其自ラ
致ス所ノ壞液ニ屬スルナリ。是故ニ其証候一二
壞液病ノ見証ト甚タ異ナラス。是ヲ以テ鑿學ニ
於テ常ニ講論スル所ノ如ク。明較彰著ナル正面
ノ失^シ苟兒^{ケウエル}陪^{ボイ}苦^クノ証ノミヲ見^ミハスコトハナキ者
ナリト知ヘシ。只須ク諸般ノ診察ニ因テ。是ノ失^シ
苟兒^{ケウエル}陪^{ボイ}苦^クノ証ヲ。他ノ相類似セル諸証ノ中ヨリ。
是ヲ分別スルコトヲ要スヘキナリ。是病羅^ラ甸^{テン}ニ

コレヲ蘇格^ス格^ル尔^グ都^ツ斯^スト云。○人モ之自敗ノ壞液
 病ヲ患ルコト。上ニ記載スルカ如クニシテ。夫ヨ
 リ非同小可^{ワ子ノラガ}疲労倦怠ノ証ヲ見スコト。一身百體
 尽ク是ヲ覺フトイヘトモ。第一ニ腿股ニ於シ。或
 ハ齒搖キ始メ。終ニ愛シテ黯黑色ヲ為シ。齒斷^{ハキ}モ
 亦ウルミテ常ナラサル色ヲ見ハシ。壞爛シテ流
 血シヤスキニ至ルコト有テ。口氣臭穢ヲ發シ。身
 體中色愛シテ青色ニ赤ヲ帶ヒ。又ハ黯赭ノ斑文
 ヲ見シ。皮膚層ノ中ニ於テ。隱々トシテ傷癥ノ如キ
 ヲ發スル等^ハ証アルニ値ハシ。則是ヲ失^{ケウ}苟^{ウル}兒^{ボイ}陪^ク
 苦^クノ病ニ係ルト謂ヘキナリ。醫宗金鑑ニ載ル青
 腿疔即類ナリ。

右第二十九章大較ヲ論ス
 失^{ケウ}苟^{ウル}兒^{ボイ}陪^ク苦^クノ病タル。壞液病ト系屬ラニシス
 雖^レモ其証候ヲ求ルニ。壞液病ニ於テ。尽ク是ヲ得
 ルコト有ニ非レハ。須ク知テ更ニ別ニ異ナル
 病源有テ生シ來ル^ハ云コトヲ。其病源ヲ名状セ
 ント要スルニ。直ニコレヲ失^{ケウ}苟^{ウル}兒^{ボイ}陪^ク苦^クノ毒ト云
 ノ外ニ。他術アルコト能ハサルノ^ハ。然シテ其失^レ
 苟^{ケウ}兒^{ウル}陪^{ボイ}苦^クノ毒ヨリシテ。是ノ較著非常他候ト自
 ラ混同ス可^クラサルノ諸証ヲ見ハスナリ。○然ト
 モ其毒彼ノ寒壞液ナラヒニ熱壞液ニ附シテ發
 シ。又ハ稀涼液及ヒ稠粘液ト変シタルニ混淆ス

ルニ至テハ其証候大ニ異ナリ。是怪ムニ足ラス。其混淆スル所ノ病源アルニ因テ。便其挾スル所ノ証ヲ兼見ハスノミ。譬ニ其証候ノ異ナルノミナラス。其治法ヲ連テ共ニ隨テ同カラスト知ヘキナリ。○且其毒ノ多少ニ從テ其証ヲ異ニス。毒多キ者ハ之ヲ患ルコト久ク。毒少キ者ハ更ニ然ラサルノミ。○茲ニ緊要ナルハ。生人患者ニ臨テ。此ノ疾ヲ辨別スルコト。皆先賢ノ成説ノミヲ標的トシテ。相照シ相徵ス。其疑似ヲ別テ。是非ヲ診察シテ。治療ヲ擬議スルナリ。宜ク是ニ於テ思ヲ精クスヘキ所ナリ。若シ至サル所アルトキハ。

其關係鮮少ナラスト知ヘキナリ。其關係鮮少ナラスト知ヘキナリ。右第三章分列ヲ論ス。諸液ヲシテ自ラ變壞セシムル事ヲ致スノ原由。即亦是ノ失^シ苟^ウ兒^ル陪^ボ苦^クノ繇^ト起ル所トナルコト。是其平常ノミ。假令ハ久ク消化ニ難キノ食物ヲ用ヒツレケ。或ハ富貴安逸ノ人。怠惰シテ動作セス。生氣健運スルコト能ハス。又ハ諸病ヲ患タルノ後。虛衰シテ常ニ復セサル者。若クハ濕蒸ノ地ニ住シテ。筋膜ノ維結。肉腠ノ固衛コレニ縱弛解^レ休セラレテ其用ヲ失ヒ。以テ飲食ヲ消化シ諸液ヲ製造スルコト能ハス。是等皆諸液ヲシテ自ラ

幼穉集 卷之三 廿一

内秘撰要 卷之三

寔壞スルニ至ラシムルナリ。○右ノ諸件ノ原由
ノ中ニ。此ノ二症ヲ發スルノ病因。常ニ並ヒ行ハ
ル。カ故ニ。失^{シケウ}苟^ウ兒^ル陪^{ボイ}苦^クヲモ發シ。又ハ幸ニシテ
壞液病トノミナリテ止モアリ。必ス滿成シテ失^シ
苟^{ケウ}兒^ル陪^{ボイ}苦^クト為ルニ非ス。然トモ人皆自敗ノ壞液
病ヲ。漫ニ察シテ失^{シケウ}苟^ウ兒^ル陪^{ボイ}苦^クト通呼スレハ。宜ク
是ヲ辨別シテ。錯誤セラル。コト無ルヘシ。○只
其分明ニ是レ氣ニ傳染感觸スルコト。長ク續テ
口鼻コリシテ吸納タルノ原ニテ。一種ノ殊異ナ
ル寔壞ヲ將來リタルハ。則吾力輩ニ於テモ。其
殊異ナル徵候アルニ因テハ。之ヲ失^{シケウ}苟^ウ兒^ル陪^{ボイ}苦^クト

名クルナリ。○其生氣運行ノ強健ニシテ虧損ス
ルコト無トキハ。諸液ノ自ラ寔壞スル者ヲシテ。
復シテ良液トナラシムル者ナリ。其人ニ於テハ。
夫ノ殊異ナル失^{シケウ}苟^ウ兒^ル陪^{ボイ}苦^クヲ成スノ壞液ハ生ス
ルコト無ナリ。○
右第三十一章病原ヲ論ス
失^{シケウ}苟^ウ兒^ル陪^{ボイ}苦^クノ病ニ於テ。二箇ノ病原有テ。常ニ相
並ヒ行ハル。即其諸液ノ自ラ寔壞セル者ト。殊異
ナル失^{シケウ}苟^ウ兒^ル陪^{ボイ}苦^クノ毒トナリ。是ニ由テ第一ニ先
ツ二條ノ須ク知ヘキコトアリ。二條トハ何ソ。便
其寔壞スルコトノ至ル。自ラ其諸証ヲ見スコト

内秘撰要 卷之三 卅二

内科摘要 卷之三

第二十三章ニ説カ如シ。是其一ナリ。其失^シ苟^ケ兒^ル陪^ボ苦^クノ毒。漸々ニ滋益シテ。性酷厲ヲ成ストキハ。右壞液病ニ定テ來ル所ノ諸証ノ外ニ。許多ノ異証ヲ添ヘ得ルコトアリ。是其二十ナリ。○次ニ須ク失^シ苟^ケ兒^ル陪^ボ苦^クノ毒。挾^シテ夫ノ稀涼及ヒ粘稠ノ二壞液ト與ニ發シ。又ハ寒熱ノ二壞液ト與ニ來ルカ如キハ。其証候ナラヒニ法方大ニ異ナルコトヲ知ヘキナリ。寒熱ニ壞液ノコト。第二十五章及ヒ第二十六章ニ出ワ。右第三十二章餘義ヲ申明ス。失^シ苟^ケ兒^ル陪^ボ苦^ク其見ハスヘキ所ノ証ヲ具ヘ。挾雜シ

テ支節ニ寒腫ヲ發シ。形圓ニシテ柔軟。痛深シテ頑強ナルニ值ハク。是失^シ苟^ケ兒^ル陪^ボ苦^クノ毒ノ腐壞セ^ル粘稠液ノ中ニ混淆セルノ証ナリト知ヘシ。治法患者ヲシテ徐々ニ身體ヲ運動シ。氣血ヲ盪摩シ。移シテ乾燥ノ地。氣候温暖ノ所ニ行テ住セシメ。之ニ與ルニ煖メ且其凝結ヲ解クノ失^シ苟^ケ兒^ル陪^ボ苦^ク劑ヲ以テスルヲ緊要トスルナリ。温暖解釋シテ失^シ苟^ケ兒^ル陪^ボ苦^クヲ治スル方
格^コ蜜^リ列^レ亞^ア里^リ亞^ヤ葉^エ 三溢
刺^ラ八^ハ奴^ヌ謨^ム露^ル私^ス執^チ曷^カ 奴^ヌ謨^ム根^ン 八錢
橙^チ皮^ヒ 四錢

内科摘要 卷之三 卅三 六

右件是ラ勃的利斯ニ二ノ白蒲桃酒ヲ用テ密
 閉セル硝子内ニ於テ浸シ。菜氣ヲ泡出シ。日ニ
 一次若クハ三次。爾黙兒苴ニ一ツ宛服スヘシ。
 右ノ菜必ス新鮮ヲ要ス。若シ是ヲ得サルコト
 アラハ。宜ク次ノ方ヲ用ヘシ。
 格蜜列亞里亞精 十六錢
 羅思馬理奴謨精 八錢
 橙皮油 十滴
 沒藥 二錢
 右件合シテ調勻セシメ。四十滴許ヲ取テ。少シ
 ノ酒ニテコレヲ服スルコト。日ニ數度劑ノ名

コレヲ丁蜜去ルト云。此刻時ヲ経レハ凝結シ
 テ解散シ難キカ為ニ。須ク用ルニ臨テ少々宛
 製スヘキナリ。

右第三十三章。粘稠ナル寒壞液ト混シ發ス
 ルノ証治ヲ論ス
 夫ノ患人身體羸瘦シ。多ク稀涼ニシテ酷厲ナル
 液ヲ漏洩シ。四支骨節ニ寒痛有テ游歴スルノ証
 ヲ得ルカ若キハ。正ニ知ル是レ失苟兒陪苦ノ毒。
 一箇ノ稀涼ナル寒壞液ト共ニ發スト云コトヲ。
 治療ノ法。多ク強壯ナラシムル失苟兒陪苦劑ヲ
 用テ。大ニ漏洩スルコト無ラシムルヲ術ノ第一

内科指要 卷之三

標的トシテ從事スル所トス。後方コレヲ主ル。強壯ナラシメテ失芍見陪苦ヲ治スル方。

執里福利亞括室据 三滋

香椽皮

高良薑根 各八錢 一種小者

右件兩箇ノ勃的利斯ノ酒ヲ用テ。浸シテ蒸氣

ヲ泡出し服ス。初ハ決尔機ニテ一盃半ツク飲

服スルコト。日ニ三次。後ニハ稍々ニコレヲ増

益シテ可ナリ。

右第三十四章。稀涼ナル寒壞液ト混シ發ス

ルノ証治ヲ論ス。

夏暑濕蒸ノ候。アルヒハ炎熱ノ土ニ於テ。毎ニ患

ル所。其証候一ニ失芍見陪苦ノ証ニシテ。挾シテ

多ク腐壞セル一物ヲ洩スルコト。臭穢ニシテ甚

粘稠ソノ口内ナラヒニ牙齒ニ。多ク粘穢ナル汚

液有テ布着シ。身體衰弱スルコト甚ク。壯熱燒カ

如クナルコト有ハ。此病コレヲ失芍見陪苦ノ毒。

粘稠ナル熱壞液ト相混淆スルニ得タリト思フ

ヘシ。是証ニ臨テハ。須ク清涼ニシテ且疏緩スル

ノ失芍見陪苦劑ヲ用ヘシ。

清涼疏緩シテ失芍見陪苦ヲ治スル方。

乳酪清 百二十八錢 原名物

内科指要 卷之三 卅五

和梅...
...
...

答末林度 四錢
酒石 一錢

右件合シテコレヲ煮テ患者ヲシテ日々ニ是
ヲ頓服セシム。然トモ若シ是ニ因テ下利スル
コト多キハ。則次ノ方ヲ用ヘシ。

酸模 四溢
香椽 二顆

右件合シテ土罐中ニ於テ。勃的利斯ニ二箇ノ
水ヲ用テコレヲ煮テ。用ルニ臨テ砂糖少許ヲ
加テ其味ヲ美ニシ。患人ヲシテ日ニ數次酒盃
ニ一盃ツク服セシム。○若シ並テ虛衰ノ証大

過ナルモノハ。方中ニ烈應設酒少許ヲ加ヘシ。

○是時ニ臨テ。乳酪清アルヒハ新鮮ナル酸模

ヲ具スルコト能ハサル時ハ。宜ク覆盒子桑葢

結ル私子等。又自餘斯ノ如キ類ニテ造タル昆

設ル拂沙糖漬ノ食品ナリ。即干上ノヲ取テ他

ノ汁液ニ合和シテ是ニ與ヘ。其闕ヲ補ヘシ。

右第三十五章。粘稠ナル熱壞液ト混シ發ス

ルノ証治ヲ論ス。

失レケウ苟ル見ル陪ク苦クノ酷厲ナルモノ。稀涼ニシテ且熱セ

ル壞液ニ混淆スルノ一証アリ。其内証應ニ殊異

ナル大熱及ヒ哥コウ尔ル都ツ是レ一証ノ名トナル。只熱

ハ

寒熱等ノ証ヲ兼ヌ。詳ニアルヘシ。而シテ外其大

東西病考ニ載ス。考ヘシ。アルヘシ。而シテ外其大

ニ熱セル酷厲液ヲ漏洩スルコトアラハ。則宜ク

多ク収斂ニシテ清涼ニスルノ劑ヲ用ヘシ。

収斂清涼ニシテ失苟兒陪苦ヲ治スル方。

酸模根 各十六錢

刺ハ黥謨亞括蟄屈謨根

玫瑰花 一溢

答馬立蘇屈私皮 二錢

右件合シテ勃的利斯ニ二箇ノ水ヲ用テコレ

ヲ煮テ。尔黙兒苴ニ一盃ツ。是ヲ服スルコト

日ニ數回。宜ク意ヲ用テ將息シ。此藥ヲ服スル

ニ因テ其酷厲液ノ漏洩ヲシテ。俄頃ニ止住セ

シムルコト無ルヘシ。是ヲ良トス。若シ患者清

涼ニ至ルノ過度ナルコトヲ見ハ。則宜ク方中

ニ少シク赤酒譯語ナリ。其物性主治。ヲ加テ調

シ與ヘシ。

右第三十六章。稀涼ナル熱壞液ト混シ發ス

ルノ證治ヲ論ス。

聖京健篇第五

羅旬ニ加粗栗ト云。此ニ聖京健ト翻ス。其病タル
總シテ先ツ頭痛ニ始ル。其痛次第ニ進行クコト。
高ニ始テ卑ニ下ル。頭ヨリシテ鼻ニ至リ。夫ヨリ
齒牙ニ至リ。咽喉ニ及ヒ。終ニ胃中ニ降り。肺藏ニ
訖ル。右ノ諸部ニ於テ疼痛ヲ發スルトキ。必ス共
ニ咳嗽ヲ患ルナリ。其病時日ヲ經ルトキハ。終ニ
其眼中鼻孔アルヒハ口内咽喉ノ中。其餘諸處ヨ
リシテ疼痛スル所ノ病毒ヲ一箇ノ稀涼ナル厲
液ト變シテ。コレヲ漏洩スルナリ。斯ノ如キノ証
候ヲ見ハサハ。是レ聖京健ヨリ發シ来ルト云コ

トヲ辨スヘキナリ。聖京健ノ病。其証候ヲ察スル
コト多端ニシテ諸般アリトイヘトモ。其疼痛ト
漏洩トノ二件ニ於テ是ヲ求レハ。其徴ヲ失ハス
ト知ヘキナリ。

右第三十七章。聖京健ノ大較ヲ論ス

此病ヲ患ルコト常ニ虚弱ナル人。婦人小兒及ヒ
年高ノ輩。其身ヲ保スルコト生平温暖ノ所ニ於
テスル者。今ニシテ俄ニ其常ヲ變シ。温暖ノ所ヲ
離テ風寒ヲ冒シナドスルニ因テ。コノ病ニ陥ル
モノナリ。其始テ發スルコト。多クハ皆冬時寒涼
ノ候ニ於ス。其較著ナルハ。夏暑秋炎既ニ過テノ

後承ルニ新涼早寒ヲ以シ。或ハ住馴タル温暖ノ地ヲ離レテ旅行シテ俄ニ異氣ヲ犯シ。寒涼ノ處ニ入ルノ類。皆コノ病原ヲ資ルモノナリ。

右第三十八章。聖シキ京ケン健ケンノ病因ヲ論ス

此病ヲ得ルノ原ハ。既ニ前章ニ是ヲ畧記スレトモ。其疼痛ナラヒニ漏洩ヲ為スノ病毒ハ。何如ナル者有テコレヲ發スルゾト跡スグルニ甚夕領解シ易キモノニシテ。他ニアラス。即チ日常ダン覺ケンヘズシテ身體ヨリ蒸發スルノ一物ニシテ。壅遏セラレテ鬱滯シタルモノ。是レ此ノ病ノ毒ト為ナリ。○其漏洩スルトコロニ般ノ別有テ其液ヲ除キ出

スナリ。第一ハ。是レ老廢液ニ見ヘタリニシテ。平常ノ生氣ノ運行ニ因テ。日常覺ヘズシテ身體ヨリ蒸發スルノ氣ト為テ。是ヲ洩シ去ル。第二ハ。是レ諸病ニ因テ生スル所ノ壞液ニシテ。稀涼ナル者。本篇ノ眼中鼻孔等ヨリシテ漏洩スル。即是ノ物ナリ。右兩種ノ液。俱ニ惣シテノ身體中ニ流動スル諸液一章ニ詳ナリト同ク運行循流シテ。斯ク漏洩スルコトヲ為ナリ。○此ノ廢液ト壞液トハ。大便小水ナラヒニ汗ヨリシテ通利發散スルヨリハ。自他ホカ是ヲ令利カニシ除クノ官能アルモノナク。又是ヲ排斥驅出スヘキ道路甚鮮シトス。○此

内科醫學 卷之三 卅九 卅二

ノ病原一ニ其蒸發ノ氣ヲ壅遏スルヨリニ起
ルカ故ニ。虚弱ノ人婦女小兒ナラヒニ高年ノ輩
ニ於テハ。第一是ヲ患ヘ易シ。其中較著ナルハ。馴
升ル氣候ニ值テ俄ニ其常ヲ失ヒ。又ハ異地ニ客
行スル類ニ因テ。右等ノ人ヲシテ。輒ニ廢液鬱滯
シ。壞液壅遏スルノ變ニ嬰ラシム。是即聖京健ノ
病毒ナリ。

右第三十九章。聖京健ノ病毒ヲ論ス
酷厲ナル聖京健ノ病毒ノ普ク運送スルコトヲ
為ス。他ノ諸液ニ混淆スルニ論ナシ。唯其血ナラ
ヒニ自餘ノ諸液ニ混淆シテ。其中ニ在テ疼痛ヲ

發シ。諸部ヨリノ漏洩ヲ為スニ至テハ。人甚ソノ
理ノ解スヘカラスナルニ疑惑スル者ナリ。何トナ
レハ。惣シテ血ハ動脈管ノ中ヲ循行シテ。身體ニ
運送スルコトヲ為シ。其動脈管ノ中ニハ。元來天
資固有ノ潤滑ナル一液有テ。其周圍ニ密布灌溉
シテ。血ノ循行ヲ便ニシ。且以テ侵刺ノ害ヲ防護
スルコト。輸尿道ノ中ニ滑液有テ。小水ノ悍厲ヲ
受サラシムルカ如シ。第二百九十四章ニ
詳ナリ。併考スヘシ。茲ニ固
有ノ滑液有テ爾ク防護スレハ。假令酷厲ナル聖
京健ノ病毒其血ニ混淆スルコト有テ。動脈管ノ
中ヲ循行ストイヘトモ。是ニ侵刺スルコトハナ

キ道理ナレハ。夫故ニ此痛ヲ發ストハ思ハレヌ
ナリ。○然レトモ聖^{シキ}京^{シキ}健^{シキ}ノ病毒ノ循行スルコト。
營ニ自然ノ動脈ノ循行ニ從フノミニアラス。神
經ノ循行トイヘトモ。亦コレニ從フナリ。○是ニ
由テ之ヲ觀レハ。其病毒ノ神經ノ循行ニ從フモ
ノハ。吾輩ノ所謂神經液ナル者ノ中ニ。其病毒自
ラ止リ存スルノミ。

右第四十章。聖^{シキ}京^{シキ}健^{シキ}ノ病毒ノ所在ヲ論ス
病^{シキ}毒ノ所在ハ既ニ前章ニ於テ之ヲ辨ストイヘ
ト七。其中ニ舉ル所ノ神經液ナル者。元來其名物
ヲ曉知セサレハ。其說通解シ難キカ為ニ。病論ノ

次ニ於テ。其名物ヲ釋シテ小説ヲ贅シ。以テ學者
ヲシテ明ニ其病毒ノ所在ヲ識シメントス。○夫
神經ニ二種ノ液アリ。醫學^{シキ}室^{シキ}函^{シキ}ニ曰ク。神經ハ其
リ生ス。生活ノ精神^{シキ}ヲ身體ニ普達スルヲ主ル。
分テ二様トス。内ナル者^{シキ}流動シテ髓液ノ如ク外
ナル者^{シキ}凝結シテ膜ノ一ラ精神ト名ク。原是レラ
大小二腦ノ中ニ於テ製シ出ス。播別シテ小管ト
ナリ。蔓衍シテ遍身ニ彌滿シ。四末ニ普達シ。以テ
寒熱痛癢凡百ノ觸レ感スルノコトヲ知覺シ。動
靜云為諸般ノ運営スルコトヲ掌ル。其形ニ據レ
ハコレヲ神經線ト云。腦^{シキ}原^{シキ}名^{シキ}コレ^{シキ}。
二腦。詳ニ解體ノ諸書ニ見タリ。余カ輯スル西
醫言ニ。釋^{シキ}神^{シキ}ノ為^{シキ}アリ。曰ク。夫腦者。元
神ノ海。コレ

二腦。詳ニ解體ノ諸書ニ見タリ。余カ輯スル西醫言ニ。釋神ノ為アリ。曰ク。夫腦者。元神ノ海。コレ

○此ノ神經線ノ身體ニ蔓衍普及スルヲ暴露シテ單行スルニ非ス必ス一條ニ會撮シテ一箇ノ膜衣ヲ以テ包裹シ以テ其寒熱痛癢凡百ノ運營事為ラ處置スルノ部分ニ達シテ精神ノ主用ヲ為ナリ。○其神經線ヲ包裹シタル膜衣ノ中間ニ

ハ。另ニ一箇ノ液アリテコレニ充ツ我輩之ヲ名テ神經液ト謂フ。此其神經線ヲシテ常ニ浸潤灌漑ヲ失サラシムルカ為ナリ。是ヲ第二トス。右ノ神經液ト神經線ト皮表ニ布满シテ又能ク一箇ノ目ニ見ヘサル蒸發ノ氣ヲ分利シ去ルナリ。是ノ事予カ羅甸鑿術ノ中ニ詳ニコレヲ論シ置タレハ爰ニ只其略ヲ挙テ粗其義ヲ悟スノミ。右第四十一章神經液ノ説ヲ挙ク。諸液ノ其主用ヲ為シ終レハ皆從テ而シテ老廢スルカ如ク。神經液ト雖モ亦漸々ニ老廢シテ無用ノ物ト變スルナリ。既ニ變シテ無用ノ物ト為

レハ。廼所謂人ノ知覺セサル所ノ蒸發ノ氣ト為
テ身體ヲ謝シ去ルナリ。○若シ上ニ論スル所ノ
諸件ニ因テ其蒸發ノ氣ヲ閉塞障遏スルニ至テ
ハ。神經液ト雖モ亦鬱止シテ終ニ腐壞液ト為リ。
久ク身體中ニ滯住スルニ因テ。變シテ酷厲ノ液
ト為テ。究竟ハ初二論スル所ノ漏洩ヲ成スナリ
○其酷厲ノ液神經線ニ加ハリ。其平常ヲ失テ順
良ナラサルヲ以テ疼痛ヲ為スナリ。然シテ其毒
神經室即チ神經線ヲ包裹スル少チニ鬱止滯住
スルカ故ニ其痛必ス神經ノ循行ニ從フナリ。○
若シ其液漸ク以テ推盪シ進テ上ニ説ク所ノ漏

洩スヘキ諸末管口ニ及カ如キハ。則其酷厲ナル
聖シキ京健ノ毒ヲ大ニ漏洩スルニ至ルナリ。○此等
ノ事廣ク説キ審ニ論スルニ非シハ。能ク其義ニ
通曉セシムルヲ得サレ凡。姑ク且其一端ヲ舉
テコレヲ示スノミ。
右第四十二章。病毒ノ神經液ニ生スル所以
テ論ス
聖シキ京健ノ病毒ハ。老廢液或ハ腐敗液ヨリシテ生
シ。身體中ニ鬱滯シ。生氣運行ノカト雖モ。是ヲシ
テ復良液ト為シムルヲ能サルカ故ニ。唯是驅逐
排斥スルヲ以テ一大緊要トスルナリ。何トナレ

ハ若シ其毒鬱滯シテ去サレハ。酷厲ノ性漸ヲ以テ滋甚ク。日ニ益シ月ニ長シテ。良善ナル神經液ニ混淆シ。終ニ之ヲ併テ腐敗ニ至ラシムルナリ。○是ニ於テ神經液ヲ混汚シテ共ニ腐敗シ。以テ聖京健ヲシテ益增長滋蔓スルニ至ラシムレハ。則諸部ニ浸淫シテ届ラサル所ナク。從來未タ曾テ病毒ノ漸漬セサル處ト雖モ。其波及ヲ免ルニ地ナキニ至ルナリ。

右第四十三章餘義ヲ申明ス。

其蒸發ノ氣ヲ障遏スルニ因テ。身體中ニ鬱滯スル所ノ病毒ヲ。再ヒ皮表ニ驅逐排斥シ。以テ之ヲ

發泄スルノ術ハ。發汗劑ヲ以テ之ヲ療スレハ。則足ル。○唯是其鬱滯シテ發セス。夫ヨリ自餘ノ諸液ト混淆スル。輒其良液ノ援救ヲ失力故ニ。其病毒ヲ驅逐スルニ宜キ因便ノ地ナキニ至ルナリ。宜ク其身體ニ厚被シテ之ヲ温覆シ。且コレニ服セシムルニ蒸發ヲ助ルノ藥ヲ以シテ其汗孔ヲ徹シ。一面ハ是ニ添テ眠ヲ催サシムヘシ。假令ハ底野迦壹錢ヲ取テ之ヲ服スルモ可ナリ。

蒸發ヲ助ル藥劑ノ方

白罌粟舍利別 八錢

泊夫藍 六分錢之一

安質没扭謨若波烈蟄屈謨 三分錢之一
右件合シテ調勻シ。夜臨臥ニ温酒少許ヲ用テ
コレヲ飲服ス。

又方

濃煮接骨木汁 八錢

洎夫藍 六分錢之一

牢達扭謨律規需謨 十滴

右件合シテ調勻シ。共ニ遡ニ交夜ニ值テ服セ
シムル。其酷厲液ノ人目ニ見ヘスシテ蒸發
スルノ氣ニ從テ悉皆洩除スルニ至ルマテハ
長服スヘキナリ。

又其病毒止ソノ神經ノ一二ノ支別。或ハ此ニ鬱
滯シ或ハ彼ニ底著シテ疼痛ヲ作ス。毎々多
クアル証ナリ。其時ハ亦外傳ノ藥ヲ用テ可ナリ。
聖京健ノ痛ヲ止ル慰藥ノ方。

的列並底那油 二錢

燒酒 四錢

急製礪砂精 一錢

右件合シテ調勻シ。一箇ノ小綿布ヲ把テ。疊重
シテ三襲又ハ四襲トシ。用テ以テ藥ヲ蘸シテ
霑濡セシメ。以テ患處ニ傳貼ス。少ク赤紅色ヲ
發セントス。則其痛消散スルナリ。

爰ニ列スル所ノ急製礶砂精ナルモノ。今其製法
 ラ奉テコレヲ左ニ示ス。
 礶砂ナラヒニ剥ポッ篤ト亞斯アスヲ取テ。各別ニ之ヲ治
 ノ。各水少許ヲ用テ溶化スルコト。宜ニ適スル
 ラ度トス。○コレヲ漉紙ニテ瀘過シ。以テ其汚
 穢塗滓ヲ浄盡シ。兩件ノ藥液。各等分ヲ取テ。之
 ラ合シ。能ク調勻セシムル時ハ。直ニ輒チ銳烈
 ナル香氣ノ猛ニ揮散發越スルヲ得ルナリ。○
 コレヲ貯ル硝子中ニ密藏スルヲ須テ乃チ得
 右第四十四章。聖シキ京キン健ケンノ治法ヲ論ス

伊堀多篇第六

伊堀多篇第六 在即ニチ痛風ノ類ナリ。痛
学宝函ニ曰ク。脚ニ在ラシ。我納。脚ニ在ラシ。其類ナリ。痛風ノ類ナリ。痛
膝ニ在ラシ。我納。脚ニ在ラシ。其類ナリ。痛風ノ類ナリ。痛
倭刺トシ。骨ニ在ラシ。獨碌。失葛。布刺。綸ト
護ト予。西洋ニコレヲ言ノ中。釈
病篇ニコレヲ言ノ中。釈

夫レ醫學ニ從事スル者ヲシテ甚夕蹇難ヲ致サ
 シメ。其證候相類似セル者甚多シテ。互ニ混亂シ
 易ク。病原ナラヒニ治療ノ法方ニ至テモ。亦復尔
 ク難糅シテ紛錯ヲ免レサルノ病ハ。即チ伊堀多
 本篇主トシテ論スル所。漢人ノ所謂府篤トウ歐オウ兒エ
 痛風ナル者。粗クナレニ近シ。漢人ノ所謂府篤トウ歐オウ兒エ
 漢人ノ所謂脚氣ナル者。近シ。拂里フリ健ケン埜ノ伊イ堀コ多タ
 コレニ近シ。考フヘシ。者。拂里フリ健ケン埜ノ伊イ堀コ多タ
 シテ處ヲ移スモ。即チ。孽鳥立窟登痛ノ四支ノ十節ノ
 歴節痛風ナル者。是ナリ。孽鳥立窟登痛ノ四支ノ十節ノ

ノ如キ。是等最其辨シ難キ者ナリ。是ヲ以テ医学
浅陋ノ輩。又ハ術業習熟ナラサルノ人ニ在テハ。
毎ニ錯失ヲ致ス。多カラストセス。○右ノ中ニ
就テ。茲ニ惟ソノ伊^イ偃^グ多^トノ一病ヲ論セントス。其
他尽クコレヲ壘^イ挙^グセントスレハ。廣喻詳説シテ
事浩繁ニ涉リ。畧説ノ能スル所ニ非ルカ故ノミ。
○伊^イ偃^グ多^トノ病タル。疼痛ヲ以テ證トス。其痛俄ニ
生セス。漸ヲ以テ發動増進ス。大率^{フホ}内深ニ於セス
シテ。外コレヲ四支ニ患フ。又ハ四支關節ノ間ニ
於スルコト。孽^ゲ鳥^ウ立^リ窟^ク點^{テン}痛ノ自ラ四支關節ノ痛
ヲ發スルニ比スレハ。更ニ甚シ。其患處外ヨリシ

テ之ヲ察スルニ。毫モ證候ノ常ニ異ナルヲ得
テナシ。其痛ヲ發スル。初ヨリ其處ヲ越テ他ノ
部ニ浸淫セス。拂^フ里^リ健^{ケン}垣^{ケン}伊^イ偃^グ多^ト痛^ツ風^フ及^ツヒ^ツ府^フ篤^ト歐^オ
歇^ハ兒^ニ註上ニ出ツ。脚氣ノ類。ニ異ナリ。只其患處漸々ニ削瘦
シテ羸弱ニ至リ。其痛初ヨリ其處ヲ越テ他ノ部
ニ浸淫セスト雖モ。一處ニ在テ久キヲ經ルニ至
テハ。猶能ク彼此ニ走注游歷シテ相往來スルヲ
常トシテアルヲナリ。只是時定期アルヲナキノ
ミ。然トモ多ハ氣候寒冷ノ時ト濕蒸ノ節トヲ以
テ來復スル者ナリ。其證熱ヲ發スルヲ稀ナリ。然
トモ若シ歳年ヲ積テ。其毒勢增長滋益スルニ及

外科集要 卷之三

テハ。内藏ニ施及潜攻スルノ害ヲ免レサルナリ。此病羅旬ニコレヲ過ル的栗執私ト云。

右第四十五章。伊倭多ノ大較ヲ論ス。

外ヨリ此病ヲ致ス所ノ原由ハ。第三十八章ニ奉ル聖京健ノ病因ト殆ト一般ナリ。只漸々ニ一箇ノ苛毒ヲ将来ルヲ異ナリトスルノミ。蓋シニ証共ニ酷厲ナル毒液アツテ。神經中ノ神經液ニ底著スレハ。明ケシ此ハ其肉及ヒ膜ニ至ルノ處ニ於シ。而シテ彼ハ其末梢ノ漏洩スヘキノ部ニ在ル。其毒ノ所在ニ隨テ。痛ラシテ微甚ヲ異ニセシムルノミ。第四十二章予又明知スルコトア

リ。其蒸發ノ氣ヲ壅遏シテ身體ニ鬱滯セシムルノ能ク腐壞液ヲ生スルノミニ非ス。神經液ト雖モ亦能ク自ラ腐壞ヲ致スコト有テ。其毒常ニ其神經ノ所在ニ滯著シテ鬱止スト云コトヲ。○其腐壞毒液ノ未夕病ヲ發セシテ靜藏スルノ中ハ。其性甚麼様ナル者タルト云コト。余豫其情態ヲ概畧スルコト能ハス。其發見スル所ノ証候ニ就テ。其已ニ然ル所ノ者ヲ目撃シテ。指摘シテ爰ニ辨明スルニ非ルヨリハ。他術アルコト無ノミ。○此等ノ義能ク類推思索スルトキハ。復辨說ヲ俟スシテ足レリトス。余輩医家者流ニ於テ。自他

ノ酷屬液ヲ説與スルニ於テモ。未夕曾テ遠ク此
事マテニ論シ及サクルヲ以テ之ヲ知ヘシ。余輩
ノ法ニ於テ熟知明習セル一液所謂収兒ナル者
ニ於テスラ。其病ノ自ラ證候ニ發見スルヲ俟テ
之ヲ辨スルヨリハ。豫メ未形ニ説テ能ハサルナ
リ。矧ヤ是物ニ於テ。豈徒ニ懸想億度ノ能ク及フ
テ得ル所ナランヤ。祇ニ以テ腐談ヲ費スノミ。
右第四十六章。伊倭多ノ病因ヲ論ス。
若シ此苛痛ヲ發スルノ酷屬液ニ生シ。其底著
スル所ノ依託アルヲ領解シテ已往ハ。爰ニ異ト
スヘキコト有テ存ス。之ヲ尋繹シテ自ラ知ヘシ。

夫ノ天資固有ナル人身中ノ兩良能其元氣ノ運
行ヲ増發スルト。為ニ膿ヲ成スト。營救ノ常コノ
一病ニ於テ何ヲ特コレヲ視ル。惘然タル。何ト
ナレハ。其痛斯ノ若ク又夕留テ差サルニ。自若ト
シテ曾テ微熱ヲモ發動スルコトナク。又終ニ膿
有テ見レ来ラス。寒熱篇中第四章。及上第六章。又
下ノ痘瘡篇中第三百七章。併七
考ヘ此異ナルニ非スヤ。然トモ予ヲ以テ熱コ
レヲ尋繹スルニ。物動脈ニ侵刺スレハ則チ熱ヲ
發起ス。創傷竹木刺ノ皮肉ニ在ル。輒チ為ニ膿ヲ
釀シ成ス。神經ハ則然ラス。一箇ノ各異ノ酷屬液
コレニ侵刺スト雖モ。竟ニ運行ヲ増發スルコト

内科抄要 卷之三 四十七 二十二

ナシ。即予コレヲ長ク持久シテ差サル寒痛ニ於
テ徴シ。且コレヲ打撲箱笥等ノ神經ヲ暗傷スル
者。曾テ膿ヲ成スコト有コトナク。只一箇ノ稀涼
液ヲ漏洩スルニ徴スレハ。則チ知ル伊^イ屈^ク多^トノ毒
ノ。他物ニ殊異ニシテ。神經ニ屬スル力故ニ右ノ
數件ト同ク。元氣ノ運行ヲ増發スルコトナク。又
膿ヲ成スノ舉ナキコトヲ。○其元氣ノ運行ヲ増
發スルコトナク。又膿ヲ成スノ舉ナキ所以ノ者。
其毒除キ易キ力故ニ其二件ヲ假ラスシテ然ニ
非ス。只是其物ノ性質。右ノ若クナルヲ以テ。速ニ
治スルニ至ラス。其滯止シテ久ラ経ルニ隨テ。其

毒亦隨テ增長滋益シ。治療モ亦隨テ功ヲ為シ難
キニ至テ。危殆コトニ從フナリ。何トナレハ。既ニ
此ノ如キニ及テハ。其毒亦能ク沉潜緣施シテ。終
ニ内藏ニ浸淫スル力為ニ。竟ニ死地ニ輸スト知
ヘキナリ。

右第四十七章餘義ヲ申明ス。

伊^イ屈^ク多^トヲ療スル。法必ス許多ノ時月ヲ消シテ。一
朝一夕ノ能ク療スルコトヲ得ル所ニ非ス。何ト
ナレハ。神經液ノ自己ヨリシテ腐壞ヲ為スニ至
ル。固ヨリ一旦ノ能ク生スル所ニ非ス。コレヲ基
資スルコト久シ。故ニ之ヲ除クモ速ニスルヲ能

ハス。徐々ニ人ノ知覺セサル所ノ蒸發ノ氣ヨリ
シテ。コレヲ驅散泄除スルナリ。即子次ニ舉ル所
ノ方ヲ以テ最トス。伊^イ倭^ワ多^タヲ治スル丸子ノ方。

的^テ列^レ竝^ビ底^{テイ}那^ナ
勿^ハ擲^チ祭^チ亞^ヤ石^シ鹼^{ケン} 各二錢

乳^ニ香^ク
蘇^ス底^{テイ}刺^シ失^シ斯^ス 各三分錢之二

高^{コウ}良^{リョウ}薑^{カウ}根^{ケン}末^{マツ} 一錢
拔^{ハク}尔^ニ撒^サ謨^モ亭^{テイ}露^ロ非^ヒ亞^ヤ尼^ニ 三分錢之一


右件合シテ。每一錢十五丸ト為シ用フ。先ツ的

列^レ竝^ビ底^{テイ}那^ナヲ將^シテ。石^シ鹼^{ケン}ト共ニコレヲ煮^クテ。少ク
凝^{コウ}結^{ケツ}スルヲ候^ケテ。然後ニ諸^{シヨ}藥^{ヤク}末^{マツ}ト拔^{ハク}尔^ニ撒^サ謨^モヲ
下^シ。以^テコレヲ調^テ勻^スス。若^シ未^タ夕^キ濡^ク軟^ニシテ
宜^ニ適^セスハ。鹿^カ角^{カク}霜^{シヨウ}ヲ加^ヘシ。以^テ丸^ニスヘキ
ニ至^テ度^トス。○若^シコレニ加^ルニ薩^{サツ}洎^ポ弗^フ刺^シ
斯^スノ油^ユヲ以^テスレハ。殊^ニ利^{アリ}トス。其^ト時^ハ
橙^{テイ}皮^ヒ末^{マツ}ヲ以^テ衣^フトス。○此^ノ丸^ニ子^シ患^ケ者^ヲシテ三
四^ニ丸^ヲワ^キ日^ニニ三^ニ次^ニコレヲ服^スセシム。久^クニ至^テ
長^ク湔^ルサ^ルルヲ妙^トス。斯^ノ若^クスル時^ハ。其^ノ痛^ム
漸^ク々^ニ消^ス散^スシ。身^ノ體^更ニ強^ク健^{ナル}ヲ得^ルル
リ。○若^シ其^ノ痛^ム全^ク差^ルトモ。舊^ニ依^テ尚^能ク

半年程ノ内ハ。毎朝三四丸ヲ長將スルヲ良トス。此其病ノ初發ニ於テ其原ヲ蕩滌シ盡シキ力為ニ。初ヨリ其ヲシテ遺孽ナカラシムルノミ。

右第四十八章。伊^イ倭^ワ多^タノ治法ヲ論ス。其^イハ

西説内科撰要卷三終



宇田川玄隨著

槐園藏板

寛政八丙辰歲孟春

東都書林

弘所 室町二丁目 須原屋市兵衛



