



内科撰要

頭眩眩胃  
精神錯亂

卷之三

七  
至

洋学文庫  
文庫 8  
C 26  
3





西說内科撰要卷七

遠西

玉函涅斯垓我爾德兒著

日本

津山

宇田川玄隨晉

譯

鑿官法眼桂川甫周國瑞 閱

頭眩眩冒篇第十六

頭旋眩冒疾夕ル即予卒厥ト同出ニシテ只其  
 發スル所ノ証ニ據テ以テ其名ヲ分タルナリ  
 十三人章ニ曰ク卒厥ノ証ノ大較ラ陳スル者  
 若シ人偶ニ其候忽トシテ病其趣キ為ント陳スル  
 修ニ運動スル人トシテ失ヒ共ニ之ヲ存スル心  
 意精神外ニ應スル思慮知識共ニ之ヲ喪フコト

内科撰要

卷之七

九十九章

第八十三章論外ヨリ別案スヘキ所ノキ  
第其呼吸並ニ殆トヨリ。乃夫ノカ所ノキ  
ス。始ト死アノ屍。是レ其證候ニテ。夫ノカ所ノキ  
フ。コト如キ。其證候ニテ。夫ノカ所ノキ  
証ノ如キ。其證候ニテ。夫ノカ所ノキ  
崩壊脱失セ。其證候ニテ。夫ノカ所ノキ  
皆廢絶ス。其證候ニテ。夫ノカ所ノキ  
ス。其證候ニテ。夫ノカ所ノキ  
僅ニ作爲運シム。其證候ニテ。夫ノカ所ノキ  
ハ全體ニ善達スル。其證候ニテ。夫ノカ所ノキ  
發ス。其證候ニテ。夫ノカ所ノキ  
ル。其證候ニテ。夫ノカ所ノキ  
瞳子ニ照映スヘキ者アルコト無ニ發シ。又ハ眼  
目ヲ運動スルコト有サルニ見ル所自ラ旋轉ス  
ルノ状ヲ説ク是ナリ。羅旬ニ之ヲ歇而執麴ト謂

フ。此証若シ大ナルニ至テハ。始ハ先ツ瞳子蒙昧  
ナルノ証ヲ發シ。尋テ乃チ昏冒シテ明ヲ失ヒ。遂  
ニ卒厥ニ陥ルニ至ル者ナリ。  
右第九十九章。頭眩冒ノ大較ヲ論ス。  
窮理学ニ於テ之ヲ研求スルニ。元來瞳子ノ質夕  
ル。静止ヲ以テ其素トス。人流水ニ鑑スルコト  
ル。形ヲ照シ定ルコト能ハサ。是ニ於テ凡ソ照映  
ノ力故ナリ。即チ是ノ理ノハ。是ニ於テ凡ソ照映  
ノ至ル所ハ。遍ク觸レ悉ク鑒シテ遺スコト無ク。  
亦皆曲ニ應シテ其本相ヲ易ルコト無ク。諸ヲ眼  
底ニ達シテ神經ノ觀采ニ供ス。乃チ吾人共ニ是  
ニ由テ以テ百爾ノ大小方圓邪正動靜多寡遠近

内科要  
卷之七  
百  
〇二

鏡ハ像ニコ隨大ヲ焔膜云。膜ルルル所用ノシルモツ  
ヲ門ヲ供トテナ保化ニ三有ニ者樹ヲル孔ム所象コ  
取或画スヲ即リ。ス。セ接ニテ侶ハ脂受所眼ルナ目ハ  
リハクル主ナ以之ルス。日以夕其木テ孔ヲコレ。交ニ  
出窓ニ所ル。羅テヲ者水クテル形液悉眼承ト以接受  
シ一全以此此文水硝ノ様硝自モ。圓ノクニクヲテノク。  
テ孔クナヲ膜晶子如液子ヲ前ナ如斯置喻主之間其  
諸ヲ門リ。三ヲ液膜シニ液護面リ。クニクヘルヲハ正  
ヲ開窓湯液シニト故比水ス頗其一聚ノハニ中上面  
孔キヲ若トテ照謂ニス晶極ル他般。縮鏡室ニ央下直  
眼大閉望ス。之撮フ。名レ液テ平ハ極ス。ノ中曰ニ左線  
ニ小ナ。云外ヲス三クハノ薄塌差テ其如鏡ク轉右ノ  
置前務ク。象采ル液亦更後シ。ナ扁透質シ。ヲ水シ。斜射  
キ。鏡テ室ヲ覽所ノ一ニニ名ルナ明夕四假晶水隅ル  
白ト幽中照識ノ中膜稠在テノリ。ナル周ヲ液。晶曲所  
淨相暗鏡撰別象此有ナテ蜘蛛。偶リ。孰ノ像正液突ニ  
紙ヒヲヲシセ相液テリ。直蛛水尔人ニ照ヲクニ照論  
ヲ緝極照テシヲ最以硝ニ絲晶ク類漏撰画葡輻撰ナ  
以へ。メ。シ觀ム受モテ子羅膜液圓ニ滴スク葛。漆セシ  
テ前或テ象ルテ。多自ノ文ト一ナ在セルニ膜セサ苟

液所此護諸ス正膜。後始烏膜烏外ヲハ。藏妄運之ヲ  
ト以ヲス膜ル中玲ニヲ暗ノニ第匝一各ニ動ヲ鑿別  
ノ十六ルノ者ニ瓏周斯ニ前繫一テニ稟屬ス。層別  
間リ。膜所最是孔膜シニ於面リ。膜目曰ルス所成ス  
ニ三ト十下ヨヲノ細資テ白水ト窠ク所其謂シ。ル  
克液ス。リ。ニリ穿下脉ルハ膜脉ス。ノ白ア冥ル三コ  
盈ハ。諸萬在シワ。ニ血四最牖烏ニ内膜リ。ハ五液ト  
シ一液物リ。テ即在絡ニ外ヲニニニ又相眼輪以ヲ  
外ニヲノ敏眼ナリ。ノ曰ノ啓絡曰附コ管目八テ得  
象曰包景密底所即成ク膜テフク著レスハ廓之ル  
ノク裏ス織ニ謂ナス脉夕通三強シヲル自五ニナ  
来水シルカ達瞳脉所絡リ。微ニ膜上結コヲ藏克リ。  
リ様テ者如ス。子給ナ膜物ヲ曰運下膜ト眼配盈究允  
景液。眼以シ。六十膜リ。其象為ク動臉ト有目。當シスソ  
ス玲質テ此ニリ。ノ五色ノス玲ヲニ謂ニ五ノ六ル眼  
ル瓏ヲコ瞳曰萬前ニ黑映所瓏為連フ。ア瘋說筋ニ。目  
者膜資、神ク物面曰ク。射十膜スル。周ヲハハ以六ノ  
必ト成ニ經羅來ニク鳥スリ。即ノ此クス。自尽テ膜質  
ス水ス知ノ文リシ葡暗ル此ナ諸ヲ眼六ヲク之以ヲ  
先晶ルル。布膜。景ヲ。葛ノ者レ強筋最珠膜五。証ヲテ精

法照ノ如ク對シテ内室ニ置ケハ。則チ潑鏡諸ノ外像ヲ此相ヲ用シ。國々ノ物像ヲ畫クニ。西ノ儼然トシテ。生者毎ニ如ク。借テ其幽暗ヲ成鏡ハ。照コトト。ア西ノ儼然トシテ。壁ノ目ニ於ル。以テ其幽暗ヲ成鏡ハ。照コトト。ア西ノ儼然トシテ。前鏡ニ相テ愈明ナリ。而テ其幽暗ヲ成鏡ハ。照コトト。ア西ノ儼然トシテ。白淨紙ナリ。而テ其幽暗ヲ成鏡ハ。照コトト。ア西ノ儼然トシテ。空明氣ナリ。而テ其幽暗ヲ成鏡ハ。照コトト。ア西ノ儼然トシテ。ム。六筋曰ク。一相ヒ。照ニ液膜ハ。即チ中間ニ過ケルノ。人ヲ筋。外ヲ筋。眼ヲ轉レテ斜下セシム。六筋曰ク。一相ヒ。照ニ液膜ハ。即チ中間ニ過ケルノ。運動レテ定ラサルコトヲ為サシムルノ罪ニ。血脈及ヒ。其宜ルニ適ハシム。此ヲ六筋ト間筋。人ヲ筋。外ヲ筋。眼ヲ轉レテ斜下セシム。六筋曰ク。一相ヒ。照ニ液膜ハ。即チ中間ニ過ケルノ。是ニ由テ之ヲ觀レハ。頭眩冒ノ人ニ於テハ。瞳

子其素ヲ失テ靜止スルコト能ハスシテ運盪シ。是ニ於テ其觸レ抵ルノ諸物ヲシテ。亦照映シ得テ運動シテ定ラサルコトヲ為サシムルノ罪ニアラス。只是レ眼底ニ於テ之ヲ領取觀采スルコトヲ主ルノ官。其常職ヲ失テ闇昏不明ナルノ致ス所ニ在ルノミ。是ヲ以テ瞳子ノ照攝シテ供スル所。靜定ノ物輒チ變シテ運旋ノ状ヲ為シ。若クハ乃チ象目交接ノ間ノ全ク無キ所ニシテ。獨リ眼底ニ於テ自ラ諸般ノ異象ヲ現スルコト有二至ルナリ。○是ニ於テ予カ輩其眼底ニ在テ之ヲ領取觀采スルコトヲ主ル者ハ。甚麼ナル物有テ

内科要  
卷之二

以テ之ヲ為シ。而シテ其ヲシテ其常ヲ失テ以テ  
 不明ヲ致シ。自ラ非常ノ妄見ヲ發セシムル所以  
 ノ者。何ノ原因有テ以テ之ヲ致スト云コトヲ考  
 究スルニ。固ヨリ所由アリ。即チ左ニ陳スル所  
 如シ。○看ヨ此ノ眼底ニハ。隨處盡ク瞳神經ナル  
 者有テ。其狀糊ノ如ク。其膜ノ細筋纖維ニ憑依シ  
 テ布護蔓延シ。人<sup>身</sup>五<sup>司</sup>ノ中。目ヲ司ラクテ第一  
 リ。腦ニ密近ナルハ。無シテ其<sup>中</sup>ノ<sup>目</sup>ヲ<sup>司</sup>ラ<sup>ク</sup>テ<sup>第</sup>一<sup>目</sup>  
 ス。外ニ<sup>一</sup>團<sup>聚</sup>ヲ<sup>為</sup>セ<sup>ル</sup>者<sup>ト</sup>ス。西<sup>醫</sup>或<sup>ハ</sup>茲<sup>ニ</sup>賦<sup>予</sup>  
 經ノ外ニ<sup>一</sup>團<sup>聚</sup>ヲ<sup>為</sup>セ<sup>ル</sup>者<sup>ト</sup>ス。西<sup>醫</sup>或<sup>ハ</sup>茲<sup>ニ</sup>賦<sup>予</sup>  
 ラス。外ニ<sup>一</sup>團<sup>聚</sup>ヲ<sup>為</sup>セ<sup>ル</sup>者<sup>ト</sup>ス。西<sup>醫</sup>或<sup>ハ</sup>茲<sup>ニ</sup>賦<sup>予</sup>  
 道。脊<sup>髓</sup>ヨリ<sup>分</sup>レ<sup>テ</sup>其<sup>第</sup>二<sup>三</sup>皆<sup>先</sup>ヲ<sup>フ</sup>道<sup>共</sup>ニ<sup>至</sup>  
 十<sup>神</sup>經<sup>目</sup>司<sup>レ</sup>テ<sup>用</sup>テ<sup>神</sup>經<sup>目</sup>司<sup>レ</sup>テ<sup>用</sup>テ<sup>神</sup>經<sup>目</sup>司<sup>レ</sup>テ<sup>用</sup>  
 謂<sup>ル</sup>。以<sup>テ</sup>第<sup>三</sup>司<sup>レ</sup>テ<sup>用</sup>テ<sup>神</sup>經<sup>目</sup>司<sup>レ</sup>テ<sup>用</sup>テ<sup>神</sup>經<sup>目</sup>司<sup>レ</sup>テ<sup>用</sup>

即チ<sup>二</sup>衆<sup>神</sup>識<sup>別</sup>ノ<sup>成</sup>ス<sup>ル</sup>所<sup>ト</sup>タ<sup>リ</sup>。萬<sup>象</sup>ノ<sup>來</sup>リ<sup>景</sup>ス<sup>ル</sup>者<sup>ハ</sup>。此<sup>ノ</sup>力<sup>者</sup>。  
 茲<sup>ニ</sup>衆<sup>神</sup>識<sup>別</sup>ノ<sup>成</sup>ス<sup>ル</sup>所<sup>ト</sup>タ<sup>リ</sup>。萬<sup>象</sup>ノ<sup>來</sup>リ<sup>景</sup>ス<sup>ル</sup>者<sup>ハ</sup>。此<sup>ノ</sup>力<sup>者</sup>。  
 為<sup>ナ</sup>リ。神<sup>經</sup>ノ<sup>見</sup>タ<sup>リ</sup>。及<sup>チ</sup>動<sup>脈</sup>ノ<sup>支</sup>別<sup>微</sup>細<sup>ナル</sup>者<sup>。</sup>  
 四<sup>十</sup>一<sup>章</sup>ニ<sup>見</sup>タ<sup>リ</sup>。及<sup>チ</sup>動<sup>脈</sup>ノ<sup>支</sup>別<sup>微</sup>細<sup>ナル</sup>者<sup>。</sup>  
 共<sup>ニ</sup>聚<sup>會</sup>シ<sup>テ</sup>之<sup>ヲ</sup>周<sup>衛</sup>擁<sup>保</sup>ス<sup>ル</sup>コ<sup>ト</sup>ヲ<sup>。</sup>○是<sup>ヲ</sup>  
 以<sup>テ</sup>其<sup>膜</sup>ノ<sup>細</sup>筋<sup>纖</sup>維<sup>條</sup>若<sup>ク</sup>ハ<sup>其</sup>動<sup>脈</sup>ノ<sup>支</sup>別<sup>微</sup>細<sup>ナル</sup>者<sup>。</sup>  
 ナ<sup>ル</sup>者。一<sup>箇</sup>ノ<sup>常</sup>然<sup>ニ</sup>反<sup>セ</sup>ル<sup>運</sup>動<sup>ヲ</sup>其<sup>部</sup>ニ<sup>發</sup>起<sup>ス</sup>  
 ス<sup>ル</sup>コ<sup>ト</sup>有<sup>ト</sup>キ<sup>ハ</sup>。則<sup>チ</sup>千<sup>瞳</sup>神<sup>經</sup>モ<sup>亦</sup>輒<sup>チ</sup>是<sup>ノ</sup>力<sup>為</sup>  
 ニ<sup>運</sup>動<sup>ス</sup>ル<sup>カ</sup>故<sup>ニ</sup>。其<sup>部</sup>ニ<sup>於</sup>テ<sup>自</sup>ラ<sup>倣</sup>異<sup>非</sup>常<sup>ノ</sup>  
 運<sup>動</sup>ヲ<sup>現</sup>ス<sup>ル</sup>ニ<sup>至</sup>ル<sup>。</sup>此<sup>レ</sup>即<sup>チ</sup>千<sup>頭</sup>旋<sup>眩</sup>冒<sup>ノ</sup>繇<sup>テ</sup>  
 起<sup>ル</sup>所<sup>ナ</sup>リ。  
 右<sup>第</sup>百<sup>章</sup>。頭<sup>旋</sup>眩<sup>冒</sup>ノ<sup>内</sup>因<sup>ヲ</sup>論<sup>ス</sup>。  
 凡<sup>ソ</sup>此<sup>ノ</sup>疾<sup>ヲ</sup>發<sup>ス</sup>ル<sup>ノ</sup>諸<sup>因</sup>ハ。或<sup>ハ</sup>其<sup>眼</sup>底<sup>ニ</sup>紫<sup>絡</sup>

内科要  
卷之七  
百

スル所ノ動脈ノ小別細支。或ハ其膜ノ細筋織條。或ハ直ニ瞳神經自ラ灌溉運資スル所ノ精氣。其平素ノ常ヲ失ヒ衰シテ常然ニ逆スルノ動ヲ為ストキハ。則チ此ノ頭眩眩冒ヲ將出シ来ルナリ。而シテ其原由大ナル者ニ至テハ。瞳神經ノ中ニ灌溉運資スル所ノ精氣。因テ壅ニ非常ノ運動ヲ為スノコトニアラス。進テ遂ニ凝泣スルコトヲ為スニ至ルトキハ。眼目蒙昧シテ明ヲ失ヒ。已而ニシテ止サレハ。則チ卒厥コレニ從フナリ。○右ノ諸般ノ次序ヲ失ヘル運動ヲ為ス者。其由來スル所ノ諸原一ニシテ足ラス。悉皆同シ治法ヲ以テ

療スヘキニ非ス。是ヲ以テ宜ク其所因ヲ分別シテ。診察ナラヒニ治術ニ於テ。錯誤ヲ致スコト。勿ルヘキナリ。何トナレハ。其暈倒昏冒スルノ際ニ臨テハ。何ノ藥劑ニ宜シト去コト。其証候ノ明白ニ處分スルニ足レル者ナケレハ。切當ナル對方ヲ得カタクキ者ナリ。故ニ豫メ其原由ヲ明辨シテ。然シテ後ニ斯ニ從事スルコトヲ為スヘキナリ。○諸ノ原由盡ク斯ニ援引シテ之ヲ示ニコトヲ要スレトモ。甚タ繁長ニ屬スルカ故ニ。特ニ夕、其中ニ就テ其尤モ較著ナル者ヲ擧テ之ヲ指摘スルノミ。

血ノ過多洋溢ヨリシテ發スルノ一証アリ。其動  
脈ヨリ血ヲ頭部ニ輸送スルコト。平常ニ越テ過  
多ナルニ因テ致ス所ナリ。其原コレヲ其人元來  
多血ナル稟賦。若クハ居恒血ヲ脱泄スルノ性ヲ  
齎セルニ。今ニシテ其脱泄ヲ止住シタルカ為カ。  
或ハ自ラ其股ヲ以テ腹ヲ重壓シ。血脉ノ血ヲシ  
テ多ク心藏へ衝逆セシメ。並ニ又動脈大幹ヨリ  
シテ血ノ下流スルヲ礙隔スルコト有カ為カ。或  
ハ偶其首ヲ低クシテ寢臥スルコト有ニ得ルナ  
リ。此等皆能ク其頸脈ノ循行ヲシテ閼遏シテ通

セサラシムルコト。猶夫ノ緊ク頸ヲ絞繫スルカ  
コトシ。又喉風第百二十七章並ニ諸般ノ肺藏ノ  
疾ニ於テ。血脉ノ頭ヨリシテ下流スルヲ障  
碍阻絶スル者ナリ。常ニ多ク右件ノ諸因ヨリシテ此  
ノ頭眩眩冒ヲ發スルナリ。之ヲ治スルニ須ク瀉  
血ノ法ヲ以テシ。又ハ清涼ナル下劑ヲ用ヘシ。第  
十二章ニ出ツ。其瀉血ニ由テ治スル所以ノ者ハ  
此其諸血管極テ多ク眼目ニ輻湊シテ。其運用ヲ  
營為スヘカラシムルコト。自餘ノ諸部ヨリ殊異  
ニ資成シアル緊要ノ處ナルカ故ニ其變ニ臨テ  
モ。亦恒ニ諸血ノ衝逆ヲ受易キカ為ナリト知ヘ

百二



○是ヲ以テ諸熱病ニ於テ。血ノ騷擾シテ頭ニ  
 衝逆スルコト有トキハ。亦能ク此ノ頭眩眩冒ノ  
 譫妄ニ先タツテ其<sup>サキ</sup>號<sup>ブ</sup>箭ト為リ來ル者ナリ。共ニ  
 前ニ説ク所ノ理ニ依テ其証ヲ將出シ來ルト知  
 へシ。

右第百二章。頭眩眩冒ノ血ノ衝逆ニ因ルノ  
 証治ヲ論ス。

不学無術ノ輩。疾ノ原由ヲ蹤跡セズ。元ヨリ其因  
 ヲ明ニセズシテ。妄投瞑行スルコト。甚夕危殆十  
 ルコトナリ。学者須ク之ヲ知テ。深ク戒慎シ。其轍  
 ヲ蹈ムヘカラス。若シ概シテ是レ頭眩眩冒ノ藥

ト號シ。其名ニ執シテ之ヲ處スルトキハ。其因ノ  
 元ヨリ一ナラサル。一定ノ劑以テ諸般ニ應スル  
 二足ラス。其因ト藥ト方鑿<sup>ヤ</sup>圓<sup>ウ</sup>抽ナルコトヲ救ハ  
 ス。膏ニ其効ナキノミナラス。祇ニ以テ害スルニ  
 足ル。讀者須ク能ク之ヲ領解スヘシ。因テ茲ニ其  
 因ノ相反スル者ヲ以テ之ヲ曉ラシメントス。○  
 前章ニ論スル所ノ血ノ衝逆ニ因テ發スル者ハ。  
 是レ多血ヨリシテ來ルカ故ニ。之ヲ消シ減スレ  
 ハ治スルヲ以テ從事シ易シ。若シ夫レ其血ヲ誤  
 リ消スル等ヨリシテ。血ノ不足ニ因テ發スルノ  
 証ニ至テハ。則チ其事容易ナラストス。而シテ其

毎ニ見ル所ニ據ルニ。其多ク血液ヲ脱失スルニ  
因テ常ニ此証ヲ致スヨリ通患ナルハ無シ。○右  
ノ証ヲ治スルニハ。其法前章ニ論スル所ノ多血  
ヨリスルノ証ト冰炭相反スルナリ。即チ第九十  
六章ニ論スル卒厥ヲ治スルノ術ニ同一ナリト  
知ヘシ。

右第百三章。頭眩眩冒ノ失血ニ因ルノ証治  
ヲ論ス。

假令ハ第二十一章ニ論スル性ヨリスル壞液病  
ノ稀涼ニシテ酷厲ナルノ液ヲ生シ。知覺ヲ為ス  
ノ神經ニ於テ痛ヲ催シ。及ヒ異政ノ諸器ニ屬セ

ル神經ニ於テ煩悶ヲ發スル者。爾ク此ノ眼底ニ  
浸淫シテ。資成スル所ノ原機ニ加ハルトキハ。一  
箇ノ次序ナキ非常ノ運動ヲ發スルコト。即チ頭  
眩眩冒ノ証ニ至ルナリ。○其寒壞液ノ治セスシ  
テ長ク彌留スルノ間ハ。此証モ亦治スルコト無  
シ。其因彼ニ在テ此ニ在サルカ為ニ。宜ク第二十  
六章ニ論スル所ニ從テ其原ヲ治スヘシ。而シテ  
此証自ラ瘳ユ

右第百四章。頭眩眩冒ノ壞液ニ因ルノ証治  
ヲ論ス。

夫レ蘇對布的列金偃ノ運動ニ因テ。神經ノ牽掣

牽急スルコト。第百十三章。目膜ノ細筋織條ニ連  
及スルノ証。能ク此ノ頭眩眩冒ヲ發スル者ナリ。  
此其理甚々解シ易クシテ其治ハ則チ難シトス。  
其解シ易キ所以ノ者ハ。此其細筋織條。彼ノ神經  
ノ牽急スル力為ニ。次序ナキ非常ノ運動ヲ為シ。  
因テ茲ニ照撮スル百爾ヲシテ亦自ラ非常ノ運  
動ヲ形サシムルコトヲ知レハナリ。○是ヲ以テ  
子藏衝逆ノ証第百十三章併セ考ヘシ。及ヒ發癩ニ至ルノ人。  
ルク此ノ証ヲ發シ。且ツ常ニ善ク右ノ証ニ係ン  
トスル者。亦多ク此ノ証ヲ現スル者ナリ。○其治  
シ易ラサル所以ノ者ハ第一ニ先ツ神經ノ牽急

ヲ治セサレハ。特ニ此証ノミヲ治セント欲スル  
モ治スルコト能ハス。而シテ其論其法後ニ於テ  
之ヲ明説スル力如ク。神經牽急ノ疾ヨリシテ。既  
ニ彼力如ク其レ治術ヲ施スニ於テ容易ナラサ  
ル所ナレハナリ

右第百五章。頭眩眩冒ノ蘇ス對布トイフニ因ルノ証  
治ヲ論ス。

斯ニ甚々異トスヘキニ似タルハ。生人ノ事態ニ  
就テ之ヲ蹤跡スルニ。其頭眩眩冒等ヲ患ルノ人  
ハ。屢コレヲ歷試スルニ。必ス悪心スル力。又ハ嘔  
吐ノ証ヲ為ス者ナリ。若シ悪心スル力。或ハ箇ノ

遠在ナカスルニ。漢一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。  
一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。  
一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。  
一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。  
一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。  
一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。  
一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。  
一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。  
一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。  
一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。漢一ノルコト。痛ヲト。

其ルステ。胃侶キヲ其クル上。義ニ達スヘキナリ。頭痛論。篇第百二十一。其十。  
誰、上、全ノクノ以胃腦所下。下。甚夕相通。シテ二十ナラサルコトヲ。学者須ク此。  
何要此ク最一般能感ニリ。ヒ。間十人徑開ナア觸絡直故隔。キナリ。頭痛論。篇第百二十一。其十。  
問十人徑開ナア觸絡直故隔。キナリ。頭痛論。篇第百二十一。其十。學。者。須。ク。此。  
ヲル身有哆リリ知フニヲ。考スル。ト。雖ノ。頭。痛。論。篇。第。百。二。十。一。其。十。  
主カ死テセト。存覺コトル。ト。雖ノ。頭。痛。論。篇。第。百。二。十。一。其。十。學。者。須。ク。此。  
ラ故生茲ル心ス。甚ト。雖ノ。頭。痛。論。篇。第。百。二。十。一。其。十。學。者。須。ク。此。  
シニ。存ニ部。腹。膈。敏。密。所。蒲。郎。其。動。都。甚。其。十。六。章。頭。亦。是。  
ム知亡布ヨ痛膈敏密所蒲郎其動都甚其十。六。章。頭。亦。是。  
ル覺ノ護リ。篇。第。百。一。頭。其。部。ノ。經。八。鮮。相。比。近。頭。二。亦。是。  
カヲ係ス。食。第。百。一。頭。其。部。ノ。經。八。鮮。相。比。近。頭。二。亦。是。  
為為ル故道百一。頭。其。部。ノ。經。八。鮮。相。比。近。頭。二。亦。是。  
ニス所ニノ。終。十。部。ノ。經。八。鮮。相。比。近。頭。二。亦。是。  
神ノノ。終。十。部。ノ。經。八。鮮。相。比。近。頭。二。亦。是。  
經。神。飲。ク。竟。一。ヲ。最。如。ハ。鮮。相。比。近。頭。二。亦。是。  
ノ。經。食。重。二。章。具。モ。ク。胃。剖。比。近。頭。二。亦。是。  
茲。ヲ。痛。至。ニ。日。ル。力。ヘ。是。リ。日。十。一。是。此。  
ニシ受ヲル。日。ル。力。ヘ。是。リ。日。十。一。是。此。  
賦テ。納。為。マ。ク。力。ヘ。是。リ。日。十。一。是。此。

同科漢要  
卷之七  
十一

大幹ヨリシテ。合レテ。睪丸ニ下リ。以テ精ヲ製ス。  
ル所ノ精脉ト。腎ヨリ膀胱ニ達スル輸尿道ト。近  
ク相ヒ並フヲ以テ些ノ病考ニ錯ヲ致ス。此証ノ胃中  
ニ壞液敗物ノ在ルコト有ルニ因テ發シタルコ  
トヲ蹤跡シテ。能ク得ルコトアラハ。先ツ其胃ヲ  
淨刷シテ清閑ナラシムルヲ良トス。其方第十五  
章ニ載ル所ノ吐藥ヲ用ユヘシ。然シテ後從テ第  
二十章ニ出ル所ノ健胃劑ヲ用テ。胃ノ消磨化熟  
ヲ左右スヘシ。○右ノ如ク其原ハ甚タ相ヒ廻別  
セル所ヨリシテ出来レトモ。其証ハ則チ同ク是  
レ一ニ此ノ頭眩冒ノ候ヲ發スルカ故ニ。人其  
証ニ値コトニ。徒ニ患者説ク所ノ標証ニ因テ。皆

コレニ蒙ラシムルニ此名ヲ以テシテ。妄ニ一緊  
シテ治スルコトヲ得サレ常ニ豫メ其因ノ一十  
ヲサル。名人以テ頼ムニ足ラサルコトヲ知テ。漏  
洩シテ其原ヲ得テ。然シテ後治法ヲ處スヘキナ  
リ。者ヨ此ノ手段。爾ク難事ニ非ス。斯ク從事スレ  
ハ。甚タ由リ易クシテ且ツ大ニ覈實ナルコトヲ。  
右第百六章。頭眩冒ノ胃中ノ壞液ニ因ル  
ノ証治ヲ論ス。

内科抄  
卷之七  
十一

精神錯亂篇第十七

精神錯亂シ常ヲ失ヘル者所謂ル癲狂  
譎妄痴迷昏瞶ノ類皆是ナリ。只其輕重  
同シ甚ニ因テ其發見スル致スノ各自

斯ニ人アリ。先ニハ其心意知覺ノ操設。動靜云為  
ノ運営。ナラ人ノ猶クニシテ。一モ異ナル所アル  
コト無カ。今ニシテ乃チ心意知覺ノ事ニ應シテ  
用ヲ為スノ便宜ヲ失ヒ。夫ヨリシテ心意ニ思念  
スル所。並ニ身體ノ運為スル所。尽ク常ヲ失テ異  
ナラサル所ナク。人事昏憤言語錯亂スルニ至ル  
此ヲ精神錯亂病ト曰フ。羅甸ニ之ヲ埵栗留謨ト  
謂フ。○若シ其知覺意思ノ常ヲ失フコト。未夕甚

シキニ至ラス。或ハ其証偶事件ニ由テ發スル者  
ヲハ。乃チ第六十三章ニ出ル喜剥昆埵兒ノ証ト  
ス。即チ膽汁敗黒病ナリ。其証必ス故チ知覺ノ  
如ク憂悲悶スルコトヲ為シ。又且ツ心志知覺ノ  
ルノ証相ト副テ離レス。第五卷ニ疑惑迷罔ス。此証  
ノ最モ彰著ナルハ。右ニ説ク所ノ証ニシテ。必ス  
鬱憂悲惋スルコト有テ並ヒ發スルコトヲ為シ。  
又常ニ多ク他事ニ於テハ俛能ク爽利快了ニシ  
テ。彼此相ト副ハサルガ如ク然ル者ナリ。○若シ  
其人精神意思ノ運営ヲ失フコト有テ。常ト成テ  
治セス。其証熱ニ由ラスニテ發スル者ハ。之ヲ痴  
迷ノ証ト謂フ。原名厄ゲキ敬イ度マタ卒篤イ度  
ト云。精神錯亂シテ便宜ヲ失フ者。

内科提要 卷之七 百七 十三

○若シ之ニ加ルニ其氣志ヲ動作シテ靜止セザルコト過度已甚ニシテ。曠日持久。間歇アルコト無キハ。則チ失心癲狂等ノ名ヲ以テ之ニ命スルナリ。刺源 設名 爾獨 泥尔 歌云 意度 ○若其大熱兇壯ニ發シテ。患人心意ニ於テ知覺スル所ナリ。全然トシテ荒憤シ。騷擾發作罵詈叫喚スルヲ。乃チ熱毒發狂トト名ク。原名 畏馬 聖尼 迄 歌 ○其熱毒發狂ノ甚シカラサル者。熱ニ由テ發シ。若クハ熱ト共ニ並ヒ病ムヲハ。常ニ之ヲ謔妄ト謂フナリ。原名 栗 窳 篤 意度 夫レ 精神 錯亂 病 辭 弗 其他 幾多 諸病。其証其名。元ヨリ紛雜ニシテ一ナラス。余

今コ、ニ厄勒祭亞及ヒ羅旬ノ名稱。若クハ國語ノ中ニ於テ之ヲ以考スルニ。極南ノ地ニ在リ。經度三十四ヨリ四十三ニ至リ。緯度四十四ヨリ五十五至ル。其聲名天下傳聞ス。凡ソ禮樂法度。文字典籍。皆西土ノ宗タリ。是ヲ以テ學者多ク替ス。究理ノ者。後先踵ヲ接ス。是ヲ以テ學者多ク替ス。精神錯亂ノ名タル。即チ此等ノ統名ニシテ。其他諸般ノ証。皆其種屬タリ。因テ本篇主トシテ精神錯亂ヲ舉テ之ヲ統へ。更ニ其中ニ就テ之ニ屬スル諸病ヲ列シテ。能ク証ニ對スルノ名ヲ取テ以テ之ヲ示シ。証因名實ヲシテ辨シ易カラシメンコトヲ要スルノ也。○右ニ舉ル所ノ精神錯亂十ラヒニ自餘ノ諸証ニ及フマテ。其發見スル所ノ

卷之七

候各異ナリト雖モ皆一同源ナルコト此ヲ醉者ノ情態ニ於テ觀スルトキハ則チ以テ其義ヲ發明スルニ足ル夫レ醉者ノ情態各各同シカラス。吳有可飲邪ヲ論スルニ亦是喻アリ云ク邪ノ人ニ着ク酒ノ如ク然リ。九ソ人酒ニ酔フク。乃其常ナリ。其變ヲ言ニ高ク及テハ各不同アリ。妄言妄動シ醒後全然サレテ醉後赤カアル。至テハ反テモ神思終ニ亂サレテ醉後赤カアル。強ナリ者壯熱ヘテ弱ナレハ後赤カアル。醒難キ者易ク醒テ思ハシクテ反テテ赤カアル。眩眼花及頭痛更ニ過カサレト諸態モ亦以テ情狀考ル自醒ル時ニ及テハ諸態モ亦以テ至テハ則チ各ナリ。醒ル時ニ及テハ諸態モ亦以テ相トハ其為ニ言フ所識ノハ言東西隔絶ス。テシ此發ルニ言足有識ノハ言東西隔絶ス。

ルモ。期トス。如テ相。嘆ヒス。似ベク。ル者ナ。然トモ其因ハ是レ酒ニ酔フノ一同源ニ外ナラス。則チ其外証ノ各各不同ナル所ニ據テ。按テ建テ治テ處セントスルハ。惑ヘルナリ。只其酒毒ノ因ヲ除テ。百尔皆已ムノ也。○是ヲ以テ予宜ニ隨テ只其一二ノ種屬ヲ蹤跡シテ其原由ヲ記載シ。其外表ヨリシテ見ツヘキ証候ノ甚タ分明ニシテ別異ナルニ似タル者ト雖モ。並ニ拘泥セス。只其源ニ源洄センコトヲ要スルノ也。

右第百七章。精神錯亂ノ大較ヲ論ス。

夫レ諸腦ノ運動全クシテ。良善ナル精氣ヲシテ



循行灌溉セシムルコト。次序ヲ失ハスシテ栄養  
スルノ間ハ。其人必ス心意知覚ヲ保テ。精神ニ於  
テ匱乏スル所アラサルナリ。然ルニ若シ諸腦ノ  
運動全カラス。良善ナル精氣ヲシテ循行灌溉セ  
シムルコト。他ノ外物ノ所因ニテ。其次序從テ衰  
スルコト有トキハ。則チ其難ノ多少。障礙ノ微甚  
ニ隨テ。諸般ノ精神錯亂ノ種類ヲ旁生シテ。種々  
同シカラサルノ証ヲ發スルコトヲ得ルナリ。○  
其精神錯亂ノ証。ヲラヒニ其病因。若シ增長シテ  
過大ナルニ及テハ。其發スル所。迴ニ復絶殊異ニ  
シテ復タ同因ヨリシテ生スト謂ヘカラサルカ

如ク然ル者アリ。知スハアル可ラス。

右第百八章。精神錯亂ノ病因ヲ論ス。

若シ人アリ。慄悍酷烈アルヒハ。煎熬醲腊ナルノ  
諸飲ヲ用テノ後。多時ナラスシテ此ノ精神錯亂  
ノ証ヲ發スルコト有ハ。則チ彼ノ飲酒シテ酩酊  
セルト一般ニシテ。大抵コレニ傍テ發シ來ル醉  
眠ノ中ニ消散シテ。尔後從テ故ニ復スル者ナリ。  
此其精氣ノ外物ニ震盪湧發セラレタル者。尋テ  
稍々ニ吾カ體中ノ生氣運動ノ主能ニ因テ。即チ  
中ノ自然ノ良能。第四章及ヒ。其物ヲ包攝降伏シ。  
第三百七章等ニ論ス。考ヘシ。又從テ之ヲ外表へ排擯シ去ルカ故ニ。斯ク時ヲ

移ストキハ故ニ復スルコトヲ得ルナリ。○然ト  
モ若シ氣ノ震盪湧發ヲ受ルコト過大ナル者ニ  
至テハ其消散スルノ間モ亦必ス之ニ應シテ多  
時ヲ須テ然レテ後ニ能クスルナリ。○此証ハ每  
人はレ其被酒ノ致人所ナルコトヲ知リ且ツ其  
多時ナラスレテ醒復スルコトヲ明ニスルカ故  
ニ復タ之カ為ニ治ヲ需ルコト有コト稀ナリ。○  
但其久ク連綿シテ右ノ震盪湧發ノ諸飲ヲ常將  
スル人ハ善ク箇ノ精神錯亂ヲ發シ歲月長ク治  
セス。遂ニ習テ性ト成ルノ衰ヲ生スル者ナリ。予  
カ歴視スル所男子ヨリハ婦人ニ多ク此証ヲ發

ス。此皆其慄悍酷烈ノ飲ヲ用ルニ因テ其ニ染漬  
セラルノ致ス所ナリト知ヘシ。○此レ明ケシ  
其持久シテ慄悍酷烈ノ飲ヲ誤用スルノ過ニ因  
テ斯ク大ナル患崇ノ衰出シテ諸神經及ヒ諸腦  
ノ精氣常行ノ次序ヲ過越シテ奔激迸散スルノ  
癖ヲ成スカ故ニ生氣運動ノ官能ト雖モ亦其力  
ノ能ク當ル所ニ非スレテ故ニ復スルコトヲ為  
スコト能ハスト云コト。此証夫ノ曼陀羅花及ヒ  
弼尔生格祿乙突ヲ用ルニ於テモ亦コレヲ發ス  
ルコト有ヲ見ル。譯度涅子鳥斯カ本草ニ云ク曼陀  
木器ニ且ツ麻。弼尔生格祿乙突ハ荒野砂地ニ生ス

莖高シ。旁ラ。枝ヲ分チ。葉長大ニシテ。澗ノニ。鋸齒アリ。黄緑シテ。紫條。中心紫黒色。根大ニ長シ。状ノ如ク。刺絨ヲ成シ。中ニ性大寒。腫痛止ム。内服ニ用ルコト無シ。外ニ諸腫痛ヲ治シ。脚痛ヲ療シ。耳痛ヲ止ム。医家發狂セシム。又云ク。曼陀羅花ノ毒ニ中シテ。失心野逆並シ。○其精神意思ノ廢荒散脱セル。其証ノ微劇ニ因テ。他カ動靜ニ由テ。甚夕事ニ害アラサル者アリ。又胡動妄作殆ト人ノ回護ニ頼リ。許多ノ攪擾ヲ費ス者アリ。俱ニ終身治セサル者。終コレアル者ナリ。○茲ニ論スル所ノ証ハ。復夕其所因ヲ考按スルコトヲ記載スルヲ須クスシテ。自ラ能ク明白ナルカ為ニ。例ニ依テ特ニ其治法ノ之ヲ説テ左ニ示ス。○斯ニ事ニ從フニ。必ス須ク記得スヘキ者並ニ其良法アリ。先ツ宜ク諸般ノ慄悍酷烈ノ飲ヲ禁スヘシ。若シ右ノ如クシテ。其証猶尚應シテ已サル者ハ。隨テ即チ刺絡法ヲ行フヘシ。其著明ナルハ。身體ノ運動過度ナル者ニ施スベシ。尋テ然シテ宜ク數清凉ナラシムルノ下劑ヲ飲シメ。下利ヲ催サシムヘシ。其方第十二章ニ載ス。從テ其舉動ヲシテ。靜安ナラシメ。且ツ清凉ニスルノ法ニ從テ之ヲ將息スヘキナリ。○差後ト雖モ。猶且ツ慄悍酷烈ノ飲ヲ用ルコトヲ禁スヘシ。何トナレハ。此証

二依テ特ニ其治法ノ之ヲ説テ左ニ示ス。○斯ニ事ニ從フニ。必ス須ク記得スヘキ者並ニ其良法アリ。先ツ宜ク諸般ノ慄悍酷烈ノ飲ヲ禁スヘシ。若シ右ノ如クシテ。其証猶尚應シテ已サル者ハ。隨テ即チ刺絡法ヲ行フヘシ。其著明ナルハ。身體ノ運動過度ナル者ニ施スベシ。尋テ然シテ宜ク數清凉ナラシムルノ下劑ヲ飲シメ。下利ヲ催サシムヘシ。其方第十二章ニ載ス。從テ其舉動ヲシテ。靜安ナラシメ。且ツ清凉ニスルノ法ニ從テ之ヲ將息スヘキナリ。○差後ト雖モ。猶且ツ慄悍酷烈ノ飲ヲ用ルコトヲ禁スヘシ。何トナレハ。此証

一タヒ發シテノ後ハ。甚タ再發シ易シ。而シテ其  
再發ノ際ニ及テハ。復夕初起ノ如クナラム。容易  
ニ治スヘカラサルカ為ナリ。

右第百九章。精神錯亂ノ酔汚染漬ニ因ルノ  
証治ヲ論ス。

凡ソ一身遍體ノ中。熱毒ノ夥滋ナル處ハ。或ハ此  
ニ於テシ。或ハ彼ニ於テシ。此ノ疆彼ノ界トナク。  
其在ル所便チ箇ノ熱毒ヨリシテ來ルノ諸見証  
ヲ發スルコト。亦增多ナル者ナリ。此レ其所在熱  
毒ニ擾亂セラル。ニ由テ尔リ。其熱毒ニ擾亂セ  
モ。居然トシテ彼ノ良知能ヲ受ルヲ排擯介除セシカ  
ニ是レ然トシテ彼ノ良知能ヲ受ルヲ排擯介除セシカ

為ノ之。即チ寒熱痘瘡諸篇ニ説ク擾亂カ致シ。○若シ  
夫レ其毒ノ進テ腦中ニ至ル。則チ患人啻ニ第一  
章ニ陳スル所ノ熱病ノ諸徵候ヲ發シテ。且ツ甚  
劇重難ノ証ヲ頭部ニ現スルノミナラス。又其攪  
擾ノ難ヲ腦中ニ作スニ至ル。腦ハ精神ノ存スル  
所ノ都城タルカ故ニ。第百六章ノ註輦轂下ノ騷  
亂。他處ニ比スレハ其傷タルコト甚シ。是ニ於テ  
精神錯亂ノ發生ス。其精神錯亂ノ微甚ハ。人憤睡中  
呢喃譫言妄語等ハ。是其微ナル者ナリ。若シ夫レ  
躁暴癡狂。高ニ登テ歌ヒ衣ヲ弃テ走り垣ヲ踰ヘ  
屋ニ上リ。水火ヲ避ササル。熱ノ發作ノ多少ニ隨テ  
等是其甚シキ者ナリ。○治療ノ法。第十二章ニ陳スル所ノ  
異ナリトス。

常例ノ熱病ノ治ニ隨テ之ヲ療スヘシ。但其中並ニ多ク下利ヲ為サシムヘシ。以テ其頭腦ニ衝逆スル所ノ毒ヲ下降シテ之ヲ下利ニ送ルカ為ナリ。即チ清涼ナラシムル下劑コレヲ主ル。○若シ其精神錯亂ノ候時有テ來去スル者ハ危カラズトス。若シ然ラズシテ長ク連綿シテ斷ヘス。所謂ル發狂熱ナル者ニ至テハ。則チ更ニ危シトス。何トナレハ。若シ其証已ニ精神錯亂ノ候ヲ見ハスニ至ルハ。則チ熱毒已ニ腦中ニ深入シテ攪亂スルノ致ス所ナリ。是時ニ方テ只其毒ノ下降シテ泄除セシコトヲ望ム。然ルニ今却テ其頭腦ニ底

止滯著スルコトヲ辨シ。若クハ之ニ加ルニ稀清ニシテ透明澄徹ナル小水。彼ノ白塗ニ代テ發シ来ルコト有ニ値ハ。○白塗ノ說第六其大ニ危キコトヲ慮圖シテ可ナリ。此其熱毒ノ瀉下シ除クコト能ハサルカ為ナリ。○精神錯亂ノ熱病ニ發スルニ於テ亦甚危キノ一証アリ。此其熱毒ノ過越シ。進テ壞液病ニ變シタル者是ナリ。第二十五章ニ詳ナリ。何トナレハ。已ニ斯ニ及テハ。復タ瀉血ノ相當スル所ニ非ス。而シテ發汗劑ヲ與レハ亦却テ其謬妄ヲシテ益甚カラシム。然ラハ則チ如何カ從事シテ可ナル。條ノ巾帛ヲ將テ之ヲ醋

ニ蘸シテ。用テ以テ頭首ヲ圍繞シ。從テ第二十五  
章ニ載ル清凉ニシテ且ツ腐壞ヲ救復スルノ藥  
劑ヲ用ヘシ。而シテ其ヲシテ大二多ク下利セシ  
メンコトヲ要ス。其方第十二章ニ記スル所ノ運  
動大過ノ熱病ニ用ル所ヲ與ヘ且ツ之ニ附スル  
ニ少シノ催眠藥ヲ以テ兼行フヘキナリ。

右第百十章。精神錯亂ノ熱病ニ因ルノ証治  
ヲ論ス。

凡ソ翁篤私參金伍諸腫起ノ病共因多端ナリ。過キモ。然シテ其熱熱ノ西  
九ソ翁篤私參金伍二諸腫起ノ病共因多端ナリ。過キモ。然シテ其熱熱ノ西  
ノ腫起ノ病共因多端ナリ。過キモ。然シテ其熱熱ノ西

此翁羅呂培輕私如鈔  
ス。二屬私參金伍此翁羅呂培輕私如鈔  
強盛ニシテ腫脹スルコト。予カ著ス所ノ瘍科精  
選ノ中ニ論スルカ如クナルカ為ニ。即チ是レ其  
証ノ腦蓋膜ニ發スルニ至テハ閉固密塞セ。ル處  
ナルカ故ニ。其運動ノ強甚ナルコト。固ヨリ宜ナ  
リト云コト。以テ其義ヲ領シ易シ。是ヲ以テ復ク  
輕易ナル精神錯亂ノ証ニ非ス。箇ノ謬妄發狂。即

卷之七  
百十一

予所謂ル發狂熱ナル者ノ証ヲ發シ。誘シテ共ニ  
隆盛ニシテ斷ヘサル壯熱有テ。身體火ニテ燒カ  
如ク。頭部ノ動脈尽ク強盛ニシテ鼓腸發跳シ。頭  
痛破ルカ如ク。耐忍スヘカラス。然トモ患者自ラ  
之ヲ告訴スルコト能ハサルニ至ル。此其己ニ知  
覺ヲ喪失スルカ為ナリ。○其必ス發スル所ノ變  
証ヲ言フニ。若シ夫レ謔妄發狂ノ腦蓋膜ノ翁篤<sup>ヲシト</sup>  
私<sup>ス</sup>釜<sup>ユ</sup>金<sup>キン</sup>屈<sup>グ</sup>ヨリ發シタルハ。病治スルコト稀ナリ  
ト知ヘシ。何ヲ以テ之ヲ言ハハ。其癰腫<sup>私<sup>シ</sup>即<sup>ト</sup>發<sup>シ</sup>翁<sup>ヲ</sup>篤<sup>ト</sup></sup>  
已ニ膿ヲ成スニ及テハ。其救ハレサルコト必セ  
リ。此其腦中ニ在ルカ故ニ。其膿ヲ泄除スルニ所

ナキカ為ナリ。○是故ニ。須ク始ニ於テ速ニ刺絡  
シテ瀉血スヘシ。夫ニテ十分ニ靜止セスハ。反覆  
シテ刺絡スヘシ。且ツ第十二章ニ出ル清涼劑ヲ  
用テ。之ヲ下利シ。中ヲ將テ醋ニ蘸シ。以テ頭首ヲ  
圍繞シ。患者ヲシテ移テ風氣清涼ノ處ニ居シム  
ヘシ。然トモ晴明ノ處ニ宜カラス。又凡ソ氣カヲ  
動作スルコトヲ防禦シテ。其ヲシテ安靜ナラシ  
ムヘキナリ。○謔妄發狂ノ熱ト偕ニ發スルノ証  
所謂ル發狂熱ナル者。皆尽ク右ノ腦蓋膜ノ翁篤<sup>ヲシト</sup>  
私<sup>ス</sup>釜<sup>ユ</sup>金<sup>キン</sup>屈<sup>グ</sup>ヨリシテ將來ルト思フコト勿レ。何ト  
ナレハ。箇ノ羅斯ノ如キモ。倭<sup>上ノ</sup>翁<sup>ヲ</sup>篤<sup>ト</sup>ニ見<sup>ル</sup>夕<sup>リ</sup>。其毒

○月井要  
卷之七

頭首ニ衝逆シ及ヒ其熱毒ノ致ス所腐敗ノ傷箇  
ノ諸液ニ加リ。以テ頭ニ輸送スルコト有二及テ  
ハ。俱ニ同ク譎妄作狂ノ熱ト偕ニ相伴テ發スル  
コトヲ為カ故ナリ。

右第百十一章。精神錯亂ノ腦蓋膜ノ翁篤私  
爹金<sup>ラキ</sup>倔<sup>グ</sup>ニ因ルノ証治ヲ論ス。

上第六十三章ニ論スル敗黑膽汁。血脉ニ混淆シ  
テ從テ上コレヲ腦中ニ輸セハ。一種ノ精神錯亂  
ヲ来ス者ナリ。之ヲ膽汁敗黑病ト謂フ○然トモ  
其証只資性ノ壞液ヨリ生シタルヲハ。之ヲ非剥<sup>ホ</sup>  
昆<sup>コ</sup>堦<sup>テ</sup>兒<sup>ル</sup>ト通稱ス。其証乃チ精神意思ニ於テ缺損

スル所有モノナリ。○其詳ナルコト已ニ第六十  
五章第六十六章ニ於テ之ヲ論セリ。

右第百十二章。精神錯亂ノ膽汁敗黑ニ因ル  
ノ証治ヲ論ス。



西說內科撰要卷八

遠西

玉函涅斯垤我爾德兒著

日本

津山

宇田川玄隨

晉譯

鑿官法眼桂川甫周國瑞閣

曷

曷<sup>カ</sup>郎<sup>ラ</sup>布<sup>フ</sup>蘓<sup>ス</sup>對<sup>ト</sup>布<sup>フ</sup>的<sup>テ</sup>列<sup>キ</sup>金<sup>キ</sup>屈<sup>グ</sup>篇<sup>ハ</sup>第<sup>ニ</sup>十<sup>ハ</sup>  
 文<sup>ハ</sup>ル<sup>ニ</sup>布<sup>ニ</sup>並<sup>ニ</sup>名<sup>ヲ</sup>郎<sup>ヲ</sup>布<sup>ヲ</sup>蘓<sup>ヲ</sup>對<sup>ス</sup>布<sup>ヲ</sup>的<sup>テ</sup>列<sup>キ</sup>金<sup>キ</sup>屈<sup>グ</sup>篇<sup>ハ</sup>第<sup>ニ</sup>十<sup>ハ</sup>  
 共<sup>ニ</sup>ス<sup>レ</sup>云<sup>ハ</sup>的<sup>テ</sup>神<sup>ヲ</sup>併<sup>セ</sup>列<sup>ス</sup>金<sup>キ</sup>屈<sup>グ</sup>條<sup>ヲ</sup>ナ<sup>シ</sup>蘓<sup>ス</sup>對<sup>ス</sup>布<sup>ヲ</sup>的<sup>テ</sup>列<sup>キ</sup>金<sup>キ</sup>屈<sup>グ</sup>篇<sup>ハ</sup>第<sup>ニ</sup>十<sup>ハ</sup>  
 相<sup>ト</sup>通<sup>ス</sup>指<sup>ス</sup>其<sup>ノ</sup>別<sup>ヲ</sup>テ<sup>リ</sup>牽<sup>リ</sup>引<sup>ク</sup>義<sup>ヲ</sup>了<sup>ス</sup>度<sup>ヲ</sup>及<sup>ビ</sup>列<sup>キ</sup>金<sup>キ</sup>屈<sup>グ</sup>條<sup>ヲ</sup>ナ<sup>シ</sup>蘓<sup>ス</sup>對<sup>ス</sup>布<sup>ヲ</sup>的<sup>テ</sup>列<sup>キ</sup>金<sup>キ</sup>屈<sup>グ</sup>篇<sup>ハ</sup>第<sup>ニ</sup>十<sup>ハ</sup>  
 ス<sup>ル</sup>コ<sup>ト</sup>本<sup>ニ</sup>文<sup>ニ</sup>見<sup>ル</sup>ハ<sup>ニ</sup>父<sup>ニ</sup>リ<sup>テ</sup>即<sup>チ</sup>

卷之八 百三十三章

漢醫所謂筋痛症驚風角弓反張搦掣者五積六聚等亦コレニ詳ニスル

凡ヲ吾人意ノ欲スル終ニ動靜云為スルコトヲ得セ使ルノ諸筋若シ吾カ思フ所ノ外ニ卷縮引急シ伸ヘキ所ニシテ自由ニ伸ビス又動スコトヲ要セスシテ自ラ掣抽シ又胃ト腸トノ如キ平常是レ動作運用ヲ為スガ夕ノノ諸器ナルニ非ルニ右ニ係リ存スル所ノ筋條彼ヨリシテ自ラ拘挛掣急等ノ証ヲ發ス此ヲ曷郎布の列金屈ト云又蕪對布の列金屈トモ云ナリ○別テ之ヲ言ハハ其証若シ長ク緩弛セスシテ稽留固滯スル

コトアル乃チ吾輩コレヲ曷郎布の列金屈トス  
羅甸ニ所謂尔的韃奴斯ナリ其休止スル時有テ  
復々強ク發ルヲハ右ノ所屬トシテ之ヲ蕪對布  
的列金屈ト云羅甸ニ所謂ル昆弗尔叔ナリ然ト  
モ右ノ二種大抵通シテ同名モテ稱スルノ也  
寶函ニ曰ク通シテ曷郎布の列金屈ト云  
ヲ呼テ蕪對布ト云他ニ非スルナリト  
右第百十三章曷郎布蕪對布ノ大較ヲ論ス  
前章ニ言フ所ノ如ク吾人意ノ思フ所ニ逆ヒ又  
思ハサルニ之ヲ得ル何レ意思ノ自由ニスルコ  
ト能ハサルノ運動ニ二條アルナリ即チ運動セ  
ント欲スルヲ俟テ然シテ後運動スル者ト思欲

二隨ハスレテ内ヨリ自然ニ運動スル者トナリ。  
ハ運ハ手足ノ如キハ。運動セシト欲スルニ非レ  
動サシト要スルモ自由ナラズ。是レ一ナリ。又  
胃等ノ如キ。其運動元ト人意ニ隨フ者ニアラス。  
亦今カスコトヲ欲セズ。然ル。右ニ條ノ思欲ニ逆  
シ外ナル運動ニ此患ヲ發スルコト。其部ヲ一ニ  
セズ。然レテ其發スル所。又必ス能ク人身ヲシテ  
各自其營為ノ官能ヲ失ハシム。其証候ノ發スル  
所甚タ多端ナリ。是ヲ以テ各自ニ名ヲ蒙ラシメ。  
其名ニ據テ之ヲ極ント要スル時ハ。當ニ勝テ窮  
尽ス可ラサルノニアラス。却テ眩亂紛糾シテ。  
錯誤ヲ致シ易ラシムルニ足ル。學術ヲ精究シ事

理ヲ研明スルニ非ルヨリハ。斯ニ辨哲ナルコト  
能ハサル所ナリ。○此病ノ諸証ヲ發スルコト。甚  
彰明較著ナル状態ヲ發シ。且ツ甚タ相ヒ廻異ナ  
ルノ別候ヲ形スナリ。此其發スル所既ニ然ク其  
部ヲ一ニセサレハ。主動モ亦隨テ各同シカラサ  
ルニ因テナリ。是ニ於テ人其標ヲ殊ニシテ本ヲ  
同シ。百候ニシテ一原ナルコトヲ知ラス。患者ノ  
常情。乃チ醫家ヲシテ証ヲ尋子標ヲ逐ヒ。詳悉ニ  
シテ遺スコト無ラシメンコトヲ欲シ。具狀委曲。  
鄭重ニシテ自ラ己ムヲ能ハサルニ至ル。以為ラ  
ク必ス關係スル所有テ。大ニ施術ニ裨益アラン

日本醫學  
卷之八

ト。必シモ然テサルナリ。○其治法ノ要トスル所  
ハ。大畧其殊異ナルニ拘泥セズ。只其病原ヲ辨察  
スルヲ以テ務トス。是ヲ以テ予爰ニ其傍ヒ來ル  
所ノ諸証。若クハ先ツ發スル所ノ徵候ヲ以テ。各  
異ノ所因ヲ察スルノ諸件ヲ陳列シテ。由テ治療  
ノ術ニ從事セシメントス。  
右第百十四章。曷郎布蘇對布ノ合別ヲ論ス。  
夫レ死シタル身體ニ於テ。此病ノ發スルコト能  
ハサレニ就テ之ヲ觀ルニ。生活セル間ノ諸運動。  
悉ク是レ精氣ノ灌注シ入ルニ因テ。之ヲ營為ス  
ルコトヲ知ル。則チ此病ノ發シ來ルコト。是レ精

氣ノ諸筋或ハ細筋纖條ニ灌注シ入ルコト強甚  
ナルカ為ニ。其運動吾人ノ意外ニ出テ。思欲ニ聽  
從セサルコトヲ致スコト明ケレ。是ニ由テ之ヲ  
觀レハ。其曷郎布列金偃ヲ發スル所以ノ者ハ。  
知ヌ是レ其灌注シ入ル所ノ精氣強クシテ。相ヒ  
持シテ除サルノ致ス所ナルコトヲ。只其蘇對布  
的列金偃ニ於テハ。是レ其精氣ノ強ク灌注シ入  
リ。然シテ時々休止スルコト有テ。又再ヒ強ク灌  
注シ入ルコトヲ為スナリ。○右ニ説ク所ハ。此其  
内因ヨリシテ常ニ然ル者ノ也。自餘尚其由ル所  
復ニ殊ニシテ。斯ニ非常ノ運動ヲ發スル者アリ。

宜ク與ニ現ハス所ノ諸証。若クハ前ニ有ル所ノ  
徵候ニ據テ之ヲ明ニスヘシ。○其所因ニ從テ。善  
ク生平意ニ隨フノ運動ノ得テ及フコト能ハサ  
ル至強ノ動作ヲ發スル者常ニ多シ。

右第百十五章。曷カ郎ラ布フ蘓ス對トイ布フノ内因ヲ論ス。  
夫レ吾輩若シ曾テ歷試シテ。大ナル去血ノ証。亦  
尋テ蘓ス對トイ布フヲ發スルコト有ルヲ知ルコト無ハ。  
則チ此病原極テ精氣灌注ノ強甚ナルヨリシテ  
發スルノコト妄意ニ謬解スルコト有ヘシ。何ト  
ナレハ。徒ニ其精氣ノ強甚ニ出ルコトヲ知テ。未  
夕其虛缺ニ出ルコトヲ知ラス。偶其証ニ值ル。

則チ將夕曰シ。去血是ノ若ク其大ナリ。精氣那  
ソ虛缺セサルコトヲ得シ。蘓ス對トイ布フノ証。法當ニ無  
ルハ其所ナリ。斯人ニシテ斯証ヲ見。怪ニ非シハ  
則チ寔ナリト。夫レ此カ如クハ。病ヲ誣セ事ヲ誤  
ルコト孰カ焉ヨリ甚シカラシ。○是故ニ蘓ス對トイ布フ  
ノ原。悉ク前章ニ説クカ如シト謂フコト勿レ。亦  
虛缺ヨリモ發スルナリ。此レ生人ニ歷試シテ明  
知スル所ナリ。○即チ此証ノ發スル。必シモ大ナ  
ル脱失ノコトナラス。亦唯其精氣ノ憑テ以テ本資  
トナシテ。其護養ヲ仰ク所ノ諸血液ヲ。禁忌ヲ避  
ズ。部分ヲ論セスシテ。妄ニ之ヲ刺瀉レ。或ハ其他

諸ノ脱漏ヲ催スカ如キ謬施誤治等ニ因テ。俛能  
ク此証ヲ將出シ來ル者有ナリ。○之ヲ要スルニ  
其蘊對布ノ來ルハ。外表諸末ノ血ノ脱失ニ因ラ  
ス。只是レ腦中ノ血ノ虚缺ニ因テ發スル者ナリ  
○是故ニ。此証ニ臨テ最第一ニ緊要トスル所ハ。  
大約此血ヲシテ心藏ニ輻湊セ使ルコトヲ為ス  
ノ諸術ナリ。假令ハ婦人産後。又ハ水腫ヲ患ルノ  
人。其水ヲ利スルコト大甚ナル。又ハ大ニ泄瀉シ。  
及ヒ暴卒ニ下利シタルカ如キ。宜ク患者ノ腹上  
ニ據按シ。其血ヲシテ血脉管中ヨリ心藏ニ流シ  
入ラシメ。患者ノ頭腦ヲシテ體軀ヨリ高カラシ

ムルコト無ルヘシ。  
右第百十六章蘊對布ノ脱血ニ因ルノ証治  
論ス。  
若シ夫レ血ニ自己ノ力ヲ以テ孤行スルノ運動  
アル者ナル時ハ。則チ此証ニ臨テモ。亦其自ラ腦  
中ニ資給スルノ多キ。以テ精氣ノ灌注ヲシテ強  
甚ナラシムルコト。固ヨリ知り易シトス。然トモ  
血ノ質タル。行止已ニ由ル者ニ非ス。一ニ只他ニ  
任スル者ナリ。第百二十二章併セ考フヘシ。是ヲ以テ偶爾ク鼓  
動激躍セラル。ニ由リ。使メラル。所アレハ。則  
チ時有テ精氣ヲ資スル分外ニ越テ。大過已甚ノ

衝逆ヲ為シ。以テ蘊對布ヲ發スルニ至ルナリ。○  
其蘊對布ノ發スルニ當テ。諸ノ分別ヲ辨スルニ  
及ハス。只是レ其多血ノ人ニシテ。假令ハ平常諸  
ノ出血スルコト有ルカ。俄ニ之ヲ障礙停住スル  
所アルニ於ルカ如キニ値ハ。則チ宜ク先ツ刺  
絡シテ瀉血シ。患者ヲシテ頭ヲ置クコト高カラ  
シムヘシ。而シテ諸ノ其腹ヲ固抱緊禁スル者ヲ  
解緩シテ之ヲ除クヘシ。餘ハ之ヲ處治スルコト。  
第百二章ニ載ル頭眩冒ノ義ニ從テ。講明シテ  
施術スヘキナリ。○  
右第百十七章。蘊對布ノ多血ニ因ルノ証治

ヲ論ス。  
吾人生活セル身體ニハ。自然ノ良智常道アリ。凡  
ソ之ニ侵刺襲入スル者アルニ値トキハ。其處必  
ス元運ヲ發動増益シテ以テ之ニ膺當ス。只其侵  
刺襲入スル所ハ一ナリト雖モ。身體ノ中コレヲ  
受ル部分ニ於テ。強弱堪不堪ノ差異アルコトヲ  
致ス。假令ハ人ノ心思意想ノ諸運動ノ如キ。尤モ  
其差異ナル者ナリ。所謂ノ類ノ外喜怒憂思驚恐ナル  
入スル替ト。他ノ外侵ノ因ヨリハ。尤モ感動シ易  
トモ猶得サルコト養生論ニ。茶ヲ服シテハ。萌  
トモハ。然トシテ背ヲ沾ス。人偶寐サルトキハ。  
ト然トシテ。寐ズト云ノ類。亦是ノ物ナリ。○  
吾輩

其中ニ就テ又細ニ之ヲ求ルニ。淺輕ノ因ト雖モ。其感動スルコト甚夕敏速ニシテ且ツ大ナルニ至ルコト。迴ニ別ナルノ一件アルコトヲ見ル。即是レ強壯ノ人ト虛弱ノ者トナリ。虛弱ノ人ニ於テハ。其因甚夕鮮少ナリト雖モ。其感動スルコト。強壯ノ人ヨリハ敏速ニシテ且ツ大ナルニ至ルモノナリ。○其心思ヲ勞動スルノ因。常ニ多クハ長ク續テ失意凶禍等アル。驚怖スル所アル。諸液ノ大ニ脱漏スルニ値フコトアル。長病ニ嬰リタル等ヨリシテ。皆右ノ病因ヲ資ルモノナリト知ヘシ。○甚夕鮮少ノ因ニ始リ。其患終ニ過大ナル

ニ至ルノ最モ彰著ナルハ。其感觸ノ易キ。即チ婦女ノ常態。婦女ノ常態ト云ヘル者。其中蓋シ幾多論ナシ。欲念妄動。情思遂ケスニ任。衝ヲ發動シ。意思ヲ攪擾スル等。是レ專ラ其常態ノ中ニ在ル。○天資ノ固有二。稟性ノ脆弱ナル。其腹中ノ諸藏ニ於テ。繁亂擾雜シテ次序ナキノ運動ヲ為スナリ。夫ヨリ漸々ニ増益シテ。分明ニ是レ上ニ向テ冲升スルコトヲ現シ。終ニ頸ニ至ルトキハ。乃チ飲食ヲ送下吞嚥スルコトヲ妨碍シ。或ハ又呼吸ヲ障遏スルニ至ル。是ヲ名テ子藏衝逆ノ証ト云。所謂ル母兒思百爾是ナリ。第五十二章ノ○此証增長滋甚ナルニ至テハ。遂ニ四末ノ神經



ニ浸及シ。終ニ其人ヲシテ人事ヲ省セサルニ至  
ラシムル時ハ。是ヲ名テ發兒連堙病ト云。堙發ハ連  
ハ連。○若シ少女子  
等ニ於テ。此病ノ一種。四支ニ於テ甚夕驚異スベ  
キ奇状ノ舞蹈ヲ發スルノ証ヲ得ルコト有ルニ  
至テハ。是ヲ名テ舞蹈病ト云ナリ。醫學室函ニ曰ク。舞蹈病ハ。妄  
ニ舞蹈シテ休マズ。手足身體ヲ運動スルコト甚  
タ驚異スヘキノ奇態ヲ為ス。羅敏ニ動スルコト甚  
斯ト稱ス。○右等ノ諸証ニ於ルカ如ク。自餘尚証ヲ  
逐テ人コレニ許多ノ諸名ヲ布演スルコトコト為  
スト雖モ。予ハ則チ之ヲ濫名ニ屬シテ用ナシト  
ス。其諸証皆是レ起原ヲ殊ニセサルガ故ニ同シ

法方ヲ以テ治スベキガ為ナリ。○又爰ニ明ニ知  
ル人身神經多シテ感觸シ易キノ部ノこハ。其神  
經液ト雖モ亦寢シテ酷厲ヲ為シ稀涼ヲ為スコ  
ト敏疾ニシテ。上ノ第二十六章ニ記スル所ノ自  
寢ノ壞液病ヲ將出シ來ルコトヲ。○夫然リ。故ニ  
其人鮮少ナル因ノ。外ヨリスルノ感觸シ易キカ  
致ス所ナルノこニアラス。内ヨリモ亦自ラ其酷  
厲液ノ刺戟侵襲スルニ因テ。蘇對布ス対布的列金偏ノ  
疾ヲ發スルコトアルナリ。○是ヲ以テ藥ヲ用テ唯  
其外証ノ蘇對布ス対布ヲノこ治セント要ス可ラス。亦  
其内原ノ稀涼ナル酷厲液ヲ連テ攻治スルヲ以

テ緊要トスヘキナリ。○若シ唯其標証ヲ治セン  
 ト要セハ。條ノ帶或ハ何ニテモ右様ノ物ヲ取テ。  
 胃腹ノ間ヲ緊々地ニ緊縛シテ。走竄飛越ノ揮發  
 鹽。名義上ノ第<sup>シフカリ</sup>八<sup>十</sup>。或ハ羅思馬理奴謨精。若クハ  
 藿香精。若クハ琥珀油。又ハ乾白揮發鹽ヲ以テ鼻  
 中ニ納ルヘシ。乾白揮發鹽ノ製法。第八十七章ニ  
 載ス。○若シ患者其心思知覺ヲ失フ程ニ至ラズ。  
 自後續テ長ク差ヘズ。又ハ屢コレヲ發スルニ至  
 テハ。須ク次ニ列スル所ノ方ヲ用ヘシ。  
 方  
 藿香水 四十八錢

羅思馬理奴謨精 二錢  
 琥珀 三分錢之二  
 撒尔忽刺室烈阿勒温須謨 二十五滴  
製法遠西名物考ニ出ス。諸酸敗液ヲ攻  
 治スル甚捷利ニ出ス。粘液痰飲ヲ消解  
 通スル鬱閉ヲ開發疏テ。  
 字達扭謨律規需謨 十五滴  
製法第五章ニ出ワ。  
 白罌粟舍利別 四錢  
製法第五章ニ出ワ。  
 右件藥合シテ調勻シ。小半時毎ニ一匙ヲ服ス  
 ルコト。其証ノ差ルニ至ル。其差後ト雖モ。尚コ  
 レヲ半時若クハ一時毎ニ一匙ヲ服スルコト。  
 一兩日ノ間ハ爾スベキナリ。

若し其疾意ノ如ク治セハ。即チ宜ク其脅腹ヲ索縛シタル帶ヲ解クコト。須ク徐々トシテ稍々ニ之ヲ緩鬆シ。以テ除クニ至ルヘシ。何トナレハ。其強ク緊繫シテ諸藏ノ運営ヲ逼住シ。且ツ以テ惡証ノ從テ来ントスルヲ遏止シタルカ故ニ。若シ急ニ遽テ、之ヲ弛ルトキハ。諸証勢ニ乘シテ復發スルカ故ナリ。是事予カ幾回トナク現ニ目撃シタル所ナリ。○尋テ然シテ第二十六章寒壞液ノ篇ニ記載スル所ノ方ヲ用シムベキナリ。○此病ニ於テ其尤顯赫ナル殊切ノ劑アリ。之ヲ左ニ示ス。

方

乳香 各一錢  
 琥珀 各一錢  
 拔尔撒謨 各一錢  
 香櫟皮油 六滴  
 牢達扭謨 阿芙蓉 默謨 六十分錢之三  
 孛露非亞尼皮 適宜  
 右件菜合和シテ。每一錢二十九ト為シ。日ニ數回ニ丸ヲ服ス。  
 右第百十八章。蘓對布ノ感動ニ易キ多神經ノ部ヨリ發スルノ証治ヲ論ス

内科要

卷之八

七

小児ノ蕪對布ニ於テハ。テハ摺ノ蕪對布ハ。小ニテ  
ハ痲瘋驚風之ヲ治スルコト。大率皆大人ノ諸証  
ト大ニ殊異ナリトシ。是ニ因テ其從事スルノ諸  
法方ニ至ルマデ。秘スル所アリテ容易ニ之ヲ宣  
說セズ。然ト雖モ予ハ則チ茲ニ其次第ヲ歷說シ  
テ之ヲ示ントス。○初生ノ小児未夕其胎尿ヲ利  
下セサルニ先夕ツテ。コノ証ヲ發スル者ナリ。須  
ク知ヘシ是レ其聚蓄セル所。體中ニ停止スルニ  
因テ。衰シテ酷厲ヲ為シ。其兒ノ為ニ疼痛ヲ催シ。  
其小児ノ體最モ柔脆ニシテ感動シ易キ力為ニ。  
終ニ微ナル蕪對布ヲ發スルナリ。即チ驚搐厄ル

堉兒國和蘭七州ニ之ヲ漢成健ト謂ヒ其他ニ之  
ヲの迷念子ナリ。謂フ。痲瘋即チ加部ノ醫師新論  
的見迷念ノ証ヲ載ス。痲疾利斯○此証ニ臨テハ。次  
國モ亦和蘭七州ノ一ナリ。利斯○此証ニ臨テハ。次  
出ス所ノ藥ヲ用テ之ヲ利スヘシ。  
方

- 大黃サレボケ 各五分
  - 撒兒剎ボケレ 各五分
  - 薄荷水 二十四錢
  - 滿那ミナ 二錢
- 右件藥合和シ。菜氣ヲシテ融化セシメ。漉過シ  
テ滓ヲ去リ。半時若クハ一時半毎ニ。芭布ヲ抄

又ルニ用ル所ノ小匙ヲ以テ一匙ヲ與ヘ服セ  
シメ。麩布ハ彼土通ニ用テ以テ小兒ヲ養フ所  
ル。匙ノ小匙大抵常用者ナリ。之ヲ含哺スルニ用  
ル。匙ノ容量已ニ第十三章ノ四分ノ一ヲ容多ク  
其下利ヲ得ルニ至ラシムヘシ。尋テ尚能ク日  
ニ一兩度右ノ程ツ、之ヲ用テ通利セシメ。胎  
尿尽ルヲ以テ度トスヘシ。而シテ其証自ラ愈  
ユ  
右ノ証多クハ其初生ヨリ即チ之ヲ乳母ニ授テ  
其ヲシテ養ハシメ。其生母自ラ之ニ乳セサルノ  
小兒ニ於テ之ヲ得ルモノナリ。此其初生ニ於テ  
其胎尿ヲ滌除セシメンカ為ニ造化玄微自然ノ

妙ニテ正ニ新婉ノ際ニ當テ。茲ニ賦予シアル所  
ノ常ニ殊異ナル性用ヲ具セル生母ノ初乳。所謂  
皮私篤ナル者ヲ常理ニ背テ之ヲ與ヘサル故  
ニ。胎尿停住シテ。右ノ患ヲ發スルノ與ヘ  
新論。小兒初生門ニ曰ク。人或ハ産後始テ出ル  
乳汁。其性常ニ異ナリ。以テ兒ニ飲レム可ク  
ラズ。他人ヲ常ニシテ之ニ乳セシムベシト謂フ。  
爰ニ賦與スルハコト。所ニ是レモ造ル者ノ機巧  
何トナシ。ハ婉後ノ新乳。甚々功ナル以テ。物  
疏滌スルハ性ヲ清滌ス。是レ其初生ノ胎尿ヲ  
為ル故ニ。其體ヲ清滌ス。是レ其初生ノ胎尿ヲ  
スル。復コトヲ主テ爾リ。自然ニ微ト。○其歲月ヲ  
夕ル小兒ノ如キハ。是ノ証ノ發スルコト。常ニ多  
ク。腸胃中ノ酷厲ナル酸敗液。所謂収兒ナル者ヨ

内科要  
卷之八

リシテ起ルナリ。此小兒ニ於テハ夫ノ乳糜第七章  
ニ詳ク製造スルノ諸器甚々微弱ナルニ因テ十  
リ。何トナレハ或ハ蒸餅ヲ喫シ或ハ乳汁ヲ飲テ  
其製造ノ器微弱ナル故ニ傳化セズシテ一所ノ  
温暖ナル中ニ鬱滯スルヲ以テ自ラ變壞シテ酸  
敗液ニ至ルトシルヘシ。○茲ニ今小兒ノ蘇對布  
即チ驚ヲ治スルノ能ク適中切當ナルノ方菜ヲ  
露シ示サントス。此蘇對布其秘スル所ノ者夕リ曰  
夕未兒叔尼斯散和蘭局方ニ出テ癩癩驚瘦搖擲  
主考ニ其方遠西名曰ク格密鉄洎更篤散亦和蘭  
物考ニ其方遠西名曰ク格密鉄洎更篤散亦和蘭  
出ヲ其主用達シ痲諸驚ヲ療シ膿液惡瘰ヲ強  
蒸發氣ヲ主用達シ痲諸驚ヲ療シ膿液惡瘰ヲ強

アシ酸敗液ヲ政伏スル等ノ功曰ク珍珠及ヒ東方  
酢答ア小兒諸驚並ニ大人諸痲ヲ治スル効是ナ  
リ。○然ト雖モ多ク秘スル所ノ方菜ヲ授受スル  
ニモ及ハズ。蝟蝟石一品ニテ足レリトス。何トナ  
レバ。是ノ物特ニ其酸敗液所謂収兒ナル者ヲ攻  
治制伏シテ其液ヲシテ消蝕セラレテ復夕驚搖  
ヲ發スルニカナカラシムルニ至ルカ故ナリ。○  
是証ニ臨テ施シテ最モ宜ク且其功單ニシテ專  
ラ厚キハ便是レ後方ヲ然リトス。

蝟蝟石

蝟蝟石  
蝟蝟石

鹿角霜

各一錢

琥珀

酒石

五分

橙皮油

三滴

右件茶合シテ散劑ト為シ。克禿ト銅泉トノ名。形圓

徑七分。許ニ鈔シテ落ザルヲ取テ。少シノ琵琶布前注

タリ見ヲ以テコレヲ和シ與ヘ服セシムルコト。

日ニ數回。

其小兒若シ良長シテ始テ齒ヲ生スルノ時ニ至

テハ。適チ齒ヲ生スルノ疼痛スルガ為ニ屢擗擗

ヲ發スルモノナリ。其時節ニ於テハ。小兒其齒ノ

故ト。其腸胃中ナル酸敗液ノ故トニ因テ。常トシ

テ一齊ニコレヲ發スル者ナリ。○是ノ証ニ臨テ

其能ク使用スヘキノ茶ハ。即チ前ニ出ス所ノ散

劑ナリ。之ヲ用ヘシ。而其方中ニ牢達ト扭謨ト阿芙蓉ト

點謨トニ滴ヲ加ヘ調スヘシ。阿芙蓉トヲ用テ製ス。睡

ヲ和シ。吐血トヲ治シ。血痢トヲ止メ。崩漏トヲ治シ。血痔ト

ヲ療スル等ノ功アリ。鑿ト字ト宝函トニ出ツ。遠西名物

ヲ考ニ載ス。○若シ之ヲ加ヘハ。須ク意ヲ用テ仔細

ニ調勻スヘシ。是其小兒一頓ニ多ク之ヲ服スル

一能ハズシテ。稍クニ之ヲ與ルカ為ニ。偏ニ和セ

サル所アルトキハ。適ニ其加味ヲ服セザルト一

般ナルコト有ニテ恐テナリ。

内科抄要

卷之八

十四

右第百十九章蕪對布ノ小兒ニ發スルノ証  
治ヲ論ス。

頭痛篇第十九

夫鑿家者流。科ノ内外ヲ問ハズ。未夕嘗テ諸病ノ  
名稱ヲ識スハ。アラズ。是ノ故ニ。若シ為ニ療術ヲ  
記載スル者ヲシテ。徒ニ名ニ就テ之カ方ヲ處シ。  
甲ニハ宜ク某ノ方ヲ用ヘシ。乙ハ則某ノ劑ヲ用  
テ之ヲ主ルト曰テ。而シテ斯ニ從事スル者。據テ  
以テ其肯綮ニ中テ其治效ヲ奏スルヲ得ヘカ  
ラシメバ。則チ論豈ニ容易ナラサランヤ。是ノ頭  
痛ノ一門ノ如キ。其証ト名ト。殊ニ知リ易シトス。  
何トナレハ。患者自ラ其疾ム所ノ状ヲ説クヲ聞  
テ。即其頭痛ニ係ルヲ知リ。其痛生平常トシテ



之ヲ得タルヲナク。今ニシテ新ニ發シタリト曰  
 カ若キハ。則是レ所謂設撥刺魯細亞。若シ然ラス  
 シテ久ク之ヲ患ヒ。或ハ時々發作スト曰フハ。則  
 是レ所謂設撥刺亞。雲林ノ所謂者。又其痛一方ニ偏  
 ナルヲ訴ルハ。所謂歇迷葛刺泥亞。漢醫ノ所謂  
 或ハ只一箇ノ處ニ於テ之ヲ患ヒ。其痛廣カラサ  
 ルヲ状スルハ。則是レ所謂葛刺吸私。翻シテ丁  
 其痛ノ在ル所大ナラス。タリト云フヲ知ル  
 丁子ノ刺痛ヲ為カ如キヲ云。夕リト云フヲ知ル  
 ニ是レハナリ。諸般ノ名稱ヲ分別スルモ。固ヨ  
 リ名ニ據テ方ヲ處ス可ラサレ。一モ治術ニ於  
 テ益アルヲナシ。然ラハ則何如カ從事シテ可ナ

ルトナレハ。只是其附來ル所ノ徵候ニ因テ。其病  
 原ヲ明辨シテ。然後以テ其治術ヲ處置スヘキナ  
 リ。

右第百二十章。頭痛ノ大較ヲ論ス。

吾人ノ身體。元來始成シタル所ノ常然ノ性。其精  
 氣ノ循行流榮。所謂神經ノ中ヲ通テ。惣シテノ知  
 覺ヲ主ルノ諸器ニ向ヒ行クナリ。若シ之ヲ抑塞  
 スルヲ有トキハ。其處則痛ムヲ為ス。此即有生  
 ノ始ヨリシテ。然ク構造スル所ニシテ。造物者ノ  
 天工ナリ。○是故ニ。凡百ノ感觸寒熱痛痒等ヲ知  
 ルヲ主ルノ神經ヲ。或ハ押壓スルヲアリ。或ハ

百二十一

強引カ伸スルヲ為シ。又ハ強暴非理ニ運動スル等ノ事。皆是諸痛ノ原由トスル所ナリ。○其諸痛ノ發スル所。千百ヲ以テ算ヘシ。是ヲ以テ能ク其因ヲ蹤跡シテ斯ニ從事スルニ非ルヨリハ。何ヲ以テカ其治ヲ望ンヤ。○予其幾多ノ中ヨリ。其最モ彰較ナル。常トシテ是ノ頭痛ヲ催スノ條件ヲ撰出シテ。茲ニ之ヲ示サントス。

右第百二十一章。頭痛ノ病因ヲ論ス。

凡ソ血液ハ。自己ノカニテ循行スルノ性アル者ニ非ス。其一身百體ヲ循行スルヲ為スハ。尽ク是レ動脈ノ所為ニ因テ。前行セザルトヲ得ズシテ前行スルナリ。人須ク是ニ由テ以テ領解スベシ。其血ニ諸痛ヲ為スノ所以ナケレハ。假令頭痛スルト有テ。是レ其騷擾シテ頭ニ衝突逆注スルノ致ス所ナルヘシト曰フト雖モ。定テ其因ヲ血ニ於テ求ルノ義ナキヲ。○右ノ如ク血ノ運動大ニ騷擾シテ頭ニ向フモ。唯血ノニ頭ニ衝激湊逆スルニ於テハ。常ニ頭痛スルトハ無モノナリ。此其多ク熱スルトヲ為シ。及ヒ動搖スルノ事。枝ヲ為スノ人ニ於テハ。必ス大ニ血ノ騷擾シテ頭ニ衝逆スルハ常ナリト雖モ。未夕曾テ頭痛ヲ患ルト有テ無カ故ニ之ヲ知ルノニ。○只是レ熱毒

内科摘要  
卷之八  
百二十一  
十八

多ク頭ニ送ルヲ為シ。或ハ頭ニ滯住スルニ至  
テハ。則其熱ノ發作スルニ當テ頭痛ヲ得ルモノ  
ナリ。且ツ誘ヒテ頭部鼓動シ。顛顛モ亦跳躍シ。耳  
ニ蟬鳴ヲ聞キ。面目赤色ニシテ脹起シ。患人自頻  
ニ小蛇ノ如キ赤條。及ヒ火光ノ飛逆シテ眼中ヨ  
リ閃發スルヲ見ルヲアリ。夜中寐ルヲ能ハス。又  
ハ微ク爵冒シテ醒了ナラサル等ノ諸証ヲ發ス  
ル者ナリ。熱毒ノ事第四章ニ説ケリ。○右ノ頭痛  
ニ至テハ。第百十一章ニ出セル謔妄發狂及ヒ發  
癩。若クハ第百十六章ニ載ル昏睡病ノ。前茅嚙矢  
ナリト知ヘシ。○然レ若シ復ニ鼻血ニテモ發ス

ルヲ有トキハ。則其痛甘キ。復右ニ列挙スル所ノ  
惡候ノ隨テ来ントスルヲ恐ル。ノ虞良鮮シ  
ト知ヘシ。○是ヲ以テ是ノ如キノ頭痛ニ逢ハ  
宜ク數刺絡シテ瀉血シ。第十二章ニ出ス所ノ清  
涼ナル下劑ヲ用ヒ。而シテ尽ク予カ精神錯乱篇  
ニ於テ説與セシカ如クスヘキナリ。第百十一章  
及ヒ第百十二章ニ見ス。

右第百二十二章。頭痛ノ血ノ衝逆ニ因ルノ  
証治ヲ論ス。

夫ノ患者頭痛ヲ告ケ。察スル所。配シテ彼ノ冒寒  
傷冷毒ノ諸徵ヲ具シ。其痛定テ一處ニ在ルヲ久

内科要  
卷之八  
百二十三

キ一能ハス。只僞尔トシテ乍發シ乍止シ。倏忽ト  
 シテ遷移スル。高ヨリシテ下ニ至リ。眼目耳鼻。  
 齒牙咽喉。及ヒ自餘ノ諸部ニ於テ其痛ヲ發スル  
 一ヲ為ニ値ハ。則其頭痛是レ其冒寒傷冷毒所  
 謂聖京健ニ因テ發スル者ナリト知ヘキナリ。漢  
ノ謂フトコ口頭風ノ証。素ト疾アル者。或ハ沐  
涼ヲ取リ。酔飽シテ仰臥シ。賊風腦ニ入リ。頂ニ八  
リ。耳ニ入リ。鼻ニ入リ。頰上。耳目口鼻。眉稜ノ  
間。一處吾體ノ如クナラサル。一アリ。或ハ耳聾シ  
或ハ目痛シ。或ハ健ノ致ス所ナリ。其通シ用ル所  
スル者。即是聖京健ノ致ス所ナリ。其通シ用ル所  
ノ治法。前ノ第四十四章ニ於テ之ヲ記ス。是証ニ  
臨テハ。宜ク其頭首ヲ清潔ニシ。其毛髮ヲ刷淨シ  
テ。コレニ灌洗スルニ次ニ記スル所ヲ以スヘシ。

方一。羅思馬理奴謨精八錢。  
 急成礪砂精一錢。  
 右件菜合シテ調勻シ。使用ス。之ヲ灌洗劑ト云。  
 隨テ廻千尚且ツ香竈菜料ヲ用テ小枕子ヲ造リ。  
 以テ其頭ニ襯スルヲ為スヘシ。小枕子ヲ造テ  
以テ。用テ患處ニ貼ス。第ニ百六  
章ニ扶胃枕子ノ方アリ。考ヘレ。又一箇ノ旃罽  
モテ造リタル小帽兒ヲ把テ。乳香蘓合香阿里按  
奴謨ノ煙ヲ以テ。是ヲ熏スルヲ為スヘシ。  
 右第百二十三章。頭痛ノ聖京健ニ因ルノ証  
 治ヲ論ス。

內科要略 卷之八 百二十四

内科摘要 卷之八

又其伊偃篤ノ酷厲液。外表四末ノ諸部ノ神經及  
ト諸膜ニ嬰ル者。常トシテ善ク逃<sup>カ</sup>不<sup>ナ</sup>過<sup>ラ</sup>腦膜ニ浸  
淫シテ。厄<sup>ダ</sup>耐<sup>ラ</sup>難<sup>ク</sup>熬<sup>ム</sup>的ノ頭痛ヲ發スルノ變ヲ生ス  
ル<sup>ト</sup>。亦甚多キモノナリ。○之ヲ察スルノ法。大抵  
定リタル第四十六章ニ列スル諸証ヲ以テ之ヲ  
候スヘシ。其較著ナル者ハ。其外表四末ノ痛消散  
スルヲ承テ。即チ頭痛之ニ代テ發スル<sup>ト</sup>ヲ為ス  
者。是其徵ナリ。○是証ニ臨テ。之ヲ治セ<sup>ニ</sup>。一ヲ要  
セハ。宜ク第四十九章ニ出ス所ノ。伊偃篤ノ諸茶  
ヲ用テ。然メ且ツ宜ニ隨テ其液ヲ頭ヨリ外表四  
末ヘ送り發スル<sup>ト</sup>ヲ務ムヘシ。即チ斑蝥ヲ貼ス

ルノ方ニ因テ之ヲ施スヘシ。第八十七章ニ出ル  
且ツ予箇ノ呼毒法ノ是人証ニ臨テ甚必用夕  
ル<sup>ト</sup>ヲ識得ス。是ヲ一兩處ニ施シテ。以テ膿ヲ成  
サシムルヲ妙トス。呼毒法其法多端ナリ。要スル  
聚<sup>リ</sup>至<sup>ラ</sup>シ。銀<sup>ム</sup>鍼<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>法<sup>ナ</sup>瘡<sup>ヲ</sup>口<sup>ヲ</sup>作<sup>リ</sup>。茶<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>填<sup>ル</sup>。  
項<sup>ニ</sup>於<sup>テ</sup>シ。銀<sup>ム</sup>鍼<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>法<sup>ナ</sup>瘡<sup>ヲ</sup>口<sup>ヲ</sup>作<sup>リ</sup>。茶<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>填<sup>ル</sup>。  
シ<sup>テ</sup>膿<sup>ヲ</sup>得<sup>ル</sup>。又<sup>ニ</sup>燒<sup>メ</sup>至<sup>ル</sup>。是<sup>レ</sup>其<sup>ノ</sup>一<sup>ノ</sup>端<sup>ナ</sup>リ。特ニ茶紅  
溼<sup>ク</sup>用<sup>テ</sup>ル<sup>ヲ</sup>ア<sup>リ</sup>。又<sup>ニ</sup>燒<sup>メ</sup>至<sup>ル</sup>。是<sup>レ</sup>其<sup>ノ</sup>一<sup>ノ</sup>端<sup>ナ</sup>リ。特ニ茶紅  
考<sup>ニ</sup>詳<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>遠<sup>ク</sup>譯<sup>ス</sup>載<sup>ス</sup>。用ルアリ。原名コレヲ茶紅  
右第百二十四章。頭痛ノ伊偃篤トニ因ルノ証  
治ヲ論ス。  
爰ニ常ニ數コレアラサル所ニシテ。異トスヘキ  
一証アリ。即チ頭中ノ空隙ニ滯著底止スル所ノ

内科摘要 卷之八 百二十五

液其鬱停スルニ因テ壞変シ以テ痛ヲ發スル是ナリ。是其腦膜ト空隙トノ間其諸部ヲ浸潤スヘキカ為ノ液管外ニ透漏スルコト多キカ故ナリ。○若シ其液聚滯爵積スルニ至レハ頑惡ノ痛ヲ發シテ頭重ヲ覺ルヲ為スナリ。若其滯著底止スルニ因テ變シテ酷厲ト為ルトキハ則チ曠日弥久ニシテ休止スルヲナキノ痛ヲ發ス治シ難シトス。○右ノ諸証ニ宜キハ其停液ヲ泄除スルニ鼻ヨリスルヲ為スヲ得ベシ。又下利ニ道シテ忒ルヲ得ベシ。迺チ次ニ列スル所ノ誘嚏茶ヲ用ヘシ。

方

茉莉玉刺那

薄荷

藿香

霸王鞭

各一錢

六分錢之一

右件茶合シテ散劑ト為シ。少許ヲ取テ鼻中ニ嗅引シ。以テ發嚏スルニ至ルコト。日ニ數回。

瀉利丸ノ方

安謨泥亞吉脂

一錢

世ニ盧會ヲ代用スル者アリ

蘓合香

五分

私甘謨扭母

三分錢之一

沒食子ヲ代用スベシ

羅思馬理奴謨油 五滴

酒石鹽 六分錢之一

右件茶合シテ每一錢二十九子ト為シ。朝夕兩度ニ各六丸ヲ服ス。其下利ヲ視テ以テ其服度ヲ増減ス。日ニ下利スルコト三次ナルヲ以テ妙トス。

右第百二十五章。頭痛ノ頭中ノ爵液ニ因ルノ証治ヲ論ス。

夫レ胃ト頭ト。上下遠ク相隔處ストイヘドモ。其事甚相通シテ近一ナル者ナリ。其頭ノ諸疾何ニテモ常ニ善ク胃ニ浸淫スルヲ為ス。若シ上頭

痛ヲ患ルノ人ハ。例シテ下必ス食ヲ欲スルヲ失フノ証有テ。是ニ配スル者ナリ。又其反對エテ。下胃中ニ惡液等ヲ將來ルトキハ。則チ大抵上必ス頭痛ヲ偕ニスルヲ為スナリ。○是ヲ以テ頭痛ノ証ニ値フ毎ニ。是レ其胃中ノ爵積ヨリ致ス所ニ非ルヲ無ヤト云フヲ探察スルヲ緊要トスルナリ。何トナレハ。若シ右ノ胃中ノ因ナルニ。是ヲ思察セシテ。徒ニ諸般ノ頭痛ヲノミ治セシトスルノ茶ヲ用ルトキハ。皆勞シテ効用アルト無カ故ナリ。○若シ患人從來前ニ飲食ヲ思ハス。飲食スル所消化セス。酸臭液ヲ吐シナドスルノ

証有テ。尋テ而シテ頭痛ニ陷ル。アヲハ。則宜ク  
先ツ第一ニ其胃ヲ淨刷スルニ第十五章ニ出セ  
ル吐劑ヲ以テシ。從テ而シテ第二十章ニ載ル健  
胃劑ヲ用テ。以テ其胃ノ官能ヲシテ。再ヒ故ニ復  
セシムル。一ヲ為スベキナリ。○其間須ク方總ニ  
昏載シタル所ノ丸子ニ由テ。大便ノ通利ヲ開達  
スベシ。妙トス。○是証ニ臨テ。大抵ハ頭痛ヲ治ス  
ルノ茶ヲ用ヒズト雖モ。見ヨ其頭痛自ラ差ル。一  
ヲ。是其頭痛ヲ為スノ因除クカ為ナリト知ヘシ。  
右第百二十六章。頭痛ノ胃中ノ惡液ヨリ發  
スルノ証治ヲ論ス。

病屬頸項

喉風篇第二十

從來ラテ羅ラ旬ンノ安ア及キ那ナヲ譚スルニ。多クハ咽喉ノ翁ウ鴛ウ私シ鴛ウ金キン屈グヲ以テ是ニ充ツ。然ル咽喉ノ翁ウ鴛ウ私シ鴛ウ金キン屈グハ。是レ安ア及キ那ナノ中ノ一種ニシテ。其因翁ウ鴛ウ私シ鴛ウ金キン屈グニ係ル。未タ以テ全ク安ア及キ那ナヲ尽スニ足ラス。而シテ喉風ノ名タル。源源名名。應應。是レ腫腫特特兒兒蘭蘭陀陀蘭蘭ヲ和和謂謂ノ人ノ通稱スル所ニシテ。其指シ言フ所ノ証候。即チ能ク鑿家者流ニ用ル所ノ安ア及キ那ナニ合ス。因テ今其名義稱呼ノ馴正ニシテ相聽ニ一ヲ要

喉風篇第二十

卷之八 百廿七

百廿七



レテ。改テ喉風ヲ以テ安<sup>ヲ</sup>及<sup>ナ</sup>那ニ充テ。以テ篇ニ題  
 スルノニ。其証候如何トナレハ。大凡其病ニ嬰兒  
 トキハ。呼吸ヲ妨害スル<sup>ト</sup>有リ。或ハ飲食ヲ障碍  
 スル<sup>ト</sup>有リ。又ハ呼吸飲食ナラヒニ之カ災ヲ共  
 ニスル<sup>ト</sup>有テ。其原アルヒハ喉頭ニ在リ。或ハ咽  
 門ニ在ルニ起リ。又ハ二ノ者一齊ニ病ニ係ルニ  
 因ル。此ヲ喉風ト云ナリ。

右第百二十七章。喉風ノ大較ヲ論ス。  
 夫レ呼吸ヲ通シ飲食ヲ下ス。彰較緊要ナル兩箇  
 ノ管為<sup>テ</sup>妨害障碍スル<sup>ト</sup>。其由來スル所ノ原甚  
 多端ナリ。况ヤ自餘諸處ニ在テ。病ノ發スル所ヲ

一ニセズ。共ニ同ク是ノ患ヲ為スニ於テヲヤ宜  
 ナル哉。學識淺陋ニシテ術業習煉ナラザルノ輩  
 ニ於テハ。其病ヲ的認明辨スル<sup>ト</sup>能ハス。其証候  
 如何カ發シ。救療如何カ處置スト云<sup>ト</sup>ヲ知リ難  
 キニ困スル<sup>ト</sup>。固ヨリ其所ニシテ復タ怪ムニ足  
 ラサル所ナリ。○其上ナヲ証候ノ據テ以テ徵ト  
 スヘキ者ニシテ。疑似蒙昧未タ明哲ナラス。以テ  
 給錯ヲ致スニ足ル者アリ存ス。其呼吸ヲ妨害ス  
 ルヲ徵セント欲スルトキハ。則チ肺ノ病ニ因テ  
 亦能ク呼吸ヲ妨害スル<sup>ト</sup>アリ。是ヲハ喉風ニ屬  
 セズ。徵以テ徵トスルニ足ラサルニ非スヤ。抑亦

飲食ヲ障碍スルニ據シカ。則チ胃系ノ病アル共  
 ニ同ク飲食ヲ障碍スレ瓦。亦算シ得テ此門ニ収メ  
 サレバ其証ノ辨シ難キ。以テ知ルヘシ。○其喉頭  
 ナラビニ咽喉中ニ病アルモ。呼吸飲食ヲ妨害障  
 碍スルヲ無ク只是レ生平ノ如ク十分安快ニ呼  
 吸飲食スルヲ能ハザルノミノ患ナルトキハ。亦  
 之ヲ喉風ニ係サルナリ。○假令ハ鼻中息肉ヲ生  
 シ。浸長シテ咽門ニ垂掛スルニ及フ者原名剥利  
醫學寶函魚骨鯁及ヒ自餘何ニテモ咽中ニ梗塞  
ニ詳ナリ。スル者。喉頭ニ係ル所ノ筋痲スルニ因テ。暴啞シ  
 テ聲音ヲ作スヲ能ハサル者。葛郎布カランブ的列レック金屈キンクニ

テ。頸部ニ絡フノ筋拘攣掣急シテ。分明ニ是レ夫  
 ニ因テ咽喉閉塞シ來ルヲ。子藏衝逆ノ証第五章。並  
ニ第百十八ニ於ルカ如キ者。食道胃系ノ諸筋痲  
章ニ見タリ。シテ飲食スルヲ能ハサル者。○右ニ列スル所。及  
 ヒ自餘是類ノ病ニテ呼吸飲食ヲ妨害障碍スト  
 雖モ。輒必ス之ニ蒙ラシムルニ喉風ノ名ヲ以テ  
 スルヲ為ザルナリ。○加シカニナラス之撰述家又其中ニ就  
 テ。曲ニ許多ノ區別ヲ為スニ。其目立タル腫脹ノ  
 有無ト。其咽喉ニ於テ腫脹ヲ發スルヲ。内ニ於テ  
 スルカ。將夕外ニ於テスルカ。唯其食道ニノミ在  
 ヤ。又ハ特ニ喉頭ニ在ヤ。抑亦二ノ者俱ニ病ムヤ

ト云フ以テス。蓋シ其術ニ於テ從事シ難キニ窘  
スルニ因テ。許多ノ名目ヲ工夫シ出シタル者ノ  
吸ガ滯ル。其因滯ル。翁私ノ金工家言ニ曰ク。咽  
。其充ト。粘稠ノ液閉塞スニ頭ノ筋ヲ起リ。咽  
。爾ノ充ト。粘稠ノ液閉塞スニ頭ノ筋ヲ起リ。咽  
。テ休マズ。且ツ呼吸ヲ妨害シ。其患氣飲ヲ誘  
。内深ノ筋處ノ筋。是カ結ビ難ク。患氣飲ヲ誘  
。其ノ筋處ノ筋。是カ結ビ難ク。患氣飲ヲ誘  
。撥刺ノ色ニ熱難ク。患氣飲ヲ誘  
。謂テ共熱難ク。患氣飲ヲ誘  
。内外ノ筋。是カ結ビ難ク。患氣飲ヲ誘  
。中ノ筋。是カ結ビ難ク。患氣飲ヲ誘  
。覺ル。患氣飲ヲ誘  
。厲難ク。患氣飲ヲ誘

塞ス。且ル汗出ヲ閉。○今其定テ徴トスベキ者ヲ言  
。喉風ノ諸類。皆外表ニ觀ヘキ腫脹ノ証候ナキ  
。ハ其腫脹ノ外ニ存ル者ニ比スルニ。更ニ蹇難ナ  
。リ。一乘ハ其外ニ發セサルガ故ニ。必ス内ニ腫ル  
。ヲ知ル。是ヲ以テ其レ危シトス。二來ハ其視察  
。診候スベカラサルガ故ニ。其証狀原由ヲ知ルニ  
。縁ナク。以テ其對証ノ法方ヲ處置スルヲ能ハズ。  
。是カ為ニ難キナリ。  
。右第百二十八章。喉風ノ令別ヲ論ス。  
。喉風ノ熱毒ヨリシテ發スルノ証ニ。二種ノ同シ  
。カラサル。一有ナリ。知ズハアルベカラス。○其一

ハ。呼吸並ニ飲食ヲ妨害シ。且ツ痛ムトヲ為ス。其  
之ニ嬰兒多クハ初夏ノ頃ニ於テ暴卒ニ之ヲ得  
ルモノナリ。其初証惡寒振慄スルヲ。他ノ熱病ニ  
於ルカ如シ。夫ヨリ喉風ノ証忽チ之ニ續テ發ス  
即チ咽喉或ハ頸外腫脹ス。又ハ腫脹スルヲ無  
アリ。此其熱毒ノ多ク咽喉頸部ノ諸管ニ鬱結滯  
住スルカ致ス所ナルヲ知ヘシ。○此ノ一種乃  
是ヲ名テ真人喉風ト呼フナリ。○右ノ一種ハ熱  
病ノ類ナルニ因テ。初ニ於テハ其部ニ腫脹スル  
ト少シト雖モ。漸々ニ增益スルヲ有力故ニ。須ク  
其究ヲ恐ルヘシ。畢竟必ス其熱ノ極ニ至ルニ先

夕ツテ。咽喉必ス窒塞シテ。呼吸飲食トモニ全然  
トシテ壅絶スル者ナリ。○是ヲ以テ宜ク先ツ第  
一ニ刺絡術ニ由テ瀉血シ。以テ熱毒ノ騷擾衝逆  
ヲ減シテ。之ヲ節ニスヘシ。若シ一次ニテ思フ儘  
ニ差スハ。則其間久ク廢置クトナク。再ヒ報刺ス  
ヘキナリ。何トナレバ荏苒トシテ少クモ濡滯ス  
ルトキハ。咽喉尋テ將ニ窒塞スルニ至ントスル  
カ故ナリ。○又宜ク之ニ續テ清涼ナル吉利詞參  
見及ヒ清涼ナル下劑ヲ用テ。其能ク物ヲ送下ス  
ベキニ及テ與ヘ行フヘシ。方ハ第十二章ニ出ツ。  
○又一箇ノ含嗽劑ヲ作テ。以テ之ヲ與ヘシ。以テ

内科要

卷之八

三十九

咽喉ヲ潤露シテ其ヲシテ乾燥セサラシムルニ  
取ル。必シモ含嗽セス。

含嗽劑ノ方

玫瑰花

接骨木花

各半盞

水 八十錢

右件火ニ上セテ煮テ。瀘過シテ滓ヲ去リ。次ノ

茶味ヲ加フ。

石硫黄精

適宜

蜜 八錢

右ノ劑ヲ作ルニ。之ヲ調和スルコト酸味ヲシ

テロニ可ナラシムヘシ。方中ノ石硫黄精。是レ

然トモ若シ石硫黄精ヲ得ルコト能ハスハ。覆

盆子汁或ハ香椽汁ヲ代用シテ可ナリ。若シニ

物モ亦偶闕ルニ値ハバ。則チ酢ヲ用テ此ニ灌

入スヘシ。

外用ニハ宜ク蒸餅原名ト母原名ト造ルニ必ス及ギト云。蒸餅

ト云。蒸餅ト考ニ詳ニスコ。若クハ酥滓原名ト葛ト而云。

乳酪ヲ名ト製シ取ニタルニ詳ニス。餘滓ト胡麻仁末トヲ以テ。

布名。注ス。上ニ出ル。造頭ヲ蒙シテ之ヲ貼スヘ

○若シ酥滓ヲ得ルヲ能ハスハ。酢及ヒ水ヲ用

ルモ亦可ナリ。○若シ患人終能ク容易ニ吞飲ス

内科要

卷之八

三十九

へキハ。為ニ大麥或ハ燕麥ノ麩碎セル者ヲ取テ。  
 水ヲ以テ之ヲ煮テ。香櫞汁及ヒ撒兒布尔涅而刺。  
 少許ヲ加テ箇ノ飲劑ヲ製シ與フヘシ。醫學室函  
 麥麩碎セル者ヲ取テ煮服シ。喉風咽熱腫スル  
 ヲ治シ。声啞シテ出ケルヲ主リ。又咳嗽ヲ療ス。熱  
 病ニ於テ殊ニ必用タリ。又舍利別ニ製見肝痛ヲ  
 治ス。ト。第二章熱壞液ニ用ル法。散兒肝痛ヲ  
 ノ。即チ是ニ。○其二ハ。是レ直ニ熱病ヨリシテ將出  
 シ來ル。此熱病ノ其毒ヲ咽喉ニ移スニ因テ忽チ  
 起ル。下ヲ能スルナリ。然レ其來ル。下甚遲シ。尤較  
 著ナルハ。熱ノ終ニ於テ發ス。是ニ由テ大抵ハ故  
 ハレサルニ至ル。此其咽喉ノ其部狹隘ニシテ。爾  
 ク膿壞セル熱毒ヲ多ク容納スルニ足レル餘地

有ル。下無ガ為ナリ。縦ヘ幸ニシテ死セサル。下  
 得ルモ。多クハ皆變シテ肺癰或ハ胃内癰ト為ル  
 者ナリ。在胃内者。東。西。病。考。ニ。詳。ニ。ス。  
 右第百二十九章喉風ノ熱毒ニ因ルノ証治  
 ヲ論ス。  
 夫レ羅斯及ヒ翁篤私爹金偃共ニ第六十一章ノ註ニ  
 詳ナノ二病ノ咽喉ニ發シ來ル。其二ノ者ニ於テ。  
 共ニ疼痛腫脹焮赤ヲ發シ。從テ而シテ發熱スル  
 コト有カ故ニ。毎々二証相ヒ混淆シテ分別ヲ為  
 シ難ク。証候ノ以テ診察シ定ムベキ者鮮キモノ  
 ナリ。○是故ニ。大抵緊シテ翁篤私爹金偃ヲ以テ

之二處言<sub>レ</sub>。其治術ヲ施スニ至テハ。則是ヲ羅斯ノ法中ニ約シテ斯ニ從事ス。此其叔欽劑ヲ用テ。能ク手ニ應シテ治スル<sub>レ</sub>。翁篤私爹金<sub>ハ</sub>方ヲ用タルヨリ宜キカ為ナリ。而ノ是ノ喉風ニ於テモ。亦復爾リ。右ノ法方ヲ用テ能其治功ヲ収ル<sub>レ</sub>ヲ得ルナリ。○羅斯モシクハ翁篤私爹金<sub>ハ</sub>頤頤ノ外面ニ發スルカ。又ハ咽喉中ト雖モ。見ヘ渡リタル諸部ニ發シタルハ。危キ<sub>ト</sub>鮮シ。若シ然ラスシテ其証候見察スヘカラザルニ至テハ危シ。○右ノ兩種ニ於テハ。是ヲ分別セズ。際シテ皆之ヲ其原熱毒ヨリ生スルノ喉風トスルナリ。○右ノ証

或ハ壞シテ膿腫ト變スル<sub>レ</sub>アリ。漢人ノ所謂喉者。是癰一名猛疽ナ其變証大抵第七日ニ及テ發スル者ナリ。爰ニ至テハ。各異ノ膿腫ヲ療スルノ法方有テ存ス。就テ之ヲ用ヘシ。予カ著ス所ノ瘍科精選ノ中ニ是ヲ記載ス。

右第百三十三章。喉風ノ羅斯及ヒ翁篤私爹金<sub>ハ</sub>屈ニ因ルノ証治ヲ論ス。

允咽喉ノ諸部ニ屬スルノ裏面ハ。其膜甚ク鬆脆嫩軟ニシテ。其質尽ク私<sub>ハ</sub>瑋<sub>ハ</sub>斯<sub>ハ</sub>ノ似ク一般ナリ。私瑋斯<sub>ハ</sub>海<sub>ハ</sub>産<sub>ハ</sub>此<sub>ハ</sub>ニ海綿ト云。形故。絮敗綿ノ如ク。針眼氣孔アリ。潮ニ隨テ海磯ニ漂栖ス。此其多ク粘津滑液ヲ茲ニ分利シ茲ニ保有<sub>レ</sub>。以テ咽喉

通利ノ道路ニ灌溉浸潤シ。常ニ竭涸セズシテ滑  
 澤順溜ナラシムルカ為ナリ。是故ニ。右ノ津液其  
 常然ヲ失フコト有トキハ。亦能ク其部ニ鬱滯シテ。  
 以テ腫脹ヲ發スルニ至ル。之ヲ寒液腫ト謂ナリ。  
 耶チ巴旦杏核原名過滿埵連。西洋醫言釋體篇ニ。過滿埵連。巴旦杏核ノ如キ之。  
 者是ナリ。埵連ト謂フト云。上腭後軟肉ノ部。食道裏  
 面ノ膜。喉頭裏面ノ膜等。鬱脹浮腫シテ。或ハ呼吸  
 通セス。或ハ水穀下ラス。又ハ呼吸飲食共ニ之ヲ  
 妨障スルモノナリ。○若シ其咽喉ニ於テ。或ハ外  
 表。或ハ裏面。腫ヲ發スルコト寒慘ニシテ黯蒼ナル  
 ヲ見。然レテ患者呼吸飲食ニ於テ大ニ蹇難不利  
 ナルコトアリテ。熱アルコト無キハ。唯其窒塞シ來ル  
 ノ危険ヲ恐ルヘキノ也。○是証ニ臨テハ。刺絡ノ  
 宜キ所ニアラス。只須ク斑蝥ヲ貼スル發疱術ヲ  
 施スヘシ。又須ク燕窩ヲ用テ琵琶布ヲ造リ。之ニ加  
 ルニ苦蕒花少許ヲ以テシ。頭ヲ嬰シテ之ヲ貼ス  
 ヘシ。又須ク患者ヲシテ乳香ヲ用テ造ル所ノ茶  
 糕子寒具ノ如ク之ヲ用フ。小兒ニ施スニ便ナリ。  
模シテ諸形ヲ定メ。或ハ茶品糖蜜ヲ和シテ煉成  
以テ収ム。其用ル所ニ從テ。其方各異ナリ。乾物考  
ニ詳シ。齧シムヘシ。以テ其ヲシテ多ク鬱壞粘穢  
ナル寒液ヲ泄サシムルカ為ナリ。

右第百三十一章。喉風ノ寒液腫ニ因ルノ証



治ヲ論ス。

假令ハ第百十三章ニ論スル葛郎布の列金僣ニ  
因テ。身體中ナル百爾ノ諸筋。其欲スル所ニ反シ  
テ爾ク強ク引急拳縮シテ。支體骨節復平常ノ如  
ク思フ。僣ニ屈伸運動スベカクザルニ至ルカ如  
ク。其病ノ胃系食道及ヒ肺管喉頭ニ係屬スル所  
ノ諸筋ニ届リ及フ。有トキハ。其開通スベキ咽  
喉中。皆為ニ纏緊セラル。カ故ニ。亦因テ閉塞ス  
ルノ患ヲ發スルナリ。○其發シ来ル。甚暴率ニ  
シテ且フ屢コレアル者ナリ。然ル其鬆解スル。一  
モ亦久カラスシテ復スルナリ。○若シ夫ノ葛郎

布の列金僣ノ頸脈ヲ壓止スルニ及テハ。其人ヲ  
シテ面尽ク青色ナラシム。是証毎ニ多シ。此其出  
テ上頭部ニ循行スル所ノ血ヲ遏止シテ。之ヲシ  
テ還リ降ル。一得サラシムルカ致ス所ナリト  
知ヘシ。○是ノ一種ノ驚異スベキハ。患者右ニ云  
如ク。暴率ニシテ咽喉閉塞シテ呼吸絶シ。從テ而  
ノ死ニ瀕スルノ状ヲ現シ。殆ト續ク屬セントス  
ルバカリニシテ。忽チ復タ蘇シテ故ニ復スルニ。  
一モ發泄スル所ノ者有。一ナシ。第百十六章ニ曰  
カ。自己ノ運動有テ。他ノ運動ト毫モ肺ノ六  
ナク。政ヲ異ニメテ。立。故ニ其細筋。交。渉。ス。ル。一。彼  
亦從テ。獨。立。孤。行。ノ。曷。郎。布。的。列。金。僣。筋。有。テ。障。碍。ス。ル  
証ヲ發ス。亦能ク以テ自ラ肺ノ運行ヲ有テ。障碍スル

内科要

卷之八

三十三

証ニ足ル。乃ニ因テ暴喘ヲ發スル。其  
リ。故ニ患人モ亦自スル。作止甚ク暴率ナリ。  
リ。トシ。以テ為ラク。是肺中ニ粘痰有テ。塞  
俄項ニ開ス。故ニ其解散スル。脱然トシテ。故  
其發スルニ。開ク。息ニ障礙ナキ者ナリ。得  
タリト。是レ發泄スル所ナキ者ナリ。其人其是ノ如  
クナルヲ見テ。以為ラク。咽喉中悉皆寒液有テ。閉  
塞スルカ。或ハ又自餘ノ毒有テ。茲ニ充滯スルノ  
致ス所ナリト。○右ノ因ヲ知ント。要セハ。能ク之  
ヲ蹤蹟シテ。自ラ明ナリ。此ハ寒液及他物ノ得テ  
遏絶スル所ニアラス。只是ル曷郎布の列金屈ノ  
壓止スル所ニ外ナラサルノ也。其壓止スル忽チ  
精氣ノ循行ヲシテ。遏絶セシムル也。亦猶箇ノ卒

厥ニ嬰兒ルガゴトシ。其忽チ蘇スル所以ノ者ハ。此  
其運動ノ咽喉ヲ箝搾スル者。鬆解スルカ故ニ。從  
テ而メ。精氣流通スルヲ得テ。以テ故ニ復スル  
ニ至ル也。極テ領解シ易シトスルノ也。○是証ノ  
如キニ至ルニ及テハ。刺絡シテ。瀉血スルヲ妙ト  
ス。由テ以テ其曷郎布の列金屈ヲシテ。緩弛セシ  
ムルカ為ナリ。然レ刺絡ノ舉。後ニ至テハ。大抵不  
利ニシテ。宜シカラサルニ歸スルナリ。且ツ其數  
數ニ再發スルニ方テ。瀉血ノ毎ニ施スヘカラザ  
ルカ為ナリ。只宜ク茶劑ヲ用テ。其未病ニ逮テ。豫  
メ之ヲ救ベキナリ。方ハ第百十八章曷郎布の列

內科  
卷之八  
三十一

内科撰要

卷之九

三十一

金匱ニ於テ之ヲ記載ス。

右第百三十二章。曷郎布の列金匱ニ因ルノ証治ヲ論ス。

西説内科撰要卷八終

西説内科撰要卷九

遠西

玉函涅斯垓我爾德兒著

日本

津山

宇田川玄隨晋

譯

鑿官法眼桂川甫周國瑞 閱

病屬胸膈

咳嗽篇第二十一

咳嗽ハ羅旬ニ之ヲ黠失私ト謂フ。凡ソ人身ニ内外ヨリ物ノ侵刺襲戟スルニ因テ。其思欲ヲ待ズシテ。彼ヨリ自ラ發スルノ運動ナル者數種アリ。

内科撰要

卷之九

百三十三章

其數種中ニ於テ。此ノ咳嗽ノ一証ヲ以テ稱首トス。何トナルハ。元來此ノ咳嗽ナル者ハ。其喉頭ニ侵刺襲戟スル者アルカ為ニ。肺管ノ纖維筋細條コレニ應シテ。之ヲ排擯斥出セシカ為ニ之ヲ發スルナリ。啻ニ夫ノミナラズ。腹中ノ諸筋。及ヒ其他ノ諸物。常ニハ思欲ニ聽從シテ意ノ麾使ヲ待テ而後ニ運動スル者モ。亦共ニ同ク思ハサルニ運動ヲ作シテ。カヲ戮セテ其排擯斥出シタスケ左右テ。夫ヲシテ功ヲ成シ易カラシメシカ為ニ斯ニ從事スルナリ。○外表ニ侵刺シテ人ニ害アル者ヲハ。人為ヲ以テモ亦之ヲ除治スルヲ得ベシ然

レ氏體中ノ變故ニ於ルガ如キニ至テハ。之ヲ除治セント思欲スルノ意切ナリト雖モ。毫モ久功ヲ施スニ由ナキノ處ニ及テハ。則チ右ノ如ク彼自ラ思欲ヲ俟スシテ。其侵刺襲戟シタル所ノ者ヲ排擯斥出スルノ運動ヲ作シ。以テ其害ヲ免レシムルニ至ルヲ見ツヘシ造物主ノ奇巧全能。懇到周悉ニシテ届ラサル俟ナキヲ。○此ノ咳嗽ノ証タルヲ。其狀ヲ説クヲ待スシテ。每人知ラザルヲ無キ所ニシテ。即チ患者ト雖モ。己ニ能ク自ラ知テ更ニ言フニ及サルトキハ。則チ術ヲ操リ藝ヲ執レル醫家者流ニ於テハ。固ヨリ耳聞目

内科要

卷之九

九

見スル所アレハ。則チ論ナキノ云。○其咳嗽ノ發  
スル所以ノ者ハ。分明ニ是レ其侵刺襲戟シテ喉  
頭ニ附着シタルヲ斥出シテ。其害ヲ免レシムル  
カ為ナルヲ。是レ天然ノ良能ノ致ス所ニ出ルト  
云ニ至テモ。亦以テ自ラ知ルニ足レルノ云。

右第百三十三章。咳嗽ノ大較ヲ論ス。

凡ソ喉頭ノ内膜ニ於テ。或ハ疼痛ヲ為シ。或ハ侵  
刺襲戟スルヲ致スノ諸因ヨリシテ。皆能ク咳  
嗽ヲ發スルヲ致スナリ。○第一ニハ諸ノ辛烈  
苛厲ニシテ微細ナル者。氣息ニ隨テ吸納シテ。喉  
頭ノ内膜ニ粘着スルカ。或ハ辛烈苛厲ニシテ微

細ナル者ニアラスト雖モ一二ノ汁液送下スル

ノ際誤テ氣管ニ入ルヲ有ルニ出ツ下ノ第百三

ス。○第二ニハ。體中一二ノ各液。酷厲ニ変シタル十五

者爰ニ將來ルヲ。毎ニ箇ノ諸熱ナラヒニ冒寒傷

冷毒即チ第五篇ノ聖ト健ニ是ナリ。冒寒傷冷ト曰

テハ直ニ異ナリ。其中右ニ傷風ヲ該有スルニ近ケレ

キガ如キニ諸ハ漢ノ說ニレレ。恐ラクハ讀者古未ノ名稱

ニセガラニ諸ハ漢ノ說ニレレ。恐ラクハ讀者古未ノ名稱

能ハ在ルヲ有カシニ特々ニ新名ヲ創立セルガルト意

是ノ觀ヲ作ス官應ニ如ニ於テ之ヲ得ルカ如キニ出

ワ第百三十三章ニ至ルマテリ第百三十三章ニ○第三ニハ。其膜大

ニ乾燥ルヲ熾盛熱ノ燒カゴトキニ於テ之ヲ

内科  
卷之九  
百三十四

得ルガ如キニ出ツ。第百三十九○第四二ハ肺藏  
ナラビニ胃中ニ膿有テ聚ルニ出ツ。第百四十○  
第五二ハ喉頭ノ空虧中ニ物有テ聚ルニ出ツ。第百  
四十一章○第六二ハ羅斯ナラビニ翁篤私參金  
屈ノ此部ニ發シタルニ出ツ。第百四十○第七二  
ハ胃ノ水穀ヲ化熟スルノ劣弱ニシテ其製造未  
夕至ラサル不成液ノ此部ニ將來ルニ出ツ。第百  
二章○ホカ自餘斯ノ若キノ類。此ノ病因ト為ル者  
尚多シ悉ク之ヲ歷舉セント要スレ凡右ノ諸因  
ニ據テ之ヲ類推セハ其他自ラ能ク知ルベキガ  
為ニ復之ヲ具列セザルナリ。

右第百三十四章咳嗽ノ病因ヲ論ス。  
夫レ咳嗽ヲ發スルノ外物ニ係ル。或ハ氣息ニ  
隨テ吸納シタル辛烈苛厲ノ諸氣水火ナラシニ  
スル所ヲ尋常ノ烟氣蒸氣等ノ類ノ如キ是ナリ。  
ヨリシテ來レル者。又ハ飲食スルノ際ニ臨テ失  
咽シテ氣管ニ誤リ落ルニ値テ然ル者ノ若キハ  
共ニ是レ人人ノ常ニ知ルトコ口。皆其入タル所  
ノ者ヲ却ケ出スガ為ニシテ。一時偶コレ有ルノ  
事。以テ病トスルニ足ラス。○只其咳嗽スルノ一  
頓ニシテ止ズ。頻ニ連綿シテ絶サルノ甚夕久キ  
ハ。此其及納シタル微細ノ外物ヲヨビ汁液。那ノ

○内科要  
卷之九  
百三十五

膠粘ナ喉頭ノ内膜ニ繋着シテ。復々咳嗽ノ勢ニ乗シテ。推盪漂去スルノ氣息ノ。カヲ為シ易カラサル所ナルカ為ニ。斯ノ若ク其レ擔閣スルナリ。此証ニ遇ラハ。要カナラズ沸湯ヲ取テ。其蒸氣ヲ吸納シテ。其津潤ヲ助ケ。以テ其繋着スル所ノ外物。又ハ酷厲ノ液ヲシテ。發泄シ易カラシムベキナリ。○此証ニ臨テ。妄ニ潤滑ノ劑ヲ以テ之ニ與ル者アリ。甚々無益ニ屬ス。何トナレハ。其茶以テ蒸氣ヲ起シテ津潤ヲ滋盛ニスルヲ能ハス。且コレヲ飲服スルモ。只是レ箇ノ咽門ヨリ。那ノ食道ニ向テ。一道烟ニ下ケリ了ルカ為ニ。呼吸

ヲ主ル氣管ニ於テハ。毫モ其澤ヲ被ルヲ無ク。實ニ没交渉ナレハナリ。

右第百三十五章。咳嗽ノ外物ヲ吸納シタル

ニ因ルノ証治ヲ論ス。

諸般ノ熱病即チ哥ル都第一卷常ニ多ク咳嗽ア

ルモノナリ。此其熱毒ノ喉頭ノ液中ニ混淆シ。其

内膜ニ侵刺襲戟スルカ故ナリ。○其熱毒若シ滋

甚益盛ニシテ。喉頭ノ内膜ニ侵戟シテ足ラズ。更

ニ他ノ部ニ濫流浸淫スルトキハ。因テ遂ニ治シ

難キノ咳嗽ヲ發スルモノナリ。之ヲ要スルニ究

竟必ス其侵刺襲戟シタルヲ排斥センガ為ニ。其

所在盡為膿ヲ釀シ成シテ。以テ其毒ヲ包攝誘道シ。形ヲ咳出スル所ノ白痰ノ中ニ混シテ之ヲ除クニ非ルヨリハ。夷瘳スルヲ無ク。又救療スヘキノ術有ルヲ無キノニ。○第七章ニ於テ示ス所ノ。平常緊用ノ熱病ヲ治スル茶ノ外。宜ク和胸湯ヲ用テ之ヲ柔ケ和スヘキナリ。

和胸湯方  
欵冬葉 各一滋  
錦葵葉 各一滋  
蜀葵根 各八錢  
甘草根 各八錢

水 二百四十錢

右件合シテコレヲ煮テ。漉過シテ滓ヲ去リ。麥酒盃ニ一盃ヲ熱服セシムルヲ一日ニ數度。○其熱服スルニ於テハ。其利益アルヲ冷飲ヨリ極テ多キヲ得ルヲ有ントス。

右第百三十六章。咳嗽ノ熱毒ニ因ルノ証治ヲ論ス。

第三十九章ニ出ス所ノ冒寒傷冷ノ伏毒。夫ノ氣管ノ裏面ニ灌溉シテ其部ヲ潤養スル所ノ。天資固有ノ滑液ト混淆シ。曠日弥久ニシテ差サレ咳嗽ヲ發スルヲアリ。年長ノ人ニ於テハ甚夕治シ



難シト云。治法一二第三十七章ニ論スル冒寒傷  
冷毒ノ法ニ從ヘシ。且其最モ要トスル所ノ者ハ  
其酷厲ナル毒ヲ托裏シテ之ヲ皮表ニ驅發スル  
ニ發汗劑ヲ以テスヘシ。

發汗劑方

底野迦

一錢

安質波

扭謨若波烈蟄屈謨

三錢之一

洎夫藍

六分錢之一

蘇合香

六十分錢之五

右件茶合シテ調勻シ。毎夕之ヲ服ス。劑名之ヲ  
勃律思ト謂フ。

是ノ茶。葡萄酒少許ヲ以テ之ヲ和調シテ服スル  
モ亦可ナリ。○若シ謨ニ茶功ノ速ナラントヲ要  
シテ。之ヲ一頓ニ服スルハ益ナシ。何トナレハ。其  
甘葡萄酒若クハ蜜水原名之ヲ啐埒ト謂フ蜜ト  
考ニ載ス。ヲ以テ。之ヲ調和シテ滋益セシメ。以テ長服  
ニ供スル。平居ノ匙漿ヲ用ルカ如クスルヲ可  
ナリトスレハナリ。○人若シ以テ匙漿ニ造テ之  
ヲ用ル。多ク利益アラントヲ察セハ。方中ノ底  
野迦ニ代ルニ白罌粟ノ舍利別ヲ用テスヘシ。  
右第百三十七章咳嗽ノ冒寒傷冷毒ニ因ル  
ノ証治ヲ論ス。

常ニ多ク無病平全ノ人ニ於テ。暴卒ニ箇ノ咳嗽  
ノ証ニ嬰兒者アリ。其証コレヲ寒冷濡濕ノ氣ニ  
觸冒シ。若シクハ風ノ隧道。闕ニ枕シ窓隙ニ當リ。  
虛邪賊風ニ蒸發ノ氣ヲ抑遏セラレ。泄除スル  
能ハサルニ得タリ。是ニ於テ終ニ身體ニ鬱塞ス  
ルモノ肺中ニ將來リ。天資固有ノ滑液ト混淆シ  
テ。元來感冒スル所ノ寒冷ニ因テ。共ニ冷結頑凝  
シテ。以テ斯ニ侵刺襲戟スルカ為ニ。箇ノ咳嗽ヲ  
發スルナリ。若シ未夕其毒元ノ如ク身體ヲ謝シ  
去リ或ハ皮表ニ浮テ泄除スルヲ得サルノ間  
ハ。長日持久ニシテ治セサル者ナリト知ルヘシ

此等ノ証ハ。皆前章ニ論スル所ノ法方ニ據テ能  
ク治スルヲ得ルカ為ニ。爰ニ更ニ新方ヲ奉ル  
ニ及ハサルナリ。

右第百三十八章。咳嗽ノ蒸發氣ヲ抑遏スル  
ニ因ルノ証治ヲ論ス。

熾盛熱ノ燒カ如キ証ニ於テハ。啻ニ其皮膚ノ焦  
枯シ。口舌ノ津潤ヲ失フノミナラズ。気管ノ内膜  
ニ至ルマテ。一同ニ乾燥スルナリ。若シ飲食ヲ送  
下スルトキハ。其物内ヨリシテ喉頭ヲ刺戟ス。是  
ヲ以テ咳嗽スルノミ。此ノ咳嗽ノ証タルヲ。自己  
ヨリシテ終知リ易ク。其候見易キナリ。第十二章

ニ載ル所。定テ熾盛熱ヲ治スルノ方ヲ用テ差  
ルナリ。且是ヲ輔翼スルニ第百三十五章ニ出ス  
所ノ水液ノ蒸気ヲ以テ。気管ヲヨヒ肺ノ裏面ヲ  
潤露スルノ治ヲ以シ。並ニ第百三十六章ニ載ル  
和胸湯ヲ飲シムヘシ。○是ニ由テ連綿シテ輟  
能ハサルノ乾咳靜止シ。粘痰以テ稀薄ヲ致シテ  
吐泄スルニ易ク。大ニ輕差スルヲ得ヘキナリ。  
其吐痰スルヲ。是レ其毒泄除スルノ象ニシテ。病  
差ルノ徵ナリト知ヘシ。

右第百三十九章。咳嗽ノ熾盛熱ノ乾燥ニ因  
ルノ証治ヲ論ス。

吐血肺ヨリシテノ後。箇ノ連綿シテ絶ガル咳嗽  
ヲ患ルヲ有ル者ナリ。此其肺藏癰膿ニ來ルノ徵  
ナリ。其癰膿其所ニ滯止シテ。變シテ酷厲ノ性ト  
為リ。以テ其處ニ刺戟シテ致ス所ナリ。○宜ク意  
ヲ用テ營求シ。其膿ノ腐壞スルヲ防治シテ。尤  
右シテ其ヲシテ發泄シ易カラシムルノ計ヲ為  
スヘシ。治法或ハ呵咯シテ以テ之ヲ除キ。或ハ利  
尿ヨリシテ之ヲ泄スヘキナリ。

拔<sup>バ</sup>ル<sup>ル</sup> 撒<sup>サ</sup>モ<sup>モ</sup>格<sup>ゴ</sup>ハ<sup>ハ</sup> 非<sup>ヒ</sup>亞<sup>ヤ</sup> 泥<sup>ニ</sup>二<sup>ニ</sup>熬<sup>熬</sup> 令<sup>令</sup>錢<sup>錢</sup>  
拔<sup>バ</sup>ル<sup>ル</sup> 撒<sup>サ</sup>モ<sup>モ</sup>格<sup>ゴ</sup>ハ<sup>ハ</sup> 非<sup>ヒ</sup>亞<sup>ヤ</sup> 泥<sup>ニ</sup>二<sup>ニ</sup>熬<sup>熬</sup> 令<sup>令</sup>錢<sup>錢</sup>  
五<sup>五</sup>分<sup>分</sup>

內科

卷之九

百四

鯨腦

三分錢之二

蘇合香

三分錢之一

甘草末

適宜

右件合勻シテ每一錢十五丸ト作シ。半時毎ニ  
一九ヲ服ス。

若シ少壯ノ輩ニ於テ。初次吐血肺ヨリスルハ有  
テ後。多時ナラスシテ總ニ咳嗽ヲ催スノ始。ナラ  
ヒニ咳嗽ノ際。一齊ニ一二次胃中温熱スルハ  
覺ヘ。口舌ニ甜味ヲ催ス。一アルニ値ハ。則チ刺  
絡シテ瀉血スルヲ以テ良法トス。以テ其新ニ吐  
血スルヲ豫防スルガ為ナリ。其法宜ク下ニ説與

スルカ如クスヘシ。○若シ胃脘痛或ハ肺痛ノ後  
テ多ク咳嗽スルニ値ハ。則其変シ成ス所ノ癰  
膿。肺藏及ヒ胃脘ノ腔中ニ底止滯着スルハ恐  
ルヘシ。○必ス意ヲ以テ營求シテ其膿ヲ泄除ス  
ルハ。上ニ説タルカ如クスベシ。然レ唯多ク汁液  
ヲ飲シムルヲ佳ナリトス。即チ一齊ニ上第百三  
十六章ニ出セル和胃湯ヲ用ヘシ。然レ若シ其熱  
已甚ニシテ大ニ翕發セハ。則チ其丸子ヲ除テ。只  
上ノ和胸湯ヲノ用ルヲ妙トス。  
右第百四十四章。咳嗽ノ肺及ヒ胸部ノ膿ニ因  
ルノ証治ヲ論ス。

巴旦杏核解體新各二詳ナリ。考へシ。又及ヒ満咽喉  
アル所ノ膠粘ナル滑液。時有テ能ク一旦酷厲ノ  
性ニ変スルヲアリ。又能ク長ク変シテ頑結固定  
スルヲアリ。又喉頭ノ中ニ於テ居恒ニ製設スル  
液。亦能ク変シテ常然ニ逆スルノ性ニ化スルヲ  
アリ。○若シ患人咳シテ稀涼液ヲ出シ。評熱病論  
清水ヲ出スト。謂且ツ喉中刺戟シテ癢起シ來ル  
ニ値ハ。則其液ノ稀涼ニシテ且ツ酷厲ニ変シ  
タルヲ明知スヘシ。其治宜ク第三十七章ニ載  
ル。冒寒傷冷毒ノ例ニ從ヒ。且ツ兼ルニ第百三十  
六章ニ出セル。緩柔ナル和胸湯ヲ以テシテ之ヲ

服セシムベシ。利アリトス。○但其酷厲ノ粘稠液  
ト為テ。膠着シテ咳咯メ能ク吐泄スル所ニ非ル  
トヲ明ニセハ。則宜ク多ク凝結ヲ解クノ法ヲ用  
ヘシ。妙トス。即チ甘草汁。蜂蜜。氷絲糖西洋叔兒  
ノ居家纂要ニ曰ク。亞アル証証厄厄即即チ麥麥糖糖又糖糖纏纏ト  
曰フ。冒寒傷冷毒ニ用テ。其酷厲ノ膏膏隔隔ニ爵爵結結  
スルヲ鬆和シ。粘除キ難キヲ解化シテ吐除キ  
易カラシムルヲ主ル。又宝函ニ曰ク。之ヲ小兒  
ニ與テ。咳嗽ヲ患ルヲ治ス。無花果等ノ如キ。其粘  
痰ヲシテ能ク稀薄ナラシメ。是ニ因テ其肺管中  
ニ膠粘セル者鬆化シテ除キ易キニ至ルヲ得  
ルナリ。○若シ其痰凝結粘稠スルノ極テ甚キニ  
至テハ。俛能ク聚テ一團ノ形塊ヲ成シ。以テ喉頭

内科要略 卷之九

ノ空圍中ニ底着ス。其所<sub>レ</sub>在<sub>レ</sub>コレニ刺戟セラレハ、  
ニ因テ。頑強ニシテ休止スル時ナキ連嗽ヲ發シ。  
連續シテ聲ヲ絶ザルドモ。其痰出ガタク。終ニハ  
則チカテ強ク咳スルニ隨テ。遂ニ凝結シテ較堅  
實ナル小塊ヲ吐泄スルニ至ル。或ハ大ニ或ハ小  
ニシテ。形定リアルナシ。此其始メ聚リタル終  
ニ其處ニ結成スルヲ以テ。其喉頭中所在ノ廣狹  
ニ隨テ。形大小アルヲ致スカ故ナリ。○人其吐  
泄スル所ヲ見テ以テ是レ其肺中ノ機<sub>キ</sub>里<sub>リ</sub>爾<sub>ル</sub>ヲ吐  
出セリト為ルニ至ル。實ハ然ラサルナリ。和蘭<sub>和蘭ノ</sub>  
ニ非スト雖モ。猶コノ<sub>ノ</sub>機<sub>キ</sub>里<sub>リ</sub>爾<sub>ル</sub>ヲ見<sub>ル</sub>ハ。又右ノ  
知ル。習常ノ<sub>ノ</sub>然<sub>ル</sub>コノ<sub>ノ</sub>機<sub>キ</sub>里<sub>リ</sub>爾<sub>ル</sub>ヲ見<sub>ル</sub>ハ。又右ノ

外尚同ク気管中天資固有ノ滑液。変シテ粘稠ス  
ルトキハ。亦能ク肺中諸管ノ形状ニ象シテ其質  
ヲ成シ。以テ吐泄スルヲアリ。衆人見テ以テ肺中  
該<sub>アル</sub>有<sub>ル</sub>的<sub>キ</sub>ノ物件ヲ咳シ出ス<sub>ル</sub>ヲアリト為ル者。亦間  
コレアリ。○天資固有ノ滑液ヲ聚斂シテ之ヲ泄  
除スルカ故ニ。其跡必ス剥喪シテ裸露シ。其處ニ  
將來ルノ諸液。皆之ニ侵襲刺戟スルヲ為ス。○  
此其人ノ咳嗽スル<sub>ル</sub>。必其痰塊ヲ吐泄スルノ前  
後ニ於テ。共ニ免ル<sub>ル</sub>。一能ハサル所以ノ者ナリ。  
後ニ於テ。共ニ免ル<sub>ル</sub>。一能ハサル所以ノ者ナリ。  
刺戟スルモ。前者ハ。是レ前説ニ謂フ所ノ諸液ノ  
刺戟スル所。前後互ニ於テ。相<sub>レ</sub>為<sub>ル</sub>ス。此咳嗽ト吐痰  
ハ。相<sub>レ</sub>須<sub>ル</sub>。發スル<sub>ル</sub>。大抵<sub>ニ</sub>相<sub>レ</sub>為<sub>ル</sub>トス。宜ナ<sub>ル</sub>カナ

胸科要略 卷之九

内科撰要 卷之九

漢人後世無痰有聲。有痰無聲。ヲヨヒ有痰有聲。以テ咳ト嗽トノ分釋シ。或ハ二証亦常ニ相因ル等シノ聚訟ヲ未ス。今取テ以テ譯語ニ用ル所ハ必シモ拘ラヌト雖モ。張從政カ古ニ稽ルニ據ノ必  
○治法其凝結セル粘小塊ヲシテ。吐泄シ易カラシムルヲ管為スヘシ。即チ湯ヲ燻シテ其蒸氣ヲ吸納セシメ。且ツ第百三十六章ニ載ル和胸湯ヲ服セシムヘシ。是ヲ良トス。但右ノ如クニシテ粘痰小塊容易ニ吐泄スルヲ得ハ。尚且能ク其處ヲシテ常ニ濕潤ヲ保セシムルニ右ノ法ヲ以テシ。且ツ之ニ副シテ一齊ニ用ルニ箇ノ熏法ヲ以テスヘキナリ。其法。乳香ヲ把テ諸ヲ熾炭ノ上ニ尚ヘ。煙氣發スルニ乘シテ之ヲ吸納ス。並ニ又

上ノ第百四十四章ニ載ル丸子ヲ用ヘシ。

右第百四十一章。咳嗽ノ喉頭ノ液ニ因ルノ

証治ヲ論ス。

余常ニ多ク夫ノ小兒ニ於テ。胃ノ飲食ヲ消磨ススルノ官能ヲ喪テ。傳化健運ナラス。因テ咳嗽ヲ催ス。有テヲ習知セリ。其咳嗽必ス食後多時ナラスシテ發ス。咳嗽スルヲ強クシテ且ツ屢スト雖モ。全ク然ク痰ノ以テ吐出スヘキ有ルヲナシ。偶尔ク之アルモ。亦至テ僅々タルノニ。因テ之ヲ名テ乾咳嗽ト曰フナリ。千金方ニ所謂食飽咳嗽是ナリ。○其咳嗽スルヲ彌久シテ。長ク連綿シテ絶サルノ極ニ

内科撰要 卷之九 百四十二

至ルニ方テハ。長幼ヲ問ハス。必ス嘔吐スル者ナ  
リ。○若シ其飲食。或ハ自餘何ニテモ胃中ニ在ル  
所ノ者ヲ吐キ除テノ後ニ至テハ。其咳嗽自ラ靜  
止スル者ナリ。○若シ此証ニ臨テ。緊シテ諸般ノ  
胸膈ヲ和調スルノ藥劑ヲ投スルトキハ。皆以テ  
其咳嗽ヲシテ頑固ナラシムルニ足ル。此其胃中  
飲食ヲ消磨化熟スルノ敗壞シタルヲシテ弥  
益増進セシムルカ故ナリ。唯治スルニ胃ヲ強壯  
ニスルノ藥ヲ以テスルヲ良トス。大抵瘵サル  
有ルヲナシ。其方左ニ示ス。  
方

薄荷水 四十八錢

盧會 五分

沒藥 五分

酒石鹽 五分

高良薑根末 各三分錢之二

右件藥合シテ調勻シ。日ニ四次若クハ其餘モ  
之ヲ服ス。每服一匙。小兒ニハ少ク砂糖ヲ加調  
シテ。甘味ヲ添ヘテ口ニ可ナラシメ。其服度ヲ  
減シテ與ヘ服セシムルヲ良トス。劑名コレヲ  
密吉斯黠刺ト謂フ。○若シ大人ニシテ丸子ヲ  
吞嚥スヘキ者ニ於テハ。則チ空ク茲ニ記載ス



凡所入丸茶ヲ製シ與一服セシムヘシ。

方

勿<sup>ヘ</sup>搗<sup>子</sup>祭<sup>テ</sup>亞<sup>ヤ</sup>石<sup>ハ</sup>鎔<sup>ル</sup> 一錢五分

拔<sup>バ</sup>尔<sup>ル</sup>撒<sup>サ</sup>謨<sup>モ</sup>字<sup>ハ</sup>露<sup>ル</sup>非<sup>ヒ</sup>亞<sup>ヤ</sup>泥<sup>ニ</sup>

盧會 各三分錢之一

没<sup>メ</sup>菜 一錢

酒石鹽 三分錢之一

高良薑根末 適宜 一種小者

薄荷油 五滴

右件藥合シテ每一錢十五丸ト作シ。橙皮末ヲ以テ衣トシ。二丸ヲ服スル。日ニ一二次。

右第百四十二章。咳嗽ノ胃ノ化熟ノ卷敗ニ因ルノ証治ヲ論ス。

吐血篇第二十二

名義本文ニテ明白ナリ。漢醫ノ所謂唾  
血咳血嘔血肺疽齒衄等皆是中ニ属ス  
原名之ヲ蒲尔独蘇布負ルヲ言ナリ。

凡ソ口ヨリシテ其流溢スル所ノ血ヲ吐出スル。  
是ヲ吐血ト曰フ。羅甸ニ之ヲ髮護布底失斯ト謂  
フ。其由來スルトコロ一ナラス。諸部ヨリシテ斯  
ニ將出シ來ルナリ。假令ハ鼻ヨリスルトアリ。喉  
中ヨリスルトアリ。口内ヨリスルトアリ。胃中ヨ  
リスルトアリ。肺中ヨリスルトアリ。之ヲ治スル  
。其因ニ隨テ法ヲ異ニセサルト能ハス。必ス各  
法ヲ須テ然メ後ニ治スルナリ。只是レ悉ク危難

ノ患ニ致スニアラス其肺中ヨリ溢泄シ來ルノ  
一証ヲ以テ危難ヲ慮圖スヘキ一大危証トシテ。  
即チ本篇主トシテ論スル所ノ者ハ職トシテ此  
ノ一証ヲ指スナリ。而シテ其証自ラ他ニ殊異ナ  
ル者有テ。以テ自餘ノ諸吐血ト之ヲ分別スルト  
ヲ得ルナリ。○其証ヲ言フニ。先ツ第一ニ咳嗽ス  
ルト過忒テノ後ヲ承テ之ヲ發スルカ。又ハ其咳  
嗽ト偕ニ之ヲ現スルナリ。此其血。箇ノ軟骨様ニ  
シテ。恒ニ<sup>クナリ</sup>咳セ<sup>ル</sup>ル肺管ヨリ出ルカ故ニ。自然ノ  
重クシテ下流スルノ性。其咳嗽スルノ勢ニ乘ス  
ルニ非ルヨリハ自然ニ及シテ上ニ向テ逆流ス

ル一能ハスシテ唯其咳嗽スルニ於テ一ニハ其  
 血ノ流レ出ル所ノ血道下ヨリシテ來ル所ノ氣  
 ニ因テ開圻シテ以テ喉ニ向フヲ為シニハ  
 肺管咳嗽スルノ時ニ方テ其細筋織條急引スル  
 ニ因テ其溢出スル所ノ血ヲ推盪激迫シテ以テ  
 上ニ向ハシムルヲ為スナリ○第二ニ徵スル  
 所ハ其出ル所ノ血泡沫アリ即チ今カ非剥葛刺  
 室伽ノ撰著セル所ノ醫術編ノ中第二百六條ニ  
 詳ニ論シタル力如シ此其血粘稠ナルガ呼吸ノ  
 氣ナラヒニ咳嗽ニ因テ鼓橐沸騰セラレテ此ノ  
 泡沫ノ變有ルヲ致スナリ○若シ其吐血ノ証

ニ右二件ノ徵候アルヲ無キハ復其肺中ヨリシ  
 テ來ルノ危難ヲ慮圖スルニ及ハス何トナレハ  
 此ノ証ト咳呵スルニ乘シテ痰飲ニ隨テ出テ泡  
 沫ナキトハ此其喉内ヨリシテ出ル者ニシテ危  
 キヲ鮮シ又ハ其鼻ヨリ溢出シテ畜門ヲ經テ齧  
 後咽門ニ下リ以テ口ニ出ルナリ○其血唯咳嗽  
 ニモ因ラス痰唾ヲ俟タスシテ出ルハ是レ口内  
 後邊ノ諸部ナル細血道ノ破開セル力漢人ノ所  
 ル者等即チ又ハ牙縫アルヒハ齒斷等ヨリシテ  
 是類ナリ漢人ノ所謂齒衄○夫ノ胃中ヨリシテ  
 出ルナリ漢人ノ所謂齒衄○夫ノ胃中ヨリシテ  
 來ルノ一証ノ若キ如何ナル証候有テ以テ之ヲ

別ツトナレバ。則チ余コレヲ下ノ嘔血篇ニ於テ  
詳説ス。就テコレヲ考索スヘシ。

右第百四十三章。吐血ノ大較ヲ論ス。

凡ソ殷赤ナル血液ハ。悉皆若キ血脉及ヒ動脈ノ  
管中ニ在リ。而シテ動血ニ脈ノ諸管。心藏ヲ以テ  
根ト為シ。根ヨリシテ幹ヲ生シ。幹ヨリシテ枝ヲ  
岐チ。枝又小枝ヲ令ケ。小枝又細極ヲ布キ。本末轉  
生シ。巨細相稱也。一身百體。表裏上下。絲分縷抗シ  
テ。經絡セザル所ナリ。條達蔓延シテ被及セザル  
所ナシ。以テ其血ヲシテ全體諸末ニ至ルマデ。斯  
ニ周流遍滿スルニ。皆其中ニ由テ行クヲ得セ

シメ。而シテ其諸脈管ノ究竟至細至微ノ末ト雖  
モ。尚且ツ斯ニ圍繞シ。斯ニ包括シテ。終ニ之ヲシ  
テ。毫モ其管外ニ漏洩濫佚スルヲナカラシムル  
所ナリ。是ニ由テ之ヲ觀レハ。肺管ニ於テ其血溢  
ノ患アル所以ノ者ハ。此其細血管ノ。或ハ一處或  
ハ數處。必ス破綻決裂スルカ。又ハ其諸末抄。赤血  
ノ透漏スル如<sup>ホ</sup>ニ疎鬆セルカニ因テ。是ノ血溢ヲ  
發スルヲ明ケシ。○右ノ血管ノ破綻決裂ヨリス  
ルノ原ニ係ル。之ヲ吐血ト名ルニ論ナシ。古末此  
リ出ルノ証ニ於テモ。尚コレヲ胃ヨリ末ルノ証  
ニ混レテ。或ハ嘔血ト曰ヒ。或ハ吐血ト曰ヒ。其  
ヲ説クニ及テモ。素ヨリ實據ナク。只是レ五藏  
當ノ說ニ過キガレバ。衆說ノ中偶尔ク僅ニ合又

内科要

卷之九

九

其諸末抄ノ僅ニ透漏スルホドニ疎鬆セルノ因  
 ニテ發スル者其証只是レ咳レ吐スル所ノ痰中  
 二數條ノ血線紅縷ヲ帶絡レ來ル一有ノニシ  
 一右ノ如ク夥ク赤沫泡起スルノ血ヲ吐泄スル  
 一無レト雖モ尚能ク同ク此ノ吐血ノ名ヲ以テ  
 之ヲ稱スルナリ。丹溪ノ略ハ痰ニ血ヲ帶テ流  
 ノ唾ハ肺ヲ傷ルナリト謂ヘル者即チ是ナリ如キ  
 者。是レ肺ヲ傷ルナリト謂ヘル者。即チ是ナリ。  
 ○但其血道細管ノ破綻坼裂レタル者ニシテ。迺  
 其血恒ニ朽咳セル肺管ニ淋漓レ呼吸ノ出入ニ  
 隨テ鼓索沸騰セラレ以テ此ノ赤沫ヲ成レ末ル

凡所アハルモ。微スル所  
 蠶績蟹匡ニシテ。偶中自  
 然ラサニアラス。只是レ  
 其諸末抄ノ僅ニ透漏スル  
 二數條ノ血線紅縷ヲ帶絡  
 一右ノ如ク夥ク赤沫泡起  
 一無レト雖モ尚能ク同ク  
 之ヲ稱スルナリ。丹溪ノ  
 ノ唾ハ肺ヲ傷ルナリト謂  
 者。是レ肺ヲ傷ルナリト  
 ○但其血道細管ノ破綻坼  
 其血恒ニ朽咳セル肺管ニ  
 隨テ鼓索沸騰セラレ以テ

ナリ。其赤沫究竟必ス喉頭ニ上リ極ルトキハ其  
 處ニ刺戟レテ。忽チ咳嗽ヲ發スルナリ。是ニ於テ  
 漸々ニ流出テ蓄滯スル所ノ血。尽ク咳嗽ニ乘シ  
 テコレヲ暫時ニ吐出スルナリ。○凡ソ此証ノ由  
 テ起ル所ノ原ハ。皆是レ極テ其血道細管ヲ破裂  
 スルノ諸因ニ係ルナリ。即チ強ク咳嗽スルニ因  
 リ、疾言厲語スルニ因リ。カヲ極テ叫喚スルニ因  
 リ。歌曲ヲ高唱スルニ因リ。身體ヲ暴動レテ。血ノ  
 循行ヲシテ強猛已甚ナラシムルニ因リ。慄悍精  
 烈ノ酒漿ヲ貪飲レテ。血氣ヲ鼓動レテ上逆ヲ致  
 スニ因リ。病源候論及ヒ古今統ニ説ク所ノ肺  
 痺者。正ニ此因ヨリニ發スル者

凡所アハルモ。微スル所  
 蠶績蟹匡ニシテ。偶中自  
 然ラサニアラス。只是レ  
 其諸末抄ノ僅ニ透漏スル  
 二數條ノ血線紅縷ヲ帶絡  
 一右ノ如ク夥ク赤沫泡起  
 一無レト雖モ尚能ク同ク  
 之ヲ稱スルナリ。丹溪ノ  
 ノ唾ハ肺ヲ傷ルナリト謂  
 者。是レ肺ヲ傷ルナリト  
 ○但其血道細管ノ破綻坼  
 其血恒ニ朽咳セル肺管ニ  
 隨テ鼓索沸騰セラレ以テ

熱病ニ於テ其熱氣輕揚飛竄ノ極テ大過ニシテ冲騰奔突到ラサル所ナク。遂ニ血ヲシテ躁擾妄行シテ。上是ヲ肺中ニ決溢セシムルニ因ル等。是ナリ。○其胸腔ノ寛裕ナラスシテ褊窄ナルノ人。即チ偃僂疋劣若クハ其胸狹小ニシテ且ツ淺薄ナルカ如キ。及ヒ喉頭ノ通竅窄小ニシテ。氣ノ出入寛裕ナラサルノ人。喻ルニ聲婦人ノ如ク清高纖急ニシテ。說話歌唱常ニ嗽々嚙々タル者ノ如キ。皆若シ右ノ諸因ヲ犯ス者ハ。定テ此患ニ嬰ルト知ヘシ。○其父母既ニ此証ヲ患タル者ノ子トシテ。有生ノ始ヨリ之ヲ傳リタル者ハ。成長シ

テ其血氣充溢シ。運行強盛ニシテ少壯ノ輩列ニ比スルノ年ニ至ルニ及テ。亦此患ニ遭遇スル者ナリ。若シ然ラサレハ。則チ其親ノ曩者ニ此証ニ嬰リシ年齒ニ及フ比ニシテ。甚同患ニ陥リ易キ者ナリ。且ツ時ヲツテ上ニ歷舉セル彰著ナル諸因ノ中。一モ犯ス所ナクシテ。端ナク此証ヲ發スル者ナリト知ヘシ。是ヲ以テ右ニ説ク所ノ類ノ人ニ於テハ。宜ク自ラ豫メ省察シ。上ノ諸原ヲ戒慎シテ敢テ犯サズ。他ノ身體資性平全無虞ノ人ノ忌憚ナキカ如ク為ス。勿ルヘキナリ。

右第百四十四章。吐血ノ病因ヲ論ス。

此ノ吐血ノ証。初二於テハ人コレヲ忽ニシテ戒  
慎セサルモノナリ。何トナレハ其恒ニ鼻洪或ハ  
金刃創傷ヲ得ル等。出血スル。此ノ吐血ニ比ス  
レハ。復ニ相ト倍蓰什百シテ多シト雖モ。殊異ナ  
ル。变故ノ後ヲ承テ發シ來ル。無キニ忸フガ故  
ニ。據テ以テ意ニ錯カズ。且ツ此証ヲ得ルノ初二  
於テハ。起居情態平素ニ異ナル。ナク。疼痛モ十  
ク發熱モ有ザレハ。恬然トシテ省察セザル。固  
ヨリ其所ナリ。但其レハ。之ヲ得テ止ザルノ際  
ニ及テ。然レテ後其見ル所。此ヨリシテ勞証ニ陷  
テ。少年ニシテ矢札スル者多キニ因テ。始テ纒ニ

コレヲ畏ル。一ヲ知ル者間亦コレ有ノ。○然  
ラハ則チ此証ヲ得ルノ初ヨリ之ヲ省悟スル。一  
有ラハ。後ノ患モナク。亦增長セズ。必ス治スルカ  
ト言フニ。猶尚斯ニ蹇難ノ事アリ存スルナリ。何  
ヲカ蹇難ノ事ト謂フヤ。夫人ノ此患ニ嬰ル。鑿必  
ス直ニ課戒ヲ設テ。飲酒ヲ禁シ。夜作ヲ禁シテ強  
テ寢ニ就シメ。為ニ考按シテ。苦渋ニシテ口ニ可  
ナラサル茶方ヲ記シ與ルナリ。這般ノ戒禁。設シ  
其人ヲシテ痛患スル所。有テ自ラ疾苦ニ困スル  
ノ際ニ方テコレヲ持セシメハ。空ク厭ヒ惡ムノ  
事ナカルベシト雖モ。上ニ説ク所ノ如ク。此証ノ

初ハ。患人自覺ル。平居ニ異ナラスシテ。飲酒舞  
踏。擊劔ヲ講シ。歌曲ヲ唱ヘ。秉燭ノ遊。間燕ノ樂。日  
常ニ自若タルベシト。以為ルヲ。俄ニシテコレヲ  
強制スルガ故ニ。是ヲ以テ其レ蹇難ナリ。○是故  
ニ。患人能ク右件ノ忌戒ヲ守持謹保スルガ侶ク  
然ルモ。素ヨリ勉強シテ致ス所。情実ノ勝サルヲ  
熬<sup>コラシ</sup>シ得テ終ニ斯ニ已到スルニ屬スレハ。唯一  
次吐血ノ變有テノ後モ。右ノ如クニシテ荏苒ト疾  
ノ差ルヲ庶幾スルノ中。早ク己ニ膿ヲ吐出シ。遍  
體羸瘦シ。食後毎ニ多時ナラズシテ微熱ヲ催ス  
ノ証アルニ至ルト知ルヘシ。○大抵既ニ茲ニ至

ルニ及テモ。猶尚其根ス所深シテ。淫及スル。己  
ニ大甚ナルヲ知ラス。暫時ノ間ニシテ率意ニ之  
ヲ治セン。一ヲ思欲スル者ナリ。嗚呼。只是<sup>ムガウサ</sup>レ己ニ  
遅<sup>ヨシキ</sup>了ノ也。○何トナレハ。吐血以後。膿ヲ吐出スル  
ニ進ムトキハ。少年輩ト雖モ治スル。一稀ナル者  
ナリ。即チ余力非<sup>ヒ</sup>利<sup>ボ</sup>葛<sup>カ</sup>刺<sup>チ</sup>室<sup>カ</sup>伽<sup>カ</sup>ノ撰著スル所ノ醫  
術編ノ中。第三百四十條ニ明説セルカ如シ。○爰  
ニ畧其説ヲ援引シテ以テ斯ニ附シ。讀者ヲシテ  
茲ニ因テ益<sup>コトク</sup>余カ説ク所ノ徵據アル。一ヲ知テ。以  
テ其理ヲ詳明ニシ。以テ其術ヲ公哲ニスル。一ヲ  
得テ。斯ニ從事セシメン。一ヲ要スルノ也。○夫レ

内科要略 卷之九



内科撰要 卷之九  
三十一  
圻裂シタル血道ヨリ。滴々トシテ流漓シタルノ  
血。皆恒ニ捫開セル肺管ニ流落シテ。肺中ノ衆小  
胞ニ入り充ルナリ。然ルトキハ肺中ノ小胞。虚ニ  
シテ以テ氣ヲ包容スベキニ。血之ニ代テ奪テ其  
中ニ充實スルナリ。○其血始ハ只其裏ニ滯止シ  
テ凝結粘稠スルノミナルモ。久キヲ経ルニ及テ  
ハ。腐壞シテ且ツ酷厲ノ性ト変スルナリ腐壞ス  
ルノ勢。增長貫盈スルニ及テハ。遂ニ其所在ヲシ  
テ糜爛癰膿セシム。○其血尚圻開セル血道ヨリ  
淋漓スルヲ絶サレハ。弥益ミクシ肺管中ニ充盈スルガ  
故ニ。必ス其近傍ノ支別ニ濫流シ入ラザルヲ

得ズ。其近傍ノ支別中ニハ。尚氣ノ充盈セルヲ有  
ガ故ニ。此泡起セル血ヲ成ス下ヲ致スナリ。○而  
シテ前ニ流入タル所ノ血。既ニ腐壞シ且酷厲ニ  
変シテ肺ヲ刺戟シ。觸レ誘シテ咳嗽ヲ催スニ因  
テ。夫ヨリシテ其究オチ必ス流漓シタル泡起セル血  
ヲ吐泄スルヲ為スナリ。而シテ前ニ充塞スル  
所ノ者ハ。自若トシテ底著シ居ルナリ其酷厲ノ  
性ト変シタル者。終ニ必ス肺ノ癰膿ヲ作シ。夫ヨ  
リシテ遂ニ治スベカラザル癆瘵ノ証ヲ成スト  
知ベシ。○其初等閑ニシテ事トセザルモ。吐終レ  
ハ一旦ハ先ツ常ニ復ルカ故ニ。忽畧シテ不治ニ

至ラシムレバ。其時ヨリ廢置ズ豫メ後患ヲ慮リ。當時無恙ニ生存スルモ。危殆ノ期尋テ及ントスルヲ能ク熟思シテ。其災ノ微ナルニ速テ戒慎醫治スベキナリ。

右第百四十五章餘義ヲ申明ス。

凡ソ諸吐血ヲ療スルノ法。其溢出スル所ノ蓄血ヲ悉ク除キ去ルノ術アリ。嘔血ノ証ニ於ルガ如ク所ノ胃ヨリキヲ謂フ。即チ上ニ云外表面ヨリ之ヲ壓定シテ其開哆シタル血道ヲ封合スルノ術アリ。即チ鼻ノ類ヲシテ又ハ止血ノ劑ヲ敷貼シテ之ヲ治スルヲ。他ノ諸出血ニ於ルカ如クスルノ術アリ。口中斷者等ヨク此

等ノ療法。固ヨリ事トシ難キノ例ニ在サレバ。更ニ斯ニ枚擧セサルナリ。○但其易キニ侶テ易カラザルノ一件ヲ言フニ。人此ノ吐血ノ証ニ値ヘハ。諸ヲ其臆ニ取テ。想像シテ妄意ニ濃厚凝泣ノ劑ヲ與ヘ服セシメ。以テ其出血ヲ止住セント要ス。此大ニ誤ナリ。何トナレハ。若シ滿意ニ其薬力ニ因テ其血為ニ稠厚スルトキハ。開哆シタル所ノ血道ヨリ淋漓スルヲ止ムベキモ。肺ノ動脈管ノ末抄ヨリ。血脈へ循行スルノ血モ。亦之ト偕ニ凝泣シテ。循行ノ力為ニ絶ン。其循環流通スルヲ停止セハ。人命奚ニ從テ立ツテアランヤ。以テ

知ルヘキノ云。○是ノ故ニ。見ヨ余カ之ヲ治スル  
ノ法。他ナシ。其初ニ於テ唯タカ力チカラ所ノ及ノ務ヲテ血ノ肺ニ  
輻湊スルノ洪勢ヲ殺サイ減シ。其ヲシテ血道ノ末抄。  
開咳セル處マテニ。届リ溢レサルニ因テ。自ラ能  
ク密合狹窄スルヲ得テ。復タ血ノ流出ツベキ  
無キニ至ラシムルノ云。○是ヲ以テ先ツ患人ヲ  
シテ上ニ列擧スル所ノ諸件。吐血ノ原由ニ係ル  
者ヲ停止セシメ。刺絡シテ瀉血シ。血ノ減少スル  
ニ因テ。血道ニ輸送スルヲ寡カラシム。何トナレ  
ハ。悉皆會カス肺ニ朝宗セザルヲナケレハ。逃ゼ不ヒ過ニ  
全ク其血ノ爰ニ輸送スルヲ遏止スルヲ能ハ

ガレバナナリ。○其瀉血スルヲ。一月若クハ兩月ヲ  
期シテ必ス報刺スヘシ。其最モ宜ク施スヘキハ。  
少壯ノ輩ニ於テスヘシ。又夏月ニ於テスヘシ。此  
其新血漸長スルノ時ナルカ為ナリ。○其間一箇  
ノ清涼ニシテ且ツ收斂ヲ兼ルノ劑ヲ用ルヲ良  
トス。以テ其血ノ循行ヲ緩慢ニシ。血道圻裂ノ歎  
合ヲ助ケ。以テ故ニ復シ易カラシム。且其菜ノ能  
ク肺中圻裂セル諸管ニ届リ達シテ。其效ヲ奏ス  
ルヲ獲ルニ取ル。○夫ノ收斂ノ義ニノ云注意  
シテ。聚瀘ノ菜性石脂等ノ隊伍ヲ成セル諸方ノ  
如キハ。其液道第十出ハ考ニノ中ニ入り達スルヲ

○内科要

卷之九

三十五

能ハサルヲ以テ。余其依頼鮮キヲ知ルノミ。○左  
 ニ記スル所ノ一方ヲ以テ甚夕之ニ利アリトス。  
 吐血肺ヨリスルヲ治スル飲劑方

菘宕根 各八錢  
 精大麥 各八錢  
 玫瑰花 一溢  
 水 百六十錢

右件合シテ密器中ニ於テ之ヲ煮。漉過シテ滓  
 ヲ去リ。可<sup>カウ</sup>喜<sup>ヒイ</sup>盃<sup>用</sup>蓋<sup>テ</sup>尋<sup>常</sup>ノ<sup>可</sup>多<sup>喜</sup>ヲ<sup>服</sup>ス<sup>ル</sup>所<sup>ノ</sup>飲<sup>碗</sup>  
ノ如シ。可<sup>カウ</sup>喜<sup>ヒイ</sup>ハ。木<sup>蓋</sup>ノ<sup>名</sup>。西<sup>人</sup>常<sup>ニ</sup>微<sup>炒</sup>細<sup>末</sup>ニ  
 湯ニ點<sup>テ</sup>常<sup>服</sup>ス<sup>ル</sup>。猶<sup>此</sup>ニ<sup>茶</sup>ヲ<sup>喫</sup>ス<sup>ル</sup>。  
 ガ如シ。功<sup>用</sup>製<sup>造</sup>ヲ<sup>以</sup>テ<sup>日</sup>ニ<sup>數</sup>回<sup>稍</sup>温<sup>ニ</sup>シ<sup>テ</sup>  
 名<sup>物</sup>考<sup>ニ</sup>載<sup>ス</sup>。

服シ。若クハ冷飲セシム。

若シ再ヒ咽喉中癢起シテ咳嗽ヲ催シ。胸中熱キ  
 一ヲ覺ヘ。口中甜味ヲ發スルヲアテハ。即時ニ其  
 吐血ヲ見ザルニ速テ再ヒ瀉血シ。且右ノ方ヲ用  
 ヲヘシ。縱<sup>タト</sup>使<sup>ハ</sup>吐血既ニコレ有テモ可ナリ。此其諸  
 徵候。皆其患ノ將ニ來ントスルニ在カ故ナリ。○  
 若シ夫レ吐血スル一數度ニシテ。其證已ニ彰著  
 ナルニ及テ。之ニ加ルニ膿ヲ成スノ徵ヲ得ル一  
 アテハ。此其肺ノ癰膿スルノ証ナルヲ知ヘシ。  
 ○其時ニ當テモ。尚必ス其吐血ノ將ニ來ントス  
 ルノ徵有ル一無ヤト云テヲ視察スヘキナリ。此

内科要略 卷之九

其説ク所ノ如ク。唯<sup>チカラヲヨラトシ</sup>カ所<sup>ルケ</sup>及務テ先々ツテ治ヲ施  
スベキガ為ナリ。○迺其肺癰ノ証已ニ成ルニ至  
テハ。復々瀉血ノ宜キ所ニ非スト雖モ。然凡若シ  
吐血ノ將ニ來ントスルノ徵ヲ得ル<sup>テ</sup>アラハ。隨  
テ即チ尚前章ノ如クコレヲ禦サル<sup>テ</sup>ヲ得ズ。然  
ラズシテ廢テコレヲ行ハザレバ。則チ其吐血ノ  
証ヨリシテ<sup>イヨクマシク</sup>弥益凶惡ニ至ルカ為ナリ。○但宜ク  
其間兼テ第二十七章膿壞液ニ用ル所ノ藥ヲ益  
ヘ用ユヘキナリ。○其膿ヲ成スノ徵ヲ知ント要  
セハ。其咳吐スル所ヲ將テ<sup>シ</sup>諸ヲ水中ニ置テ迺チ  
知ベシ。膿ハ水ヨリ重キモノナリ。而シテ痰ハ則

又水ヨリ輕キカ為ニ。是ニ於テ之ヲ察スルトキ  
ハ。膿ノ有無。以テ明覈ヲ得ヘキノ也。

右第百四十六章。吐血ノ治法ヲ論ス。

内和抄  
卷之九

古書百四十六卷  
...

宇田川玄隨著

槐園藏板

寬政九丁巳歲季夏

東都書林

弘所

室町二丁目

須原屋市兵衛



