

○發賣之記

予ハ聊カ藥學ヲ修メ就中化學ノ術ヲ熱心シ且衛生上ニ注意スルヲ最ニ深ク本邦人ナリ
 大學醫學部教授獨逸國醫學博士ベルツ氏其他諸大醫ノ說ニ於テモ本邦ノ人民ハ概テ澱粉質タル米麥ノ如キヲ
 多食スルガ故ニ不消化病ヲ醸サマルモノ殆ド無ガ如シト夫然ラン然リト雖モ愛ニ天與ノ良藥即チ飴ナルモノ
 有テ其病因ヲ防禦シ大ニ人跡ノ健康ヲ保護スルナリ抑モ飴ハ吾人ノ常食トスル米麥小豆芋ノ如キ澱粉質食
 物ノ不消化タルニ化學的作用ヲ促進シ其物ヲ消化セシムルニ在リト既ニ支那國ノ如キハ遠ク千有餘年前ヨ
 リ其真理ノ如何ハ措キ只管ヲ經驗上ヨリノ不老不死ノ良能アリト云ヒ傳ヘリ本邦ニ於テモ又往古ヨリ飴ノ良
 能アルヲハ孀媪小兒モ已ニ知ル所ナリ夫レ飴ノ良能アルヲ斯ノ如シ然ト雖モ單ニ飴ノミヲ用テ病ヲ避ケント
 スルハ大ニ迂遠ノ法ト言フ可シ抑モ此ノ健胃ペプシチ飴タルヤ胃液素(即チ胃腸ノ消化作用)ト他ニ製酸強壯
 ノ劑及ビ健胃通利ノ良藥ヲ以テ飴ニ配伍シ精製セシモノナリ是即チ予ガ發明ニ係ル所ニ本欄ニ掲クル諸病
 諸症ニ効驗アルヲ敢テ喋々チ俟ザル所ナリ請フ愛求ノ諸君ヨ良効アルヲ試ミ江湖ノ該病者ニ流布アラバ衛生
 上ノ大利益予ガ本懷焉之ニ如シヤ

官 健胃
 MOR.EXT.
 PEPSIN
 C.QIUNIA
 強壯

ペプシチネ飴

大罐六拾目入 定價金四十錢
 小罐拾二文目入 定價金十五錢

許 官 強壯
 明治十七年三月創製 遠國ハ定價ノ外運賃ヲ申受クヲアリ

○藥劑性分

本劑ハ「ペプシチ」五分、糖酸キニート〇、五分、格魯兒曹達二、五分、複方
 酸敗液アレハ之ヲ中和シ胃液素ヲ増シ有害ノ釀造物ヲ轉シ有益物ニ化セシメ小腸ニ作用シ
 脾液ノ亞爾加里機能ヲ完全ナラシメ複方大黃越幾斯ヲ以テ膽汁ノ作力ヲ増シ以テ緩ニ通利
 ナ促進シ又タ飴ヲ以テ澱粉ヲ「デキストリン」其他ニ類化セシメ又規尼涅ヲ以テ強壯ヲ主トリ
 之ニ加フルニ健胃芳香ノ劑ヲ配伍シ方例ノ君臣佐使完備シテ以テ良能ヲ得ベキモノナリ且
 芳香甘味ノ此劑ニ此良能アル實ニ妙ト謂フ可シ矣

○布言

夫レ胃ハ命ヲ養フノ府タリ口ハ命ヲ養フノ門タリ人若シ食セザレバ即チ死ス
 ノ人民ハ習慣トシテ其物質ノ如何ニ拘ラス嗜味ノ一点ヨリ直接ノ中毒ヲナサザル限リハ探テ
 以テ食餌ト爲モノ、如シ故ニ不消化ノ食物ヲ厭ハズ否ナ知ラズ識ラズ之ヲ食シ或ハ運動不
 足等ノ爲ニ今ヤ病者ノ比例ヲ舉レバ不消化ニ原因スル者最モ多シト夫レ然ラン而シテ命ヲ養
 フノ府タル胃腸ニ病症ヲ醸スルハ譬バ水源ニ毒ヲ流シ或ハ風上ニ火ヲ放ツガ如シ之ヲ等閑
 ニ付スルハ大ナル害ヲ生ズ豈ニ忽スルヲ得ンヤ必シモ適應ノ藥用ヲナサザル可カラズ然
 リト雖モ食物不消化ノ如キハ慣習ニシテ其際一々良醫ヲ待タズ多クハ放拋自然ニ任セ爲ニ
 慢性ノ腸胃病ヲ患ルニ至ラシムル者甚シトモ是レ必竟芳味輕辨ノ適應藥ノ有ラザルニ基
 因スルカ抑モ此健胃「ペプシチ」飴タルヤ甘味ニシテ敢テ甘カラズ滴味ニシテ敢テ滴カラズ芳香
 温且良ナレバ幼兒婦女子ハ素ヨリ好酒家嗜甘家モ共ニ美味ヲ嘉シ好テ以テ藥用シ不消化ノ
 諸病ヲ治愈セシム可キノ良劑ト謂ザル可カラザルナリ

○主治効能

凡ソ留飲トハ總テニシテ其病症種々アリ
 雖モ皆本劑ヲ以テ良効アリ

○留飲諸症

○**飲食物停滯** ○**胃弱諸症**
 飲食物ヲ用レバ或ハ痛ミヲ發シ又動モ
 スレバ痛ミ食物消化アシキ種々ノ諸症

○消化不良

飲食物ヲスレバ兎角滯リ易
 消化ノ甚ク惡キニヨリ

○酸液過乘

酸氣ノ水
 ナ吐キ或

ハ黄色ノ水ヲ嘔シ又ハ嘔氣出テ
又ハ痛ミ飲食進マザルニヨシ
○胃弱便秘 食物消化アシク兎角ニ大
便ノ通ジアシキニヨシ

酒家胃病 胃ヲ痛メ酒ヲ用ユレハ一時ハ凌グモ又酒氣ノ
醒ルニ從ヒ痛ム者其他種々ナル症ニヨシ
○貪餅好甘家 菓子又ハ餅ヲ嗜ミ所謂ル留
飲ヲ發スル諸症ニヨシ

胃病 飲テ發スル諸症ニヨシ
○嗜茶家胃弱 茶ヲ多ク好ミ茶中ニ含ム單
尼涅ト云フ一物ニテ消化チ
司ル胃液素ヲ分解セシメ爲ニ不消化ヲ生シ痛ミ或ハ酸液ヲ醸スモノニヨシ

○小兒青便吐乳及ビ脾疳 小兒殊ニ乳離レノ際ニ或ハ乳ヲ吐キ又ハ
青便ヲ瀉スル者ニ最モ良効ヲ呈スルナリ
又此乳ヲ吐キ青便ヲ瀉スハ是レ消化アシキヨリ發スル者ニ病症ノ逞キニ至レバ瘰疔ト云
テ瘰疔ニ極メ疲勞一方ナラズ食物ヲ食リ動モスレバ涕泣シ終ニ衰ロヘ斃ス斯ノ如キ症ニ
永ク用テ其効アル事妙ナリ但
シ平常ノ飲物ヲ能注意スベシ

○食欲缺乏 更ニ飲食物ヲ好
マザル病ニヨシ
○胃腑知覺 以上揭ケタル胃
ノ諸病ノ久敷ク
不敏 熱キ物ヲ飲ムモ意トセス却テ快ヨク微温ノ
物ヲ嫌ヒ胃弱ノ諸症ヲ患フル者ニヨシ
○慢性胃弱 以上揭ケタル胃
ノ諸病ノ久敷ク
治癒セサル諸
症ニ神効アリ

○病後ノ衰弱 凡テ病ノ末期
ニ用井テヨシ
○肺病者ノ飲食 以上揭ケタル胃
ノ諸病ノ久敷ク
不進者 助シ榮養ヲ完全シテ回復セシムルナリ
○此他 シテ脾臟、肝臟迄モ破
損シ動モスレバ胸胃加答兒ヲ發シ或ハ面色常ニ黃白色ヲ帶ル者即チ酒ヲ非常ニ甘味物ヲ多
ク好ミ又ハ茶ヲ多ク喫シ或ハ單ニ暴食スル者或ハ飲食時ナラズ食シ又ハ飲食不同ノ者ニテ
胃ノ諸症ヲ患フル者ニ神効アルヲ實ニ希世ノ良劑ナリ

用法 男女老若チ問ハス飲食セシ后日ニ三回煙管ノ頭位宛用ユベシ十二歳ハ大人
ノ半量以下之ニ準ス白湯或ハ水ニテ用ユベシ但シ大人ナレバ大罐一個チ十日乃
至十五日間小罐一個三日乃至四日間ニ服スルチ量トス十二歳ヨリハ半量以下之ニ準シ減量
スベシ

攝生 成ルベク酒或ハ甘味物或ハ團子餅或ハ茶等ヲ多ク飲食スル
ヲ適宜ニスベシ諸藥食物等ニハ決シテ差合ナシ

内務省本免許藥舖 東京々橋區出雲町十六番地
資生堂本舖福原有信謹製
諸大醫先生調合所