KODAK Color Control Patches © The Tiffen Company, 2000
Kodak LICENSED PRODUCT
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19
Inches 1 2 3 4 5 6 7 8
Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ナ4
681
5

蘭醫抱獨英氏口授

第五

官版日講記聞

毎月必出一編

大坂醫學校

門ヤ 武4 681 巻5

日講記聞巻之五目次

陰具編

泌尿器病
○水尿崩
○糖尿崩

日講記聞巻之五

大阪醫學校教師和蘭醫官抱獨英氏　口授

陰具編

泌尿器病

○水尿崩

是ハ無味水様ノ尿ヲ夥ク利スルノ病ニシテ世ニ所謂ル消渴ノ一種ナリ而シテ通例兼ル二大渴、羸瘦、諸般ノ神經症ヲ以テス往古以來世人此病アルヿヲ知レリト雖モ真ニ其本性ヲ確定セシハ千八

百四十一年ノ後ニアリ剖屍ノ此ヲ視ルニ腎藏
増大肥實シ皮様質ノ細尿管ニ脂粒狀ノ物充盈
シ其尿内些少ノ卵白質ヲ胎メリ
徴候、此病ハ通例著ク健康ノ態ヲ傷ラスノ徐
徐ニ發スルヲ常トス或ハ早ク全身器質ヲ掠略
メ速ニ進歩スル者モ之アリ其正症ハ大渇ヲ發
シ口舌涸燥メ一日ニ五樊篤乃至三四十樊篤ノ
液ヲ飲ミ尿量モ亦増加メ一日ニ二十壯乃至三
十壯ノ尿ヲ利シ其甚キ者ハ四十壯乃至六十壯
餘ノ尿ヲ利ス尿ノ異重甚タ輕シ善性ノ症ニ在

テハ一零一零乃至一零一二ニ下ラスト雖モ一
零零六、一零零四、一零零一ニ下ル者多シ其尿、色
十ク臭十ク糖質ヲ胎ムヿナシ其成分ハ大抵常
尿ニ同シテ唯水分著ク増スノミ試尿藥ヲ以テ
此ヲ撿スルニ通例微ニ酸性ノ徴ヲ呈ス中性或
ハ亜尓加里性ノ徴ヲ現ス者ハ甚タ罕ナリ皮膚
滋潤無ク特ニ顔面ノ涸燥已甚フシテ其苦ヲ訴
ル者多シ或ハ異症ヲ發セスメ長ク自若タル者
アリ或ハ早ク全身違和ヲ覺ヘ頭痛、頭重、逆上、顔
面紅灼、神經痛ヲ發シ且ツ努力操作ニ堪サル者ア

リ或ハ食物不化、胃痛、失味、呑酸、頑固便閉ノ如キ消食器ノ患ヲ發シ軀體ノ重サ以テ漸テ益ヽ減シ精力加ヽ衰ヘ四肢倦怠、精神恍惚、冷氣ニ感スルヿ極テ敏、或ハ偶、腎部ニ疼痛ヲ覺ルヿアリ或ハ經過中ニ諸症暫ク靜止スルヿアレ𪜈真ニ病ノ癒ルニ非ス此病幼年ニ發スルキハ顕著ノ妨ヲ為サスノ徐々ニ增重シ婚嫁期ニ至テ依然ト同調ニ止ルヿ屢、之アリ大人ニ發スル者ハ急ニ極度ニ進ミテ數歲綿延ス其間時々輕快アレ𪜈持久セスシテ終ニ全治ニ至ルヿナシ

此病ハ通例幼年ニ發ス假令ヒ此期ヲ踰テ發スル者アレ𪜈多クハ幼年ヨリ釀シ出ス者ナリ男子ハ此ヲ患ヘ易クノ之ニ罹ル者婦人ニ二倍ス原因ハ詳ナラス或ハ遺傳ニ原クト謂ヒ或ハ情意感動、誓留寒冒、肝部挫傷、慓忤液ノ誤用、身體溫熱ナルニ乘ノ冷飲スル等ニ因ルト謂フ此病ハ頑固ニソ續々衰弱ヲ作シ健康ヲ傷ルヲ以テ假令ヒ之カ為ニ死セスト雖𪜈每常險重ト看做サスンハアラス此尿崩ハ次ノ蜜尿症ニ似タレ𪜈尿内糖分無キト其異重ノ輕キトヲ以テ鑒別ノ

候トスヘシ

治法、實驗ニ據ルニ強壯食料、保固強壯劑、鐵劑等ノ内服、温覆、温湯浴、蒸氣浴ヲ最佳トス或ハ阿芙蓉或ハ纈草或ハ結列阿曹篤ノ功ヲ稱スル者アリ古來此病ニ稱譽スルノ藥品甚タ多シト雖モ實ニ其功ヲ立ル者ナキヲ以テ一々其品ヲ開載セス

○糖尿崩　一名蜜尿崩

是葡萄糖ヲ尿内ニ排洩スルノ病ニメ通例兼ル二大渴、多尿、精力虛脫ノ症ヲ以テス而シテ亦消渴ノ一種ニ屬ス

古來尿崩ノ書記アリト雖モ蜜尿崩ト水尿崩トノ差別ナカリシニ似タリ千六百七十四年ニ至テ尿崩ニ甘味ノ尿ヲ排洩スル症アルヿヲ發明シ厥後久シテ英國舍密家尿内ニ糖分アルヿヲ試檢セリ其他高名ノ魯尓羅氏世ニ出テ胃腑ハ此病ノ源ニメ糖分ヲ釀出スノ處トシ腎ハ之カ為ニ累感セラル者ト云フ自此シテ世醫澱粉質ヲ胎ム食物ノ糖質ニ化スルヿヲ知リ此病ニ專ラ肉食ヲ用ルヿヲ創メタリ千八百五十二年以後ニ

至テ蜜尿ハ物質交代ノ變常ニ作ルヿヲ檢査シテ此ニ兩時期ヲ區別シ第一期ニ在テハ尿内ノ葡萄糖專ラ糖質、澱粉質ヲ胎ム食物ヨリ生シ第二期ニ在テハ毫モ右等ノ食物ヲ用ヒス單ニ肉食ヲ用フト雖モ機體成分ヨリ糖質ヲ化成スル者トセリ別示那兒獨氏ハ腦ノ第四腔底ヲ刺メ人工ノ蜜尿ヲ將來シ得ルヿヲ發明セリ其說蜜尿崩ノ本性ヲ盡サスト雖モ亦一照考ニ備フヘシ近世ニ至テハ肝藏内ニテ糖分ヲ釀成スル所以ヲ檢査シテ此不可思議ノ病ニ井然タル條理ヲ立テタリ

剖屍ノ之ヲ視ルニ腎藏ハ早ク增大腫脹シ特ニ髓樣質ノ毘刺密埜體肥實セリ然モ其構成ハ毫モ變常スルノナシ偶變常スル者アルハ其運營尤盛ノ所為ニ出ツ、肝藏モ有時テハ腫脹增大スレモ他變常アルヿナシ若シ之アルハ亦其運營尤盛ノ所為ニ出ツ故ニ此病ノ糖分ヲ駁ク釀成スルハ肝藏ニ在テ此ヲ排洩スルハ腎藏ニ在リト看做スヘシ然モ此病長ク續クヿハ他ノ器藏モ累感ノ諸般ノ症ヲ發スルアリ、特ニ肺藏ノ結核

腫ヲ生スル者其四分ノ三ニ居レリ是世ニ蜜尿ノ患者ハ大抵皆季期ニ至テ肺勞ノ素質ヲ現スト言フ所以ナリ其他喜ク傍發スル症ハ腦膜嗽衝兼腦水腫、腸管粘膜、肥實症、肺嗽衝、四肢、寒壞疽、白内障ノ如シ、或ハ其白内障ニ羅レル水晶體中ニ糖分ヲ胎ミ或ハ此患者ノ血漿、發泡膏ノ泡液ニ糖分ヲ胎メルフアリ常体ニ在テハ肝藏ニ胎ムノ糖分僅ニ百分ノ一五五ナルニ此病ニ在テハ増加シテ百分ノ一、七九ナルアリ、其他心藏ノ筋膜ハ糖分ヲ胎ムフ百分ノ零、三一、腎藏ハ百分ノ零、二七、脾藏ハ百分ノ零、一三、肺藏ハ百分ノ零、二二ナリ而、腦ハ毫モ此ヲ胎ムフナク、膵、胸膜、汎乙、心嚢、汎乙、胆汁、動脉血、静脉血ノ糖分ハ定量アルフナシ、其屍ニ存セル尿内ノ糖分ハ百分ノ二、五十リ

徵候、　初起諸症曖昧ニノ瞭然タラス唯一身倦怠ヲ覺ヘ精力徐ク衰ヘ體ノ重サ漸ク減スルヲ見ルノミ継テ口内著ク涸燥シ舌苔ナクノ煩渴ヲ發スルフ宛モ水尿崩ニ於ルカ如シ唾液ハ粘稠メ常體ニ於ルヨリモ濃膠、試檢藥ニテ此ヲ査ス

ルニ通例酸性ノ徴ヲ現ハシ毫モ糖分ヲ胎ムヿ
ナシ齒牙ハ病ノ經過中ニ朽蝕ス渴ハ此病ノ一
主症ニメ早ク極度ニ至ル者ナリ熱及渴ヲ作ス
ノ他症ナキニ然ルヲ以テ最モ此ニ着目セサルヘ
カラス但シ初起早ク的當ノ食料ヲ用テ尿内ニ排
洩スル糖分ノ量減スル片ハ渴モ亦姑ク歇ムヿ
アリ、抑渴ノ發スルハ夥ク糖分ヲ釀出スニ由ラ
ス唯、體内ノ水分夥ク費耗メ喉頭、口内涸燥スル
ニ由ル者ナリ故ニ水尿崩ノ糖分ヲ排洩セサル
ニ大渴ヲ發スルト同一理ニ歸ス食欲ハ平素ニ

異ナラス或ハ却テ常度ニ倍シ唯、死期ニ瀕スレ
ハ始テ其減スルヿアルノミ、若シ誤テ食欲ノ盛ン
ナルヲ見テ此病ノ源ト做シ乃チ消食機ヲ支テ以
テ糖分釀成ヲ遮ラントスルハ惑ナリ病ヒ極度ニ
至レハ愈、訝ルヘキ多量ノ食物ヲ用ヒ却テ愈、削
瘦スル者多シ特ニ此患者ハ果實ヲ嗜ムヿ已甚
シ是唯、煩渴ヲ消センカ為ノ良能ニメ飲液ヲ呼
フト同一致ニ出ツ消食機ノ不化症即チ悪心嘔吐
等ノ如キハ亦唯、病末ニ之ヲ見ルノミ大便通利
ハ稍、遲澁シ食品宜キニ適フ片ハ常例ニ異ナラス

唯季期ニ至テ頑固ノ下利ヲ發スルヿアルノミ通例熱及血行、呼吸ニ係ル症ハ全ク闕如スト雖肺結核、肺炎衝等ノ如キ合併病アルトキハ乃チ此症ヲ發スルヿアリ皮膚ハ涸燥ノ剥屑スルヲ常トスレトモ有熱病ヲ合併シ或ハ季期ノ肺結核ヲ夾ムトキハ乃チ微汗盜汗ヲ發スルヿアリ獨リ小便分泌ハ非常ニ增加スレトモ其他ノ諸分泌ハ皆減少ス男子ニ在テハ精液ノ分泌著ク減スルヲ以テ速ク陰萎ニ陷ル者ナリ、婦人ニ在テハ月經始ノ不整ト為リ継テ全ク閉止ス皮膚温度モ減少シテ大甚ク悪寒ヲ作ス者多シ神經系ハ諸般ノ異症ヲ發ス即チ頭痛、腰痛、四肢痠痛、關節麻痺、衰弱、神思不安、活起、怯恐、悲哀或ハ乍チ冷乍チ温ナルヲ覺ル等ノ如シ病ヒ進歩スルトキハ視力亦衰フ檢眼鏡ヲ以テ其眼ヲ候フニ黒内障ノ症狀ヨリモ白内障ノ症狀ニ罹ル者多シ善ク病勢ヲ遮ラサルトキハ羸瘦、脱力、憔悴、景況日ニ加ハリ脱衰ノ極ニ至テ終ニ死ニ歸ス

此病ノ看法ハ右件ノ諸症ヨリモ尿量尿質ノ變常ニ着目スルヲ最緊要トス煩渴ト共ニ尿量ノ

増スヿ頗ル著シ晝夜ヲ分タス頻々尿ヲ催フシテ之カ為ニ夜眠ヲ妨ケ毎次多量ノ尿ヲ排洩スル二六時中ニ通スルノ量大約六ヒ乃至十ヒナリ、加之二六時中ニ十二ヒ十六ヒ乃至二十ヒノ尿ヲ利スル者モ罕トセス利尿ノ量ハ大抵飲液ノ量ニ匹敵ス、通例釀成スル所ノ糖量増スヒハ尿量モ亦隨テ増加スルヲ常トス但シ糖分著ク増ス二尿量ハ均ク増サヽル者間之アルヲ以テ其比例ハ不易ノ定則ト為シ難シ此患者ノ尿ハ初起早ク固有ノ臭色ヲ變シ其異重ハ速ニ増加ノ忽

チ一零三零、一零四零、一零六零、一零七零以上ニ至ル、通例此異重ノ多寡ヲ以テ糖分ノ多寡ヲ判断スト雖モ其異重ハ必シモ正ク糖分ノ多寡ニ符合セス即チ晨タニ利スルノ尿ハ異重偏勝スレモ糖分ハ偏勝セサルヿアリ是恐クハ晨タニ利スルノ尿ハ尿素、尿酸塩ノ偏勝スルニ因ルナルヘシ糖分ノ量初期ニ於テハ正ク用ル所ノ糖質、澱粉質ヲ胎ム食物ノ量ト符合スレモ病漸ク歳月ヲ經ルヒハ全ク是類ノ食物ヲ用ヒスト雖モ糖分ノ量ハ日〻ニ増加スル者ナリ尿内糖分百分ノ一、

乃至一、五ナルハ至少ノ量トス百分ノ三乃至五、ナルモ罕トセス往々百分ノ六乃至七餘モ利スル者アリ或ハ同一患者ニメ二六時中ニ利スル糖量百八十匁乃至五百匁ノ差アルヿアリ或ハ病進歩スルニ隨テ其量六百五十六匁ニ至リ終ニ一日一忙餘モ利スト云者アレモ是他部ヨリ排洩スル糖分モ共ニ筭スルノ量ナリ此糖ノ性質ハ尋常ノ葡萄糖ニ同シ或ハ尿糖ヲ一異種ノ物トセシ者アレモ未其證ヲ得サルナリ尿内糖分ノ有無ヲ査點スルノ法數般アレモ日用簡便ノ一法ヲ掲示ス、其法、腐蝕加里濃溶液ヲ取リ尿ニ加ヘ火ニ上セテ熱セシム糖分存スルヿハ其液忽チ黄色ト為リ次ニ褐色ト為リ終ニ全ク黯褐色ト為ル継テ修兒ヲ取テ此ニ加ルヿハ一異烈臭ヲ發ス是糖ノ燃ルノ候ナリ其色ノ轉變スルモ亦鑒定ノ微トスヘシ、此檢査法ハ別ニ含密裝置ノ設ヲ要セス臨時一片ノ腐蝕加里ヲ藥鋪ニ買ヒ此ヲ糖尿ニ和シテ錫匙ニ盛リ蠟燭ノ炎ニ抵テ熱セシメテ足レリ故ニ貧家ニ在テモ能行フヿヲ得ヘシ

此病ハ急性ノ者罕ニシテ慢性ノ者居多シ慢性ノ者モ治ヲ加ヘスシテ自然ニ任スルトキハ一歳ヲ踰ヘスシテ斃ル者アリ然トモ其經過ノ修短ハ毎常確定スルヿ甚タ難シ何者通例口内、涸燥、煩渇、羸瘦ヲ以テ其初頭ト為セトモ此諸症ノ未タ發セサルニ前テ既ニ久ク尿内ニ糖分ヲ排洩スル者之アレハ十リ攝養宜キニ適フトキハ能ク多年ヲ渉ル者アリ特ニ此病ハ勉テ糖質、澱粉質ヲ胎ム食料ヲ遠レハ能ク多歳ヲ閲テ十年廿年モ其命ヲ保ツ者アリ或ハ其間暫時尿内ニ糖分ヲ排洩セサルヿアリト雖トモ真ニ治スル者ナクシテ早晩必ス之カ為ニ死ス或ハ食規宜キニ適フテ之カ為ニ死セサルモ他病合併ノ之カ為ニ死スルアリ或ハ他病合併セス食規宜キニ適フトキハ本病治セスト雖トモ亦能ク高老ニ至ル者アリ

第一期ニ在テハ糖質、澱粉質ヲ胎ム食物ヨリ尿糖ヲ生シ第二期ニ在テハ是等ノ食品ニ係ラスシテ多量ノ尿糖ヲ生スル所以ハ既ニ説示スルカ如シ、是尋常純ハラ窒素ヲ胎ム食品ヲ用ユル獣類ニ於テ亦目擊スル所ナリ、故ニ蜜尿ノ患者極テ

細心ノ毫モ糖質、澱粉質ヲ胎ム食品ヲ用ヒサル
ニ其尿内日々多量ノ糖分ヲ排洩スルハ即チ此病
ノ第二期ニ之實ニ危險ノ秋トス抑此患者多量
ニ穀内ヲ併用スル代ハ暫時ニノ多量ノ糖分ヲ
排洩ス然モ食物ヨリ生スルノ糖分ハ二時ヲ過
レハ過半尿内ニ出テ去リ四時ヲ過レハ全ク尿
内ニ謝出スル者ナリ故ニ第一期ニ在テハ四時
間ヲ過レハ糖分ノ排洩全ク歇ムヘシ然モ第二
期ニ在テハ此時間ヲ過レモ仍糖分ヲ排洩ノ歇
マス是レ體中成分ヨリ釀成スレハナリ是故ニ此

病ノ時期輕重ヲ診決スルニハ其朝餐前ニ利ス
ルノ尿ヲ取テ檢査セサルヘカラス而其尿毫モ
糖分ヲ含マサル代ハ其病仍第一期ニ住マル者
トシ多少糖分ヲ含ム代ハ既ニ第二期ニ轉スル
者トス而其糖量愈多キ時ハ病愈進歩スル者ト
決スヘシ
此患者ノ死ハ必其第二期ニ轉スル後ニアリ則
單ニ脱衰骨立極ッテ斃ルアリ或ハ合併症ニ由
テ斃ルアリ其合併症ハ從前至健ノ消食器忽チ
障碍ニ羅テ胃痙或ハ慢性ノ胃及腸加荅流斯ヲ

發シ或ハ胸膜炎衝、肺炎衝、氣管枝炎衝、肺結核ヲ發スルカ如シ、肺結核發スルトキハ腸及他ノ器藏モ同シク此ニ羅ルヿアリ或ハ腦膜炎衝、頭痛、頭重、譫語、昏睡ノ如キ腦水腫ノ諸症ヲ發シテ速ニ脫力スルアリ或ハ此諸症ニ先テ搐搦ヲ發スル者亦多シ季期ニ於テ偶〻有熱急性病ヲ合併スルトキハ能〻尿内ノ糖分ヲ減スルヿアレ𪜈此ヲ以テ佳兆ト為シ難シ肺結核ノ如キハ屢〻發熱シ其熱終ニ稽留性ト為ルト雖𪜈此ニ由テ糖分減メ本病治スルモノニ非レハナリ或ハ寒壞疽性ノ皮膚炎衝ヲ發メ終ニ骨壞疽ニ轉スルアリ卵白尿、貌麗都腎病モ亦糖尿季期ノ合併症ニ屬ス

此病ノ源因ニ至テハ種々ノ臆說アレ𪜈其理穩ナラサル者多シ蓋シ此病ハ暖國熱國ニ多クメ各國一般ニ行ハル者ニ非ス男子ハ婦人ヨリモ此ヲ患ルヿ多ク體質ニ拘ラス無病健全ノ徒ヲ犯シ易シ、又年齡ヲ問ハスメ發スト雖𪜈幼年ニ少ク卅歲ヨリ四十歲ノ間ニ最モ多ク六十歲ヲ踰ル者モ亦此ヲ免ルヿナシ攝生裕富ニメ食規ヲ嚴守スルノ徒モ此ヲ患ルヿ多キカ故ニ必スシモ

貪宴多房、飲食放恣ニ起因スル者ニ非ス但シ外來ノ感動特ニ頭及ヒ背ノ創傷激衝ハ善ク此病ヲ誘起スルニ似タリ

獸類ニ於テ此ヲ實驗スルニ其肝藏ヲ直徑ニ刺戟スルトキハ夥ク糖分ヲ釀成ス喻ハ肝藏ノ挫傷創傷、肝藏脉管内ニ安母尼亜ヲ注射スル等ノ如シ神經系特ニ肝藏交感神經ヲ介トシ隔徑ニ肝藏ヲ刺戟スルトキモ亦然リ腦ノ第四腔底即チ肺胃神經生スル所ノ一部ヲ刺戟メ尿内ニ糖分ヲ生セシムルハ實ニ確切ノ試驗ナリ、又腦ノ第四腔底ニ於テ聽神經ト蔓延神經ノ源ニ在ル中間虛地ノ上部ヲ刺戟シテ水尿崩ヲ作シ其下後部ヲ刺戟シテ糖尿崩ヲ作シ其上下兩部ヲ一齊ニ刺戟シテ水尿崩ト糖尿崩ヲ併發セシムルモ亦最要ノ試驗ナリ肺胃神經ヲ切斷メ其下端ヲ刺戟スルトキハ糖分ノ釀成增加セサレモ其上端ヲ刺戟スルトキハ肝藏神經ノ反應機ニテ糖分ノ釀成忽チ增加ス其上端ハ延髓脊髓ニ由テ肝藏神經ト吻合スルハナリ又腦ノ第四腔底ニ限ラス神經系中心ノ他部ヲ刺戟スルモ亦能ク糖尿ヲ作シ得

ルフアリ前件ノ諸試驗ヲ照考スルトキハ第一期ニ在テハ肝藏ニ於テ糖質、澱粉質ヲ胎ム食物ヨリ糖分ヲ釀成シ第二期ニ在テハ體中ノ滋養分ヨリ此ヲ釀成スルニ似タリ

蜜尿ノ看法ハ難カラスト雖モ往々全ク病性ヲ辨ヘスメ看過シ季期ニ至テ始テ此ヲ認得ルノ弊アルヲ以テ常ニ左則ニ着目スルトキハ大ナル惑莫カルヘシ即チ熱及ヒ脱液等ノ因ナキニ頻ニ渇ヲ發シ口内喉頭ノ涸燥ヲ訴ル患者ニ遇フ毎ニ丁寧ヲ極テ其尿ヲ點檢シ特ニ其色、其量ト飲液ト

ノ稱對ヲ商慮セサフヲ要ス然ルトキハ水尿崩モ同一ノ症ヲ發スルヲ以テ更ニ檢尿法ヲ舉行フテ尿内糖分ノ有無ヲ覈質セサルヘカラス病ヒ仍初期ニ在ルカ將タ既ニ進歩セルカヲ知ラント要セハ尿質、尿色、及ヒ其異重ノ轉變ノミナラス特ニ糖量ノ轉變ニ注意セサルヘカラス則糖量過多ナルトキハ試ニ糖質、澱粉質ヲ胎ム食物ヲ禁セシメテ其尿ヲ檢査シ而糖量仍存スルトキハ更ニ食後六時ヲ踰テ此ヲ檢査シ且ツ兼發症ノ有無ヲ照考スルトキハ其第一期症或ハ第二期症ナルフヲ確定

シ得ヘシ

此病ハ毎常危篤ト看做スヘシ然ヒ尿内ノ糖量猶未タ多カラス全軀羸瘦猶未タ甚カラサルヒハ猶安候トス何者攝生食料宜キニ適ヘハ急ニ大患ニ陥ラスメ能ク性命ヲ保チ得レハ十リ糖量既ニ多ク患者大ニ羸瘦シ糖質ヲ胎ム食物ヲ斷スト雖ヒ其景況佳候ヲ呈セサルヒハ甚タ危嶮ノ兆トシ既ニ肺結核ヲ生スルニ至テハ數月以内或ハ半歳若クハ一歳ノ間ニ其性ト為ルノ徴ト シ兼發ノ寒壞疽、氣管枝炎衝、肺炎衝、劇性腦患等ヲ發スルヒハ瀕死ノ候トス

治法、食規攝生ヲ要務トスル丁蜜尿ノ如ク切ナル者ナシ糖質、澱粉質ヲ胎ム食物ノ中ニ就テ尋常蒸餅ハ最モ悪シトス此ニ代ルニ麩製蒸餅ヲ以テスル者アレヒ病人ニ由テハ持久メ用ルニ堪ヘサル丁アリ近來滋養分ノ多キ良好蒸餅ヲ創製ス是即チ麩質六分一乃至四分一ヲ配調スル者ニメ尋常蒸餅ト麩製蒸餅ノ間ニ居レリ尋常蒸餅ヲ全ク斷スル丁能ハサル患者ニハ此新製蒸餅ヲ少量宛與テ佳其他米、馬鈴薯、豆類、栗子、

甘味果實、特ニ葡萄、梨子、林檎、梅李等モ亦用テ宜シカラス乳汁モ乳糖ニ富ムヲ以テ的當ノ食品ニ非ス、但シ乳酪、乳酥、乳婆膜ハ用テ佳動性食物ハ総テ此患者ニ用テ可ナレトモ同一ノ肉食ヲ連用セス時々其品ヲ交換メ與ヘシ然ラサレハ胃機ヲ損シ或ハ嫌悪ヲ作スノ弊アリ肉食ノ中ニ就テ用ヘキ品ハ牛肉、犢肉、羊肉、雞鴨、鳧雁、豚肉ノ如シ、古人豚肉ヲ此病ニ稱譽スレトモ未タ確實ノ功ヲ見ス総テ此等ノ食品ハ患者ノ常習、好悪、其胃ノ一異性ヲ思顧メ取捨セサルヘカラス細ニ之ヲ

言ヘハ獸蓄ノ筋肉、腦、腎、心、肺ハ用テ可ナレトモ肝藏ハ糖分ヲ含ムヲ以テ用ヘカラス又肉食獸ノ肉ハ蔬食獸ノ肉ヨリモ此患者堪易シ但シ猫肉、狐肉ハ宜カラサルヘシ魚介ハ海産ト川産トヲ論セス大抵皆食フヘシ卵ハ用テ可ナレトモ多量ニ與フ可カラス蛞蝓、蝦蟇モ亦交換シ用テ佳蔬菜、菌類モ良性ノ物ハ用テ佳飲液ノ中ニ就テ葡萄酒、燒酒ハ用テ佳、但シ多量ニ用ヘカラス、佛郎製ノ赤葡萄酒、特ニ收斂性ノ葡萄酒ハ益アリトス、日々此ヲ半瓶或ハ一瓶用ヒ平素此ニ馴ル人ハ尚多

ク用テ佳、但シ甘味ノ酒類、麦酒等ハ禁スヘシ肉羮汁、蔬菜或ハ麩質ヲ加ル羮汁、茶或ハ骨喜ニ些少ノ流謨、乳婆膜ヲ加ル者等ハ皆用テ可ナリ渴劇シキ時ハ曹達水、炭酸含胎水ヲ的當トス少量ノ亜尓箇兒ヲ加ヘ用レハ愈佳、是等ノ飲液ニテ猶渴ヲ消スルニ足ラサルトキハ括矢亜、葎草其他苦味藥ノ飲料ヲ製シ用ユルニ宜シ食饌ニ臨テハ常水ノ代リニ亜尓加里性礦泉、鑛鉄水等ヲ用ルヲ佳トス、但シ此患者ハ力所及飲液ヲ減シ食物ハ徐々ニ熟ク咀嚼ノ少量ヲ用ヒ飲食共ニ其欲ニ充

タサルヲ貴フ頭頂ヨリ足端迄善ク一身ヲ温覆シテ四時ヲ問ハス好時候ニハ温湯ニ浴シテ皮膚ノ運營ヲ振起催進スルニ宜シ肢體猶健ニメ病猶初期ニ在ルトキハ海水浴ヲ施サシメテ佳患者自ラ配意ノ濕潤觸冐ノ事件ヲ避クヘシ微微身體ヲ運動ノ佳、但シ疲勞スルニ至ルヘカラス此患者ハ純ラ動性食物ヲ與テ澱粉質、糖質ヲ胎食物ヲ禁スルハ從來一般ニ信用スルノ説ナリ、然ルニ近來澱粉質ヲ胎ム食物ヲ全ク禁スルヿヲ止メタリ何者其食規ニ從ヘハ糖分ノ排洩暫時減

少スト雖モ糖尿病ハ治スルヿナク且數年間此食規ニ堪ルノ患者少ナケレハナリ、日々少量ノ蒸餅ヲ許スヿハ患者ノ體力能ク他療法ヲ施スニ堪ヘ且此ニ由テ害ヲ引クノ恐ナシ、若此ヲ許サヽルヿハ久ク其禁ヲ守ルヿ能ハス遂ニ嗜ム所ノ蒸餅果實ヲ過食シ却テ害ヲ招クヿアリ又多ク飲液ヲ用レハ糖分ノ排洩増シ此ヲ用ヒサレハ其排洩減スト雖モ渴ヲ消セシメサルハ亦宜キ所ニ非ス實ニ渴ヲ忍ヘハ糖分ノ排洩著ク減スト雖モ久ク此ヲ忍フヿ難シ故ニ渴ヲ消スル

ニ足ル許ノ飲液ハ與テ可ナリ

醫藥ハ有名ノ品多シト雖モ其名其實ニ當ル者鮮シ種々ノ醫藥ヲ雜投スルハ益ヲ為スヨリモ却テ害ヲ為スモノナリ近世已甚ク亜尓加里劑ヲ稱譽スル者アリ是此病ノ因ハ一異酸ニ在リトシ以テ之ヲ中和セントスルノ意匠ニ出タリ曽テ試ニ重炭酸曹達ヲ取リ一匁二匁ヨリ漸ク増量シ半弓迫連用スルヿ二三週間ナリシニ全ク功ヲ收メシヿナシ又體中ニ窒素ヲ賦與センカ為ニ炭酸安母尼亜ヲ稱譽スル者アリ試ニ此

藥一戔乃至二戔、水四弓乃至六弓、溶和メ一日ニ與ヘ或ハ此藥四刃、流謨五戔、水四弓、溶和メ三回ニ分チ毎食餌前ニ用ヒシメタリ此法モ屢〻試驗セシニ功ヲ奏セシフナシ夫神經系ヲ刺衝メ人工蜜尿ヲ作スノ試驗ニ據リ腎ノ動機ヲ減却センカ爲ニ阿芙蓉ヲ稱譽スル者アリ因テ拖歇尔斯散四氏或ハ五氏宛毎タ用ヒ或ハ阿芙蓉越幾斯四分氏或ハ半氏ヲ丸トシ用ヒ漸ク增量メ十二時間ニ一氏二氏乃至三氏ヲ用テ屢〻試驗セシニ毎次其功ナク却テ之カ爲ニ消食機ヲ傷フノ弊ヲ目擊セリ近世又體中糖分ノ缺損ヲ補ハンカ爲ニ亜尔箇兒劑、列貌、并ニ麦酒酵ヲ稱譽スレトモ亦益ナクシテ却テ害アリ肝藏ノ機能ヲ復良センカ爲ニ牛胆ヲ用フル者アリ是亦臆說ニ屬ス總テ醫藥ノ功否ヲ驗セントト欲セハ試ニ一二週間全ク醫藥ヲ斷チ繼テ復此ヲ舉用ルヿ同日間如斯ク取捨スルノ際ニ日々尿量、異重、渴及糖分ノ增減、全體ノ景況等ヲ比較スルトキハ其功否明カナルヘシ近世著ク姑息ノ卓功ヲ得シ者ハ獨リ鉄劑ナリ其用法ハ食餌毎ニ還元鉄二氏乃至三

氏宛用フ、此藥第一期ニ在テハ無益ナレヒ第二期ニ在テハ糖分ノ釀成ヲ著ク挫クノミナラス精力ヲ補托シ體質ヲ復良スルノ偉功アリ兼テ毎日兩三回精撰ノ機那酒ヲ併用スル氏ハ其功愈顯著ナリ其他機那劑、苦味劑、強壯劑ヲ用テ屢試驗セシト雖ヒ其功皆姑息ナルヲ以テ高ク其德ヲ頌スルニ足ラス酸劑、收斂劑等ヲ稱譽スル者アレヒ皆持久ノ功績ナシ傍發症ノ治法モ亦一大緊要トス則病經過中ニ發スル消食機不化症ニハ苦味劑、亜尓加里劑ヲ用ヒ、頑固ノ便秘ニハ緩下劑、下利ニハ阿芙蓉劑、消酸銀結核症ニハ肝油加沃鉄劑、胸脈衝ニハ少量吐酒石、發泡膏ヲ防脈劑トシテ處スヘシ約メ言之ハ第一期ニ在テハ食規攝生法ヲ嚴ニシ無益ノ醫藥ヲ妄投セス第二期ニ在テハ鉄劑、保固強壯劑ヲ與ヘ傍症蜂起セハ仔細ニ診視シテ各自對症ノ方法ヲ處スルヲ要トスル十リ

官版
製本所
大坂心齋橋通唐物町
河内屋吉兵衛
同通安堂寺町
秋田屋善助

日講記聞卷之五

大阪醫學校