



蘭醫抱獨英氏口授

第六

官版日講記聞

每月必出 編 大坂醫學校



日講記聞卷之六目次
陰具編

男子生殖器病

○遺精附陰痿

○攝護液漏

○攝護液衝

○攝護肥大

○副罩焮衝

○罩丸焮衝

○罩丸癌腫



○畢九結節腫

○畢九截除法



日講記聞卷之六 三四頁 正八頁 辭 授

大坂醫學校教師和蘭醫官抱獨英氏 口授

陰具編

男子生殖器病

○遺精 附陰痿

夜中快夢ナク陰莖半勃舉ノ累ニ精液ヲ漏ラシ
 或ハ晝間ニモ此ヲ漏ラス者ヲ斥ノ遺精ト稱ス
 此病ニ罹ル時ハ身體精神共ニ衰レムヘキ變常
 ヲ作ス者ナリ其最因ハ手淫ナリ自餘過度交媾

淋疾、痔疾、尿道變窄、膀胱結石、直腸、蟻蟲、小腦疾患等ヨリ作ル者モ亦之アリ其近因ハ膀胱頸、輸精管、精囊等ノ刺衝状ニ在テ其粘膜炎性ノ覺機過敏ニ罹レリ、有時テハ眼、鼻、咽喉ノ粘膜炎モ亦過敏ト為レルコトアリ少年ノ手淫ニ耽ル者ハ其初意識ニ感動ノ精液ヲ漏洩スルユヘ快夢或ハ腦神活起ノ機ニ乘ノ遺精スレバ漸ク局處ノ刺衝状増盛スル時ハ睡中或ハ上厠ノ時不覺不知漏精シ終ニ習癖ト為ル時ハ一週間ニ五六回或ハ二六時中ニ二回或ハ三回發スルニ至ル其精液ハ

多量ニ漏ルト雖其粘質ナク甚々稀薄ニ一異ノ烈臭ヲ放ツヲ徵トス如斯キ精液費耗ハ早晚必全身ノ和ヲ賊ハサレヲ得ス則先消食機ノ損敗、便秘、頭痛、神經性顫振ヲ發シ漸ク歲月ヲ經ル時ハ心悸、眩暈、睡寐不安、四肢冷厥ヲ作シ全身一異ノ精液臭ヲ放テ其人同僚ヲ忌避ケ遂ニ恐怯失意ノ態ニ陥ツ陰莖ノ勃舉完キヲ得ス畢丸削瘦シ股間、陰囊、會陰ニ麻痺或ハ寒冷ヲ覺テ陰痿モ亦經久遺精ノ一擄症ニ屬ス其滿發症ニ至テハ記憶ヲ亡シ所業兇戲

ニ類シ癩癩及精神錯乱ヲ發スルニ至ル
 治法、カ所及速ク其治ヲ下スヲ要ス、逾長ク之
 ヲ懈レハ、逾深ク陰痿及廢疾ニ陷レハナリ、輕症
 ハ誘因ヲ除キ或ハ簡易ノ方法ヲ處メ能ク治ス
 ヘシ則適宜ノ攝生ヲ守リ大便通利ヲ整ヘ開豁
 氣中ニ運動シ冷水浴ヲ施シ薰蒸ニ卧スル等ノ
 如シ局外ノ覺機已甚ク亢盛スル時ハ會陰ニ蟻
 針ヲ貼シ收斂鎮痛ノ注射法ヲ施スヘシ、喻ハ、鉛
 糖、阿芙蓉各三氏、蒸餾水一弓溶和ノ一日兩次注
 射セシムルカ如シ然レ病既ニ滿發シ特ニ常習

手淫ニ起ル症ニ在テハ諸般ノ方法ヲ舉行ハサ
 ルヘカラス中ニ就テ先施スヘキ最良局處法ハ
 燒蝕法ナリ、此法ヲ施サレハ他法ヲ施スモ全
 治ヲ遂ケシムルニ縁ナシ、燒蝕法ヲ施スニ前テ
 預テ蒲施或ハ銀加多的兒ヲ以テ仔細ニ尿道ヲ查
 點シ確切ニ刺傷状ノ所在ヲ認ムヘシ、其所在ハ
 通例膀胱頸ノ後側排洩管口ノ邊、雞冠ノ前端ニ
 ノ療具微之ニ觸ルレハ覺機過敏ニシ患者之カ
 為ニ驚縮ス有時テハ覺機過敏尿道ノ全面ニ布
 行シテ蒲施ヲ挿入スルヤ否ヤ忽チ劇痛昏冒ヲ

作ス₁アリ既ニ其所在ヲ審察セシキハ硝酸銀
 晶小片ヲ腐藥裝ニテ其部ニ輸タシ之ヲ住マラ
 シムル₁僅ニ五設昆度乃至十設昆度乃₁慎重ノ
 引退ケ以テ鎮靖ノ刃ヲ取ルヘシ若シ長ク住マ
 ラシムルキハ其刃ナク₁却テ害ヲ招ク₁恐ア
 リ既ニ燒蝕法ヲ終ヘシキハ冷水ニ少許ノ甘消
 石精ヲ加テ患者ニ與ヘ防焮ノ攝生ヲ命スヘシ
 若シ劇性疼痛或ハ尿閉症作ルキハ香竈阿芙蓉
 液ニ龍腦ヲ配用シ或ハ謨尔非涅ヲ與フヘシ此
 手術ハ通例八日毎ニ反復シ病的ノ覺機過敏全

ク退ク₁度トシ止ム其回数ハ固ヨリ症ニ應メ
 異ナルヘシト雖₁要之大抵二回乃至五回ニ
 足レリトス
 或ハ硝酸銀晶ノ代リニ硝酸銀十₁乃至一₁莖
 餉水一₁弓ノ溶液ヲ施ス者アリ其法十日毎ニ反
 復シ每次尿後直ニ施スキハ愈益アリト云
 冷水全身浴及冷水局處浴ハ往々此病ニ施ノ良
 驗アリ即₁冷水槽内ニ坐シ或ハ冷水ヲ會陰陰囊
 陰莖、股内側ニ灌クカ如シ神經質ノ徒ハ冷水浴
 ニ堪ヘス₁却テ温湯浴ヲ喜ム₁アリ宜ク斟酌

ノ施スヘシ有時テハ冷水灌腸ヲ二六時中ニニ
 回宛施メ大ニ輕快ヲ覺ル_レアリ初期ニ在テ患
 者猶多血ノ候ヲ現ハス_レハ會陰ニ蜈針ヲ貼シ
 繼テ發泡膏、水銀膏、小貫線法、打膿法ヲ施スニ宜
 シ高處ノ刺衝狀愈太甚キ症ニハ愈_レ的當トス尿
 道過敏汎ク蔓リ且、頑滯ノ退カサル時ハ毎日兩
 次消酸銀稀溶液加阿芙蓉液ノ注射法ヲ施シ以
 テ燒蝕法ノ功ヲ助クヘシ通例其配合ハ消酸銀
 二氏、阿芙蓉液半_三、蒸餾水一_三ノ和ニ成ル皓禁
 結列阿曹篤、銘糖モ亦是等ノ症ニ施メ益アリ、奏

功ノ完カラントヲ要セハカ_レ所及其液ヲ深ク注
 入_レ此ヲ尿道ニ住マラシムル_レ二三密扭篤ナ
 ルヘシ

全ク手媯ヲ輟ノ交媯モ暫ク禁スルヲ要事トス
 此禁ヲ犯ス_レハ治術ヲ連施スルモ亦無益ニ属
 スヘシ患者寢ルニハ藁褥ヲ須ヒ總テ飲食、醫藥
 共ニ刺戟性ノ物ヲ避クヘシ緩下劑ヲ以テ大便
 通利ヲ促シ秘結ニ至ラシムヘカラス開豁氣内
 ノ運動ハ行步乘輿ヲ論セス總テ益アリ、但、騎馬
 ハ陰具ヲ挑動スルヲ以テ禁スヘシ、有時テハ患

者從前ノ職務ヲ全ク轉變ノ偉切アルトアリ
 全身ノ虚脱已甚クノ煩躁不寐ヲ兼ルキハ強壯
 劑ヲ與ルニ宜シ喻ハ規尼涅、酸性香竈丁幾、枸椽
 酸鉄ノ類ニ阿芙蓉或ハ菲沃斯ヲ配用スルカ如
 シ、是等ノ症ハ住地ヲ轉メ新氣ヲ引キ日々澆注
 浴ヲ施メ大ニ其恢復ヲ促スノ能アリ食物ハ消
 化シ易クメ滋養ノカアル品ヲ撰ヒ且食饌毎ニ
 良好葡萄酒一硝盞ヲ用ヘシ遺精ノ本因小腦ノ
 刺衝状ニ在ルトヲ診決スルキハ項窩ニ蟬針及
 發泡膏ヲ貼シ冷水澆注浴、鎮降劑ノ内服ヲ主張

スヘシ、此病ニ流布里涅ヲ鎮降劑トシ用テ其功
 ヲ稱揚スル者アレド此ヲ數回試ミシニ曾テ其
 驗アルトナシ、鎮降劑ノ中ニ就テハ貌魯謨加里
 ノ右ニ出ル者ナシ、其用法ハ十氏乃至廿氏雙鸞
 菊丁幾五滴、羯布羅水半弓、調和ノ一劑ト為シ一
 日三劑宛與フヘシ
 前件ノ方法ニ由テ體力及陰具彈力復故セシ片
 ハ親迎セシムルヲ以テ再發ヲ防クノ妙策トス、
 醫士狐疑セズ斷然ト之ヲ許ノ可ナリ但少年ニ
 在テ手媠ノ習癖アリシ徒ハ一過ノ陰痿ニ罹テ

親迎ニ堪ヘサルヲ屢之アリ然レ總テ陰痿ハ其
 因軀體ニ関ルヨリモ精神ニ係ル者多シ故ニ數
 週間全ク房事ヲ斷チ些少ノ藥品ヲ與ヘ以テ其
 速ニ治スルヲ保證スルキハ其陰痿能ク治ス
 ヘシ、喻ハ番木鱈丁、幾、鹽酸鉄液、芫菁丁、幾各、等分
 調和ノ毎日三次ニ三滴宛與ルカ如シ、或ハ至急
 ニ勃舉ヲ欲シ或ハ交媾ノ過度或ハ少年早ク精
 液ヲ過洩スルヨリ陰痿ヲ將來スルアリ是等ノ
 症モ自然ニ任メ治スル者多シ若シ治セサルキ
 ハ保固強壯劑、既注浴、瓦爾花尼法、諸、分泌排洩、催

進法等ヲ撰用シ局外覺機過敏ナルキハ尿道燒
 蝕法、緩收斂注射法ヲ兼施シテ佳、

○攝護液漏

是病ハ攝護腺ノ刺衝状或ハ其織質ノ焮衝ニ起
 因ノ稀薄粘滑ノ液ヲ排洩スル者ナリ而、小兒及
 少年ニ鮮ク廿歳ヲ踰ル徒ノ一般ニ患ル所ニノ
 極老人ニモ亦目撃ス總テ配偶ノ有無ヲ論セス
 均ク此ニ罹ル者ナリ特ニ多血質、神經質、過度ノ
 房事、手淫、騎馬、肛門、膀胱直腸ノ疾患、飽飲過食等
 ハ皆此病ヲ作シ易ク且、此ヲ彌久セシムル者ト

ス、其他刺衝性下劑、羌菁、的列並油モ攝護腺、膀胱頭、尿道後部ニ多量ノ血液ヲ呼ブヲ以テ此病ヲ誘起スルヲアリ

徵候、透明粘滑ノ液ヲ洩ラスヲ主徵トス、其量ハ二六時中ニ兩三滴乃至一錢餘、多量ナルハ尿道口之カ為ニ常ニ滋潤シ襯衣ニ一異汚斑ヲ印スルヲ猶淋疾及隨淋ニ於ルカ如シ、患者則ニ上テ努責シ特ニ便秘、燥尿ノ為ニ直腸緊脹スルハ其排洩最多シ其排洩ノ多少ニ拘ラス攝護腺ニ一異ノ刺戟ヲ覺ヘ其感覺尿道ニ沿テ龜頭

ニ達ス有時テハ患者其刺戟ヲ愉快ニ覺ヘ畧交媾初期ニ鬚髯タリト謂フ者アリ、或ハ液ノ攝護腺ヨリ尿道ニ點滴シ出ルカ如ク覺ル者アリ、或ハ攝護、肛門、直腸ノ邊或ハ會陰ニ沿テ重墜ヲ覺ヘ尿スル時可惡ノ感動ヲ作シ或ハ累ニ尿意ヲ催ス者アリ、或ハ陰莖頻ニ勃舉シ夜間屢、淫夢ヲ結テ之カ為ニ其睡ヲ妨ル者アリ

此患者ハ其意識ヲ紊スヲ特ニ已甚シ其排洩ハ微ナリト雖氏大ニ怯懼ノカ為ニ大衰弱、脊及腰部ノ疼痛繼キ作ルト想ヒ或ハ其排洩液ヲ精

液トノ將ニ陰痿ニ陷、ント謂、ヒ晝夜念頭ニ掛ケ
 須臾モ之ヲ忘ル、トナク、百方治ヲ募リ、這醫ヨリ
 那、醫ニ轉シ、衆醫ヲ責ノテ、終ニ治スルノ期ナク
 如、之日常ノ職務ヲ懈リ、愁沈失意、一心唯、液ノ排
 洩ヲ憂ヘ、鬱々光陰ヲ消、リ實ニ大患ノ源ト為ル
 者アリ

抑、此病ト混同シ易キ者ハ淋疾、隨淋、遺精、慢性膀
 胱加、答流斯ナリ、然、比其者別ハ難カラズ、其症徐
 徐ニ作ツテ淋疾ノ如ク頓發セス、且、不潔ノ交媾
 前驅セス、其排洩液ハ透明粘滑ニ、ノ膿黄色ナラ

ス、且、尿道ノ熱灼、刺痛症ナク、尿道、陰莖ニ焮衝ノ
 景況ヲ現ハス、トナシ、隨淋ハ其排洩物多少膿様
 ニ、ノ其量亦多シ、尿道ノ變窄ヲ兼ル者ハ蒲施ヲ
 以テ検査ノ能、者別ス、ヘシ遺精ハ甚々稀有ノ病
 ニ、ト世ニ遺精ト唱ル者多ク、ハ此攝護液漏ナリ
 其排洩ニ快美ノ感動ヲ兼ル、ハ患者益、之カ為
 ニ、神氣ヲ惱マス、トアリ、疑似不決ノ症ニ臨ンテ
 ハ、顯微鏡ヲ以テ検査スルニ、若クハナシ、精液ハ
 每常著ク精絲ヲ胎ニ攝護液ハ、決ノ之ヲ胎マサ
 レ、ハナリ、膀胱加、答流斯ハ非常ニ夥ク粘液ヲ排

洩シ兼テ尿質變常シ小便頻數ニノ通シ難ク膀胱邊ニ疼痛ヲ發ス攝護液漏モ攝護甚ク増大スルキハ孟骨底ノ微痛利尿ノ難澁ヲ兼ヌト雖モ彼ト此トノ症狀ハ大異ニノ混同セント欲スルモ能ハサルヘシ

此病ハ大抵皆危險ナラスト雖モ甚ク頑固ナルヲ以テ速ニ其治ヲ期スヘカラス神經質多血質ノ少年ニ在テ此局處病ノ為ニ意識ヲ紊タルハ實ニ醫ノ煩勞ヲ極メ其惑ヲ生セシムルト此病ノ如ク己甚キ者ナシ

治法、攝護腺及此ニ連ル諸器ヲ検査シ次ニ患者攝生ト其體質ヲ検査スルヲ專務トス局處検査ニハ加麥的兒ヲ用ヒ兼テ灌腸ヲ施シ直腸ヲ虚フメ指ヲ入レ探診スルニアリ加麥的兒ヲ用ルキハ尿道變窄ノ有無攝護腺ノ大小硬軟膀胱ノ淤衝、結石ノ有無等ヲ審察スルト得ヘシ指ヲ直腸ニ入ルキハ攝護腺ノ病状ヲ認得ルノミナラス又直腸肛門ノ景况ヲ候フノ益アリ但指ハ頗長クメ巨キニ過キサルニ宜シ

患者ノ攝生ヲ査問ノ惡習アレハ改メシムヘシ

總テ此病ニ罹ル者ハ多情家ニテ房事ニ耽リ攝護精囊近隣、織質恒ニ活潑状ヲ為シ睡眠、食欲障ヘラレ多クハ便秘ヲ兼ル者ナリ

前、兩件ヲ検査シ了テ一ハ全軀ニ係リ一ハ局處ニ関ルノ治ヲ下スヘシ此患者ハ大抵薄弱ニシ筋力乏ノ消食機損敗セリ故ニ鐵、規、尼、涅、ノ如キ保固強壯劑、滋養攝生、良好葡萄酒、開器氣内ノ運動歩行等ヲ命スヘシ但、騎馬ハ嚴禁セスンハアラス例之鹽酸鉄液十二滴、番木鱈丁幾十滴、調和メ四回ニ分服セシメ患者多血ニシテ熱發スルハ

ハ小量ノ吐酒石ヲ與ヘ惡心ヲ作スニ至ラサルヲ佳トス總テ大便通利ヲ整ルヲ一大事トス但、刺戟性下劑ハ徒ニ本病ヲ増惡セシムルヲ以テ之ヲ禁シ患者著ク衰弱セサルハ香竈物及香料物ヲ加ル食品モ亦禁スヘシ

局處ノ治法ハ先、慾火ヲ制止メ攝護腺及此ニ連ル諸器ノ刺衝亢盛ヲ鎮靖シ次ニ清涼鎮痛藥或ハ消酸銀稀溶液加香竈阿芙蓉液ノ注射法ヲ施シ或ハ阿芙蓉液一二莖、ゴウラルド水十弓乃至十二弓配和シ唧筒ニテ一日三四回尿道ニ注入シ

每次三四密扭篤間其内ニ住マラシム頑固症ニ
 ハ尿道攝護腺部或ハ尿道全面ノ燒蝕法ヲ佳ト
 ス此法ヲ施ス一每一週一回ナルヘシ二六時中
 ニ冷水坐浴ヲ行フ一二次直腸ヲノ恒ニ清凉空
 虚ナラシムルニ宜シ病頑然退カサルハ會陰
 及ヒ肛圍ニ蟻針ヲ貼メ卓功アル一アリ
 全功ヲ收ント要セハ倦マスノ長ク主張シ其間
 時々藥品ヲ轉變スルヲ妙トス意識既ニ甚ク變
 調スルハ復故セシムル一甚タ難シ宜ク旅行
 ヲ命シ職業ヲ轉セシメ患者未娶ラサルハ親

迎セシムルニ宜シ

○攝護腺焮衝

此焮衝ハ外傷ヨリ来ルアリ中年ノ徒全軀特ニ
 陰具ノ生機滿盛ノ時無故シテ發スル一アレハ
 多クハ淋疾ニ兼發ス其大畧既ニ淋疾條下ニ附
 説スルカ如シ今更ニ其餘義ヲ述フ
 徵候、初起膀胱頸疼痛ヲ發シ會陰、肛門、耻骨邊
 ニ重墜焮熱ヲ覺ヘ漸ク斯感覺腰部股内ニ蔓延
 ス利尿ノ努責頻迫スレハ快通セスノ龜頭疼痛
 ヲ發シ些少ノ尿ヲ滴出スルモ繼テ膀胱ノ裏急

暫ク暫留ス 龜頭特ニ其冠多クハ鮮紅ト為リ尿
 道口腫脹ノ粘鎖ス大便ニ臨メハ苦惱極テ已甚
 キヲ以テ患者此ヲ畧省シ因テ壓重疼痛症愈増
 加ス若シ兩脚ヲ近接シ或ハ劇ク動揺スルキハ亦
 疼痛ヲ増スヲ以テ常ニ兩脚ヲ披キ此ヲ正平ニ
 置カサルヲ得ス直腸ヨリ此ヲ候フニ著シク其
 腫脹灼熱ヲ覺ヘ稍壓セハ劇痛ヲ發ス膀胱ハ蓄
 物ヲ排洩セサルヲ以テ膨脹シ加參的兒ハ膀胱
 ニ達シ難ク強テ此ヲ入レントスレハ疼痛ヲ作
 シ出血ヲ發ス然レ峻カ治法ヲ處スルキハ其炊

衝兩三日ノ間ニ消散ノ疼痛灼熱利尿艱難等ノ
 諸症減退ス若シ然ラサルキハ釀膿ニ歸ス釀膿ハ
 偶腺ノ外層ニ發スルヲアレハ多クハ其本織質
 ニ發メ膀胱内ニ破潰シ極度ノ諸症亦頓ニ減退
 ス是時小便俄ニ夥ク排洩メ其内ニ多分ノ膿球
 ヲ雜フ是裸眼ニテモ能ク看取スルヲ得ヘシ
 斯ク破潰スルハ危險ノ恐ナシ兩三日ノ際尿ス
 ル毎ニ膿ヲ外洩シ厥後膿ノ排洩徐々ニ減シ大
 抵初起ヨリ二週乃至三週ニメ全ク治ス有時テ
 ハ其膿直腸内ニ潰ルヲアリ是亦危險アルヲナ

シ或ハ此焮衝醜膿セスノ慢性焮衝ニ轉スル
 アリ然ル時ハ常ニ膀胱頭邊會陰肛圍ニ重墜ヲ
 覺ヘ腫脹已甚シケレハ小便通シ難ク大便ニ臨
 テ直腸内ニ可惡ノ感動ヲ發ス

如斯ク攝護腺焮衝ハ自發ノ者罕ニノ通例淋疾
 或ハ尿管諸部ノ刺衝狀ニ繼發シ或ハ冷氣胃觸
 房事過度手嬌創傷ニ由テ發スル者ナリ少年及
 中年ニ在テハ急性症ヲ發シ易ク老人ニ在テハ
 膿腫ニ轉スル者多シ

治法 初起ニ在テハ局處防焮法ヲ主トス則會

陰ノ毛ヲ剃リ蟻針十五個乃至廿個ヲ貼シ一次
 ニノ輕快ナキ時ハ兩三次反復ノ貼スヘシ又會
 陰邊ニ緩和毬布ヲ敷キ其周圍ニ水銀膏ヲ擦ス
 ヘシ但蟻針吸口ヲ避ルニ宜シ微温全身浴或ハ
 坐浴ヲ施ス毎日常一次或ハ數次其時間ハ半時
 許ナルヘシ蓖麻子油或ハ甘汞加藥刺巴ノ下劑
 ヲ與テ毎日兩度滑便ヲ取り或ハ亞麻仁煎汁過
 尔托泡劑ニ亞麻仁油若ハ阿列襪油一弓ヲ加テ
 灌腸法ヲ施シ以テ下劑ノ功ヲ助ルモ佳疼痛劇
 ケレハ緩和乳劑護謨油類ノ容幾斯去兒ニ適宜

ノ阿芙蓉越幾斯ヲ加一用ヒ或ハ吐酒石摸尔非
 温、双鸞菊越幾斯ノ和劑ヲ與テ鎮痛解熱ノ功ヲ
 取ルヘシ患者ハ固、痔内ニ在テ兩脚ヲ差披キ正
 平ニ卧サシメ食物ハ軟和ノ品ヲ擇テ少量ニ用
 ヒ總テ情欲ヲ發動スル事件ヲ避ケシムヘシ既
 ニ膿膿ノ直腸内ニ突出シ且波動ヲ覺ルキハ長
 キ彎形多羅乙加兒ヲ以テ其膿ヲ洩ラシ術後兩
 三日間嚴ニ直腸ノ動搖ヲ戒ムヘシ其膿腫尿道
 ノ方向ニテ突起スルキハ尋常銀加爹的兒ヲ以
 テ之ヲ開キ小便ハ加爹的兒ニテ導洩スヘシ膿

腫破潰後陸續膿ノ歌マサルキハ拔尔撒漢劑
 強壯劑ヲ用テ其治癒ヲ促スヘシ瘡後ノ處置ハ
 鉄劑特ニ龍動丁幾ヲ與ヘ衰弱復故セサレハ清
 浄山氣内ニテ攝養シ或ハ海濱ニト居メ海水浴
 ハ行ハシメ硬結腫脹慢性炊衝ヲ剩ス片ハ毎日
 沃獨加里十尺乃至十五尺宛用ヒ兼テ時々沃胃
 謨丁幾或ハ沃獨加里軟膏ヲ取テ會陰ニ塗擦セ
 シムヘシ

○攝護腺肥大

此病ハ少年ニモ發スルアレモ壯年ニ多ク五

十歳ヲ踰ル徒ニ最モシ殆者老ノ固有病ト謂テ
 可ナル者ナリ病性緩慢ニノ其因ハ騎馬痔疾伊
 倔篤或ハ既往淋疾膀胱結石過度房事慄忤飲液
 刺戟利尿藥ノ誤用下肢感冒等ノ如キ腺内ニ過
 多ノ血液ヲ引導シ其肥大ヲ致ス者皆是ナリ或
 ハ毫モ是等ノ事故ナク曾テ尿道焮衝ヲ患ヘサ
 リシ徒モ此危險症ニ罹ルコトアリ特ニ老人ニ於
 テ之ヲ目撃ス

其腫ノ太ハ自卵大至拳大種々一ナラス或ハ腺
 ノ全體ニ發シ或ハ唯其一部ニ發スト雖凡其脇

側活布ニ發スル者最モシ其腫ニ觸ルニ牢固ニ
 ノ宛モ豕肉ニ觸ルカ如キヲ覺フ是活布ノ排洩
 管擴張シ纖維質筋質莖膜モ展布腫脹ノ成ル者
 ナリ

徵候 初起膀胱及尿道内ニ刺衝ヲ覺ヘテ累ニ
 尿意ヲ催シ特ニ尿道ノ後部龜頭ニ時々灼クカ
 如ク刺スカカ如キ痛ヲ發ス又會陰邊ニ可惡ノ感
 動重墜ヲ覺ヘ腰部膀胱部ニ交感痛ヲ發シ此痛
 延テ鼠蹊股内ニ波及ス漸ク多量ノ攝護液ヲ分
 泌シ有時テハ夜間遺精シ利尿難澁ト為リ勁ク

努責スレモ膀胱ヲ虚フスルトヲ得スノ瀦尿安
 母尼亞性ト為リ砂塗ヲ生シ之カ為ニ膀胱内ノ
 刺衝利尿ノ努責愈増加シ是ニ因テ膀胱粘膜ノ
 加答流斯其筋膜ノ肥厚ヲ誘起ス腺ノ全體若ハ
 其脇側活布腫脹スルキハ直腸ヲ壓迫ノ大便ノ
 努責後重ヲ兼發ス病愈増重スレハ全軀ノ和ヲ
 傷リ有時テハ小便全ク閉ス是多クハ腺ノ中央
 活布腫起ノ膀胱口ヲ鎖スニ由ルナリ或ハ小便
 自利ヲ發ス是多クハ經久腺腫ノ一症ニシテ膀胱
 括約筋ノ其機ヲ失スルニ由リ或ハ膀胱頭及攝

護腺部ニ凹窩ヲ生シ此ニ多少ノ尿ヲ蓄ヘ徐々
 ニ淋漓セシムルニ由ルナリ
 此病ハ尿道變窄膀胱結石直腸變窄等ト混同シ
 易シ然モ直腸ヨリ探查スルキハ能ク診決スヘ
 シ其法左手ノ示指ヲ肛内ニ入レ先中線ニ沿テ
 此ヲ上ニ進メ次ニ此ヲ左右脇側ニ進メテ動カス
 キハ偏側特ニ太ク其質硬ク其面滑澤或ハ凹凸
 不齊ナルヲ覺フヘシ有時テハ直腸ト攝護腺ト
 ノ間ニ於ル結組織モ共ニ腫脹シ腺腫非常ニ太
 ク見ルトアリ但是時ハ直腸ヨリ觸知スル腺腫

、太ト利尿ノ難澁ト符合セス且其腫愈直腸ニ
 近ケレハ其難澁愈微ナルヘシ大便ノ扁平状ヲ
 以テ此病ノ徵ヲ取ルハ確切ナラス他直腸内ノ
 腫物モ斯ク大便ノ状ヲ變セシメ且其通スル時
 肛門ノ括約筋ニ由テ其状ヲ紊レハナリ加參的
 兒ノ検査法モ亦能、徵ヲ取ルニ足ルヘシ、脇側活
 布ノ腫脹ニ加參的兒ヲ攝護腺部ニ進ルキハ多
 少蹶ク處アリ尚強テ進ルキハ加參的兒宛モ籍
 搾セラルカ如キヲ覺フ活布ノ腫脹不等ニノ尿
 道之カ為ニ這旁或ハ那旁ニ壓セラルキハ加參

的兒ノ前端之ニ沿テ偏倚ス加參的兒ノ前端喜
 ク揺キテ少許ノ尿溢洩スルキハ腺腫部ニ尿ヲ
 蓄ル凹窩アルノ徵トス是加參的兒ノ既ニ膀胱
 内ニ入ルノ誤斷ヲ為サシムル者ナリ腺ノ中央
 活布腫脹スルキハ探子容易ク能、膀胱頰邊ニ達
 スレト茲ニ至テ蹶テ膀胱内ニ達スルヲ能ハス
 厥時探子ノ後ヲ其ク降シ或ハ大ニ彎リタル探
 子ヲ用ルキハ能ク達スルヲ得ヘシ
 治法、此病ハ治術ヲ盡スト雖モ全治スルヲ難
 シ專、姑息法ヲ處セサルヘカラス利尿、難澁特ニ

尿閉症發スルキハ尿閉條ヲ照シテ其治ヲ下ス
 一シ患者多血ニ腫脹及交感症已甚キ時ハ刺
 絡吐酒石内服ヲ佳トス吐酒石ハ心藏作用ヲ一
 變シ分泌ヲ催進シ腸管ヲ疎解スルヲ旨トス腸
 管ノ鬱滯ハ此病ニ害アルヲ以テ瀉利塩或ハ瀉
 刺巴末加酒石劑ヲ以テ滑便及水瀉ヲ促ス一シ
 但シ腹痛ヲ作スノ下劑ハ攝護腺ノ諸病ニ禁ス
 食物ハ澹味ニ消化シ易キ品ヲ撰用シ香竈物
 酒燒酒多精ノ飲液ヲ禁シ持ニ騎馬、熨合ヲ戒ム
 一シ又其急性炊衝ニ於ル如ク静卧ヲ一大事ト

ス但常ニ薄内ニ療養スヘシト謂ニ非入時々杭
 子或ハ椅子ニ憑リ好晴日ニハ步行ト乘輿トヲ
 問ハス一時間開豁氣内ニ運動シテ可其他神經
 症已甚キ時ハ麻醉藥ノ灌腸坐藥温湯坐浴膀胱
 部會陰部ノ麻醉藥擦法炊衝症著キ時ハ防炊法
 誘導法喻ハ會陰放蟻冷水灌腸會陰及耻骨上邊
 ノ誘導刺衝法等ヲ處スルニ宜シ吸収法ニテ腺
 腫ヲ縮小セシムル劑即所謂ル解凝劑ノ中ニ就
 テ其最者ハ沃胃謨劑矢鳩荅水銀劑硃砂反對刺
 戟即打膿法貫線法發泡膏水銀軟膏擦法ノ如シ

沃胃謨ハ全軀ノ梅毒ニ起因シ或ハ凝固性滲出液ニ原ク症ニ的當トス其用法ハ沃獨加里單味或ハ此ニ第一沃鉄些少升汞ヲ配ノ與ルニ宜シ但時々一兩日間斷ノ胃ヲ憩ハシムヘシ矢鴉荅越幾私ハ他藥ニ伍用ノ此病ニ卓功アリト云水銀劑ノ此病ニ於ル功ハ詳ナラスト雖此頑固症ニ在テ他劑驗ナキ時ハ試用ノ可但吐涎ヲ起スニ至ルヘカラス用法ハ甘汞一匁乃至二匁矢鴉荅越幾斯一匁調和ノ一劑ト為シ毎日三劑ヲ與一微ニ齒齦ノ患ヲ發スルニ至ル梅毒ニ原ク症

ニハ沃獨加里ヲ配用シ或ハ青酸汞第二沃汞ヲ與テ其功甘汞ノ右ニアリトス硃沙ハ攝護織質ノ硬結肥大ヲ驅散スルノ名聲アルト既ニ久シ用法單味或ハ些少吐酒石ヲ配ノ十匁乃至十五匁二十匁宛與ルト一日數次放蟻瀉血ハ焮衝ニ原クト否ラサルトヲ論セス每常卓驗アリ其部位ハ直腸前壁會陰股内側ニ宜シ就中四日或ハ五日毎ニ四個乃至六個宛會陰ニ貼スルヲ最佳トス打膿法貫線法發泡膏水銀膏擦法ノ如キ反對刺戟ハ慢性症ニ施ノ益アリ就中テ小貫線法

ヲ會陰ニ施スヲ最妙トス沃獨加里ノ坐藥ヲ直
 腸ニ施メ大ニ其功ヲ稱ス即沃獨加里、矢鳩谷越
 幾斯、並沃私越幾斯各五匁、研和ノ坐藥トシ朝暮
 二次直腸内ニ挿ス、其量ハ徐々ニ増シテ十匁ニ
 至ル或ハ沃獨加里五匁、單性膏一匁、研和メ蒲施
 ニ塗リテ日々尿道ニ挿入シ六時毎ニ加麥的兒
 ニテ尿ヲ洩シ如斯ク數月間連施メ其功ヲ助ル
 モ愈佳、此病ハ屢膀胱ノ刺衝狀ヲ兼ルヲ以テ温
 湯浴、阿芙蓉製、坐藥、鎮痛注射法等ヲ行、テ此ヲ靖
 ムヘシ特ニ此患者ハ利尿ノ時刻ト此ヲ利スル

ノ法トニ意ヲ注カスンハアラス、利尿ハ二時間
 一次ニ過クヘカラス且、每次努出スルヲ戒ムヘ
 シ、尿ノ鬱積ヲ防クニハ時ヲ定メ加麥的兒ヲ以
 テ洩ラスヘシ膀胱内ニ温湯ヲ注入スルト宛モ
 膀胱如荅流斯ニ於ル如クシ此ニ由テ膀胱底ニ
 堆積スル所ノ濃稠惡臭ノ粘液ヲ清刷スルト亦
 一大事トス

○副睪焮衝

此症亦多クハ淋疾ノ經過中ニ發ス而、通例唯偏
 睪ノミ此ニ羅ル者ナリ、右旁ヨリモ左旁ノ副睪

此ニ罹リ易シト云、ハ據證ナキニ似タリ有時テ
 ハ這副睪焮衝那副睪ニ跨ルニアリ淋疾家攝生
 不良慾火妄動閉塞劑ヲ以テ早ク淋疾ヲ抑遏ス
 ル等ノ過失ナキニ每次必此焮衝ヲ携ル者アリ
 故ニ此焮衝ヲ發スルハ一異素因アル者ナリ
 此焮衝發スルキハ淋疾ノ漏洩減シ或ハ全ク歇
 ミ或ハ其勢ヲ同シテ兩立シ或ハ淋疾却テ増盛
 スルニアリ此焮衝ニ前テ全身發熱シ違和ノ諸
 症ヲ發スル者アリ或ハ此諸症闕如スルニ驟ニ
 副睪焮腫シテ睪丸精系ニ疼痛ヲ覺ヘ其痛動ス

レハ腰部股内ニ蔓ル者アリ睪丸衣膜ノ中ニ就
 テ特ニ此焮衝ニ累感スル者ハ總英膜ナリ是ニ
 因テ此膜ノ層間ニ流動物ヲ滲出シ隨テ本睪増
 大シテ副睪ノ焮衝判然タラサルニアリ焮衝劇
 クシテ輸精管モ共ニ累感スルキハ睪丸總英膜
 精系共ニ腫脹シ加之陰囊皮モ其焮衝刺戟ニ坐
 ラレテ睪丸ノ内外衣膜肥厚スルヲ以テ宛モ獨
 睪丸ノ大腫脹ナルカ如シ有時テハ外膜ノ焮衝
 頗レ已甚シテ陰囊皮ノ壞疽ヲ惹出スニアリ
 此焮衝經過ノ修短ハ淋疾ノ經過ニ符合ス有時

テハ兩症桔槔スルトアリ則一旦抑遏セシ淋漏
 再發スルキハ副鞞焮衝減退シ此ニ反スルキハ
 淋漏減退ス此焮衝ハ其終リ大抵消散ニ歸ス然
 レ其腫脹全ク消散スルニハ久シキヲ瀰リ或ハ
 永ク其肥大ヲ刺マシ或ハ莢膜内ニ水様液ヲ滲
 沁ノ本鞞ノ肥大症ヲ遺ストアリ或ハ輸精管ノ
 累感ニ由テ其膜ノ肥厚其管内ノ狹窄ヲ刺スト
 アリ膿腫壞疽等ニ歸スル者ハ罕ナレレ焮衝鞞
 丸ノ織質ニ蔓テ鞞丸削瘦ニ歸スル者ハ屢之ア
 リトス

治法 患者正平ニ仰卧シテ陰囊ヲ擡ケ鞞丸ヲ
 垂下セシメサルヲ一大事トス焮衝劇キ時ハ胤
 蹊及會陰ノ放蟻疼痛ヲ鎮メ消散ヲ促スニハ毳
 布但冷罨法ハ緊張ヲ増スヲ以テ患者堪ヘ難シ
 莢膜内ノ溢液勁キ脹痛ヲ作ス時ハ針ヲ下シ或
 ハ乱刺ノ其液ヲ洩シ其際淋疾ニハ對症ノ治ヲ
 下シ本鞞及副鞞ニ無痛ノ腫起ヲ刺スルハ沃胃
 謨膏水銀膏沃獨丁幾ヲ擦搽シ格魯胃謨ヲ塗リ
 或ハ絆瘡膏ヲ貼ノ壓定スル等ニ宜シ

○鞞丸焮衝

此病ノ原因ハ副睪輸精管攝護腺尿道後部膀胱
 頭等ノ刺衝状ニノ部位ノ連接或ハ神經ノ交感
 ニ由テ睪丸ニ波及スル者ナリ或ハ黙加性ノ刺
 戟直ニ睪丸ヲ犯シ此焮衝ヲ作ス_トアリ或ハ梅
 毒瘰癧毒伊屈篤瘰麻質毒ニ原ク者アリ其急性
 ト為リ慢性ト為リ或ハ睪丸ハ一體ニ限リ或ハ
 副睪輸精管固有膜総莖膜外衣膜ノ焮衝ヲ兼ル
 等ハ斯ク原因ノ異ナルニ由ル者ナリ
 其急性症ハ纖維膜ヲ犯シ疼痛極テ已甚シ但_レ初
 起ニハ水腫ヲ兼サ_レルヲ以テ其容著シカラス焮

衝汎ク蔓ル時モ睪丸仍固有ノ卵圓状ヲ失_フテ
 ナシ但_レ睪丸ノ一部ニ發スルキハ其一隅膨脹ノ
 其體異形ヲ為ス精系ハ多少膨脹ス_レニ_レ鼠蹊管
 ニ箱搾セラ_レル_ト罕ナリ適當ノ治法ヲ施ス_レハ
 消散スルヲ常トス_レニ_レ誤治ス_レハ_レ膿腫ス_レ將ニ
 膿腫セントス_ル時ハ諸症俄ニ増劇ノ戰慄ヲ發
 シ稍謔語ヲ兼子疼痛更ニ増劇ノ僅微ノ觸歷ニ
 堪ヘス膿ハ聊カ精液ヲ交ヘテ良性ナラス且_レ纖
 維膜ニ圍マルヲ以テ長ク時日ヲ經サ_レハ陰囊
 面ニ浮_フテ_レナシ而多クハ數處ニ破潰シテ難治

ノ潰瘍ヲ醸シ或ハ細精管ノ一部灰白色ノ索状
ト為テ膿ト共ニ外脱ス壞疽ニ歸スルハ罕ナレ
氏若精系箱榨セラレ或ハ睪丸已甚ク荒蕪セラ
レ或ハ全ク其治ヲ懈ル時ハ其終リ壞疽ニ陷ル
者鮮カラス

其慢性症ハ體質ノ惡液ニ原キ經過甚タ久キヲ
瀕ル者ナリ其徵ハ硬結腫脹ヲ主トス甚キハ其
太常睪丸ノ四五倍ニ至ル疼痛劇シカラサルヲ
以テ顯著ノ織質變常ヲ作スニ非レハ患者自ラ
知ラサルヲアリ其頑固症ニ於テ之ヲ切斷スル

ニ其實硬キ纖維組織ニシテ紅褐色ナリ古人肉貌
儼窟ノ名ヲ命セシハ即此症ナリ此焮衝ハ每常
睪丸ノ一部ニ局處ノ其終リ瘻管状ヲ剩マシ醸
膿ニ歸スルヲ罕ナリ但硬結腫ニ歸スル者最モ居
多シ是纖維膜ノ肥厚或ハ精尿管ヲ連綴スル組
織ノ增殖或ハ精尿管ノ間ニ滲出セル液ノ凝聚
スルニ作ル者ナリ

治法 大率副睪焮衝ノ治法ニ同シ急性症ニ於
テハ正平仰臥睪丸擡起ヲ專トシ鼠蹊會陰或ハ
股内側ニ蟻針ヲ放テ毀傷ニ原ク症ニハ冷卷法

ヲ施シ冷罨法ニテ脹痛退カサル時ハ轉ノ緩和
 麻醉ノ罨布ヲ敷貼シ急性水腫ヲ兼發スル者ハ
 針刺ノ其疼ヲ制止シ將ニ硬結腫ヲ刺マサント
 スル勢アル時ハ解凝性ノ軟膏硬膏沃胃謨丁幾
 格魯胃謨壓定縞帶等ノ外用沃獨加里硝砂ノ如
 キ解凝劑ノ内服ヲ與ヘ全軀ノ機質ニ病患アル
 キハ對症ノ方法ヲ處シテ之ヲ治メ若輩丸膿腫
 ヲ釀ス時ハ緩和罨布ヲ持長メ力所及早ク其破
 潰ヲ促スヘシ其膿深ク輩丸ノ織質内ニ位スル
 キハ早ク細小ノ針ヲ刺シ以テ織質ノ大荒蕪ヲ

禦キ持ニ注思メ膿ヲ其織質内ニ遺ラサシム
 ヘシ若輩遺ル時ハ輩丸ノ精管織質ヲ掠略シテ
 莫大ノ禍ヲ招ケハナリ其潰口ヨリ精管ノ小團
 塊脱出セントスルキハ勉メテ此ヲ内ニ壓入ス
 ヘシ然ル時ハ其物能癒着シテ自ラ肉芽ヲ生ス
 ヘシ慢性症ニ於テハ專ラ原因ヲ斥ケ滲出液ノ
 吸収ヲ促スヘシ則滋養食物ヲ減シ少量水銀劑
 喻ハ加羅蔑兒第一沃永少量阿芙蓉ノ和劑ヲ與
 ヘ隔日ニ蓖麻子油或ハ瀉利益ノ下劑ヲ用ヒ正
 平ニ仰卧シ陰囊ヲ擡起スルモ亦要事トス解凝

精管ノ小團
 塊脱出セントスルキハ勉メテ此ヲ内ニ壓入ス
 五

瘻法沃胃謨丁幾、蟻針等モ施シテ佳、但、軟膏ハ害
 アルト多シ、畢丸織質大ニ荒蕪シ或ハ瘻管狀頑
 滯シ或ハ畸形ノ硬結ヲ剝スキハ畢丸截除法出後
 ヲ施スヘシ

○畢丸癌

畢丸ノ惡性病ハ軟性癌即、髓様海綿腫ナリ此病
 ハ年齡ニ拘ラスノ發スト雖也少年ニ最多ク大
 人ニモ亦屢之アリ但、大抵偏畢ニ發ノ兩畢ニ發
 スル一罕ナリ其經過每常速ニ本畢ニ始リ副
 畢ニ及ヒ次ニ精系、遂ニ鼠蹊水脈腺、小孟骨水脈

腺ニ蔓ル者ナリ其形下巨ク上細クノ宛モ梨子
 ノ如ク前側ハ稍扁平ナリ此ニ觸ルニ凹凸不平、
 糜粥様ニノ彈カヲ存シ不透明ニノ頗重シ其重
 數廿ニ至リ其太胎兒ノ頭大ニ比フ者アリ但、波
 動アルトナシ初起疼痛ナク日ヲ經レハ劇痛ヲ
 發ス然レ結核腫ニ於ル如ク警苗スルト罕ナリ
 季期ニ至レハ患者ノ面色綠黃トナル、是此癌腫
 ニ固有ノ一異色ナリ、是時陰囊皮ハ皮下、靜脈腫
 脹透映スルニ由テ赤色ヲ呈ス遂ニ破綻ノ癌腫
 脫出ス是、腦髓ニ似タル海綿腫ノ本相ナリ終ニ

其部壞疽、疼痛過多、排洩物ニ羅リ削瘦熱ヲ兼
 發メ患者速ニ死ス、其死期ハ大抵初發ヨリ四箇
 月以内ニアリ
 治法、此病ヲ治ル最良法ハ早ク截除法ヲ行フ
 ニアリ然レ再發スル者居多シ

○ 畢丸結節腫

畢丸結節腫ハ經過甚ク緩慢ニシテ獨大人ニ發ス
 ルノ病ナリ其痛酷烈ニシテ切ルカ如ク灼クカ如
 ク其腫畸形ニシテ硬シ然レ已甚ク増大スルナ
 シ切斷シ之ヲ觀ルニ灰白色ノ纖維組織ニシテ殆

血管ノ纏フテ無ク有時テハ軟骨硬骨ノ細片雜
 ルコアリ其經過中ニ精系并ニ水脈腺犯サレ患
 部ノ皮下ノ部ト癒着シ或ハ潰瘍ヲ生シ患者
 ノ顔面一異赭色ト為ル抑此病ハ顯著ノ因ナク
 ノ發シ經過緩慢ニシテ其腫大ナラス硬クノ結核
 状ヲ為シ一異劇痛ヲ發シ面色一異ノ變常ヲ為
 シ獨年長ノ徒ヲ犯シ皮下ノ静脈腫脹セス以テ
 他病ト看別スヘシ
 治法、水脈腺未犯サレズ惡液質未全軀ニ蔓ラ
 サルニ前テ當ニ施スヘキ者ハ獨畢丸截除法ナ

○畢丸截除法

是變性畢丸ヲ截除スルノ術ナリ其法患者ヲ正
 平ニ仰臥セシメ或ハ手術凡ノ邊緣ニ在テ兩脚
 ヲ拔カシメ術者其脚間ニ立チ術ヲ行フ部ノ毛
 ヲ剃リ左手ニテ腫ノ後面ヲ擡ケ精系ノ位置ヲ
 確認シ其方向ニ沿ヒ皮ヲ截テ腫ノ下邊ニ至リ
 其長^チ癌腫ヲ搾出スルニ足ルヲ度トス若變性部
 上^ニ鼠蹊管ニ達スルキハ此管モ截テ精系ヲ裸露
 スヘシ若外皮變性スルキハ楕圓截斷ヲ以テ之

ヲ除カスンハアラス但皮ヲ截除ク^レ汎キニ過
 ル^レ勿^レ偶陰囊引縮スルキハ動スレハ其謬ア
 ルヘシ次ニ示指ト拇指トヲ以テ精系ヲ撮ミ或
 ハ双鉤ヲ以テ此ヲ掲ケ其周邊ノ諸織質ヲ離解
 シ彎形針ニテ牢強ノ二重絹絲ヲ精系下ニ通シ
 纏^フテ此ヲ結縛ス繼テ結縛部ノ直下ニ於テ精
 系ヲ切斷シ畢丸腫ヲ搾出ス但^シ其間致意シテ陰
 囊ノ結組織陰囊ノ中膈及尿道ヲ毀傷スル^レ勿
 ルヘシ有時テハ先^ニ癌腫ヲ搾出シ而後結縛セル
 精系ヲ切斷スヘキ^トアリ特ニ丁寧ニ數個ノ動

脉ヲ結縛スヘシ之ヲ忽ニスルハ隨血歇マサ
 ルノ恐アレハナリ結縛絲ノ端ハ絆瘡膏或ハ格
 魯胃謨ヲ以テ輕ク崩蹊邊ニ定住シ創縁ハ術後
 二時半或ハ三時ヲ經テ後血縫法絆創膏ヲ以テ
 接合シ撒絲定巾ヲ冰冷水ニ醃シ搾テ其上ニ敷
 貼シT字繙帶ヲ以テ陰囊ヲ擡ケシム
 毎常陰囊創ヨリ多少ノ隨血ヲ發ス適當ノ壓定
 繙帶寒冷法ヲ施スハ若干時間ニノ能遏止ス
 ヘシ雖然溢血ニ由テ陰囊已甚ク膨脹シ隨テ緊
 脹疼痛ヲ作スハ繙帶ヲ退ケ血縫絲ヲ寬ルメ

テ其血ヲ洩シ噴血ノ面ニ撒絲ヲ被ヒ且陰囊内
 ニモ此ヲ充テ絆創膏ヲ以テ止血壓定法ト為ス
 ヘシ

