



門 8  
號 24  
卷 3

8  
3

肺論

秋三箇月

肺旺七十二日

肺為丞相

肺重三

斤十二兩肺者外應於鼻鼻則主氣氣則通

其榮衛肺家納辛肺為臟大腸為腑肺者氣

為臟大腸為傳送之腑肺是臟中之華蓋肺

為裏大腸為表肺為陰大腸為陽肺為虛大

腸為實肺者外應於西方庚辛金

歌曰

肺為華蓋心上存  
皮膚受病繫尾落

鼻連西方庚辛金  
大腸連脚左邊存

膳前肉動脚又散 鼻中濃出病十分

醫工見者休辨認 此馬必定救無門

治肺部

紫蘇散治馬鼻濕喘鹿毛焦前探胃中痛一切肺病

紫蘇葉 馬兜苓 貝母 如無用人參

木通 漢防已 苦葶藶

白牽牛子 桔梗 當歸

甘草

右為等分每用一兩水半升生薑一分細

擦蜜一兩煎至三五沸放溫草後嚙之

半夏散治馬肺風熱痰吐涎沫

半夏 升麻 防風

右為末等分每用二兩酸漿一升同煎三

五沸放冷嚙之病若未退再嚙

連翹散治馬項脊低頭不得把前把後慢

病

連翹 知母 貝母 如無代人參

杏仁 香白芷 紫蘇

桔梗 瓜樓根 山藥

當歸

馬薺苓

甜瓜子

右等分為細末每用一兩半生薑一分蜜

二兩水一升煎至三兩沸放溫草後嚙之

桂香散療馬肺恹低頭不得病

大黃

柴胡

甘草 各一兩

木香

乾薑

細辛

肉桂 各一分

右件為末先鍼出帶脉血了用青州棗十

箇去其核糯米三合生薑一兩煮粥和藥

二兩啗十數即差

烏藥散治馬慢肺痛走驟着胃脾痛鼻濕前

探五七聲啞全不食水草病

桑白皮

牡丹皮

茴香

赤芍藥

秦艽

藁本

天台烏藥

如無用

右件為末等分每藥末一兩半春夏漿水

一升秋冬則薑汁同煎三五沸放溫草後

嚙之

麥蘖散治馬把前把後慢病啞喘

知母

貝母

如無用人參

麥蘖

紫蘇

當歸

芍藥

瓜樓根

香白芷

枇杷葉升無用

山藥

桑白皮

桔梗

甘草

茯苓

秦艽

山茵陳

黃藥子如無用黃耆

杏仁去皮

馬薺苓

白藥子代麻

右件二十味各等分為末每用藥末一兩

半蜜一兩生薑一分薑汁一升煎三兩沸

葶藶散治壓喘葶藶散治壓喘

玄參

葶藶

牛蒡子

川升麻

知母

馬薺苓

黃耆

貝母如無用人參

右八味等分為末每用藥一兩漿水兩盞

草後嚙之

涼肺散治馬肺喘及非時熱喘

甘草

葶藶

桔梗

貝母如無用人參

板藍根

猪苓

右為末每用藥一兩半蜜三兩糯米粥一

鐘半同調嚙之病未退再嚙若要嚙即用

熱童子小便一鍾半蜜水嚥之  
白及散治馬蹇膜損肺空不止口鼻中濃血  
出可食水草

白及

山茵陳

山梔子

甘草

川黃蓮

防風

各四兩

阿膠

二兩

杏仁

半升

右八味為細末每用二兩漿水一升同煎

至五分候冷餵飽嚥之

五子散治馬鼻濕肺毒瘡前後脚虛腫草慢

牛菜子

于方子

牽牛子

大麻子

皆妙令

鬱金

甜瓜子

紅花子

菴朮

瓜樓根

右八味等分為細末每用藥一兩半沙糖

一兩水半升同煎至三兩沸放溫草後嚥

款冬花散治馬熱發鼻濕草慢及取草結末  
較病

款冬花

代用枯樓

川鬱金

黃藥子

代黃耆

甘草

瓜樓根

杏仁

同

香白芷

甜瓜子

兩半

右等分為細末每用一兩半軟飲一鍾白  
礬半兩飛過瓜樓一箇剉爛一處同和草  
後嚼之

草龍膽散治馬鼻內黃白膿出肺毒注破并  
熱數多啞措毛頭乾燥鼻濕並皆嚙之小  
可一兩服立效

木通

貫衆

草龍膽各一兩

梧桐淚兩半

玄參兩一

右件藥五味細末每用一匙頭猪膽子如大

香白芷散治馬肺熱或身上生瘡

山梔子

香白芷

瓜樓根

甘草

紅芍藥

川大黃

黃藥子代黃

右七味等分為細末每用二兩漿水一大  
椀同煎三五沸放冷嚙之夏用鷄子一箇  
及黑藥子半兩依前草後嚙之効

木通散治馬肺黃病精神短慢口眼色黃牽  
動似醉或時喘鹿

木通

乾山藥

梔子

瓜樓根

牛芳子

右件藥等分為細末每用一兩半漿水一升生薑一分擦入藥同煎三五沸放溫入小便半盞嚥之隔日再嚥之消黃散治馬喘鹿汗出

黃藥子

代用黃耆

貝母

知母

大黃

白藥子

代用升麻

黃芩

甘草

鬱金

右等分為末每用藥一兩新水半升蜜二

兩調嚥隔日再嚥之  
枯樓根散治馬肺氣病

枯樓根

馬兜冬

黃藥子

代用黃耆

茵陳

白礬

黃連

代地黃

杏仁

各一兩

陳橘皮

兩半

右八味為末每用藥一兩漿水煎放冷草

後嚥之

夜明砂散治馬肺毒生瘡

山梔子

兩四

知母

貝母

代參

白藥子

枯樓根

各半兩

夜明砂

兩二

右為末每服二錢漿水一鍾半童子小便



半鍾同煎待冷蜜一兩鷄子二箇白礬半  
兩同調草後嚙之  
荊芥散治馬肺風生瘡

荊芥穗 大黃 甘草  
右等分為末一兩半米泔水二鍾半同調

黃耆散治馬年熱草慢尿血濕肺病

黃耆

烏藥 代芎

芍藥

山茵陳

地黃

馬薺苓

知母

右八味等分為細末每嚙半兩將漿水或糞  
汁半升煎三五沸放冷嚙飢飽路行並嚙

心論

夏三箇月心旺七十二日心為第一心重一  
斤十二兩上有七竅三毛心者外應於舌舌  
則主血血潤其皮毛心家納苦心為臟小腸  
為腑心者血為臟小腸者受盛之腑心是臟  
中之君心為裏小腸表心為陰小腸為陽心  
為虛小腸為實心者外應於南方丙丁火  
歌曰

心家受病連膈痢

胃占硬氣又唇蹇

多叶少草蓄培土

小腸尿血傷心然

麒麟沒藥紅芍藥

不限依時童子便

用藥每日兩度嚙

此馬必定得安全

治心部

麻黃散治馬心臟虛熱中風

天南星

乾蝎

白附子

白殭

麻黃

乾地

川芎

白蒺藜

海東皮

防風

黑付子

甘草

蒿本

天麻

桂心

右等分為末每藥一兩酒半升同調攪之

天麻散治馬心風初發時曾隻緊弩自奔衝

信脚自行

天竺黃

天麻

防風

桔梗

黃藥子

甘草

知母

大黃

乾地黄

黃耆

黃芩

貝母

鬱金

黃連

牛膝

右為等分細末每用藥一兩蜜一兩酒一

六鍾油二兩水一鍾同灌  
鎮心散治馬驚悸狂前脚不寧有小痛

桔梗

白芷

白茯苓

人參 各三

右為末每服一兩已下清酒一鍾半小便

一鍾同調草後嚙之

人參散治馬心經伏熱非時驚狂饒倒地  
眼色黃草慢病

人參

茯苓

遠志

防風

麥門冬

薄荷

甘草

龍腦

牛黃

右為細末每用藥一兩半漿水一鍾同煎

三兩沸放冷入蜜一兩草後嚙之

桔梗散治心經不調陰陽不通百脉沉重遂

令十步九蹶如睡如驚眼不顧物病

升麻

桔梗

鬱金

牛菜子

生地黃

右藥三味為末與羊膽蜜錫地黃牛菜子

調拌令勻入藥一兩半草後便留立効

大黃散治馬心經伏熱見物或時驚倒眼內

如砂前探草慢病

大黃

麻黃

黃芩

甘草

防風

山梔子

右件等分為末藥一兩半蜜一兩半沸湯

二鍾同調放冷草後嚥之隔日再嚥

四黃散治馬心臍熱草慢并鼻内血出

黃蘗

黃蓮

黃芩

大黃

款冬花

如無用括攬

白藥子

如無用升麻

貝母

鬱金

黃藥子

如無代黃菁

秦艽

甘草

山梔子

右各等分為末每用藥一兩半蜜一兩水

半升調嚥之

肝論

春三箇月肝旺七十二日肝為尚書肝重三

斤十二兩肝者外應於目目即生淚淚則潤

其眼肝家納酸肝為臍膽為腑肝者風為臍

膽者精為腑肝是臍中之佐肝為裏膽為表

肝為陰膽為陽肝為虛膽為實肝者外應於

東方甲乙木

歌曰

肝家受病眼精昏  
閉骨生瘡多淚下  
詐頃之間攻左脚  
早晨臨卧嚙兩上

頭低耳搭少精神  
胡骨犯膝病無因  
青箱石決章柳根  
此病應須眼再明

涼肝散治馬眼昏暗翳膜遮障  
治肝部  
羌活  
菊花  
防風

白蒺藜  
右為末等分每用一兩漿水半升蜜一兩

蒼木散治馬肝積熱眼生翳膜  
同調劑之  
黃芩  
甘草  
蒼木

蟬殼  
木賊  
右為末每用一兩冷水半椀調勻草飽嚙

蟬殼散治馬穀暈眼腫

蟬殼  
黃蓮  
菊花  
地骨皮  
甜瓜子  
白朮  
蒼木  
草龍膽  
各五錢  
各一兩

右八味為末每藥一兩水半升煎三五沸

放温不計時候日灌一次

黃蓮膏治馬肝熱敷量及眼熱有淚點眼

黃蓮如無用青鹽如無用麩仁

楮葉 烏魚骨

右五味等分為末乳鉢內細研如粉朽每

用簞草取藥點眼內日一次

洗肝散治馬眼內有青白暈并眼腫淚出肝

熱

決明草 石決明 青箱子

并泉石如無用石膏 草龍膽

旋覆花 防風 菊花

黃蓮如無用甘草 黃芩各等

右為末每用藥一兩半猪膽取汁蜜四兩

白礬半兩漿水一升同調草飽灌之隔日

再灌如未退鍼眼脉穴出血即差

補肝散治馬蟲食肝病初得時兩目如睡伸

頭垂耳頻搐頂似驚

黃藥子 白藥子 石決明

大黃 知母 貝母

秦艽 白蕪荑 乾地黄

草龍膽

草決明

右等分為末每用藥一兩蜜四兩醋一合  
陳漿水一鍾草後嚙之

脾論

四季脾旺每季各旺一十八日共旺七十二  
日脾無正位胃為大夫脾重二斤二兩脾者  
外應於唇唇即生涎涎即閉其肉脾家納甜  
脾為臟胃為腑脾者土為臟胃者穀草之腑  
脾是臟中之母脾為裏胃為表脾為陰胃為  
陽脾為虛胃為實脾者外應於中央戊巳土

歌曰

脾無定位號中央  
多臥少草又哽氣  
生薑木蜜并綠豆  
氣藥建脾針脾穴

雙抽兩脾連膀胱  
唇乾舌上生瘡  
沙糖四兩用消黃  
此馬驗認是脾黃

天麻散治馬脾氣虛弱偏風病

天麻  
川芎  
防風

人參  
荊芥  
蟬殼

茯苓  
何首烏  
甘草

代用  
細辛

薄荷

右等分為末每用藥一兩半蜜一兩半米

飲湯浸飽後嚥之

厚朴散治馬脾不磨草口色黃白

厚朴

青皮

陳皮

苓藥

五味子

官桂

牽牛子

縮沙

右等分為末每藥用一兩酒一大鍾同調

嚥之

當歸散治馬脾胃傷水腫困世寫

當歸

厚朴

陳皮

青皮

白牽牛子

微炒

益智子

如無用

赤芍藥

右等分為末每用藥一兩水半分生薑一

分擦細煎三五沸空腹溫嚥之

事林廣記治馬傷脾胃不食水草寒唇似笑

鼻中氣短

厚朴

皮

右為末薑棗同煎嚥之宜速

桂心散治馬飲冷過多傷脾胃作泄瀉



桂心 當歸 細辛

青皮 牽牛子 陳皮

桑白皮 厚朴 各等

右為末每用一兩溫水半椀童子小便一

鍾同調灌之

東人經驗方麴木散治馬脾胃不調泄瀉

好麴微炒末 蒼木末四兩 溫泔湯調灌

之未愈再灌

治馬不進水草毛焦方

鷄卵則一介鷓鴣卵則二介去殼取水真由

三合清蜜三合熊膽一錢半大蒜一顆爛

研豆淋酒一升和空心灌之愈朝灌則至

夕先與草料飽後小與水一斗許徐徐飲

黃木散治馬勞瘦臟腑不調雖食草料腹不

充滿毛焦不肥亦治傷水

大黃兩二 人參 當歸

甘草 白木 各半

右為細末好酒一大鍾真油一中盞鷄子

一箇和調早朝灌口午後飼米未愈再灌

負衆散治馬瘦喂不肥者脾臟有虫

貫衆兩二 皂莢兩一 麻子四兩

右件三味不以多少鹿剉以水濃煮和草料啗之之亦可

腎論

冬三箇月腎旺七十二日腎為烈女腎有兩

箇左則為腎右則命門腎重一斤十二兩腎

者外應於耳腎即生津液津液壯其骨腎家

納鹹腎為臟膀胱為腑腎者水為臟膀胱為

津液之腑腎是臟中之使腎為裏膀胱為裏

腎為陰膀胱為陽腎為虛膀胱為實腎者外

應於北方壬癸水

歌曰

腎家受病切須知

心連小腸泉更溢

限利早夜空草嚙

脚重頭低陰又腫

後脚難擡耳又垂

膀胱邪氣透入脾

苦棟苗香青橘皮

此馬必定可憂疑

腎部

烏藥散治馬外腎搐腰背緊硬或肺病把前

把後草慢病

天台烏藥 芍藥

當歸

玄參 茵陳

馬薺苓

升麻 貝母

白芷

山藥 秦艽

杏仁

右等分右等分為末為末每服每服一兩半一兩半鹽鹽二錢二錢煎煎葶藶汁葶藶汁調調空腹放溫空腹放溫嚥之嚥之如狗蹲如狗蹲腰痛牽拽腰痛牽拽不不動

慢病慢病擯榔散擯榔散治馬抽腎病治馬抽腎病腰背硬腰背硬拖拽後脚拖拽後脚水草

擯榔

狗豆蔻

細辛

貝母

秦艽

款冬花

牽牛子

芭戟

沒藥

當歸

右等分右等分為末為末每用藥每用藥一兩一兩葱白葱白二條二條細切

破破古紙古紙散治馬腎冷腰膝痛散治馬腎冷腰膝痛

破古紙

厚朴

胡蘆芭

茴香

肉豆蔻

川練子

青皮

陳皮

右等分右等分為末為末每用藥每用藥一兩一兩水水一鍾一鍾煎沸煎沸候

入童子小便半鍾草前灌之  
葱豉湯治馬腎傷氣拖腰胯

葱 椒 各半 豉 兩二

右四味用水一升同煎沸去藥只使煎下  
湯放溫作一次嚥至晚再煎依前法嚥之

苦棟散治馬小腸氣

苦棟 茴香 當歸

甘草 玄胡索 蒿木

右等分為末每服半兩酒一鍾同煎并葱  
酒煎散治馬抽腎

用天南星一箇大者濕紙數張裏慢火  
煨令黃色為度取出置地上出火毒爛  
搗不羅每嚥用酒半升豆豉半兩燈心  
十莖葱白二莖一處煎之兩三沸去滓  
先將豆豉諸般葱燈心嚼之令將汁用  
藥一錢入上項汁內煎至一兩沸放溫

牡礪散一服治馬袖口陰腫塗擦消腫毒

天南星 縮砂 牡礪過

天仙子 木鼈子

右等分末每藥一錢淡醋一盞同煎三兩

沸熱塗上自消

灸法 風門 各臍風已出上文

柳條三十箇五寸長地上匏窩火燒柳條汗出灸百會穴二一度或三十一度

鍼法 灸法

見上諸穴門

治馬作驕後狂走發汗中風如麻

木者入温埃密房中以射干雞糞和艾

醞醋洒熏腹下厚衣裏馬全體汗出二

三日愈卒中風前法慰之

五臟汗歌

肺痛難行汗出病源歌

拳脚汗出肺家傷

其胃行時饒汗出

精神短慢更為陽

肺痛行時審細詳

止痛當歸白藥子  
更用火鍼生起膊

○肺愈汗出病源歌  
汗出渾身喘不休

肺喘氣產并把膊  
更用八味白藥子

更下白礬粥裏啖  
○心熱汗出病源歌

汗出渾身數黏黃  
是汗熱時涼藥補

甘草只用荷車散  
七味將來蜜裏下

○心愈汗出病源歌  
心愈熱燥汗白流

更用消黃涼藥啖  
心愈肺喘饒肺敗

○肝爛失魂汗出病源歌  
肝爛失魂汗如漿

肝爛肺損難醫治  
交他死人難理會

芍藥具母共消黃  
葱煎麻附啖為狎

醫人切在細搜求  
胃堂大血急須抽

粉糖白蜜配生油  
囉時不得忘瓜數

心家有病熱來傷  
蔚黃金鷄子共商量

大黃梔子配蒲黃  
大血抽罷放胃堂

出氣如同似鋸抽  
胃堂大血最為壽

入河淋洗自然休  
行如醉狗便衝墻

腸斷肚破更無醫  
師人說與聽行藏

七十  
七十

經書驗盡中無効

○肝黃汗出病源歌

汗出渾身是肝黃

口中青色多眵淚

五藥生魂通抱服

藥用洗肝黃消散

○脾脹汗出病源歌

汗出脾家脹不消

口黃鼻冷微腫痞

唇又郎當精神慢

○脾即愈汗出病源歌

汗出脾愈口色黃

汗出脾黃多喫土

檳榔肉桂并荳蔻

○陰腎汗出病源歌

陰腎汗出是心黃

心連小腸饒顛走

急嚙消黃洗肝散

主人見道哭忙忙

肝黃得病目無光

肝家本旺見青陽

木家不奈火燒將

二消蜜下嚙三黃

五臟六腑不和調

相知此病大難逃

醫家千方沒功勞

寒鼻直上笑作忙

青橘陳皮共生姜

桂心二消配三黃

併嚙三眼自安康

心黃腎上汗如漿

更蕪賺汗眼顛狂

入河淋洗更無傷

大血兩鐵須要出

○定陰汗出風吹者木腎病源歌

陰汗騎來備風傷

木腎膀軀如腫硬

止痛消黃鹽酢擦

嚙用炒鹽葱一把

醫人不在放胃堂

腎家如鐵木軀將

火鍼刺破是明方

七傷嚙痰酒為強

酒煎冷下却如常

五臟黃

木通散治馬肺黃方見肺部

人參散治馬心黃病多睡饒驚神慢

人參

茯苓

甘草

吳藍

大青

黛青花

鬱金

黃藥子

代細

板藍根

右等分為末

每藥一兩

水半升

生薑半兩

擦油蜜各一兩同煎三五沸放冷草後灌

黃蓮散治馬肝黃病初得時目硬四脚如柱牽動到坐而倒

黃蓮

黃蓍

黃芩

知母

麥門冬

貝母

鬱金

大黃

山梔子

如無用



天門冬

黃藥子

細如無用

右十一味

等分

為末

每二兩雞子五箇生

地黃三兩

細槁

合和灌之

次日再灌

白藥子

散治馬脾黃

初得時精神慢頭垂鼻

出冷氣或起卧慢草迴頭返看

當歸

吾味子

沒藥

細辛

蒿本

厚朴

陳皮

白芷

牽牛子

青皮

芍藥

白藥子

代人

右十二味等分為末每藥一兩生薑半兩

搽細酒一鍾同調灌之

黃藥散治馬脾黃病外腎棚上一兩賺浮腫

黃藥皮

知母

貝母

鬱金

大黃

山梔子

黃芩

白芷

桔梗

括樓根

山藥

右等分為末每用藥一兩蜜四兩水一鍾

生薑半兩搽細同和灌之

苗香散治馬腎黃病外腎腫硬水草進退抽

搽後腎

茴香

知母

苦練子

甘草

貝母

乾薑

秦艽

官桂

山梔子

青皮

右十味

各等分為末每用藥一兩煨葱二

條酒半升

同煎三五沸放溫嚙之

○諸黃門

不二丸治馬肘黃

砒霜

黃丹

麝香

右件藥三味

同熬研為末湯浸紅餅為丸

桐子大兩頭

尖用微鐵破紙藥一丸在

內半月已後取下

千金湯治馬瘦內黃

千金木葉皮中

貫衆

松葉

艾葉各三

右用水三斗煎至一斗好醋一鍾徐徐嚙

治內外黃方

細辛

右二味於法油三升浸待藥潤取出倍乾

為末病重則二匙輕則一匙半調并花水  
一鉢好酒一鍾半分三服徐徐灌之平繫  
半白不給水草

又方

羊蹄根細一鉢

松葉細一鉢

右為同杵水一斗半和合取汁嚙口極妙  
羊蹄根三斗單搗嚙之亦佳

又方

羊蹄根一

艾葉三

右水一盆煎至七分常飲之

治外疔方

羊蹄根削如棗核以鐵周磨刺之納孔  
中則其瘡自消如無羊蹄葛根亦佳

又方

針刺舌端一寸血出令馬自嚼無血則  
不利

又方

婦人月經衣浸水并

麋皮末錢和

合嚙之

灸法

馬

二

馬面骨下端割十字灸十壯

治馬節黃一黃有二種節上癰腫軟而如

拳者名曰水黃以燒鐵條橫烙大節上三畫

只燒毛而止勿破皮腫如栗者名曰鐵黃腫

曰針如粒長以艾灸三壯艾炷如棗大若經

月不差則如前灸針曲池冗

鐵粉散治馬蹄黃一解蹄上堅腫者是以刀

割去其核勿犯筋一白鮮皮末鐵粉末等分割處塗之以布

帛裏之以艾煙熏之三日後去其裏帛

田螺膏治馬蹄黃

田螺乙鄉方云古白鮮皮

黃蘗

烏魚骨

蚤休

右任意多少同搗貼傷處以中裏

猪脂膏治馬膝黃用白鐵出血

何首烏

大黃

右等分為末猪腦猪脂中同研以油塗患

處中裏之

治馬地黄方

松一上二取三生四枝五以六粗七標八厚九覆十下十一端十二火十三

馬方

七

燒取

馬齒莧生搗

右二味和均厚傳瘡上以帛裹之經三日即愈

又方郁李人根皮細研用蜜和納瘡內愈

又方桃葉和漿爛搗傳瘡上以帛結之得効

又方

明礬松脂  
右等分煉成膏作丸納孔中神驗

○諸張明  
牽牛散治傷飽氣痛草慢及因飽起卧

牽牛子 續隨子 瞿麥  
郁李仁 甘草 木通

陳皮 滑石  
右等分為末每用一两半煎葱生薑湯二

治六畜食米脹欲死方  
大盞同調灌之如起卧油一盃和灌之

治馬中穀方  
麴汁灌之立消

生蘿蔔三五箇切作片字啖之立效

又方

麥蘖三升微炒為末和草料餵之甚良

又方

手執脾上繫向上令皮離肉如此數過  
以大鍼刺空中皮突過以手當刺孔則  
有如風吹是穀氣也令人溺其上又以

鹽塗之立乘數十步即愈

治馬卒熱腹脹起卧欲死方

藍汁一升和冷水二升灌之立效

東人經驗治脹滿方  
鹽一升研和冷水二升灌之即愈

用一竹筒一端留節鑽小孔一端斜削

納肛門中以艾灸鑽小孔十餘壯即去

竹筒糞隨筒而出得效

緊化滯氣消膨

牽牛子散治馬低頭難腰背緊化滯氣消膨

脹

- 白牽牛子
- 大腹子
- 大黃
- 甘遂
- 葳靈仙
- 陳皮

蒿本

當歸

丁香皮

葶藶

右等分トウフン為末トメ每用藥トク一兩ニ水半ニ升トク入葱トク白トク

十莖トク細切ニキリ生薑トク一分トク細擦トク煎トク沸トク草前トク溫トク灌トク

治馬トク誤食トク亂髮トク飛禽トク毛翎トク或木硬物トク使腹脹トク

悶欲トク絕トク穀トク作トク有時トク體瘦トク方トク綿トク一兩トク剪折トク細油トク調トク嚼トク之腹中トク惡物トク即トク

隨綿出トク綿トク一兩トク剪折トク細油トク調トク嚼トク之腹中トク惡物トク即トク

消毒散トク治馬トク誤食トク毒草トク口中吐沫トク悶絕トク欲死トク

白礬トク半トク右同トク拌トク令トク均トク於トク舌上トク塗トク之トク良トク久トク再トク用トク甘草トク

末トク二兩トク水三升トク同煎トク二升トク放トク溫トク入トク芸薹汁トク

半升トク鹽二兩トク伏龍肝トク一兩半トク同調トク嚙トク更於トク

尾本トク穴出血トク一升トク即差トク

大安散トク治馬起卧トク大肚板腸トク糞不轉トク

青皮トク陳皮トク大戟トク

木通トク牽牛子トク大黃トク

瞿麥トク郁李仁トク晚瓜苗トク

滑石トク鼠糞トク續隨子トク

右等分トク為細末トク每用トク一兩半トク葱一握トク水トク二トク

鍾同煎三兩沸放温入油二兩攪之後頗

阜角散治馬結糞

阜角燒灰 大黃 枳殼

麻子仁 黃蓮代黃厚朴

右等分為末清米泔調嚙暑腸突蔓荆子

末同調嚙之

又方

冬月馬結糞納竹筒穀道中冰碎納筒

中以木箸推入

治馬大小便不通眠起欲死須急治之若不

急治斃以脂或油塗入手探穀道去結屎又

以鹽納溺道中溺出便差

滑石散治馬小便不通 滑石研一兩 朴消研 木通

牽牛子各二

右為末同温水嚙一兩末通再嚙之

人參當歸散治馬大勞小便赤濁或有血出

大黃 人參各一 當歸半

右細切用水二鉢煎至一鉢半待冷去滓



加清醬一鍾調嚙之  
白芷散治馬尿血

沒藥代蒲 自然銅 細辛 肉桂  
芍藥 藁本 當歸

右等分為末每服一兩鹽小許童子小便

同調嚙之

青鹽散治馬眼骨

白礬四 青鹽彈子二塊

右將鹽為末銚子內中心用礬蓋用火飛

之熬定後取出却入炭火燒絕黑煙為度

明睛散治馬點眼

白礬飛乾者 烏賊魚骨一分 燕莖一分

灸法

凡馬眼骨後腹痛及諸腹痛灸神闕穴  
五十壯即差神驗

又方

初發時釜底墨鹽炒等分細末一錢納  
眼差

又方

熊膽如小豆大細研酒一鍾半和均以  
小盃徐徐嚥之後腹痛則一日不給料  
即差

又方

初有氣以亂髮燒燻鼻流涕至流濃

○諸熱門

治馬年熱二母散

貝母如無用瓜樓根各五兩山梔子一兩

知母五兩

右細末每壺藥末二兩生薑二兩研細取

自然汁同調飼草後嚥之

麥冬散治馬發熱貪水慢草或因起卧未著

草虛熱飲水

人參 茯苓 黃蓮代括

乾葛 烏梅 甘草

石膏 蘆根

右等分トウシ細末サイ每藥イ一兩半リヤウハン蜜ミツ一兩半リヤウハン水スイ下ゲ大鍾ダイチュウ半ハン同煎ドウケン三四沸サンシウヒ放冷ハツク先以マツ新汲水シンキスイ啗ノミ後ノチ嚙之クハス

治馬熱ウマノネ發垂青ハツクサナセ解毒飲トクドクイン

鹽豉シ一升イシヨウ研ケン猪母糞シウモクソウ

蜜ミツ各四兩カクシヨウリヤウ

右藥ウダク同ドウ和草ワクサ後啗ノチノミ之ノ隔日ヘツニヒ再啗マタノミ

又方

黃黑豆ワウコク及ツク熟飲ジュクイン散三四度サンシウタク則愈ソレニイユ

又方

以麩鹽フコ和ワ作劑サツ用水スイ洗下センゲ汁ジツ飼草キウサ後ノチ嚙クハス

○温疫門ウンエキモン治牛馬時疫ウシウマトキエキ

白木ハクキ藜蘆リロ芎藭クウキウ

細辛サイシン鬼臼クイジウ菖蒲ショウボ

右等分ウダク麋末メイマツ燒熏シユン兩リヤウ鼻令煙ハナニケリ入腹イラハス即愈ソレニイユ

五木瀝イノキ治馬疫氣ウマノエキ已發イハツク未發ヘツク

梧桐木ウツク白楊木ハクヤウ白榆木ハクユ  
紫柞木シソク梓木シ牙木キバ

右為刮取等分束如炬取油塗病馬牛滿身至蹄甲垂死即活

又方

懶肉肝肚以水煮汁嚙之不用尿

又方

始發羊蹄汁二三升嚙口未發者預嚙

又方

有氣則千金木斫取擁廐又水煮木與

葉待冷嚙口又菜判和草飼之

灸法牛馬疫通用

初發時身體中有小腫字細審之腫則

以燒鐵條烙之又冷水漫豎體寒為度

又以艾炷如小指大灸神闕穴中臍三十

鼻療門

治馬瘰菴麥磨粉拌草連稗折飼之

又方

松脂明者熊膽分

右為細末納兩耳中以軟帛約耳根錢兩耳後頂端有虛穴灸七壯三日後約帛解

又方之

馬小台星毛旋中鑽徹骨即止勿犯腦  
老馬腦深兒淺細審鑽之先以臭油塗  
之灸三七壯厚紙貼之生肌為限凡飼  
之勿多水

又方

原蠶蛾細末一分  
兩耳中  
好酢一匙  
分盛

石蝶蛸散治馬鼻瘰

又方

石蝶蛸  
右等分  
末真油一鍾入亂髮煎待冷烏雞卵四介  
同和分納鼻中即差

又方

藥皮三分  
貫衆一十鄉云  
黑豆一  
右水二斗半煎至一大鉢紅花末一錢煙  
墨五分好酢一鍾咳嗽則加製半夏三分  
和均嚥口

真油 鍾

白鑞

黃鑞

甘草

人參

大黃

有咳嗽

加製半夏

夏

羊蹄根

生則漸細細研末

則五分細末

錢各三一分同

右味淡豉湯

一鉢好酒

一鍾和均

以竹筒

分三

先以白鑞

分三

納口

次以前藥

又方

瘰如一年可治

此藥性緊勿飼半日

又方

瘰如一年可治

芥子

鹽 各三

蒜 七

右件

一處搗成膏子

若右鼻瘰用藥

兩

右耳內尖上

裏面皮用

小力直

翻三道

將

耳尖望裏

相倒用

麩子

緊包裏耳根

上細

繩緊縛

十日不騎

即愈

耐後方

治虫瘰

十年者

醬清如膽者

右分兩度

灌鼻隔

一兩日

再灌之

將息令

不得多多

則損身

追蟲散

治馬虫瘰

病

躑躅花

穀精草

蘆薈

瓜蒂

母丁香

麝香

各一分 研半分

皂莢分用 右細末麝香拌勻每用半錢以竹筒盛吹納鼻中虫出差鄉麝香亦可

藺茹散治馬附骨疽骨一瘡云

藺茹 白鮮皮 黃蘗皮

細辛 松脂 石硫黃

右等分細末熊膽如大榛子許沈水和藥從瘡深淺作丁以筋納瘡口七日内差

又方

明松脂 葱白 醬 鹽

又方

巴豆散治馬脚生附骨疽即入膝節令馬跛

芥子兩半 巴豆無介去皮如

右先芥子研爛次入巴豆同研細用竹刀

子以水和令相着每用先當附骨疽上按

去毛融小蠟周匝圍之蠟罷以藥傳骨上

取生布割兩頭作三道急裹之骨小者一

宿便盡大者不過再宿審知骨盡即便取  
冷水洗瘡淨再取車軸頭脂作餅子蓋瘡  
還以淨布志裏之三四次解去即生毛而  
無癩此法神良大勝灸者然初用藥時須  
以蠟圍恐藥燥瘡大用藥了須頻頻看恐  
骨盡便傷好肉若未差輒乘騎即令瘡中  
血出便成大病切須慎之  
雄黃散治諸般腫毒筋骨大硬

雄黃 川椒 白芨  
白欬 官桂 草烏頭 大黃  
芸臺子 白芥子

右等分為末每藥一大匕麵一匕醋一盞  
同熬傳腫處  
麻子散治馬失節擦腫

白芥子 木鼈子 草烏頭 雄黃  
白芥子 草烏頭 雄黃  
右藥末油調擦候一伏時如失節用水浸  
有瘡腫油調藥後亦一伏時用水澆潑或  
有腫痛再用附貼候乾再水走潑



桃花散治老鼠瘡瘡癩癩癬癬

明松脂 白礬

右等分細末每瘡以針橫刺去惡汁用唐紙裹納之

又方

針瘡開口以皂莢細末納之大效

又方

銅錢不以多少醋內蘸火燒九遍細末千年石灰同和作丁字納瘡口

又方

黃狂狂西西肥肥皮肉并骨燒存性細末唐紙裹納乳中亦治骨瘡

又方

用射干射干鄉鄉云云凡凡削如棗核大以鍼刺瘡作孔去惡汁納之其腫濃出即愈

黃藥錠

黃藥皮末 簡茹末各一分 細辛末

白鮮皮末各一分

右和水作錠子如串子大以鍼橫刺瘡作孔納錠子濃出即愈

灸法

執病馬兩耳伏其馬眼後大血俞量去  
 眼一寸端耳抵處淺針開皮不出血灸  
 三七壯又兩脇自上第三肋下橫大血  
 兩歧中以針暫刮其皮灸三七壯又針  
 尾尖灸三七壯又馬脊末四歧中高骨  
 陷中灸三七壯額上旋毛中以針開皮  
 納銅錢愈  
 付口舌瘡  
 喉腫明  
 牙消散治馬咽疾腫痛或口內瘡草慢

牛菜子炒過 天門冬 五倍子各炒過

鹽豉 白礬 牙消各生用

右為末每一兩半蜜一兩如口瘡小便浸

鹽豉一兩飽嚼之

薄荷散治馬鼻濕鼻內虫出咽喉腫痛作聲  
 燕水草稍難草慢病

龍腦薄荷 川芎 紫何車

黃藥子 甘草 白殭蠶

栝樓根 川黃蓮 川甜消

牛菜

右等分為末每用藥一兩半新汲水半升

治馬喉腫方

以鍼連柄納竹管中露刃七分刺懸癰血出即愈

又方

取乾馬糞置瓶子中亂髮覆之火燒馬糞及髮煙出令熏馬鼻須臾即差

赴慈散治馬口舌瘡

黃蘗皮 細辛 各等

右細末破處塗之

立效散治馬木舌在外

款冬花 瞿麥 山梔子

地仙草 各一兩

右為末塗在舌上立差

打破瘡

丹礬散治打破驢馬梁背并諸處磨擦成瘡

訶子核 白礬 黃丹 各半

右藥先以白礬於銅銚子內鑿作汁入黃丹攪令熬之乾枯看黃丹色紫為度先將

訶子核擣爛便入熬礬黃丹同搗羅為末  
先以溫漿水洗瘡更用冷漿水洗之不用  
苦乾貼藥末細摻蓋遍乾手按過不防乘  
騎瘡極者不過兩上  
定粉散治馬花瘡菌瘡

砒霜 錢一

定粉 錢半

膩粉 錢半

菜豆 顆二百

右一處不得語杵為末每用漿水洗過少  
使藥貼

又方

生米切作片子貼瘡上以艾灸貼米上

米熟則改貼二十壯瘡亦落

薑礬散治馬打破梁背瘡

白礬 二兩

生薑 二兩 燒

右為同研每貼油調相度瘡大小使藥如  
瘡濕即乾摻立效

又方

治馬鬣瘡鬣多會凡馬為物所傷鬣肉

腫滿濃出

蘭茹

白芍藥

右等分細末以紙裏納深則作錠納之  
又方 治馬脊打破瘡

用馬脚下水屎濕稀泥塗之乾即易之  
或溝中青臭泥亦可已破成瘡者用黃  
丹枯白礬及生薑三味燒灰存性等分  
為末入麝香小許真麻油調傅已成濃  
者先用漿水同葱白煎湯洗淨傅前藥  
肘後方 六畜瘡焦痂麩膠封之即落

○癢蹄門  
丹砂散治馬癢蹄

礬砂 兩  
黃丹 錢二

右件藥二味同研細先用羊脛骨髓調搭  
紫礦膏生馬蹄

紫礦 黃蠟 各四兩  
黃丹

白膠香 木鼈子 已上各 臘脂 頭髮 三錢

酥 兩半 菜油 兩四

右件藥八味一處慢火熬頭髮盡為度盛  
在磁器中蹄上侵毛搭一遭三日五日一

如 上 聖膏生馬蹄

好猪脂油四兩去熬生薑二兩胡桃仁半兩

爐甘石為末

右件藥四味一處慢火熬成膏先洗過蹄

拭乾用藥靠先搭一遭三兩日一次上

木鼈子膏生蹄

猪脂生片

黃蠟片半

紫礦三錢

頭髮燒三兩

木鼈子五箇

地黃半兩

批把葉為末

右件藥七味先將猪脂熬油去滓次入餘

藥再熬成膏入瓷器內塗於紙上餘貼

定血黑藥子治馬瘡口寒久不效或磨刺破

瘡

草烏頭不拘

右用醇麴裏之候乾燒存性用梔合於地

上良久去火毒候冷取出為細末乾貼即

愈

乳香散治乾濕癢

烏賊魚骨三兩

白礬兩

乳香半兩

右件藥三味細搗羅為末濕癢淨洗貼乾

癢用油調搽

治馬癢蹄方

以刀刺馬腕叢毛中血出愈

又方

融羊脂塗瘡上以布裹之

又方

紋魚濃煮塗之

又方

以湯淨洗燥拭之嚼麻子塗之以布裹裏三度愈

又方

巴豆三十介用真油煎削去毛塗之即愈

又方

剪去毛以鹽湯淨洗去痂燥拭之煮人尿令沸熱塗之即愈

又方

先以酸泔清洗淨然後爛煮猪蹄取汁熱洗之差

東人經驗治馬疥

蘭茹

藜蘆

歲靈仙

右等分

細末和如淡粥塗之

層層木油塗之

又方

猛灰二斗白木爛擣一斗水二盆煎至

一盆稍熱塗之不過三度永差更無復

發

又方

苦參 白頭翁 各三斤 水五盆煎二盆紅

椒 苦棟 各皮末和溫洗之

又方

用好釀醋調石灰熱搭大妙

研芥子塗之

又方

生漆木切作束如炬以火燒取油塗疥

瘡一二度雖積年疥瘡見效

雜病門

消黃散暑月灌馬

大黃 黃芩 梔子

黃蓮 代地 黃蘗 滑石



甘草

桔梗

栝樓根

薄荷葉

右等分為末蜜水嚙每服二兩隔一日一

服

治馬

腿骨解

鄉云都

以繩繫不病脚腿子上

沉杵

輕打傷處

三下不入則騎急行四五步

許還入

治牛馬百病

柳葉生牛乳同搗爛丸如彈子晒乾用

時擣為細末仍和生牛乳灌之神效

治馬

急行遠路傷血入腹肚清醬和醋一升

又方治馬百病

大黃半茶蜜一大者一分小者一分猪膽大者一分小者一分

右大黃碾極細用水一椀浸重次白先入

猪膽多攪均入蜜再攪均嚙之春一月兩

服夏秋一月三服

又方治馬急起卧病

取壁上多年石灰細末二兩用油一大

鍾酒一鍾半調嚙之

馬方

又方治馬落兒後

藿三介 生葱十介 麩七 麥五 合

右水半盆同煎待冷徐徐嚙之

新編集成馬醫方卷終

