



武門  
第 77  
卷 7

同治

# 截方序

方者後手刀圭之技  
四診以察焉標本以攻焉  
而後處方其治可驗也  
若夫四診不察標本不  
攻則雖有千百良方徒為  
虛器諺所謂莫耶之一劍  
依執持之

明治  
永麟  
十

龍

醫事小言卷之七藏方

叢桂亭藏

大西利錢系焉學者思諸文化  
 二年七丑十月原另克記於水  
 石城南叢桂亭中

男呂綏謹書



叢桂亭藏方目次

甲字湯	乙字湯
丙字湯	丁字湯
弄玉湯	曼倩湯
忘憂湯	濁浪湯
中正湯	及急湯
如意湯	發後湯
翹玄湯	潤通湯
知母湯	獨活湯
肺癰湯	巫神湯

聖薑湯	相皮湯
鍼砂湯	當歸湯
香姜湯	甘竹筴湯
黃連解毒湯	九味檳榔湯
紫胡四逆湯	尚足飲
合璧飲	不及飲
烏藤丸	雞肝丸
刀豆丸	令壽丸
皇盤丸	將運丸
甘遂丸	萬藏丸

黑瞳散	木香散
繫宿散	仙受散
治水散	崑崙散
一極散	三妙散
工彖散	乳香散
桃花散	皮弁散
有牙散	珊瑚膏
坐藥	摺瘡疥方
治狐崇方	又方
救溺死方	腋下狐臭方

醫事小言卷之七藏方

二

叢桂亭藏

叢桂亭藏方目次 畢

叢桂亭藏方

水藩 侍醫 南陽 原昌克子柔 著

同藩 醫宦 門人 揚元貞子幹 同校

宮井俊德子明

甲字湯 理瘀血方

茯苓 一錢 桃核 芍藥 各七分 牡丹皮 四分

桂枝 六分 甘草 生薑 各二分

右七味以水二合煮取一合分服

婦人為病屬瘀血者。什之八九。經閉。腰脊攣急引脚。新舊腹

痛。或天氣陰晴。頭痛頸強。發作有時。不係蟲積者。皆屬于瘀血。外施鋒鍼。刺絡出血者。為良。又治產後小便不利。水腫病。屬瘀血者。有驗。或加附子。手足引痛之證。為瘀血結滯之因。中風偏枯。歷節風痛。癢痕疔痛。脹滿麻木。冷痛濕痺。男女并通用。又加附子。或烏頭。有塊者。加鼈甲。腸癰。加薏苡仁。膿既成者。更加大黃。

乙字湯 理痔疾。脫肛痛楚。或下血腸風。或前陰痒痛者。方

柴胡 黃芩各七分 升麻 大黃各四分  
甘草三分 大棗四分 生姜二分

右七味。以水一合半。煮取一合。分服。外橐吾莖葉煎汁。又煙

草煎。洗之。亦得。又井華水。頻灌亦良。

諸瘡疥。禁洗傳之藥。下部瘡疥。最忌之。誤枯藥洗傳。頓愈後。上逆鬱冒。如氣癖。纖憂細慮。或如心氣不定者。并主之。而灸長強。腸風下血。久服無効者。宜理中湯。

丙字湯 理諸淋方

甘草六分 厄子四分 澤瀉二分  
當歸 地黃 滑石 黃芩各五分

右七味。以水二合。煎取一合。分服。血淋。加阿膠。又散服。亂髮。灰。灸隱白。太鍾二穴。六七壯。或須滑石。礬甘散。間服。經年不治者。兼與再造散。若陰腫疼痛。發瘡疥。或為漏者。烏藤丸間。

服化毒丸亦得。其腫疼痛劇者，忘憂湯洗之。

丁字湯

理癖囊病。舊腹痛吐宿水，得食痛劇。嘈雜、噯氣、酸臭。

衝鼻至昏暮，吐終日所食之物，吐後痛如失。次日又作前狀。

者方

牡蠣 六分 錢

茯苓 二分 錢

吳茱萸 八分

橘皮 四分

朮

枳實 各六分

甘草

生姜 各二分

人參 三分

右九味，以水一合半，煮取一合，分服。忌生冷、粘滑、魚、鳥肉、油、膩、酒、餅等物，節飲食而調養。

其人起居如故者，一日量與陳倉米二合，作粥，以飲水一合。

藥一貼為限。病劇者，米一合，作粥，分與一日四餐，只用燒味。

嚼金山鼓、梅醬供膳。其他如鹽、薑、糟、茄，不許食之。菓食蒸餅。

一切禁之。煎茶最忌之。貪嘴偷食，不能守禁者，難治。癖囊病。

朝起空心則無痛。朝餐後腹微痛，或嘈雜。午餐後劇，晚餐後。

益劇。是以胃中不能消穀而發痛。故昏暮吐盡，終日所餐物。

而痛如忘，但其吐水倍所飲者，古稱朝食吐者，反胃者。或

翻是也。或加附子，或加烏頭，又兼用工家散，更妙。又與赤丸。

周身發疹者，別是一策。不與此湯管。

弄玉湯 理小兒疳證。黃瘦、腹痛、久下，或食不進者，大人心中下。

痞、惡心、虛悸等，可通用。

茯苓 一錢

桂枝

木 各五分

橘皮 三分

木香

黃連

甘草 各一分

右七味煎服。惡心者加烏梅。屬冷者加附子。

小兒疳癖。嚼瓜或食壁土炭者。兼與黑瞳散。餌鰾鱉魚。灸背腹。劇者連日上艾火。若疳眼。或生翳者。雞肝丸。間之。

曼倩湯 治陳久腹痛發作。澀囊。嘈雜。吐食者。

牡蠣粉 半錢

柴胡 八分

芍藥 七分

枳實

吳茱萸 各六分

甘草 三分

右六味煎服。禁若丁字湯法。此方與丁字湯同効。只有彼驗是驗者。忘憂湯 理諸急痛者。眼胞熱腫。前陰腫痛。或為痒。又湯火傷。

亦可洗。

甘草 二錢

右水盞半。煮取一盞。洗患處。

濁浪湯 洗痔瘡為痒。或前陰腫。婦人牝戶傷爛。熱痒。或生瘡者。一切下部諸毒。主之。若下疳瘡。及諸瘡有膿氣者。不可洗之。

荆芥 金銀花 各二錢

黃柏 半錢

枯礬 一錢

蛇床子 三錢

升麻 二錢

右六味水五合。煮取三合。半葉溫洗之。馬尾退落。俗呼尾味。曾者。試洗之。劑全愈。

中正湯 治食傷吐逆不安。又理霍亂中熱。陳舊宿食方。

半夏 五分

木 四分

藿香

橘皮

乾姜



厚朴 大黃各三分 黃連二分 木香 甘草各一分  
 右十味煎服。

經年宿停食毒在內為種種之証候或似痰似積宜察其因而治之。又得病治之中間傷食嘔吐者或以為加變症者并主之。飲酒多過下血人以痔治之無効者主之。一女子不能穀食香川太仲為癰而論之經三年而不治始食赤小豆。暫又惡之靡食。恚意者甘藷。纔盈口而護生更問其所得病則三年前過食桃花飯爾後覺腹滿常如飽心神憤憤惡聞食臭只臥深閨與此湯數十日而報病又一少女惡白飯只食炙魚二年許服此湯百日許而全愈運用多端。

及急湯 治噎塞方

芍藥 附子各四分 紫菀 烏頭 半夏

防風 桂枝 枳實各二分 人蔘 遠志

乾姜 細辛 食茱萸各一分 甘草少許

右十四味煎服。腸噎者是不治之證。此方但取一時之効而已。如意湯 理五淋疼痛方

桔梗 甘草 薑草各等分

右三味煎服。血淋加亂髮灰。

發後湯 截瘡方

蒿本 前胡 葛根 白朮 芍藥各等分

右五味。水煎。瘡發日。不用一切之藥。發後熱解。分服二貼。次日。二貼。發日二貼。凡六貼。即治。始患瘡。不可截也。俟其毒盡。而可截。翹玄湯。治蛇盤瘰癧。頸筋凝硬方。

連翹一錢 玄參 木通各七 升麻

羌活 山梔子各三 黃陸 甘草各二

右八味煎服。上部腫毒發疔。或麻疹愈後發小瘡。寒熱似瘵。疾狀者。宜用之。

潤通湯 理久淋。腹痛拘急。枯瘦者。常淋亦用。而有效。

麻子仁 木通 車前子 冬葵子 各一錢半

滑石 當歸 地黃各一 阿膠三錢五分

右八味煎服。腹脹停滯者。去地黃。加虎杖根。

知母湯 治產後乍寒乍熱。通身溫壯。胸心煩悶方。

知母 芍藥 黃芩各七 桂枝 五分 甘草 二分

右五味煎服。

獨活湯 理產後腹痛引腰背拘急疼痛方。

獨活 當歸 桂枝 芍藥 生姜各六

甘草二分 大棗五分

右七味煎服。

肺癰湯 理咳唾腥臭。口吐膿。或如米粒。胸肋間隱痛。或徹背聲枯氣急。不能卧者方。

國老

桔梗各六分

貝母

括蕒根各五分

杏仁四分

白芥子三分

生姜二分

右七味。水煎。

巫神湯

理婦人血暈發熱。或振寒。小便不利。上衝頭眩。惡心。或嘔。或吐。產後諸症。婦人百病。運用多端。

茯苓一錢

朮

猪苓

澤瀉

桂枝各五分

乾姜四分

黃連三分

木香一分

右八味。煎服。

瘀血結痛。桃仁輩頻用。益劇者。有不可攻者。其持重堅守之日。可任用。血熱入膀胱者。是正的。

聖薑湯

理諸瘡內攻。一身洪腫。諸藥不效者。

牛糞

夏月。放青者。益良。曝乾。二錢半。

右一味。煎服。神驗。

相皮湯

理脚氣衝心。一身洪腫。皮膚不光澤者。

檳榔子一錢

吳茱萸

紫蘘葉

木瓜

橘皮各四分

生姜三分

右六味。煎服。

鍼砂湯

理虛悸短氣。眩暈虛煩。并黃胖方。

鍼砂八分錢

牡蠣

茯苓各一分

桂枝四分

人蔘二分

朮五分

甘草一分

右七味水煎分服。配用皇盤丸。或鎮神丸。

此方運用多端。專以鎮墜為主也。神氣不定。胸膈動悸。眩暈。或夜卧不安。或多惡夢。或夢遺露精。或大病愈後。眩悸心煩。或上衝耳鳴。此他。心胸間有悸。為種種證者。用之。妙在鎮墜。

當歸湯 療胸痺心痛。并陳舊腹痛。旁治淋囊病。

當歸 六分 芍藥 五分 黃耆 桂枝

半夏 四分 乾姜 厚朴 蜀椒 各三分

人蔘 二分 甘草 一分

右十味水煎分服。寒疝加附子。

舊腹痛。得食則劇吐。則快。噯氣吞酸。辛臭衝鼻者。旋覆花代。

赭石湯。附子粳米湯之所治。而無驗者。用此湯。凡胸痛心痛。

微背為危證。若真心痛。則手不可近。朝發夕死。最為急症。而有緩急輕重。其急為難治。人皆所識也。其緩可治。凡其痛徹。

背。只起坐不能。卧或俄飢。得食痛稍薄。得甘味益快。是建中主。或胸如麻。如痺懸痛者。并主之。舊腹痛屬寒疝者。極多。兼。

用烏頭赤石脂丸。嘈雜者。兼用二朶散。有仙驗。

香姜湯 理赤白帶下方。

香附子 二錢 芍藥 一錢 乾姜 六分 甘草 二分

右四味煎服。

凡帶下。腰及脚冷痛。牽引者。帶下數年。眼目瞳子散大。殆似。

內障候者。不可必為血虛之候。而行補血之策。其治在下氣之方。及坐藥主之。若夫數年患之。臭惡不可近。廁中之氣。及窓外者。為難治。又面目四支。羸瘦無大肉。潮熱盜汗。雖壯婦。然難救療。况老嫗。赤白穢物。有臭氣者。別是一證。藏内生蝕。瘡下膿汁也。必覺隱痛。不可以破血補血。而覆置焉。其因懸隔。又有桃花蛙者。與瘰同。不治。

甘竹茹湯 理產後內虛。煩熱短氣方。

甘竹茹 一錢 黃芩 八分 人蔘 二分

茯苓 六分 甘草 一分

右五味煎服。

黃連解毒湯 治諸熱毒。諸惡毒方。

黃芩 一錢 山梔子 五分 黃連 大黃 各四分

人中黃 臘月製 三分

右五味水煎服。吐衄血。或痘毒結熱不醒。或心氣不定。夜寐不安。若夫虛悸妨睡者。加茯苓。兼用刀豆丸。

九味檳榔湯 理脚氣氣血凝滯。為腫者方。

檳榔子 一錢 紫蘇 厚朴 枳實 各四分 橘皮

桂枝 各五分 大黃 三分或五分 木香 二分 生姜 五分

右九味水煎。照常。

氣血凝滯。為腫者。灸足八種。連日不愈者。良其灸法。因病之

輕重將息。又刺委中出血者亦佳。于八種灸穴詳解  
柴胡四逆湯 疫熱挾陰症者主之。

小柴胡湯合茯苓四逆湯

余昨治疫大低承氣白虎每每收功。近時所見大不同。潮熱  
譫語。舌上乾燥。詳之則其人雖熱不發。開衣被或惡風。足指  
微冷。舌乾而無胎。或黑胎不渴。或下痢。此方有異驗。潮熱譫  
語。用附子者。非方後論說之所盡。

尚足飲 理舌唇生瘡牙痛喉痛一切口病方。

石膏一錢 黃芩六分 紅花五分 玄參

大黃各四分 黃連三分 甘草二分

右七味水煎分服。蟲牙痛含之稍久而吞下亦佳。

口內諸病。配用崑崙散。旁理乳後心下痞。虛悸。或心煩。神氣  
不定者。又眼痛赤熱用之。

合璧飲 理痢病赤白下重後急者泄瀉并治之。

芍藥一錢 黃芩七分 枳實六分 厚朴

大黃各五分 甘草二分 大棗二枚

右七味水煎。若嘔者加半夏生姜。

凡痢病寒熱者。先與葛根湯主之。如小兒最為危證。以發表  
為至策。老壯同法。表解裏急後重仍在者。此湯主之。利減毒  
盡而休。不必收斂。仍延日者。去大黃枳實。若下純血者。加赤

石脂裏急倉皇登廁點滴不下者是為氣滯去大黃加木香  
枳實五更瀉又曰脾腎瀉者溫補無効則更用秘瀉之藥勢  
及前竅小便不利變為水腫狀者每每見之先用此湯則下  
乃斷慎勿過劑五更瀉一種有係寒疝者不問下利治疝即  
休宜熟察又陳舊下利多屬疝家者亦不問下利而可小兒  
疝痢亦有不問下利而治疝者同機也而疝痢亦有疝又不  
問疝而治疝即妙凡大便前小便利者又不拘大便特小便利  
者為佳兆是痢病一種之看法也痢病經日者灸天樞疝痢  
益有驗疝痢者不徒天樞灸之  
腹部數穴須灸之

不及飲與鼓脹方

大麥炒

赤小豆炒

茯苓各等

右三味煎服。

凡鼓脹服破血攻下之劑則益脹滿或腹痛小便不利不啻  
不能治其病反促命期不服藥節飲食調養則庶幾延年以  
此意論病人病家傍人以為對病不藥非正法議論咕咕懇  
求不止與之塞其責鼓脹豐脹諸藥無効者有不服藥則腹  
內平穩年餘復常者是最治鼓脹之一策也。

島藤丸 主癰毒新舊方。

大黃

輕粉各二錢

桂枝

沉香

甘草

丁子錢各一

右六味細末糊丸以七日盡一劑無効者更作劑用之口中腐爛至吞米飲者乃其驗也瘡即愈至口流血涎者不可驚其初誤治毒奔筋骨關節疼痛或眼目赤脉為醫者并主之若舊毒不盡者五寶散亦主之其機在緩急輕重而已初起發瘡五物解毒湯送下或加草薺腫疼劇者忌憂湯洗之

雞肝丸 理小兒疳癖虛羸疳眼生翳赤子一切眼目或痘毒入眼者方

雞肝一具

胡黃連

肉豆蔻

各五分

芙蓉花

六月花落者佳二分

右四味以水一合無灰酒半合煮肝及心至水殆盡而出肝心切片片餌之日三四次以藥查及煮汁和寒製米粉至可丸為度梧子大每服二三十丸

龔居中切科百効全書云胡黃連五錢芙蓉花陰乾

四錢肉果一箇麪裏煨共為末用赤雄雞軟肝一具去筋膜入前藥搗丸如彈丸大用白酒煮熟分作三四次空心溫服非特小兒用之大人眼目暗黑不明或翳矇者并老少雀目用而有異驗凡雀目黑瞳散亦得外灸合谷五七壯亦得又可灸身柱肺俞三里

刀豆丸 理癩狂方

刀豆

使君子

甘草



右三味等分糊丸。

令壽丸 療積塊氣逆欲絕小兒急慢驚風并疳癖方。

當歸 芎藭 地骨皮各半錢 雞舌 檳榔子

莪朮 桂枝 茯苓 香附子 橘皮各二錢

甘草 熊膽各五分 黃連三分 麝香四分

右十四味搗篩糊丸辰砂為衣。

皇盤丸 療黃胖方

木 厚朴各三錢 橘皮半錢 綠礬二兩煨過

右四味共末糊丸每服五分日二。鍼砂湯送下白湯亦佳。

黃胖病面青黃腫無光彩動悸喘乏眩暈耳鳴手足爪甲反

折不榮是其證也。劇者欲執作則先喘故偃蹇懈怠此證有與產後水腫或崩漏帶下後或腸風臟毒去血過多或痰飲奮嗽等併病者悉主之。

將運丸 治傳屍勞瘵灸四花患門而用之。

大黃 麝香錢一 管仲 猪牙皂角去皮炒

雷丸 桃仁去皮 檳榔子 鼈甲酸炒各一兩

蕪苡仁半兩

右九味為末以青蒿二兩東邊桃柳李桑葉各七枚水一椀煎至七分去渣入蜜一大盞成膏入前末及麝香搗丸如桐子大每服三十九食前棗湯下常山方衍義

甘遂丸 理心下水毒停畜逆滿衝心者方。

甘遂 二錢 吳茱萸 大戟 芫花 各三錢

芫硝 一錢

右五味細末糊丸。銀箔為衣。食前白湯送下。自四五分至一錢餘許。分量多寡。隨病勢緩急。

萬藏丸 治惡風方

烏蛇 白蛇 各一 大楓子 錢三百 午膠

苦參 防風 升麻 大黃 各六錢 乳香 二錢

麒麟血 五分 麝香 熊膽 龍腦 人參 各

分 金箔 十五枝

右十五味。杵大楓子二千下。內諸藥合治。更杵之內。龍麝令相得。彈丸大。服之。二十日服盡。其毒輕重。緩急。以意將息。不必拘日數。

黑腫散 理小兒疳癖。羸瘦丁溪。鼻孔常赤。睡中驚悸。戲遊了

戾齧。或噉生米壁土炭等物。疳痢經日。不治。疳眼雀目。一

切小兒諸病。

烏 一隻。臘月捕之。去翼足。備并腸。填滿紅花。車前子。漬之。內糞中。三十日。燒存性。

右細末。炙鱧鱖魚。蒲燒。大寸許。塗藥。餌日兩三次。

小兒疳癖。以艾灸。為至治。身柱。膈俞。脾俞。肝俞。或章門。京門。不容。天樞。凡灸小兒法。先上小炷。其痛不徹。炷根無紅暈者。

或艾火數炷。止啼者。或睡者。去小炷。上中炷。艾亦不知者。更上。大炷艾。雖睡稍醒而不泣。泣亦穩者。併大艾二炷。劇者。有至併四炷者。每穴百炷。連日灸之。發灸瘡。則枯藥傳之。如背部諸穴多。知痛熱。只腹部多。不知者。三五日連灸。而知之。暫休之。灸瘡報疔。又灸。每月灸之者。俗唱月灸。二三年灸之。則壯健。只是姑息微細艾炷十餘壯而止者。徒驚啼而已。驚癇卒發者。艾炷小。則無効。古人言艾炷如雀糞。如麥粒者。蓋平常之法也。不在此例。每見灸小兒。乍輕爽。不俟湯藥。木香散。理心下痞。寒冷腹痛嘔吐惡心者方。

木香 良姜 黃連 丁子 莪朮 各三錢

檳榔子 七錢 胡黃連 八錢 縮砂 五錢

苦棟皮 四錢 甘草 一錢

右十味。散服。又丸服。

藥宿散 治癬瘡方

葎葉 長夏採乾

右一味。細末。和酢塗。其塗時。先以麻布拭瘡上。肌皮發起。而後塗之。益妙。

仙受散 理產后水腫方

大豆 一兩半 炒去皮 琥珀 茯苓 各一

右三味。為細末。濃煎紫蘊黑豆湯。送下。日三四次。每服一錢。

治水散 理一切水腫小便不利方

冬瓜 水盈瓜腹中

右二味燒存性為散配用諸湯每服半錢或一錢

崑崙散 理舌瘡及一切口中諸瘡腐爛并止齧齒痛

昆布未經製造者佳 鹽梅連核燒存

巴豆燒存性 枯礬二分

右四味研末傳瘡處甚良齧齒痛麻油少許盛小陶器安火上令沸取藥末一撮容於油中牙掃尖挾綿將絹包之絲以紮之熱油上藥末浮在者乘熱卷痛牙痛立止仙驗此方去瘡所惡肉生新肉敷藥而慘痛者毒淺不知慘痛者毒深又

其腐潰既去生新肉者無痛其度在看法內服尚足飲凡口內咽喉齒牙諸痛必結核領下大低纓筋前後絡脉凝結劇者每絡累累按之痛隱隱然而引患所是絡脉怒脹作核也即灸其核上五六壯至十數壯累累者每核皆灸大驗若不愈者連日上火唯其灸時俯仰則其絡內移互正取之又有今日灸之明日其核消散結於他絡者須摸索之而灸其處口問篇云齒齧刺手陽明不已刺其脉入齒中者立已乃此意也又喉痺纏喉風鋒鍼刺少商出血又刺尺中及十指端此法亦可施一切口病毒深者主之

一極散 治小兒驚口瘡

糞蟲土旺中。取為霜。生則中。稱尾長姐。

右一味。白湯送下。和糊敷足心。有得效者。

小兒胎毒諸病。以紫圓為至。治鴛口。紫圓二三厘。下之。則愈。若不愈者。再三服之。只是赤子初生。姑息畏之。不敢用。此散易用。方書皆言。銀突耳。或生紗。輕輕拭去。此法亦可用。

三妙散 治臍中出水者方

檳榔子 蒼朮 黃蘗各等分

右三味。共細末。乾撒肚臍出水。浸淫。成片。止癢。滲濕。又治濕癬。以蘓合油調搽。甚效。

工錄散 治舊腹痛發作者方

紅螺十兩 甘草一錢

右二味。研末。合治。白湯送下。一七。則噯氣焦臭。痛如失。若無即效者。非其證。

陳久腹痛。皆係于寒疝。按之痛。引臍旁陰筋及腰部者。是其候也。又按之。有腸鳴如蛙聲者。又有噯氣為噓。遇北風雨雪。夏月雹霰。雷雨之候。預催腹痛。手足冷寒。盛夏忌寒等者。皆屬疝。此散配用。丁字湯。桂枝加附子湯。當歸湯。烏苓通氣湯等。取效。兼嘈雜者。益妙。凡嘈雜者。牡蠣一味。白湯送下。亦良。  
藥肆有稱吉益牡蠣者。其性大劣。不可用之。

乳香散 理口中傷爛方

乳香一錢 朱砂少

右二味細末敷患處

桃花散 理諸出血方

隱君子一錢 葛粉三錢 辰砂少許

右三味和勻撮少許摻患人舌上閉目斂氣即止神驗又金

及傷敷之然不及摻舌上之妙一士人牙縫出血諸藥無效

至升餘此散一撮立地奏效牙縫出血者齒齦者其出血以線香點火焙其孔即止

皮弁散 治小兒欬嗽方所謂百日效者

燈籠草秋初採苗葉實相連燒存性紅熟者不佳

右一味散服又治大人痰咳吐白沫者用勞嗽似有驗者

有牙散 理帶下方

鼠去腸盈紅花燒存性一方用栗鼠亦佳

右一味細末每服一錢土茯苓五兩以水五合煮取三合分

送下日二夜一臘月午旁芽曝乾煮味嚼汁日餌食以七日

為期午旁冬月去苗後再生芽者曝乾大低日以七八錢分煮味嚼汁中或加水

珊瑚膏 療毒蛇咬人一名豆州膏

乾柿漬嚴酢中以其爛漬為泥為度

右一味為膏塗傷口及毒腫脹處神驗急卒無膏搗乾柿為

泥和好酢塗之柿渣塗之不及膏以青葱甘艸湯蒸益良

坐藥 治女人赤白帶下經日不止者方

杏仁 甘草各二分 丁香一分 枯礬一分

片腦五厘

右五味為末盛絳囊納藏中三日一換囊如指大以糸繫視小解則出之又納  
之穢惡貼着囊頭則拭之而再納若覺微痛者間日而納之可也

赤白淋露者先用甲字湯逐瘀滯而行坐藥丁香飲香姜湯選用又有大小柴胡主之者是宜察其證莫以帶下執滯巫神湯等亦可隨其候

摺瘡疥方 療一切諸瘡疥新久不愈方

巴豆 胡麻各等分

右二味研勻入酒少許摩瘡上日數次慎勿近眼胞及陰處

以發膿汁為度候其毒盡湯沐凡諸瘡內攻為腫狀諸藥不能奏其效者外摺瘡痕擡其毒瘡氣沸沸則小便即快解

治狐崇方 別灸鬼谷穴出于經穴彙解奇穴部

馬錢二錢 桔梗五分 薰陸二分

右三味水煎服神驗

又方

狼糞 白雞冠花各燒存性

右二味等分細末每用少許以蘆管吹入鼻孔中救溺死方 屈足大指則柔軟者可治強直者難救療

枯礬

右一味。以水調。頻頻灌之。灸神闕。仍將犀角末吹入肛門。吐水而活。救法詳諸若艸中。

腋下狐臭方

白檀

枯礬 錢各二

輕粉 五分

右細末。溫湯洗腋下。而后塗。散少許。又生陰蝨者。將散摻毛中。即去。

門人 郡司 恭 筆記

叢桂亭藏方 畢

書叢桂亭藏方後

錄又云。子之好畧。而世之好畧。不可不以接戰。錄又云。沙氏之至論。而世之好畧。不可不以療疾。吾 南陽先生之好畧。不可不以授之。錄又云。高權大夫。子亦秘蘊。悉出子之寶。錄又云。弟持之。自一至於此。既以於世。終未盡載。某方。見若憾焉。言井子明。言德之好畧。以公子世。先生許之。吾亦存之。吾可知也。自是以生。其志於畧。其於治。應之親。



起死肉膏之效云云。又云。乙酉之年庚辰初春

水戸 醫者友 條 志 高 謹 識



南陽原玄璵先生著述目錄

經穴彙解

命穴の誤を訂悉古書に徴し頭面腹背手足各分寸を以て圖に加し流注の一卷ハ一經切に別圖に記し奇穴二卷ハ諸書出

八卷

瘈狗傷考

病大喰療治るるを以て記し附録にハ鼠喰蛇食其外諸毒虫刺經驗の秘方を載

一卷

叢桂偶記

仲景の奇跡を考諸虫おつるを以て集めて廣東人參伊吹艾の考瘡瘡の考ハ丈島流竹の考瘡瘡神の考病名儒を考合し傷寒の名義を以て記す

二卷

叢桂亭醫事小言

假名を以て醫學論の秘を察色狐つきの見つけを委く記病因病名以古書に考し經驗の良方を以て療治を教末は家の秘方を以て

七卷

砦草

戰場より急卒の病金瘡赤身水死に至るまで救へき心付入後り此の病を考し方未人として製するを成すを以て記す

一卷

書肆

- 京都 二條通富小路 須原屋平左衛門
- 江都 下谷池之端仲町 須原屋伊八
- 水戸 下町本町三丁目 須原屋安次郎

