


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Inches  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
Centimetres  
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

**KODAK Color Control Patches** © The Tiffen Company, 2000  
**Kodak** LICENSED PRODUCT  
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black





傷寒雜病類方

醫

跋

武

110  
1

武門  
卷一  
118

清永壬子新脩

傷寒雜病類方



嘉永壬子新鐫



傷寒雜病類方

學訓堂藏版

傷寒雜病類方序  
余少時辱喜多鄙槐園先生  
票君齡尚多沈靖寡言笑  
好讀書終日沾畢不停聲  
余竊謂先生博學洽聞非

碌仁刀圭家所能擬宜承  
達選躋華廩而十與命朕  
其潛德必發于士栗君矣  
大進累餘季士栗君學殖二  
樂晉侍醫活眼聲華藉仁

動在余心和自喜藻鑑之  
平爽也士栗君博涉羣籍  
說尤妙心傷寒論輯諸家之  
歸于正庄疏義十卷後進  
者崇奉改焉醫門之圭臬

令又著傷寒雜病類方蓋  
清涼靈胎纂傷寒類方而  
遺病載之而不能無躡駁焉  
士栗君就二子之書取醇  
去駁綱提領挈極為明端

實藥籠中不可無一部也  
頃將錄諸梓授余序之余  
於醫書望洋向若而歎何  
足已序之焚嘗愛先生之  
文識君於善露豈可無  
一言但先生宰木已拱不

得覩君之榮進與其著書  
之富是則大可憾耳

嘉永癸丑立元

民齋安積信撰

閻國

蓮塘戶《清書

閻國

鄭嘉平刻

傷寒雜病類方叙

本邦寶曆間吉益公言爲則纂類聚方清乾隆  
間徐靈胎大椿編傷寒類方時代頽頏彼是見  
同亦可奇也夫方之治病有定而病之變化無  
窮故仲景之書應類方而不可類證其識卓矣  
想靈胎之著僅止傷寒而雜病乃不載公言之  
撰傷寒雜病併採而未免躊躇學者憾焉愚不  
揆擣昧竊就二子之書更加釐正勒爲一編題  
曰傷寒雜病類方雖未知有愜長沙見病知源

之旨否。然其於臨證施理之際。庶乎亦不無小補云爾。

弘化紀元闕逢執徐臘月除夜江戶喜多村直寬士栗撰

凡例

一徐靈胎類方成於乾隆己卯吉公言類聚方竣於寶曆壬午其間相距僅四年而識見之相合如印券符契矣蓋文運之盛衰隨時轉變而醫術之汚隆亦與世軒輊此乃天地生生之機造物者之無盡藏也今就二家之著捨瑕取瑜折諸其衷綱領節目秩然有條昔人云剏始者難工踵事者易密非敢欲凌前哲也

一漢之一銖卽今一釐四豪五絲。一兩卽今三分四釐八豪。一斤卽今五錢五分六釐八豪。六銖爲分。四分爲一兩。而其量則一升。當今一合有奇。一合當今一勺有奇。惟半夏五味子類。則係藥升量之。

藥升說見本草序例。今  
圭用以今曲尺計大約上徑八分五釐。據周尺制造以充家  
弱下徑五分五釐深六分五釐。

竊說見本草序例。今  
圭用以今曲尺計大約上徑八分五釐。

權量之說。最爲紛呶。而此乃當世識者所檢核。殊極綦詳。今舉桂枝湯一方徵之。桂枝三兩。卽今一錢。四釐四豪。芍藥。生薑。各三兩。三分合三錢。

一分三釐二毫。甘草二兩。卽六分八釐六毫。大棗十二枚。重四兩。以三枚準一兩。卽今一錢三分九釐二毫。凡一劑之藥。約五錢二分零。以水七合有奇。煮取三合有奇。較之方今醫家藥。一貼一錢七八分已上。以水二合。煎取一合服者。約略爲均。蓋古今之口相似。古今之病亦相同也。

一豬膽。本邦稀有。今以熊膽代之。梓白皮亦少有。以桑白皮代之。羊肉絕鮮。以牛肉或鹿

脯代之人尿使用不便以童子小便代之白  
酒未詳以苦酒代之弁是先哲所試驗而應  
機制變之妙自存乎其人矣愚嘗著越俎藥  
誌一書竊述古人代藥之義亦要參看

一玄武湯本曰真武湯避宋諱也人漫茈胡原  
作人參柴胡從俗便也凡此類今皆改訂以  
復其舊說具于傷寒及金匱疏義中

一金匱雜療所載單方捷驗者常須熟識茲不

備錄愚嘗著廣傷寒類方要是推擴仲景之

法今是著乃係約此之法故其編類間有不  
同觀者恕之可也

一此編詮次僅畢及門頻催刊布因校以授剖  
氏然金根自及猶或未免若正其謬補其闕  
固所企望乎後之博雅也耳

壬子春二月 喜多村直寬識

傷寒雜病類方目錄

桂枝湯類一 凡三十五方

桂枝湯一

小建中湯二

桂枝加桂湯三

桂枝附子湯四

桂枝加附子湯五

桂枝去芍藥湯六

桂枝去芍藥加附子湯七

桂枝加芍藥湯八

桂枝加大黃湯九

桂枝去芍藥加皂莢湯十

烏頭桂枝湯十一

桂枝甘草湯十二

桂枝加茯苓白朮湯十三

桂枝加厚朴杏子湯十四

桂枝加芍藥生薑人瀆新加湯 十五

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯 十六

桂枝加龍骨牡蠣湯 十七 桂枝甘草龍骨牡蠣湯 十八

栝萎桂枝湯 十九

黃耆建中湯 廿二

黃耆芍藥桂枝苦酒湯 廿三

內補當歸建中湯 廿四

桂枝生薑枳實湯 廿五

當歸四逆湯 廿六

當歸四逆加吳茱萸生薑湯 廿七

桂枝麻黃各半湯 廿八 桂枝二麻黃一湯 廿九

桂枝二越婢一湯 卅

桂枝芍藥知母湯 卅一

芍藥甘草湯 卅二

芍藥甘草附子湯 卅三

桂枝茯苓丸 卅四

土瓜根散 卅五

麻黃湯類二 凡二十六方

麻黃湯 一

還魂湯 二

甘草麻黃湯 三

麻黃醇酒湯 四

麻黃細辛附子湯 五

麻黃附子甘草湯 六

桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯 七

小青龍湯 九

仲尼雜病類方

卷之三

射干麻黃湯 十

麻黃杏仁薏苡甘草湯 十一

大青龍湯 十二

小青龍加石膏湯 十三

厚朴麻黃湯 十四

麻黃杏仁甘草石膏湯 十五

文蛤湯 十六

越婢湯 十七

越婢加术湯 十八

越婢加半夏湯 十九

續命湯 二十

半夏麻黃丸 尤一

麻黃升麻湯 尤二

三黃湯 尤三

牡蠣湯 尤四

烏頭湯 尤五

麻黃連轺赤小豆湯 尤六

葛根湯類三 凡五方

葛根湯 一

桂枝加葛根湯 二

葛根加半夏湯 三

葛根黃芩黃連湯 四

竹葉湯 五

茈胡湯類四 凡九方

小茈胡湯 一

大茈胡湯 二

茈胡加芒消湯 三

茈胡加龍骨牡蠣湯 四

茈胡去半夏加桔梗湯 五

茈胡桂枝湯 六

茈胡桂枝乾薑湯 七

四逆散 八

茈胡飲子 九

梔子湯類五 凡九方

梔子豉湯一

梔子甘草豉湯二

梔子生薑豉湯三

梔子乾薑湯四

梔子厚朴湯五

梔子蘖皮湯六

枳實梔子湯七

梔子大黃湯八

茵陳蒿湯九

承氣湯類六 凡三十二方

大承氣湯一

小承氣湯二

調胃承氣湯三

桃核承氣湯四

麻子人丸五

厚朴三物湯六

厚朴七物湯七

厚朴大黃湯八

大黃甘草湯九

抵當湯十

抵當丸十一

下瘀血湯十二

大黃麌蟲丸十三

大黃消石湯十四

大黃牡丹湯十五

大黃附子湯十六

治食鱠成癥方十七

大黃甘遂湯十八

大陷胸湯十九

大陷胸丸二十

仲尼雜病類方

卷之四

小陷胷湯 丸一

十棗湯 丸二

葶苈大棗瀉肺湯 丸三

白散 丸四

走馬湯 丸五

三物備急丸 丸六

己椒苈黃丸 丸七

治馬墜及筋骨損方 丸八

甘遂半夏湯 丸九

蜜煎導 三十

豬膽汁方 丸一

九痛丸 丸二

瓜蒂散 一

一物瓜蒂湯 二

鹽湯 三

飲食中毒煩滿治之方 四

瀉心湯類八 凡十五方

半夏瀉心湯 一

生薑瀉心湯 二

甘草瀉心湯 三

大黃黃連瀉心湯 四

瀉心湯 五

附子瀉心湯 六

黃連湯 七

黃芩湯 八

黃芩加半夏生薑湯 九

黃芩湯 十

三物黃芩湯 十一

乾薑黃芩黃連人蔘湯 十二

旋覆代赭湯 十三

黃連阿膠湯 十四

澤漆湯 十五

仲景新病類方

白虎湯類九 凡五方

白虎湯 一

白虎加人瀆湯 二

白虎加桂枝湯 三

竹葉石膏湯 四

竹皮大丸 五

五苓散類十 凡二十一方

五苓散 一

茵陳五苓散 二

豬苓湯 三

茯苓甘草湯 四

豬苓散 五

茯苓桂枝白朮甘草湯 六

茯苓桂枝甘草大棗湯 七 淨瀆湯 八

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 茯苓澤瀉湯 九          | 茯苓杏人甘草湯 十       |
| 桂苓五味甘草湯 十        | 苓甘五味薑辛湯 十一      |
| 茯苓五味甘草去桂加薑辛夏湯 十二 | 苓甘五味加薑辛半杏大黃湯 十三 |
| 苓甘五味加薑辛半夏杏人湯 十四  | 苓甘五味加薑辛半杏大黃湯 十五 |
| 茯苓戎鹽湯 十六         | 葵子茯苓散 十七        |
| 牡蠣澤瀉散 十八         | 滑石白魚散 十九        |
| 蒲灰散 二十           |                 |

理中湯類十一 凡十一方

傷寒雜病類方

卷之六

學林堂藏本

理中丸一

人瀆湯二

桂枝人瀆湯三

大建中湯四

茯苓飲五

枳木湯六

甘草乾薑湯七

甘草乾薑茯苓白术湯八

白术附子湯九

甘草附子湯十

天雄散十一

四逆湯類十二凡十三方

四逆湯一

四逆加人瀆湯二

通脈四逆湯三

通脈四逆加豬膽汁湯四

乾薑附子湯五

白通湯六

白通加豬膽汁湯七

茯苓四逆湯八

玄武湯九

附子湯十

大烏頭煎十一

赤丸十二

烏頭赤石脂丸十三

凡十二方

半夏湯類十四

小半夏加茯苓湯二

小半夏湯一

大半夏湯四

生薑半夏湯三

乾薑人瀆半夏丸六

陽寒雜病類方

目錄

學林堂藏本

附子粳米湯 七

厚朴生薑半夏甘草人瀆湯 八

半夏厚朴湯 九

苦酒湯 十

半夏散及湯 十一

麥門冬湯 十二

甘草湯類十四 凡七方

甘草湯 一

桔梗湯 二

炙甘草湯 三

生薑甘草湯 四

甘草粉蜜湯 五

排膿湯 六

甘草小麥大棗湯 七

芎歸湯類十五 凡六方

芎歸膠艾湯 一

溫經湯 二

當歸生薑羊肉湯 三

當歸芍藥散 四

當歸散 五

當歸貝母苦瀆丸 六

雜法方類十六 凡七十一方

吳茱萸湯 一

桃花湯 二

括蒌瞿麥丸 七

薯蕷丸 八

仲景新方卷之二

序言

橘皮湯 九

橘皮竹茹湯 十

橘皮枳實生薑湯 十

木防己湯 十二

水防己去石膏加茯苓芒消湯 十三

防己黃耆湯 十四

防己茯苓湯 十五

防己地黃湯 十六

奔豚湯 十七

酸棗湯 十八

鱉甲煎丸 十九

蜀漆散 二十

皂莢丸 二十一

柏葉湯 二十二

黃土湯 二十三

赤小豆當歸散 二十四

括蔞薤白白酒湯 二十五

括蔞薤白半夏湯 二十六

枳實薤白桂枝湯 二十七

括蔞牡蠣散 二十八

百合知母湯 二十九

百合代赭湯 三十

百合雞子湯 三十一

百合地黃湯 三十二

百合滑石散 三十三

薏苡附子散 三十四

薏苡附子敗醬散 三十五

葷莖湯 三十六

白頭翁湯 三十七

白頭翁加甘草阿膠湯 三十八

紫瀆湯 三十九

訶梨勒散 四十

訶梨勒丸 四十一

侯氏黑散 四十二

風引湯 四十三

目錄

九

皇清重刊反

傷寒之類方

學訓堂藏板

紫石寒食散 四十四

白术散 四十五

豬膚湯 四十六

王不留行散 四十七

枳實芍藥散 四十八

排膿散 四十九

紅藍花酒 五十

頭風摩散 五十一

豬膏髮煎 五十二

百合洗方 五十三

雄黃熏方 五十四

苦蕩湯 五十五

杏子湯 方闕  
五十六

礬石湯 五十七

黃連粉 五十八

礬石丸 五十九

消石礬石散 六十

蛇床子散 六十一

狼牙湯 六十二

小兒疳蟲蝕齒方 六十三

升麻鱉甲湯 六十四

獺肝散 六十五

藜蘆甘草湯 六十六

雞屎白散 六十七

蜘蛛散 六十八

旋覆花湯 六十九

救卒死客忤死方 七十

燒禪散 七十一

以上共二百八十一方

傷寒雜病類方

江戸 喜多村直寛士栗 編

桂枝湯類一 凡三十五方

桂枝湯一

桂枝三兩

去皮

芍藥三兩

甘草二兩

炙

生薑三兩

切

大棗十二枚

擘

右五味咬咀二味以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須臾歎熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許遍身漿漿微

似有汗者益佳。不可令如水流離。病必不除。  
若一服汗出病差。停後服不必盡劑。若不汗。  
更服依前法。又不汗。後服小促其間。半日許。  
令三服盡。若病重者。一日一夜服。周時觀之。  
服一劑盡。病證猶在者。更作服。若汗不出。乃  
服至二三劑。禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭  
惡等物。

太陽中風。陽浮而陰弱。陽浮者熱自發。陰弱者  
汗自出。嗰嗰惡寒。浙浙惡風。翕翕發熱。鼻鳴乾

嘔。太陽病頭痛發熱。汗出惡風。太陽病下  
之後。其氣上衝者。可與桂枝湯。若不上衝者。不  
得與之。太陽病三日。已發汗。若吐。若下。若溫  
針。仍不解者。此爲壞病。桂枝不中與之也。觀其  
脈證。知犯何逆。隨證治之。桂枝本爲解肌。若  
其人脈浮緊。發熱。汗不出者。不可與桂枝湯。得  
識此。勿令誤也。若酒客病。不可與桂枝湯。得  
之則嘔。以酒客不喜甘故也。太陽病初服桂  
枝湯。反煩不解者。先刺風池風府。却與桂枝湯

則愈

太陽上

太陽病外證未解脈浮弱者當以汗

解外

太陽病外證未解不可下也下之爲逆欲

不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脈浮故

在外當須解外則愈

病常自汗出者此爲榮

氣和榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣諧和

故爾以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮衛和

則愈病人藏無他病時發熱自汗出而不愈

者此衛氣不和也先其時發汗則愈傷寒不

大便六七日頭痛有熱者未可與承氣湯其小  
便清者知不在裏仍在表也當須發汗傷寒  
發汗已解半日許復煩脈浮數者可更發汗  
傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急  
當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏  
宜四逆湯救表宜桂枝湯太陽病發熱汗出  
者此爲榮弱衛強故使汗出欲救邪風太陽中傷  
寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不  
可攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝

湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯太陽陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脈實者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯陽明太陰病脈浮者可發汗太陰下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯厥陰吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之霍亂下利後身疼痛清便自調者

急當救表宜桂枝湯發汗可發汗婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無寒熱名妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此證設有醫治逆者却一月加吐下者則絕之婦人產後風續之數十日不解頭微痛惡寒時時有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽旦證續在耳可與陽旦湯即桂枝湯婦人產後

小建中湯二

桂枝湯原方加膠飴一用芍藥六兩

右六味以水七升煮取三升去滓內飴更上

微火消解溫服一升日三服嘔家不可用建

中湯以甜故也

傷寒陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛先與小建  
中湯不差者與小茈胡湯主之傷寒二三日  
心中悸而煩虛勞裏急悸衄腹中痛夢失  
精四肢酸疼手足煩熱咽乾口燥虛勞男子黃  
小便自利當與虛勞小建中湯黃疸婦人腹中  
痛婦人雜病

桂枝加桂湯三

桂枝湯原方加桂枝二

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發奔豚  
氣從少腹上衝心者灸其核上各一壯太陽

桂枝附子湯四

桂枝

四兩去皮附子三枚炮生薑三兩

大棗

十二枚擘甘草二兩炙

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服  
傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側  
不嘔不渴脈浮虛而濇太陽

桂枝加附子湯 五

桂枝湯原方加附子一枚炮去皮破八片

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸太陽上

桂枝去芍藥湯 六

桂枝湯原方去芍藥

太陽病下之後脈促脅滿太陽上

桂枝去芍藥加附子湯 七

桂枝湯原方去芍藥加附子一枚炮去皮破八片

前證若微惡寒者太陽上

桂枝加芍藥湯 八

桂枝湯原方加芍藥三兩

本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛者屬太陰也

桂枝加大黃湯 九

前方加大黃二兩

前證大實痛者太陰

桂枝去芍藥加皂莢湯 十

桂枝

生薑

各三兩

甘草

一兩

大棗

十枚

皂莢

一枚去皮子

炙焦

右五味以水七升微微火煮取三升分溫三服

肺痿吐涎沫

肺痿引千金

烏頭桂枝湯

十一

烏頭

右一味以蜜二斤煎減半去滓以桂枝湯五合解之令得一升後初服一二合不知卽服三

合又不知復加至五合其知者如醉狀得吐者爲中病

寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺諸藥不能治抵當烏頭桂枝湯主之寒疝寒疝腹中絞痛賊風入攻五臟拘急不得轉側發作有時使入陰縮手足厥逆同上引外臺烏頭桂枝湯

桂枝甘草湯

十二

桂枝

四兩去皮

甘草

二兩炙

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按。太陽

中

桂枝加茯苓白术湯 十三

桂枝湯原方。加白术。茯苓。各三兩。小便利則

愈。

服桂枝湯。或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱。無汗。心下滿微痛。小便不利。太陽

上

桂枝加厚朴杏子湯 十四

桂枝湯原方。加厚朴。二兩。炙。杏仁。五十枚。

去皮尖

喘家。作桂枝湯。加厚朴。杏子。佳。太陽 太陽病。下

之。微喘者。表未解故也。太陽

中

桂枝加芍藥生薑人瀆新加湯 十五

桂枝湯原方。加芍藥。一人瀆。三生薑。一

兩

兩

兩

右六味。以水一斗二升。煮取三升。去滓。溫服

一升。

發汗後。身疼痛。脈沈遲。太陽

中

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯 十六

桂枝湯原方。去芍藥。加牡蠣。熬。五兩。蜀漆。三

兩

兩

桂枝湯原方。去芍藥。加牡蠣。熬。五兩。蜀漆。三

兩

八

事則堂藏反

傷寒雜病類方

卷之三

諸病別編

龍骨四兩

洗去腥

右七味以水一斗二升先煮蜀漆減一升內諸藥煮取三升去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫刲之亡陽必驚狂卧起不安

太陽中火邪者驚悸

桂枝加龍骨牡蠣湯十七

桂枝湯原方加龍骨牡蠣各三

脈得諸芤動微緊男子失精女子夢交虛勞

桂枝甘草龍骨牡蠣湯十八

桂枝一兩去皮甘草二兩炙牡蠣二兩熬

龍骨二兩

右四味以水五升煮取一二升半去滓溫服八合日三服

火逆下之因燒鍼煩躁

太陽中

栝萎桂枝湯十九

栝萎根二兩

桂枝三兩

芍藥三兩

甘草二兩

生薑三兩

大棗十二枚

右六味以水九升煮取三升分溫三服取微

汗。汗不出。食頃啜熱粥發。

太陽病。其證備。身體強几。然脈反沈遲。此爲痙。痙。

黃耆桂枝五物湯二十

黃耆三兩

芍藥三兩

桂枝三兩

生薑六兩

大棗十二枚

右五味以水六升。煮取二升。溫服七合。日三

服。一方有  
人蔘

血痺。陰陽俱微。寸口關上微。尺中小緊。外證身

體不仁。如風痺狀。血痺

桂枝加黃耆湯廿一

桂枝湯原方加黃耆二

黃汗之爲病。兩脰自冷。假令發熱。此屬歷節。食已汗出。又身常暮盜汗出者。此勞氣也。若汗出已。反發熱者。久久其身必甲錯。發熱不止者。必生惡瘡。若身重。汗出已輒輕者。久久必身瞞。瞞卽胸中痛。又從腰以上必汗出。下無汗。腰髀弛痛。如有物在皮中狀。劇者不能食。身疼重。煩躁。

小便不利。此爲黃汗。水氣諸病黃家。但利其小便。假令脈浮。當以汗解之。黃疸

黃耆建中湯

丸二

於小建中湯內加黃耆一兩半。餘依上法。氣短胸滿者。加生薑。腹滿者去薑。加茯苓一兩半。及療肺虛損不足。補氣加半夏三兩。

虛勞裏急。諸不足。虛勞。

黃耆芍藥桂枝苦酒湯

丸三

黃耆

五兩

芍藥

三兩

桂枝

三兩

右三味。以苦酒一升。水七升。相和。煮取三升。溫服一升。當心煩。服至六七日乃解。若心煩不止者。以苦酒阻故也。

問曰。黃汗之爲病。身體腫。重一作發熱。汗出而渴。狀如風水。汗沾衣。色正黃。如麯汁。脈自沈。何從得之。師曰。以汗出入水中浴。水從汗孔入。得之。

水氣

內補當歸建中湯

丸四

建中湯原方加當歸四兩

右六味以水一斗煮取三升分溫三服一日  
令盡若大虛加飴糖六兩湯成內之於火上  
煖令飴消若去血過多崩傷內衄不止加地  
黃六兩阿膠二兩合八味湯成內阿膠若無  
當歸以芎藭代之若無生薑以乾薑代之  
婦人產後虛羸不足腹中刺痛不止吸吸少氣  
或苦少腹中急摩痛引腰背不能食飲產後一  
月日得服四五劑爲善令人強壯婦人產後引千金

桂枝生薑枳實湯尤五

桂枝三兩 生薑各三兩 枳實五兩

右三味以水六升煮取二升分溫三服

心中痞諸逆心懸痛心痛

當歸四逆湯尤六

當歸三兩 桂枝三兩去皮 芍藥三兩

細辛三兩 甘草二兩炙 通草二兩

大棗二十五枚擘

一法十二枚

右七味以水八升煮取二升去滓溫服一升

易經准病源

桂枝湯

日二服。

手足厥寒。脈細欲絕。厥陰

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

九七

當歸四逆湯原方。加吳茱萸二升生薑半斤切。

右九味以水六升清酒六升和煮取五升去

滓溫分五服。

前證若其人內有久寒。厥陰

桂枝麻黃各半湯

九八

桂枝

一兩十  
銖去皮

芍藥

生薑切

甘草

炙

麻黃各一兩去節

大棗四枚擘

杏仁

二十四枚湯浸去皮尖及兩人者

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫

內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便自可一日二三度發脈微緩者爲欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以英不能得小汗出身必痺

太陽上

桂枝二麻黃一湯尤九

桂枝一兩十七銖去皮芍藥一兩六銖麻黃十六銖去節  
生薑一兩六銖切杏仁十六箇去皮尖甘草一兩二銖炙

大棗五枚擘

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫  
內諸藥煮取二升去滓溫服一升日再服  
服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法  
若形似瘧一日再發者汗出必解太陽上

桂枝二越婢一湯三十

桂枝去皮芍藥 麻黃

甘草各十八銖炙

大棗四枚擘

生薑一兩二銖切

石膏二十四銖碎綿裹

右七味以水五升煮麻黃一二沸去上沫內  
諸藥煮取二升去滓溫服一升  
太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽  
也不可發汗太陽上

桂枝芍藥知母湯三十一

桂枝四兩

芍藥三兩

甘草二兩

易寒雜病類方

桂枝湯

古

學川堂藏本

麻黃二兩

生薑五兩

白朮五兩

知母四兩

防風四兩

附子二枚

右九味以水七升煮取二升溫服七合日三服

諸肢節疼痛身體尪羸脚腫如脫頭眩短氣溫欲吐歷節

芍藥甘草湯三十二

芍藥

甘草

各四兩炙

右二味以水三升煮取一升五合去滓分溫

再服

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸

芍藥甘草附子湯三十三

芍藥

甘草各三兩炙

附子一枚炮去皮破八片

右二味以水五升煮取一升五合去滓分溫

芍藥甘草附子湯三十四

芍藥

甘草各三兩炙

附子一枚炮去皮破八片

右二味以水五升煮取一升五合去滓分溫

芍藥桂枝湯

芍藥四兩

桂枝四兩

生

學川堂藏本

三服。

發汗病不解反惡寒者虛故也。太陽中

桂枝茯苓丸三十四

桂枝

茯苓

牡丹去心

桃人去皮  
尖熬

芍藥各等分

右五味末之煉蜜和丸如兔屎大每日食前

服一丸不知加至二丸

婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不止胎動在臍上者爲癥瘕害妊娠六月動者前三

月經水利時胎也下血者後斷三月衃也所以血不止者其癥不去故也當下其癥婦人妊娠

土瓜根散三十五

土瓜根

芍藥

桂枝

蠶蟲各三兩

右四味杵爲散酒服方寸匕日三服

帶下經水不利少腹滿痛經一月再見婦人雜病

學言堂別編

麻黃湯類二 凡二十六方

麻黃湯一

麻黃

三兩去節

桂枝

二兩去皮

甘草

一兩炙

杏人

七十箇去皮尖

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘太陽與陽明合病喘而胸滿者不可

易矣

麻黃湯

七

學言堂藏板

下。太陽病十日以去。脈浮細而嗜卧者。外已解也。設脅滿脅痛者。與小茈胡湯。脈但浮者。與麻黃湯。太陽病。脈浮緊。無汗發熱。身疼。痛。八九日不解。表證仍在。此當發其汗。服藥已微除。其人發煩目瞑。劇者必衄。衄乃解。所以然者。陽氣重故也。脈浮者。病在表。可發汗。脈浮而數者。可發汗。傷寒。脈浮緊。不發汗。因致衄。太陽

中陽明中風。脈弦浮大而短氣。腹都滿。脅下及

心痛。久按之氣不通。鼻乾不得汗。嗜卧。一身及

面目悉黃。小便難。有潮熱。時時噦。耳前後腫刺之小差。外不解。病過十日。脈續浮者。與小茈胡湯。脈但浮。無餘證者。與麻黃湯。若不尿。腹滿加曖者。不治。陽明病。脈浮。無汗而喘者。發汗則愈。陽明

還魂湯二

麻黃三兩去節 杏仁七十箇去皮尖 甘草一兩炙

右三味。以水八升。煮取三升。去滓。分令咽之。

通治諸感忤。

傷寒雜病類方

雜療

甘草麻黃湯

三

甘草二兩

麻黃四兩

右二味以水五升先煮麻黃去上沫內甘草煮取三升溫服一升重覆汗出不汗再服慎風寒

裏水

水氣

麻黃醇酒湯

四

麻黃三兩

右一味以美清酒五升煮取二升半頓服盡冬月用酒春月用水煮之

麻黃細辛附子湯

五

麻黃二兩

細辛二兩

附子

一枚炮去皮破八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服少陰病始得之反發熱脈沈少陰

麻黃附子甘草湯

六

傷寒雜病類方

麻黃湯

七

學制堂藏本

仲尼卷之二

甘草二兩

附子一枚炮去皮破八片

麻黃二兩去節

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也少陰水之爲病其脈沈小屬少陰浮者爲風無水虛脹者爲氣水發其汗卽已脈沈者宜麻黃附子湯卽本浮者宜杏子湯未見○

桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯七

桂枝三兩

生薑三兩

甘草二兩

大棗十二枚

麻黃

細辛各二兩

附子一枚炮

右七味以水七升煮麻黃去上沫內諸藥煮取二升分溫三服當汗出如蟲行皮中卽愈氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作水氣

麻黃加术湯八

麻黃湯原方加白术四兩

濕家身煩疼可與麻黃加术湯發其汗爲宜慎

易經卷之二

麻黃湯

學記卷之二

傷寒雜病類方  
不可以火攻之。濕

小青龍湯 九

麻黃 去節

芍藥

細辛

乾薑

甘草 炙

桂枝 各三兩去皮

五味子 半升

半夏 洗半升

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升若渴去半夏加桔梗根三兩若微利去麻黃加蕷花如一雞子熬令赤色若噎者去麻黃加附子一

枚炮若小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓四兩若喘去麻黃加杏仁半升去皮尖傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也太陽中病溢飲者當發其汗欬逆倚息不得卧痰飲婦人吐涎沫醫反下之心下卽痞當先治其吐涎沫婦人雜病

射干麻黃湯 十

傷寒雜病類方

麻黃湯

卷

學林堂藏板

射干

十三枚。法三兩。

麻黃

四兩

生薑

四兩

細辛

三兩

紫菀

三兩

欬冬花

三兩。者洗。

五味子

半升。法半升。

大棗

七枚。大者八枚。

半夏

大者八枚。一升。

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去上沫內諸藥煮取三升分溫三服。欬而上氣喉中水雞聲欬嗽

麻黃杏仁薏苡甘草湯

十一

麻黃

去節半兩。湯泡。

甘草

一兩。炙。

薏苡仁

半兩。炙。

杏人

十箇。去皮尖炒。

右剉麻豆大每服四錢七水盞半煮八分去滓溫服有微汗避風

病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也

濕。

大青龍湯

十二

麻黃

六兩。去節。

桂枝

二兩。去皮。

甘草

二兩。炙。

杏人

四十枚。去皮尖。

生薑

三兩。切。

大棗

十枚。擘。

石膏

如雞子大碎。

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者溫粉撲之一服汗者停後服若復

服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服之服之則厥逆筋惕肉瞞此爲逆也傷寒脈浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證

太陽病溢飲者當發其汗痰飲

小青龍加石膏湯十三

小青龍湯原方加石膏二兩

強人服一升羸者減之日三服小兒服四合肺脹欬而上氣煩躁而喘脈浮者心下有水

欬

厚朴麻黃湯十四

厚朴五兩 麻黃四兩 石膏如雞子大  
杏仁半升 半夏半升 乾薑二兩

細辛二兩

小麥一升

五味子半升

右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓內

諸藥煮取三升溫服一升日三服  
欬而脈浮欬嗽

麻黃杏人甘草石膏湯十五

麻黃四兩去節杏人五十箇去皮尖甘草二兩炙

石膏半斤碎綿裹

右四味以水七升煮麻黃減二升去上沫內  
諸藥煮取二升去滓溫服一升  
發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者  
太陽下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大

熟太陽

文蛤湯十六

文蛤五兩 麻黃甘草

生薑各三兩

石膏五兩

杏人五十箇

大棗十二枚

右七味以水六升煮取二升溫服一升汗出  
卽愈

吐後渴欲得水而貪飲兼主微風脈緊頭痛嘔吐

越婢湯十七

麻黃湯

學林堂藏板

麻黃 六兩

石膏 半斤

生薑 三兩

大棗 十五枚

甘草 二兩

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取二升分溫三服惡風者加附子一枚炮

風水加术四兩

古今錄驗

風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無大熱水氣

越婢加术湯十八

越婢湯原方加白术四兩

肉極熱則身體津脫腠理開汗大泄厲風氣下焦脚弱中風千金引裏水者一身面目黃腫其脈沈小便不利故令病水假如小便自利此亡津液故令渴也裏水水氣

越婢加半夏湯十九

越婢湯原方加半夏半升

欬而上氣此爲肺脹其人喘目如脫狀脈浮大欬

續命湯二十

麻黃

桂枝

當歸

人瀆

石膏

乾薑

甘草各三兩

芎藭

杏仁四十枚

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆脊憑几坐汗出則愈不汗更服無所禁勿當風并治但伏不得卧欬逆上氣面目浮腫

中風痱身體不能自收口不能言胃味不知痛處或拘急不得轉側姚云與大續命同兼治婦人產後去血者及老人小孩

兒○中風引古今錄驗

半夏麻黃丸

丸一

半夏

麻黃等分

右二味末之煉蜜和丸小豆大飲服二丸日

二服

心下悸驚悸

麻黃升麻湯

丸二

麻黃二兩半去節

升麻一分

當歸

一兩一分

知母十八銖

黃芩銖十八

萎蕤

銖十八

傷寒雜病類方

麻黃湯

學訓堂藏版

芍藥六銖

天門冬六銖

去心桂枝六銖

茯苓六銖

甘草六銖

去皮石膏六銖碎

白术六銖

乾薑六銖

綿裹石膏六銖碎

右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服相去如炊三斗米頃令盡汗出愈

傷寒六七日大下後寸脈沈而遲手足厥逆下部脈不至喉咽不利唾膿血泄利不止者爲難治厥陰

三黃湯

尤三

麻黃五分

獨活四分

細辛二分

黃芪二分

黃芩三分

右五味以水六升煮取二升分溫三服一服小汗二服大汗心熱加大黃二分腹滿加枳實一枚氣逆加人蔘三分悸加牡蠣三分渴加桔梗根三分先有寒加附子一枚

中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食

中風引  
千金

仲景經卷第十一  
牡蠣湯

九四

牡蠣

四兩  
熬

麻黃

去節  
四兩

甘草

二兩

蜀漆

三兩

右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升內諸藥煮取二升溫服一升若吐則勿

更服

牡蠣

瀉引  
外臺

烏頭湯

九五

麻黃

芍藥

黃芪各三  
兩

甘草炙

川烏

五枚咬咀以蜜二升煎取一升卽出烏頭

右五味咬咀四味以水三升煮取一升去滓內蜜煎中更煎之服七合不知盡服之脚氣疼痛不可屈伸歷節

麻黃連轺赤小豆湯

九六

麻黃

二兩  
去節

連轺

二兩

杏人

四十箇  
去皮尖

赤小豆

一升

大棗

十二枚擘

生梓白皮

切一升

生薑

二兩  
切

甘草

炙  
二兩

右八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫

傷寒瘀熱在裏。身必發黃。陽明。

葛根湯類三凡五方

葛根湯一

葛根

四兩

麻黃

三兩  
去節

桂枝

二兩  
去皮

生薑

三兩  
切

甘草

二兩  
炙

芍藥

二兩

大棗

十二枚  
擘

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升去白沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升太陽病項背強几几無汗惡風太陽與陽明合病者必自下利太陽中太陽病無汗而小便反

少氣上衝胸口噤不得語欲作剛痙痙

桂枝加葛根湯二

桂枝湯原方加葛根四兩

右六味以水九升先煮葛根減一升內諸藥煮取三升去滓溫服一升

葛根加半夏湯三

葛根湯原方加半夏半升洗

太陽與陽明合病不下利但嘔太陽中

葛根黃芩黃連湯四

葛根半斤甘草二兩炙黃芩三兩

黃連三兩

右四味以水八升先煮葛根減一升內諸藥煮取二升去滓分溫再服

太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出太陽中

竹葉湯五

竹葉一把葛根三兩防風

桔梗

桂枝

人瀆

甘草各兩

附子一枚炮

大棗十五枚

生薑五兩

右十味以水一斗煮取二升半分溫三服溫覆令汗出頸項強用大附子一枚破之如豆大煎藥揚去沫嘔者加半夏半升洗產後中風發熱面正赤喘而頭痛婦人產後

小茈胡湯

一

茈胡湯類四 凡九方

茈胡

半斤

黃芩

三兩

人瀆

三兩

半夏

洗半升

甘草

炙

生薑

各二兩切

大棗

十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服若胃中煩而不嘔者去半夏人瀆加桔樓實一枚若渴去半夏加人瀆合前成四兩半桔樓根四兩若腹中

痛者去黃芩加芍藥三兩若脅下痞鞕去大  
棗加牡蠣四兩若心下悸小便不利者去黃  
芩加茯苓四兩若不渴外有微熱者去人蔘  
加桂枝三兩溫覆微汗愈若歎者去人蔘大  
棗生薑加五味子半升乾薑二兩

傷寒五六日中風往來寒熱胷脅若滿嘿嘿不  
欲飲食心煩喜嘔或胷中煩而不嘔或渴或腹  
中痛或脅下痞鞕或心下悸小便不利或不渴  
身有微熱或歎血弱氣盡腠理開邪氣因入

與正氣相搏結於脅下正邪分爭往來寒熱休  
作有時嘿嘿不欲飲食藏府相連其痛必下邪  
高痛下故使嘔也服茈胡湯已渴者屬陽明  
以法治之得病六七日脈遲浮弱惡風寒手  
足溫醫二三下之不能食而脅下滿痛面目及  
身黃頸項強小便黃者與茈胡湯後必下重本  
渴飲水而嘔者茈胡湯不中與也食穀者噦  
傷寒四五日身熱惡風頸項強脅下滿手足溫  
而渴傷寒陽脈濶陰脈弦法當腹中急痛先

與小建中湯不差者。傷寒中風有茈胡證。但見一證便是不必悉具。凡茈胡湯病證而下之。若茈胡證不能者。復與茈胡湯必蒸蒸而振。却復發熱汗出而解。傷寒十三日不解。胷脅滿而嘔。日晡所發潮熱已而微利。此本茈胡證下之以不得利。今反利者。知醫以丸藥下之。此非其治也。潮熱者實也。先宜服小茈胡湯以解外。太陽病十日以去。脈浮細而嗜卧者。外已解也。設胷滿脅痛。太陽婦人中風七八日續得中

寒熱發作有時。經水適斷者。此爲熱入血室。其血必結。故使如瘡狀。發作有時。傷寒五六日。頭汗出。微惡寒。手足冷。心下滿。口不欲食。大便鞶。脈細者。此爲陽微結。必有表。復有裏也。脈沈亦在裏也。汗出爲陽微。假令純陰結。不得復有外證。悉入在裏。此爲半在裏。半在外也。脈雖沈緊。不得爲少陰病。所以然者。陰不得有汗。今頭汗出。故知非少陰也。可與小茈胡湯。設不了了者。得屎而解。傷寒五六日。嘔而發熱者。茈胡

湯證具而以他藥下之。茈胡證仍在者復與茈胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解。太陽陽明病發潮熱大便溏小便自可。胷脅滿不去。陽明病脅下鞶滿不大便而嘔舌上白胎者可與小茈胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濺然汗出而解。陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脅下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不

解病過十日脈續浮。陽明本太陽病不解轉入少陽者脅下鞶滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脈沈緊若已吐下發汗溫鍼讞語茈胡湯證罷此爲壞病知犯何逆以法治之。少陽嘔而發熱厥陰傷寒差已後更發熱小茈胡湯主之脈浮者以汗解之脈沈實者以下解之。差後勞復諸黃腹痛而嘔黃疸產婦鬱冒其脈微弱嘔不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤

陽上出故頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食婦人產後婦人在草蓐自發露得風四肢苦煩熱頭痛同上引千金

大茈胡湯

二

茈胡

半升

黃芩

三兩

芍藥

三兩

半夏

半升洗

生薑

五兩切

枳實

四枚炙

大棗

十二枚擘

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎

溫服一升日三服一方加大黃二兩若不加恐不爲大茈胡湯

太陽病過經十餘日反二三下之後四五日茈胡證仍在者先與小茈胡湯嘔不止心下急鬱微煩者爲未解也與大茈胡湯下之則愈太陽中傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱傷寒發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐而下利太陽傷寒後脈沈沈者內實也下之解可下按之心下滿痛者此爲實也當下之腹滿

不寐系利方

茈胡加芒消湯三

小茈胡湯原方加芒消二兩

傷寒十三日不解。胷脅滿而嘔。日晡所發潮熱已而微利。此本茈胡證。下之以不得利。今反利者。知醫以丸藥下之。此非其治也。潮熱者實也。先宜服小茈胡湯以解外。後以茈胡加芒消湯主之。太陽中

茈胡加龍骨牡蠣湯四

茈胡四兩

龍骨

黃芩

生薑切

鉛丹

人薑

桂枝去皮

茯苓各一兩半

半夏二合半洗

大黃二兩

牡蠣一兩半熬

大棗六枚擘

右十二味。以水八升。煮取四升。內大黃切如碁子。更煮一兩沸。去滓溫服一升。傷寒八九日。下之。胷滿煩驚。小便不利。讞語。一身盡重。不可轉側者。太陽中

茈胡去半夏加桔萎湯五

小茈胡湯原方。去半夏。加桔萎根四兩

傷寒雜病類方

學講堂藏版

卷之三

七

七

七

七

瘧病發渴者亦治勞瘧瘧

茈胡桂枝湯六

桂枝去皮

黃芩

人參各一  
兩半

甘草一兩  
炙

半夏二合  
半洗

芍藥一兩  
半

大棗六枚  
擘

生薑一兩  
半切

茈胡四兩

右九味以水七升煮取三升去滓溫服一升  
傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下  
支結外證未去太陽發汗多亡陽譏語者不可  
下與茈胡桂枝湯和其榮衛以通津液後自愈

發汗心腹卒中痛寒疝引  
後臺

茈胡桂枝乾薑湯七

茈胡半斤

桂枝三兩  
去皮

乾薑二兩

括樓根四兩

黃芩三兩

牡蠣熬

甘草二兩  
炙

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎  
取三升溫服一升日三服初服微煩復服汗  
出便愈

傷寒五六日已發汗而復下之脅脅滿微結小

傷寒雜病類方

茈胡湯

七

學講堂藏版

便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者

此爲未解也

太陽

瘧寒多微有熱或但寒不熱

服一劑如神

○瘧附方

四逆散八

甘草

炙

枳實

破水漬乾

茈胡

芍藥

右四味各十分擣篩白飲和服方寸匕日三服欬者加五味子乾薑各五分并主下利悸者加桂枝五分小便不利者加茯苓五分腹

中痛者加附子一枚炮令折泄利下重者先以水五升煮薤白三升煮取三升去滓以散三方寸匕內湯中煮取一升半分溫再服少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重少陰

四時加減茈胡飲子九

冬三月加茈胡

八分

白朮

八分陳皮五分

大腹檳榔四枚并皮子用

生薑

五分桔梗七分

春三月加枳實

減六分

白朮

共六分

夏三 生薑三分

枳實五分

甘草三分共八味

秋三 月加陳皮三分共六味

右各咬咀分爲三貼一貼以水三升煮取二升分溫三服如人行四五里進一服如四體壅添甘草少許每貼分作三小貼每小貼以水一升煮取七合溫服再合滓爲一服重煮都成四服

退五藏虛熱雜療

梔子湯類五 凡九方

梔子豉湯一

梔子十四

箇擎

香豉四合

綿裹

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分爲二服溫進一服

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊惱發汗若下之而煩熱胷中窒傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也凡用梔子湯病人舊微溏者不可與

仲景全集卷之二

辨寒熱病論

服之太陽陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤反讞語若加溫針必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊惱舌上胎陽明病下之其外有熱手足溫不結胷心中懊惱飢不能食但頭汗出陽明下利後更煩按之心下濡者爲虛煩也厥陰

梔子甘草豉湯二

於原方加甘草二兩

原證若少氣太陽

中

梔子生薑豉湯三

於原方加生薑五兩

原證若嘔同上

梔子乾薑湯四

梔子十四箇乾薑一兩

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩同上

傷寒雜病類方

梔子湯

學林堂藏板

仁宗集解卷之二

梔子厚朴湯五

梔子箇擘十四

厚朴四兩炙

枳實四枚水浸

去皮炙令黃

右三味以水三升半煮取一升半去滓分二

服溫進一服

傷寒下後心煩腹滿卧起不安同上

梔子蘡皮湯六

肥梔子十五箇擘

甘草一兩炙

黃蘢二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再

服

枳實梔子湯七

枳實三枚炙

梔子十四箇擘

豉一升綿裹

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實  
梔子煮取一二升下豉更煮五六沸去滓溫分  
再服覆令微似汗若有宿食者內大黃如博  
朮子五六枚服之愈

大病差後勞復八

差後勞復

梔子大黃湯八

梔子湯

易經推演

梔子湯

卷之二

梔子  
一枚

大黃  
一兩

枳實  
五枚

豉  
一升

右四味以水六升煮取二升分溫三服酒黃疸心中懊憹或熱痛黃疸

茵陳蒿湯

九

茵陳蒿  
六兩

梔子  
一枚

大黃  
二兩

酒洗

右三味以水一斗二升先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分三服小便當利尿如皂莢汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

陽明病發熱汗出者此爲熱越不能發黃也但頭汗出身無汗剝頸而還小便不利渴引水漿者此爲瘀熱在裏身必發黃傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿陽明穀疸之爲病寒熱不食食卽頭眩心胷不安久久發黃爲穀疸黃疸

承氣湯類六 凡三十二方

大承氣湯一

大黃四兩  
酒洗 厚朴半斤  
去皮  
炙 枳實五枚  
炙

芒消三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃更煮取二升去滓內芒消更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿服

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足

濶然汗出者此大便已鞶也。陽明病潮熱大便微鞶者可與大承氣湯不鞶者不可與之。傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視脈弦者生濶者死微者但發熱譏語大承氣湯主之若一服利則止後服。陽明病譏語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞶耳。汗出譏語者以有燥屎在胃

中此爲風也須下者過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之愈。二陽併病太陽證罷但發潮熱手足繫繫汗出大便難而譏語者下之則愈。陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭鞶後必溏不可攻之若有燥屎病人煩熱汗出則解又如瘡狀日晡所發熱者屬陽明也脈實者宜下之脈浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯大下後六七日不大便煩不解腹

在第  
卷之二  
滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也  
病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘  
冒不能卧者有燥屎也得病二三日脈弱無  
太陽茈胡證煩躁心下鞶至四五日雖能食以  
小承氣湯稍稍與微和之令小安至六日與承  
氣湯一升若不大便六七日小便少者雖不受  
食但初頭鞶後必溏未定成鞶攻之必溏須小  
便利屎定鞶乃可攻之傷寒六七日目中不  
了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此爲

實也急下之陽明病發熱汗多者急下之  
發汗不解腹滿痛者急下之腹滿不減減不  
足言當下之陽明少陽合病必下利脈滑而  
數者有宿食也當下之陽明少陰病得之二三  
日口燥咽乾者急下之少陰病自利清水色  
純青心下必痛口乾燥者可下之少陰病六  
七日腹脹不大便者急下之少陰下利三部脈  
皆平按之心下鞶者急下之下利脈遲而滑  
者內實也利未欲止當下之寸口脈浮而大

按之反濇.尺中亦微而濇.故知有宿食.當下之.  
下利不欲食者.以有宿食故也.當下之.下  
利差.至其年月日時復發者.以病不盡故也.當  
下之.病腹中滿痛者.此爲實也.當下之.下  
利脈反滑.當有所去.下乃愈.脈雙弦而遲者.  
必心下鞶.脈大而緊者.陽中有陰也.可下之.可  
下脈數而滑者.實也.此有宿食.下之愈.宿食.痽  
爲病.胃滿口噤.卧不著席.脚攣急.必齦齒.痽病  
解能食.七八日更發熱者.此爲胃實.產後七

八日無太陽證.少腹堅痛.此惡露不盡.不大便.  
煩躁發熱.切脈微實.再倍發熱.日晡時煩燥者.  
不食.食則譏語.至夜卽愈.宜大承氣湯主之.熱  
在裏.結在膀胱也.婦人產後

小承氣湯二

大黃

四兩

厚朴

二兩去皮

枳實

三枚大炙

右三味.以水四升.煮取一升二合.去滓.分溫  
二服.初服湯.當要衣.不爾者.盡飲之.若要衣  
者.勿服之.

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濶然汗出者此大便已鞶也大承氣湯主之若汗多微發熱惡寒者外未解也其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令至大泄下陽明病潮熱大便微鞶者可與大承氣湯不鞶者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若

不轉失氣者此但初頭鞶後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便復鞶而少也以小承氣湯和之不轉失氣者慎不可攻也陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞶鞶則讞語小承氣湯主之若一服讞語止者更莫復服陽明病讞語發潮熱脈滑而疾者小承氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉氣者更服一升若不轉氣者勿更與之明日又不大便脈反微濶者裏

傷寒雜病類方  
虛也爲難治不可更與承氣湯也。太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞶者與

小承氣湯和之愈。陽明

下利譏語者有燥屎也。

厥陰大便不通噦數譏語噦引千

調胃承氣湯三

大黃

四兩清酒洗

甘草

二兩炙

芒消

半斤

右三味切以水三升煮一物至一升去滓內芒消更上微火一二沸溫頓服之以調胃氣傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚癉急

反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚卽伸若胃氣不和譏語者少與調胃承氣湯太陽發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣太陽病未解脈陰陽俱微必先振慄汗出而解但陽脈微者先汗出而解但陰脈微者下之而解若欲下之傷寒十三日過經譏語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當

鍼而反下利。脈調和者。知醫以丸藥下之。非其治也。若自下利者。脈當微厥。今反和者。此爲內實也。太陽病過經十四日。心下溫溫。欲吐而胃中痛。大便反溏。腹微滿。鬱鬱微煩。先此時自極吐下者。與調胃承氣湯。若不爾者。不可與。但欲嘔。胃中痛。微溏者。此非茈胡湯證。以嘔故知極吐下也。太陽 中陽明病。不吐不下。心煩。太陽病三日。發汗不解。蒸蒸發熱者。屬胃也。傷寒吐後。腹脹滿。陽明

桃核承氣湯四

桃人五十箇去皮尖 大黃四兩 桂枝二兩去皮

甘草二兩炙 芒消二兩

右五味以水七升。煮取二升半。去滓。內芒消。更上火微沸。下火。先食溫服五合。日三服。當微利。

太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。下者愈。其外不解者。尚未可攻。當先解其外。外解已。但少腹急結者。乃可攻之。太陽 中

仲景集解卷之二  
麻子人丸

五

麻子人二升芍藥半斤 枳實半斤 炙

大黃一斤 厚朴一尺 杏仁一升去皮

脂

去皮 厚朴去皮 杏仁一升熬別作

右六味蜜和丸如梧桐子大飲服十九日三服漸加以知爲度

趺陽脈浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則鞶其脾爲約陽明

厚朴三物湯六

厚朴八兩 大黃四兩 枳實五枚

右三味以水一斗二升先煮二味取五升內大黃煮取三升溫服一升以利爲度

痛而閉者腹滿

厚朴七物湯七

厚朴半斤 甘草三兩 大黃三兩

大棗十枚 枳實五枚 桂枝二兩

生薑五兩

右七味以水一斗煮取四升溫服八合日三

傷寒雜病類方

承氣湯

辨學圖堂藏板

服嘔者加半夏五合下利去大黃寒多者加生薑至半斤

病腹滿發熱十日脈浮而數飲食如故同上

厚朴大黃湯八

厚朴一尺

大黃六兩

枳實四枚

右三味以水五升煮取二升分溫再服

支飲胸滿痰飲

大黃甘草湯九

大黃四兩

甘草一兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服食已卽吐嘔吐

抵當湯十

水蛭熬

蟲蟲各三十箇桃仁二十箇

大黃三兩酒洗

右四味以水五升煮取三升去滓溫服一升不下更服

太陽病六七日表證仍在脈微而沈反不結胷其人發狂者以熱在下焦少腹當鞶滿小便自

傷寒雜病類方

承氣湯

辨學制堂藏本

利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在  
裏故也太陽病身黃脈沈結少腹鞶小便不  
利者爲無血也小便自利其人如狂者血證諦  
也太陽中陽明證其人喜忘者必有畜血所以然  
者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞶大便反易其  
色必黑病人無表裏證發熱七八日雖脈浮  
數者可下之假令已下脈數不解合熱則消穀  
喜飢至六七日不大便者有瘀血陽明婦人經  
水不利下亦治男子膀胱滿急有瘀血者○婦人雜病

抵當丸十一

水蛭

二十箇熬

蟲蟲

二十箇去翅足熬

桃人

二十五箇去皮尖

大黃

三兩

右四味擣分四丸以水一升煮一丸取七合  
服之。時當下血若不下者更服。

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者爲有  
血也當下之不可餘藥太陽中

下瘀血湯十二

大黃

二兩

桃人

二十枚

麤蟲

二十枚熬去足

右三味末之煉蜜和爲四丸以酒一升煎一丸取八合頓服之新血下如豚肝

產婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此爲腹中有乾血著臍下宜下瘀血湯亦主經水不利婦人  
產後

大黃麤蟲丸十三

大黃蒸十分黃芩一兩甘草三兩桃人一升杏人一升芍藥四兩乾地黃十兩乾漆一兩蟲蟲一升

水蛭百枚蟻螬一升麤蟲半升

右十二味末之煉蜜和丸小豆大酒飲服五丸日三服

五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷飢傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯黑緩中補虛虛勞

大黃消石湯十四

大黃

黃芩

消石各四兩

梔子十五枚

右四味以水六升煮取三升去滓內消更煮取一升頓服

黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此爲表和裏實當下之黃疸

大黃牡丹湯十五

大黃四兩牡丹一兩桃人五十箇瓜子半升芒消三合

右五味以水六升煮取一升去滓內芒消再煎沸頓服之有膿當下如無膿當下血

腸癰者少腹腫痞按之卽痛如淋小便自調時發熱自汗出復惡寒其脈遲緊者膿未成可下之當有血脈洪數者膿已成不可下也腸癰大黃附子湯十六

大黃三兩附子三枚炮細辛二兩

右三味以水五升煮取二升分溫三服若強人煮取二升半分溫三服服後如人行四五里進一服

腸下偏痛發熱其脈緊弦此寒也以溫藥下之

寒、疝

治食鱠成癥方 十七

橘皮 一兩

大黃 二兩

朴消 二兩

右三味以水一大升煮至小升頓服卽消  
鱠食之在心胃間不化吐復不出速下除之久  
成癥病蟲魚禁忌

大黃甘遂湯 十八

大黃 四兩

甘遂 二兩

阿膠 二兩

右三味以水三升煮取一升頓服之其血當

下

婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴生後者  
此爲水與血俱結在血室也婦人雜病

大陷胸湯 十九

大黃 六兩

芒消 一升

甘遂 一錢

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內  
芒消煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利  
止後服

太陽病脈浮而動數浮則爲風數則爲熱動則

爲痛數則爲虛。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒者。表未解也。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。胃中空虛。客氣動膈。短氣躁煩。心中懊憹。陽氣內陷。心下因鞶。則爲結胷。大陷胷湯主之。若不結胷。但頭汗出。餘處無汗。劑頸而還。小便不利。身必發黃。傷寒六七日。結胷熱實。脈沈而緊。心下痛。按之石鞶。傷寒十餘日。熱結在裏。復從來寒熱者。與大茈胡湯。但結胷無大熱者。此爲水結在胷脅也。但頭微汗出。太陽病重發汗。

而復下之。不大便五六日。舌上燥而渴。日晡所小有潮熱。從心下至少腹鞶滿。而痛不可近。傷寒五六日。嘔而發熱者。茈胡湯證具。而以他藥下之。茈胡證仍在者。復與茈胡湯。此雖已下之。不爲逆。必蒸蒸而振。却發熱汗出而解。若心下滿而鞶痛者。此爲結胷也。太陽

大陷胷丸二十

大黃半升

葶苈子半升

芒消半升

杏仁半升去皮

尖熬黑

右四味搗篩二味內杏仁芒消合研如脂和散取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢匕白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取下爲效禁如藥法

結胷者項亦強如柔症狀下之則和太陽

小陷胷湯二十一

黃連一兩半夏半升洗桔樓實大者一枚右三味以水六升先煮桔樓取三升去滓內諸藥煮取二升去滓分溫三服

小結胷病正在心下按之則痛脈浮滑太陽下

十棗湯二十二

茺花熬

甘遂

大戟

右三味等分各別搗爲散以水一升半先煮大棗肥者十枚取八合去滓內藥末強人取一錢匕羸人服半錢溫服之平旦服若下少病不除者明日更服加半錢得快下利後糜粥自養

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人糜

雜汗出發作有時頭痛心下痞鞕滿引脅下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表解裏未和也太下病懸飲欬家其脈弦爲有水夫有支飲家欬煩會中痛者不卒死至一百日或一歲痰飲芩蘆大棗瀉肺湯二十三

芩蘆

熬令黃色搗丸如彈丸大

大棗

枚十二

右先以水三升煮棗取二升去棗內芩蘆煮取一升頓服

肺癰喘不得卧肺癰胸滿脹一身面目浮腫

鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫塞肺癰支飲不得息痰飲

白散方

金匱名桔梗白散○二十四

桔梗

三分

巴豆

一分去皮心

熬黑研如脂

貝母

三分

右三味爲散內巴豆更於臼中杵之以白飲和服強人半錢匕羸者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一杯利過不止進冷粥一杯

金匱云飲冷

水一杯則定

寒實結胃無熱證太陽欬而胸滿振寒脈數咽

乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者爲肺癰肺癰引外臺

走馬湯二十五

杏人二枚

巴豆二枚去皮心熬

右二味以綿纏搥令碎熱湯二合捻取白汁飲之當下老小量之

中惡心痛腹脹大便不通通治飛尸鬼擊病腹滿引外臺

三物備急丸二十六

大黃一兩

乾薑一兩

巴豆

一兩去皮心熬外研

如脂

右藥各須精新先搗大黃乾薑爲末研巴豆內中合治一千杵用爲散蜜和丸亦佳密器中貯之莫令歇見千金司空裴秀爲散用亦可先和成汁乃傾口中令從齒間得入至良驗

心腹諸卒暴百病若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刺氣急口噤停尸卒死者以緩水若酒服大豆許三四丸或不下捧頭起灌令下咽須臾

當差如未差更與二丸當腹中鳴卽吐下便差若口噤亦須折齒灌之雜療

已椒蘋黃丸二十七

防已

椒目

葶藶熬

大黃各一兩

右四味末之蜜丸如梧子大先食飲服一丸日三服稍增口中有津液渴者加芒消半兩腹滿口舌乾燥此腸間有水氣痰飲治馬墜及一切筋骨損方二十八

大黃

湯一兩切浸

紺帛

如手大燒灰

亂髮

如雞子大燒灰

用久用炊單布

燒灰一尺

敗蒲

一握

桃人

四十九箇去皮尖熬

甘草

如中指節炙剉

右七味以童子小便量多少煎湯成內酒一大盞次下大黃去滓分溫三服先剉敗蒲席半領煎湯浴衣被蓋覆斯須通利數行痛楚立差利及浴水赤勿恆卽瘀血也

甘遂半夏湯二十九

甘遂

大者一枚

半夏

十二枚煮取半升

以水一升去滓

仲景經卷之二

學詩堂藏版

學詩堂藏版

芍藥

五枚

甘草

如指大一枚炙

右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半升和藥汁煎取八合頓服之。

病者脉伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此爲留飲欲去故也痰飲

蜜煎導三十

食蜜七合

右一味於銅器內微火煎當須凝如餡狀攬之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大

如指長二寸許當熱時急作冷則輒以內穀道中以手急抱欲大便時乃去之。

豬膽汁方三十一

大猪膽一枚

瀉汁和少許法醋以灌穀道內如一食頃當大便出宿食惡物。

陽明病自汗出若發汗小便自利者此爲津液內竭雖鞶不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及大猪膽汁皆可爲導陽明

傷寒雜病方

承氣湯

至

學詩堂藏版

九痛丸 三十二

附子 三兩 炮

生狼牙 一兩 炙香

巴豆 一兩 熬研如脂

去皮心

人薑

乾薑

吳茱萸 各一兩

右六味末之。煉蜜丸如桐子大。酒下。强人初服三丸。日三服。弱者二丸。忌口如常法。

九種心痛。兼治卒中惡。腹脹痛。口不能言。又治連年積冷。流注心胸痛。并冷衝上氣。落馬墜車

血疾等。心痛

