





傷寒雜病類方

武
110
2止

武
110
卷 2 止



瓜蒂散類七 凡四方

瓜蒂散一

瓜蒂一分

赤小豆一分

右二味各別擣篩為散已合治之取一錢七以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與瓜蒂散

病如桂枝證頭不痛項不强寸脈微浮胃中痞鞭氣上衝喉咽不得息者此為胃有寒也當吐



之。太陽下宿食在上脘當吐之。宿食

一物瓜蒂湯二

瓜蒂二七

右剉以水一升煮取五合去滓頓服。

太陽中暈身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷

水水行皮中所致也。喝諸黃黃疸

鹽湯三

鹽一升 水三升

右二味煮令鹽消分三服當吐出食便差。

貪食食多不消心腹堅滿痛。

飲食中毒煩滿治之方。四

苦蕒三兩 苦酒一升

右二味煮三沸三上三下服之吐食出即差。

或以水煮亦得。果實菜

傷寒雜類方
傷寒雜類方
傷寒雜類方

瀉心湯類八 凡十五方

半夏瀉心湯一

半夏半升洗

黃芩

乾薑

人蔞

甘草

黃連

大棗十二枚擘

炙各三兩

一兩

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

傷寒五六日嘔而發熱者芫胡湯證具而以他藥下之芫胡證仍在者復與芫胡湯此雖已下

傷寒雜類方 瀉心湯 傷寒雜類方

傷寒雜病類方
卷之五
學詩堂藏版
之不為逆。必蒸蒸而振，却發熱汗出而解。若心下滿而鞭痛者，此為結胃也。大陷胃湯主之。但滿而不痛者，此為痞。此胡不中與之。太陽嘔而腸鳴，心下痞，嘔吐。

生薑瀉心湯 二

生薑

四兩切

甘草

三兩炙

人蔞

三兩

乾薑

一兩

黃芩

三兩

半夏

半升洗

黃連

一兩

大棗

十二枚擘

右八味以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三

升，溫服一升，日三服。

傷寒汗出解之後，胃中不和，心下痞鞭，乾噫食臭，脅下有水氣，腹中雷鳴，下利。太陽下

甘草瀉心湯 三

甘草

四兩炙

黃芩

三兩

乾薑

三兩

半夏

半升洗

大棗

十二枚擘

黃連

一兩

人蔞

三兩

右七味以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，溫服一升，日三服。

傷寒、中風、醫反下之，其人下利，日數十行，穀不化，腹中雷鳴，心下痞，鞭而滿，乾嘔，心煩，不得安。醫見心下痞，謂病不盡，復下之，其痞益甚。此非結熱，但以胃中虛，客氣上逆，故使鞭也。太陽狐惑之為病，狀如傷寒，默默欲眠，目不得閉，卧起不安，蝕於喉為惑，蝕於陰為狐，不欲飲食，惡聞食臭，其面目乍赤乍黑乍白，蝕於上部則聲喝。

大黃黃連瀉心湯 四

大黃 二兩 黃連 一兩

右二味，以麻沸湯二升漬之，須臾絞去滓，分溫再服。

心下痞，按之濡，其脈關上浮。傷寒大下後，復發汗，心下痞，惡寒者，表未解也，不可攻痞，當先解表，表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯，攻痞宜大黃黃連瀉心湯。太陽

瀉心湯 五

大黃 二兩 黃連 一兩 黃芩 各一兩

右三味以水三升煮取一升頓服之

心氣不足吐血衄血亦治霍亂吐衄婦人吐涎

沫醫反下之心下即痞當先治其吐涎沫小青

龍湯主之涎沫止乃治痞婦人雜病

附子瀉心湯六

大黃 二兩 黃連 一兩 黃芩 一兩

附子 二枚炮去皮破別煮取汁

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附子汁分溫再服

心下痞而復惡寒汗出太陽下

黃連湯 七

黃連 三兩 甘草 三兩炙 乾薑 三兩

桂枝 三兩去皮 人蔞 二兩 半夏 半升洗

大棗 十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服晝三夜二

傷寒胃中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐同上

黃芩湯 八

傷寒雜病類方

瀉心湯

學講堂藏版

黃芩 三兩

芍藥 二兩

甘草 二兩

大棗 十二枚

右四味以水一斗煮取三升去滓温服一升

日再夜一服

太陽與少陽合病自下利太陽下

黃芩加半夏生薑湯九

黃芩 三兩

芍藥 二兩

甘草 二兩

大棗 十二枚

半夏 半升

生薑 三兩

右六味以水一斗煮取三升去滓温服一升

日再夜一服

前證若嘔同上乾嘔而利嘔吐

黃芩湯十

黃芩 三兩

人蔘 三兩

乾薑 三兩

桂枝 二兩

大棗 十二枚

半夏 半升

右六味以水七升煮取三升温分三服

乾嘔下利嘔吐引外臺

三物黃芩湯十一

黃芩 一兩

苦蕒 二兩

乾地黄 四兩

傷寒雜病類方
卷之五
下蟲
右三味以水六升煮取二升溫服一升多吐

婦人在草蓐自發露得風四肢苦煩熱頭痛者
與小芫胡湯頭不痛但煩者婦人產後引千金

乾薑黃芩黃連人蔘湯 十二

乾薑

黃芩

黃連

人蔘 各三兩

右四味以水六升煮取二升去滓分溫再服
傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若

食入口即吐 厥陰

旋覆代赭湯 十三

旋覆花 三兩 人蔘 二兩 生薑 五兩

代赭 一兩 甘草 三兩 半夏 半升

大棗 十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除

太陽

瀉心湯

五
皇
川
金
藏
反

黃連阿膠湯 十四

黃連 四兩

黃芩 二兩

芍藥 二兩

雞子黃 三枚

阿膠 二兩

右五味以水六升先煮三物取二升去滓內

膠烱盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合

日三服

少陰病得之二三日以上心中煩不得卧少陰

澤漆湯 十五

半夏 半升

紫葢 五兩

澤漆 三斤以東流水五斗

煮取一斗五升

生薑 五兩

白前 五兩

甘草

黃芩

人蔘

桂枝 各三兩

右九味咬咀內澤漆汁中煮取五升溫服五

合至夜盡

欬而脈沈欬嗽

傷寒雜類方

傷寒論

白虎湯類九 凡五方

白虎湯一

知母 六兩

石膏 碎 一斤

甘草 炙 二兩

粳米 六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓温服一升日三服

傷寒脈浮滑此以表有熱裏有寒太陽三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上生汗手足逆冷若自

傷寒雜類方

白虎湯

三

皇朝經世文編

傷寒雜病類方

傷寒論

汗出陽明傷寒脈滑而厥者裏有熱厥陰

白虎加人蔞湯二

知母 六兩
石膏 一斤碎
綿裹
甘草 炙二兩
粳米 六合
人蔞 三兩

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓温服一升日三服

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大太陽

傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數

升 傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒 傷

寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎湯渴

欲飲水無表證太陽若渴欲飲水口乾舌燥陽

太陽中熱者喝是也汗出惡寒身熱而渴喝

白虎加桂枝湯三

知母 六兩
炙
甘草 二兩
石膏 一斤
粳米 六合
桂枝 三兩去皮

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓温服一

升日三服

傷寒雜病類方 白虎湯 學川堂藏反

溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節疼煩時嘔

瘧

竹葉石膏湯 四

竹葉 二把

石膏 一斤

半夏 半升

麥門冬 一升

去心

人蔘 二兩

甘草 二兩

炙

粳米 半升

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮

米熟湯成去米溫服一升日三服

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐 差後 勞復

竹皮大丸 五

生竹茹 二分

石膏 二分

桂枝 一分

甘草 七分

白薇 一分

右五味末之棗肉和丸彈子大以飲服一九
日三夜二服有熱者倍白薇煩喘者加柏實

一分

婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣 婦人 產後

傷寒雜病類方

傷寒論卷之九

五苓散類十一 凡二十一方

五苓散

猪苓

十八銖 去皮

澤瀉

一兩 六銖

白朮

十八銖

茯苓

十八銖

桂枝

半兩 去皮

右五味搗為散以白飲和服方寸匕日三服
多飲煖水汗出愈如法將息

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲
得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脈浮
小便不利微熱消渴發汗已脈浮數煩渴

傷寒雜病類方

五苓散

書

學川堂藏反

傷寒汗出而渴。中風發熱六七日不解而煩。有表裏證。渴欲飲水。水入則吐者。名曰水逆。太陽中病在陽。應以汗解之。反以冷水濕之。若灌之。其熱被劫不得去。彌更益煩。肉上粟起。意欲飲水。反不渴者。服文蛤散。若不差。本以下之。故心下痞。與瀉心湯。痞不解。其人渴而口燥煩。小便不利。太陽太陽病。寸緩關浮尺弱。其人發熱汗出。復惡寒。不嘔。但心下痞者。此以醫下之也。如其不下者。病人不惡寒而渴者。此轉屬陽明。

也。小便數者。大便必鞭。不更衣十日。無所苦也。渴欲飲水。少少與之。但以法救之。渴者。陽明霍亂。頭痛發熱。身疼痛。熱多欲飲水。霍亂脈浮。小便不利。微熱消渴者。宜利小便。發汗。消渴假令瘦人。臍下有悸。吐涎沫而癩眩。此水也。痰飲

茵陳五苓散 二

茵陳蒿末 十分 五苓散 五分

右二味和先食飲方寸匕。日三服。

黃疸病 黃疸

五苓散 五苓散

猪苓湯 三

猪苓 去皮

茯苓

澤瀉

阿膠

滑石

碎各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烱消溫服七合日三服

陽明病若脈浮發熱渴欲飲水小便不利陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓湯復利其小便故也陽明少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠少陰

茯苓甘草湯 四

茯苓 二兩

桂枝

二兩 去皮

甘草

一兩 炙

生薑 三兩 切

右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者太陽傷寒厥而心下悸宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也厥陰

猪苓散 五

猪苓

茯苓

白朮

各等分

右三味杵為散飲服方寸匕日三服
嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思水者
嘔吐

茯苓桂枝白朮甘草湯 六

茯苓 四兩

桂枝 三兩
去皮

白朮

甘草 各二兩
炙

右四味以水六升煮取三升去滓分溫三服
傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胃起則頭
眩脈沈緊發汗則動經身為振振搖太陽中心下

有痰飲胸脇支滿目眩夫短氣有微飲當從
小便去之痰飲

茯苓桂枝甘草大棗湯 七

茯苓 半斤

桂枝 四兩
去皮

甘草 二兩
炙

大棗 十五
枚擘

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內
諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服
作甘爛水法取水二斗置大盆內以杓揚之
水上有珠子五六千顆相逐取用之

傷寒雜病類方
發汗後其人臍下悸者欲作奔豚
中 太陽

澤瀉湯 八
發汗後其人臍下悸者欲作奔豚
中 太陽

澤瀉 五兩
白朮 二兩

右二味以水二升煮取一升分溫再服

心下有支飲其人苦冒眩 痰飲

茯苓澤瀉湯 九

茯苓 半斤
澤瀉 四兩
甘草 一兩

桂枝 二兩
白朮 三兩
生薑 四兩

右六味以水一斗煮取三升內澤瀉再煮取

二升半溫服八合日三服

胃反吐而渴欲飲水 嘔吐

茯苓杏人甘草湯 十

茯苓 三兩
杏人 五十
甘草 一兩

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三

服不差更服

胸痺胸中氣塞短氣 胸痺

桂苓五味甘草湯 十一

茯苓 四兩
桂枝 四兩
甘草 三兩

傷寒雜病類方
五苓散
學川堂藏版

五味子 半升

右四味以水八升煮取三升去滓分温三服
青龍湯下已多唾口燥寸脈沈尺脈微手足厥
逆氣從少腹上衝胸咽手足痺其面翕熱如醉
狀因復下流陰股小便難時復冒者與茯苓桂
枝五味甘草湯治其氣衝
苓甘五味薑辛湯 十二

茯苓 四兩

甘草 二兩

乾薑 三兩

細辛 二兩

五味 半升

右五味以水八升煮取三升去滓温服半升
日三服

衝氣即低而反更欬胸滿者用桂苓五味甘草
湯去桂加乾薑細辛以治其欬滿

茯苓五味甘草去桂加薑辛夏湯 十三

茯苓 四兩

甘草 二兩

細辛 二兩

乾薑 二兩

五味子

半夏 各半升

右六味以水八升煮取三升去滓温服半升

日三服

欬滿卽止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑
爲熱藥也服之當遂渴而渴反止者爲支飲也
支飲者法當冒冒者必嘔嘔者復內半夏以去
其水

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯 十四

茯苓 四兩 甘草 三兩 五味子 半升

乾薑 三兩 細辛 三兩 半夏 半升

杏仁 半升 去皮尖

右七味以水一斗煮取三升去滓溫服半升

日三服

水去嘔止其人形腫者加杏仁主之其證應內
麻黃以其人遂痺故不內之若逆而內之者必
厥所以然者以其人血虛麻黃發其陽故也

苓甘五味加薑辛半夏大黃湯 十五

茯苓 四兩 甘草 三兩 五味 半升

乾薑 三兩 細辛 三兩 半夏 半升

杏仁 半升 大黃 三兩

右八味以水一斗煮取三升去滓溫服半升

傷寒雜病類方

日三服

若面熱如醉此為胃熱上衝熏其面加大黃以利之痰飲

茯苓戎鹽湯 十六

茯苓 半斤

白朮 二兩

戎鹽 彈丸大一枚

右三味先將茯苓白朮煎成入戎鹽再煎分溫三服

小便不利淋

葵子茯苓散 十七

葵子 一斤

茯苓 三兩

右二味杵為散飲服方寸匕日三服小便利則愈

妊娠有水氣身重小便不利洒淅惡寒起即頭眩妊娠

牡蠣澤瀉散 十八

牡蠣 熬

澤瀉

蜀漆

煖水洗去腥

葶藶子 熬

商陸根 熬

海藻

洗去鹹

桔樓根

各等分

傷寒雜病類方

五苓散

全

學川堂藏反

傷寒雜病類方

五苓散

右七味異擣下篩為散。夏於白中治之。白飲和服。方寸匕。日三服。小便利止。後服。

大病差後從腰以下有水氣。差後勞復

文蛤散 十九

文蛤 五兩

右一味為散。以沸湯和。一方寸匕服。湯用五合。

病在陽。應以汗解之。反以冷水溼之。若灌之。其熱被劫不得去。彌更益煩。肉上粟起。意欲飲水。

反不渴。太陽下渴欲飲水不止。消渴

蒲灰散 二十

蒲灰 七分 滑石 三分

右二味杵為散。飲服方寸匕。日三服。

小便利。淋厥而皮水。水氣

滑石白魚散 二十一

滑石 二分 亂髮二分 白魚 二分

右三味杵為散。飲服半錢匕。日三服。

小便利。淋

傷寒雜病類方 五苓散 全 學川堂藏反

傷寒雜病類方

傷寒雜病類方

理中湯類十一 凡十一方

理中丸一

人蔘

白朮 各三兩

乾薑

甘草 炙

右四味，搗篩，蜜和為丸。如雞子黃許大。以沸湯數合，和一丸，研碎，溫服之。日三四，夜二服。腹中未熱，益至三四丸。然不及湯。湯法：以四物，依兩數切，用水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。若臍上築者，腎氣動也。去木加

傷寒雜病類方 理中湯 全 學川堂藏反

桂四兩吐多者去木加生薑三兩下多者還
用木悸者加茯苓二兩渴欲得水者加木足
前成四兩半腹中痛者加人蔘足前成四兩
半寒者加乾薑足前成四兩半腹滿者去木
加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一升許
微自溫勿發揭衣被

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散
主之寒多不用水霍亂大病差後喜唾久不
了胃上有寒當以丸藥溫之差後
勞復

人蔘湯 二

人蔘

甘草

乾薑

白朮 各三兩

右四味以水八升煮取三升溫服一升日三

服

胸痺心中痞留氣結在胸胸滿脇下逆搶心胸痺

桂枝人蔘湯 三

桂枝 四兩別切

甘草 四兩炙

白朮 三兩

人蔘 三兩

乾薑 三兩

右五味以水九升先煮四味取五升內桂夏
煮取三升去滓溫服一升日再夜一服

太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下
不止心下痞鞞表裏不解太陽下

大建中湯 四

蜀椒 二合 去汗 乾薑 四兩 人蔘 二兩

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一
升微火煎取一升半分溫再服如一炊頃可
飲粥二升後更服當一日食糜溫覆之

心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起
出見有頭足上下痛而不可觸近 寒疝

茯苓飲 五

茯苓 人蔘 白朮 各三兩
枳實 二兩 橘皮 二兩 半 生薑 四兩

右六味水六升煮取一升八合分溫三服如
人行八九里進之

心胸中有停痰宿水自吐出水後心胸間虛氣
滿不能食消痰氣令能食 痰飲引外臺

傷寒雜病類方

論語

枳木湯 六

枳實 七枚

白木 二兩

右二味以水五升煮取三升分温三服腹中
奕即當散也

心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作水氣

甘草乾薑湯 七

甘草 四兩

乾薑 二兩

右二味以水三升煮取一升五合分温再服
傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急

反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾

煩躁吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽太陽

上肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺尿小

便數所以然者以上虛不能制下故也此為肺

中冷必眩多涎唾甘草乾薑湯以温之若服湯

已渴者屬消渴肺痿

甘草乾薑茯苓白木湯 八

甘草 二兩

白木 二兩

乾薑 四兩

茯苓 四兩

傷寒雜病類方

理中湯

六

學則能識反

傷寒雜病類方

傷寒雜病類方

右四味以水五升煮取三升分温三服腰中即温

腎著之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出衣裏冷濕久久得之腰以下冷痛腰重

如帶五千錢五藏風寒

白朮附子湯九

附子三枚炮去皮破 白朮四兩

生薑三兩切

甘草二兩炙 大棗十二枚擘

右五味以水六升煮取二升去滓分温三服初一服其人身如痺半日許復服之三服都盡其人如冒狀勿怪此以附子朮併走皮內逐水氣未得除故使之耳

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濡者桂枝附子湯主之若其人大便鞭小便自利太陽下風虛頭重眩苦極不知食味煖肌補中益精氣中風引近効

甘草附子湯十

理中湯

學川堂藏版

傷寒雜病類方

傷寒雜病類方

甘草 二兩 炙

附子 二枚 炮 去皮 白朮 二兩

桂枝 四兩 去皮

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服初服得微汗則解能食汗止復煩者將服五合恐一升多者宜服六七合為始風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫 太陽下 天雄散 十一

天雄 三兩 炮

白朮 八兩

桂枝 六兩

龍骨 三兩

右四味杵為散酒服半錢匕日三服不知稍增之 虛勞

傷寒雜病類方

理中湯

天

學則堂藏版

作身雜症類方

學言生癩片

四逆湯類十二 凡十三方

四逆湯一

甘草二兩 炙 乾薑一兩 半 附子一枚 生用 去皮 破八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服强人可大附子一枚乾薑三兩

傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若

傷寒雜病類方

學訓堂藏版

厥愈足温者，夏作芍藥甘草湯與之，其脚即伸。若胃氣不和，識語者，少與調胃承氣湯。若重發汗，復加燒針，上太陽傷寒醫下之，續得下利，清穀不止，身疼痛者，急當救裏。病發熱頭痛，脉反沈，若不差，身體疼痛，當救其裏。中太陽脉浮而遲，表熱裏寒，下利清穀。陽明自利不渴者，屬太陰，以其藏有寒故也。當温之，宜服四逆輩。太陰少陰病脉沈者，急温之。少陰病，飲食入口則吐，心中温温欲吐，復不能吐，始得之，手足寒，脉弦

遲者，此胃中實，不可下也。當吐之。若膈上有寒飲，乾嘔者，不可吐也。當温之。少陰大汗出，熱不去，內拘急，四肢疼，又下利厥逆，而惡寒，大汗若大下利，而厥冷，下利腹脹滿，身體疼痛者，先温其裏，乃攻其表，温裏宜四逆湯。嘔而脉弱，小便利，身有微熱，見厥者，難治。厥陰吐利汗出，發熱惡寒，四肢拘急，手足厥冷，既吐且利，小便利，而大汗出，下利清穀，內寒外熱，脉微欲絕。霍亂

傷寒雜病類方

四逆湯

子

學訓堂藏版

四逆加人蔘湯 二

四逆湯原方加人蔘一兩

惡寒脉微而復利利止亡血也霍亂

通脉四逆湯 三

甘草 二兩

附子

大者一枚生用去皮破八片

乾薑

三兩強人可四兩

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温

再服其脉即出者愈面色赤者加葱九莖腹

中痛者去葱加芍藥二兩嘔者加生薑二兩

咽痛者去芍藥加桔梗一兩利止脉不出者

去桔梗加人蔘二兩

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲

絕身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾嘔或

咽痛或利止脉不出少陰下利清穀裏寒外熱

汗出而厥厥陰

通脉四逆加豬膽汁湯 四

通脉四逆湯原方加豬膽汁半合

右四味以水三升煮取一升二合去滓內豬

傷寒雜病類方

學問堂藏板

膽汁分温再服其脉即來無豬膽以羊膽代之

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絕霍亂

乾薑附子湯 五

乾薑 一兩 附子 一枚生用去皮切八片

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沈微身無大熱者太陽中

白通湯 六

葱白 四莖 乾薑 一兩

附子 一枚生去皮破八片

右三味以水三升煮取一升去滓分温再服

少陰病下利少陰白通加豬膽汁湯 七

葱白 四莖 乾薑 一兩 附子 一枚生去皮破八片

人尿 五合 豬膽汁 一合

右五味以水三升煮取一升去滓內膽汁人尿和令相得分温再服若無膽亦可用

少陰病下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者白通加豬膽汁湯主之服湯脉暴出者死微續者生少陰

茯苓四逆湯八

茯苓四兩

人蔘一兩

附子一枚生用去皮破八

片

甘草二兩炙

乾薑一兩半

右五味以水五升煮取三升去滓温服七合日二服

發汗若下之病仍不解煩躁太陽中

玄武湯九

茯苓三兩

芍藥三兩

白朮二兩

生薑三兩切

附子一枚炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓温服七合日三服若欬者加五味子半升細辛一兩乾薑一兩若小便利者去茯苓若下利者去芍藥加乾薑二兩若嘔者去附子加生薑足前為半斤

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭

傷寒雜病類方
眩身暈動振振欲擗地。中太陽少陰病。二三日不
已。至四五日。腹痛。小便不利。四肢沈重疼痛。自
下利者。此為有水氣。其人或欬。或小便利。或下
利。或嘔。少陰

附子湯 十

附子 二枚炮去皮破八片 茯苓 三兩

人蔘 二兩

白朮 四兩 芍藥 三兩

右五味以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

少陰病得之一二日。口中和。其背惡寒者。當灸之。少陰病。身體痛。手足寒。骨節痛。脉沈。少陰

大烏頭煎 十一

烏頭 大者五枚熬去皮不咬咀

右以水三升。煮取一升。去滓。內蜜二升。煎令水氣盡。取二升。強人服七合。弱人服五合。不差。明日更服。不可日再服。

腹痛脉弦而緊。弦則衛氣不行。即惡寒。緊則不欲食。邪正相搏。即為寒疝。繞臍痛。若發則自汗

出。手足厥冷。其脉沈弦。寒疝
赤丸 十二

茯苓 四兩

烏頭 二兩炮

半夏 四兩洗

細辛 一兩

右四味末之。內真朱為色。煉蜜丸。如麻子大。先食酒飲下。三九。日再夜一服。不知稍增之。以知為度。

寒氣厥逆。寒疝

烏頭赤石脂丸 十三

蜀椒

法一兩一分 烏頭

附子

法半兩一分

乾薑

法一兩一分 赤石脂

右五味末之。蜜丸。如桐子大。先食服。一九。日

三服。不知稍加服。

心痛徹背。背痛徹心。胸痺

傷寒雜病類方

傷寒雜病類方

半夏湯類十三 凡十二方

小半夏湯一

半夏 一升

生薑 半斤

右二味以水七升煮取一升半分温再服

嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲

故也痰飲黃疸病小便色不變欲自利腹滿而

喘不可除熱熱除必噦噦者黃疸諸嘔吐穀不

得下嘔吐

小半夏加茯苓湯二

傷寒雜病類方

半夏湯

卷

學

堂

藏

小半夏湯原方加茯苓三兩

卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸先渴後嘔為

水停心下此屬飲家痰飲

生薑半夏湯三

半夏半升 生薑汁一升

右二味以水三升煮半夏取二升內生薑汁

煮取一升半小冷分四服日三夜一服止停

後服

病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心

中憤憤然無奈嘔吐

大半夏湯四

半夏二升洗完用 人蔞三兩 白蜜一升

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十

遍煮藥取二升半溫服一升餘分再服

胃反嘔吐嘔吐

半夏乾薑散五

半夏 乾薑各等分

右二味杵為散取方寸匕漿水一升半煎取

七合頓服之。

乾嘔吐逆吐涎沫嘔吐

乾薑人蔞半夏丸六

乾薑一兩 人蔞一兩 半夏二兩

右三味末之以生薑汁糊為丸如梧子大飲服十九日三服。

妊娠嘔吐不止婦人

附子粳米湯七

附子一枚 半夏半升 甘草一兩

大棗十枚 粳米半升

右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服一升日三服。

腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐寒疝霍亂

四逆吐少嘔多外臺引

厚朴生薑半夏甘草人蔞湯八

厚朴半斤 生薑半斤 半夏半升

甘草二兩 人蔞一兩

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升。

日三服。

發汗後，腹脹滿。太陽中

半夏厚朴湯九

半夏一升

厚朴三兩

茯苓四兩

生薑五兩

乾蘇葉二兩

右五味，以水七升，煮取四升，分溫四服，日三

夜一服。

婦人咽中如有炙臠。婦人雜病

苦酒湯十

半夏

洗破，如棗核，十四枚

雞子

一枚，去黃，內上苦酒，著雞子殼中。

右二味，內半夏，著苦酒中，以雞子殼置刀環

中，安火上，令三沸，去滓，少少含嚥之，不差更

作三劑。

少陰病，咽中傷生瘡，不能語言，聲不出。少陰

半夏散及湯十一

半夏洗

桂枝去皮

甘草炙

右三味，等分，各別搗篩已，合治之，白飲和服

方寸匕，日三服。若不能散服者，以水一升，煎

七沸內散兩方寸匕。更煮三沸。下火令小冷。少少嚥之。

少陰病。咽中痛。少陰

麥門冬湯十二

麥門冬七升半夏一升

人蔘二兩

甘草二兩

粳米三合

大棗十二枚

右六味。以水一斗二升。煮取六升。溫服一升。日三夜一服。

大逆上氣。咽喉不利。止逆下氣。肺痿

甘草湯類十四凡七方

甘草湯一

甘草二兩

右一味。以水三升。煮取一升半。去滓。溫服七合。日二服。

少陰病。二三日。咽痛。少陰

桔梗湯二

桔梗一兩

甘草二兩

右二味。以水三升。煮取一升。去滓。溫分再服。

少陰病二三日，咽痛者，可與甘草湯不差。少陰欬而胸滿，振寒，脈數，咽乾不渴，時出濁唾腥臭，久久吐膿，如米粥者，為肺癰。肺癰炙甘草湯三

甘草四兩

生薑三兩

人蔞二兩

生地黄一斤

桂枝三兩

阿膠二兩

麥門冬半升

麻人半升

大棗三十枚

右九味，以清酒七升，水八升，先煮八味，取三升，去滓，內膠烱消盡，溫服一升，日三服，一名

復脈湯

傷寒脈結代，心動悸。太陽下虛勞不足，汗出而悶。

脈結悸，行動如常，不出百日，危急者，十一日死。

虛勞引，千金翼肺痿，涎唾多，心中溫溫液液。肺痿引，外臺

生薑甘草湯四

生薑五兩

人蔞三兩

甘草四兩

大棗十五枚

右四味，以水七升，煮取三升，分溫三服。

肺痿，欬唾涎沫不止，咽燥而渴。肺痿引，千金

甘草粉蜜湯 五

甘草 二兩

粉 一兩

蜜 四兩

右三味以水三升先煮甘草取二升去滓內粉蜜攪令和煎如薄粥溫服一升差即止

止 虻蟲
虻蟲之為病令人吐涎心痛發作有時毒藥不

排膿湯 六

甘草 二兩

桔梗 三兩

生薑 一兩

大棗 十枚

右四味以水三升煮取一升溫服五合日再服 瘡癰

甘草小麥大棗湯 七

甘草 三兩

小麥 一升

大棗 十枚

右三味以水六升煮取三升溫分三服亦補脾氣

婦人藏躁喜悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸 雜病

傷寒雜病類方
婦人經水不調
經閉不通
經行腹痛
經行腰痛
經行頭暈
經行眼花
經行耳鳴
經行口苦
經行舌燥
經行咽乾
經行渴飲
經行多汗
經行身熱
經行脈數
經行脈弦
經行脈滑
經行脈沉
經行脈微
經行脈弱
經行脈澀
經行脈結
經行脈代
經行脈亂
經行脈絕

芎歸湯類十五 凡六方

芎歸膠艾湯 一

芎藭 二兩

阿膠 二兩

甘草 二兩

艾葉 三兩

當歸 三兩

芍藥 四兩

乾地黄 四兩

右七味以水五升清酒三升合煮取三升去滓內膠令消盡溫服一升日三服不差更作婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕者有妊娠下血者假令腹中痛為胞阻婦人 婦人

傷寒雜病類方 芎歸湯

陷經漏下，黑不解。婦人雜病

溫經湯二

吳茱萸 三兩

當歸 二兩

芎藭 二兩

芍藥 二兩

人蔞 二兩

桂枝 二兩

阿膠 二兩

生薑 二兩

牡丹皮 二兩
去心

甘草 二兩

半夏 半升

麥門冬 一升
去心

右十二味，以水一斗，煮取三升，分溫三服，亦主婦人少腹寒，久不受胎，兼取崩中去血，或月水來過多，乃至期不來。

婦人年五十所病，下利，數十日不止，暮即發熱，少腹裏急，腹滿，手掌煩熱，唇口乾燥，何也？此病屬帶下，何以故？曾經半產，瘀血在少腹不去，何以知之？其證唇口乾燥，故知之。婦人雜病

當歸生薑羊肉湯 三

當歸 三兩

生薑 五兩

羊肉 一斤

右三味，以水八升，煮取三升，溫服七合，日三服。若寒多者，加生薑成一斤，痛多而嘔者，加橘皮二兩，白朮一兩，加生薑者，亦加水五升。

易長 准病類方 芎歸湯

婦人雜病

傷寒雜病卷下
煮取三升二合服之。

寒疝腹中痛及腸痛裏急寒疝產後腹中疔痛。

并治腹中寒疝虛勞不足產後

當歸芍藥散四

當歸 三兩

芍藥 一斤

茯苓 四兩

白朮 四兩

澤瀉 半斤

芎藭 半斤

右六味杵為散取方寸匕酒和日三服。

婦人懷妊腹中疔痛婦人婦人腹中諸疾痛婦人

病雜

當歸散五

當歸

黃芩

芍藥

芎藭 各一斤

白朮 半斤

右五味杵為散酒飲服方寸匕日再服妊婦

常服即易產胎無苦疾產後百病悉主之。

婦人妊娠宜常服婦人

當歸貝母苦葶丸六

當歸

貝母

苦葶 各四兩

右三味末之煉蜜丸如小豆大飲服二三丸加

傷寒雜病類方

芎藭湯

蘆

淨川堂藏版

至十九男子加滑石半兩
妊娠小便難飲食如故婦人

雜法方類十六 凡七十一方

吳茱萸湯 一

吳茱萸洗一升 人蔞三兩

大棗十二枚擘

生薑六兩切

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七合日三服

食穀欲嘔屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上焦也陽明乾嘔吐涎沫頭痛厥陰少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死少陰嘔而胸滿吐嘔

桃花湯二

赤石脂

一升 用一半篩末

乾薑 一兩

粳米 一升

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合
內赤石脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服

少陰病下利便膿血少陰

赤石脂禹餘糧湯三

赤石脂一升 碎

禹餘糧一升 碎

右二味以水六升煮取二升去滓分溫三服

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞭服瀉心湯已
復以他藥下之利不止醫以理中與之利益甚
理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯
主之復不止者當利其小便太陽

禹餘糧丸方本關 四

汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰疼太陽

烏梅丸 五

烏梅 三百枚

細辛 六兩

乾薑 十兩

傷寒雜病類方

雜法方

真

學則堂藏

作知藥非類

黃連 十六兩

當歸 四兩

附子 六兩 炮

蜀椒 四兩 出汗

桂枝 六兩 去皮

人蔘 六兩

黃蘗 六兩

右十味異擣篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五斗米下飯熟擣成泥和藥令相得內臼中與蜜杵二千下丸如梧桐子大先食飲服十九日三服稍加至二十九禁生冷滑物臭食等

傷寒脉微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安

時者此為藏厥非虺厥也虺厥者其人當吐虺令病者靜而復時煩者此為藏寒虺上入其膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者虺聞食臭出其人當自吐虺虺厥者又主久痢厥陰

腎氣丸 六

乾地黄 八兩 薯蕷 四兩

山茱萸 四兩

澤瀉 三兩 茯苓 三兩

牡丹皮 三兩

桂枝 一兩 附子 一兩 炮

右八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五丸

易經雜方

雜法方

學川堂藏版

傷寒雜症類方

加至二十五丸，日再服。

脚氣上入，少腹不仁。中風引虛勞腰痛，少腹拘

急，小便不利。虛勞夫短氣有微飲，當從小便去

之痰飲。男子消渴，小便反多，以飲一斗，小便一

斗。消渴婦人病，飲食如故，煩熱不能卧，而反倚

息者，何也？此名轉胞，不得溺也。以胞系了戾，故

致此病。但利小便則愈。婦人雜病

括蔞瞿麥丸 七

括蔞根 二兩

茯苓 三兩

薯蕷 三兩

附子 一枚

瞿麥 一兩

右五味末之，煉蜜丸。梧子大，飲服三丸，日三服。不知，增至七八丸，以小便利，腹中溫為知。小便不利者，有水氣，其人苦渴。消渴

薯蕷丸 八

薯蕷 三分

當歸

桂枝

乾地黄

麴

豆黃卷 各十分

甘草 二分

芎藭

麥門冬

芍藥

白朮

杏仁 各六兩

傷寒雜症類方

雜法方

學川堂藏板

傷寒雜病類方

學川堂藏板

人蔘 七分

芫胡

桔梗

茯苓 各五分

阿膠 七分

乾薑 三分

白斂 二分

防風 六分

大棗 百枚
為膏

右二十一味末之煉蜜和丸如彈子大空腹酒服一丸一百丸為劑

虛勞諸不足風氣百疾虛勞

橘皮湯九

橘皮 四兩

生薑 半斤

右二味以水七升煮取三升溫服一升下咽

即愈

乾嘔噦若手足厥噦

橘皮竹茹湯十

橘皮 二升

竹茹 二升

大棗 三十枚

生薑 半斤

甘草 五兩

人蔘 一兩

右六味以水一斗煮取三升溫服一升日三服

噦逆噦

橘皮枳實生薑湯十一

傷寒雜病類方

雜法方

原

學川堂藏板

竹葉石膏湯

橘皮 一斤

枳實 三兩

生薑 半斤

右三味以水五升煮取二升分溫再服

胸痺胸中氣塞短氣胸痺

木防己湯 十二

木防己 三兩

石膏

十二枚

桂枝 二兩

人蔘 四兩

右四味以水六升煮取二升分溫再服

木防己去石膏加茯苓芒消湯 十三

木防己 二兩

桂枝 二兩

人蔘 四兩

芒消 三合

茯苓 四兩

右五味以水六升煮取二升去滓內芒消再

微煎分溫再服微利則愈

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脉

沈緊得之數十日醫吐下之不愈木防己湯主

之虛者即愈實者三日復發復與不愈者宜木

防己去石膏加茯苓芒消湯主之 痰飲

防己黃耆湯 十四

防己 一兩

甘草

半兩

白朮

七錢

易經雜法方

雜法方

學

學川堂藏版

黃耆 一兩一分去蘆

右剉麻豆大每抄五錢匕生薑四片大棗一枚水盞半煎八分去滓溫服良久再服喘者加麻黃半兩胃中不和者加芍藥三分氣上衝者加桂枝三分下有陳寒者加細辛三分服後當如蟲行皮中從腰下如冰後坐被上又以一被繞腰下溫令微汗差

風濕脉浮身重汗出惡風 濕 風水脉浮身重汗出惡風腹痛者加芍藥 風水脉浮為在表其

人或頭汗出表無他病病者但下重從腰以上為和腰以下當腫及陰難以屈伸 水氣

防己茯苓湯 十五

防己 三兩

黃耆 三兩

桂枝 三兩

茯苓 六兩

甘草 二兩

右五味以水六升煮取二升分溫三服

皮水為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動 水氣

防己地黄湯 十六

易良佳病類方

雜法方

藥

學

訓

堂

反

傷寒雜病類方
學誦室藏版

防己 一分

桂枝 三分

防風 三分

甘草 一分

右四味以酒一盃浸之一宿絞取汁生地黃二斤咬咀蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黃汁和分再服

病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脉浮中風奔豚湯十七

甘草

芎藭

當歸 各二兩

半夏 四兩

黃芩 二兩

生葛 五兩

芍藥 二兩

生薑 四兩

甘李根白皮 一斤

右九味以水二斗煮取五升溫服一升日三夜一服

奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱奔豚氣

酸棗湯 十八

酸棗人 二升 甘草 一兩

知母 二兩

茯苓 二兩

芎藭 二兩深師有生薑二兩

右五味以水八升煮酸棗人得六升內諸藥煮取三升分溫三服

易經雜方

雜法方

學誦室藏版

虛勞虛煩不得眠虛勞

驚甲煎丸 十九

驚甲 十二分

烏扇 三分

黃芩 三分

芫胡 六分

鼠婦 三分

乾薑 三分

大黃 三分

芍藥 五分

桂枝 三分

葶藶 一分

石葦 三分

厚朴 三分

牡丹 五分

瞿麥 二分

紫威 三分

半夏 一分

人蔘 一分

麤蟲 五分

阿膠 三分

蜂窠 四分

赤消 十二分

蜚蠊 六分

桃人 二分

右二十三味為末取鍛竈下灰一斗清酒一斛五斗浸灰候酒盡一半著驚甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁內諸藥煎為丸如梧子大空心服七丸日三服

病瘡以月一日發當以十五日愈設不差當月盡解如其不差當云何此結為癥瘕名曰瘡母急治之瘡

蜀漆散 二十

雜法方

蜀漆洗去腥

雲母燒二日夜

龍骨等分

右三味杵為散未發前以漿水服半錢温瘧

加蜀漆半分臨發時服一錢匕瘧多寒者名曰牡瘧

皂莢丸 二十一

皂莢八兩刮去皮用酥炙

右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯服三九日三夜一服

欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠欬嗽

柏葉湯 二十二

柏葉

乾薑各三兩

艾三把

右三味以水五升取馬通汁一升合煮取一升分温再服

吐血不止吐血衄

黃土湯 二十三

甘草

乾地黄

白朮

附子炮

阿膠

黃芩各三兩

竈中黃土半斤

右七味以水八升煮取三升分温二服
下血先便後血此遠血也亦主吐血衄血吐血
赤小豆當歸散 二十四

赤小豆 三升浸令芽出曝乾 當歸 十兩

右二味杵為散漿水服方寸匕日三服

病者脉數無熱微煩默默但欲卧汗出初得之
三四日目赤如鳩眼七八日目四眦黑若能食
者膿已成也狐惑 下血先血後便此近血也下血
括萋薤白白酒湯 二十五

括萋實 一枚 薤白 半升 白酒 七升

右三味同煮取二升分温再服

胸痺之病喘息欬唾胸背痛短氣寸口脉沈而
遲關上小緊數 胸痺

括萋薤白半夏湯 二十六

括萋實 一枚 薤白 三兩 半夏 半升

白酒 一斗

右四味同煮取四升温服一升日三服

胸痺不得卧心痛徹背 胸痺

積實薤白桂枝湯 二十七

枳實 四枚

厚朴 四兩

薤白 半斤

桂枝 一兩

括蕒實 一枚

右五味以水五升先煮枳實厚朴取二升去滓內諸藥煮數沸分溫三服

胸痺心中痞氣氣結在胸胸滿脇下逆搶心胸痺

括蕒牡蠣散 二十八

括蕒根

牡蠣熬等分

右為細末飲服方寸匕日三服

百合病渴不差百合病

百合知母湯 二十九

百合 七枚

知母 三兩

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎知母取一升去滓後合和煎取一升五合分溫再服

百合病發汗後者

百合代赭湯 三十

傷寒雜病類方

雜法方

卷

學川堂藏反

傷寒雜病類方

百合七枚

碎綿裹

滑石三兩碎綿裹

代赭石如彈丸大一枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水
更以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二
升煎滑石代赭取一升去滓後合和重煎取
一升五合分溫服

百合病下之後者

百合雞子湯三十一

百合七枚

雞子黃一枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水
更以泉水二升煎取一升去滓內雞子黃攪
勻煎五分溫服

百合病吐之後者

百合地黃湯三十二

百合七枚

生地黃汁一升

右以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更
以泉水二升煎取一升去滓內地黃汁煎取
一升五合分溫再服中病勿更服大便當如

傷寒雜病類方

雜法方

觀

學川堂藏板

漆

百合病不經吐下發汗病形如初者

百合滑石散 三十三

百合 一兩 滑石 三兩

右為散飲服方寸匕日三服當微利者止服熱則除

百合病變發熱者 以上百合病

薏苡附子散 三十四

薏苡人 十五兩 大附子 十枚

右二味杵為散服方寸匕日三服

胸痺緩急者 胸痺

薏苡附子敗醬散 三十五

薏苡人 十分 附子 二分 敗醬 五分

右三味杵為末取方寸匕以水二升煎減半頓服小便當下

腸癰之為病其身甲錯腹皮急按之濡如腫狀

腹無積聚身無熱脈數此為腸內有癰膿 腸癰

葶藶湯 三十六

傷寒雜病類方

學誦堂藏板

葦莖 二升

薏苡人 半升 桃人 五十枚

瓜瓣 半升

右四味以水一斗先煮葦莖得五升去滓內諸藥煮取二升服一升再服當吐如膿

欬有微熱煩滿胸中甲錯是為肺癰肺癰引千金

白頭翁湯 三十七

白頭翁 二兩

黃蘗 三兩

黃連 三兩

秦皮 三兩

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升

不愈更服一升

熱利下重厥陰

白頭翁加甘草阿膠湯 三十八

白頭翁

甘草

阿膠 各二兩

秦皮

黃連

藥皮 各三兩

右六味以水七升煮取二升半內膠令消盡分溫三服

產後下利虛極婦人產後

紫薑湯 三十九

易經雜病類方

雜法方

專

學誦堂藏板

傷寒雜症類方

紫葢 半斤 甘草 三兩

右二味以水五升先煮紫葢取二升內甘草煮取一升半分溫三服

下利肺痛 下利

訶梨勒散 四十

訶梨勒 十枚

右一味為散粥飲和頓服

氣利 下利

長服訶梨勒丸 四十一

訶梨勒 煨 陳皮 厚朴 各三兩

右三味末之鍊蜜丸如梧子大酒飲服二十丸加至三十九 雜療

侯氏黑散 四十二

菊花 四分 白朮 十分 細辛 三分

茯苓 三分 牡蠣 三分 桔梗 八分

防風 十分 人蔘 三分 礬石 三分

黃芩 五分 當歸 三分 乾薑 三分

芎藭 三分 桂枝 三分

傷寒雜症類方 雜法方 學川堂藏版

右十四味杵為散酒服方寸匕日一服初服
二十日溫酒調服禁一切魚肉大蒜常宜冷
食六十日止即藥積在腹中不下也熱食即
下矣冷食自能助藥力
大風四肢煩重心中惡寒不足中風
風引湯四十三

大黃

乾薑

龍骨各四兩

桂枝三兩

甘草

牡蠣各二兩

寒水石

滑石

赤石脂

白石脂

紫石英

石膏各六兩

右十二味杵麤篩以韋囊盛之取三指撮并
花水三升煮三沸溫服一升

除熱癰痼大人風引少小驚癇瘈瘲日數十

發醫所不療除熱中風脚氣同上引巢氏

紫石寒食散四十四

紫石英

白石英

赤石脂

鍾乳研鍊

括蕒根

防風

桔梗

文蛤

鬼臼各十分

太一餘糧十分乾薑

附子炮去皮

桂枝去皮各四分

右十三味杵為散酒服方寸匕

治傷寒令愈不復雜療

白木散四十五

白木

芎藭

蜀椒三分去汗

牡蠣

右四味杵為散酒服一錢匕日三服夜一服

但苦痛加芍藥心下毒痛倍加芎藭心煩吐

痛不能食飲加細辛一兩半夏大者二十枚服之後更以醋漿水服之若嘔以醋漿水服之復不解者小麥汁服之已後渴者大麥粥服之病雖愈服之勿置

妊娠養胎婦人妊娠

猪膚湯四十六

猪膚一升

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和令相得温分六服

少陰病下利咽痛胃滿心煩少陰
王不留行散 四十七

王不留行

十分八月八日採

蒴藿細葉

十分七月七日採

桑東南根

白皮十分三月三日採

甘草

十八分

川椒

三分除目及閉口去汗

黃芩

二分 乾薑 二分

芍藥

二分 厚朴 二分

右九味桑根白皮以上三味燒灰存性勿令
灰過各別杵篩合治之為散服方寸匕小瘡
即粉之大瘡但服之產後亦可服

病金瘡 瘡癰

枳實芍藥散 四十八

枳實

燒令黑勿大過

芍藥 等分

右二味杵為散服方寸匕日三服并主癰腫
以麥粥下之

產後腹痛煩滿不得臥 婦人產後

排膿散 四十九

枳實

十六枚

芍藥 六分

桔梗 二分

右三味杵為散取雞子黃一枚以藥散與雞

黃相等揉和令相得飲和服之日一服瘡癰

紅藍花酒 五十

紅藍花 一兩

右一味以酒一大升煎減半頓服一半未止再服

婦人六十二種風及腹中血氣刺痛婦人雜病

大附子一枚 鹽等分

右二味為散沐了以方寸匕已摩痰上令藥

力行中風

豬膏髮煎 五十二

豬膏半斤 亂髮如雞子大三枚

右二味和膏中煎之髮消藥成分再服病從小便出

諸黃黃疸 胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也膏髮煎導之婦人雜病

百合洗方 五十三

右以百合一升以水一斗漬之一宿以洗身

洗已食者餅勿以鹽豉也。

百合病一月不解變成渴。百合病

雄黃熏方 五十四

雄黃

右一味為末筒瓦二枚合之燒向肛熏之。

狐惑病蝕於肛。狐惑

苦葶湯 方闕 五十五

蝕於下部則咽乾苦葶湯洗之。同上

杏子湯 方闕 ○見麻附甘草湯 ○五十六

礬石湯 五十七

礬石 二兩

右一味以漿水一斗五升煎三五沸浸脚良。

脚氣冲心。中風 救卒死而壯熱者。礬石半斤以水一斗半煮

消以漬脚令沒踝 ○雜療

黃連粉 方未見 ○ 五十八

浸淫瘡 瘡癰

礬石丸 五十九

礬石 三分 燒 杏人 一分

右二味末之煉蜜和丸棗核大內藏中劇者再內之

婦人經水閉不利藏堅癖不止中有乾血下白物婦人雜病

消石礬石散六十

消石

礬石燒等分

右二味為散以大麥粥汁和服方寸匕日三服病隨大小便去小便正黃大便正黑是候也

黃家日晡所發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時澹此女勞之病非水也腹滿者難治黃疸

蛇床子散六十一

蛇床子人

右一味末之以白粉少許和令相得如棗大綿裹內之自然溫

溫陰中坐藥婦人雜病

狼牙湯 六十二

狼牙 三兩

右一味以水四升煮取半升以綿纏筋如繭浸湯溼陰中日四遍

少陰脉滑而數者陰中即生瘡陰中蝕瘡爛者婦人雜病

小兒疳蟲蝕齒方 六十三

雄黃

葶藶

右二味末之取臘日猪脂鎔以槐枝綿裹頭

四五枚點藥烙之婦人雜病

升麻鱉甲湯 六十四

升麻 二兩

當歸 一兩

蜀椒 炒去汗

甘草 二兩

雄黃 半兩 研

鱉甲 手指大一片炙

右六味以水四升煮取一升頓服之老小再服取汗

陽毒之為病面赤斑斑如錦文咽喉痛唾膿血五日可治七日不可治陰陽毒

升麻鱉甲湯去雄黃蜀椒

陰毒之為病。面目青。身痛如被杖。咽喉痛。五日可治。七日不可治。同上

獺肝散 六十五

獺肝一具。炙乾末之。水服方寸匕。日三服。

冷勞。又主鬼疰。一門相染。虛勞引

藜蘆甘草湯 未見

六十六

病人常以手指臂腫動。此人身體潤潤。跌蹶

雞屎白散 六十七

雞屎白

右一味為散。取方寸匕。以水六合。和溫服。轉筋之為病。其人臂脚直。脉上下行。微弦。轉筋入腹。轉筋

蜘蛛散 六十八

蜘蛛 十四枚 熬焦 桂枝 半兩

右二味為散。取八分一匕。飲和服。日再服。蜜丸亦可。

陰狐疝氣者。偏有小大。時時上下。陰狐疝

旋覆花湯 六十九

旋覆花

三兩

葱

十四莖

新絳

少許

右三味以水三升煮取一升頓服之。

寸口脉弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏此名曰革婦人則半產漏

下婦人雜病

救卒死客忤死方 七十

葦根 一把

烏梅 二七筒

吳茱萸

半升炒

右三味以水一斗煮之以病人櫛內中三沸櫛浮者生沈者死者煮取三升去滓分飲之。

雜療

燒禪散

七十一

婦人中禪近隱處取燒作灰。

右一味水服方寸匕日三服小使即利陰頭

微腫此為愈矣婦人病取男子禪燒服。

傷寒陰陽易之為病其人身體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急。陰陽易

傷寒雜病類方

專

學
言
堂
癘
別

傷寒雜病類方

弟子

信濃柏原公均校對

傷寒雜病類方後序

班史所錄經方之書散佚弗傳古之遺
方可徵于今者唯張長沙之經而已清
徐大椿嘗類集其方名曰傷寒類方而
我邦吉益東洞亦著類聚方其書出
于一轍而彼此年代相適可謂奇矣爾

傷寒雜病類方

後序

一

學川堂藏反

後豪杰輩出。迭相唱和。如尤在涇諸子。亦與大椿相拮抗。皆唱古方。長沙之經。煥然復顯于世矣。蓋鑿道之興廢。與氣運相應。而其顯晦通塞。有不偶然者也。昔者孔子刪詩書。定禮樂。贊周易。修春秋。弟子三千。通六藝者七十二人。可謂

盛矣。而老莊之言。出於其時。東漢立辟雍。養三老。臨白帟。論五經。大學諸生。至三萬人。而馬鄭賈服之徒。皆明經術。其盛如此。而佛氏之教。行於其古。嗚呼。異端之說。聖賢弗能禁之。况於我醫之道乎。方今圭運大闢。名師指匠。世不乏其

人而侏離馱舌之流。橫行海內。極其譎
詭。然吾道之卓然。不可泯滅者。自存於
其中焉。則何必喋々與之詆詰哉。栲窗
喜多邨先生研古之餘。有傷寒雜病類
方之著。蓋繼徐吉二子書。而集成之者。
其傳播寰宇。而嘉惠後學。固弗淺鮮也。

嘗聞白氏有長慶集。元氏亦著長慶集。
韓氏有鑿通。張氏又著醫通。而後古並
稱不置。即此書殆亦可謂其類焉。惟常
辱先生之知。有年于茲矣。平生服其才
學絕特。挽頽波以回鑿流。今又讀此書。
喜經方之益顯于世。而異端之徒。有可

修集雜類卷之六 行 三 學 訪 生 履 册

自省也。遂忘固陋。敢題數語於卷末。以寓欽仰之意云。

嘉永五季歲次壬子季夏日

信濃 淺田惟常謹誌



江戸 成齋清熙書

邨嘉平刻



