外科正宗

二

十貳
238
2

腦疽
鬢疽 五十六
肺癌 九十
疔瘡 十七
咽喉 六十三
脫疽 廿九
時毒 七十三
瘰癧 三十九
癭瘤 八十

中醫門 258 卷 2

新刊外科正宗卷之二

崇川陳實功毓仁父纂著

腦疽論第十六

夫腦疽者係稱對口是也但所發不同其源有二得於濕熱交蒸從外感受者輕五臟鬱結從內發外者重其理何也濕熱之為病天行氣候寒暑不調節序溫涼陰陽失度凡有體虛者易於侵襲項後雖屬督脉又主太陽寒氷司行之道所有侵襲氣血必凝凝則後必為腫此從外感受者其患初起有頭多生正穴三四日間多作瘡痛始生寒熱口和而乾色紅根活瘡勢漸高形不散

大時止時疼易膿易腐飲食知味起坐尋常外勢雖可
畏而內無北惡之症其由從外來矣故
多不治可愈所有五蓋心
主血故心緒煩擾動不寧以致火旺而沸騰行於項
間與寒水交滯而為腫者也肝統筋故惱怒傷肝項
乃三陽統筋之所傷則血脉不潮筋無榮養凝結為
腫故項緊急強痛不能轉側其患未潰前肉色紫暗堅
硬漫腫破流血水疼痛無膿此等之症皆肝氣受傷者
二也脾主肌肉故思慮傷脾脾氣日損又或膏粱損胃
胃汁乾枯以致中脘塞氣不運行遊於肉裏乃生瘡

腫其患外皮雖腐而內堅不潰口燥舌乾飲食不進根
脚走散膿穢色敗此等之症皆脾氣受傷者三也肺主
皮毛故憂鬱傷肺則毛竅閉塞腠理不通氣不
暢縱橫經絡結而為腫其形瘦多平陷色淡不華皮痿
脂流形如湯潑氣虛短促鼻鼽鼻掀鼻煤生瘡殷殷發
歛此等之症皆肺氣受傷者四也腎主骨髓故悉慾傷
腎腎傷則真陰之氣敗矣真陰一敗相火自生此火最
能自升自降或動或靜煎熬臟腑消爍津液更變形容
改換聲音蒼黑形紫黑度頰燥口乾隨飲隨渴此
等之症皆腎氣受傷者五也凡治此症必內分虛實外

辨陰陽體順天時察其病理七日以前瘍勢未成者當
通竅以汗發之七日已後瘍勢已成治當兼補以托之
此則毒不內攻必無變症如藥攻利太過元氣受傷毒
多難出又敷圍涼藥氣益冰凝則肌肉多死反難腐潰
宜治此及諸發背初起未成者用披針當頂點入知
痛處出其惡血通其瘡竅隨揀蝟酥條直至瘡底外用
膏蓋內服萬靈丹或蝟酥丸蔡其太汗解散內蘊之毒
次日患止或腫或痛或不腫或痛仍揀直至患
頂腫高根腳突起四圍列縫有膿方住揀藥輕淺者九
日後吐出病根堅硬不化之物毒甚者不能頓然脫落

亦可漸漸成膿為轉重就輕之良法外用玉紅膏長發
內服補托收斂其患不久自愈如陽症輕淺者候自腐
潰不用前法針刺如不腫不疼灸亦不痛陰症尤當速
用不必遲延此為移深居淺之大法也

腸癰看法

初起頂高根活色紅皮薄作疼熬腫不開散者順已成
無論偏正瘡形獻起疼痛發熟易腐易膿者順已潰膿稠
肉色紅活瘀腐易脫熬腫漸消痛減者順潰後腐脫新肉
便生瘡口漸斂凝結痂膿作痒者順初生一點黃泡或似
疣疼不腫不疼自不知覺者逆已成不發高腫亦不熬痛

蒼頂軟陷根脚平散者逆已潰膿清肉色紫黑外皮不腐內生臭穢不食者逆腐肉雖盡新肉不生蒼白散大軟陷無神色敗者逆

腦疽治法

初起有頭或無頭太痛或不痛俱隔蒜灸兼服解毒已成堅硬發熱煩痛口乾便秘者邪在內也宜泄之堅腫本痛發熱惡寒頭疼四肢拘急者兼發表攻裏腫硬日深形色紫黑外皮不腐內膿不潰宜行拔法腫強頭面煩熱口燥惡心嘔吐者邪在上也宜清之煩熱腫痛紅色光亮疼苦有時肉膿脹痛者急開之將潰不潰微熱微紅不作腐清者脾胃虛也宜補之潰後腐肉不脫膿水清稀腫痛仍作者當大養氣血大便多溏小便短澁自汗食少脉細身凉溫中健脾

腦疽治驗

一男人項疽十餘日視其蒼勢頗甚根連左右耳項並腫紅赤煩熱脉浮而數先用黃連消毒散一服退其太勢根脚稍定後用托裏消毒散數服不覺腐潰但脉浮無力詢知患者年過五旬久艱嗣息房中又有妾人多兼思慮勞慾太過損傷元氣故也又蒼形勢大止能起發不能培養爲膿更用十全大補湯加桔梗白芷倍人

參白朮各三錢外用桑木灸法早晚二次灸之又塗紫
霞膏數日患者頭面俱腫雙目合縫形狀可畏然後膿
潰並作膿出日至數升如此半月因前藥不勝其事內
加煩燥不寧五心煩熱飲食漸少等症此謂膿水出多
氣血走泄爲虛火假症之故雖變不妨隨用聖愈湯一
服不應又進二服加熟附子二錢方應前症悉退次以
人參養榮湯加麥冬五味參朮常倍至三錢調理月餘
後至腦骨腐肉連髮片脫下其狀狼狽不可觀瞻凡
相視者無不驚頭驚訝又恐腐潰深矢補不及事每日
粥食中用人參三錢凡食分入同煮食之以接補脾元

後方元氣漸醒調理四月方愈彼後一年反生其手以
承後祀也

一監生項疽初起請視疽頭偏於右半不可輕待必用艾
灸爲上隔蒜灸至二十五壯知痛乃住後彼視爲小恙失
用內藥又四日其疽復作頸腫項強紅紫木痛便秘脈
實有力以內疎黃連湯加玄明粉二錢通其大便次用
消毒救苦湯二服腫勢仍甚此內毒外發也不可再消
之換服托裏消毒散至近二十日因患者肥甚外肉多
緊不作腐潰予欲行針開放彼家堅執強阻豈後變症
一出煩悶昏憒人事不醒彼方驚悔隨用披針左右開

邊併頂之中各開二竅內有膿腐處剪割寸許頂內放出肉積淤毒膿血不止碗許內服健脾胃養氣血托膿補虛之藥其膿似泉流不歇每朝夕藥與食中其參六七錢服至腐肉脫盡新肉已生又至四十日外患者方得漸甦始知人事問其前由逕不知其故也此患設若禁用針刀不加峻補豈有生乎因其子在座見識道理從信予言未百日而愈也

一男子項瘡五六日就肆看視頭梗黃色根亦平散予曰此當急治方可彼面色不悅而去又請里中一醫視之乃曰小恙也因喜其說用藥又至五日外其瘡勢堅梗根腳開大毒氣已過兩肩流注前項胸乳皆腫嘔吐惡心寒熱不食瘡勢形色俱覺可畏始信前言復請予治其瘡形狀不可觀也此非藥力可及先用葱艾湯洗淨舊藥連煮藥筒拔提二處拔出淤血碗餘隨用銀針斜挿入根腳透通患底數處以蟾酥條挿入孔內此最解毒為膿總以膏蓋走散處以真君妙貼散敷之旧漸旧消其毒收歸後項原處又兼服內托降火化痰之藥三四日候其大勢已退內膿已通換服十全大補湯凡堅而不化者照之腐而不痛者取之新血生遲者培之如此調理將近三月方得完口平復此為患者諱疾忌

醫之過幾乎至於喪命者多矣

一女人年過六旬係宦族素禀佐弱項間患疽初起頭便如粟謂裏可容谷之病也喜其形體不肥雖發之後必易於腐潰此則不妨前說先用隔蒜灸之次用蟾酥餅貼灸上四邊以吸毒散敷之收其根脚不散內服托裏消毒散數服瘡勢堅硬疼苦不止予曰到其日方止況今瘡不腐潰膧其脉細數而無力此內虛之故不能解毒爲膿以疼爲要豈可得止次換益氣養榮湯加角針白芷三服腫亦漸起外用桑木灸法其堅漸軟膿出稠而不多前方去角針白芷加香附倍用參芪又數服方得膿潰潰後痛亦不止予曰再二日午後痛可止也至期腐肉將脫小半晬午用乳香定痛散一服午後疼痛頓退安睡不醒患家欣悅予曰不然此在用藥適其時也雖半月之言應於今刻惟信則不失耳後當其日腐盡其日肌平其日完口此三者患家以墨繩記候期自果實並無過與不及也此法要在眼力精巧量病難易新腐遲速補助有無用藥合式然後相量日數可決於前發之必中也

一婦壯年項瘡三日其形徑對前口彼家相畏人胖不當瘡發此穴也予視項高脚活雖發不妨彼欲內消之方

妥予曰藥消則不能針消則可取彼從之用披針當頂針入六七分黙至軟肉方住隨去淤血又以蟾酥條揷入孔内服蟾酥丸得大汗而解次日瘡上微膿出之漸消尤恐内毒未盡又用消毒清熱之藥數服不出十日而安大抵凡欲消瘡先斷根本次泄毒氣使毒自衰無得内攻爲妙

一男子耳後生疽十餘日自謂小恙不治將近半月根脚潮大瘡頭惟流血水稀惡汚穢四邊紫黑軟陷無膿面慘鼻掀手冷氣促脉脬散大無根此内敗症也何必治之辭不用藥又延客醫治之因詢無事患者恨予不治凡遇親友勉力支持應聲自囑決不甘死予曰心不服死也再五日必死果然予常觀瘡但犯此症雖山嶽之軀一敗無不傾倒

一婦人正對口四五日自灸念欲壯逕不知痛灸疤焦黑平塌如故脬之脉微數而無力此内虛症也若假藥力則候其事用披針當頂刺入寸許不知痛亦無血出此毒滯而未發揚者用蟾酥條揷入針孔每日一次膏蓋其上至七日後周圍裂縫出膿内服純補之藥至十四日落出瘡根一塊指大長寸餘後以玉紅膏平長肌肉又半月其口已平以珍珠散摻上即刻生皮而愈此症

設若不用針工專假藥力攻托雖不至死豈能得其速愈者哉

一婦人四旬肥甚項癰五六日視之肉腫癰不腫必竟生疑恐又兼口燥心煩堅硬色紫根腳散平六脉洪大此太過症也後必無膿相辭不治彼又請醫視之有言外托者又言內消者有稱年壯不妨又說脉大易治衆人紛紛不定仍各用藥又至七八日前後胃項俱腫木悶堅硬仍復請視決之予曰此不治者何也初起肉腫癰不腫頂陷者一也根腳平散真氣內敗不能收束毒氣二也口燥心煩邪火內淫三也形色紫暗血死毒滯不作膿潰者四也六脉洪大癰毒太盛正氣受剋無以抵當故癰終變軟陷邪毒內攻而死者五也當備後事爲要此終於二十七朝前後足矣後果至期而發觀此言正理順之病可喫時人何爲紛紛妄治也

腦疽主治方

黃連救苦湯　一柴芎歸翹梗芩

黃連救苦湯升麻　羌活防風銀共草　腦疽煎服可安寧

治腦疽發鬢發順及天行時毒初起增寒壯熱頭面耳項俱腫服之未成者即消已成者自潰

黃連　升麻　乾葛　柴胡
赤芍　川芎　歸尾　連翹
桔梗　黃芩　羌活　防風
金銀花　甘草節　各一錢
水二碗煎八分臨服入酒一杯食後服

解毒天漿散

解毒天漿石決明　姜爨山甲防風評
連翹羌活乳香遊　銀花歸尾大黃行

治腦疽積毒日深堅腫木硬口燥舌乾惡心煩渴大
脉沉實有力大便閉結不通者並宜服之

石決明生研　姜爨山甲炒　防風
連翹　羌活　乳香　甘草
金銀花　黃連　當歸尾各一大錢　大黃三錢
天花粉新鮮未晒者四兩　紅白肉搗爛投水一碗攪勻絞去渣用

右花粉淨汁一碗半同藥煎至八分入酒一杯空心
熱服行過三次方用飲食忌食煎炒發物

內托千金散

內托千金散方載　芎歸防桔桂花隨人參白朮蔞根草　痛加乳沒効堪推

治腦疽發背諸毒惡瘡已成不消者服之易潰

白芍　黃芪　川芎　當歸
防風　桔梗　天花粉　金銀
人參各一錢　肉桂　白芷　甘草各五分
乳香　沒藥二味痛甚加入

右水二碗煎八分臨服入酒一小杯食遠服

廻毒銀花散

廻毒銀花散最奇　癰疽陰毒總堪醫
借問君家何等藥　銀花甘草協黃芪

治腦疽及諸發陰瘡不起色變紫黑者急服之

金銀花連枝葉二兩　黃芪四兩生切　甘草一兩切

用細酒二十兩同藥入小白砂罐內密封重湯內煮盡二十香爲度取起濾清服之蓋瘡患上其瘡漸漸高腫此轉陰爲陽吉矣後用托藥潰膿如服後不痛不起痛頭流出黑水此眞陰不治

梅花五氣丹

梅花五氣丹輕粉　乳沒辰砂射片酥
還有粉霜雄血蚘　此方原自出仙都

治腦疽發背諸般疔腫初起寒熱交作筋骨疼痛有似傷風惡心嘔吐但未成膿者並宜服之

梅花片　當門麝各五分　輕粉一　辰砂各六分　乳香

没藥　瓜兒卵　明雄黃各一錢　真蟾酥 預於端午日前取酥二錢用頭男乳二調膏

右前藥各研極細對準分數於端午日辰時製度候至午時將上藥九味和入蟾酥膏內向日丸之如茄子大一時內晒乾用川椒二十七粒燈心二十七段同藥收於磁罐內養之以蠟封口不泄藥氣爲妙凡遇惡瘡大毒開罐取出一枚先用美饌食飽次用無根水漱淨口內再含水一口少頃待溫用葱白五寸同水嚼爛嚥下隨將藥餅安放舌下睡於暖處以被覆蓋藥化苦水徐徐嚥之瘡勢大者二三餅亦可藥盡其汗即到如淋諸病若失如冬月天寒難汗嚥後將葱白湯催之亦妙凡治無有不効如暗疔人所不知覺及知覺而失治者毒氣入裏人便昏沉一中便倒不能依法服藥急用蓮鬚葱白七箇煎湯一杯研藥五餅灌下藥氣到心其功如湯潑雪患者即便甦醒此爲外科第一奇方也

小保安湯

小保安湯歸耆苓　黃芪半夏麥冬陳

甘桔人參併白朮　棗姜煎服作陽春

治腦疽諸發已潰流膿時平常服之庶不更變

當歸　茯苓　川芎　黃芪　麥門冬　陳皮

桔梗　人參　半夏　甘草　白木各一錢　藿香各五分

薑三片棗二枚水二茶鍾煎八分食遠服

大保安湯

大保安湯木附歸　參苓芎芍桂山萸

黃芪山藥丹皮草　麥冬五味地黃隨

治腦項諸發癰疽惡瘡大毒已潰之後膿水出多氣血虛弱精神短少餘食少思坐臥不寧煩燥不眠晝則安靜夜則發熱及虛陽煩渴等症

白朮　當歸　人參　茯苓　川芎　白芍　山萸

黃芪　山藥　丹皮　熟地　五味子各一錢　肉桂

甘草　麥門冬　熟附子各五分

煨薑三片大棗二枚蓮肉七粒水煎食前後服

陽春酒

一盞陽春酒罕稀　天冬杞朮地黃隨

人參栢子歸遠志　百補方中讓此醫

治腦疽諸發已潰流膿腐盡時脾胃虛弱肌肉生遲或氣血原有不足致肉色淡白不能長發收斂宜服此酒生長肌肉強健脾胃美悅顏色滋潤皮膚凡大瘡後飲此不惟却病亦且延壽

人參切片　白朮　熟地各五錢　歸身切片　天門冬　栢子仁

枸杞各三錢　遠志各二錢

右上藥用絹袋寬貯以無灰好酒五斤磁罐內浸至三十伏時每早午晚各飲三一杯熱服如夏月天炎易壞不堪久服將藥分作五分每次用酒一斤隨便浸服亦効如酒將完藥尚有味再添酒浸飲之一次比後藥淡無味不必再浸用之

桑木灸法

治諸瘡毒堅而不潰潰而不腐新肉不生疼痛不止用新桑木長七寸劈指大十頭燃着向患上灸之火盡再換每次灸五六條肉腐爲度

神妙拔根方

治腦疽發背陰症初起不腫高不燃熱灸不疼其病來難果必致壞人十日以前用披針當頂揳入知痛處方止隨用蟾酥條揳至犯底每日二條膏蓋三日後加漆揷藥其根高腫作疼外用神燈照法助陰爲陽揳照七日其瘡裂縫流膿至廿三日其根自脫如日多根深帶固不能脫者披針取之內用玉紅膏不脫者自脫不欲者自飲此法百人百活再無不愈者

腦疽應用方

隔蒜灸法　拔筒法

琥珀蠟礬丸　太乙膏

灸焰疔

真君妙貼散　護心散　方俱見腫瘍門　蟾酥條俱見疔瘡門　人參養榮湯　聖愈湯　方俱見潰瘍門　蟾酥丸　乳香定痛散

疔瘡論第十七

夫疔瘡者乃外科迅速之病也有朝發夕死隨發隨死有三日五日而不死一月半月而終死此在於毒中之淺深臟腑之乘逆節候之寒溫肅殺之瞬息奇類尸忤性情激變暴戾一時死生立判人之氣血虛者各隨臟腑而中之且如毒氣發於心經者生爲火焰疔其患多生脣口手掌指節間其發初生一點紅黃小泡抓動痒痛非常左右肢體麻木重則寒熱交作頭暈眼花心煩發燥言語昏憒此等出於心經之病也毒氣發於肝經者生爲紫燕疔其患多生手足腰脇筋骨之間初生便作紫泡次日破流血水三日後串筋爛骨疼痛苦楚重則眼紅目昧指甲純青舌强神昏睡語驚惕此等出於肝經之病也毒氣發於腑經者生爲黃鼓疔其發初生黃泡光亮潤四邊紅色纏連其患初生口角腮頰眼胞上下及太陽正面之處發之便作麻痒綳急硬强重則惡心嘔吐肢體木痛寒熱交作煩渴乾嗽此等出於脾經者生爲白丌疔其發初生白

黑鷩疔

紅絲疔

泡頂硬根突破流腊水痒痛驟然易腐易陷重則腮損咽焦毛聳肌熱咳吐膿痰鼻掀氣急此等出於肺經之病也毒氣發於腎經者生爲黑靨疔其患多生耳竅胃腹腰腎偏僻軟肉之間其發初生黑斑紫泡毒串皮膚漸攻肌肉頑硬如疔痛徹骨髓重則手足青紫驚悸沉困軟陷犯深目睛透露此等出於腎經之病也以上五疔相應五臟又紅絲疔起於手掌節間初起形似小瘡漸發紅絲上攻手臂令人多作寒熱甚則惡心嘔吐遲者紅絲至心常能壞人用針於紅絲盡處挑斷出血至初起痛上挑破俱用蟾酥條捲入膏蓋內服汗藥散

之自愈凡治此症貴在乎早初起即治者十全十活稍遲者十全五六失治者十全二三初起項以上者三陽受毒必用披針刺入瘡心四五分挑斷疔根令出惡血隨用回疔丹或蟾酥條捲入孔內膏蓋之如項之以下者三陰受毒即當艾灸灸之不痛亦須針刺捲藥方效隨後俱用蟾酥丸冬月萬靈丹發其太汗毒方得解庶不稽留毒氣致生變症今人治法不論陰陽表裏部位上下凡見是瘡便加艾灸殊不知頭乃諸陽之首凡陽熱極所致其形雖小其惡甚大再加艾灸火盛其勢逼毒內攻反爲倒陷走黃之症作矣既作之後頭面耳項

俱能發腫形如戶胖七惡頓起治雖有法百中難保三
二外又有疔名數種形狀紛紛故有舊說未及重錄也

疔瘡看法

初起如疥形如粉刺或小泡或疙瘩結腫不散者順瘡也
不作寒熱亦不惡心飲食有味手足温煖者順形已成瘡
腫肉不腫四圍白色多痛少痒作膿者順已潰出膿瘡仍
高腫肉色鮮明根內紅活漸平者順初起似疔非疔軟慢
灰色四邊瘡根平塌漫腫者凶未發前先作寒熱如瘧惡
心不食後出瘡如蚊跡蚤斑或青紫黑泡軟陷無根腐爛
深乳氣露足冷者逆瘡形似魚鱗頂凹灰白軟慢相兼脈

細身冷者多逆已成肉腫瘡不腫根脚走散瘡頂空腐血
水氣穢死凡疔項之以上針刺不疼項之以下灸之不痛
俱死已經走散頭面耳項俱腫煩燥脈細疼動喘急者死
日次原瘡無跡走散之處仍復作膿脈數屑焦終死病雖
險惡歲運順者可活瘡雖微險歲運逆者常危

疔瘡治法

初生項之以上者必先針刺以去惡血毒焰不攻內初發
項之以下者必先艾灸以殺其勢焰不侵良肉發熱惡寒
身體拘急六脈緊數邪在表也宜汗散之身體發熱口燥
咽乾脈實有力一便秘澁者宜下之針刺之後瘡不作膿

邊腫不消仍加揑藥內亦補托初起快炙致毒走黃不住者急當隨走處砭去惡血發熱乾嘔心煩作渴悶亂神昏解毒清心托裏護膜潰後氣血受傷神怯食少睡臥不寧助脾胃斂神氣將愈後氣血漸復飲食當進仍作渴者急滋養腎水

疔瘡治驗

一監生右顴下生疔三日形如漁目詢問起居但云麻痒不常此卽肺經受毒之症也用針刺入四五分其硬如骨有聲隨用蟾酥條揑至三日猶不腐化此堅頑結毒之病也此藥力不及其事換用三品一條錦揑至七日

外用糊紙封蓋至十一日脫出疔根一塊約有指許孔長肉玉紅膏漸堆漸長先服托裏消毒散加金銀花土錢白芷五分脫後用八珍湯加天花粉麥門冬黃芪陳皮各一錢調理月餘候瘡生肉已平用珍珠散搽上結痂而愈

一監生中年妻喪繼娶幼室乃嬌態人也自服補腎助陽之藥以致腎水受傷不能上制心火左顴發生一泡先紫後黑麻木不知痛痒凡黑者腎經之毒也其毒豈淺且喜瘡之四邊尚未走散此猶可取隨用針刺疔上量別藥不濟其事用氷蛳散厚糊作條揑入患孔用糊紙

寄封勿令泄氣朝服加減八味丸以滋腎水午服益氣養榮湯接補真氣以滋不足晚用琥珀蠐螬丸護心解毒候至十一日外疔根與藥結成一塊依期脫落次用生肌斂口補助調理脾胃之劑二十日而愈後因此公不慎調理失於保節幾及三年復成虛損勞瘵而歿

一頌人年近四旬未主不利愁鬱種種抱懷不散時值季夏歲荒之極腮發一疔大如後方延予視其時疔毒已經走散頭自眉項俱腫形色紫赤予曰肉腫瘡不腫乃疔毒走黃不治之症彼婦流淚嘆曰一家皆絕也予問曰何其如此婦又曰吾夫乃不肖之人婦有一女二子俱未適配設若婦死寄托於夫予女曰後必爲流蕩輩也故婦在一家生婦逝一家敗自然之理予時聞之洋洋不已知此何以得生不恐甚治況此瘡勢大又非藥力可回思之當先僱一貧人以飯養飽再飲火酒數杯隨用針刺腫上十餘處令彼嘴吸惡血數碗將溫湯洗淨用蟾酥錠磨濃塗之四圍敷金黃散早晚二次內以護心散飄搽先清心護裏兼服降火化痰開鬱安神之藥調治庶保不變吸血之後餘腫稍退又至六日大又對言何其不死彼婦相聞甚苦暴怒之極仍又復腫比前尤甚也復用針刺腫甚上約十餘處出血三四碗針

孔上小膏盖貼餘腫仍敷其人出血多而其内必虚以人參養榮湯加香附貝母服數日後針口漸膿餘腫漸消原瘡處復得高腫仍用蟾酥條揑化亦漸腐潰外用生肌斂口内服開鬱和中養血健脾等劑調理百日外方愈此病設若相論瘡勢形色者百無一生之理此功出於强勉行之亦得其生者此婦愈後二子一女俱以婚配其夫亦守其終見今已六旬半矣

一頰人二十二歲右耳垂向前二寸生疔二日請予視之形有豆大頂陷灰色此肺經感毒發爲白疔也又聆其根脚綿軟毒不結聚爲陷伏陰症也未及針刺伊舅曰何恙也予直告曰疔瘡症彼聽爺笑不信是言也予因辭不用藥隨其信否彼復請客醫治之視曰風熱瘡乃小恙也彼家告以某醫曾曰是疔瘡醫者默頭而笑曰此真胡說患家喜悅天下事大相懸絕醫用消風散藥二服毒氣全收隨發昏憒喘急而卽死後里中人詢問何速之甚彼初時因不信予言自候其死真可惜也

一年少頰顴下生疔疼痛作痒予欲針之彼家不信醫後自炙次日四邊漸腫瘡漸軟陷又三日頭面大腫復請治之予觀原瘡久上已結黑層乾陷無膿此毒氣内陷

外肉已死又面目浮腫光亮發熱形狀不堪此正氣衰而邪氣實也雖治亦不効後必終死彼家方悔自恨之說後延半月果然歸寂

疔瘡主治方

蟾酥丸

蟾酥丸効獨稱雄　乳沒砂礬輕粉同

銅綠蟾酥寒水麝　蜈蚣

治疔瘡發背腦疽乳癰附骨臀腿等疽一切惡症反瘡不痛或麻木或嘔吐病重者必多昏憒此藥服之不起發者即發不痛者即痛痛甚者即止昏憒者即甦嘔吐者即解未成者即消已成者即潰潰有回生之功乃惡症中至寶丹也

蟾酥二錢　乳沒各五分
酒化輕粉

乳香　沒藥　枯礬　寒水石煅　銅綠

蜈蚣二十一箇　硃砂三錢　膽礬　麝香各一錢　雄黃二錢

以上各爲末稱準於端午日午時在淨室中先將蜈蚣研爛再同蟾酥和研稠粘方入各藥共搗極勻先如棗豆大每服三九用葱白五寸患者自嚼爛吐於男左女右手心包藥在內用無灰熱酒一茶鍾送下被蓋如人行五六里出汗爲効甚者再進一服俟各時辰婦人雞犬

等忌見

黃連解毒湯

黃連解毒湯黃柏　山梔甘草共連翹

內熱口乾煩燥甚更加牛子寂然消

治疔毒入心內熱口乾煩悶恍惚脈實者宜用

黃連　黃芩　牛蒡子各等分　黃柏　山梔　連翹

甘草

水二鍾燈心二十根煎八分不拘時服

立馬回疔丹

立馬回疔丹輕粉　蟾酥蚣射白丁香

雄乳硃砂金頂等　化疔如雪去投湯

治疔瘡初起已用鍼刺後又或誤灸失治以致邪毒走

散不住乃疔走黃險惡症也急用此插

蟾酥　酒化　硃砂　輕粉　白丁香各一錢　雄黃

蚣一條炙　硃砂　乳香六分　麝香一字　金頂此

五分共

末卷

共爲細末糊成麥子大凡遇疔瘡針破用此一粒插入

孔內膏蓋之次後追出膿血疔根爲効

疔毒復生湯

疔毒復生湯住蠲

山梔乳沒骨連翹

花粉銀花黃皂刺　木通牛子不相饒
治疔毒走黃頭面發腫毒攻煩悶欲死者
牡蠣　山梔
牛蒡子　乳香
大黃　地骨皮各八分
沒藥　角刺　花粉
水酒各一茶鍾煎二半食遠服不能飲者水煎節服入
酒一杯和服亦効脈實便秘者加朴硝
七星劍
疔瘡最怕七星劍　野菊蒼耳希薟半
麻黃地丁紫河車　斬斷諸疔及人面

治十三種疔瘡初起增寒作熱惡心嘔吐腹體麻木痒痛非常心煩作燥甚者皆憒急宜服之
野菊　蒼耳頭　希薟草　半枝連　地丁香各二錢
麻黃一錢　紫河車二錢
用好酒一斤煎至一碗濾清熱服被蓋出汗為度冬月無鮮草宜預採陰乾臨時煎服之亦効

鉛粉散
鉛粉散治冷疔瘡　麝香松脂及黃丹
輕粉黑鉛為黑粉　諸般陰爛可用陽
治冷疔生於腳上初起紫白泡疼痛徹骨漸至腐爛深

孔紫黑色水氣殘經久不癒用此大効
黑鉛 四兩鐵粉化開傾入水中取起再化如前盡駕度攙水澄下者三錢 松脂
黃丹 飛炒五分 輕粉五分 麝香一分
共研先用葱湯洗淨麻油調塗瘡口油紙蓋札
化疔內消散
化疔內消散山甲 知母 天花粉半夏
甘草 白芨 紫河車 皂角鋏花赤芍藥
治疔瘡初起或已針已灸之後服之能令內消
皂角刺 金銀花 貝母 天花粉
穿山甲 白芨 乳香 赤芍 半夏

甘草 紫河車各一錢 水酒各一茶鍾煎半量病上下食前後服之
東毒金箍散
東毒金箍散大黃 白蘞白芨白芷當
黃柏 鬱金輕粉 敷圍諸毒不開張
治疔瘡針刺之後餘毒走散作腫宜此藥箍之
鬱金 瞥肚者 白芨 白蘞 白芷 大黃各四
黃柏二兩 輕粉五錢 菉豆粉一兩
共為細末醋米漿調箍四邊熱甚者蜜水調
解毒大青湯

解毒大青湯石膏　玄參知母麥冬各錢
麻梔木桔燒人糞　加上人中黃更高
治疔瘡悞吃逼毒入裏致生頑燥諸證不定者
玄參　桔梗　大青葉　升麻
大黃便秘加　燒人糞悶亂加　知母　人中黃　麥門冬　木通各一錢
水二茶鍾淡竹葉燈心各二十件食遠服

消疔簡便方

消疔簡便方容易　葱白原來共白礬
每服三錢溫酒下　如湯潑雪勝靈丹

治疔瘡及諸惡毒初起但未成膿者服之即効

白礬末三錢
葱白七莖
右二味同搗極爛分作七塊每塊用熟酒一杯送下服畢用厚被蓋之再喫葱白湯一鍾少頃汗出如淋從容去其覆物其病若脫此雖味澁難服其効更妙凡居鄉村之處倘有緊病不及請治只傳此方服之活人甚衆誠爲良便方也

太乙紫金丹

太乙紫金丹大戟　茨菰文蛤共千金
雄黃硃砂凡七品　諸瘡百症總通神

解諸毒療諸奇利關竅通治百病此藥真能起死回生
製之濟人奇効不可盡述凡居家出入興大土動大兵
及閩廣雲貴仕宦者不可無之

山茨菰 洗去毛皮 川文蛤 一名五倍子 槌
淨焙二兩 破淨焙一兩

麝香 揀淨毛皮乾者研淨三錢 千金子一名續隨子仁
白者去油一兩

紅芽大戟 杭州紫大戟為上江南土大戟次之北方
綿大戟色白者性烈峻利反傷元氣弱人
服之有致吐血崩去蘆根泥淨焙乾為末一兩五錢蜜

硃砂 有神氣者研極細末三錢 雄黃 鮮紅大塊者
研細末三錢

以上之藥各擇精品於淨室中製畢候端午七夕重陽
或天月德天醫黃道上吉之辰凡入室合藥之人三日

前俱宜齋沐更換新潔衣帽臨日方入室中淨手薰香
頂立藥王牌位主人率衆焚香拜禱事畢各將前藥七
味復筆稱準入於大乳鉢內再研數百轉方入細石臼
中漸加糯米濃飲調和軟硬得中方用杵搗千餘下極
至光潤為度每錠一錢每服一錠病勢重者連服二錠
以取通利後用溫粥補之修合時除合藥潔淨之人餘
諸忌見此藥惟在精誠潔淨為効治一切飲食藥毒蠱
毒瘴氣惡菌河豚中毒自死牛馬猪羊六畜等類之肉
人誤食之必昏亂卒倒或生異形之症並用水磨灌服
或吐或瀉其人必甦南方山嶺瘴氣烟霧癘疫最能傷

入感之纔覺意思不快惡寒惡熱欲嘔不嘔即磨之一錠服之得吐利便愈癰疽發背對口疔瘡天蛇無名腫毒蛀節紅絲等疔及楊梅瘡諸風癮瘡新久痔瘡並用無灰淡酒磨服外用水磨塗搽瘡上一日夜數次覺痒而消陰陽二毒傷寒心悶狂言亂語胸膈塞滯邪毒未出瘟疫頑亂發狂喉閉喉風俱用薄荷湯待冷磨服赤白痢疾肚腹泄瀉急痛霍亂絞腸沙及諸痰喘並用薑湯磨服男子婦人急中顛邪喝叫奔走鬼交鬼胎鬼氣鬼魘失心狂亂羊兒豬顛等風俱用石菖蒲煎湯磨服中風中氣口眼歪斜牙關緊急言語蹇澁觔脉攣縮骨節風腫遍身疼痛行步艱辛諸風諸癇並用酒磨頓熱服下自盜溺死驚死壓死鬼魅迷死但心頭微温未冷者俱用生薑續斷酒煎磨服一切惡蛇風犬毒蝎溪澗諸惡等蟲傷人隨即發腫攻注遍身甚者毒氣入裏昏悶呵呵命在須臾俱用酒磨灌下再與葱湯一碗被蓋出汗立甦新久瘴疾臨發時東流水煎桃枝湯磨服小兒急慢驚風五疳五痢脾病黃腫疳瘡瘡瘤牙關緊閉並用薄荷浸水磨濃加蜜服之仍擦腫上年歲幼者每錠分作數服牙痛酒磨塗痛上仍合少許良久嚥下小兒父母遺毒生下百日內皮塌爛班瘡道眼睛損爛者俱

用清水磨塗打撲傷損松節無灰酒研服年深月近頭
眼頭疼太陽痛極偏頭風及時瘡愈後毒氣攻注腦門
作脹者俱用葱酒研服一錠仍磨塗太陽穴上婦女經
水不通紅花湯下凡遇天行疫症延街及巷相傳遍染
者用桃根湯磨濃搭入鼻孔次服少許任入痛家再不
傳染又治傳屍勞瘵諸藥不能禁忌一方止指教服此
每早磨服二錠至三次後逐下惡物屍蟲異形怪類後
得脫利以此相傳活人不計其數　女子久患勞瘵爲
屍蟲所蝕磨服二錠片時吐下小蟲十餘條後服蘇合
香丸其病頓失調理月餘而愈真濟世衛身之寶藥也

人參清神湯

人參清神湯术甚　歸芩甘草麥冬宜
柴陳遠志黃連等　功効共同地骨皮

治疔瘡潰膿後餘毒未盡五心煩燥精神恍惚不寧言
語睡臥不清服之降火滋心保扶元氣

人參　黃芪　當歸　白术　麥門冬
陳皮　茯苓　遠志　地骨皮　各一錢　甘草
柴胡　黃連　各五分

水二茶鍾糯米一撮煎八分食遠服

內托安神散

內托安神散木芪　麥冬　五味　菖蒲草

加上人參玄又奇

治疔瘡針後已出膿時元氣虛弱睡臥驚悸心志不寧或毒未盡流入心竅致生健忘亦宜服

人參　茯神　黃芪　白朮　麥門冬

玄參　陳皮各一錢　酸棗仁　遠志　甘草

石菖蒲　五味子各五分

水二鍾煎八分歸入硃砂末三分和勻食遠服

疔瘡應用方

蟾酥條即前蟾酥丸作條捏餅用之　琥珀蠟礬丸　玉紅膏

加意金黃散　益氣養榮丸　護心

托裏消毒散見腫瘍門　加減八味丸　八珍湯

人參養榮湯見潰瘍門　珍珠散下疳門　氷蛳散瘰癧門

脫疽論第十八

夫脫疽者外腐而內壞也此因平昔厚味膏粱蕙燕臟腑丹石補藥消爍腎水房勞過度氣竭精傷或兼房術澀精霸道藥噙舌下化水直至丹田或納腑中使熱徑投內腎爲丸掌握作香鼻息塗抹陰囊或搽陽龜圖使堅鋼希求常濟多致陽精煽惑淫火猖狂其蘊蓄於臟腑者終成燥熱火症其毒積於骨髓者終爲疽毒陰瘡誠

爲巧人行拙誰防禍起蕭墻智者多愚自謂喜從天降
不顧後日也骨枯髓涸臟敗腑亡方知今日催命有故
解脫無方凡患此者多生於手足故手足乃五臟枝幹
瘡之初生形如粟米頭便一點黃泡其皮猶如煮熟紅
棗黑氣侵漫相傳五指傳遍上至脚面其疼如湯潑火
燃其形則骨枯筋練其穢異香難解其命仙方難活故
謂血死心敗筋死肝敗肉死脾敗皮死肺敗骨死腎敗
此五敗者雖有靈丹竟喪命而已是生此疾者死生付
於度外孫眞人曰在內則割在指則切卽此病也治之
得早乘其未及延散時用頭髮十餘根纏患指本節盡
處遶扎十餘轉漸漸緊之毋得毒氣攻延良肉隨用蟾
酥餅放原起粟米頭上加艾灸至肉粘瘡死爲度次日
本指盡黑方用利刀尋至本節縫中將患指徐順取下
血流不住用金刀如聖散止之餘疽以妙姑散敷之次
日倘有黑氣未盡單用蟾酥錠研末摻之膏蓋黑氣自
退患上生膿照常法用玉紅膏等藥生肉護骨完口此
爲吉兆內服滋腎水養氣血健脾安神之劑若內無變
症外無泥雜此十中可保其三四矣若割取之後黑色
仍漫痛腫尤甚敗惡無膿口乾舌硬精神不爽食不知
味者終死凡治此不可一一已醫治必與高明衆議聽患

者願情割取況此症首尾吉凶變駁難定故不可輕易用之又有形似而實非穴真而受異詳註在後宜參觀之

脫疽看法

起發不渴口潤舌和性志尋常並妄暴急循禮爲告初出形如麻子漸熟作痛一指皆腫根脚收束者吉已成頭便作腐肉不紫黑疼痛有時膿出腫消者吉已潰先膿後腐肉色紅活毒不走散氣不醒穢者吉未落先渴喜冷無度氏甘睡舌乾小便頻數陽痿者逆初起形如粟米肉便紫色不腫刺疼黑氣延散者逆已成瘡形枯鱉肉黑皮焦痛如刀刺毒傳好指者逆已潰肉枯筋腐血水臭污疼苦應心佟仃徹骨者逆

脫疽治法

脫疽多生足指少生手指初起冰窠黃泡者即灸之初生如粟裹可容谷皮色紫赤不作漫腫髮扎仍灸已灸之後瘡受火氣發泡作膿外藥箍之內兼補托毒勢已成瘡形稍陷但紫色未攻腳面者評議割取既割取之後血水淋漓疼痛不減和氣血補脾胃已成飲食減少身體倦怠便數口乾滋津液壯腎水破後氣血受傷脾胃虛弱自汗盜汗惡心乾嘔睡臥不寧日晡發熱疼痛苦楚煩悶譫妄俱

宜大補氣血富貴及膏粱素饜色慾每淫房術縱恣日久
禁行割法

脫疽治驗

男子年近五旬右足小指初生如粟米漸成白泡二十日
始痛請治頭已腐爛一指紫腫此脫疽也隨用艾火明
炙十三壯始大痛乃止又用針刺炙頂以蟾酥餅貼炙
上膏益本指腫上用披針擊刺七八處發泄毒血用蟾
酥錠磨濃塗之腫外以眞君妙貼散敷護良肉庶不外
侵其時患者脉數身發寒熱惡心體倦先用人參敗毒
散解其表症次用黃連內疎湯通其大便而惡心煩熱
亦止又以托裏消毒散加金銀花牛膝數服早以八味
丸晚用醒脾養元相兼服之喜其火疎毒氣隨又針刺並
泄其毒故不變作解毒爲膿腫方不散後用十全大補
湯加山萸五味麥冬等藥調理月餘而愈此疽若不針
炙發泄毒氣專假藥力敷圍再加峻藥攻利必致傷其
元氣豈能保固毒不侵犯得安之理

一客商右足次指生一紫泡痒痛異常次日指甲俱紫欲
黑視之乃肝腎二經之毒彼曰何別也予曰甲乃肝之
餘氣甲紫則肝受毒也骨乃腎之餘腎傷則骨黑此理
甚明彼又曰何以致之予曰凡人勞瘦筋力傷於肝候

服熱藥傷於腎傷者曰情實有此因彼久居客旅交結私妓情懷最密極力承奉但夜並服興陽細丸期許常至立交戲謔有此二年矣前言正中其病此勞力熱藥傷腎傷筋之實也其病尤險欲醫不治彼哀告客途欲得生返再三求治予又斟酌先取妓者頂髮十餘根撚線纏札患指盡處隨將艾炷安於所札上面紫色處排匀三處每灸七壯各放膽酥餅膏蓋次後脹痛相恐不捨解去札髮過夜一指皆黑相量筋骨皮肉俱死仍用利刀順節取脫患指乃水冷惡物預煎甘草湯浸洗良久候瘀血稍盡以止血散撚之次日灸上紫色不退恐其土延又以神燈照法照之候血散皮縐旋合膽酥丸羽多加海蛸研爛敷之早晚二次腫不復作紫色變紅紅色潰膿外用生肌止痛活血收斂之藥又熬參木地黃膏朝服扶補真元午服健脾藥以回胃氣晚用金液丹以解藥毒如此調理三月而愈後人問之用妓者頂髮札之何也予曰彼之頂髮乃心奠之物也以髮靠肉雖疼而不疼彼又如在目前此釋情之意也

一婦人中年肥胖生渴三載右手食指麻痒月餘後節間生一小泡隨後木指漸腫疼脹不堪視之原泡處已生黑班半指已變紫黑此亢陽之極乃成脫疽之脈洪

大數而有力此與肥人相反如再黑色上延壞入迅速詢問此婦先居富室無嗣每縱膏深架烘爐炭又兼多服種子熱藥中年喪失家業盡被嗣人侵費致久悒憂鬱後與寡舟同棲身軀寂寞此先富後貧所願不得又爲失榮症也辭不可治彼婦母子再三哀懇予亦無之奈何乃遵孫眞人治法在肉則割在筋則切此外無他彼願從之先用人參養榮湯隨用軟絹條尺許纏裹黑色盡處好肉節上以漸收緊扎之庶不通行血絡次用利刀放準依節切下將手逍浸甘草溫湯中片時其血不太多其疼亦不太甚患者日惟忍之懼不知而下以

神力之祐也予曰所嫌者切而不痛此爲氣血筋骨俱死此物雖脫其症未可得愈每以八味丸料加人參麥冬大劑煎服先救腎水次扶脾胃間用金液戊土丹以解藥毒後三日所扎指上漸漸放鬆以通血脉旣紅黑二膏生肉指痛次後手背手掌日漸發腫勢惡之甚惟不黑色此內毒已出之故仍用神燈照法兼以豬蹄湯淋洗後又匱上皆出數頭流去膿血不計其許兩月外方得原腫稍退膿穢稍減又以參朮膏人參養榮湯兼服半年外方妥其婦雖活五指失矣

一男僕冬月嚴寒主使赤足履地不敢移隨後血氷麻木

次日十指俱紫又數日全變黑色麻木不痛請視之強用辛熱散寒活血薰洗等藥終至不應後必十指脫又延黑脚面骨節一段甚作疼痛彼主恐脫疽也予曰似是而來非後必不妨令患者常用桑木火炙之取其温煖活血又能解散鬱毒其患漸腐漸脫自不走散內服健脾養血之藥調理外用生肌紅黑二膏培長肌肉百日外愈矣

侍女年十二歲容貌頗通新主嫌其脚大用脚布在意纏緊以線密縫其脚脹痛不堪訴主不聽至半月後流出臭水方解視之其雙足前半段盡皆黑腐請視之骨

肉已死予曰此已壞者不能復活只救將來未壞者可也先煮參粥食之次煎葱湯冷彼家侍女將患足浸入湯內淋洗再換湯浸但腐黑不痛者逐一剪割連續知痛者又以花蕊石散搽之保將壞者復其生已壞者得其脫內服補中益氣湯接其勞外搽生肌玉紅膏長其肉後雖得愈但二者俱致疲疾終身此爲穴眞而受異也

一男人右足小指縫中初生一點黃粟泡皮肉隨變紫色陰疽不腫常如刀刺視其形色眞脫疽也脈又得細數無力此腎經傷敗症也但患者生平大飲肉有正

副三人此必精力已竭縱治無功于強辭之後必延
脚面足底皆穿痛徹不已又飲食日少氣血日衰形體
日削兩月後百苦而終

脫疽主治方

解毒濟生湯

解毒濟生湯草芍　花粉紫苓歸茯苓
知柏紅花併遠志　犀角升麻牛膝同

治脫疽初起惡寒體倦發熱作渴或腫或紫或麻或痛
四肢倦怠心志恍惚不寧者並宜服之

川芎　當歸　黃柏　知母　天花粉
金銀花　麥門冬　遠志　柴胡　黃芩
犀角　茯神各一錢　甘草　紅花　升蔴手指加
牛膝足指加各五分

水二鍾煎八分臨服入童便一杯隨病上下服

陰陽二氣丹　片柏玄參青黛同

陰陽二氣麥天冬　人參甘草解煩癢
澤瀉辰砂礬五味

治脫疽久服丹石補藥致腎水多成口燥咽乾宜飲
氷雪不知其冷此孤陽獨旺宜服此解

天門冬搗膏麥門冬搗膏五味子砂研黃柏　辰砂爲衣

人中白 小兒溺者 主用研

甘草　枯礬

各爲細末同玄參二冬膏子加煉蜜少許再搗千餘下軟硬得中丸如桐子大每服六十丸童便乳汁各一鍾空心送下安睡一時其功如神

清神散

清神散内用硃砂　　菖粉梅花冰片佳

解毒其於甘草飽　　諸瘡煩嘔自無他

治脫疽疔瘡發背毒積甚者腠理發越不盡多致煩燥悶亂睡則譫言嘔吐不食者並宜服之

甘草節五錢 眞菖粉一兩 大硃砂三錢 梅花片五分 牛黃分

右爲細末每服一錢淡竹葉燈心湯調服

雌雄霹靂火

雌雄霹靂火純陽　　斬艾雙黃丁麝香

陰毒陰疽陰發背　　逢之一灸自回陽

治脫疽及一切發背初起不爽痛者並宜灸之

艾茸二錢　丁香　雌黃　雄黃各二錢　麝香一分

右下四味共研極細搓入艾中作炷安豆大先放於患上灸之毋論痛痒以肉焦爲度如毒已經走散就紅暈盡處排炷灸之痛則至痒痒則至痛爲妙灸後仍用提疔

麥子貼干膏蓋次服瓊酥丸及解毒濟生湯兼治轉回活色有膿爲妙

金液戊土丹

金液戊土丹五味　牛黃神志石菖蒲

砂雄硝石烏梅等　片麝人中黃不殊

治脫疽及疔瘡發背縱食膏粱厚味法酒又或丹石補藥勉力房勞多致積毒臟腑久則胃汁中乾腎水枯竭不能上制心火以致消渴消中消腎饒飲多乾能食多瘦九竅不通驚悸健忘此症若出後必發疽多難治療宜預服此亦可轉重就輕移深就淺又解五金八石之毒殺三屍除勞熱極有奇功又治煩顛主安神志辟

毒藥也

人中黃法在未卷　烏梅肉　茯神　胡黃連

五味子各一兩　石菖蒲　辰砂　雄黃

遠志　硝石各三錢　牛黃　氷片各一錢　金箔二十

各爲淨末配準前數共入乳鉢內再研千轉於端午七夕或二十至二十分吉辰在淨室中先將烏梅地黃二膏搗極爛和藥漸加煉蜜少許徐徐添搗軟硬得中每藥一兩分作十丸金箔爲衣每服一丸用人乳童便共一大杯化藥隨病上下食前後服之此藥最解膏粱金石藥毒殺三屍除勞熱極有奇功又治煩顛主安神志辟

辟瘟及諸邪魅譫語妄情失心喪志者俱効修合之時
服藥之際俱忌婦人僧尼孝服雞犬等見之此藥用蠟
封固收藏不泄藥味愈久愈効

脫疽應用方

針刺法　蠟礬丸　太乙膏
蟾酥丸見疔瘡門　神燈照法　猪蹄湯
托裏消毒散見腫瘍門　十全大補湯　玉紅膏
參朮地黃膏　人參養榮湯　加減八味丸見消渴門
補中益氣湯　桑木灸法見腦疽門　人參敗毒散見時毒門
花蕊石散見金瘡門　內疎黃連湯

瘰癧第十九

夫瘰癧者有風毒熱毒氣毒之異又有濕癧筋癧痰癧之殊風毒者外受風寒縛於經絡其患先寒後熱結核浮腫熱毒者天時亢熱暑中三陽或內食膏粱厚味釀結成患色紅微熱結核堅腫氣毒者四時殺癘之氣感昌而成其患耳項胸腋驟成腫塊令人寒熱頭痛項強作痛瘰癧者累累如貫珠連接三五枚此不作寒熱其患得於悞食蟲蟻鼠殘不淨之物又或汗液宿茶陳水混入而食其患先小後大初不覺疼久方知痛筋癧者憂愁思慮暴怒傷肝蓋肝主筋故令筋縮結萬成核生於

項側筋間形如棋子堅硬大小不一或陷或突久則靣
扁多生寒熱勞怒則甚痰癧者飲食冷熱不調饑飽喜
怒不常多致脾氣不能傳運遂成痰結初起如痲如粟
生及遍身久則微紅後必潰破易於收斂凡觀此症別
其風毒者散其風除其濕如防風解毒湯之類是也熱
毒者清其脾瀉其熱連翹消毒飲之類是也氣毒者調
其血和其氣藿香正氣散之類是也瘰癧者散其堅和
其血散腫潰堅湯之類是也筋癧者清其肝解其鬱柴
胡清肝湯之類是也痰癧者驀其痰行其氣芩連二陳
湯之類是也又有寡婦尼僧鰥夫庶妾志不得發思不

得遂積想在心過傷精力此勞中所得者往往有之最
爲難治有此先養心血次開鬱結益腎安神疎肝快膈
如歸脾湯益氣養榮湯俱加香附青皮山梔貝母木香
之類是也又男人不宜太陽青筋潮熱咳嗽自汗盜汗
女人又忌眼內紅絲經閉骨蒸五心煩熱男婦有此後
必變爲癆瘵難治之症但此體實者初起可服散腫潰
堅攻利之藥得効者十中三四有不察虛實盡剿追伐
損傷元氣致成壞病者十有八九此非患者之命自出
醫人之手亦常治初起成核服前藥未效者用針刺核
內深入二三四分用冰蛳散撚成條子插入核內潮紙封

生待至二七後核子自然落出隨用紅黑二膏摻貼內
服補劑不久便愈又常見班毛牽牛巴霜大黃追蝕等
用往往致其危亡者多矣切宜戒之

瘰癧看法

初起核高腫痛色紅軟活微作寒熱肩項不強者易巳成
根不堅硬內無小核相叢脾健氣血不衰者易巳潰膿稠
肉色紅活核腫漸消肩項自便漸歛者順潰後易消易歛
氣體平和胃膈寬利飲食知味者順未成形體消瘦寒熱
往來結核頑硬痰嗽相兼者險已成核堅連續如珠大小
不等項強筋急脉虛者險已潰膿水清稀肌肉消爍自汗
盜汗寒熱不腫者逆潰後陰虛煩燥作渴泄秘男子骨蒸
女人經閉俱逆

瘰癧治法

初起腫痛增寒壯熱四肢拘急項強頭疾者表散之腫便
發熱便秘口乾胃膈不利惡心脉實者宜利之膏粱厚味
醇酒積熱濕痰凝結而成化疫降火清中憂思過度鬱怒
傷肝筋縮結核者宜養血開鬱疎肝房慾勞傷陰虛瞞熱
自汗咳嗽形消瘦者滋腎健脾失利忘名懷抱鬱結積想
在心所如不得乖隔陰陽虛哦歲月所得此者精血俱傷
先養正氣次治標病堅而不潰腐而潰之潰而不斂補而

欲以皆活法也

瘰癧治驗

一男人項核腫痛拘急惡寒用荊防敗毒散二劑表症悉退餘核不消用散腫潰堅湯加川芎香附貝母十餘服其核漸小外以琥珀膏貼之月餘而安

一男人仲冬渡江暴發霧氣又值驚恐次日寒熱交作頭面耳項俱腫先以藿香正氣散二服寒熱亦止面腫漸消惟項間堅腫不退紆緩作痛此毒聚必欲作膿仍用正氣散加芎歸皂刺數服候膿熟針之腫痛頓退又以十全大補湯脾健肌生完口

一婦人孀居六載子幼未竝憂鬱成核半年又兼經水不調寒熱交作形體消瘦脉亦弦數此勞傷氣血肝火妄動而成斯疾也所謂損者益之不可用追蝕之藥損而復損先用逍遥散加香附牡丹皮貝母和其血服平其肝氣使寒熱盡退次用益氣養榮湯服至月餘氣血漸復經事漸調元氣漸醒外用火針核上點破四孔用黄線藥捻入五六次候至孔大換用冰蛳散搽於核上封之至十三日外其核自落外搽紅膏生肌收斂內攙入參養榮湯加香附木香三十餘服其口自完此婦慎起居回七情成口味盡調理故可得愈否則必不能矣

一室女年十七因父擇婿不遂躭至二旬懷抱日久頂生
數核堅硬如石此肝經凝結筋縮之病也又兼經水斷
絕寒熱如瘧咳嗽脉數惟不顏紅此陰虛火動已成勞
瘵症也非藥能愈視其形狀喜無敢色予曰欲治此病
先治其心猶可父問曰何藥治心予曰非藥也易云天
地氤氳萬物化醇男女構精萬物化生此天地男女生
成化育之道也斯病獨起於孤陰寡陽不生不化所謂
逆理之病此女大失配謂當至而不至漸成失度之疾
其病不生而自生非已作也由時變也故藥不能攖同
心得陰陽和而雨澤降夫婦和而家道成斯時之後厥

藥方可彼父始悟遂即擇婿三月後復請視之前症稍
定先用逍遥散加香附青皮山梔丹皮貝母十餘劑開
鬱疎肝寒熱漸止次以人參養榮湯加丹皮紅花通其
血脉使心血易生容顏稍澤又用益氣養榮湯倍參朮
培助脾胃增進飲食間用歸脾湯加麥冬五味遠志沙
參收斂神氣竟慰性情又製參朮地黄膏服至半年精
神頓復經事亦通惟核不能全退用火針點破一核琥
珀膏貼之漸腐爲膿又兩月而得收斂餘腫三核漸針
漸潰漸斂首尾純用補脾開鬱藥調理一年始得全愈

一男子年近三十項生數核面白神勞皮麤脉數此正氣

受傷之症也先當補養氣血待根本壯實後治其瘡隨用養榮健脾藥十餘劑未効彼以為緩又信方士所惑圖內消之自服琵琶猫巴麝之藥連瀉十數行後致小便淋漓不已虛熱更增飲食減少又復請視形色內敗不堪調理辭而不治彼後方悔雖請內醫強投扶助降火之藥終不應而死

一婦非年性急夫蕩不為家左項生核半載漸至雞卵大堅硬如石皮外紅絲纏遶左右脈俱弦數弦屬肝火妄動數乃脾熱之甚先用梔子清肝湯乎伐肝木五服後而脈始平又以清肝解鬱湯數服散其鬱結次用溫氣養榮湯調其氣血開服散腫潰堅湯軟其堅腫外以琥珀膏貼之調理百日而元氣乃復堅硬已消八九止存小核未盡彼以為愈止不服藥後又一載值夫賭訟未勝暴急驚恐前腫復作兩手脈膠細而多數此陰血虛損陽火乘之非前有餘症也又兼胃脘不利飲食無味經水先期過多形容憔悴不澤此神傷於思慮則肉脫意傷於憂愁則肢廢魂傷於悲哀則筋攣魄傷於喜樂則皮稿志傷於暴怒則腰脊不能俯仰以上俱七情內損症也法當滋養氣血調和脾胃兼益腎精心開鬱散滯庶保無虞彼不肯信仍前欲服散腫潰堅之藥欲求速

上圖內消之一日此非前比今則不敢治也請客醫自製前藥亦久患上併灸肘尖此爲真氣虛而益虛邪氣實而益實後果反加發熱自汗咳嗽項強四肢不收多痰無膿血水不絕腫亦熾盛此臟腑已損之候必不久居也又月後傳爲氣急聲啞痰血交出而殁予嘗見庸醫不辨虛實患家不信正理偏賞服藥作崇多致不救者十有八九凡醫者患者俱當省而慎戒之

瘰癧主治方

防風解毒湯

防風解毒湯刑梏　牛子連翹草石膏

薄荷枳殼芎蒼朮　知母燈心共豈逖

治風毒瘰癧寒暑不調勞傷奏襄多致手足少陽分亏項結腫或外寒內熱痰凝氣滯者並効

防風　荆芥　桔梗　牛蒡子　連翹

甘草　石膏　薄荷　枳殼一　川芎

蒼朮　知母各錢一

水二鍾燈心二十根煎八分食後服

連翹消毒飲

連翹消毒飲陳皮　甘桔玄參羌芎歸

梔葛射干花粉等　紅花澤蘭大黃醋

治熱毒瘰癧過食炙煿醇酒膏粱以致鬱熱腮項成核或天行亢熱濕痰作腫不能轉側者効。

連翹　陳皮　桔梗　玄參　黃芩
赤芍　當歸　天花粉　紅花各一錢　甘草五分　山梔　葛根　麝干
水二鍾煎八分食後服有痰者加竹茹一錢

加味藿香散

加味藿香散甘桔　青皮柴蘇半夏攪
术苓白芷厚朴芎　夏枯草効君當說

治氣毒瘰癧外受風邪內傷氣鬱以致頸項作腫肩臂

彈痛四肢不舒寒熱如瘧及胃脘不利

藿香　甘草　桔梗　青皮　陳皮
柴胡　紫蘇　半夏　白朮　茯苓
白芷　厚朴　川芎　香附　夏枯草各等分

薑三片棗二枚水二鍾煎八分食遠服

滋榮散堅湯

滋陰散堅四物湯　甘桔參苓海粉當
陳术升麻香附貝　紅花昆布共煎服

治一切瘰癧憂抑所傷氣血不定形體瘦弱潮熱咳嗽堅硬腫痛毋分新久但未穿潰者並効

川芎　當歸　熟地　陳皮
茯苓　桔梗　白术　香附各一錢　甘草
海粉　貝母　人參　昆布各五分　升麻
紅花各三分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服身熱加柴胡黃芩白汗盜汗去升麻倍入參黃芪飲食無味加藿香砂仁食而不化加山查麥芽胃脘痞悶加澤瀉木香咳嗽痰氣不清加杏仁麥冬口乾作渴加知母五味子睡臥不寧加黃柏遠志棗仁驚悸健忘加茯神石菖蒲有汗惡寒加薄荷半夏無汗惡寒加芥术藿香女人經事不調加玄胡索牡丹皮腹脹不寬加厚朴大腹皮

益氣養榮湯

參苓陳貝附歸宜
芎芍桔甘兼熟地
勞傷瘵癆大堪是

治拘攣或勞傷氣血或四肢頸項筋縮結成累累如貫珠者謂之筋癆此患皆緣思慮太過神氣受傷乃勞中所得者也其患或軟或硬或赤不赤或痛不痛或潰或不潰而不斂者是也

人參　茯苓　陳皮　貝母　香附
當歸　川芎　黃芪　熟地　白芍各一錢

甘草　桔梗各五分　白术二錢
薑三片棗二枚水一鍾煎六分食遠服
如胃脘痞悶加枳殼木香
飲食不甘暫加厚朴蒼术
往來寒熱加柴胡地骨皮
膿潰作渴倍參芪歸术
膿多或清倍當歸川芎
脇肋生遲加白斂肉桂
痰多加半夏橘紅
發熱加柴胡黃芩
口乾加麥門冬五味子
渴不止加知母赤小豆
膿不止倍加人參黃芪當歸
虛煩不睡者倍人參熟地黃遠志棗仁

芩連二陳湯

芩連二陳湯半夏　甘桔連翹花粉苓
木香牛子夏枯草　消痰散核効如神

治瘰癧生於少陽部分項側結核外皮漫腫色紅微熱或至缺盆高骨上下發腫形長堅硬作痛名曰馬刀初起並宜服此已成氣弱者不宜

黃芩　黃連　陳皮　茯苓　半夏
甘草　桔梗　連翹　牛蒡子　花粉各一錢
木香三分　夏枯草二錢
薑三片水二鍾煎六分食後服渣再煎臨睡服

散腫潰堅湯

散腫潰堅芍藥歸　升柴膽草葛梗隨
知翹連柏三稜术　見布甘花粉莫遺

治瘰癧馬刀瘿堅硬如石或在耳下或至缺盆或在肩上或至脇下皆手足少陽經症又發於下頰或至頰車堅而不潰或已破流膿又屬足陽明症也此治有餘症而効多不足症而効少

黃芩八分　白芍　當歸　龍膽草　桔梗
知母酒炒　黃柏酒炒　昆布　天花粉各五分
連翹　葛根　炙甘草　黃連　三稜酒拌炒

廣木各三分　柴胡四分　升麻三分

水二鍾煎八分食後服臨服入酒一小杯亦効此藥可為末煉蜜為丸桐子大每服八十丸即散腫潰堅丸治症同前臨睡食後俱白滾湯下

升麻散堅湯

升麻散堅湯甘草　莪木三稜陳桔連
葛根龍膽夏枯等　芍芍歸翹芩共煎

治瘰癧遶頸或至頰車屬足陽明核深遠陷隱曲肉底入屬足少陰俱作腫塊堅硬大小不一

升麻　甘草　莪木　三稜　陳皮

桔梗　黃連　龍膽草　葛根　川芎
白芍　夏枯草　連翹　黃芩　當歸各五分
天花粉有痰加

水二鍾煎八分食後熱服再用上藥加倍爲末窠九芡豆大每服百九黃酒臨睡服頭不枕更妙

夏枯草湯

夏枯草湯歸朮陳　桔甘生地貝母冬
香附柴胡芷芍桔　加上紅花効若神

治瘰癧馬刀不問已潰未潰或已潰日久成漏形體消瘦飲食不甘寒熱如瘧漸成勞瘵並効

夏枯草二兩當歸三錢　白朮　茯苓　桔梗
陳皮　生地　柴胡　甘草　貝母
香附　白芍各一錢　白芷　紅花各二分

先用夏枯草水三碗煎至二碗濾清同藥煎至八分食後服將藥渣同前夏枯草渣其再煎六七分臨睡時入酒半小鍾和服宜食淡味物件

活血化堅湯

活血化堅湯朴芷　芎歸貝芍桔針蠶
花粉銀花陳皮草　乳香靈脂共成線

治一切瘰癧及瘿瘤痰核初起未潰膿者並効

防風　赤芍　歸尾　天花粉　金銀花
貝母　川芎　皂角刺　桔梗各一錢　姜蠶
厚朴　五靈脂　陳皮　甘草　乳香
白芷稍各五分
水二鍾煎八分臨服用酒一小杯食後服

逍遥散

逍遥散當歸芍藥　白茯苓香附柴胡
牡丹皮薄荷甘草　雲片术女病堪扶
治婦人血虛五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忡頰赤口燥咽乾發熱盜汗食少嗜卧及血熱相搏月水不調

臍腹作痛寒熱如瘧及治室女血弱榮衛不調掠嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

當歸　白芍　茯苓　白术　柴胡各一錢
香附八分　丹皮七分　甘草六分　薄荷　黄芩如熱加五分
水二鍾煎八分食遠服有寒加薑三片棗二枚

通治瘰癧方

通治瘰癧方陳术　柴桔芳歸白芷翹
苓芷藿香夏枯草　甘草半夏附相饒
治瘰癧不分新久表裏虛實及諸痰結核並効
陳皮　白术　柴胡　桔梗　川芎

當歸　白芍　連翹　茯苓　香附醋炒
夏枯草　黃芩各一錢　藿香　半夏　白芷
甘草各五分

薑三片水二鍾煎八分入酒一小杯臨睡時服

芎歸養榮湯　參苓砂仁熟地黃

芎歸養榮湯　麥冬甘草共煎嘗

五味茯神丹遠志

治瘰癧流注及一切不足之症不作膿或不潰或已潰不斂或身體發熱惡寒肌肉消瘦飲食少思睡臥不寧盜汗自汗驚悸恍惚並皆治之

當歸身二錢　人參　黃芪　白朮　川芎
白芍　熟地各一錢　五味子　麥門冬　遠志
甘草　茯苓各五分　牡丹皮　砂仁各三分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服

氷蝉散　氷蝉散內用田螺　砒塊將來紙麪糊
龍腦研砂爲細末　總將津拌患頭塗

治瘰癧日久堅核不消及服消藥不効者用此點落癧核如馬刀根失面小及失榮等症忌用

大田螺五枚去殼日乾　白砒一錢二分麪裹煨熟　氷片一分

硇砂　二分

用曬乾螺肉切片同煨熟白礬爲細末加硇片再礬小磁密收凡用時先用艾炷灸核上七壯次候灸處起泡以小針挑破將前藥一二釐津唾調成餅貼灸頂上用綿紙以厚糊封貼核上勿動泄氣七日後四邊裂縫再七日其核自落換搽玉紅膏內服補藥兼助完口此藥又治癭瘤患大蒂小及諸般高突異形難狀者並効

紫雲膏

紫雲膏品不多般　銅綠　松香一處攢

煎入蘇油如紫漆　百般頑症貼當安

治瘰癧初起未成者貼之自消已成未潰者貼之自潰已潰核存者貼之自脫及治諸色頑瘡膿瘡瀦瘀濕氣新久痔瘡疼痛不已者並用之

明淨松香　研末　一斤

銅綠　淨末　二兩

用蘇油四兩銅鍋內先熬數滾滴水不散方下松香熬化次下銅綠熬至白烟將盡其膏已成候片時便入磁罐凡用時湯內頓化旋攤旋貼

琥珀膏

琥珀膏內桂防歸　松脂硃砂木鱉隨

丁木二香草麻子　木通白芷共相宜

治瘰癧及腋下初如梅子結腫硬強漸若連珠不消不潰或潰膿水不絕經久不瘥漸成漏症

琥珀 一兩　朮通　桂心　當歸　白芷
防風　松脂　乳香　木香 各三錢　麻油 二斤　黃丹 飛炒十二兩　木鱉肉　草麻肉 各五錢

先用琥珀丁香桂心硃砂木香爲細末其餘爲咀浸油內七日入鍋內慢火熬至羣藥焦黃爲度絹濾淨油徐下黃丹以柳枝手攪候至膏成滴入水中軟硬得中撥下鍋來以盆頓穩攪至烟盡方下羣藥攪勻磁器盛之臨取少許攤貼

大紅膏

大紅膏血竭銀硃　硝石　獺冰　味不殊
輕粉南星併石鐘　乳香猫骨勿堪塗

治瘰癧痰核結塊不分新久但未穿破者並効

南星二兩　銀硃　血竭　硝石　朝腦 各三錢
輕粉　乳香 各二錢　猫頭骨一具煅

石灰一兩用大黃三錢切片同炒石灰紅色去大黃

右共爲細末陳米醋熬稠調藥敷核三日一換敷後皮嫩微損者另換紫霞膏貼之其核自消

火針法

火針之法獨稱雄　破核消痰立大功

燈草桐油相協力　當頭一點破元龍

治瘰癧痰核生於項間初起堅硬或如梅李結聚不散宜用此法針之捕藥易消用縫衣大針二條將竹節頭劈開以卧雙夾縫內相離一分許用線扎定先將桐油一盞用燈草六七根油內排勻點着將針燒紅用手指將核揑起用針當頭刺入四五分核大者再針數孔亦妙核內或痰或血隨即流出候盡以膏蓋之次日針孔必漸作膿輕者用黃線藥捕之核堅硬者用氷蛳散糊打成條曬乾捕核針孔內外以糊紙二三重封固次日其核發腫作痛不妨乃藥氣攻入於內又至三四日自然核外裂開大縫再至七日其核自落用湯洗淨孔內換用玉紅膏搽入外以膏蓋內服益氣養榮湯或十全大補湯加香附兼戒勞動氣惱房事發物煎炒海腥等件三品一條鎗

三品一條鎗最靈　雄礬砒信少入聞

加上乳香爲線藥　疔疽癰漏盡承平

上品錠子去十八種痔中品錠子去五漏翻花瘿瘤乳核下品錠子治瘰癧疔疽發背腦疽等症此爲古之三品錠子但藥同而分兩不同治病故有分別今註二條

錠本方三品以下之症並皆用之俱各相應況又藥品簡易而不繁是曰三品一條錠之說也凡同志者隨試而用之

明礬三兩　白砒一兩五錢　雄黃二錢四分　乳香一錢二分

砒礬二味共爲細末入小罐內加炭火煆紅青烟已盡旋起白烟片時約上下紅徹住火取罐頓地上二宿取出約有砒礬淨末一兩加前雄黃乳香一錢二分共研極細厚糊調稠搓成如線條陰乾凡遇前症有孔者紉入孔內無孔者先用針放孔竅早晚插藥二次捕至三日後孔大者每插十餘條插至七日患孔藥條滿足方住以後所患四邊自然裂開大縫共至十四日前後其疔核瘰癧痔漏諸管自然落下瞎用湯洗搽上玉紅膏虛者兼服健脾之藥

瘰癧酒藥方

治年久瘰癧結核串生滿項頑硬不穿破者服

雀瓜草半斤　忍冬藤六兩　野蓬蒿四兩　野菊花四兩　五爪龍三兩　馬鞭草一兩五錢

上藥切碎用老酒十五斤袋貯藥懸於酒內封口煮二十香爲度取起水頓浸一伏時初服盡醉出汗爲効已後隨便飲之其酒一料病愈不發

瘰癧應用方

玉紅膏　太乙膏 見腫瘍門　梔子清肝湯 見鬢疽門　荆防敗毒散 見時毒門　柴胡清肝湯　十全大補湯 見潰瘍門　歸脾湯 未卷補遺

鬢疽論第二十

夫鬢疽者乃手少陽三焦相火妄動又兼腎水不能生木或外受風熱所感但此經多氣少血肌肉相薄凡有憂結而成疽之初起寒熱交作頭痛徹太陽甚則耳肖最難腐潰此皆起於情性急暴房慾血虛火動肝氣凝連鬢通腫治法不可妄用針灸不分陰陽表裏邪正虛實治之庶不有悞且如初見寒時多寒少熱口乾作渴好飲熱湯六脉虛數無力又兼患上堅硬多不潰無膿瘡根流散此等之症乃真氣虛而邪氣實也治以托裏爲主消毒佐之如清肝養血湯托裏消毒散之類是也又如見症時熱多寒少頭痛作痛口燥舌乾渴欲飲冷二便秘澁六脉沉實有力瘡亦焮腫夜痛身體發熱易腐易膿根腳不開腫焮在外此乃正氣實而邪氣虛也治以消毒爲主托裏佐之如梔子清肝湯風勝子湯之類是也大抵正氣勝則實邪氣勝則虛必然一勝則一負邪正不並立故其虛而不待損而自虛矣又

有未見瘡時先作渴症或一年半載日久日重然後發爲發疽其形色多紫黑瘡多平陷堅硬無膿毒流耳項又兼氣味不正形容不澤精神不明飲食不進者俱爲不治

發疽看法

初起無口乾無寒熱飲食有味舉止尋常發瘡者順已成瘡頭腫起根腳不散形色紅活煞痛潰膿者順已潰膿稠色鮮紅活腫消痛止項便頭輕口和者順潰後瘀肉易腐新肉易生瘡口易平飲食有味者順初起瘡頭如粟頂軟不高色紫根散木痛食少者逆已成瘡形紫黑軟陷無膿足冷身涼便利脈虛者逆已潰膿水清稀多生臭穢壞肉不腐新肉不生者逆潰後飲食發養身體發熱口乾不眠肉削皮蠹者逆

發疽治法

初起煞腫堅硬內熱口乾脈數有力邪實不當利之已成增寒壯熱四肢拘急脈浮者邪在表也宜散之赤腫作痛血凝滯也宜散血清肝色黯漫腫升陽助胃已潰堅腫不退脈細而數日晡發熱者宜滋陰健脾肝膽怒火上攻心煩作燥腮顴紅熱者宜抑陰降火已潰膿清腫痛尤甚虛煩食少者宜養氣血健脾胃潰後氣血俱虛身涼脈細大便

多溏者宜峻補溫中潰後不欲新肉生遲瘡口淡白膿水不止健中補脾

鬢疽治驗

一男子患此三日瘀腫寒熱脈浮數以荊防敗毒散一劑表症悉退腫痛仍作已欲作膿以托裏消毒散膿潰又以益氣養榮湯加麥冬五味漸斂而愈

一男子患此五日頂高根若錢大形色紅活此肝經濕熱爲患用麻子大艾炷七壯以梔子清肝湯二服腫勢行止以蟾酥餅膏貼炙上更以柴胡清肝湯加白芷黃芪天花粉數服膿潰腫消半月收斂

一男子渴疾三年寒熱半月自以爲瘡鬢間忽生一小瘡三四日外形如粟瘡乎堅硬色暗不澤又兼脈洪數而無力此水竭火旺之症也終難潰斂辭不敢治復請醫者視爲易治用針刺腫上出紫血鍾許內服解毒藥次日邊傍愈腫醫者謂腫高屬陽易治彼家懽悅又三日膿項俱腫口禁不食用針又刺腫上一日加昏憒又復請視予曰死將及矣但此症未病先作渴腎水已竭外形如粟裏可容谷形色紫黑氣敗血衰脈洪無力元氣內敗如此干涉豈有不死者彼家方信晚矣共二十一日而歿

一男子腫熾五六日彼欲内消外敷涼藥内服大黄泄氣等劑隨後熾腫雖退乃生寒熱惡心乾嘔肩膊牽強脇之脉數無力此内虚毒氣入裏涼藥之過也東垣云瘡疽之發受之有内外之别治之有寒温之異受之外者法當托裏以温劑反用寒藥攻利損傷脾胃多致内虚故外毒乘虚入裏受之内者法當疎利以寒劑反用温劑托裏初病則是骨髓之毒悞用温劑使毒上徹皮毛表裏通潰其爲二瘡助邪爲毒苦楚百倍輕則變重重則死矣前症既出寒藥之過以托裏建中湯二服嘔吐全止又以十全大補湯加白芷敷劑而原瘡漸起又以人參養榮湯間服腐潰膿稠兩月餘瘡口收斂

一婦人患此腫硬寒熱口乾煩痛脉洪大有力此表裏俱實也以防風通聖散一劑行二次前症稍退又一劑大行數次熱退渴止惟原瘡腫硬用銀針點破挿入蟾酥條内服托裏消毒散漸潰膿而安

一男子患此三四日頂高根活且無表裏之症此肝經濕熱爲患用針挑破瘡頂以蟾酥餅蓋貼内服加味逍遥散加皂角針數服頭出微膿根腫亦消

鬢疽主治方

柴胡清肝湯

柴胡清肝芩芍歸　黃芩梔子地黃隨
防風牛蒡天花粉　甘草連翹一處宜

治鬢疽初起未成者毋論陰陽表裏俱可服之

川芎　當歸　白芍　生地黃　柴胡
黃芩　山梔　防風　天花粉　牛蒡子
連翹　甘草節各一錢

水二鍾煎八分食遠服

鼠粘子湯

鼠粘子湯甘桔歸　赤芍連翹地骨皮
玄參木通天花粉　防風大黃不可遺

治鬢疽初起熱多寒少頭痛作痛口燥咽乾渴常飲茶二便秘澁六脈沉實有力煩悶疼痛者

鼠粘子　桔梗　當歸　甘草稍　赤芍
連翹　玄參　防風　地骨皮　天花粉
木通各錢　大黃

水二鍾煎八分食前服渣再煎服

加味逍遙散

加味逍遙白朮苓　紅花丹芍柴胡陳
當歸梔貝天花粉　甘草羚羊勿更奇

治鬢疽七日以上根盤深硬色紫燃痛者宜服

白朮　茯苓　牡丹皮　白芍　柴胡
陳皮　當歸　山梔　貝母　天花粉各八分
甘草　紅花　羚羊角各五分

水二鍾淡竹葉二十片煎八分食後服

梔子清肝湯

梔子清肝湯牛子　柴苓芍石當歸
黃連甘草丹皮等　川水同煎一處服

治少陽經虛肝火風熱上攻遂成癭疽痛連頸項胸乳
太陽等處或寒熱晡甚胸滿口苦舌乾
生芍子　柴胡　川芎　白芍　石膏

當歸　山梔　牡丹皮各二錢　黃芩
黃連　甘草各五分

水二鍾煎八分食後服

清肝解鬱湯

清肝解鬱湯歸芍　苓木梔柴貝母隨人參半夏丹皮附　川芎熟地草陳皮

治暴怒傷肝憂思鬱結致肝火妄動發爲癭疽頭痛
徹太陽胷脇痞連兩脇嘔酸水皆服之

當歸　白芍　茯苓　白朮　月母
熟地　山梔各一錢　半夏　人參　柴胡

丹皮　陳皮　香附　川芎　各六分　甘草四分

水二鍾薑三片煎八分食遠服

參苓內托散

參苓內托散歸芪　芎芍陳皮白朮隨

山藥熟地併官桂　附子甘丹地骨皮

治鬢疽已成堅而不潰潰而不斂氣血俱虛身涼脈細飲食少思口淡無味及形體消瘦者服

歸身　黃芪　川芎　白芍　陳皮

白朮　山藥　熟地　茯苓　人參　各一錢

甘草　肉桂　熟附子　牡丹皮　地骨皮　各五分

薑三片棗二枚水一鍾煎八分食遠服

保安萬靈丹見癩疽門

治鬢疽初起增寒壯熱頭疼惡心四肢拘急者

鬢疽應用方

托裏消毒散見癰瘍門　荊防敗毒散見時毒門　人參養榮湯

蟾酥餅子見疔瘡門　托裏健中湯　益氣養榮湯

防風通聖散見時毒門　十全大補湯俱見癩疽潰瘍門

咽喉論第二十一

夫咽喉雖屬於肺然所致有不同者自緜虛火實火之分緊喉慢喉之說又咽爲心肺肝腎呼吸之門飲食聲音

吐納之道此關係一身害人迅速故曰走馬看咽喉不待少頃也假如虛火者色淡微腫脉亦細微小便清白大便自利此因思慮過多中氣不足脾氣不能中護虛火易至上炎此恙先從咽嗌乾燥飲食妨碍咳吐痰涎呼吸不利班生苔蘚壘若蝦皮有如毛草常刺喉中又如硬物嗌於咽下嘔吐酸水藏出甜涎甚則舌上白胎脣生瘡色聲音雌啞喘急多痰以上等症皆出於虛火元氣不足中來治此不可誤投涼藥上牛痛者屬氣虛補中益氣湯加麥冬五味子牛子玄參午後痛者屬陰虛四物湯加黃柏知母桔梗玄參如服不効者必加薑附以爲引導之用亦爲佐治之法也實火者過飲醇酒縱食膏粱蘊熱重衾裹暖辛烈多致熟積於中久則火動痰生發爲咽喉甚者風痰上壅咽門閉塞少頃湯水不入聲音不出此爲喉閉緊喉風是也用藥不及事先用針刺喉間發泄毒血隨用桐油餞雞翎探吐稠痰務使痰毒出盡咽門得鬆湯藥可入語聲得出乃止內服清咽利膈湯疎利餘毒如牙關緊閉難入必當先刺少商出血其閉自開如針刺探吐無痰聲如拽鋸鼻掀痰喘湯水不入語聲不出者真死候也又有喉癰喉痺乳蛾上膊癰等症其患雖重而咽門半塞半開其病雖凶

而喉道又寬又緊此皆標病雖重無妨當用金鎖匙吐出痰涎利膈湯推蕩積熱膿脹痛者開之損而痛者益之其患自安凡喉閉不剌盃喉風不倒痰喉癰不放膿喉痺乳蛾不針烙此皆非法又有痰火勞瘦咳傷咽痛者無法可治

咽喉看法

初起紅色腫痛語聲清朗亦無表裏之症相兼者輕已成腫痛咽喉半閉半開咯吐痰涎飲食稍進者順咽喉腫閉牙關緊急言語不清痰壅氣急聲小者險咽喉驟閉痰涎壅塞口禁不開探吐不出聲喘者死時瘡之後毒結咽間

腫痛腐爛吐納不出聲啞者重久嗽痰火虛陽上攻咳傷咽痛但見聲嘶面紅者死

咽喉治法

初起腫痛寒熱交作頭疼拘急者邪在表也宜發散初起腫痛發熱脈有力而便秘者邪在內也宜下之腫痛寒熱口乾作渴脈洪大而有力者宜發表攻裏咽喉腫痛痰涎壅甚面紅口乾邪在上也宜探吐之喉閉痰涎壅塞氣急口禁難開先刺少商後行吐法已成脹痛咽喉塗塞湯水不入膿已成也宜急針之腫痛微紅脈虛無力午後痛者屬陰虛宜滋陰降火腫痛色白咯吐多涎上午痛者屬陽

虛宜補中健脾

咽喉治驗

一男子咽喉腫痛發寒體倦脉弦有力此邪在表以荊防敗毒散加牛子玄參一劑表症已退腫痛仍作又以玄參解毒湯二劑腫痛減半又二劑而安

一男子咽喉腫痛痰涎壅盛用金鎖匙先吐稠痰清咽利膈湯推蕩積熱腫痛稍減惟色紅甚此火熱也又以黃連解毒湯加桔梗二劑腫亦退而安

一男子素飲火酒一時咽喉腫閉口噤舌強痰涎壅塞勢頗危急用針先刺少商二穴口噤方開以桐油餞雞翎探吐稠痰數碗語聲方出仍用針刺腫上出紫血鍾許溫湯漱淨氷硼散搽之以涼膈散加芒硝天花粉利去積熱又以連翹散二劑而安

一婦人肥甚暑熱咽間腫痛痰涎上壅語聲不出甚危先用針刺毒血次以金鎖匙吐去稠痰五六碗以清咽利膈湯一服腫痛少減去硝黃又服而安

一男子勞甚咽喉腫痛自服清咽利膈藥不應脈之脈細而虛此勞傷虛火之症朝以補中益氣湯加麥冬五味子桔梗玄參晚以四物湯加黃柏知母炒黑乾薑服加童便不數日腫痛亦消疲恒咽愈

一婦人咽痛微腫色白吐燕不利膸之脉亦細微此中氣不足虛火假症也用理中湯二服其疼頓止又以補中益氣湯加炒黃柏知母數服再不復作

一男子腫痛日甚服清咽利膈藥不應必欲作膿以防風通聖散去硝黃二服候膿脹痛而下針便愈

咽喉主治方

清咽利膈湯

清咽利膈湯　薤白　桔梗　防風　薄荷　銀

大黃　牛子　黃連等　朴硝加上再玄參

治積熱咽喉腫痛瘡瘍逆壅盛及乳蛾喉痺喉癰重舌木舌或胸膈不利煩燥飲冷大便秘結等症

連翹　黃芩　甘草　桔梗　荊芥

防風　山梔　薄荷　金銀花　黃連

牛蒡子　玄參　各一錢　大黃　朴硝　各二錢

水二鍾煎八分食遠服

玄參解毒湯

玄參解毒湯梔子　甘草　黃芩　桔梗　荊芥

葛根　生地　竹葉　燈心　共得宜

治咽喉腫痛已經吐下飲食不利及餘膿不消

玄參　山梔　甘草　黃芩　桔梗

葛根　生地　荊芥各一錢　水二鍾淡竹葉燈心各二十件煎八分食後服

連翹散

連翹散內葛根芩　赤芍山梔桔梗升　木通加上効如神

門冬牛子併甘草

治積飲停痰蘊熱膈上以致咽喉腫痛胸膈不利咳吐痰涎舌乾口燥無表裏症相兼者服之

連翹　葛根　黃芩　赤芍　山梔　桔梗　升麻　木通各八分　麥門冬　牛蒡子　甘草

水二鍾竹葉二十片煎八分食遠服

涼膈散

涼膈散中荊芥防　薄荷粉桔連大黃　玄參石膏牛蒡子　貝母山梔總在藏

治咽喉腫痛痰涎壅甚膈間有火大便秘澁用

防風　荊芥　桔梗　山梔　玄參　石膏　薄荷　黃連　天花粉　牛蒡子　貝母　大黃各等分

水二鍾煎八分不拘時服

金鎖匙

金鎖匙中用焰硝一錢　姜蠶片腦雄黃饒
加上硼砂効更高　咽喉腫閉即時消
治喉閉纏喉風痰涎壅塞口禁不開湯水難下
焰硝一兩　片腦一字　白姜蠶一錢　雄黃二錢
五錢　硼砂一
各另研爲末和勻以竹筒吹患處痰涎即出如痰雖出
腫痛仍不消急針患處去惡血服煎藥
埋中湯
埋中湯內藥四般
甘草乾姜白朮攢
加上人參仔細看
虛陽之火立時安
治中氣不足虛火上攻以致咽間乾燥作痛吐噦妨碍

及脾胃不健食少作嘔胜腹陰疼等症
人參一錢　甘草炙八分
乾薑炒黑五分　白朮錢
水二鍾煎八分食遠服
桐油餞
桐油餞
治的喉風如神見
桐油餞兮　回生起死眞堪羨
探吐頑痰日照霜
治喉風喉閉其症先兩目胸膈氣急呼吸短促驀然咽
喉腫痛手足厥冷氣閉不通頃刻不治先用溫湯半盞
加入桐油三四匙（ヲカヤ）用硬雞翎（ヒタメ）蘸油探入喉中連探
四五次其痰壅出（ヲ）再探再吐以人甦醒聲高爲度後服

清咽利膈之藥

治喉烏龍散

烏龍散只一品藥　十八喉風總堪嚥

開關利膈効如神　虛火實火要對證

歌曰　十八喉風各有名　原來總是一根因

子孫代代宜珍惜　誓不輕傳與世人

用猪牙皂角七條去皮弦爲麤末水一鍾煎五分八人乳三匙冷服即時非吐則瀉治咽喉腫痛痰涎壅盛喉風喉癬乳蛾等症並効惟纏喉風牙關緊閉者不可與恐痰上出而口不開壅塞無路而出故也除此皆効又

久病咽痛忌用

神効吹喉散

神効吹喉散薄荷薑蠶青黛朴硝和

白礬火硝黃連各等加上硼砂治病自癒

治纏喉風閉塞及乳蛾喉痺重舌木舌等症効

薄荷　薑蠶　青黛　朴硝　白礬

火硝　黃連　硼砂各五錢

上藥各爲細末臘月初一日取雄猪膽七八箇倒出膽汁用小半盃和上藥拌勻復灌膽殼以線扎頭膽外用請缸紙包裹將地掘一孔潤深一尺上用竹竿懸空橫吊

上用板鋪用泥窖蓋候至立春日取出挂風處陰乾去
膽皮青紙磁礶窖收每藥一兩加冰片二分同研極細
吹患上神効歌曰此法端的通神聖萬兩黃金方不傳

少陰甘桔湯

加味甘桔湯黃芩　柴胡羌活玄參陳
川芎升麻葱白靈　少陰咽痛即安寧
治少陰咽痛頭痛脉沉細而身猶熱者宜服之
桔梗二錢　甘草一錢　陳皮　川芎　黃芩
柴胡　玄參各六分　羌活　升麻各四分
水二鍾葱白一根煎八分不拘時服

清音嚥化丸

清音嚥化丸阿子　天麥歸苓黃柏參
阿膠知母生熟地　烏梅人乳犢牛津
治肺氣受傷聲音雌啞或久嗽嗆傷聲啞亦宜
阿子　真阿膠　知母各五錢
麥門冬去心　白茯苓　天門冬監水泡炒
熟地各一兩　人參三錢　黃柏蜜炙　當歸　生地
梨汁各一碗共熬稠膏　人乳　牛乳　烏梅肉去核一百箇
共為細末和入前膏加煉蜜搗成丸如雞頭實大每用
一丸仰臥嚥化日用三丸如改作小丸每服一錢阿子

煎湯或蘿蔔湯送下亦可取効

治暴失音

暴失音方猪板油　再加白蜜兩相投
慢火煎至稠膏住　每日三匙不用憂

公猪板油一斤入鍋先煉成油濾去渣入白蜜一斤再煉少頃絹濾淨磁器內冷定成膏不時挑服二茶匙其音漸清無疾時亦可常服潤肺

豁化丸

喻化丸申用白礬　硼砂牙皂共雄黃
膽礬棗肉丸成就　吐嗽艱難第十一方

治梅核氣乃痰氣結於喉中嚥之不下吐之不出加毛草常剃作痒新則吐酸妨得久成閉塞

膽礬　硼砂　朋礬　牙皂　雄黃
各等分爲末紅棗煮爛取肉爲丸芙實大空心噙化一丸溫黃酒一杯過口內服蘇子降氣湯

蘇子降氣湯

蘇子降氣湯厚朴　陳皮半夏共前胡
官桂相兼甘草用　生薑爲引効堪圖

治虛陽上攻氣不升降致結患咽嗌痰涎壅塞

蘇子一錢五分　厚朴　陳皮　半夏　前胡

官桂各一錢　甘草五分

水二鍾薑三片煎八分食遠服

氷硼散

氷硼散劾實堪誇　玄明粉再共硃砂
硼砂氷片相兼佐　咽喉口齒病無他

治咽喉口齒新久腫痛及久嗽痰火咽啞作痛

氷片五分　硃砂六分　玄明粉法注未卷　硼砂各五錢

共研極細末吹搽患上甚者日搽五六次最効

咽喉應用方

防風通聖散　荊防敗毒散見時毒門　四物湯見癰疽瘍門

補中益氣湯　黃連解毒湯見疔瘡門

少商穴（在手掌外側去爪甲角二分是穴發針出血）

時毒論第二十二

夫時毒者天行時氣之病也春當温而反寒夏宜熱而反凉秋當凉而反熱冬宜寒而反温此四時不正之氣感於人發成斯疾也自有陰陽表裏寒熱虛實分治初起與風寒相類惟頭面耳項發腫爲異其患既得寒熱交作體强頭痛脉浮緊數者爲邪在表以期防敗毒散或萬靈丹發汗以散之如兩目鼻面漸次傳腫者乃正陽明受病其患燃腫發熱便秘口乾多熱少寒脉數有力

爲邪在裏五利大黃湯四順清凉飲下之又頭角兩耳前後結腫者乃手少陽經受之其患耳鳴筋痛寒熱呕吐口苦咽乾煩燥時甚當以知母石膏湯小柴胡湯和之通用防風通聖散加牛子玄參解毒攻裏勞役凶荒沿門問巷傳染者普濟消毒飲藿香正氣散以安之表裏俱解腫尚不消宜砭去惡血腫熱甚者如意金黃散敷之微熱不紅堅硬者冲和膏選而用之自後仍不消者必欲作膿宜托裏消毒散加白芷皂角刺托之已潰體倦食少者補中益氣湯膿穢脾虛食而嘔吐者香砂六君子湯潰而不斂者十全大補湯又有毒中三陽自

頂之以上俱發腫者光如冰色饑目令雞屑似脂形白角流涎腫不消潰聲音不出飲食不入咽喉腫閉牙關難開破流臭水穢氣連綿不絕者犯此俱爲不治

時毒看法

初起寒熱交作頭面一處作腫紅赤發熱疼痛者易已成高腫發熱疼痛有時語聲清朗湯藥易入者輕已潰膿稠堅腫漸消疼痛漸減飲食漸進身溫者吉潰後膿水漸止腫退肌寬神彩精寧睡臥安穩者順初起多寒少熱頭面耳項俱腫光如冰晶不熱者險已成漫腫無頭牙關緊閉湯水不入聲音不出者逆已潰膿水清稀氣味敗臭腫痛

不除如屍發腫者死潰後臭水淋漓腫不知痛手足多冷常出譫言者死

時毒治法

寒熱交作頭痛體痛六脉浮緊邪在表也宜汗散之頭面赤腫作痛口燥咽乾大便秘實邪在裏也下之外有寒熱內亦口乾脉弦有力表裏俱實發表攻裏表裏俱解腫痛仍不消者乃瘀血凝滯宜砭去惡血砭血之後腫痛仍作不消者已欲作膿宜托膿健脾腫痛日多而脹痛者已有膿急針之更兼補托脾胃潰後腫痛不減膿清腥穢脾胃弱也更宜溫中健脾饑年時毒流行傳染者忌用攻發當和解宜養正氣

時毒治驗

一男子耳項腫痛發寒熱脉浮數以荆防敗毒散一劑寒退熱存又以連翹消毒飲一劑便行三次內熱頓退餘腫不消本方去大黃加川芎數劑而愈

一男子先發寒熱次日頭面俱腫又二日口禁湯水不入脘之脉洪數而有力此表裏俱實也又咽喉妨碍湯藥難下先用針刺咽間去惡血鍾許牙關稍開以防風通聖散一劑徐徐服之便去三四次腫上砭去惡血以金黃散敷之次日腫勢稍退又以普濟消毒飲二劑面腫

漸消惟兩耳下堅腫不退此必作膿又以托裏消毒散數服候膿熟而針之次以十全大補湯去肉桂加陳皮十餘劑而斂

一男子牙根腫痛次傳腮項俱腫頓生寒熱此陽明濕熱上攻用羌防敗毒散加石膏二劑寒熱頓退惟腮腫不消以針刺牙根腫上出毒血以氷硼散搽之外敷黃君妙貼散內服牛蒡子湯數服而愈

一男子冬月耳面赤腫發熱口乾脈洪實而便秘此三陽蘊熱症也必捨時從症治之以五利大黃湯一劑便行二次赤腫稍退內熱稍疎又以升麻解毒湯二服腫亦消而病愈此為用寒遠寒之意也

一婦人冬月面腫咽痛口禁難開脈脬洪數有力又見房中暖氣如烘此因爐火盛也以黃連解毒湯加玄參一劑次日腫消咽利又用二劑其疾痊安

一男子勞甚鬢間腫硬肉色不變予曰勞傷氣血濕痰凝滯之症與夫外感時毒不同又脬脈細數而無力為內傷損病治當養氣血調經脈理勞瘵猶治之彼欲內消自服仙方活命飲二服腫不覺消脾胃已損又請二醫乃行攻利復損臟腑數日後飲食不進便泄不止腫硬愈堅痰涎愈盛復請視之辭不可治予曰凡療理病有

王未治有權宜此病初起肉色不變者血不足也堅硬不熟者脾胃弱也脉細數而無力正氣衰也豈可用前有餘之藥以攻不足之病後又强投溫中補劑不應而死

時毒主治方

荊防敗毒散

荊防敗毒散人參 羌獨前柴苓桔梗

茯苓枳壳同甘草 寒甚加葱其得名

治時毒初起頭痛惡寒腮項腫痛脉浮者服之

荊芥 羌活 獨活 前胡

柴胡 川芎 桔梗 枳壳各一錢

甘草 人參各五分

薑三片水二鍾煎八分食遠服寒甚加葱三枝

五利大黃湯

五利大黃湯黃芩 升麻梔子朴硝評

時毒煩腫大便秘 服之敢取即安寧

治時毒煩腫赤痛煩渴便秘脉實有力者服之

大黃煨 黃芩 升麻各二錢 芒硝 梔子各一錢二分

水二鍾煎八分空心服未利者渣再煎服

連翹消毒飲

連翹消毒飲芎歸　赤芍牛蒡薄荷隨
黃芩花粉桔梗草　枳殼升麻共所依

治時毒表裏二症俱甚餘腫不消疼痛不退者

連翹　川芎　當歸　赤芍藥　牛蒡子
薄荷　黃芩　天花粉　甘草　枳殼
桔梗各一錢　升麻五分

水二鍾煎八分食後服便燥者加酒炒大黃

防風通聖散

防風通聖將軍芍　薄荷芎歸草朴硝
桔梗梔翹芩白术　荊芥麻黃滑石膏

治時毒惡寒發熱煩燥口乾表裏痲症俱實者

防風　白芍　薄荷　川芎　桔梗
山梔　黃芩　白术　當歸　連翹
荊芥　麻黃　滑石　石膏各一錢　甘草五分

芒硝一錢五分　大黃酒炒二錢

水二鍾煎八分空心溫服

普濟消毒飲

普濟消毒飲芩連　玄草參陳牛子蒡
柴桔翹藍併馬勃　升麻薑蠶共水煎

治時毒痘瘡初覺增寒發熱肢體沉重次傳頭面作雁

或咽喉不利舌乾口燥煩渴不寧者服之

黃芩 黃連 各二錢 人參一錢 陳皮去白 玄參

甘草 柴胡 桔梗炒 各一錢五分 連翹

牛蒡子 馬勃 板藍根 升麻 薑黃 各五分

水二碗煎八分食後服如大便燥加酒煨大黃一錢或二錢以利為度腫勢甚者宜從去惡血之

通氣散

通氣散內用玄胡 羊躑躅花與藥廬

川芎 牙皂共為末 撚於鼻內嚏無窮

治時毒焮腫疼痛咽喉不利語言不爽者用之

玄胡索 一錢五分 羊躑躅花 二錢五分

藜蘆 三分 川芎 牙皂角 各五分

為細末用紙撚蘸藥少許納於鼻內取嚏為効

花裏消毒散 見腫瘍門

治時毒表裏俱解腫尚不退欲其作膿者服之

牛蒡子湯

牛蒡子湯用為根 連翹 薑黃 升麻 板藍根

江西豆豉同甘草 前胡 薑黃 可少減

治時毒熱甚腫痛麻浮數而無汗者宜服之

葛根 管仲 薑黃 甘草 江西豆豉

牛蒡子 半生半熟研各二錢

水二鍾煎八分食後服

十全大補湯 見潰瘍門

治時毒潰後膿水清稀形容消瘦脾胃虛弱飲食減少虛熱不睡自汗盜汗及不收斂者服之

時毒應用方

金黃散 見腫瘍門　黃連解毒湯 見丹瘡門　真君妙貼散 見腫瘍門

冰硼散 見咽喉門　升麻解毒散 見楊梅瘡門

瘿瘤論第二十三

夫人生瘿瘤之症非陰陽正氣結腫乃五臟痰血濁氣痰滯而成瘿者陽也色紅而浸腫亦無痛痒高突或帶小而下垂瘤者陰也色白而浸腫亦無痛痒扁大所不覺障玄齋分別甚詳

肝經筋怒動肝火血燥筋攣曰筋瘤心主血暴急忿大甚火旺逼血沸騰復被外邪所搏而腫曰血瘤脾主肌肉鬱結傷脾肌肉消薄土氣不行逆於肉裏而為腫曰肉瘤肺主氣勞傷元氣腠理不密外寒搏而為腫曰氣瘤腎主骨忿慾傷腎腎火鬱過骨無榮養而為腫曰骨瘤

予曰筋瘤者堅而色紫壘壘青筋盤曲甚者結若蚯蚓治當清肝解鬱養血舒筋清肝蘆薈丸是也血瘤者微紫微紅軟硬間雜皮膚隱隱纏若紅絲擦破血流甚至之

不往治當養血涼血抑火滋陰安魂心神調和血脉若
連二毋九是也肉瘤者軟若綿硬似饅皮色不變不緊
不寬終年只似覆肝然治當理脾寬中疎通戊土開鬱
行痰調理飲食加味歸脾丸是也氣瘤者軟而不堅皮
色如故或消或長無熱無寒治當清肺氣調經脉理勞
傷和榮衛通氣散堅丸是也骨瘤者形色紫黑堅硬如
石疼痛高起推之不移昂鼻堅貼於骨治當補腎氣養
血行瘀散腫破堅利竅調元腎氣丸是也此瘤之五名
治瘤之五法惟在此也又觀立齋云筋骨呈露曰筋瘿
赤脉交結曰血瘿皮色不變曰肉瘿隨憂喜消長曰氣
瘿堅硬不可移曰石瘿此瘿之五名也通治瘿瘤初起
元氣實者海藻玉壺湯六軍丸久而元氣虛者琥珀黑
龍丹十全流氣飲選服此藥自然縮小消磨切不可輕
用針刀搗破出血不止多致立危久則膿血崩潰滲漏
不已終致傷人又一種粉瘤紅粉色多生耳項前後亦
有生於下體者全是痰氣凝結而成宜被針破去脂粉
以三品一條鍼揀入數次以淨肉膜自愈又一種黑砂
瘤多生臀腿腫突大小不一以手攝起內有黑色是也
亦用針刺內出黑砂有聲軟硬不一又一種髮瘤多生
耳後髮下寸許軟小高突按之不痛亦針之粉髮齊出

又一種蛔虫癌生於胸下又一種蛔虫癌連生肩膊並在後治驗中予觀古又有虱癌矣但其形狀之異皆五臟濕熱邪火濁氣瘀血各感而成此非正病也以上數癌皆親手治驗非謬也

瘿癌看法

初起紅色光亮微熱微痛根腳浮淺不堅實者爲易已成紅赤高腫作熱燃痛頂破皮穿膿潰腫消者易已潰膿綢色鮮根腳縮小內肉漸生外皮漸斂者順潰後氣體平和飲食如故腫消痛止平收斂者順初起肉色不變寒熱漸生根腳散漫時或陰痰者險已成堅硬如石舉動牽強咳嗽生痰皮寒食少者逆已潰無膿惟流血水腫不消痛不止脾氣衰弱者逆破後血水不止腫硬更增敗腐不脫泄氣惡心者死

瘿瘤治法

初起自無表裏之症相兼但結成形者宜行散氣血已成無痛無痒或軟或硬色白者痰聚也行痰順氣已成色紅堅硬漸大微痒微疼者補腎氣活血散堅形如茄帶癌大下垂者用藥點其蒂茄落生肌收斂已破流膿不止癌仍不消宜健脾胃爲主佐以化堅已潰出血不常癌自開口者宜養血涼血佐以清肝潰後癌腫漸消脾弱不能收斂

者補腎氣兼助脾胃

瘿瘤治驗

一男子臀瘤五年形如覆瓢按之隱隱黑色此黑粉瘤也以針破之挼出黑砂兼黑粉其約碗許用三品一條錦挿入患內十餘日每次捺出黑膜其瘤漸消內服十全大補湯健脾胃養氣血月餘而斂

一男子腮上生瘤半年形若覆桃皮色不變按之微紅此粉瘤也針破之捺去脂粉挿前藥半月而愈

一義烏兵士肩膊下連生小瘤五枚三月餘漸發痒異狀以手捫之內則翁翁攻動予視之內動果如蝦鞠此必有異蟲以針破其一枚先出紅水一匙少頃攻出黑嘴粉紅蟲一條形如蛆樣長六七分又破二枚依然如是其人漸覺昏暈此泄氣之過也餘瘤停止服補中益氣湯數劑外以膏蓋又五六日患者方健漸漸破之仍以補藥十餘服而愈

一婦人併二女子耳後髮際下一寸各生一瘤半年餘漸漸而大此乃粉瘤用針破之先出脂粉後出頭髮數根長約二尺餘齊根剪斷出血微許俱用揀藥數日化出內膜而愈以此觀之知有髮瘤也

一婦人腰間生一肉瘤三年餘方漸微痛一日潰後出汞

蛔三條長約五寸置溫湯中遊動半時方愈其時患者形體衰弱面黃肌瘦口乾發熱朝以八味丸午用人參養榮湯服至百日外元氣漸醒又百日其白方收予意度之其蛔乃經絡氣血化也

一婦人氣沖穴生癌紅紫堅硬乃血癌也請視之心肝二脈俱已潰數其患得之心氣鬱結肝氣受傷之故辭不可治後請京師明公醫治其時頭已穿潰雖強投補托化堅凉血等劑日潰日爛終至不應破經兩月一日潰出紫血盆許隨即身亡後人問曰何以致此予曰心脈洪數心火旺也肝脈弦數肝氣傷也火旺逼血妄行肝氣傷不能藏血後破之必出血不止多致危亡預辭不治者此意也

癆瘤主治方

清肝蘆薈丸

清肝蘆薈丸芍药

海粉還兼甘草節

昆布青連皂地黃

當歸加上其成方

治惱怒傷肝致肝氣鬱結爲瘤其堅硬色紫壘壘青筋結若蚯蚓遇喜則安遇怒則痛者服之

川芎　當歸　白芍　生地　酒炙搗膏各二兩

青皮　蘆薈　昆布　海粉　甘草節

牙皂　黃連各五錢

右爲末神麴糊爲丸如梧子大每服八十丸白滾湯送下食前後服之

芩連二母丸

芩連二母丸芩芩

蒲黃生地瞿骨皮

治心火妄動逼血沸騰外受寒涼結爲血癌其患微紫微紅軟硬間雜皮膚隱隱纏如紅絲皮被血流禁之不住者宜服

黃連　黃芩　熟地當歸羚羊角

知母　貝母　甘草柏葉同丸嚼　川芎

當歸　白芍　生地　熟地　蒲黃

羚羊角　地骨皮各等分　甘草減半

右爲末側柏葉煎湯打寒食麪爲丸如桐子大每服七十丸燈心湯送下或作煎劑服之亦効

順氣歸脾丸

順氣歸脾湯貝母　烏附芪陳术炙神

棗仁遠志人參等　木香甘草合歡靈

治思慮傷脾致脾氣鬱結乃生肉癌軟如綿腫似饅脾氣虛弱日久漸大或微疼或不疼者服之

香附　烏藥　當歸

陳皮　貝母

白朮　茯神　黃芪　酸棗仁　遠志
人參各一兩　木香　甘草炙各三錢

右爲末合歡樹根皮四兩煎湯煮老米糊丸如桐子大每服六十丸食遠白滾湯送下

通氣散堅丸

通氣散堅丸半夏　陳貝母　薑粉草各
香附　桔梗　人參　海藻　南星　枳實炒
治憂鬱傷肺致氣濁而不清聚結爲癌色白不赤軟而不堅腫陰陽失度隨喜怒消長者宜服

陳皮　半夏　茯苓　甘草　石菖蒲

枳實炒　人參　膽南星　天花粉　桔梗
川芎　當歸　貝母　香附　海藻
黃芩酒炒各等分

右爲末荷葉煎湯跌丸安五大每服一錢食遠燈心二十根薑三片泡湯送下

調元腎氣丸

調元腎氣丸參地　山藥丹皮歸萸澤苓
麥冬龍骨香砂柏　骨皮知母勿忘神

治房慾勞傷憂恐損腎致腎氣弱而骨無榮養遂生骨癌其患堅硬如石形色或紫或不紫推之不移堅貼於

骨形體日漸衰瘦氣血不榮皮膚枯槁甚者寒熱交作飲食無味舉動艱辛脚膝無力者並服之

淮生地 酒煮搗膏 四兩　山萸肉　山藥　牡丹皮　茯苓 各二兩　人參　當歸身　澤瀉　麥門冬 搗膏 木香　砂仁 各三錢

龍骨　地骨皮 各一兩　黃柏 鹽水炒　知母 童便炒 各五錢

右爲末鹿角膠四兩老酒化烊加蜜四兩同煎滴水成珠和藥爲丸如桐子大每服八十丸空心溫酒送下忌白蘿蔔火酒房事

海藻玉壺湯

海藻玉壺湯青皮　翹貝芎歸昆布訶半夏獨活併甘草　海帶煎來効有靈

治瘿瘤初起或腫或硬或赤不赤但未破者服

海藻　貝母　陳皮　昆布　青皮　川芎　當歸　海帶　半夏　連翹　甘草節　獨活 各一錢　海帶 五分

水二鍾煎八分量病上下食前後服之凡服此門藥劑先斷厚味大暈欠宜絕慾虛心者爲妙

活血散瘿湯

活血散瘿湯芎歸　青陳芎半地黃隨

參苓昆布丹皮草　紅花肉桂木香催
治瘿瘤已成日久漸大無痛無痒氣血虛弱者
白芍　當歸　陳皮　川芎　半夏
熟地　人參　茯苓　牡丹皮各一錢
紅花　昆布　木香　甘草節各五分
青皮　肉桂各三分
水二鍾煎八分量病上下服後飲酒一小杯
六軍丸
六軍丸內用蜈蚣　全蝎薑蠶蟬脫同
夜明砂與川山甲　諸腫癭瘤可資功

治癭瘤已成潰者不論年月新久並宜服
蜈蚣去頭足　蟬脫　蛇蛻　薑蠶炒絲　夜明砂
穿山甲
以上等分爲細末神麯糊爲丸粟米大硃砂爲衣每服
三分食遠酒下忌大暈煎炒日漸可消
枯瘤方
枯瘤方用白礬硇　黃丹輕粉雄黃銚
乳香沒藥硼砂等分　斑猫田螺米粥調
治瘤初起成形未破者及根蒂小而不散者用
白礬　碙砂　黃丹　輕粉　雄黃

乳香　没藥　硼砂各一錢　班猫二十個

田螺大者去壳三枚晒乾切片

共研極細糯米粥調和搆作小棋子樣曝乾先灸癌頂三灶以藥餅貼之上用黃柏末冰調蓋數藥餅候十日外其癌自然枯落次用敛口藥

秘傳敛癌膏

秘傳敛癌膏血竭　輕粉龍骨海螵蛸　象皮乳香各等分　雞子蒸汕一處調

治瘻癌枯藥落後用此搽貼自然生肌完口

血竭　輕粉　龍骨　海螵蛸　象皮　乳香各三錢　雞蛋十五枚煮熟用黃煮油一小鍾

以上各等細末共再研和入雞蛋油內攪勻每日早晚井草湯洗淨患上雞翎蘸塗膏藥蓋貼

琥珀黑龍丹

琥珀黑龍丹海帶　南星血竭五靈脂　海藻木香併京墨　麝香加上劾堪隨

治五瘻六癌不論新久但未穿破者並宜服之

琥珀一兩　血竭二兩　海藻　南星　姜汁拌炒各五錢　五靈脂炒　京墨　木香三錢　海帶　麝香一錢

以上各爲細末和勻再用研煉蜜丸一錢重金箔爲衣晾

乾漆收每用二九熟酒一杯量病上下食前後化服如
患在下部服後隨用美膳壓之
十全流氣飲
十全流氣飲陳皮　赤茯青皮香附隨
木香烏藥芍歸芍
治憂鬱傷肝思慮傷脾致脾氣不行逆於肉裏乃生瘿
瘿肉瘤皮色不變日久漸大宜服此藥
陳皮　赤茯　川芎　當歸
白芍冬錢　香附八分　青皮六分　甘草五分　木香三分
薑三片棗二枚水二鍾煎八分食遠服

瘿瘤應用方
三品一條鞭見痔瘻門　人參養榮湯見瘰癧門　補中益氣湯
寒食麪註未卷　八味丸　十全大補湯俱見癰疽瘍門

肺癰論第二十四

夫肺癰者金受火刑之症也益肺爲五臟華蓋其位至高
其質至清內主乎氣中主乎聲音外司皮毛又兼主乎貴
賤壽夭金清而氣管深長者其音自清其嶺自高其聲
自洪此三者主壽主貴亦主通達如金濁而氣管短細
者其音自焦其韻自低其聲自小此三者主夭主賤亦
主窶滯故肺金獨旺於秋者應其輕清之候也倘有所

則其病自生致患肺癰者先因感受風寒未經發越停留肺中初則其候毛蓬惡風咳嗽聲重胃脘隱痛項強不能轉側者是其候也久則鼻流清涕咳吐膿痰黃色腥穢甚則胃脇脹滿呼吸不利飲食減少脉洪自汗法當清金甘桔湯主之麥冬清肺飲調之又久嗽勞傷咳吐痰血寒熱往來形體消削咯吐瘀膿聲啞咽痛其候傳爲肺痿如此者百死一生之病也治宜知母茯苓湯主之人參五味子湯調之又有七情饑飽勞役損傷脾肺者麥冬平肺飲主之紫菀湯調之又有房慾勞傷丹石補藥消鑠腎水者宜腎氣丸主之金液戊土丹

調之又勞力內傷迎風呵吐外寒侵入未經解散致生肺癰者初起脉浮微數胃熱氣盛寒熱往來咳嗽生痰者當以小青龍湯主之麥冬清肺飲調之通用金鏡湯蠐螬丸大乙膏相間服之亦効如手掌皮麤六脉洪數氣急顴紅活膿白血嘔藏淫水鼻瀉不食飲食者俱爲不治此症以身凉脉細膿化膿血變粘痰色鮮明飲食知味膿血漸止者俱爲無劫反此則死

肺癰看法

初起脉浮虛細身體不熟咳嗽有痰呼吸調勻者順已成脉浮微數咳吐膿痰形色鮮明語聲清朗者吉潰後咯吐

膿痰間吐鮮血時發時止飲食知味者順吐膿漸漸稀少胸脇不疼面色微微帶黃便調多穩初起脉洪弦數身熱多寒胷疼氣喘面紅汗多損壽已成咯吐膿痰氣味滾臭黃痰如膠粘固唇反終亡咯吐再兼白血氣急多煩指甲紫而帶灣終歸黑路手掌皮如柘樹面艷顴紅咽痛音妳鴨聲鼻掀終死

肺癰治法

初起風寒相入頭痛惡寒咳嗽聲重者宜解散風邪汗出惡風咳嗽氣急鼻塞項強胷膈隱痛實表清肺日間多寒喜覆衣被夜間發熱多煩去被滋陰養肺口乾喘滿咽燥而渴咳嗽身熱脉弦數者降火抑陰胷滿喘急咳吐膿痰身熱氣麤不得安臥平肺排膿熱退身涼脉來短滑精神減少自汗盜汗補肺健脾

肺癰治驗

義官仲冬時督工河道不常迎風呼喚致肺受傷後發此症初起寒熱交作咳嗽聲重氣急生痰請內醫治之越治越重後予視胷其脉浮而數面光而澤此肺癰也視其痰果有膿意相粘以桔梗湯二服咳嗽稍止以排膿散四服其膿漸多惟胸膈疼痛不減脉亦帶乾此胸中有瘀血也以四順散加紅花牡丹皮二服吐出紫血

碗許隨後膈痛漸止又以金鯉湯兼入參五味子湯間服月餘而愈

男子久嗽不已咳吐膿痰面白神勞胸中隱痛脇脅之脉浮微數此屬肺氣不足火尚有餘以知母茯苓湯數服而膿痰漸少又以清金寧肺丸服之而愈

男子因勞傷咳嗽不止至夜身熱尤甚日久咯吐膿血脇脅之脉弦而數此虛火假症也先以童子小便日飲二三次又服紫菀茸湯數劑至夜身熱不發又間服金鯉湯月餘而漸瘳此非童便之功而陰火豈能得退膏治瘡瘍虛熱不退者用此極効

一男子鬱鬱不遂意患嗽半年時或咳吐膿血形體衰弱飲食減少脉亦微數聲漸將雌惟面不紅其病將成肺痿而尚可治以清金二母湯十餘服咳吐減半又以金鯉湯與人參五味子湯間服之又早飲人乳晚飲童便各一鍾調理百日外而安

一男子生平好飲口乾作渴致肺壅熱成癰咳吐膿痰喘滿難臥以葶藶散二服而喘定易睡又以紫菀茸湯加乾葛天花粉十餘服而膿痰漸少早以加減八味丸午用清金寧肺丸間服之兩月而愈

一男子五十餘歲平素寵妾膏粱復生咳嗽發熱吐痰腥

臭視之手掌枯澁面隱微紅痰中白血脈亦細微而數此肺癰所忌症也醫不治後醫强許其生而用藥終治不應乃死人問曰何以致之予曰手掌乾澁血枯土傷不能生其金也面色微紅相火已動痰中白血正肺受傷脈細而數真氣虛敗凡肺癰犯此豈有不死者乎以此言之後人乃服

肺癰主治方

麥冬平肺飲

麥冬平肺飲人參　赤芍　桃榔　赤茯苓

陳皮甘桔同成劑　肺癰咳嗽可治春

治肺癰初起咳嗽氣急胸中隱痛嘔吐膿痰者

人參　麥門冬　赤芍　桃榔　赤茯苓

陳皮　桔梗各一錢　甘草五分

水二鍾煎八分食遠服

玄參清肺飲

玄參清肺飲柴陳

玄參八分　銀柴胡　陳皮　甘桔桃榔參茯苓

麥冬骨皮薏苡仁　生薑童便可安寧

治肺癰咳唾膿痰胃脘脹滿上氣喘急發熱者

地骨皮　麥門冬各一錢　桔梗　茯苓

薏苡仁一錢　人參

甘草各五分　桔梗三分

水二鍾薑一片煎八分臨入童便一杯食後服

寧肺桔梗湯

寧肺桔梗湯貝芪

防巳百合各五味

治肺癰胸膈隱痛兩脇腫滿口燥咽乾煩悶多渴自汗盜汗眠臥不得俯吐稠痰腥臭宜服之

桔梗　貝母　當歸　瓜蔞仁　黃芪

枳殼　甘草節　桑白皮　防巳　百合

苡仁各八分　五味子　甜葶藶　地骨皮　知母

杏仁各五分

水二鍾薑三片煎八分不拘時服咳甚加百合身熱加柴胡黃芩大便不利加蜜灸大黃一錢小便澁滿加澄心木通煩燥兼益加白茅根痛甚加人參白芷

四順散

四順散內有奇功

甘草杏仁相協力

治肺癰吐膿五心煩熱壅悶咳嗽氣急不能安

貝母　紫菀　桔梗各一錢

水二鍾煎八分食遠服或爲末白湯調服二錢

桔梗紫菀貝母同

肺癰喘嗽永無踪

甘草　杏仁各七分

清金寧肺丸

清金寧肺貝甘陳　參桔歸苓地骨芩

銀柴天麥苄連芍　五味白朮生熟薏

治肺癰咳嗽日久膿痰不盡身熱虛羸漸成勞瘵者服之

陳皮　茯苓　桔梗　貝母　人參

黃芩各五錢　麥門冬　地骨皮　銀柴胡　川芎

白芍　胡黃連各六錢　五味子　天門冬

生地酒浸搗膏熟地搗膏　歸身　白朮各一兩　甘草三錢

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服七十丸食遠白滾湯送下之

人參五味湯

人參五味湯陳朮　芪桔歸苓枳地黃

桑皮柴前地骨草　肺癰虛之可煎嘗

治氣血勞傷咳膿或咯血寒熱往來夜出盜汗羸瘦困乏一切虛損之症並効

人參　五味子　前胡　陳皮　白朮

桔梗　當歸　茯苓　熟地　甘草各一錢

黃芪　地骨皮　桑白皮　枳殼　柴胡各五分

水二鍾薑三片煎八分食後服

紫菀茸湯

紫菀茸湯參犀角　冬花桑葉草半夏
杏仁百合與阿膠　貝母蒲黃薑莫邪
治膏粱厚味飲食過度或煎炒法酒致傷肺氣咳嗽咽
乾吐痰唾血喘急脇痛不得安臥並服
紫菀茸　犀角　炙甘草　人參各五分　桑葉用經霜者
款冬花　百合　杏仁　阿膠　貝母
半夏　蒲黃生各七分
水二鍾薑三片煎八分入犀角末食後服

排膿散

排膿散內用黃芪白芷人參五味宜
每服三錢蜜調下　肺癰瘀血効甚奇
治肺癰已吐膿後宜服此藥排膿穢補肺氣
黃芪　白芷　五味子　人參各等分
右爲細末每服三錢食後蜜湯調服

知母茯苓湯

知母茯苓湯桔梗　薄荷五味草人參
柴半冬花苦白术　阿膠麥冬仔細憑
治肺痿喘嗽咳吐痰涎或自汗盜汗往來寒熱
茯苓　黃芩各一錢　知母　甘草　桔梗

薄荷　人參　五味子　柴胡　半夏
川芎　款冬花　白朮　阿膠　麥門冬各六分
水二鍾薑三片煎八分加童便一杯食後溫服

滌痰湯

滌痰湯內二陳先ヅ　麥冬枳實膽星前
人參桔梗黃連煎ヽ　竹茹加上病安然
治心火剋肺金久而不愈傳爲肺痿咽嗌雌啞胸脇落
悶嘔吐痰涎喘急難臥者並服之

陳皮　半夏　茯苓　甘草　麥門冬
膽南星　枳實　黃連　人參　桔梗各五分

竹茹一錢
水二鍾煎八分食後服ヽ

寧肺丸

寧肺丸中二般藥　烏梅粟殼去觔膜ヲ
每服二錢功有靈　肺癰肺痿同甚ク
治久嗽咯吐膿血胸膈不利咳嗽痰盛坐臥不安言語
不出甚則聲音啞嗌者服之

烏梅蜜拌蒸取肉　去膜蜜拌炒
粟殼八錢搗膏　未一兩

用烏梅膏加生蜜少許調作丸每服二錢烏梅湯不拘
時下ヽ

清金二母湯

清金二母湯本桔梗　知母蘇梗术杏本
葉桑五味陳皮麥
冬

治肺痿多嗽少痰午後發熱口乾煩燥不寧者

知母　貝母　桔梗　茯苓　當歸
白术　陳皮各一錢　桑皮　紫蘇　杏仁
柴胡　瓜蔞仁　黃芩　五味子　甘草
麥門冬名五分

水二鍾煎八分入童便一杯食後服

梔子仁湯

梔子仁湯大青葉　石膏淡豉黃芩
杏仁知母赤芍藥　升麻柴胡甘草行

治肺痿發熱潮熱或發狂亂煩燥面赤咽痛者

梔子仁　赤芍藥　大青葉　知母各七分　黃芩
石膏　杏仁　升麻各一錢五分　柴胡一分

甘草五分　淡豆豉百粒

水二鍾煎八分食遠服

加味理中湯

加味理中湯半夏　茯苓白术共陳皮
乾薑細辛併甘草　人參五味劾同推

治肺胃俱虛咳嗽聲重發熱不已又兼脉浮數而無汚者服之

炙甘草　半夏　茯苓　乾薑泡　白朮　陳皮　細辛　五味子　人參各五分　水二鍾煎八分食遠服

金鯉湯

金鯉湯中効罕稀獨將貝母効眞奇肺癰痰吐最甚醫童子小便重湯頓

治肺癰已成未成胸中隱痛咯吐膿血者服之

金色活鯉魚一尾約四兩重貝母錢

先將鯉魚連鱗剖去肚腸勿經水氣用貝母細末搽在魚肚內線扎之用上白童子小便半大碗將魚浸童便內重湯頓煮魚眼突出爲度少頓取起去鱗骨取淨魚肉浸入童便內頓熱肉與童便作二三次一日食盡一枚其功効甚捷

亭藶散

葶藶散中慧玫仁　甘草桑皮芫葛根

瓜蔞升麻枯梗等　肺癰服下可回春

治過食炙煿或飲酒過度致肺熱氣壅喘急不臥及肺癰濁吐腥臭胸膈脹滿不食者並服之

甜葶藶　桔梗　瓜蔞仁　服升麻　薏苡仁
桑白皮　葛根　各一錢　炙甘草五分
水二鍾薑三片煎八分食後服

腎氣丸

治腎氣素虛不交於心津液不降敗濁爲痰致生痿逆
乾山藥四兩　山茱萸去核四兩　澤瀉蒸　牡丹皮皆
熟地用生者八兩酒炸銅器蒸半日砂器亦可搗膏
白茯苓各三錢
右爲末地黃煮爛杵膏蜜丸如桐子大每服七八十丸
空心滾湯鹽湯溫酒送下

肺癰應用方　○　金液戊土丹見脫疽門