



同 七 九  
第 292  
卷 2 止



建中湯

加<sub>二</sub>果<sub>一</sub>知<sub>二</sub>茶<sub>一</sub>或加<sub>レ</sub>將<sub>二</sub>取<sub>二</sub>下<sub>一</sub>利<sub>二</sub>三<sub>一</sub>行亦可也

食療

果<sub>一</sub>羸<sub>二</sub>餅<sub>一</sub>葛<sub>二</sub>餅<sub>一</sub>胡<sub>二</sub>麻<sub>一</sub>蜜湯

雪花菜 白湯攪之日燕之得效者間有之

○黃疸

茵陳五苓湯

本方加<sub>レ</sub>茵陳惡<sub>レ</sub>陳氣者去<sub>レ</sub>陳或加<sub>二</sub>水<sub>一</sub>將

茵陳大黃湯

大便秘結者

陳將 厄 枳 朴 滑 甘

四君子湯

虛人宜之或加桂附沈棗類

茯苓 甘草

熊膽

食療 蜆

○黃胖

平胃湯

蒼朮 枳實

家方順氣劑

加鉄粉葛粉

灸 皂礬丸 名平胃丸

○結毒 淋疾 膿瘡 疔瘡 便毒

家方排毒劑

家方解毒劑

淋疾加芩或附滑

一方

主淋疾 茯苓 通芎 芩 菜 甘 竹葉

食療 雞肉為最 鼠肉鼈肉次之

溫泉

一方

治疥癬瘡 巴 姜

右二味臨時和點

神祐丸

紫癬入裏為水腫用之  
行餘醫言癩瘡門參考

諸痛

○頭痛

有癩瘡風邪結毒三  
目治法漢末各門

家方順氣劑

加辛或芷

都梁丸

白芷一味糊丸

○腹痛

建中湯

或加烏附菜

因瘀血者加索芎

黃耆建中湯

右二方惡苦味最可

家方順氣劑

加芍桂附菜

五靈脂丸

或加索

治結毒或舊瘀血塊

○胸痛

家方順氣劑

擇加芍藥、桔梗、薤白之類

半夏瀉心湯

○脇痛

家方解毒劑

家方順氣劑

有結毒癰二因可考各門加索

○腰痛

建中湯

加烏附、歸芍

家方順氣劑

家方解毒劑

加桂附

○痔漏

家方解毒劑

馬膏或熊膽猪脂之類點之肛脫者塗之

以綿推入

辣茄丸

食療牛肉

鼈肉

兔肉

雞肉卵亦可也

灸

溫泉

蒸法

諸血門

○吐血 效血

家方潤涼劑

加歸艾艾

芎歸膠艾湯

芎歸膠艾芎非甘

當歸建中湯

○衄血

卮子藥皮湯

或柴胡湯加卮

白虎湯

加芎或芩

黃芩湯

芩芩芩 芩桂半姜

○便血

家方解毒劑 加芎歸

理中湯

或加歸芎或加芩附

一方加芩芩可

求 著 芩 附 竹 升 甘

○下血

家方潤涼劑

加桂芍朮棧或歸芍

○瀉血

猪苓湯

家方解毒劑

一方 果 知 苓 膠 艾 芍 參 甘

一方 漫 茯 歸 芍 赤石

一方 歸 芍 蒼 升 芍 苓 甘

一方 甘草一味細末白飲送下

凡膠艾芍歸芍升知苓朮果厄之類  
擇用

○眼目

家方排毒劑

加厄將檉菊芸連芍歸之類

洗眼湯

治赤眼痛或加菝苓藥

菊 歸 芍 連小 菝小

右水一合煮取半合合礬石多則眼相攣

灸 肩井 扶分 魄戶 膏肓 神堂

肺俞 足三里 三陰交

四苓散 加華蒼朮治雀目至妙

朮 扶 猪 澤

蟾連丸 主疔眼  
食療 鰻鱺魚及腸煮食妙  
山蛤

灸 疔眼不問虛實可灼灸

○耳

家方排毒劑 加通辛或蟬痛甚加旁

家方解毒劑 加將羔

小柴胡湯 柴桂湯  
麻黃附子細辛湯  
家方順氣劑 加苓柴

○鼻 酒查

辣茹丸 雞肉

○口舌

白虎湯  
家方排毒劑 家方解毒劑加減

升麻葛根湯 或加果苓  
甘桔湯 或加升或羔果知

家方解毒劑 主重舌  
一方 研小 辛大  
右細末以三稜針刺取血以管吹藥



○牙齒

連辛湯 連 辛

白虎湯

或加連辛 加果苓治齩齒痛

一方

口舌亦可

升麻葛根湯

或加果苓 辛 菝 荊

○咽喉

甘桔湯

升麻葛根湯 升麻葛根湯 升麻葛根湯

加饅饅最佳

家方排毒劑

有風邪者加芍果桂苓之類有喉痺成熟路者加柴苓桔果芍升之類以指爪傷之最良凡果桔升芍知貝連葛柴芍辛羔防

○小便閉

十棗湯 或神祐丸

導水丸 猪苓湯

一方 柴 通 沉 滑

一方 牽 通 將 枳 桂

一方 通大滑 桂中米中附小將

硫黃湯 熨方  
灸丹田 腰眼

○大便閉 秘結

大承氣湯 小承氣湯

麻仁丸 備急圓 神祐丸或散

蜜導 灸 腰眼

○癰疽 腸癰

家方排毒劑 或加葛

黃耆建中湯

或加歸芍或加附並治腸癰

大黃牡丹皮湯

蔓附湯 蔓姜湯

自古內托多用芷今人惡芷氣故不用

補中益氣湯 桃仁承氣湯

一方

薏 附芍 將 桃 甘

一方 或加桂

薏 香 芍 歸 附 甘

右四方主腸癰

食療 雞卵 反鼻

醫方類聚

卷之五

○疔

家方排毒劑 加櫻皮

一方

堯 芎 將 桔 升 芎

○癰癧 結核

家方順氣劑

擇加果芎薏貝桂

家方排毒劑 家方解毒劑

食療 果羸餅

灸

溫泉

一本無 萃藜

○金瘡破傷風

家方排毒劑 加接骨

一方

或升芎桂漫著水歸苓

一方

萃 藜 桂 芎 歸 甘

○打撲

一方 日久者加附

萃 芎 桂 中 將 小 丁 甘 少

溫泉

硫黃湯

一本無 萃

醫方類聚

婦人科

○經閉 血塊

家方順氣劑

擇加芎歸桃紅芍稜桂附之類

當歸建中湯

婦人血枯經閉或腹痛者或逆經吐血不

止加薄荷果

桃仁承氣湯

或去芒婦人壯盛經閉者當專攻之及

血塊宜此湯

抵當湯

主治大槩同上或為丸用

大黃甘遂湯

婦人小腹滿如鼓脹小便難而不渴者此

為水與血結在血室也

一方土芍桂麩

家方解毒劑

加桂芍歸下物臭氣甚者必因結毒也

此劑主之

灸

食療

溫泉

○妊娠

家方順氣劑

加減主疏氣擇加橘蘇木之類或浮腫者  
加腹葵果苓朮枳安胎之主藥也若胎動  
則須加減用此四味妊中雜病當隨症施  
治有故無損雖大黃芒硝之快藥夫何畏  
之有

當歸芍藥湯

妊娠腹中疝痛者

乾姜人浸半夏丸

妊娠嘔吐不止者

葵子茯苓湯

大妊娠有水氣身重小便不利洒淅惡寒起

則頭眩者

○惡阻

黑丸子

順氣丸

惡藥氣者勿強用煎湯及咳有熱欲成勞  
症者灸數萬壯必勿忌灸

○妊娠

一方

茯苓 半橘 芩 姜 甘

○轉胞

腎氣丸

芩 薯 菜 澤 茯 牡 桂 附

芩附桂沉之類可換用

○催生

芩歸湯

或加桂或加芩難產死胎加鹿胎霜 催  
生法欲產時兒頭至產門當服藥催之或  
經日久而產婦困倦難生宜服藥以助其

氣力令兒速生

冬葵子湯 或海蘿

破水過早產道乾者 外臺秘要云冬葵  
子散治推淋胎動不安

葵 此 桑 茯 芩 歸 姜 葱

○死胎

芩歸湯

加葵或元氣衰者加芩附接桂及芩葵通  
滑忍之類須擇用胞衣不下亦同若胞衣  
不下則要使產婦心懷安泰矣縱淹延數  
日不下亦無害也臨事惶惶穩婆妄用手

本有淺  
姜湯氣  
乏勞力  
不足者  
兼用十  
二字

法由是多致損可勝數哉  
熊膽 鹿胎霜

○產後 小產治同本產

鹿胎霜

芎歸湯

擇加桂芍 稜木 或此芍 厄藥

獨芩湯

產後血暈不省人事者氣急熱煩者加童便

芩附湯

四肢厥冷氣弱者

小柴胡湯

在草蓐自發露得風四肢痛若煩熱頭痛

者並主產後吐不能食

竹葉湯

產後傷風寒發熱面赤喘而頭痛者

竹 葛 附 桔 芩 甘

當歸建中湯

或加芩 產後虛羸不足腹中刺痛不止

呼吸少氣或少腹中急攣痛引腰背不能

飲食或崩傷內衄不止加半膠若無歸以

芎代之無姜則以棗代之

芩半湯 嘔家用之

一方

附一  
防

袂 半 枳 朮 姜

枳實芍藥湯 腹痛不止者並治經水不利

枳 芍

一方

下來血 將 桃 麩

大承氣湯

產後七八日無表症少腹堅痛是惡露不盡也大便乾燥發熱日哺所煩燥者不食或譫語至夜則止

白虎湯

加減芩歸芍芩桂之類 產後發狂

涼膈散

主治同上 去枳加竹

將 芒 危 芩 堯 菝 竹 葉 甘

熊膽 鹿胎霜

薰醋法

妊娠家當預備薰醋炭火凡血暈不省人事者盛醋於器中投炭火使醋氣薰蒸入鼻內則蘇

通乳方

桔 果 大 蘇 中 薑 小 甘 干 瓢 圭

一方

果 桔 通 枳 薑 枳 甘

回乳方



神麩二錢 研酒服

一方 麥牙二兩 為末 每服五錢 白湯送下 甚良

小兒科

○臍風撮口

熊膽

一方

將 芩 連

小兒初生一七日內 被風忽為臍風撮口 壯熱如灼 十無一活 坐視其斃 良可憫也

古法曰 兒齒齦上有小胞子 如粟米狀 以溫水蘸熟烏髮手指輕輕擦破 即口開便安 不用服藥 未知然否 記以備後考 此一方 予有試效 故記

○口瘡重舌

小兒夜啼 欲飲乳 若口唇到乳上 即啼而不乳者 急取燈照口 若無瘡 舌上必腫也 重舌者 舌下腫突 其狀如又加一舌 故謂之重舌 非真兩舌也

一方

羔 桔 甘

家方五香湯

藿木 丁乳 沈 將

一方

苓 連 甘

熊膽 甘草

○夜啼客忤

小兒夜啼不止者必有癖也客忤者見生人  
氣忤犯而啼也

熊膽

灸

甘草

○急驚

半夏湯

加蚕蝎竹 去牙關緊急壯熱涎潮上視  
反張搐搦頭動

家方排毒劑

或加蚕蝎 自風邪發驚者先與此湯

一方

羔 將 苓 連 木 草

熊膽

昏悶不醒口禁者急開口灌下

灸 黑丸子

腹部 章門 涌泉 徹腹

證甚不出聲者灸至發聲

○慢驚

建中湯

加<sub>二</sub>葶附<sub>一</sub>四肢微冷口鼻氣微手足瘳癱

腹掣痛者

附子理中湯

求附湯

求附甘

四君子湯

慢驚雖難治之症而預備此四劑隨症加減用之或有兼用熊膽及灸而間得治者

幸也

熊膽

黑丸子

灸

○疳 癖

六味丸

大便秘結小便渾濁解願並主年長不能言不能行者

半 薯 菜 澤 菝 牡

熊膽

黑丸子

瞻連丸

皮黃肌瘦髮直尿白肚大青筋好食泥炭

茶米之類或便秘有時瀉腹內積塊諸蟲  
作痛

食療

鯪魚 山蛤 鼠肉 臭梧桐蟲 蠶

灸

調理乖違飲食失節甘肥過度又吐久瀉  
瀉久汗久虛久效下血久瘡之後皆成疔  
其症面色痿黃眼胞微腫作渴四肢消瘦  
腹肚脹大行步不能煩能飲食作渴或發  
熱等症無如灸須兼用食療熊膽黑九子  
蟾連丸殺蟲藥

○痘瘡

絲瓜湯

無論痘與非痘嬰兒身熱呵欠煩悶睡中  
驚悸噴嚏眼目溢鼻氣粗手足酸軟即返  
與此湯若有雜症隨症加減凡輕症順候  
自初發熱至結痂不須易劑或不與藥亦  
可也身熱甚腹脹喘加麻杏木驚搐時發  
兼用熊膽嘔家加半煩渴加果麥瀉短澁  
加茯苓通茶腹秘結加歸芍朴枳二三日後  
痘症定則加歸血熱多則加堯紅秘結喘  
滿壯熱煩躁面目浮腫唇燥舌苔甚則身

將一本  
作危

反惡寒四肢厥冷加將紫譫語狂亂加羔  
知咽喉痛加倍桔加旁濁血加犀危苓便  
血加桃連苓欬嗽加果杏味傷食嘔吐酸  
臭加半藿益木麥之類泄瀉加茯苓腰痛  
加獨腹痛加桂倍芍元氣虛溺便瀉者蔓  
著木木之類斟酌加減表實者勿加著有  
汗加著痘出後三四日當出齊如出不快  
加桂芷芎瀝加夜見點頭焦而色紫者血  
毒熾也加紫茜堯羔滑辰之類舌苔加連  
芩危藥便秘舌黃苔加將大都治痘當先  
詳辨虛實而後議治一見點色白不紅不  
可便作虛治白而無神唇舌淡白或吐或

瀉或腹膨或自汗肢冷神氣虛弱表裏皆  
虛也治從虛例若白起皓光唇舌赤紅非  
虛也三日後當漸變紅紫倘作虛而治之  
誤入不淺淺矣出兩日而大便秘舌無苔  
乃血熱也非毒壅也宜清解點見身熱毒  
味盡也但所感不同有寒氣外鬱者有熱  
毒內鬱者兩者俱散之內鬱黃苔下之至  
色漸焦紫隱隱不出而身熱壯甚或肌肉  
腫亮再大發之堯勞麻紫附蚕蝎甲蟬之  
類擇用隊伍五六日候當起脹如起不快或  
皮薄易破色不紅活真虛證也加蔓著芷  
桂乳酒七八日乃灌膿時也如停漿不灌

血色淡白或灌清水倍加浸著芷桂酒乳  
寒戰泄瀉灰白瘡塌皆不能免一見此證  
用加減異功散隨症進退若膿色一足唇  
舌轉紅又惟照本方斟酌加減加茯苓以  
助收斂耳不可拘泥溫補也凡虛症而反  
見腹脹喘急便秘而渴咽痛煩躁皆病淺  
藥深之過也九日十日結廕之時也虛症  
用浸著水茯苓丁香桂血熱用苓連堯解毒  
虛與實視唇舌紅否辨之虛熱渴飲無休  
加果麥味勿利小便瀉下甚者難治半廕  
半不廕而作瀉者不必慮非貫膿時之比  
也加水茯苓治之切忌濇劑誤用作痢也當

是之時協熱下利者用苓連水勿誤認為  
瀉下治之十二三日有下形如火燒煙薰者  
死生難決若聲清能食睡卧安爬破淋漓  
神氣清爽者生反之者死又當辨虛實治  
之唇舌潔淨溫補兼清解之唇燥舌苔便  
秘溼單解之凡當廕時而流漿不止加水  
茯苓或腐爛而和皮脫去者倒廕也加浸著  
丁香桂主之結痂後餘毒結癰咽喉腫痛口  
舌生瘡或目赤腫痛者返審虛實擇用排  
毒解毒之劑

家方排毒劑  
絲升芍桔甘

或加桂芍 主痘初熱頭痛腰痛甚者並  
治痘後餘毒傷風寒

白虎湯

主痘純紅臉赤而眼紅口氣熱唇口腫痛  
煩躁悶亂衾衣摸床小便赤大便秘身如  
火發斑譫語實熱等症並治口氣臭

桂枝白虎湯

治痘欲出未出腹脹喘滿目怒面浮毛直  
皮枯蒸蒸煩翁翁熱壅遏內攻者

人漫白虎湯

或加紫紅 自發熱至起脹時有熱症譫  
語狂亂者皆可與之

黃連解毒湯

或加升后連芍藥 主痘毒多唇燥舌苔  
或血熱熾為斑或青紫者清熱涼血

涼膈散

凡升散之後四五日之間猶有煩躁悶亂  
作渴不食唇腫腹脹或大便秘澀或瀉青  
黃水外則乾枯焦紫者四五日以上用之  
可下六日以下當行補托也 咬牙加連  
羔毒壅加甲麻

調胃承氣湯

或加半 主內實便秘者凡內熱不便者  
外必乾枯焦紫或無燥糞則不然勿用之

獨聖散

主<sub>レ</sub>痘四五日、徧身紅紫黑陷者、紫草湯送下、

甲 麝 蛭

奪命散

痘乾紅紫黑、煩躁悶亂、便秘驚悸者、量兒之強弱、與<sub>レ</sub>之、白虎湯送下、微利為度、

紫 粉 甘

芎歸湯

痘灰白色、根窠不紅、不光澤、

芎 歸 芍 紅 紫

保元湯

外無鬱滯、內無壅陷、毒盡熱清、但氣虛不聚者、若七八日上、毒味解者、鬱滯而無膿者、加<sub>レ</sub>連升、

著 蔓

黃耆建中湯

或加<sub>レ</sub>茸蔓、乾枯不潤、血枯不聚、

加減異功散

或加<sub>レ</sub>菴訶丁、糯米、凡痘至八九日、見<sub>レ</sub>虛寒症、即可與服之、

茯 蔓 朮 歸 桂 附 木 甘

蔓附湯

治<sub>レ</sub>虛證、肢厥、並寒戰、咬牙、及四肢不起、脹



者

理中湯

主胃虛瀉下或喫生冷水伏成腫或倒靨者瀉甚加訶藟

托裏發表湯

主風寒外襲或倒靨者

藜 附 麻 桂 木 甘

加減消毒飲

或加芷枳朴 主虛而結癰者自利加水

附便秘加將

歸 芍 芍 桂 桔 著 藜 甘

加減連翹飲

或加荆蟬連厄柴滑 主痘後一切癰毒

實症腹膨加腹

歸 翹 芍 柴 苓 通 旁 甘

加減潤燥湯

或加蟬柴苓將 治痘後咽喉腫痛或口

舌生瘡或目赤腫痛者

歸 堯 芍 連 厄 果 通 薄 竹 甘

敗草散

痘抓破作爛不乾者以此掩之經年蓋屋

草不拘多少燒脆為末摻上

松 苓 散

痘爛者松苓粉撲之

薰癢法

茵芨荆共為末，以紙撚條點火，薰之。  
一方 荆霜摻之。

○麻疹 水痘

家方排毒劑

或加桂芍 麻忌內實，只宜解散。初發熱，咳嗽噴嚏，鼻流清涕，眼胞腫，淚汪汪，而浮腫，腮赤咽痛，惡心乾嘔，逆避風寒，表散則腠理開暢，而麻毒易出也。加減法有嘔吐，加半咽喉痛，倍桔加旁，欬嗽加果，若

發表難出者，倍升，加麻旁蟬，便秘煩熱甚，而難出者，用將微利之，或大柴胡湯下之，虛人加淺，須審虛實而施治也。

小柴胡湯

或芍歸芍連尾紅旁堯隨症加減，發熱汗出者，此毒從汗散，有鼻衄者，此毒從血解，但不可遽止，若汗多血不止者，逆加減，此方治之，疹後餘熱口渴咳嗽不止，兼血症者，加果知膠艾，不早治後必為骨蒸勞瘵，兼用灼艾最可。

白虎湯

或加漫桂，色紫赤乾燥暗晦者，毒熾也。

發熱煩躁，譫語驚悸，煩渴者，此湯去之。

竹葉石膏湯

疹退後見熱，短氣煩躁，或譫語，或喘嗽，或嘔吐，或煩渴者，疹毒內逼，毒氣上行者，為嘔吐煩渴喘嗽等數症，以此湯去之。

家方順氣劑

或加連通升澤芍，毒氣下行則自利，不必慮毒從利解，須與此劑加減，毒甚則裏急後重，而為痢，例加芍苓連通，葛實者加將，虛者以葛姜湯送下，香連丸。

甘桔湯

咽喉腫痛，不能食，或加羔苓，腫壅水漿不

下咽，噎者，加麝礬皂，並治餘毒結癰，口瘡，凡大人為婦，須深用意，臨機應變，斟酌施治，為婦者，恐毒蒸胎，多受傷，雖然壯強，則無恙也，夫痘入內實，胎落母亡，疹入內虛，胎去母存，此說殊瑩。

家方排毒劑

主一切水痘，隨症加減，若無重証，宜參考瘡疹方而施治也。

附錄

○丸散方並經驗方

黑丸子 古方無衣

合歡 五錢 沈香 一錢 木香 二錢 黃連 四錢

熊膽 三錢

又方 今方熊膽為衣

我朮 五錢 合歡 四錢 黃連 三錢 木香 二錢

熊膽 三錢 一錢半為衣

一方

合歡 五錢 我朮 三錢 藥皮 二錢 胡黃連 錢

木香 一錢 熊膽 三錢

大香連丸

黃連 六錢 木香 一錢 五分 水丸

神祐丸

將 牽 各四錢 甘遂 大戟 羌 各二錢

通滯丸

我朮 侯莎 各三錢 將軍 一錢 五分

平心丸

青藤石 三錢 沉 二錢 五分 苓 將 各四錢

三黃丸

將 連 苓 各等分

順氣丸

我 莎 各三錢 水 二錢 乾姜 一錢 木 五錢

我朮丸

我 莎 各三錢

五靈脂丸

五靈脂 玄胡索 各等分

調中散

茯苓四錢芍藥五錢 莪四錢朴木 藿 良 各三錢

治中散

木各二錢 椒 丁各一錢 甘三分

備急圓

將 礞 巴

蟾連丸

蟾 連 各等分

奇應丸

熊膽三錢 蔓 沉 各四錢 麝一錢 金箔

麻仁丸

方見傷寒門

生津丹

莎 茯 稷 蜜丸

奇効丸代黑丸

莪 合歡 各四錢 藥皮 三錢 胡連 二錢

白礬丸

一方加鐵粉神麩 橘 各二錢 半 甘 一錢 半 綠礬 十錢 五

屠蘇散

或加苗稷赤豆

水

桂枝 中 枳 小

鯉魚湯方

鯉魚 自七八寸 昆布 一尺五寸

右水一升二合先煮昆布取六合去昆布內鯉魚煮取三合溫服惡苦味者去腸膽惡腥者或加柚或枳芽

藥湯方

硫黃三斤 鹽三升 酒一升

右水四斗五升攪煮釜中減二分為度或加糯米穀一二斗

藥酒方

酒一升 雞卵五枚 砂糖十錢 桂枝二錢  
樹二錢

家方排毒劑

右浸酒十五日成而服之 桂椒須盛囊  
或加此茶 其形如火燒而腫痛者名曰  
火灼瘡此方主之

狗咬毒

近年天下狗咬若咬之人則死 灸為第一  
上策其次用白虎湯承氣湯之類亦佳

鵝掌瘡方

馬醉木十錢 附子一錢  
右水一升 煮取五合 洗

治腋臭方

銅綠青大 木香少  
右二味極末 湯洗腋下薄之 凡壯者可 用  
虛人不可

治丹毒方

赤小豆末 雞卵 右煉蜜合點之

治漆瘡方

拔毒 一品煎洗  
遺尿失禁 灸腰眼或十九俞可也

逆挽湯

痢病泄瀉之主也 先與此方可試 虛實

蒼一錢 雌一錢 枳八分 棗八分 唐五分

姜二錢 甘一分 漫六分 虛者 加減方裏

急後重甚者加賓木倍 穰風証者加酒製

芍倍桂

白頭翁湯

翁二兩 連

藥 散 各三兩

柴胡抑肝湯

此二各半 芍

橘 牡各一兩 水 莎 厄

蘇 甘各一兩 曲八分 芍七分 堯五分 芩五分

生地黄丸

此 芩 各半兩 芩 各二兩

千金細辛散 治胸痺達背痛短氣方

辛 甘各一兩 枳 姜 果實 枳 水 各三兩

郵 茯苓 各五兩

右搗以酒服方寸匕

千金翼老君神明白散

附 水 各二兩 桔 辛 各一兩 烏頭 四兩

右搗篩絳囊盛帶之所居間里皆無病有後疫病者溫酒服方寸匕覆取汗得吐則差若三四日者以方寸匕內五升水煎合大沸分三服

醫事說約終

江戸本石町十軒店萬菱堂英平吉板行醫書目録

金匱要略輯義 全十冊 大本

東都醫官桂山多紀先生歷朝諸家ノ説ヲ集メ及千金外臺等ノ書ニ引トコトマデノ異同ヲ考校シ且先生ノ按ヲ各條ノ下ニ附ス  
金匱ノ諸説コノ書ニモルノ事ナシ實ニ註家ノ大成ニ

古方丸散方 全一冊 小本

東洞吉益先生著ス所ニ此書往年田信菴先生校正上本是歲  
マタ東洞家ノ分量考ヲ附シ重訂補刺ス

兼用丸散方機 全一冊 小本

コノ書ハ東洞先生作ニテ金匱傷寒ノ方ニ機變妙用アルヲ記  
東洞翁常用ノ方ニ臨病ノ機變コノ書ニツキタリ且丸散兼



用方書

一本堂醫事說約 全二冊 小本

コノ書ハ香川先生常ニ座右ニ於テ驗セシ方ヲ集録ス往ニ藥選  
行餘醫言等ノ書既ニ行ルトイハレ藥論病論ノミニテ方ヲ  
カク今コノ書ヲ合テ全備タリ香川家ノ四劑ヨリ始メ先生ノ  
定方漏クナシ

上池秘錄 小本一冊 西川國華先生輯

同續編 同一冊 同作

同三編 同一冊 同作

同四編 同一冊 同作

コノ書ハ古今丸散ノ方ヲ集ム先大人家ニハ奇應丸一粒金丹  
婦人家ニハ龍王湯安神散小兒家ニハ萬金丹龍角圓

古方家ニ紫圓備急圓ノ類ヨリ始メ各家ヲ部類シテ  
且諸家經ケンノ奇方ヲ卷末ニ附ス

外科上池秘錄 小本一冊 同作

此書ハ外科ニ用ル所ノ丸散并ニ膏藥ノ方ヲ集ム外科方  
書最第一也

傷寒方 一冊 小本 東都医官 多紀法眼 中澤養亭 作

此書ハ傷寒發病ノ初日ヨリ五日迄又五日ヨリ十二日迄ト初メヨリ  
廿日餘リノ間ヲ分ケ藥方ヲ著シ其間ニハ或ハ下利後發汗  
後ナド色々ノ證ヲ著シ各條ノ下ニ藥方ヲ著ス附録ニ山田  
正珍先生ノ温疫辨又ハ辟温方ナド委ク出ス傷寒ノ方此  
書ニモルコトナシ

救急選方 二冊 小本

東都醫官多紀先生輯ハル也先生ノ博覽廣才世ノ知トコト  
此書古今ノ医籍中ヨリ救急ノ奇方輯ム實ニ先生ニアラズ  
シテ此書ヲ作ル事能ハズ四方ノ医家必ズ藥籠中ニカムカズ

