



武中門
帶米
312

甲申新鑄

不許
翻刻

麻疹提綱

雷井堂藏板



麻疹提綱序

人生之大厄。莫甚於痘疹矣。疾病之急卒。莫迅於痘疹矣。一謬其治。則變易存亡。在一瞬之閒。豈可不慎哉。豈可不慎哉。而其爲治方也。精于痘而略于疹。世醫爲之誤者。或有之。僚友竹田君準卿有憾于茲。爲著一書。名曰麻疹提綱。病因

脉候。用藥養護之法。辨論剖析。無所不備。自謂古人所未言及。實至切之論也。蓋救厄濟急之功爲弘多矣。嘗聞君先公應安中遊明見金翁道士。受靈劑妙訣。暨禦疹名香之方。且獲奇書數部。而歸本邦。乃謹製名香。獻

後圓融院天皇

天皇賜御歌

賞之。且賜其名追儻香焉。其方傳于今施諸衆民。皆有驗矣。豈於此書亦別有所傳。遺旨秘訣歟。如其論說。則非吾所窺。故不敢贅也。頃其門生欲鋟之梓。於是君徵序于吾意者。往昔君先公與吾先人共浴。天恩或拜。

龍顏子


殿上南階。或曳素絹

于室町柳營。爾來拜謁

大城亦同官爵等僚班。凡四百年
來如一日。豈可耻吾不文而辭乎。
故題數言爲是序。

文政甲申春二月

特謁法印大藏卿源朝臣宗悟撰



麻疹提綱序

麻疹之爲病。古人已與痘竝論之也。然其說詳於痘。而略於疹。則後人何可法而則之哉。往昔享和二年。吾先人及叔母羅此疾而殞。吾常不能無遺憾焉。特恨其無明論也。

茲歲孟春，竹君雷井先生爲門徒錄，麻疹證候竝治方，以爲一部。其辭簡而要，其法約而中，可謂治疹之準繩也。豈啻諸子之賜哉？實天下蒼生之幸也。真道與諸子同謀，而欲鋟諸梓以傳於天下後世。

先生曰：一家言不足以語天下也。况齊人之所好，則固楚人之所惡乎？暫措諸，真道對曰：嘗聞古人苟留志於利濟，其小者且爲之。今此書行，則其功亦不少焉。且人毀之者，固在其人，而不在先生也。若

傳寫致謬而失大義。蓋其蔽
不少焉。敢要而上木。真道不
憚短才。以書諸卷端云。

文政甲申孟春

官醫 生野松壽源真道君美父撰並書



自序
古人之治麻癈者。或
投寒藥以務清熱。或
因時令而立治法也。
蓋不能各無其蔽矣。

余甚憾焉。茲歲孟春
余有病缺若乃予

朝謁。病間則為麻疹
提綱。而辨其脉證治
法。以示生徒。厭演說




之勞也。而生徒請壽
諸梨棗。要以傳寫致
謬。而失大義。余不得
敢拒其請。卒附劄刷。
嗚呼。梨棗亦何冤也。

余幼而失先人。受學
於家寧福島。恕。且性
懶惰。加以淺見寡聞。
如其文辭。則非余所
固能也。大方君子幸。

勿謂拙陋。云爾。

文政甲申二月既望

竹田公欽準卿識



自序

留夫宣子雅

麻疹提綱

帶喚書外雷井堂

題言

示來學之主教相交更甲申孟春

麻疹亦一疫也。猶歲氣觸胎毒而發痘也。而痘無歲不行。疹則不然。我邦自享保庚戌以來。凡二十餘年而行。其間斷然未嘗見一人羅此患者。蓋天地厲氣之行。自有其時。而非所謂五運六氣所能定也。其氣大約起於西南。而流於東北。其際無論長幼強弱。得能免者幾罕矣。然人生一染

麻疹提綱

雷井堂藏

之則終身不復感。又不可以常疫並論也。嗚呼。疹其神疫矣哉。古人有言曰。麻疹出於六府。屬陽主氣。故有形無漿。治宜以清火滋陰爲主。首尾忌燥焊之劑。後人誤認此說者。不少矣。享和二年流行之際。用藥失宜。而誤人僉。不知幾百人矣。豈可不哀乎。茲歲甲申疹復行。余雖不敏。而守長沙之遺法。辨其脉證。並治法。以示來學之生徒。時文政甲申孟春望。竹田治部卿書於雷井堂。

麻疹提綱

竹田特謁法印

治部卿藤朝臣公欽著

○疹初熱大意
○麻疹之感於身體。陽氣先失其健運也。故洒然惡風。凜然憎寒者。陽氣壅遏也。而陽者火也。氣與火猶形影之相依也。氣行則火隨之。氣留則火亦留。唯氣能靈。而火不靈也。氣失其健運。則從火之性。故翕翕發熱。薰薰惡熱者。陽氣之炎熱也。既壅遏又炎熱。乃諸證

從而起焉。蓋起疹之機。在此一時。先視唇舌燥潤。以定熱之輕重。

○麻疹先發熱而出。猶痘發熱而出也。而痘不可以熱之微甚。豫定病之輕重。唯疹可以下。中。上。唯疹可以熱之微甚。輒定毒之輕重矣。何則。以首尾二於熱也。

○疹先發熱而出。出則其熱從而解。故一熱必用發散之劑。亦猶痘初熱以發散爲常也。若不曉其理。只視熱煩。專投寒涼。乃望其清熱。是所謂忘其本。徒治其標也。

○初熱之時。以發汗之劑者。一定之法也。然而譖語煩亂。渴飲無度。而唇舌燥裂者。或內結壅鬱者。非用寒涼之劑。攻下之劑。則不能以發疹而退熱也。乃不可拘於常法。

○古人因時令。而立法。曰時溫暖。藥用辛溫。時暄熱。藥用辛寒。時大寒。藥用辛熱。時寒時暖。藥用辛平。余則不然。藥不以從時令。而藥惟以從其證爲法。若專因時令而立法。猶

膠柱而鼓瑟也。不可從矣。

○古人以爲。疹之毒輕於痘。證候治法詳於痘。略於疹。然疹亦其證急卒。用藥失其宜。則其殃如反掌。可不懼乎。

辨初熱證候并治法

○古人以爲。痘初熱似傷寒。惟麻必咳嗽噴嚏。鼻流清涕。眼胞腫。其淚汪汪。面浮腫。雙腮赤。惡心乾嘔爲異。

按。傷寒痘瘡。未必無此證也。然疹必咽喉

煩冤而咳嗽者。僅可爲麻疹之證驗矣。

○疹之初。先覺惡寒而純熱頭痛。身體酸痛。噴嚏鼻流清涕。眼胞腫。或惡心。或乾嘔。必咽喉戟辣而咳嗽者。麻疹之候也。感之輕者。脉不甚數而渴。或不渴。舌上白苔不乾。或無苔者。宜平穩發散之劑。脉浮數譫語熱煩。唇舌燥渴者。宜寒涼發散之劑。若譫語煩亂。渴飲無度。而唇舌燥烈者。宜寒涼之劑。若內結壅鬱而煩躁。舌有黃胎者。宜攻下之劑。

發散劑

凡疹初熱必咽喉戰竦而咬噉者是疹之證而輕重俱有每方不載之。

葛根湯 脉浮數惡寒發熱頭項疼痛身體酸痛無汗乾嘔及下利者。

葛根 麻黃 桂枝 茯苓 甘艸

生姜 大棗

右七味以水一合五勺煮取八勺。

○凡加減於方者不可不審其證矣蓋本湯

之證而別見一證則視某證而知其所以然者更加治某證之藥以治之減亦如此又宜因仲景加減之方以推類而用之也若渴者加括蔞根則桂枝湯柴胡湯加括蔞是也嘔者加半夏則葛根加半夏湯是也喘者加杏人則桂枝加厚朴杏子湯是也難以一一枚舉焉唯要隨證而斟酌。

○按葛根湯於咳嗽咽痛乾嘔長沙之所不載也而疹初熱用此方則本方證外更有

咳嗽咽痛乾嘔之證。而似可加某藥。而治其證者也。然今以其證考之。蓋此三者。不固因痰飲之變。而特鬱熱使之然也。故其於咳嗽也。惟以發疹爲要。疹出則鬱熱從而解。鬱熱解則咳嗽自止。但發疹者。必用汗藥。是葛根麻黃桂枝之所主也。咽痛者。專用甘艸。論曰。少陰病咽痛。與甘艸湯是也。生姜能止乾嘔。故桂枝湯證云。乾嘔是也。乃此所以照常而不加味也。如之何。豈

可認爲痰。以加五味麥門止咳嗽。加桔梗惡實療咽痛。加半夏乾姜治乾嘔者哉。其○按葛根湯於下利也。蓋邪熱不能外泄。而反併於胃。胃津液之府也。熱入則津液爲之內潰而下泄也。故唯用發汗之方。而誘邪於表。則下利自止。論曰。大陽陽明合病必自利者。葛根湯主之是也。何可加茯苓白朮而分利之哉。

○或曰。麻疹發熱。得疹而解。傷寒發熱。得汗

而解者。固不相同也。且疹熱病也。古人已忌用辛溫之藥。彼桂枝麻黃俱辛溫。而傷寒發汗之藥。今反用之。則恐以熱而助熱也。而子特不疑者何也。曰。夫疹之起也。必先惡寒而發熱。傷寒亦先惡寒而發熱者。是皆格陽於外。而壅鬱爲熱。言其部位。則爲表。論其理。則一也。雖疹曰熱病。而其熱不必蒸蒸惡熱。而翕翕發熱者。又論熱之狀情。則一也。已同其理。同其部位。又同其熱。則何可不同其藥哉。

况陽氣鬱遏。非微汗則不舒。故一熱必投汗藥。以發之。鬱熱得疹而解。猶傷寒發熱得汗而解。雖疹與汗異。而理則一也。若舉桂枝麻黃。而措諸惡熱煩躁。則其爲害不少矣。豈特疹哉。傷寒亦如此也。然則何疑。

麻黃湯 脉浮數。惡寒發熱。體痛無汗。而喘者。

麻黃 桂枝 甘艸 杏仁

右四味照常煎服。

升麻葛根湯入門。脉浮。惡寒。發熱。身體酸痛者。

葛根 升麻 荻藥 甘艸

右四味。照常煎服。渴者。加括蒌。嘔者。加半夏。下利者。加桂枝。麻黃。蓋葛根得桂麻。則逞其伎能。故能誘邪於表。而止下利也。

解肌湯。千金葛根湯證。而心煩者。

葛根 麻黃 黃芩 荻藥 甘艸

大棗

右六味。照常煎服。甘草 杏仁 桂枝 甘艸 荻藥

升麻發表湯。六書證同。麻黃湯。

大棗 麻黃 杏仁 桂枝 甘艸 荻藥
白芷 獨活 防風 升麻 生姜

大棗

右十一味。照常煎服。

寒涼發散劑

越婢湯。惡寒。發熱。心煩。乾嘔。唇舌燥渴。而汗出者。

麻黃 石膏 生姜 大棗 甘艸

右五味照常煎服。

麻杏甘石湯 惡寒發熱。唇舌乾燥。喘而

汗出者。

麻黃 杏仁 甘艸 石膏

右四味照常煎服。

大青龍湯 脉浮緊。惡寒發熱。微喘乾嘔。身疼痛。不汗出。而煩躁者。

麻黃 桂枝 甘艸 杏仁 生姜

大棗 石膏

右七味照常煎服。

麻黃升麻湯 入門大青龍湯證。而不喘者。

麻黃 升麻 芍藥 黃芩 石膏

茯苓 甘艸 生姜

右八味照常煎服。

按此方加茯苓者。蓋本於越婢加术湯。麻黃加术湯。然彼則施於濕家身體疼痛。面目浮腫。小便不利。脉沉者。故更加术。以又

內利其水也。此則本主於傷寒、惡寒、憎熱、無汗。骨節疼痛。脉浮者。惟專於發汗。而反加苓者。爲無謂也。今疹初熱。亦專於解表。宜去之。

寒涼劑

白虎湯 脉洪大。惡熱譖語。渴飲無度。而唇舌燥烈者。

知母 石膏 甘艸 穰米

右四味。照常煎服。

白虎加桂枝湯 脉浮大。惡熱煩渴。而肢節煩疼。惡風者。

於白虎湯加桂枝。

竹葉石膏湯 惡熱少氣。氣逆欲吐者。

竹葉 石膏 半夏 麥門 人參
甘艸 穰米

右七味。照常煎服

攻下劑

大柴胡湯 脉沉數。熱毒在裏。胸脅苦滿。

心下痞鞕。或腹痛。不大便而嘔。舌黃苔者。
柴胡 黃芩 半夏 茯苓 枳實

大棗 生姜

右七味。照常煎服

小承氣湯 腹滿或痛。惡熱譫語。不大便
而舌苔者。

大黃 厚朴 枳實

右三味。照常煎服

大承氣湯 熱結在裏。腹滿惡熱。譫語煩

大黃 厚朴 枳實 芒硝

躁黑苔乾燥。不大便而渴。或下利臭水者。
右四味。以水一合二勺。先煮大黃枳實厚
朴。取六勺。去滓內芒硝消。更上火一二沸。
大黃硝石湯 惡熱譫語。短氣煩躁。二便
不利。而舌苔乾燥者。

大黃 黃柏 硝石 枳子

右四味。煎法同大承氣湯

桂枝大黃湯 六書心中痞塞。胸脅逆滿。不
大

便而氣逆撞者。

桂枝 芍藥 大黃 柴胡 枳實
甘艸 檳榔 生姜 大棗

右九味。

六一順氣湯

六書

大柴胡湯證。而黑苔乾燥者。

柴胡 黃芩 芍藥 枳實 厚朴

大黃

甘艸

芒硝

右八味煎法同大承氣湯。

凡結毒壅遏之證。一下之。得快利乃止。不必

盡劑。下後用排毒之藥。而發疹爲要。

○初熱必咳者。因熱氣薰騰而疹出於咽喉也。非固痰飲所爲。然有痰飲而咳。或熱鬱而喘者。治各有其法。痰飲咳嗽之方見於後。熱鬱喘之方見於前。

○乾嘔者。疹出則嘔自止。切不可用止嘔之藥。若胸中煩悶而嘔者。宜表裏雙解之劑。若胸中閉塞。氣上衝咽喉。而不能息者。毒結於胸膈也。宜吐之。吐則疹出。吐中自有發散之義。

表裏雙解劑

柴胡桂枝湯 癰熱汗出。肢節煩疼。心下
支結。而嘔者。

桂枝 黃芩 人參 甘艸 半夏

芍藥 大棗 柴胡 生姜
右九味。照常煎服。

金翁柴葛湯 癰熱無汗。身體疼痛。胸滿
喜嘔者。

柴胡 黃芩 人參 甘艸 半夏

生姜 大棗 葛根 麻黃 桂枝
芍藥
右十一味。照常煎服。

金翁。明洪武人也。應安二年。先人竹田山
城守。遂明學醫於金翁道士。故其秘方。傳
於家。

參蘇飲局方。心下支結。心煩喜嘔。惡寒發熱。
而汗出者。

紫蘇 葛根 前胡 桔梗 半夏
人參 橘皮 枳實 木香 生姜

大棗

右十一味。照常煎服。

敗毒散。局方。胸滿嘔吐。憎熱體痛。而汗不出者。

柴胡

防風

獨活

半夏

桔梗

人參

芍藥

枳實

甘艸

茯苓

生姜

右十一味。照常煎服。案此方用羌活獨活。本一物而無異。故以防風代羌活。前胡。柴葛解肌湯六書。前證而惡熱譫語。唇舌燥渴者。

柴胡

黃芩

葛根

芍藥

獨活

白芷

桔梗

石膏

甘艸

半夏

右十味。照常煎服。按此方本無半夏。今加之。

吐劑

金翁蒜梔散

心中溫溫。欲吐而不吐者。

石蒜 五分 梔子 一令

右細末。先以二分白湯送下。得快吐乃止。
後服。

又方 證同上。茶最下品者濃煎候漸冷。
而加鹽少許飲之即吐。

爪蒂散 證同上

爪蒂 赤小豆 各一分

右二味各別擣篩爲散。

按凡用吐劑者要審其人之虛實而用之。

用之又有口訣。病人心中懊懨之時案第
五六髓而吐氣愈加者吐之而無妨。乾嘔
者及亡血家慎勿吐之矣。

○自下者是脇熱而下利也不必爲意。熱毒
從下利而解先用發散之劑不_止者用脇熱
利之治法不可遽用滯滯之劑若胃中有結
毒而下利者大便極臭或下利臭水者宜下
之。脇熱利之治方見於後

調胃承氣湯 胃中有熱毒而下利者。

大黃 甘草 芒硝

右三味以水一合二勺先煮大黃甘草取六勺內芒硝結毒甚者宜大承氣湯方見於前○汗出者為表虛是熱從自汗而解表虛者疹易出仍用升提之劑若汗大出而不止者熱傷津液也渴飲無度而唇舌燥烈者用寒涼之劑若內壅而汗出者煩躁擾亂互下之各方見於前

升提之劑

桂枝湯 脉浮弱惡寒發熱頭痛鼻鳴乾嘔者

桂枝 芍藥 生姜 大棗 甘艸

右六味照常煎服不須啜粥渴者加桔蔓喘者加杏仁

桂枝加黃芪湯 前証而汗出不止者

於桂枝湯方加黃蓍

桂枝加葛根湯 桂枝湯証而項背強躰酸痛者

於桂枝湯方。加葛根。

踈邪實表湯。六書証同桂枝湯。

於桂枝湯方。加防風 蒜窮 獨活

白术

化毒湯。活人壯熱而汗出者。

紫草 升麻 甘草

右三味。照常煎服。

補中益氣湯。升慈脉弱。陽氣不振。胸滿或嘔。

汗出者。

人参 白术 當歸 甘草 橘皮

紫胡

升麻

黃耆

甘草 不大動血

右八味。照常煎服。心煩者加黃柏。

○鼻衄者。熱毒從血而去。不可遽止其血。若

血不止者。宜清熱之劑。

連翹飲。活人熱煩而衄者。

連翹 防風 甘草 柏子

右四味。照常煎服。

三物黃芩湯。心中煩冤。而衄者。

黃芩 苦參 地黃

右三味照常煎服。毒甚者加犀角。
生犀散直訣憎熱。疹不出而衄者。

犀角 地骨 茯藥 柴胡 葛根
甘草

右六味以水一合五勺先煮地骨。芍藥。柴
胡。葛根。甘草。取八勺去滓。內犀角屑。

三黃瀉心湯

心下痞。口燥煩。不大便而
衄者。

大黃 黃連 黃芩

右三味以沸湯水一合。煮二三沸去滓。
○發熱五六日。而疹不出者。為表實。表實則
疹難出。更無裏証者。宜大發之。

金翁排毒湯 表實疹不出者

麻黃 葛根 甘草 鹿角 穿山甲
反梶

右六味照常煎服。

麻疹提綱
卷之三
十七 雷井堂藏
發透大意

○疹發熱二三日而漸出者為輕。將出之時宜避風寒。僅覺皮膚粟起則疹沒可慎。已出之後要視其形色而察毒之輕重不使毒到於內攻也。

○疹齊出則熱自解。猶痘齊出而熱解也。痘已出之後氣血定位。毒自制伏成膿。元氣盛者。毒易消化。故以補托為主者是痘之治也。疹則異之。已出之後只肉腫而鬱陽得舒。則

熱毒消散也。若熱毒不能悉泄於外。而一半內遷而傳於胃。則或自利而解者。毒自制伏也。唯陽氣宣達者。毒易消化。故以清解為常者。是疹之治也。乃所以痘疹不同也。

辨發透證候并治法

○疹自耳後項上腰腿而先見者為常。頭面不出者為重。

○疹頂尖而不長。形小而勻淨者為常。色淡紅者。其毒為輕。色白者為陽虛。紫紅者為重。

黑黯乾燥者。熱毒最甚。

○齊出之後。熱漸減。而脉漸靜者。為順。若出而不齊。熱依然不退者。因發散之不足也。宜復發之。

○齊出之後。熱減。而脉數急者。後必有慮。

○疹已出。而忽沒者。風寒逼之也。遷延而不

發。則毒必內攻。宜急發之。疹復出而安。

○齊出而黑色。忽沒者。欲為內攻可懼。

凡毒內攻。則必氣喘心悶。鼻扇口張。直視。煩

躁擾亂。此為難治。風寒外襲。則不然。宜審唇舌而治之。

黃芩

黃芩

秦艽

○齊出之後。忽下利者。宜審其證而治之。實者下之。脇熱者。因清熱之法。泄瀉者。用其法。唯以唇舌燥潤為標準焉。

葛根黃芩黃連湯 脉浮數。心中煩悸。而

下利者。

葛根

黃連

黃芩

甘草

右四味。照常煎服。

黃芩湯 心煩。腹痛下利者。

黃芩 甘草 茯苓 大棗

右四味。照常煎服。

黃連解毒湯 外臺惡熱譫語。煩躁下利者。

黃連 黃芩 黃柏 柏子

右四味。照常煎服。

白頭翁湯 熱利下重者。

白頭翁 黃連 黃柏 秦皮

右四味。照常煎服。

桂枝人參湯 下臍脇熱泄瀉。心下痞鞕。或嘔者。

桂枝 甘草 术 人參 乾姜

右五味。照常煎服。

錢氏白术散 方考 脇熱泄瀉而渴者。

人參 白术 茯苓 葛根 蔴香

木香 甘草

右七味。照常煎服。

人參湯 胸中有寒。心下支結。腹痛泄瀉

者。

人参 甘草 术 乾姜

右四味。照常煎服。

半夏瀉心湯 心下痞鞕。脇下有水氣。腹中雷鳴。下利者。

半夏 黃芩 乾姜 人參 甘草

黃連 大棗

右七味。照常煎服。

五苓散 下利欲飲水。而小便不利者。

猪苓 澤瀉 茯苓 桂枝 术
右五味。以沸湯一合。煮五六沸。去滓。
胃苓湯。四春。胃中不和。下利而渴。小便不利者。

橘皮 厚朴 蒼朮 猪苓 澤瀉
茯苓 菖蒲 桂枝

右八味。照常煎服。按此方。本有白朮生姜大棗。今去之。

○齊出之後。熟毒滯於咽喉。而腫痛者。外吹

以清熱止痛之藥。內飲以敗毒之劑。不愈者。
宜微下之。

金翁宣志散

辰砂

二分

青黛

三分

礬石

一分毒甚者
以蓬硝代之

右以管吹入咽喉。

桔梗湯

咽痛吐濁唾者。

桔梗 甘草

右二味照常煎服。毒甚者加犀角。

半夏厚朴湯

痰飲痛。咽中如有炙脔者。

半夏 厚朴 茯苓 生姜 蘇葉

右五味照常煎服。

射干鼠粘子湯

陳氏

熱毒為痛者。

惡實即鼠粘子

甘草 升麻 射干

右四味照常煎服。

消毒飲

局方

証同上

惡實

荊芥 甘草 防風

右四味照常煎服。

牛房子湯

濟世

前証而熱毒甚者。

惡實即牛房

玄參 犀角 升麻 黃芩

通草

桔梗

甘艸

右八味以水一合八勺先煮七味取六勺去滓內犀角屑

涼膈散

局方

惡熱煩渴口舌生瘡二便不利而咽痛者

薄荷

甘草

連翹

大黃

芒硝

桔梗

梔子

黃芩

右八味以水一合二勺先煮七味取六勺

去滓內芒硝

○齊出之後火邪內逼毒上行則嘔吐內實而舌有黃苔者下之蓋下焦已不通毒逆於上而嘔吐下之則結毒去而嘔自止也若熱渴而舌燥者宜寒涼之劑否則用清熱之劑若有停飲而嘔者治從其法

清熱止嘔方

黃芩加半夏生姜湯 胃中煩冤而嘔吐者於黃芩湯方加半夏生姜

小紫胡湯 胃脇苦滿而嘔者

紫胡 黃芩 人參 甘草 半夏

生姜 大棗

右七味。照常煎服。

梔子生姜豉湯 心中懊懹而嘔者。

梔子 香豉 生姜

右三味以水一合五勺。先煮梔子生姜。取一合。內豉。更煮取六勺。

橘皮竹茹湯

熱在胃膈而嘔逆者。

橘皮 竹茹 大棗 生姜 甘草

人參

桔梗 荷葉 飲食 雜藥

右六味。照常煎服。

驅痰止嘔方

吳茱萸湯 胸滿而嘔吐涎沫者。

吳茱萸 人參 生姜 大棗

右四味。照常煎服。

小半夏湯 心中憤然嘔者。

半夏 生姜

右二味。照常煎服。

半夏瀉心湯

嘔而脇鳴心下痞者。方見於前

金翁半夏霍香湯

心下支結。得食則嘔。

或時吞酸者。

半夏

藿香

乾姜

茯苓

橘皮

白朮

人參

甘草

枕香

右九味。照常煎服。

利水止嘔方

猪苓湯

嘔而渴。小便不利者。

猪苓

茯苓

阿膠

滑石

澤瀉

右五味以一合五勺。煮取八勺。去滓內膠
烊消。

茯苓澤瀉湯

証同上。五苓散亦主之。

茯苓

澤瀉

甘艸

桂枝

朮

生姜

右六味。照常煎服。

茯苓飲

胸中有停飲。氣滿不食。而吐宿
水者。

茯苓

人參

朮

枳實

橘皮

生姜

右六味照常煎服。

茯苓半夏湯。春胃中不和。心下痞鞶。嘔而不食。小便不利者。

茯苓 半夏 蒼朮 厚朴 橘皮
砂仁 薤香 烏梅 乾姜 甘艸

右十味照常煎服。

収後大意

○夫疹已不膿。其収不膿。漫漶収退者。固不如痘釀膿収膿落痂也。痘為瘡。藉氣血為形。又以氣血為毒。故釀膿収膿落痂。而毒盡於外。毒盡而愈。愈後有瘢。而仍餘毒為患。不少矣。特疹藉氣為形。又以氣為毒。故其収退忽然如失。亦為熟毒已泄於外也。然而其已不膿。又漫漶収退。則熟毒不能盡泄於外。反轉於內者許多。况疹固為熟病乎。是以疹退之

麻疹指掌 卷之六
後胸滿不食。或晝夜純熱。或腹滿大便不通。
或下利膿血。或裏急後重者。皆餘熱轉于胃
之所致也。故及其退。乃要審脉証并唇舌。而
慮熱毒轉入于胃也。

○疹齊出三日而退者為輕。四五日而不退
者為重。本因感受之輕重也。不収者專與解
毒之劑。務解其毒。毒盡則疹自消。只欲不使
毒至於內遷也。

辨収後證候并治法

○収後脉緩。食進安眠。小便自利者。熱已解
也。脉數者。毒未欲解。

○収後熱未解。而小便不利者。宜利小便。
金翁芩芎湯 治痘疹後。發熱小便不利
者。

茯苓 芎芢 菖蒲 白术 泽瀉
梔子

右六味照常煎服。毒者加犀角。

五芩散 渴而小便不利者。方見於前

○。叔後。譫語煩熱。不大便而渴者。是熱傳胃也。宜調胃承氣湯。若胸滿不食。而嘔者。宜大柴胡湯。各方見於前。

○。凡叔後。見舌苔黃黑者。乃下之。一下後。苔去則止。不必盡劑。古人有言曰。常毒治病。十去其八。

○。叔後。便血者。熱毒穿破血絡。而漸於腸胃也。

○。叔後。咳嗽及聲啞者。本因應發而不發。熱

傷肺氣也。宜清肺之劑。若飲水大多而咳者。宜治其水。

麥門冬湯。大逆上氣。咽喉不利。咳嗽者。

大棗

右六味。照常煎服。

葶藶大棗湯

咳而喘鳴。不得卧者。

葶藶

大棗

右二味。照常煎服。

小青龍加石羔湯 肺脹欬而上氣心煩
脉浮者。

麻黃 茯苓 桂枝 細辛 甘艸

乾薑 五味 半夏 石膏

右九味照常煎服。

桔梗湯 咽痛咳而出濁唾者。方見於前
溫肺湯局方 胸中有寒。咳而不能坐臥者。

芍藥 五味 乾姜 桂枝 半夏

橘皮

杏仁

甘草

細辛

右九味照常煎服。

人參湯本事 往來寒熱。胃滿不食。小便不利。

而咳欬者。

人參 白朮 茯苓 半夏 甘艸

當歸

芍藥

葛根

柴胡

黃芩

右十味照常煎服。

苓桂味甘湯 心中悸而咳者。

茯苓

桂枝

五味

甘艸

右四味照常煎服。

猪苓湯 渴欲飲水而咳者。方見於前。

芩甘五味姜辛湯 咳而胃滿者。

茯苓 甘艸 乾姜 細辛 五味

右五味照常煎服。

○ 収後咀痛者。牙疳者。唇舌腫者。口氣惡臭者。眼疾者。耳聾者。癩癬者。變癟利者。為蒸熱者。發惡瘡者。皆因應發而不發。應下而不下。熱毒鬱積之所致也。各審其証而治之。各方不載

大連翹飲 瘰後餘熱不解者。

方不載

金翁消毒湯 用痘疹後之諸熱。

梔子 紫胡 芍藥 桔梗 黃芩
甘草 土茯苓 芎藭 牛角

右九味照常煎服。實者加大黃。

○ 痘本熱病也。首尾俱忌溫補之藥。然而用藥失其節。及誤治者。侥幸得生。亦陽氣既已虛棄。並不可以常法而論焉。收後下利洞泄而咳者。陽氣不振。飲食不進者。心氣不足。而健忘者。不語者。皆為陽虛也。治宜審唇舌而

用溫輔之藥中各方不載

○婦人經水適來無他症者。熱毒從血而去。
治不異於男子已。孕婦亦無他症者。與常婦
無異已。然藥治失節。則熱毒稽留於內。而墮
胎也。藥惟投其時。則有安胎之妙也。蓋疹將
出也。壅鬱而毒專在表。輒可發之矣。疹固不
同於痘毒。釀膿內動氣血也。故熱雖甚。不敢
傷胎。但一發之後。疹出熱解。而胎乃安矣。若
煩渴譫語者。即清之內結壅鬱者。即下之。但

清下而得疹。則熱去而胎自固矣。假令其出
之後。熱反傳於內。亦一下之。則熱結去。而乃
不至傷胎也。但疹既出。則毒已外泄。不如傷
寒溫疫。表証不得汗。遂傳於胃。而找賦內藏
之為甚也。夫痘瘡傷寒溫疫之重。用藥中節。
乃無害於其胎焉。何況疹乎。雖然應發而不
發。應清而不清。應下而不下。則熱毒鬱積。而
乃傷其胎。然胎去熱毒從此而解。不如痘之
墮胎而母必死也。凡熱蒸而墮胎者。審其証。

而從調血之策。

飲食消息

○凡疹渴者。以熱傷津液。故引飲耳。古人用綠豆炒米湯。但思飲者。即酌量與之。不可盡意多飲。則水停心下。必有咳嗽乾嘔之變。凡渴者。砂糖及炒麥葛粉。天花粉湯。宜易湯水而與之。皆是解熱止渴之品也。若有嘔氣而惡甘者。絲瓜湯。或白滾湯。亦佳。冷熱適其所好。若大渴思冷水者。不必禁。但不多與已。蓋

內熱之極。非水不能救也。若渴不止者。兼與梅漿。橙漿。外臺云。凡治熱以酸。近來西洋科多用此方。

○疹有首尾能食者。不食者。食者與粥及軟飯。不可多食。不食者。不得強與食。唯可與粥飲。而存穀氣。思食則先與稀粥。漸進軟飯。宜酌量與之。不得恣喫。忽加吞酸。反覺無味。乃胃氣傷也。不可不慎。

○凡疹首尾。禁生冷。粘滑肉麪。五辛。酒酪。臭

惡等物

○疹毒輕於痘固也。然差後禁忌反同於痘者。蓋疹亦以差後脉惟不復於常也。脉之復也有十餘日而復者。或有二三十日而不復者也。脉不復則雖氣力如常而犯禁忌者災害立起不死亦危焉。世醫立禁忌之法。飲食以七十五日房事以一百日為期者。是大槩之法而已。余則不期以日數。而唯期以氣力復平之後脉復於常也。脉復常則飲食及房俗之便宜而不可全廢矣。

宦醫

服部了元直溫子恭

吉田侍醫

岩田昌庵廣房同校

杵筑侍醫

近藤秀庵定孝

麻疹提綱畢

雷井先生著述

傷寒論辨解

六卷未刻

同脉證考

三卷近刻

方考

二卷未刻

豌豆說約

一卷未刻

徽瘡論

二卷近刻

雷井雜記

一卷未刻

司馬元泰謹書

雷井竹君麻疹提綱刻成。乃拜讀之。題詞曰。疹其神疫矣哉。蓋痘麻雖同是一疫哉。人得之構精之始焉。陽火爲麻。陰火爲痘。天地以化工之妙。

驅使歲氣而令人得爲人。其
或爲死者。何在人而不在天
也。竹君稱曰神疫。嗚呼宜
哉。大濱恭有謹題

雷井林書林參同



書肆

鴈金屋

青山堂清吉

西宮

北林堂彌兵衛

