





門 賦
籍 314
卷

東郭方意解

目次

小莖胡一

柴胡加急痧二

四逆散五

升陽散火九

七味清脾七

温胆三

四君子

大莖胡

莖胡桂姜

抑肝加芍

補中益氣

人參養胃

竹茹温胆

異功散

莖胡加芒消

莖胡加桂

參胡芍藥

九味清脾

莖葛解肌

淨府湯

六君子



文

香飲君

四物湯

芫荽湯

鎮火湯

加味四物

八物湯

十全大補

滋陰降火

寧肺湯

腎氣丸

香蘇散

行氣香蘇

分心氣飲

三和散

半夏厚朴

理氣湯

寬中湯

沈香降氣

蘇子降氣

治喘方

瓜蒌枳實

人參敗毒

駝爪解毒

黃連解毒

涼膈散

溫經湯

甘草干姜

安中散

香薷飲

十味香薷

白朮湯

逍遙散附加味逍遙

方意解

東郭和由先生口授

門人筆記

小建胡湯

大陽の寒表症を治す故其熱消漸す往來する少陽証下を治す必兩肢心下裏すう覺て心思必了んた
 之是日熱と云ふてイヤナリ食餌杯不思ハカ
 ウニル也既如此成ハ病所為ニ非ハ兩肢肝部牽縮
 牙始り延テ心下すて否硬在故胃口ヲ閉塞由昌
 ニ飲ラ蓋故其飲胸中ニ迫ラ心煩喜嘆ヲ移リ飲テ

胃口ヲ塞ク故ニ飲食ヲ思フ氣ガ閉テ黙々也是ニ曰ク
莖胡ヲ主茶ニ兩肢ヲ緩ク黄芩心下ヲ緩ク半夏生姜
胃口及胃中ノ飲ラサキ大走甘草人参心下ヲ和シ是ニ
通ク方急ニ謹ラ按ズルニ人多ク用ルニ是迄數日ノ間發汗或
誤治共ク致シ且連日不食在ニ曰ク自然ト胃ノ氣ニ缺クル
処出兼テ心下ヲ緩循リ患クナル病症故黄芩半夏生姜
ノ類ガリニテ推循ラスコトニテハ後ニ難シ是ニ曰ク人参甘
温ニテ胃氣ヲ助テ和カシ心下ヲ緩ク甘草大走ハ莖胡黄
芩半夏峻キ処ヲツクリトセシ為ニテ又人参ニ組合セ俱

ニ胃氣ヲ助テ増ヤフニ心下ヲ和カシ後止意ニ總テ古人ノ
方ヲ解スルカ又新タニ立方ニスルニモ第一ノ心得ハ若作和羹
汝惟塩梅ノ意ヲ射テ致スキコトノ既ニ示柴胡湯中ニテ人
参甘草大走ノ方ヨリ見ルハ莖胡黄芩半夏生姜ハ
塩梅ニテ又莖胡黄芩半夏生姜ノ方ヨリ見ルハ人参甘
草大走ハ塩梅ノ兔角甘味ト苦味ト錯綜ニ或ハ苦味
ト酸味トヲ調和スル妙処有ニ又往々苦味ハ苦味ガリ甘
味ハ甘味ガリ組合セル方モヤレ長夫ハ又別ニ趣意有各方ノ
下ニ辨スルニ茲ニ贅セス

大莖胡湯

即小莖胡湯之變方也其熱候蒸之強クテ柴胡之症中ニ
 冒寒ヲ兼ルノ氣味合之故其トシテ熱候論ニ是ヲ前
 之微煩ト説カレシ也其トシテ熱ヲ去ル根存心下概ラウ
 フニシタル様ニ只テ痞硬尤甚シキカ所為也其心下安ラ
 ハ本論心下急トアリ急ト急ニ是言テ莖胡兩服之後
 黃芩胸中心下ラカシク果大寒心下ヲ和ラケ半復生薑胸
 中冒口ヲ停飲ヲハキ大黃積實ヲ以テ胃中ノ熱便ヲ瀉下ス
 以外六味夫レ如ク奏之程多病勢後也故ニ本論ニモ

緊止心下急前之微煩者多夫莖胡則愈ナリ或不安心下
 之身小莖胡ト相違アル故ニ柴胡用シテ緊止ナク之故ニ
 本論ニ是言莖胡症仍在者先与小莖胡湯トアリ大黃積
 實ヲ用ル趣意是ヲ以テ見レシ

莖胡加芒消湯

即大莖胡湯之消ヲ加ル者故ニ其熱候前之微煩ニ分テ
 日晡所發熱潮也芒消由早凝滯ノ實熱ヲ取ナキ功能
 有心得シニ兼氣ヲ用サレ胸膈苦滿心下痞硬トテ以テ故也
 瘕瘕論ニ大莖胡又小莖胡加芒消行所概大兼氣ヲ用

胸中六飲ヲ多ク胃中ニ燥屎実熱ヲ蓄ル証ナリ
芫胡桂枝乾姜湯

是又小柴胡変方ナリ其証多ク飲ヲ蓄ルモ也故ニ芫胡黄芩
両腹心下ヲカシ桂枝乾姜上下左右ニ走リ蓄飲ヲ煖温メ下
降セシメ即芫胡黄芩ニカラ合ス既ニ石栗ニテ両腹心下ヲ後々
又瓜蒌根ノ苦ニテ胸中ヲ推シ牡蛎甘草ニテ蓄飲ヲ氷通
導スル意也大柴ヲ用サル六飲ヲサツ澤ニル故煎通剖分
ヲ都合スルト知シ飲ヲサツ方ニ際シテ大柴ヲ用サルニ非
ズ大柴湯大柴胡加朮骨牡蛎湯ニ大柴アリ此湯ハ其飲

胸膈ニ滞ル弊アル故ニ及テ走ヲ用也姜桂湯ハ是ト別段ト心
得ニ指又姜桂湯腹候ハ苦ツト心下候ハ軟ル如ク多ク按
シテ候ハ底ニキツト痞硬アリ此病イカト云ハ心下ニ飲ヲ蓄テ否
硬者背ニ沈シ上ハ飲ヲラハト軟ル此心下候ヲ知シ之為ニ
本論胃膈滿微結ト説リ微結トハ心下結聚ノ癢物有ニ
沈ム故ニ上ヲ輕ク候ハ心下結聚微ル様ヲ見テト云意ナリ故
本論胸膈滿微結小便不利渴而不吐但頭汗出往來寒熱
心煩者ト説ラカレテリ此ヲ玩味ス蓄飲ノ症ルヲ知シ又右
味此症ヨリ符合スルヲ知シ○謹按此姜桂湯ヲ用ル腹

候大畧柴胡似唯在胸下二行通リ中ツテ動築ル
モ也是通腹候也又多カニ左脇動悸ナキリ是ハ畜飲
是ク釋物腹底テ拘変スナリ尤甚キモノ左脇下動悸テ腹
底ニ付テ腹表見サレ也此所ヲ多ク熟讀メ左胸下二動悸ナシ
ト虽ヤリ姜桂湯ヲ用テ肝要心得也依此症姜桂湯用腹
表ノ飲消導ニ腹底釋物ノ云々時腹表二行通リ動
悸出モ之此症姜桂湯中ニテ最根強キ症知ニ故本論其
根強キ所ヲ示サシカ為ニ胸腹滿微トヤリ説テ左脇下動
悸ヲ説サ也讀者此所ニ深ク意用テ又之者過スカラス○

入葉スルニ左胸下ヨリサシラニトシテ兎角左胸下ニ難キ症
吳茱萸湯冷ヲ用ニ其効アリ是余カ深ク考ニ味ニ所
茲胡加桂枝湯

是又ハ柴胡湯ニ桂枝湯ヲ合シタル方ニ故ニ其腹候ハ柴胡
腹候ニ鳩尾ニシカトシテ凝アリテ任脈通リ凝ツ者ト知
ニ既ニ任脈凝ツコ成テ和氣具凝引シラレハ故ニ其熱ノ
位ハ柴胡ヨリ又一尋上醒シタル様見テ実ハ底ニ根強キ
熱ナル様見然レハ大柴胡熱トハ格別輕キモノナリ故本
論ニ傷寒六七日説リ六七日ハ熱ハ位ハ柴胡ヨリ少シ強キ

謂之在任脈者... 故本論云熱微惡寒... 姜桂湯心下飲... 和之者支節煩疼... 氣行... 柴胡... 飲... 外症...

最初者桂枝外症... 然場合ニアラカシメ云カダニ

四逆散

是亦大柴胡變方... 其腹形專ラ心下及兩脇下... 和ラケユル...

且文章又受氏三入恐ハ後人作ニテアラニヤセ
氏全体ノ腹形心下ノ様子ヲ考メ會得メ其候異ト上テ
四肢逆厥スルモ此藥ヲ治メシ真ノ少陰四逆厥ハ脉狀
腹形ナトモ大ニ相違止之ニ又濕疫ニ痼ヲ兼テ甚ク詰
語煩躁シ吃逆ヲ發スル等ノ症陶氏散火湯類ヲ用ル
氏寸效ナキ者本方ヲ用テ即驗アリ固ク吃逆ノ藥ヲ用ルニ
及又唯心下胸中ニシテシル故右ニ舉ル症下候外モハ
症候ヲ發スルイアリ必シモ見症ニ眩スカス多ク多年此藥
ヲ疫症及雜病用テ種々異症ヲ治スル勝テ計カラス希

代ノ靈方ナリ常用テ效ハナラハルヲ知ヘシ

抑肝加芍藥湯

此藥モ四逆散ノ變方也腹形大體四逆散同様ニ拘牽腹
表ニ浮タル標的ニ四逆散ノ拘牽腹底沈タル標的トスニ
其上抑肝ノ方ニ多ク怒不眠性急ナハ肝氣亢極徵ナリ肝
氣亢極スハ肝火熾盛肝氣又隨テ損耗ス故ニ故ニ肝
血ヲ潤シ若ク筋肝血ヲ疎通シ若胡鈞藤甘草肝氣ヲ後託ニ
右通肝氣亢極上胸脇引上故ニ陽胃水飲モ下降セズ
皆ニ引上セ也右疎肝後肝潤肝藥ニ而胸心下知ラキ彼水

飲下降シ易ク時節ナル故ニ白朮茯苓ニ水飲ラ不便消
導スレ○本方無ク茶又甘草ノ分量少シ○蘇按スレ此
葉肝氣ヲ潤シ後ル切ラ以テ主ス故ニ予帝ニ茶甘湯ヲ
合テ是ヲ用テ○又按テ方飲ヲ芳ヲ用ル事ヲ潤血ニ即皮
膚枯燥ヲモ潤ス心ノ全体由逆散ノ變方ニ飲ヲ芳ヲ加ルハ
猶道逆散ノ柴胡ノ變方ニ飲ヲ用ルカ如シ道逆テ苓
朮ヲ用テ抑肝ニ苓朮ヲ用ルト同意ナリ
參胡芍藥湯

此方升陽散火ニ似タレ左方ノ意大柴胡ヲ来ル者知ルニ

大柴胡半夏大黃ヲ去知母人參生芍薬ヲ加ル意ニ其
症大畧大柴胡ニ似タレ其脉腹大柴胡ノト裏スル処
モナク亦大柴胡ノ如ク胃中実熱スルモノ勢モナク故大黃ヲ
之ヲ熱疾少キ故附子多ク飲ラ高ル様子モナク唯潤燥ヲ
主トスル薬ナル故半夏ヲ去也按テ此症ノ只散日ノヤクヤ少
熱氣ヲ清解セサル故何ヤ津液枯燥スル容体ナリ愈
解熱シカタク也夏ニ因テ人參知母生芍薬ヲ加テ清
涼解熱スル内潤燥ノイヲ專トス唯ハ柴胡類ヲ潤燥ノイ
多クニ場合ナル故此方ヲ製テ上ト心得ニ既右通リ津液

枯燥邪熱去難^キ故必^ク下^レ膠^下音^音滿^在熱^ア故^此紫^胡
 枳^實黃^芩芍^藥知^母相^合除^テ去^カタ^シ大^畧此^道リ^ノ故^也
 門^ニ傷^寒十^餘日^外解^熱未^除脈^息未^後亦^使黃^赤或^或
 渴^或煩^不能^安睡^不思^飲食^此邪^氣未^清正^氣未^復當^當
 量^其虛^實以^調之^云然^ラ箇^樣處^ニ生^辛下^ヲ主^劑ニ^用
 八^實症^解熱^石煎^用ル^同段^效驗^アキ^多年^用試^試
 介^ト多^シ今^此方^中知^母生^辛下^ヲ相^合部^實症^知母^石煎^下組^組
 名^ト同^様趣^意ト^心得^ヘシ^シ

逍遙散

九一 芍藥甘草湯

是^亦不^紫胡^變方^ナレ^氏不^紫胡^ヨハ^少シ^肝虛^形也^ル
 症^ハ紫^胡所^實場^場ハ^ユク^紫ト^心得^キマ^シニ^專ラ^用ル^藥ト^知シ^補中^益氣^湯ヨ^ヨ
 リ^ハ一^層手^前場^所用^ニ一^層手^前下^ハ補^中益^氣ホ^トニ^ニ
 曹^中ノ^氣薄^カラ^キラ^ズ也^故方^中ニ^參苓^ヲ用^ス之^其腹^腹
 形^心下^痞硬^而眩^モ不^拘牽^スレ^モサ^カラ^ズ紫^胡黃^芩
 半^夏オ^トラ^用テ^ハ今^少シ^スル^トニ^テ受^クラ^ズキ^故シ^シ劑^劑
 ニ^ヤラ^キラ^付テ^當飯^前芍^藥紫^胡甘^草白^朮三^心下^而眩^眩
 ヲ^ツリ^トス^ル薄^荷三^胸高^曹口^ヲ開^キ白^朮茯^苓ニ^ニ
 テ^胸高^中ノ^水飲^テ下^水道^ノ消^導ス^ル意^ナリ^〇本^本

一 逍遙散

方ニ牡丹皮ノ根子ヲ加テ加味道遙散ト云夏ニ肝腎
虛火ヲ鎮ルノ意趣ト心得ヘシ凡テ牡丹皮ハ專血分
ヲサシ薬也トシテ瘀血トハ多用トモ唯通リ血分ノ薬
ト心得テハ今少シ穂ナラスワサニ取テ不自思也其故ハ
ハ味先ノ症ナトノ瘀血閉カレ無ヲ以テ知ヘシ畢竟丹皮
ノ全体ヲ云寸ハ水分ノ動ヲ鎮ルノ義ト心得テヨシ水分
ノ動ハ則肝腎ノ虛火上炎スルノ徵也此物多ク肝火ヲ鎮ル
能ル故ニ肝血ヲサシテモ用テ効アル也オレニ組合ニ曰テ
ハ虚火トモ用テシ故ニ桂枝茯苓丸ニモ組合リ今肝腎

虚火ヲ鎮ルニ危子丹皮ト組合テ道遙散ニ加ララルル全体ヲ
クツリトシタル中ヘシト現在ニ浮火スル処モクヲ組合セ
サルハ正合思ハシカラサル故危子ヲ組合セタレ也危子ノ專ヲ
上部ノ用タル処モアリ又黄柏ト組合セテ工合多ク下部
ノ火ヲ消スルモニテ上下トモ用テ牡丹皮ト組合セテ專
ヲ精上カリテ水分ノ動ヲ鎮ルナリ能シテ合ラ會得セ
サレハ此方意々ヤクヤトメ分明ナラサレ故今日ワサ取テ
近遠ノ的実ナラス右ノ通ニ解スレハ折々ワシ矢張古人ノ
説ニ合ス也下カク方意ハ的実取テハキ脈腹ニカケテ引

理るウニ解セテハ實用ニテリカダニ故ニ徳ニテ方意ヲ
解スルモ上ニ浮ラルルル横脈ヲトリステ真目付処ヲ將ル
ヤウニ工夫スニ古人ノ組立ニ方劑モ同ニ古クニ合行而
只高妙ナル理屈ニ主トシタル方多シ箇様ナル類ハ全体
ノ穴ハトクト打ステスニテ及テ思ハ外項細ルル処ニ意南
ラアルモ七八能思案メ用ヘキ也○按ニ加味道遙散
ヲ用キモノ現症ヲクニテ一定セザレ先其一端ヲ治テ予
ハ煩人産前後舌赤爛スル証ハ此方ヲ用テ人愈ルモノアリ此
疾肝腎虛火上心肺直ル云々キモノ也然レ其脉腹全体

ノ処トテ道遙散アリ前後アリ其上用皮厄子ヲ是非ト
モ加用キ標的アルニ非ハ用テ益ナシト知セシ世ニ此等処ヲ診候
メ番ニ交唯フシク見症モハ此薬ヲ治スルトニ心得タ
ル人多シ此モハ素人同様ニ箇ニ処詮論ナキ処ナリ然
レ舌赤爛スル症ニモヤク治方アルモノテ清胃散ナト如キ
輕劑ニ宜キモノアリホ疾症ニ至テハ麦門冬湯ニ加黄連石羔
ヲ用テ宜キアリ或ハ三黄湯石羔ヲ加用テ宜キモノアリ此等ハ
皆清涼ヲ主スル手段也又道遙散アリハ今一層虚候下
テ下元虚シタル煩人産前後ニ舌赤爛スルモノ付手湯

當歸品用ルモ是言一層劇キハ益氣湯附子ヲ加テ
用ルモ今一ツハ四物湯ニ黃解毒湯ヲ合シ附子少許加テ
用テアリ華皆滋燥ヲ主スル手段也ヨリテ方症審シメ
用シ免角方ハイヤウニ組ルモノ長雅用ヘキ也標的ヲ得
ルイ最難シトス標的齟吾ニテハダトセイヤル妙劑ヲ用テ其
病治セサルモ也是所謂萬里差ニテ角ノ要処一分シ
セキカハホテハ寸也劑ノ向シ道理故方事ヲ取テ深意
ヲ用キハ此処アリト知シイカモ道遙散ハ柴胡腹形ニ手
弱モノト氏其手弱ニモテノ場合アルノ故深ク意ヲ用テ

復錯條ニ後續貫通夫ニ標的ヲ得キテ肝要也
升陽散大湯

是亦ハ柴胡ニ變方ニ即道遙散ノ變ニ来ル也故ニ全
件ハ虛候ナク肝火熾盛ノ症ナレバハ黃芩苦寒ヲ用テ
ニ白肝部ヲスカシ熱氣ヲ解ス方カアル意也表ノ心ハ肝邪
ニ聚リ心滿向ニ迫ル也潤ス故ニ降氣ノモノニナル也イカニ肝火
ニ迫リ口舌乾燥シ假初ニ咽喉渴多キ処トハニ表ノ心ヲ
フサリト用テ大ニ益アルモ也今此方ニ用ルモ其氣味ヲ為タキ故ニ黃
芩麥門冬金銀鉞散ト組ナル也金銀鉞ニ性涼ニ質重

能肝火上衝シタル鎮墜シテ心肺ヲ清涼ス也確切能銀比
右通大越上氣シタル故逍遙散アリ八層心下痞塞甚
シキ白テ少ク益氣湯気味合入參陳皮ナリ用名之也此
痞今層熱サケカ悪ク上心肺ニ衝逆シタル肝火分
スニテ病勢之難ク詔言妄語ナク様ナ盛ナル者ニ犀角
生茅ヲ加フ尤多ク加用テ彼心肺ニ迫ル肝火ヲスルトニス其
ナ病勢速ニルテ手段ナリ此加味是又持
合宜ニキモノ生茅ヲ用ル症至
六通リハ水分及任脈通動悸元ルモノナレ症曰テ心下
狗牽甚ク手強上部引上ル故動悸腹底ニ沉テ少モ候レ

ナモナリサレトト候ハ動悸底隠タル容子ハ知ルモ也能此
候ヲ詳ニ表ハ動悸ナキモノニスツリト此方ヲ用ル狗牽元ル
ニ續テ動氣シカト表分見ルモノニ此等模樣ハ逍遙散ニ餘
程違ヒ益氣湯トモ違ヒヤリ逍遙散益氣湯ナリ臥合ニ
二房間位ニ在ル也畢竟此方ニ黃耆麥門金銀生茅ナリ但
合方ハ実症方ニ白術湯竹葉石羔湯ナリ用ル手段同様
ニ改ニ清涼解熱ニ也○按ニ逍遙散ニ升陽散大湯ハ全
体虛寒ノ間症トモ云キモノニ逍遙散ニ空ハ散大湯方ハ
肝火ヲ涼ニ解熱力強ニ此上脱候アルモノナラハ見合テ益氣

此方
治
心
下
痞
塞
甚
者

此方
治
心
下
痞
塞
甚
者

湯ヲ用ヰテモアリ又黄苓ナド用テ難ケレバ附子ヲ用ヰル虚
寒消散シ難キ者本方ニ附子ヲ加テ用ヒシ然レバ此症ハ虚寒
アリナカラ虚火妄動スルモノナレバ矢張生地黄南ナドヲ用黄苓
ナドニ附子ヲ組合シ用ヰテ合宜キモノ也此上一層虚寒甚重
火妄動容子元ルホトニモナキモノハ益氣湯ニ附子ヲ加テ用ヒ
黄苓白朮人參附子ヲ組合セテホトヨク受ル地念也右等
加味診察詳ナラズレバ用ヒ難シ然レバ診察スキ也畢竟散
火湯ハ道遥散也夜ノ生花如キモノニテ黄苓炙門人參陳
皮金銀ナド加シホトノ働アルモノト心得シ

著

補中益氣湯

是亦ハ柴胡變方也古人説ニ東垣医王仲景小建中
湯ヨリ變シ来ルモノ也ト云民其説的當又大考草也建中
湯變方ハ脾胃ヲカシ中氣ヲ行ラシ陽氣ヲ升提スルト云也
コト出シテ夫ナレバ実ニ左ニテラス小建中ト異ルモノ心得シ此方也
麝諭取テ云鯛薄塩シタルニ大根椎茸ナド取合セシハ
煮ニシタル如キモノ也故ニエラタラシキ茶椀蒸貝焼下ト如ク
タリトス然ラハ淡ク味ナキカト云ハ左ハナク輕シテ塩梅ヲ
旨キ故積持又ハ酒客ニテモ甚受シ存テ下ナク云夏亦

五ノ八ノ文ニ云云

○脈モ一箇
 柴胡ノ脈トモ
 味合ニカク薄
 キモ也然レテ
 其形ハサマア
 薄モ心ヲ得

味ニ甘シ過ズルモノヲ調フソクリミラホ子酢ナドヲ食如クキツキ
 塩梅氏違ヒシクソリトス右重キヲラス輕ケレトモ淡カラスト右
 合セテ系也此系ハ全体ノ趣意ヲ云ル心下兩脇痞硬標
 的ト祖云シモ也世説故其腹形ハ柴胡湯ヲ用キ様ニ
 見テ元柴胡黃芩人參半夏甘草ナド但合セテ今一際ニ
 卜ニ甘カラカク氣味合也是依テ黃芩半夏ヲ除ケル也其故
 ハ右通心下兩脇痞硬ノ肝許滯スルニ甚ク或ハ極スル至
 ハ心下胃口益痞硬ス故ニ是ヨリ改ニ中氣モ不順成リ胃
 中真陽ノ氣ヲ上肺ニ上達スルニ能ク既ニ如此胃中真陽ノ氣

ヲ上心肺ニ上達スルニ能ク既ニ此胃中真陽ノ氣悴ケテ上
 達ニ難キ故ニ心下ノ痞硬モナラ甚ク成テ終ニ飲食ヲ思
 公元氣モ日々衰微スルモ也斯ク真陽ノ氣上肺ニ上達
 ニ難ク胃氣分布ニ難キ故ニ外表肌層割却モ滯ス片
 マリニテ也ナレソノ片ナリニテ根々ハ唯心下兩脇痞塞
 ノ胃中行ラザル処ナリ故ニ心下兩脇後マヤレハ胃中ノ氣モ心
 行リ難シ心下兩脇ホトヨクニ持ハ中氣自ラヨクナリテ真
 陽自ラ上心肺ニ通達スル道開キ外表肌層割却ニモ
 通達ス様ニナリ○按此方一變ノ當故ヲ本方分量トス

當歸、專入肝部、後在歸、曰、古人無藥、不用者、肝部
正、子、八、象、毛、下、行、故、總、之、分、一、用、之、來、リ、シ、モ、ニ、テ
所謂、肝、血、藏、不、以、故、也、其、方、肝、部、後、在、切、之、肌
分、之、心、用、之、主、柔、之、右、肝、氣、變、動、而、心、下、之、結
聚、シ、タル、モ、ニ、ル、ハ、此、症、ハ、肝、弱、キ、也、主、下、之、曰、此、胡、主、柔、之、
ハ、少、シ、強、之、當、歸、氣、味、合、之、受、之、心、思、之、故、當、歸、之、味、此、胡、系
之、割、合、シ、タル、モ、也、即、當、歸、升、麻、苦、味、下、係、之、此、胡、之、而、
心、下、之、名、之、升、麻、苦、味、之、峻、心、下、之、カ、ス、也、當、歸、之、
胡、升、麻、之、苦、味、之、合、ス、ハ、ツ、タ、リ、ト、ス、升、麻、苦、味、之、キ、ツ、ト、ス、カ、シ

當歸、之、ツ、リ、ト、肝、部、之、後、且、滋、潤、之、甘、草、之、平、人、參、之、厚、辛、之、程
多、輕、甘、味、相、和、向、心、下、痞、硬、之、カ、ス、ハ、上、少、シ、ツ、ロ、之、
彼、肝、氣、之、才、付、レ、タル、胃、中、之、真、陽、之、心、肝、上、連、ス、也、即、
東、垣、ハ、此、等、段、ヲ、サ、テ、陽、氣、ヲ、升、提、ス、ト、説、カ、レ、也、世、匠、動、之、
ハ、升、提、之、字、曰、之、彼、清、陽、之、氣、之、級、ヲ、付、テ、ス、ラ、リ、ト、引、上、ル、
之、様、思、フ、ハ、甚、非、也、心、下、之、カ、ス、ハ、即、胃、口、之、カ、也、胃、口、之、胃、
之、子、之、真、陽、之、氣、自、心、肝、之、上、連、ス、ト、名、之、テ、陽、氣、ヲ、升、提、ス、
之、氣、元、來、而、心、下、之、カ、ス、ハ、陽、氣、ハ、升、提、セ、ラ、レ、ス、ト、云、也、作、者、之、主
意、之、故、東、垣、之、書、中、之、陽、氣、ヲ、升、提、ス、ト、説、ク、甚、多、シ、皆、之、ノ

意ヲ以テ解スニ頤細クイテ冬ニ升提陽氣血字ヲ以テ説ク
カレシハ東垣之微言ニ後学深ク意ヲ用テ玩味スニキル
リ必ス辛ニ着過スニ方ラス又黄芪ノ効能ヲ一ルニシテ
物ヲ外ニ引出スニ心得ヘシ先益氣湯ノ黄芪ハ心下ヲマ
リト塞キ飲食ヲ急ツス不食ニ胃氣ヲ養フナリカダキニ因テ
胃中ノ真陽愈薄クナリ閉塞セラルトラスニ甚ニ上下升
降融通セラル故ソシテ胃中必虚寒ヲ為シニサカラ番
ニ附劑ヲ用テ云様子ニテモ無キ故右ノ通リ當歸ニ肝部ニ在
シ後ノ升麻柴胡ニ兩脇心下ヲツケ又人參甘草當歸

ト併セテイテトト心下兩脇ヲツケル故彼書中真陽ノ氣モ
トクトト上心肺部ニ在ル地合ニル也故ニ彼ノ閉塞セラレ
テ胃中ノ氣ノ及肌表ニ滯レル水飲ヲ外肌表ニ滲シテ下水
道ヲト出シ白朮甘草ニ消シ黄芪人參ニ導スル意也
畢竟液汗ナラセシモ黄芪ニ水飲ヲ外ニ引出スルニ黄
芪引リテハ各必来サルニ曰テ升麻柴胡ニ當歸人參白朮
ト裡心下兩脇ヲツケリトスカシテ出ル故黄芪ノ働ナ分ニリテ
上下左右方ハ萬ニ通達セストテトニ陳皮生姜ヲ用ルニ白
朮羽翼ニ又升麻柴胡ニ羽翼ニ當歸ニ引キ又胃中ヲス

其意也右某時各功能之銘錄之肝氣之後當中
行ラニ水飲ヲ利スルハ真陽自ラ上部ニ直達シテ
各部ノ疾患常ニ復スルヲ得是ヲ名ケテ升提真陽
ト説クト心得ヘシ○又按ニ黃芪ヲ腫物ノ内托用モ外ニ
引出スルヲ主トス也水腫防ニ黃芪湯ヲ用ルモ同意ニ水
氣ヲ肌表ニ引上ル手段ナリ其ナリ止ム功ヲ得ルハ萬病ニ
施ス瘳然バダラシ○又按ニ益氣湯右亦此道ナリ其標的ハ
ハ禁胡腹形カキキ者也脈モ一通リ禁胡脈ト違モ先ツサ
カル氣味合テ力薄キモノト心得ヘシ○又按ニ此症心下痞硬

升提真陽

甚キ故多ク皆飲食ヲ思フルモ也假令益氣湯ヲ用ルモ紙
袋ナトノモノテツレモ如シ故ニ其紙袋ハ口ニツマテ吹ケ復下
カニツル如クテ黃芪ヲ以テストラスレハ男ハ何方ニ息
角多氣味合也ト云其紙袋ハ口ニ紙屑ナト付テ障碍ナ
ク息ナカスカタシ如キハ楊枝ナトテ其袋屑ヲ取除息
ヲ吹入タル故ニ升提真陽人參當歸陳皮白朮生姜ニ其障
碍ナク也當歸ハ抑肝ニ潤肝ニ能アリト云ラ會得
ヤ并大益氣湯ニ組合タル意解シカタニ畢竟當歸ヲ但ルル
此方ノ妙也ト云陳皮人參甘草ナトハ此方ノ妙也ト云非ニ東垣

升提真陽

最心ヲ用ラレシハ升麻紫胡ニ當飲ヲ但合セタル也故ニ古来ヨ
此方ヲ以テ妙劑ト稱スルハ却テ此趣意ヲ的ニテ止ルニ總テ其加
減在リモ此方合シクハ要ス此症ハ唯其モノ許シ宜
カラス然ラハトテハツタリトシタルモノニミテハ必ス派ク意アリ故ニ
方輕キレモラカラスウツリト又ハツタリトモセズ輕重中間位
在味ニ無量ナルト合アル方ニ又無量ノ切用アル也ヤシク
体胃中ノ水飲アラステ胃ノ氣薄キ処ノモノ非ト用テ功
ナシト知シ○又同三種物ナラフセ九ニ家方三物湯ノ
類ナリト古曾ノ氣薄キモノハ非ス又近來在覺テ

升麻紫胡

便毒ノ症三物湯ナリ用テサズハ氏ハラル由逆敵ニ吳茱萸
牡蠣ナリ加テ用テキ際多クハ寒キ段アリ此症ハ毒ニ毒ヲ
ニ付ル故内托散三物湯又ハ附子劑ナリ用テハ愈リトラサル
モ色ハ腹内根処ニ何レ所腎ノ部位ニ筋絡會スル処ニ
眩暈ノ方ヨリ付根ヲ絡ニ陰器注ク筋甚多ニ故肝腎ノ
氣ナリヤシクハ筋絡モ日ニ挛縮メ終ニ死ナルモ色ハ若其毒
ノシメハハ穢子甚ク右ノ通ニリ上難キモノナラフナリト極テ
合劑ヲ用テホクナリ寒者ナリ○總テ黃芪ヲ用テ水病ハ
方段ニ述名如ク曾ノ氣衰憊氣湯氣ヲ肌表面通達ナリナリ

升麻紫胡

此輩人多是不足氣者今方中三三故三今方中三三九人曰氣天香湯類ヲ
用レ其初驗彼不及一遠三難入キ一ヲラヌヤ假令ハ
沃之有家財ヲ用スニテ不自思フカ如シ又錦備ノ衣相
有テカラ禮禪ノ禮視ヲ破レ似タリ必シ偏固ニ拘泥スカラス
○升陽散火竹茹温胆益氣ヲ用キ夜邪ニ至テハ其手段
傷寒論ニ於テ不足セリ勿論益氣湯ハ柴胡ノ變方ナラ
勞ノ初アルハ柴胡柴胡姜桂代投ニテ初キモノニ所謂陽穀
痿痺カ如シ故ニ後世至テ餘義モナク此等ノ方ヲ至テ忌穢ヲ備

此輩ト心得一三

九味清脾湯

此方世医瘧疾必用某心得ヲ安リ用ル後アリ深ク方意ヲ
考ルニ似タリ今按ルニ此方の症ハ心下兩脇痞硬甚シ此肝
部ノ痞硬甚シキヨリニテ熱氣ノ増成テ難ク白散ヲ經
ルニ熱氣弥多ナリ寒クハ少クナレタリ此熱氣多キ和
熱ニ三三ニ肝部ヲ起ス処ノ熱ハ八分ト心得ニ唯肝部ノ
熱氣尙スル故胃中モ熱尙ニテ行リ難ク胃中熱氣上衝口
苦ノ咽乾ノ症アリ即傷寒論少陽篇第一章口苦咽乾

症アルト例ニッ下燃上ル火ノ如クナラズニシテトクスニ火心
持テ急己ニ肝邪胃中ニ熱鬱スル故大便赤淡症アル也故
脾胃熱ヲ清涼ス下ニ意ニ清脾散ト名ル也亦其熱
石羔ナド用キ熱ヲモク又大黃硝石ナド用ル程勢モナシ故ニ
淡胡黃苓ニ夏甘草生姜ヲ以テ胸心下ヲスカシ又夏
生姜ニ青皮ヲ併セテ胃中ニ鬱在気ヲ開キ厚朴草菓ヲ
胃中ニ宿熱ヲ行ラシ泉花冬ニ胃中ノ水飲ヲ分消スル意
也○謹テ按スルニ瘧ハ古モ病ヲ素問ニ瘧論篇アリ然レ瘧
論ニ論スル処牽合傳會ニ信ニ難ク固ヨリ實事ニハ齟齬

三
荀彧

片ナリニテ無用ノ論説ト云ヒ夏ヨリ後較近ニ至ル迄汗牛
充棟ノ医籍ニ總テ天行ノイニ説置リ如何ニ此病其始ハ天
行ニ多ク夏秋間暑濕ニ感スナリニテ發スル者忽然元此病
回テ深ク考ルニ瘧疾流行時節多ク夏秋ノ末トハ人々長夏中
苦熱スル自心下兩肢否硬メ快カラズ且快カラル処暑濕鬱
ニ乘テ發スル也病症ナリ故ニ最初ニ四症間先戰栗惡
寒ニ次ニ蒸ヒトメ大熱ヲ發ス其熱氣熾盛ニ極マル處夥シク
發汗熱氣サレ也此發汗ニ暑濕ハ三四症間解シ去リソコリ
ハ皆肝氣ヨリ寒熱ヲ發ス連綿トシテ日ヲ定メ也コレニ因テ三四

三
收

卷後ハ遠慮ナリ章門京門ニ灸スニ截瘰ニ妙ナル此法蓋
タルニ一度灸ス截スニハ二度四五度モ灸スニ截ラ以テ度
心導ヘシ又瘰間見ル則肝氣ノチカ所ニ神靈アルニ似ル
此肝氣ノチカ夫付ナルカ素問モカキ無用ノ説アリ
深ク此考ヘ肝氣ノ所為ニ相違ナキ証据ハ多ク移精
変氣メ治スルモ也故ニ急ニ病人後ヨリ水ナク灌キカテテ
以テ有急劇ク起リ来リ此等ニ驚動メ截ルナリ又佛
神ノ供物ヲ戴キ又ハ呪ナドモ是ラ深ク信メ治スルナリ又自
ラ瘰瘵ノ入湯月代ナドニ強テ外動ニ或ハ相撲芝居ナド見

三
荀
義
堂
藏

ニテ治スルナリ此等ノイラテ瘰ノ病根ヲ悟ルニ系初無氣ノ
多クハ瘰腹トテ詳テ瘰ノ氣ヲ離テ方ラ処スニ味清脾
飲主治中ニ此諸瘰通用ノ方也ト云長大ナル心導蓮ナリ
後人此言ニ白瘰ノ瘰ニ聖薬ト心得止者多ク深ク意ヲ用キ
七味清脾湯

此方前ハ味清脾比スハ両肢肝部ノ痞硬少ク專ラ心下
聚ハ腹候ハ知ヘシ口謹按スルニ此症脾胃ノ氣メシラ心下胃ニ
飲ラ畜ルナドク飲食モ不是ニ自テ停滯ニ易ク其停飲傷食
等ニ或腹痛ヲ奈ニ或吐ナリノ症ヲ兼ル瘰也故ニ先弟ニ

五
收
蔵
書
院

中氣ヲ運轉セシムルヲ主トシ製在方也コト曰テ三回方ノ主
治ニ治脾胃痛食積嘔吐腹痛等ノ症アリ○又按ニ此
味清脾飲ニ此胡黃岑ニ無ク良姜烏梅ヲ用テ温脾
ト云キニ似タリ然レ傳飲ナラズ胃口ヲ塞クニ良姜温熱
ニ傳飲傳食ヲ行ラズレバ胃中熱鬱熱ヲ生ス故ニ温熱ノ
物ヲ彼胃ノ傳飲ヲ導キハ鬱熱ノ基ヲ脾胃清和ル也
ヲ以テ清脾ノ字ヲ下スモノト知ニ故ニ厚朴ヲ主薬トシ山藥
ヲ並ニシテ胃中ヲラメラシ青皮半夏生姜ニ胸中ヨリ
胃口近ノ飲ヲスカシ良姜ニ胃口及胃中ノ傳飲傳食ヲ

百
芍藥甘草湯

温煖ニ行ラシ又烏梅良姜等分ニテ益胃口ヲ開キ胃中ヲ行
ス甘草二兩良姜烏梅生薑辛酸ニ相和心下ヲ緩ム
大抵ニ方ノ分々ノ趣意ニテ但ス方ルニテ有レ
人参養胃湯局方 **參苓朮朮蒼朮果梅甘姜**
此方ニ味清脾湯ニ比シバ胃氣虛弱ナリ一層甚シ然レモ
味清脾湯如ク嘔吐腹痛ナリ苦悩ナク唯腹部ナリトモ無
飲食不進氣カコレ曰テ之ク唯胃口開キ難キ曰テ胃及胃
中ニ水飲ヲ蓄テ多キ症ト心得ニ然レ參朮附子ト組合セテ南
北症ト又少シカアル也○謹テ按ニ此方復陳皮蒼朮烏

十五
文選

梅生姜之味胸中及胃之閉者厚朴草菓之胃中飲之
カニ後者倉木其飲之水道之通也然則胃氣虛弱之故
右此味方リテハ今少行届キ難シ故ニ人參甘草大棗又
心下胃之閉者和之趣意之○又按之此症キテ以テ輕
ニ腹表ヲ數篇スリ見ヘ腹何トナク薄クカヌケノ様ニ
見ユルモ也脈状モ亦此腹状ニ準スルモノナリ○又按之此腹
形心下任脈之聚ル一第一ニ兩脇ノ格別ニ急セザルモ
也故ニ局方ニ治瘧因飲食餓飽傷胃而發者凡虛
人患瘧者養之則邪自除也云○謹テ按之此九味清脾

一本九作七

同鏡作流

飲之三方瘧之為設也然則瘧也故ニ古今ニ遠統瘧ニ非テ用
人參養胃湯ハ和劑局方瘧之為設也然則瘧也故ニ古今ニ遠統瘧ニ非テ用
亦瘧之系ト心得テ世医他ノ病ニ用ヒス疎漏ト云今細カ
ニ方意ヲ推求シ七味清脾湯ハ停食腹痛症ニ用ヒ
人參養胃湯モ夏月泄瀉後氣力之ク食ヲ思ハルモ
ニ用ユル又虛人ノ氣滯ニ心下膨滿ノ飲食進ニ難キモ
用ヒ其他種ノ病症ニモ用ヒキ処數多ナルニヨリ菓功ヲ
并ニ方意ヲ詳シテハ一方ニ許多ノ病症ヲ治ス今其梗
概ニテ示ス

芍藥湯

此芍藥湯六書 芍藥湯芍藥甘草

此方桂麻類ヲ用テ表スレハ汗快ク出ス及テ熱氣シツク
トキツクツキ様ナルヲハ此胡ノ症モアレトモ亦表症
アリテ此胡ニテ汗スキ様ナルヲモ又白朮ヲ用キ様子ニ
ナシ唯熱氣熾盛ニ或頭痛甚シキモヤリ或身体疼痛
ルモヤリ或鼻衄スルモヤリ兎角上部内塞スル形ニ解熱
カタクダマカハ詔詔或表症同様ニ躁カシキモノ有故其
方此胡黄芩芍藥甘草ニテ肝部ヲスカシユルモ羌活白芷
桔梗ニテ上部ヲスカシ葛根ニテ上部及肌表ヲ疎通スルハ

味ニ肝部及上部内節間ニテ透スル蒸ニテ上部ヲ鎮
澀清涼ニ肌肉ニ對シタル熱ヲ疎通シ肌表ニ透シ生姜
右記味ヲ引思ヒテ夫レハ引導スル意也ニ因テニ貼
建進スル快ク汗メ苦悩頓ニ解スル者也○謹按此方
一味ノ中味ヲ指引シ難キ但合ニテ能主方ニタルモ也蒸白
湯或芍藥石羔湯トシテ此症ヲ療シタリ凡同様ナルニ
トスルアレバ此深ク考サル見識ト云フ芍藥石羔湯柴胡湯
トハ只スホリトシテ方ナト細カナル由折ナル只一筋ニ合致
症投テシクモナシ是上部内節間肌表ヲ疎通

芍藥湯

平、此方より劣り余屢此方を用て実験す試其妙信又
外邪ナク肝気元り発狂人ニ黄連白朮十枚シク用テ
寸効ナキ者此方ヲ即驗ラ得在テ数夜アリ即独ニ禪師
此処ニ夫アリト見テ発狂ニ此方ヲ用ラズ治ラズ氣元
見テ学者動スレト方書ヲ倉卒ニ看過ス古人ノ立
方ノ妙処ヲ親ニ知サル人多シ浅マシキ一ニ非スマ

温胆湯

茹 茯 陳 半 枳 甘 姜

此方外邪解後胸中ニ飲ラ為或短気心悸頭痛或
吐噦或不食ナトメ驚キ易ク臥寐ニ難キ症用テ輕ク飲

ヲ隨處ニ劑也故此方ニ積実半夏茯苓陳皮ヲ主薬ト
胃中ノ推ニ劑キ竹茹生姜ヲ咽喉ヲ肺部ヲ飲ラ分
音草ニテ右ニ味ニツクリカヲ付テ程ヨスル意ナリ謹按
左ニ三回方主治中心胆虚怯觸事易驚等アリ此辞ハ
今少ニ病症微知セサル趣ニ似テ觸事易驚ハ即短気
ト同類ニテ心中畜飲ノ為也其畜飲ヲ除キ去テ
右等ノ症必ス愈テ以テ心胆虚怯ト心得ル大ナル方也知
竹茹温胆湯 茹 莎 参 建 栝 陳 半 枳 甘 姜
此方千金温胆湯ニ言温胆氏ニ餘リ單劑ニテ力薄キニ

驚雲林深考テ五方セラレ也此在大火前温胆彷彿
夕是熱前以之難キコト心得一曰然其熱氣日數過多種
ノ某劑ヲ用テ病狂遷延シタルモ故ニ外邪殘熱モアリ又肝
部ヨリ熱過半ノ様子ニテ第一日數ヲ往來故何トシテ
氣ノスク攸擊劑ハ用ヒ難キ若クナルモ也此処ヲ多診シ覺
テ用ニシ故ニ柴胡ニ更ニ香附子ハ分ニテ肝部ヲ後ニ對熱
清解シ又黃連ニテ峻ニ心膈中ヲ推シ開シ故若更ニ柴
苓枳實ノ劑イヨク且之成或曾中ノ飲ヲ停當ニテ不能
サレ右ノ味カカリニテハスルトスル故甘草酸辛ヲ加テ心下

ホトクノ實ハ趣意也拜世保元參以リ予今是ニ後
又按カク方解スハ竹茹煎湯ニ在混同ノ様見ニ
此熱位彼ニ比スハ三ノ一ニ煩渴心熱ナト大異同アリ
久此異同ノ症ヲ熟診シテ分ツニ竹茹煎湯ニ熱氣ニシカ
リト厚クメカ強ク身熱ナト云位者ニ煩渴氣モ是ニ
準ニ何分蓄滯ノ熱ヲ深キコトヲ標的トスニ此外ニ分
キ者ハ參胡芍藥湯ノ犀角ニ方ナレ參胡芍藥ニ分
ノ動ヲ第一標的トスル者ニ痰喘ナトノ症ニ犀角湯微
アリトイハレ是ニ水分動ヲ標的トスル也箇様ニ方ヲ

九
文

解之決之混同之十カハニ其它類方アリトイハ臣等
此条ヲ以テ相分テ其上一味ノ系能ク推明ル事ハ尚更混
淆スルナキモノ能ク心ヲ用テ処方スニシテ又按ニ此方黃連
一更ヲ用ルル熱鬱雲林深ク夫ヲ用タル処アリク常久クハ黃
芩紫胡ト但キ処ナラ黄連ニ代テ格別趣意ナラハ味亦
淨府湯 苳苓猪沃木枝我茶半蓮參查甘 養
此方專小兒ノ為ニ設ル趣意ナシ大人ニ亦用キ症アルト知
レド唯多シ方ノ意ヲ會得セハ何ソ大人小兒ヲ擇ハニテ〇回
卷五若シ治小兒一切癰塊熱口乾小便赤泄瀉云々此文簡ニ症ヲ

説細察スル故ニ後人一切癰塊血氣眩惑ニ塊ヲ治ス藥心導
テ多小兒心下脇下膈旁將下ナラハ塊ヲハ必此方ヲ用是
大ナル心得蓮ナリ謹按ニ癰塊ト説ハ真ノ塊物ニ非肝癰急
縮メテ下診スル塊物々々見ニ長実ハ塊物ニ非唯急縮
甚キニ自テ其肝癰間ニ水飲停蓄ニ後方持合ニ塊物如名
正モ也必シモ確キル塊物ヲ誤リ認テ此方ヲ用エカラス決テ驗
ナキモ也〇又案ニ此方症兩胸心下此胡ノ部位痞硬甚キ自
テ上心胸間ヲ塞キ上下升降氣ヲ阻テ水飲胃口兩腹間ニ
停蓄ニ胃ノ氣將閉メ自然ト小便不利ニ大便モ亦泄瀉

文
後

文
後

不毒之毒也故其方不寒胡之變方元不寒胡手而取以下
之正其藥三稜胡黃連三稜之胸中心下之推前其右之味
三心下胃口而取之融和之彼畜端之水飲之其下降之萌
之平之胃之氣胃閉之下降機今之之之故其方加胃
之氣之方之伏之宿之沃之澤之水飲之消導之也此方不
宿之沃之澤之水飲之消導之也此方不
此方意之玩味之及之者過之可矣既如此水飲之消導之
之兩枚以下塊如之宿硬漸之止之志氣舒暢之上下融
通之不日之快彼之境之至也○又按此症心下而取之

傳飲肝火之毒之上部之痰上之故其藥熱之乾之毒之知也○又
按三稜或述堅之軟之塊之消之利之主治本草及他方
書之往之見之方多多年是之試消塊軟堅之効藥也甲之
劣之知後述之主治之論也○心中心下之痰之推之劑之
心得之然也○又按三稜字之古來之リカカヒト云肩之害
スルト云意ナル也○故大人積氣之胸熱痞硬之必ス兩肩
之如クナル也○此方之兩肩之ツヨクモ之軟之レハ治スル有
小兒驚搐之症之此症アリ兩肩ヲ揉軟之驚搐ヲ愈ス
之勢之者之愈之也○又按此方之多年試之効驗ヲ得ル也○

而肩ヲモミ軟クシ思ハシクヤク兼ハ身柱ニ灸スニ夫ヲラカ
ラスハ身門京門ニ灸スニ按ニ身柱ヲケリケト訓ス肩背ヲリ
名氣ヲ散ストム急ナシシ〇又按ニ淨府在胃ノ氣層前
洞是シク本方ヲ用テ小水通ニ難キモノハ麦芽大木杏ハ
加テ用テ試ムルニ殊功多シ〇又胡黃連ノ苦味ヲ飲得ガレモノ
ハ黃連ニ代用シ

四君子湯

此方脾胃虛弱飲食進ニ難キヲ第一標的トシ用シ如此
脾胃虛弱ハイニ參附ヲ組合セテ用キ座ハ余程相違アリ

脾胃ニ飲ラ難故ニ胃中ノ陽氣分布ニ難ク飲食コレニ進
ニ難ク胃腸日ニ分布ニカク多胃口日ニ塞リ胸高虛痞痰
嗽吞酸ナリニ并止也故ニ人參生薑ニ胃中ノ飲ヲ温煖前
キクテラニ大棗甘草ニ心下胃口ヲ平ホルニ胃中ノ飲
ヲ消導ス也此如ク胃中ノ飲消導スルニ甘草ノ陽氣ニ胃
而上達ニテ下大腸ニ下通ス是ニ白ヲ上下通和ニ痰嗽吞
酸漸ニ止ニ飲食漸ク進ニ大便実ヤルモノニ實ニ小便短淡
モノ自快通スルニ名醫此術ヲサテ脾胃ヲ補益スルヲ後人此術
ニ深ク意ヲ用テ脾胃ヲ補益スルニ白陶器罍隙ヲ沃土ニ補フ

様心得ルモ多ク思ハル其ト云ハ古訓云脾胃水穀海
ナク免水飲停蓄シ易キモ也又脾胃湿ラ思ハ説ラケリ方
ヲ考ル淡薄微温ニ滲湿ノ薬ト云ニ胃中胃口湿ラケルハ
胃中湿コレニ隨テ消導ス是即脾胃補益也字者此処ラ
熟慮セハ思ヒキ過シク按ニ此方及六君子皆飲食進ニ難氣
力薄キヲ以テ死症ト云故ニ脈腹ニ亦是ニ準ニ力薄ニ示ホ胡羊
夏海心ナリ脈腹ト曾壞ノ違ヒアリ中氣ノ薄キ病証ナリ心下
痞硬ニ任脈通リ絡聚シタル脈候ナレモ輕ニ腹表ヲ摩テ何ト
チ力薄クナリト云様覺ラテ任脈及腹表ヲ摩候ヲ尋思テ錯認

廿二 苟養堂

スカラス

異功散

即四君子ニ陳皮ヲ加ル者也

六君子湯

是亦四君子ニ陳皮キ復ラ加ルモ也○按ニ此陳皮キ復ラ加ル者
胸中胃口停飲ヲ推開クニ層カレ故也

杏砂六君子湯

即六君子ニ杏仁薤白ヲ加ルモ也○按ニ此方胸中胃口停飲
ヲ推開クニ六君子湯ヨリ層カレモ也○又按ニ腹脹鼓ノ如ク

廿二 文

水不利者多香砂之君子厚朴加倍用之効驗得之
多此方用之今少之谷消少者多前方之麦芽如虛寒
甚者前方之附子如之○右中氣薄腹滿者
肉味塩ヲタチ大麦石ヲ粥ニ煮テ百ノ食トスニ食禁如サテ
ト云ホトニ効ナシ

四物湯

勞男子煩人所氣虛耗虛火熾上血淡是カ為枯涸肝氣
多鮮大種之病極ヲ痊スルモ悉皆是ヲ主ト所謂肝虛ト独
肝氣虛者ニシテ腎氣ニ俱ニ虚ス也吾門此証ヲサテ肝虚

証者多ク此病症或瀕瘦不食者多ク或寒熱咳嗽者多ク
或吐血下血或下血下血其他症候多端ト六枚奉在暇ア
皆此腎氣虛耗肝氣妄動之症候ト假令症候ノカ様
ナルトモ任脈動悸ヲ察シ水分ノ亢ニ當テ動築劇ニキモトハ
肝虚ニ疑ヒテ肝腎虚耗人男女限ラズ必此処ノ動築劇
クナルモノト心得シ是則地黄ヲ用ル標的ナリ世道多ク此標的ヲ
シラス者リ地黄ヲ用テ其効ナキト理也○按スルニ四物湯ニ古来
劑ト稱ス故一切血症アルモノハ虚寒ヲ論セス必此方ヲ用テ
其意ヲ計見ルニ四物湯ヲ用ル虚耗セル証モ即時ニ泉湧如

科多無様心得人多是太心得違り謹按西物湯ハ
肝虚治る茶なり故効其能ヲ論セ地黃潤肝ト云當
飲潤肝ニ後肝ヲ第ト云テ為窮ニ流肝ト云テ為茶後肝
幼ニ并テ候多既ニ為茶テ肝部ノ急縮ヲ後テ為窮ヲ肝
水許結ノ氣ヲ疎通ニ當歸ヲ肝火ヲ潤ニ且肝部ヲ生地
黃ヲ肝火ヲ滋潤スル肝部能和ニ痰涎隨テ生ス腎水亦枯
燥ニ并テ地黃ヲ補腎ノ茶ト云如肝血ヲ滋潤ニ肝火ヲ清涼
スニ且腎水枯燥セザルヲ指テ補腎ノ茶ト云西物既ニ夫ノ力
ヲ致ニ相合テ肝部ヲ融和スル無數病症ヲ愈セテ上テテ故ニ

十四 芍藥甘草湯

薛之有四物湯ノ主治ヲ説ニ肝脾血虚發熱或寒熱往來或曰
哺發熱頭目不清或煩躁不寐或胃氣作脹胸脇作痛ニ謹テ
此主治ヲ按スルニ寒熱往來或曰哺發熱云ニ皆肝部見証非ス
ニ薛氏西物湯ヲ用ル長ク妙処ヲ得ル人也故ニ其云ニ此処ニ
意今人西物湯ヲ論スルニ此云大ニ卓識アルヲ覺テ主治中肝
脾腎ト説ル即水尅土土尅水ヲ急言ニ甚ク草ニ看圖ス
一カラス

家方芍藥湯

即西物湯加芍藥甘草 治一切肝虚症水分動葉甚シ

十五 芍藥甘草湯

心下痞硬思慮鬱結不_レ_レ_レ此方ヲ用テ是効_レ_レ_レ而脇物_レ_レ_レ
在者_レ_レ_レ此胡_レ_レ_レ〇肝火強盛_レ_レ_レ多性急戴_レ_レ_レ不寐_レ_レ_レ右欬
燥氣逆甚_レ_レ者_レ_レ_レ麦門紅花_レ_レ_レ〇言諸錯_レ_レ_レ或喜_レ_レ_レ忘_レ_レ_レ者
三酸_レ_レ_レ傳_レ_レ_レ加_レ_レ_レ

鏡火湯

水_レ_レ_レ動_レ_レ_レ殊_レ_レ_レ是_レ_レ_レ〇此方ヲ用テ_レ_レ_レ煎火_レ_レ_レ上_レ_レ_レ燭_レ_レ_レ〇乾
咳_レ_レ_レ者_レ_レ_レ生_レ_レ_レ下_レ_レ_レ加_レ_レ_レ〇_脚氣_レ_レ_レ衝_レ_レ_レ逆_レ_レ_レ諸_レ_レ_レ利_レ_レ_レ水_レ_レ_レ前_レ_レ_レ無_レ_レ_レ功_レ_レ_レ〇其_レ_レ_レ處_レ_レ_レ前_レ_レ_レ此_レ_レ_レ方_レ_レ_レ合

加味四物湯

四物湯_レ_レ_レ加_レ_レ_レ胡_レ_レ_レ牡丹_レ_レ_レ皮_レ_レ_レ〇此方_レ_レ_レ前_レ_レ_レ三_レ_レ_レ方_レ_レ_レ此_レ_レ_レ火_レ_レ_レ同_レ_レ_レ小_レ_レ_レ異_レ_レ_レ也

然_レ_レ_レ之_レ_レ_レ根_レ_レ_レ子_レ_レ_レ以_レ_レ_レ精_レ_レ_レヲ_レ_レ_レ加_レ_レ_レタル_レ_レ_レ趣_レ_レ_レ意_レ_レ_レ薛_レ_レ_レ氏_レ_レ_レ治_レ_レ_レ術_レ_レ_レ三_レ_レ_レ精_レ_レ_レ虧_レ_レ_レル_レ_レ處_レ_レ_レ深_レ_レ_レ探_レ_レ_レ也

八物湯

即_レ_レ_レ四物湯_レ_レ_レ加_レ_レ_レ君子湯_レ_レ_レヲ_レ_レ_レ合_レ_レ_レタル_レ_レ也_レ〇即_レ_レ_レ薛_レ_レ_レ氏_レ_レ_レ主_レ_レ_レ治_レ_レ_レ後_レ_レ_レ之_レ_レ_レ其_レ_レ_レ主
治_レ_レ_レ云_レ_レ_レ肝_レ_レ_レ脾_レ_レ_レ傷_レ_レ_レ損_レ_レ_レ血_レ_レ_レ氣_レ_レ_レ虛_レ_レ_レ弱_レ_レ_レ惡_レ_レ_レ寒_レ_レ_レ發_レ_レ_レ熱_レ_レ_レ或_レ_レ_レ煩_レ_レ_レ渴_レ_レ_レ或_レ_レ_レ寒_レ_レ_レ熱_レ_レ_レ昏_レ_レ_レ瞶_レ_レ_レ
或_レ_レ_レ胃_レ_レ_レ弱_レ_レ_レ不_レ_レ_レ利_レ_レ_レ或_レ_レ_レ大_レ_レ_レ便_レ_レ_レ不_レ_レ_レ實_レ_レ_レ或_レ_レ_レ飲_レ_レ_レ食_レ_レ_レ少_レ_レ_レ思_レ_レ_レ腹_レ_レ_レ脹_レ_レ_レ痛_レ_レ_レ等_レ_レ_レ症_レ〇按_レ_レ_レ此_レ_レ_レ肝_レ_レ_レ脾_レ_レ_レ傷_レ_レ_レ損_レ_レ_レ血_レ_レ_レ物_レ_レ_レ肝_レ_レ_レ方_レ_レ_レ西_レ_レ_レ君_レ_レ_レ脾_レ_レ_レ係_レ_レ_レ也_レ〇肝_レ_レ_レ
血_レ_レ_レ少_レ_レ_レ氣_レ_レ_レ下_レ_レ_レ胃_レ_レ_レ氣_レ_レ_レヲ_レ_レ_レ衰_レ_レ_レ氣_レ_レ_レヲ_レ_レ_レ衰_レ_レ_レ畢_レ_レ_レ竟_レ_レ_レ四_レ_レ_レ物_レ_レ_レ君_レ_レ_レ主_レ_レ_レ治_レ_レ_レヲ_レ_レ_レ會_レ_レ_レ得_レ_レ_レ不_レ〇別_レ_レ_レ云_レ_レ_レ此_レ_レ_レ不_レ_レ_レ及_レ_レ_レ唯_レ_レ_レ薛_レ_レ_レ氏_レ_レ_レノ_レ說_レ_レ_レニ_レ隨_レ_レ_レテ_レ可_レ_レ_レナリ

十全補湯局方

口_レ_レ_レ勿_レ_レ_レ勿_レ_レ_レ言_レ_レ_レ云_レ〇

即物湯加黃芪肉桂也○治氣血俱虛在熱惡寒自汗盜汗
汗支体倦急或頭痛眩暈口乾作渴又治久病虛損口
乾食少或而下利驚悸發熱或寒熱往來盜汗自汗潮熱
伏熱遺精白濁或二便見血腹痛作痛小便短少大便乾
澀或大便滑泄壯熱下墜小便頻數陰莖疼痛等証
薛氏○按此此方主治薛氏後又用黃芪用止人參三力
今自汗盜汗止人參表ヲカタル意也肉桂用止人參三力
ヲ合之遺精白濁或大便滑泄小便短少或頻數ナル治人
又此味之系ヲ引鼻メ夫ハ病處ニ達スル意ナル也

滋陰降火湯 四春 沂涂木麥 羊橘柏雷甘姜朮

此方亦八珍湯ヲ加減メ制在者也シラク五方ノ意ヲ按在潤
燥ニ專メ海火ヲ兼名也○川芎ヲ用其當歸ヲ系地黃
如潤ニ後少能ナクニ專ニ上部ヲ疏通能ルヲ以テ今
按在ニ此症メ肩背強ク凝聚或頭項ニ凝聚止テ折見
及テテリ今此症ヲハ若ク弱ヲ加テ用○人參ヲ用止ルモ人虛
火動少シ鎮リ咳嗽吐痰喘急ナド適ニ減スル人參ヲ加テ用
此場合ニ有テリ○伏令ヲ用止ルモ人曾口得畜飲少不利不
利此症ニナリ故也今按在ニ此症メ或微腫下有カ又ハ心下

胃口畜飲多キ者ハ次々品用ニ〇謹テ按ズルニ此症命門ノ
火妄動スルヲ降承虛乏ニ命門火益熾ニ肝火妄動ニ
肝實ニカ為ニ赤枯涸スニ火熾蒸ニ上脾肺ヲ薰灼スル故ニ
熱咳嗽吐痰喘急盜汗口乾ニ此症火化脾胃ニカイルニ
其根原ヲ尋テハ腎水虛耗肝血不足ニ火妄動ニ脾肺
ヲ薰灼スル也故ニ生地黃知母黃柏命門火ヲ清涼ニ當歸芍
藥熟地所入ヲ潤ニ天門冬門ニ肺部ヲ潤ニ氣甘枳大棗
多脾腎ヲ調和ニ又甘草ニ味ヲ柔ニカク緩セテ脾部ヲ
健ニ後ハ姜汁以瀝童便ニ味天門冬門ニカク合肺

廿七 芍藥湯

部ニ咳吐痰喘急ヲ治シ肺部ヲ下降セシ又生地黄母
黃柏ニ味童便ヲ得テ火ヲ清涼スル也故ニ此方ヲ名テ滋陰降
火湯ト云陰水陰氣ヲ滋ニ肝火命門火ヲ降ス也〇今按ズルニ地
黃生熟並用シ一方ヲ制スル人意ヲ用ルニ至極ト云ケル及テ精
悉ニ過ル弊アルニ故ニ余斷ニ此類ニ效ハ清涼ヲ主スル症
ニ生ヲ用テ滋潤ヲ主トスル症ハ熟ヲ用ニ唯此方ニ非ズ或レ陳
皮青皮ヲ並用或レ蘇葉蘇子ヲ並用ル等ノ方ヤケテ數ヲカ
ス皆後世ノ弊アルニ必ニ之ヲ洩スカラス

寧肺湯 楊氏方 木令沂芍下涂甘味桑麥膠

廿八 散

勞之亦八珍湯人參ヲ去味麥門冬白何膠加此意也○氣
虛之虛瀰瘦冷熱自汗盜汗咳嗽痰喘ナナル之症用
故其主治之治衛氣俱虛冷熱自汗肺氣喘急咳嗽痰
說一〇按此人參ヲ去之ハ喘急症アルヲ憚ル意ナル也
然定カヤウ病証肺氣虛耗喘鳴痰嗽ナル者人參ヲ用テ効
得テ多ク之藥論ニ難シ予多量ヲ用テ試シ虛里動甚知
膠下及心下ニ動悸甚キモ久ク人參ヲ用ルハ久ク喘鳴ヲ倍益
軍動靜ナルモノ久ク人參ヲ用テ然モ衛氣耗肌肉消
瘦痰喘スルモ虛里動シカナル甚稀也虛里動ハ有テカラ

元ニ至ラサルモノ以テ人參多ク症下定ム此病証人參ヲ去ル
ト最意ヲ用キ也倉卒ニ診視スカラス〇此方四物湯ヲ以テ
肝血枯涸ナルヲ潤シ何膠味麥門冬白生姜ヲ肺潤之
シカス計リテハ痰喘咳嗽ニ難シ故ニ四物肝血ヲ潤之
ヲ組合テ肺氣ヲ潤ス藥初ニ五ニ何膠ヲ生姜ニ組ルニ
味麥門冬ヲ肺潤之今少シカ不足故ニ何膠ヲ多ク用タ
ルハ潤肺ノ一尋常ナラスト知シ何膠ハ唯潤肺ニシテ
又四物ニカラ合テ血燥ヲ潤也故肺肝ヲ能滋潤スハ火逆
下降ニ肺部取ル飲モ心胃中ニ下降也是ニ曰テ何膠又

廿八 苟藥性論

廿九 苟藥性論

草木ノ味ヲ但ラ胃中ノ飲ヲ消導シテ下膀胱ニ輸スナリ生
姜甘草ハ草木ニ組テ胃口心下ヲ開キ後又諸薬ヲ和合
ルニ直セシム也○今按ニ本草及諸方書ニ何膠能シ能ク説ク物
トトメ説ナシ細カニ考ルニ其能潤燥後急上テ然レテ肺
ヲ潤スニ回ラ肺部ニ急火熱シテテ衆循環シ肺内復常
ス肺疾ニテ裡急後重ニモ何膠ヲ用ハ宜直ニ腸垢快
利シ小便淋瀝短注難通モノ何膠ヲ用レ宜直ニ水決利
ス是急ラ後止ル非ク其從ヒ聖下血崩漏下ナト用ルモ急症
燥火熱淨スル方為ニ其効アルモノト知シ○又按何膠潤燥

後急容草根木皮人參及之非ク學者深意ヲ
用ラ其效殊ナルヲ知シ

八味腎氣丸

此方所腎虛衰ニニ歳ノ虛火熾上テ水氣下降セリ
ル者ヲ治スルノ薬也○按ニ情欲ノ動ルモノ皆肝火下
ナリテ腎氣是ニ應ル也今按スルニ此症腎氣虛
衰スル故ニ肝氣之亦虛衰ニ或陰痿或小便頻數
或小便不禁淋瀝等ノ証ヲ在スル也是身常肝腎
不足ノ証也是ニ反テハ強中多欲久戰不氏漏精

セカトノ証トナル也此ニ症ヲ考ルニ強中ノ方ハ極虛ニメ
治シ難ク陰痿ノ方ハ及テ治シ易シト知シ○腹候ヲ細
カニ論スハ強中ノ症ハ必腹都ニ行而腹ハ狗掌強ク脘下
何ナク虛張スルヤウテ皮薄ク青筋ヲ見ル也陰痿ノ
腹ハ狗掌モアリヤカラ腹底ニ沉テ表ニ浮ク脘下虛脹
気味モアリ又青筋モ多ク脘下ノ任脈下脘瀆如ク
脘下ニ面ニカククテトシタル様子モアル也右強中陰
痿ニ候皆カクノ如クト云ニアラス然レテヤヤニ心ニ答ニ候
ニテ相ルニイテ覺テ○脈候六部ニ浮數ニ弦ヲ帶テ

ヨリ三部ヲ熟診スルハ浮本先重ク診スル微弱ニカクニ是其診
脈瘦極也○腹候兩脘下及ニ行通リハ狗掌スル任脈水分
動築ト云テ脘下ノ鳩尾ヲテ之悸動スル也此任脈水
分ニ候肝腎ノ虛火上炎ニ候也ヨクノ任脈ヲ熟診スル症
ヲ并知ルニ肝要也○脘下ニ青筋アラレ何ナク虚脹モセ
ス唯脘下カククテトシタル西瓜ヲオスカ如キ状ノモナル也
○舌候脘下ニ面ニ赤クテ其色朱ヲオクカクテ舌弁クド
シタル肌アリスニメリトシテ乾燥スルモ腎水虛損虚火上炎極
ノ候ナリ又舌常ノ通リニ薄赤ク胎モヤク舌ノ厚ヤヤ生

ヨリ三等モウク見ユルアリ又舌色格別赤クモナクトシ名
取ククナシトメ乾燥シ舌心少シ計薄白成名アリ此二
舌何モ危篤ニテ多ク不治ニ至リ易ク薄ク白粘有テ此
常ノ如クハ乾燥ス長格別事ニテモナキアリ是若ク易ク
候ナク又面ニ黒胎有カ又ハ厚白粘有テ面邊排帯ニテ
縁ナリタル様ニ赤キ舌ナリ是虚火ノ熾ナル腎水斷損ノ
極ニ至ル候也猶治スルキ症ナ知シ此外舌候数多クハ必
ハニキ故クテ若ク學者多年用意ハ必ク許多ク舌ノ識得
ルニ○水腫脚氣ニ腎氣化ラ用ルモ皆此脈候舌候ヲ以

甲一 芍藥 地黄

テ某ヲ所スシ○按此症肝腎二藏虚耗ニ虚火炎上ル白
テ腎精益虚弱シ腎膀胱及胃中ニ溜水ヲ蓄滯シ水中
ニ火ヲ熾令テ水気不降故ニ桂附ヲ以テ胃中及腎膀胱ノ
水ヲ通利スルニ然ル肝腎虚火熾ナルニ白テ桂附ヲ用ルハ
又テ虚火ヲ助ルニシテ水気下降ニ難故ニ地黄ノ君トシ山茱萸
薯蕷ヲ佐トシテ專肝腎虚火ヲ潤シ牡丹皮ニテ同肝腎ノ
虚火ヲ鎮テ鎮降セシム此四味ニテ水分ニ動筋セシ虚火鎮
降スルニ桂附虚火ヲ碍ラス其功十分ニテ溜水ヲ逐テ膀胱ニ
下降セシム故ク次ニ附子カヲ合水道ヲ疏通スルニ意

甲二 芍藥 地黄

り蜜ヲ用ルハ甘味ニ腹部^事挛縮ヲ後志也挛縮ニ止守ハ
虚火ヲ鎮リ宿水モ又下降ス是ヲ以テ考ルハ蜂蜜ノ甘味ニ
テハ味ノ柔カラ助クト云ニ甘草粉蜜湯大烏頭煎ト其
他ノ蜜ヲ用タル薬方ヲ参考シテ知シ○腹痛甚キ者
甘草膠船ヲ多用ス痛後ニ難キニ蜜甘草ヲ合用テ殊聚
アルイテ屢コレヲ試ム今参考ノ多ク此記ス○又按ニ此方桂附ヲ
用ルハ胃中及腎膀胱之間滯スル宿水ヲ通利セカ為若
水通利スレバ虚火炎上セズ虚火炎上セカレハ腎精乾涸セズ
ハ味化桂附ノ身常ノ解ニテ分リ難シ古人右腎命門火

ヲ助クテ虚火誤ト知シ○又按ニ此方地黄山茱萸使牡丹
白味ヲ組合セタルニ方ノ極妙処ニ仁意反テ所ノ非
今人ニ方ノ趣意ヲ弁知ス雖羸瘦人ニ過ハ必スハ味化ヲ
用ニ是病人ノ形状ヲ錯認メ此方ヲ用ル標的ヲ知スト云ニ故
偶ヤスレモアリ又寸切ナキモアリ是定ナシ任脈水分ノ候ヲ知
ルハ過也然レ診察ニ意ヲ用ヘキハ肝要也凡テ本草山茱
萸牡丹ト組合タル方皆水分ノ動ヲ標的トメ用シ○又按ニ
ハ味化料用テ虚火鎮リ難ク用ヒ心アシキニハ甘草ヲ加用
ニニ是本方ニ蜜ヲ用ル意アリ甘草ヲ加用テ兎角用ヒ心

本草
山茱萸
使牡丹
地黄
白味
甘草
蜂蜜

アシクノ家方ノ製附ヲ用ニ如此スニ極且虚火ニ亦ノ易キ
症ハ後世方中ニ桂附ヲ除キタ地黃劑ヲ用ニシ

香蘇散

局方

芳芷香蘇 荊防香蘇
干味香蘇附

蘇 荜 橘 甘 姜 葱

此方古来ヨリ時傷寒濕疫ヲ治ス上ニ細カニ此薬味ヲ考ヘ
且初者施シルニ傷寒濕疫等劇症ヲ治スキ薬非ス只
微熱微惡寒頭痛數嚏清涕等ト感冒ニ用テ効アリ
箇様ノ微邪盛ニ流行セシ時此薬ヲ用効驗アリシヲ傷寒
温疫ト、御山唱来ルルニシテ長世間一時流行シ病ヲ
テ、邪ノ輕重分ルル反ハス是ヲナシテ投ト云テ之然ケレト

決傷寒濕疫ノ類ニ非テ明ケシ此方外感症用ハ前ニ
还ル通ノ感冒ニ用テ然ルニシ○男女共氣滯ヲ胸中心下
否塞シ飲食ヲ思ハス熱トメ動作ノ懶心下急痞脹
下否滿ス故大ハ紫胡ト用是則キ難ク及テ薬味重
キヲ嫌ヒイテ不食スル病人ナリケヤウハ此薬ヲ用ハ胸
中心ノ悶怒然トメ大ニ効驗ヲ奏スルアリ○又臨民ヲモ
シシ痛ヲ書夜河乱ニ建中瀉心ノ薬ヲ用是亦効ナキ
者此薬ヲ不劑ニシテ用ヒ即驗アリ余往々試テ其效ノ
化ナラケルヲ知ル○此方香附ニ姜ニ胸中心下ノ氣滯

局方 香蘇散

芍藥之味酸而甘其性平其功和心下之緩又右血
滯飲之疎之甘草其味辛其性平其功和心下之緩又右血
味辛胸中下之滯其性平其功和心下之緩又右血
氣滯之滯其性平其功和心下之緩又右血
外邪之滯其性平其功和心下之緩又右血
附味苦及毒之滯其性平其功和心下之緩又右血
香胸中下之滯其性平其功和心下之緩又右血
滯之滯其性平其功和心下之緩又右血
人聖藥之滯其性平其功和心下之緩又右血

某忽畧之於連下並稱之思之甚下之○靈雲林清
世金書三川考白芷羌活薄荷加芍藥散之○右方感冒
及荆芥防風加芍藥散之○右方感冒
頭痛鼻塞或清涕之○靈雲林清
某之用芍藥之寒氣甚之○時節之邪氣發散之難之
桂枝加用之近來古方家之稱之曰動之○後世之
感冒之稱之○即古之所謂大陽中風之○此症之
過之○必桂枝湯或桂枝加葛根湯又之葛根湯之
用之深之意之○用之誤之○大陽中風之

カトシタル病ヲ次々感冒ノ類ニ非ズ故ニ獲救ノ證アリヤ附
劑ト進タリ又白虎ニ進タリ傷寒論ニ詳カク感
冒ノ真ノ微邪ニ僅ニ頭面皮膚ヲ侵ス分リイニ
根拠ナキ邪氣也故ニ紫蘇劑防芳止痛皆陳皮ナ
ノ輕菲ナルモノニテ皮膚頭面ヲ輕ニ流面タル何ノ
子細ナク連ニ解散ス也既ニ如是輕邪ヲ治スルニ紫
蘇ヲ用ルニ難ク劇ニ牛カラ用ルノ類ニ邪氣ノ解散スル
ト返テ遲キ道理ナルト多年経験ニ所也只此紫
蘇ニテラス方証上ニ就テ紫ト病ト的當スル效驗必

キテ數多アルト也深ク此意ヲ考テ數スニ〇芳正香蘇散
外日証ニ用ルニ右ニ説多通り也又内消氣滯病ニ志氣
舒暢セス胸中心下痞滿ニ肩背肘臂ナト痺酸疼ス
証ニ用テ場合アリ〇司憲王神珍方ニ味香蘇散
此方本方ニスルハ紫劑稍カアリ此主治外感内因共
前症アリハ稍重キ証用ニ各味ノ效ヲ説ニ及ム字者全
方ヲ考テ并知スニ

行氣香蘇散 **紫橘烏沙柴蒼麻芍枳甘姜**
此方香蘇散ノ變方ニテ即本方ニ烏柴柴胡蒼麻川

一六
文
...

苦差活積赤麻膏ヲ加ルモ也○按此方ヲ用ル証氣
滯心患爽慧ナラス心下兩脇不硬甚シキト主トナリテ
或頭痛ヲナシ或全身骨節疼痛或肘臂酸疼或心
腹絞痛或小腹牽痛延テ脚腰及フ等症ニテ用テ効
アリ既ニ如此而腹心下不硬上下ノ氣升降セザル故ニ凡
濕氣ニモ傷易ク又厚味堅硬モノヲ食ルハ肚腹脹滿
痛疾ノ症ヲ見スル必然ノ理也世ニ運動モスル迄雖書ヲ錯
リ讀テ飲食厚味堅硬モノニ傷ラルトテ主ト心得或ハ
凡患濕氣ニ傷ラルトテ主ト心得ル人多ク是深ク立方

趣急ヲ考サル魚也心下兩脇痞硬ノ氣滯ル此症本根ニ
主トス厚味堅硬生冷傷ルハ凡患濕氣為感ルハ皆根葉
ニ主ト心得シテ今迄鑑ニ主トテ奉テ字者ノ参考ニ備ルモノ
左如シ凡傷生冷飲食厚味堅硬之物肚腹脹滿疼痛
外感凡患濕氣頭痛身熱憎寒偏身熱骨節麻木疼
痛又情心怒相沖飲食不可心腹氣痛云々此主治作藥
根ヲ隱ニ根葉ヲ見スル也必シテ根葉ニ眩惑ニ本根ヲ失フ
カラス今方彙ニ飲食傷ルヲ誤テ第一行氣香蘇散ヲ
奉テ是内傷生冷肚腹疼痛ニ眩ルニ似テ方意ヲ

精散之主治ヲ謬ルカラス○此方香附白朮枳實柴胡甘草
三心下兩腋痞硬ヲオシニルヲ紫蘇陳皮川芎麻黃ヲ胸中
ヲ推刺ス又川芎羌活ヲ頭痛及臂肘向ヲ使通シ之紫蘇
黃生姜ニ由早及胸向滯ル滯氣ヲ吐表ニ於泄シ又下
水道ニ消導ス也○謹按此方用止之引寒濕氣外感
ナキモノ麻黃芍藥木ヲ去リ用之ニ然代薑及芩中ニ當飲多キニ
ハ藥水ヲ用テ然ルシ

分心氣飲 **桂橘** 涂冷 **青半羌通坦棗蘇甘** 燈心

分心氣飲ニ方アリ一方即至後新增方也其方不香附白朮

大腹枳實香附白朮枳實柴胡甘草 一即續添諸向經脈方受

揚仁翁カ直指方分心氣飲ノ真方アリ即續添諸向經脈方

加減シテ方也其方 續添諸向經脈方枳實木香枳實芍藥麥門冬

又炎氏海効方分心氣飲方後ニ名ノ流氣飲ト云リ此諸方ヲ

歷觀スニ續添諸向經脈方ニ方最宜ニ其也方方意

五カニ故ニ余今是ヲトス方彙ニ亦續添諸向經脈方載

ル即今規用ル方也○此方心下痞硬甚ニキニ回テ心下胃中ニ

水ヲ多量其水胸中ニ波及ニ散固節ニ流ル使短氣心胸否

問日ニ甚キハ胸助膨脹ニ心思亦日ニ益辭結ニ劇キハ

即咽喉不利喉氣吞酸吐噦惡心下痞見之者主之
 ス○此方芍藥甘草大棗四桂三前云心下痞硬之後ハ
 心下如錘三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 夏陳皮青皮三胸中以下三三三三三三三三三三三三三三三三三
 腸一下降也三水氣三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 間稍消代三故在冷水通大便及燈草三三三三三三三三三三三三三
 通利三三三三○又按此方中芍藥大棗三三三三三三三三三三三三三
 也即大柴胡及甘遂三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 者必三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 湯三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 以心下三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 夏三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 者意三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 人諸氣不和心下痞硬胸脇脹滿不通吞酸噯氣心
 噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色痿黃口舌乾燥飲食減
 少身漸瘦或大腸虛閉或日病之後胸中虛否不思飲食

湯三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 以心下三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 夏三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 者意三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 人諸氣不和心下痞硬胸脇脹滿不通吞酸噯氣心
 噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色痿黃口舌乾燥飲食減
 少身漸瘦或大腸虛閉或日病之後胸中虛否不思飲食

等症○按諸氣不和心弱石胸助虛脹石白也心胃
石胸助虛脹心下痞硬按葉也心下痞硬甚也石白也
心胸飲多石胸助虛脹石白也心胃石胸助虛脹石白也
主治之說多根元症隱之按葉症本之往是不
此至治之其在石胸助虛脹不通意氣喘喘頭目昏眩心下
反胸中飲多石白也四散傳急面色痿黃心下石硬
甚之其氣上下四末分布也石白也石白也石白也
飲多石白也其飲及之火生也石白也飲食減少日
漸羸瘦心下石硬石白也中胃中飲多石白也石白也

白也大腸虛閉上部則塞下降ノ氣チキ白也此方大
便快通スル即南川ヲ導シト飲スルニ北也方劑ノ手段ヲ用
葉此術少カラサレ也○又按吾邦之醫者茶ヲ煎スルニ甘
草ヲ減少ス甚チキニ至テハ余葉ノ分ヲ不用終吾邦人ハ
甘味ニ宜カラス甘ハクニテ中滿セシキト云テ漢ニ甘草ハ分ニ同
然ニ心得ルイ古ナリ然リ是ハ大ナル心得違ナリ殊箇様氣劑
ニ治更甘草ヲ減少シテ用ニス此方ナリ甘草ヲ減少スルハ作者
ノ意ニ依ルト云シ即此分量ニ甘草ヲ減少スルハ作者
湯ナリ及シモ舊法ニ依テ甘草ヲ減少スルカズ然定天性甘意

久六射酌スシ〇惣身滿腫ニ水尿不利心胸否向心下否
硬是者此藥ヲ效驗アルイ多シ具人格別甘味嫌ス但心下
病硬病ノ基トナル者ナラハ本方ヲ用ユニ若弱腸ノ否向是
シ甘味ヲ忌ミ且心下ノ病硬ニ甚シカラス但流通ヲ第一ト
スモ様子アラハ甘草ヲ減シ芍薬ヲ去リ木香香附類ヲ加
用シ更ニ以心傳心ナリ文類凡ス処テラス救疫此病臨ニ必
機活ヲ了悟スルイアラシカ

三和散 芍沈木羌蘇瓜坦木楨甘

此方七情ノ氣鬱結シ心腹否向協助膨脹或ハ手足微
腫或頭面虛浮大便秘澁飲食不進等ニ症用スニ又脚氣
遍心呼吸短促大小便秘不通ノ者ニ用スニ又氣滯ニ大便不
通大黃ニ消テ用レ氏通ニ難キ者此方ヲ用テ快通スルイ
此方主治文ニ腸胃燥法年高氣弱背脊痛妨飲食ニ云
ニ按ニ此言ニ標ニ論ニ難ニ腸胃燥法大便不通ニ症老人又ハ
病後人多ク此症アリ心下硬腹皮亦急々動悸セテ腹脈
共ニ疾シタル様子ニ背脇痛等ノ証ハイカニ三和散ニ大
便通スニ腹脈共ニカナク任脈水分ニ動悸アルハ
腎水肝血トモニ虧損ス候ニ古来ヨリ所謂血燥ノ症

江下 救急散

此方子三大便不通... 加用... 知... 胸... 姜... 此... 泉...

一三熱忍... 補... 薄... 如此... 此... 心... 本...

此理ヲ錯認ス方ス

羊夏厚朴湯 羊朴芍藥蘇

易簡方ニ生姜七片大棗二箇ヲ加テ湯ト名シ向方亦同
○金匱曰煩人咽中如有炙肉羊夏厚朴湯主之○易簡
方治喜怒憂思悲驚恐云氣結成痰涎狀如破絮或如
梅核在咽喉之間哈不出嚥不下是七氣之所為也或于喉
滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或曰痰飲中即吐
逆惡心並且服之云○按此方中脫芍藥手ヲ以按之
心下硬滿上胸中迫リ氣舒暢多胸向多患ニ症用ニ

一既ニ如此心下硬滿不氏本連類苦味ニ推キ証ニ云ク又芍藥
甘平膠船ト甘味ニ後ニキ証ニ云ク心下閉塞否回リ胸
心下飲ヲ多或ハ吐惡心ヲナシ或ハ痰涎壅盛氣急或曰中常
ニ痰高如キモノ有ヤウニ覺テ咯レ氏出嚥不可考ノ証ナリ是
皆心下痞硬ヲ示スル証也心下亦硬甚ニ故及テ淡味劑ヲ
用ハテ飲ニ得テ之硬早ニ後多也此手段證ニ暮ニ缺也
此ヲソルカ如キ理ニ所謂柔能制剛理ナリ○此方蘇葉輕虛
三胸中心下ヲ理ニ羊夏辛温胸中心下ノ飲ヲ疎通ニ厚朴不
苦不甘味伏於淡薄ニ心下ノ飲ヲ下降ニ下水道ニ消導

不後世に至る生薑大朮加ル毎方白癰同然之患後之
一非不此方如キハ淡薄ヲ以テ主トスルハ大朮ヲ用ルハ後カ
シヤクハ薄スハ生薑ヲ加用ルハ苦力カクシ○又按之當令ノ
逐流動モハ心下ヲ診在リ意ヲ用スルハ只咽中有欠病言ハ
カリラ標的トシ咽疾不利症之ハ概ニ此系ヲ用テ安投ト云シ咽
中不利モノ牡蠣天麻更類或甘中乾姜類ヲ治スルモノ有
只心下石硬ハ向シ状見ユレ是モ舌腹診ヲ熟シハ各ニ區
別スルモノト心得シ必ニ金匱言ニ狗派カラス此方余下蘇葉輕
ヒダケル也蘇子ハ痰飲ヲ透スキニ有傷毛有所謂小青龍ヲ在リ大
寒症ハ無故大青龍ニシテ冷推スニ故湯息トトニ應ニ厚朴推スニ散不

ト覺テ
可ナリ

理氣湯家方

即半夏厚朴湯ニ蘇子ヲ蘇葉代橘皮枳實桔梗更連克
ヲ抑モ也○此方半夏厚朴湯腹候ニ胸中逼息在リ一層是
ニモニ用テ橘皮枳實ニ峻ク胸中ヲ開キ桔梗連克ニ胸中ヲ散
ラハクク意也

寬中湯家方

是亦半夏厚朴湯ニ蘇子ヲ蘇葉代甘草干姜湯ヲ合テ
ルモ也○此方半夏厚朴湯心下石硬者ニ難ク又理氣湯ニテ

胸中下滿之象乎毛々々也故言半姜湯之合心下之患也
然此方系甘中元心下之後也此非其疎通乎辛甘之復也
後介ノ午段ト心得

沉香降氣湯方

此方心下之病ハ胸中下之病如胸塞之者氣復自逆也
又胸中苦悶或吐酸飲食不進或水不利或大便燥
者等証用之此心下候識得七分病上就之此方
用牛膝橫無碍立止即氣之急症用之即此心下候用
之也○按此方香附砂仁甘草三物心下之病皆前キ又

沉香塩少許加テ右ノ三味ニカヲ添テ上胸中下ノ腹ニ至

許閉ヲ却開スル意也○按此方香附子ニ芥沈香

二兩半一本作香附子四兩沈香二兩右物細末每服食入塩少許

沸湯点服凌旦露露空服之去邪惡氣使無穢夜云○

局方主治治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞腹脹滿

喘促短氣乾噦煩滿咳嗽喘急無味嗜臥飲食又治

胃痺苗飲噎一本作噎醋吐酸胃下支結常覺妨悶及中寒

咳逆脾濕洞泄而眩暈鳴膈下撮痛皆能治之患脚氣全

氣上衝心腸堅滿肢體浮腫者尤宜服之常服消胃消積

散難思食○古今方彙吞酸門此方ヲ載云白芍陰陽症
 滯氣不升降胸高秘塞乾嘔噎醋吐酸云按此主治同
 方云ヲ略也吞酸門載云故刀ヲ略シタル也○分量
 香附一錢半沉香六分砂仁一錢半甘草一分生姜煨少許水煎
 ○按此此方同方分量大異也此定同方散藥故各味分
 量多干理十元此方来山同方来山故各味分量減ス元
 同方分量後減スキリル然此分量本方云レキ氏見
 一又本方生姜十三方彙ニ生姜ヲ用テ何書ヲリ棟樑ニル
 一也今同方後ニ生姜ヲ用テ又同方ニ甘草ヲ用テ多シ

方彙方甘草僅二分母是也五方ノ意ヲ失フ云ニ故ニ余此方
 ヲ削テ香附甘草各一分沈香砂仁各減半煨少許ヲ加テ煎服
 也シム

蘇子降氣湯 **載陳朴前往沂半日** 加芍藥散格名
大降氣湯

治男婦虛陽上攻氣不升降上盛下虛兩聲痰多咽喉不
 利咳嗽虛煩引飲頭目昏眩腰疼肺弱支体倦急肚腹
 痞刺冷熱氣浮大便下秘澀滯不調支体浮腫有妨飲食上
 コ同方主治文也○按此方麻杏甘石湯或越婢加半夏湯或
 大青黃或小青黃加石羔類ヲ用ルト同様病形ナリ其人元氣

薄弱ヲ麻杏甘石ト用レ、痰喘反ラ盛ニリテ用心急キ故
ニ後世ニ至テ筒様方ヲ製テ用ル也。飲病者ハ脈腹ヲ詳察
的當ノ藥ヲ用テ之故ニ。虛陽上攻氣不升降上盛下虛説リ
○謹按ニ痰喘壅盛ノ証多クハ其痛根肝火上炎ナリ。在来ハ
トト知シ、痰症肝火上炎ニ痰喘壅盛スルハ巴豆甘遂ノ類
或石羔麻黄ノ類ニ制ス。此症ハ虛痺也。故石等ノ藥用ヒ
難ニ故ニ當級ニ肝火ヲ滋潤シ甘草大走ヲ合入肝火ヲ緩ク
シ前胡ヲ兩脇心下ヲ開キ肉桂厚朴ノ味甘草大走ニカク合テ
心下腹部ヲウツリト平和ニ便皮蘇子半夏生姜白味前

五十六 蘇子厚朴湯

胡カク合テ胸膈心下ニ聚リ、痰涎通ラ流通ス意也。○按ニ此
方内桂ヲ用ルイ尋常ノ解ニハ解シ難シ心下痞塞甚ニ症
本連類ニテユル難キモ甘草内桂ヲ組合セタル藥ヲ用ハ心下
ホウリユルニ上部ノ氣疎通シ下降スルニ甚速也。即苓桂朮湯
及桂苓甘枣湯類内桂甘草ヲ組合セタル方ヨク轉ニ来ルイ
ナルニ此等ノイラ理會スル内桂上衝ヲ理スルニハ心自ニ瞭然
タラシ○主治中虛煩引飲、肝火熾盛ニ心下水飲心
下ニ引シルヲ也。此処ヲ治ルニ藥内桂甘草大走厚朴當歸
前胡六味也。又肉桂辛辣上ニ頭目ニ走リ其氣味ニ頭目ノ

五十七 苓桂朮湯

氣ヲ疎通ニ厚朴當歸甘草前胡大棗五味ヲ引廻リ急
也即主治中續目昏眩ト説ル是亦肝火上飲ニ水飲ヲ
目ニ引ル形ヲ云ルニ傷寒論起則頭眩説ル同意
ニ即肉桂甘大棗ノ主心也若頭目昏眩是モ心火
ヲ加用シモ然ルニ〇余數年來哮喘持病アル今屢療
ニ聖藥受吐美久ニ蘇杏石ノ類ニ即驗アリ天稟虛弱
久ニ蘇杏甘石ヲ用レ喘氣益増ニテテ知驗ナシテレ
目テ引レニ蘇子降氣湯ヲ類ヲ用レハ其効速ニテ前
ニ勝レリ年來這箇虛寒ヲ診シ得ル故近年ハ此症ヲ

蘇杏石

一診ニ疑惑モナク夫ニ劑ヲ使テ皆効驗アリ學者此症
臨テ能ク其虛寒ヲ分別スキ也〇此症皆上衝是ニ故
脈狀弦緊洪大モ色然長其脈中何トナクツリ圓ニリ
テ底カアルモハ実症ノ脈ニ腹候モ腹皮厚クツリトカ
是ノ也ニ蘇杏石ノ類ヲ用テ効アル候也又脈狀同様ナ
氏少ニカト五テツクリトシタル形少ク重ク是ヲ按セハ何トシ
底カアルモ實寒間ノ脈ニ腹候モ腹皮薄多クツリト
シタルニマリモナクカ薄キモハ即蘇子降氣湯類ヲ用効
アル候也〇又按ニ脈狀天抵前如ク今層カ薄クツリ

二八 文選

トシタル形モ心一層少キ者ハ蘇子降気ヨリ又二層虚症
回春ノ喘四君子湯ヲ用テ之ニ老人虚人或大病後気血調
ズ呼吸短促喘咳有モノニ屢用テ効果アルトテ覺ル
又前述ノ通り虚証ノ脈微弱或沉伏シテ應ニ
難キモノ又ハ弦緊洪大ニテ少毛圓ニテ薄キ竹筴ニテ指頭
ヲシク様ナル形ニテ只キクトトカトテ底力ナク頰上及ヒ午
冷汗ヲ登シ或ハ午足微冷シ爪甲ノ色ヤト変ル症ハ最虚
候ニテ危篤ノ症也此症ハ喘四君子湯附子ヲ加テ用テ或
蘇子降気湯ニ人参附子ヲ加テ用ルルモノ也

附子ハ一擔活スル救ノカラス至ルコノ意ヲ用テ機會失
テテ要ス然レ此症現ニ痰喘壅盛第一証ナル故也
ハ參附ヲ用テテ惺リ衆議ノ啓ヲ移ニ病者ヲ死地ニ陷者
惜タキ也○此症古人モ蘇子降気湯ニ薑芪土加皮倍更ニ
活乾姜附子ハ參ニ蘇葉ヲ加テテテ謹案ニ此方藥味甚
紛雜ニ信用スルニ足ラス故余ハ唯蘇方附子ハ參ヲ加テ用
治喘一方 **杏 桑 木 桂 朴 苓 甘**
是余カ製スル処方也虚症痰喘壅成ノ病大抵ハ蘇子降気
ニテ足ルコト同ニ辛夏ヲ用テ痰喘ヲリ收リ難キ證

是言二疎通系ニテ合ニ此方ヲ製ニ用ニ方症相對スル
是奇驗アリ支所謂ニ夏燻痰ノ証カラス往見及ル
アリ忽々カラス

瓜蒂枳實湯 沂砂木中梔本橘枳積灰貝萹姜

治痰結咯吐不出胸膈作痛不能轉側或結胃兩滿胸
寒熱氣急逆心數不能言語者並皆治之痰飲食積嗽
主治
者痰如膠也咳嗽胃兩結痛者是痰結也早晨嗽者胃
有食積也上半日嗽多者胃中有伏火也俱宜此湯右咳嗽
主治
按痰飲胸膈結痛忍カラス咳嗽喘鳴氣急等症

ナク其脈滑數心下痞硬大抵大柴胡脈形ニ似名者小陷
胃湯ヲ用テ効アリ○咳嗽氣急或膠痰ヲ吐胸膈痛ヲ要
ル者瓜蒂枳實ノ症也近世古方家ト稱スル者只火小陷胸
湯ニテ知テ瓜蒂枳實ヲ知ラス今方家ト稱スル者人足
ニ及ス所謂平歩ヲ以テ古歩ヲ笑ノ類ニ長短ト云ニ
學者今方劑ヲ該觀ス此數カラニテ要ス○又按此方
專胃中伏火及胃中食積ヲ以テ病曰クイカニ痰ヲ
生スル基トシモ胃中伏火及食積也然モ胃中ニ火伏
藏ニ胃中食ヲ宿滯スル皆肝部疎通スル肝火熾盛ニ

西股以下痞硬不白胃氣運轉機失七胃中火
生其火盛上白結硬膠痰上上然守八肝火第
一根本三胃中伏火及食積枝葉心海三故此方以
薑貝母三胸中及胃口三畜三物痰三滋潤三竹瀝姜汁三
味薑貝三方三漆專胸中三開三胞子黃芩三肝火三清
三胸中及胃中火三清三再三陳皮枳實桔梗砂仁杏仁
以三胸中三下三推開三當酸甘草三肝火三潤三心三下三後三
既右三味三肝火胃火俱清三三胸中及胃口膠痰
之稍解散スル勢ニナリタル也伏冷ヲ以下水道ニ下降散

此方專治

人後敗毒散

局方

羌活 西芷 枳實 桔令 參 甘草 薄荷

治傷寒時氣頭痛項強壯熱惡寒身伴煩疾及瘧瘧
咳嗽鼻塞重爪熱頭痛吐噎寒熱並皆治之 右局方 治傷
寒頭痛壯熱惡寒及痰涎咳嗽鼻塞重爪時溫疫頭面
腫痛痲疾發熱諸般瘡毒小兒驚風瘧疹惡毒等 右局方
此方乃芷香蘇散并荆防敗毒散類同樣見ルカ之彼
邪氣僅前表及頭面ヲ傷ルニテ根柢淺キ者用此邪
氣散之ハ一層深キ故熱氣又復リハ一層甚ク且胸中以下
痞塞不白テ邪氣肌表三漏三難三疰三心胃三故三下痞

文

フ兼ノ標的トシキコトナリ○又按ニ主治中ニ諸般瘡毒ヲ治ルノ
効ヲ示シ是亦使ニ然ル也○瘡毒諸般瘡毒其餘大毒
敗毒瘡毒類伏藏シテ心ヲ去スルニ志皆心下痞硬而食其
毒胸中ニ沖シ或又前部ニ流注スル也○微毒骨節疼痛是
キ等ノ症モ心下痞硬然ラハルヲ以テ内ニ伏藏伏在毒多
少ラメオスニ是余カ多年診候ニ得テ差ハルル処ナリ梅毒是
キ者、証ヲリテ石羔ヲ大ニ加フコトモアリ又黃連解毒ヲ合シテ
モアリ然レバハ皆実症毒ヲ血燥セラル者ニ施スル手段ナリ若
血燥ニテ羸瘦スル者ナリ六道通散又ハ加減四物湯ナリ用ユ

此方梅毒治法

ニ是等ノ加減別ニ傳アル也○按ニ此方此胡前胡根ヲ以テ兩
股ニ下ラ雅ヒキテ窮極根羌活ヲ製面及胸中ヲカキ又川
芎積根羌活独活白朮薄荷生薑ニ味ニカテ合テ和氣ヲ肌
表ニ透シ人參甘草ニテ心下ヲムクリト和ラク右ヤニ味各能諸
條ノ上頭面ヲ清シ胸中ヲ開キ下ニ下ラ和氣ニ宿滯ノ邪氣肌表
ニ透スルヲ得也再々伏冷ヲ以テ腸胃中ニ滯ル水ヲ通スル上内
外ニ舉ニ融通在ノ意ナリ○古来別種防風ヲ加テ預防敗毒散ト
名シ此方頭面瘡毒甚キモノ用テ効アリ方彙ニ此方ヲ以テ熱ヲ
治スルコトヲ示シ然レニ字ナク改標的トシ難シキ事也所謂頭

改標的トシ難シキ事也

面腫塞下即頭痛鼻塞り声重或顔面腫ナラ指色〇謹
 按邪氣肌表ニ浮ルモノ唯爪寒邪熱ナリ秋毒ト秋セズ古人
 筒様ニ痒指ニ毒ト云ハ沈滞ノ容易ニ表ニ難キモノヲ指也
 其沈滞ニラ容易ニ表ニ難キハ何等モノ障礙ヲナシテ然
 ヤ是他ノ物中心下因塞スレバ今此方ヲ熟意ニルニ前解
 通リ頭面胸中心下ヲ和スル外ノ手段ナラズ此方意ヲ理
 會セハ毒ノ字ヲ解スルニ思ヒ半ニ過ン〇又按ニ古来より解毒
 ノ系ト称スルモノハ此系スレテ皆別段ノ功效アルヲナス唯峻胸
 中心下ヲスラス也諸般ニ毒内攻スルモノ皆心下ニ定リ胸中ニ沖ル

モナル故峻胸中心下ヲスラス系ヲ解毒系ト云也犀角及一兩ヲ
 解毒ノ系ト云テ是即胸中心下ヲスラス系一ノ系也故ニ古来より
 大毒鼠毒ニ用ヒ又小瘡内攻類ニ用ヒ又肺氣ニ用ヒ又痼症
 ニ用ヒ来レリ此等ノ意味ヲ識得セバ天地間別ニ解毒ノ系ト云
 モノ有ラシキ也即救毒散ニ此意ヲ用ヒ〇積山云此方ニ鼠氣
鼠熱ニ用ヒクマレハ疹疥疥癩ナリ〇凡鼠急慢毒ヲ鼠ノ息熱スルヲハ
 救毒散冷ルヲハ鼠ノ息熱スルヲハ鼠ノ息熱スルヲハ鼠ノ息熱スルヲハ
 驅風解毒湯前卷全春 防 荆 羌 克 菊 甘
 治疥眼腫痛〇按スル此方劑本防風羌活上部ノ瘰癧シテ
 邪熱ヲ散シ運亮牛蒡子熱毒ノ凝結ルヲ疎通シ甘草下

心後直倍數、此毒腫痛、知也。○謹按此方、下疳腫痛、
ヲ治、方為、殺、余、方、於、名、為、入、括、更、并、加、後、此、毒、
、咽喉腫痛、水、茶、消、滴、之、下、言、語、不、能、食、重、之、下、
治、之、其、妙、也、氣、之、毒、以、之、煮、之、取、清、之、者、
水、如、之、後、之、是、之、飲、之、大、効、也、此、藥、溫、散、之、
服、之、清、冷、勢、後、之、流、之、者、親、之、試、之、其、殊、効、也、
天候、此、藥、行、在、必、強、之、
權、之、向、之、破、之、有、是、之、也、

黃連解毒湯 附方

時后乃傷寒時令、黃連、三兩、黃柏、黃芩、各、兩、反、子、十、
眾

水六升、煮取三升、分再服、治、煩、燥、不、得、眠、之、○
黃連解毒湯也、當、附、後、為、本、也、○又、外、臺、必、黃、連、
名、為、崔、氏、方、其、文、詳、載、于、左、○前、軍、督、護、劉、
已、汗、解、曰、飲、酒、後、刺、者、煩、燥、不、得、臥、余、患、
此、黃、連、解、毒、湯、方、黃、連、三、兩、黃、柏、各、兩、
取、三、升、水、一、
取、目、明、再、服、進、粥、水、漸、愈、此、道、解、熱、毒、除、
刺、者、此、湯、療、外、臺、按、之、玉、楨、微、義、曰、此、火、
乘、然、之、也、○又、按、之、今、方、彙、傷、寒、治、人、書、
カ、ス、○方、彙、主、治、大、熱、不、煩、燥、口、渴、喘、滿、
陽、厥、微、

熱の甚及汗吐下後寒涼諸藥不能退其熱者按此至治文
 病証詳ナラス此主治通リニ白朮湯及竹葉石膏湯人証甚
 紛ニ白朮竹葉石膏類ニ所謂身熱之位フハトシタル表熱ニテハ
 ナリイカモシカトシテキ當リ熱キヤウニ覺テ^{海カラ}可斷強キ熱勢
 也其外ニ乾テ舌燥或黃胎或黑胎アリテ大渴引飲或痰喘
 咽喉不利或譫語煩燥ニ脈浮滑或洪大ナルモ也黃連解毒
 湯熱候右ニ勢ヲ抑スニ其勢今一層カナ低ニ沈々様ニテフシ
 フ帝熱^リ所謂^ルニシテ帝熱トハ半表半裏熱ニテラス又石
 羔知母桑門糲米之類ニ清涼潤燥スル内中熱モアラス又

黃芩石^ニテ効取裏寒熱ニアラホラ也解毒湯の熱數
 フ徑ル^ト火ク作^ニ殘熱餘熱ナリ云位ノ熱ヲ^ハ表^ニサ^シ熱^ニテ
 モナラズカラソキシトキ熱候ヲ標的トスシ是ヲ名クテ古^ニ熱^ト
 ト云故曰散沫カスソツト強キ熱ニ用ニカス且是ノカ
 ラス肌膚枯燥ニカサトシキキ當リノ者ヲ標的ニシ舌候^ニ黑
 胎^ニ乾燥甚シキモラ標的トスニ黃胎白胎モ^ニ宜カス此
 症ニ枳別津液枯燥スルモ^ニ三^ニ独參湯或生脈散ヲ兼用ス
 シ○謹按^ニ此^ニ至治第一心得ハ初^ニ外邪ヲ感メ後^ニ少^ニ氣^ニ衰
 也是方在相對也之故邪氣還定自久ク^ニ何^ニ系^ニ功^ニモ^ニシ^ニス^ニ只

日數ヲ經向ニイワトナル外邪減僅ニ三分許ナリ其餘七分
熱外邪ニテス内火也下知ニ准前ニ述如ク無益白散ヲ經
為津液枯燥ニ肝腎ノ腎火不降ニ熏灼スル故ニ臣子
黃柏ヲ以テ肝腎ノ腎火ヲ清クシ黃連ニ心肝ノ火ヲ涼スル意
也然レモクノ瘧疾火ノ症メ虛ニテス故ニ滿腔上心下ニ牽制シ
任脈水ヲニ動悸ナク其脈沉細或軟弱ナク底ニカカアル
モ也此脈腹反舌候熱候ヲ以テ標的トシ○又此症津
液枯燥ニ乳層カクトシ名方子ニ至ルハ尚火津液ヲ枯燥
セシムテ虛症津液枯涸スル類ニ非ス若肝腎虛火妄動

ニ津液枯涸スル症ヲス其脈浮虛散大ニ腹部及任脈水
分動悸亢極スルモ也此症ハ地黃薯蕷牡丹皮トシ主藥
ニ劑ヲ處スキ也凡虛寒ニ症是ヲ以テ并辨スシ○又按ニ
絡毒沉澀メ諸藥效ヲ示ルモノ奇良輕粉類ヲ施ヤ手効
ナク及テ轉変シ終ニ廢人トナシ多ク是皆毒氣日久結
滯在固テ肝腎ニ火妄動シ血氣涸燥ニ病毒累毒ニ對
火ヲ曠シ合テ廢疾トナシ也華蓋刀圭ヲ執者考ニ數深カ
ラサル罪也慎キテシテラスヤ絡毒家日數ヲ經ルテ久シク瀉
瘦轉甚シク毒變轉盛ナルモ毒ヲ攻カラズ先血氣ヲ補

六十一 芍藥湯
了劑之海火疎通之藥ヲ加用之即通送散於羊角如
母黃柏各半忍久木通 各大人加味三佳也 輪輸血燥甚キ
モハ四物湯ニ右加味スニ則復後後奇良又ハ輕粉類ヲ
用之奇良輕粉ヲ用ニト欲セハ前方ニ黃連解毒ヲ合入數
日用ニ此藥ニ海火解毒セ下欲セハ水必潤濁手ル也
猶右ノ藥ヲ連進スニ數日 後ハ水清潔ナリテ後証ニ後輕
粉ヲ用奇良ヲ投スニ如此トハ毒氣沈滯患モナク又藥毒
膠固ノ患モナシ是即黃連解毒湯ヲ熱病用ルト同意ナリ
○多母疫ニ耳遠不食舌重ニ皮層モカサツキ淡紫ノ兒

之家兄モ甚恐常脾胃類ヲ以テスニ迄今此ヲ餘カサト云フ雖
用ニ見事ニサシクハ肉枯燥ホニ此湯ヲシ香兒用黑ニ○蓋汗
久然反夏ニニ移リ更ニ當改麻黃トハ誓ヒ中ニ肝履ニ其
キ當ニラキアリ

涼膈散 芍藥 薄芫將硝 桔梗 芥子 甘

治大人兒穢積積熱煩燥多渴面熱頭昏唇黑咽燥舌腫喉
閉目赤鼻衄額頰結硬口舌生瘡痰痰不利涕唾粘稠膿
不更諸証妄狂腸胃燥淡便溺秘結一切凡產後且服之○
按三方主治涼膈散大抵ヲ及リ主治始才ノ所大人

小兒藏府積熱八味ヲ玩味スニ藏府積熱アルカ故ニ種ノ
症候ヲ弁スルト知ニ故ニ疔腫及無名之瘡ヲ用ニ又瘡毒
及麻疹類ニ用ニ能右ノ八字ヲ識得セ何等ノ痼症施テ
其効驗アリト無ニ〇又按局方竹葉七片蜜少許ヲ入
テ此味ト古方彙考ニ疔瘡竹葉ヲ用スス味ト大非ナリ
〇又按ニ勞瘵竹葉連壳ヲ以上心肺向ラスカニ黃芩ニテ
胸中心下熱ヲ解ニ疔子ニテ胸中ヲナキ又下降下焦ノ熱
ヲ解ニ大黃朴硝ニ味疔子黃芩ニ身ノ大藏府積熱ヲ瀉
滌ニ女使ヲ通利ナリ然定右ニ味ニテハスルトニテ及テ下降ノ

氣効ル場アリ故ニ甘草蜜ニ味ヲ加テ心下垂縮ヲ後クハ右ニ味
ノ効驗ホトヨクニ積熱障リモノト下降スル趣意也〇又按ニ局
方竹葉蜜ヲ用テ一匙深意アリ竹葉ヲ以テ連壳薄切合ニ
梔子黃冷ヲ以テ大黃朴硝合ニ蜜ヲ以テ甘草合スルヲ終メ
下蒸ノ化散ヲ送リ下ニ蜜場或ハ砂糖場ニ板スニ瞑眩少
ニテ海下是快ニ是多カ屢試テ知ルル此方ニ蜜甘ヲ用テ一
即此意ナリ

溫經場 金匱 吳茱萸 漆參 桂 何牡 半 姜 甘 姜

按ニ此方々金方名々ニ外是々々金匱經場ト多ク外是々々

崩漏虛血一服之即斷日水過期而不來者服之亦佳方
全同○按此方婦人服結塊為痛或腹滿裏急心熱舌煩
熱唇口乾燥或赤白帶下連綿不絕或大便不利者或秋
波塊成根帶終久服尚或不使淋瀝苦痛不可忍証
標的トナシ用ニテ予數年此方ヲ試シ全愈ニテ証ク如クイカニ
唇口乾燥ヲ標的トスレバ血塊痛無モノニ用テ効テ痛有
ヲ標的ト用シ○謹按此証下部血塊有テ更ナル故ニ上部
水ヲ蓄テ下降シ難ク上下隔塞在也故ニ當故ニ肝血ヲ潤
シ川芎ヲ肝血ヲ疎通シ芍藥甘草ヲ肝血ヲ緩テ更ラシ何

膠牡丹皮ニテ下部ニ集レル瘀滯ノ物ヲ通ラシ又阿膠牡丹皮ニ味前
味力ニ合潤燥ニテ虛火ヲ鎮ム人參桂枝ニ味前ニ味合
温後ニ心下ヲ和ス又麥門ノ味何膠牡丹皮ニ味合肝火ヲ鎮
潤ス此丸味ヲ肝火マヤ潤之痛ヲ稍和ラシ上部ニ集レル水飲
下降セサル故上下ノ氣融通ス故ニ吳茱萸生姜半夏ニ味
ヲ上部ニ水飲ヲ下降セシムル意也按此証肝腎虛弱ニ任水
分ニ當テ動築甚キ者地黃黃耆類ヲ加テ用之ニ是テ予カ
數ニ經驗スル所リ

甘草乾姜湯

文

此種胃口及心下之飲者其飲之心下否硬或胸中及心下
苦痛或吐逆在者主治心下傷寒論之主治之飲逆咽
中氣煩躁吐逆之証說曰胸中氣逆中心下之飲者其下
降者止故其水飲中火之生火熱上衝胸中問無干云
也單飲只胸中分利之非必口舌毛氣燥在者也咽中乾
燥者活用之舌及下見止

安中散 和劑局方 **枳 日 桂 姜 索 良 苗**

此方即甘草干姜湯之變方也後人甘中乾姜湯用之切驗必
有証有白之苦心極此方之製法之方主治白治逆年逆

日得發翻胃吐酸水寒邪氣滯於內停積不消胸膈
脹滿攻利腹脹急心吐逆面黃肌瘦受後急又治煩人
受利痛小腹連腰攻注重痛并飲主之云此方本
為散每散受焚酒調送下煩人六次酢湯調服云
若酒不飲者以溫湯調送下是方也予今煎湯用
亦有効也近年游囊病者甚多其症遠年日也
腹痛吐水吞食漸少惟悴危萬及者多其腹形囊
中氣亂盛力如或心下或將旁或在右腹皮突起
擗之而無真腹中活物有力如故庸醫誤認執

中ニシ敘虫ノ葉ヲ用ニ長夏種ニ効ニ殊ニ知ラス是皆平気
不和水飲畜師ノ妖災起遊走在イラ此症右ヨリ上衝痛
者ニ平方ヲ用ニ在リ衝要ル者平方ニ吳茱史ヲ加用
一ニ若曹中虛寒甚シ腹臥力之ニキ煮六附子ヲ加用ニ
○辟叢ヲ証只茶カヲ用テ効有ル者非ス先弟一飲
量ヲ減スニ米一合粥ニ煮終日食成スニ魚旨腹
生冷粘滑等物一切用カラス吐水後多ク大湯ヲ飲スル
有リ禁メ水飲ヲ与カラス茶ヲ用モ一昼夜ニ貼之与ニ
此飲長禁ヲ能フ者若シテ浮ナル者効驗ナシ切ニ戒諭教訓

スニ○又腹痛ニ此禁ヲ安破ハ茶ヲ用テ効ナシ○辟叢及久服
痛重安中散ニ用非ス外附子稷米湯甘中粉湯湯或
香砂六君子香蘇散類各用ニ症候有リ也ニ拘泥スカ
ラス○謹案ニ此方甘草ヲ主茶ニ心下ヲ和後ニ氣善ニ善
肉桂ニ味甘ヤカラ合セ曹心下水飲ヲ温服ニ廻ニ茴香
香實肉桂与曹口ノ前キ又疝胡索ニカラ併セ胸中ヲ用キ
再ニ特効ニ但水飲ヲ下降ニ消導スルニ○按ニ疝胡索面
香胸中ニ滯氣ヲ推開又下小腹滯結ヲ通ス切有故ニ
支胸痛ニ疝胡索ヲ用ニ又煩人疥癩亦腹痛及疝後

牽痛之用芍藥者曾中及胃中胃劑之腹痛假若
右二系上下用之効アルヲ知シ良姜辛温ニ專ニ最
ヲ温水飲ヲ行ス切有リ故ニ支多ク腹痛用ニ然其
効只胃腹ヲ温ノニ非ニ右膝下ニ衝或痞滿或苦痛者
用ヲ効有是予カ親驗スルナリ

香薷飲 同方。純香薷。同。

藿朴藿散

同方曰治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉若年中身熱冒
倒角者及張不醒人事手足或全搐搦此為暑氣不可
為引引之當以此方加羌活治之○謹按此方治証誤認

夜冷四逆湯証疑ニ夏月此証甚多必錯認ニ誤治之
カス香薷飲証大陽引飲口燥咽乾ヲ主症トシ麻狀
カ有ラ第第一表のトニ其外の証悉皆無ク無シ脈中
之レニキ等証ヲ錯綜シ可診○同方中身熱有香薷散
其方白扁豆厚朴香薷水ニ入酒一分煎至七分去滓
水中沉冷云○又傷寒論又書黃連香薷散其方
厚朴香薷黃連三味也方後曰一方有白扁豆尤及然
黃連香薷散名無シ同方香薷散方后白扁豆及然
用白扁豆加黃連名黃連香薷散○按夏中飲水之

胃中多滯消身難自胃中熱生肝火
 心肝間焦燥煩渴益甚上下表裏因寒
 炎暑氣外煩動兩熱灼燼於暑病極
 足長夏月病常態也故香薷香鼠先胸中
 及胃中滯因之而厚朴香薷三伴之心下及滿腔
 氣下降之白扁豆伏苓之多滯水飲之消導
 其味香薷飲主珍白歷方 茂木香薷瓜薷朴薷
 此方唐時製也故人原方稱其具果味者蓋
 味香薷飲簡約之如瓜薷四味香薷飲証又脫

候有者此方用然也之多カラ參附并用証比又
 層輕易証知黃芪人參泉甘草陳皮其味胃
 氣之助心下之後木瓜伏苓其味香薷厚朴陳皮
 三味カラ併也水中心下之滯因之押劑之意也

改解湯 治世本方無多味 蓋志詳五有加之 加紫胡尾子各四味 厚朴湯 兼此者用之

此證思慮過度解之傷脾氣弱之飲食無味所謂後天
 元氣薄以心肝之氣流揚之不能多食少寐熱盜汗
 健忘怔忡驚悸嗜臥散解指尋之症或吐或下受煩
 人必往行不暇補其氣瀉其濕流注等症在在是也

肝ノ氣虚耗スル曰テ解胃傷脾氣虚耗スル曰テ心肝ノ
 氣損養テ平養テ力故也故ニ方ノ趣意ヲ玩味スルニ
 胃中ノ虚寒ヲ消導シ胃中ノ真陽ヲ升提シ心肝ノ氣
 ヲ行ラスヲ以テ主トスル藥也即各味ノ辨別ニ方意ヲ詳
 ニシト如左○人参木香生姜ニ味胃口ヲ温煖シ胃氣ノ
 升昇大走ニ味人参生姜木香ヲ合セ心下胃口ノ
 閉塞ニテ痞硬スル者ヲ和シ既胃口心下降得平和
 スヲ以テ白朮茯苓人参生姜ヲ伴テ胃中虚寒ノ水飲ヲ
 消動下降セシム也既如此胃口心下平和ノ上下升降

氣ヲ妨ル者無キ故テ人参黄芩ニ但シテ胃中ノ真陽ヲ上
 下ニ升降シ外肌表通達ス酸辛竟眼當歸遠志深
 心肝寧滋潤スルヲ以テ心肝ノ氣能整テ元氣無諸病
 々平和スル也○又按此証肝氣虚弱ニ心下痞塞甚キ以
 厚味ノ藥ヲ用ハズテ淡平甚シクテ飲食ヲ妨ク故ニ甘草ノ
 分量ヲ減シ且地黄等ノ藥ヲ用ス製方久深ク病情ニ
 通達ニテ苦心甚シキヲ可觀

嘉永庚戌六月念七日抄

荀彧遺書

荀彧遺書





