

一本堂行餘醫言

六下
癩痔 疥癬 臙瘡

十武
5/1
7



門中記
511
卷 7



一本堂行餘醫言卷之六下

疥音戒

香川修德太冲父著

疥者謂手指間生小瘡甚痒遂及周身也。即邦俗所謂肥前瘡是也。肥前西海道州名。其始自肥前州傳來。猶云廣東瘡也。或以謂黥瘡為華瘡。故未至華瘡已成肥前瘡之意也。大要有痒痛二樣。即俗所謂痒疥痛疥是也。其痒者手指間始生細粟瘡。甚痒搔之水出。漸延腕臂。遂及周身。有時苦痒則至爬搔安頓難為忍耐。以其瘡在水分。故搔

疥
一
一本堂醫言

之止出水耳。若搔破較深，則入血分而出血。如是必覺小痛，以其水出，故謂之濕疥。又有小瘡，痒搔之，白屑起，皮頑厚而靱，每作乾痂，以其氣分故不出水。若搔破甚深，微出血水，故謂之乾疥。其痛者，始痒瘡漸多，延大如豆，大小不一，包膿水如痘瘡，嫩赤腫起，疼痛潰爛甚者，與徽瘡一般。或有遂成徽瘡者，以其血分故出膿淋漓。古云馬疥者，即是也。

出神農本草柳葉條云：馬疥痂瘡。

又見名醫別錄馬勃條

此證專稱痒疾，雖痛者亦痛痒相半，但痛而有膿者易愈。唯痒而出水者難治，如其無水唯痒，搔之白皮起，稱乾疥者至難治。有延及十年餘者，若用外敷藥愈之，或浴冷泉取速効者甚，則直成暴水脹而臥不起者，陷成結毒，猶徽瘡結毒，諸證蜂起，終身不可除治。輕者至成諸結，每發漏可不慎畏乎。

如攝州多田冷泉為最，及但州城崎溫泉，稱瘡湯者，諸州呼為愈瘡溫泉類皆同。

間有生蟲者。此其末耳。按靈樞稱痂疥。

見經脈篇。

神農本草稱疥癩馬疥痂疥蟲。

出石灰冬灰五色石脂青琅玕藜蘆羊蹄敗醬扁蓄牙
子莽草松脂等條馬疥見上痂疥見雌黃薑草鐵落等

條疥蟲見蘭茹殺羊角等條云殺疥蟲又按草蒿條云疥癩痂疥蜀羊

泉條云疥癩痂癬蟲鮫魚甲條云瘡疥棟實條云疥癩
水銀條云疥癩痂瘍名醫別錄及已條云疥癩癩蝨
柳華條云痂疥白及條云白癬疥蟲防己條云諸蝨疥
癬蟲瘡青箱子條云疥蟲雄黃石硫黃鈎吻等條云疥

蟲。○千金方云惡瘡其大如錢名曰馬疥者謬名也。

病源候論稱大疥馬疥水疥乾疥濕疥

云疥者有數種有大疥有馬疥有水疥有乾疥有濕疥

多生手足乃至遍體大疥者作瘡有膿汁焮赤痒痛是

也馬疥者皮內隱嶙起作垠塘搔之不知痛此二者則

重水疥者瘡癰如小瘰癧搥破有水出此一種小輕乾

疥者但痒搔之皮起作乾痂濕疥者小瘡皮薄常有汁

出並皆有蟲人往往以針頭挑得狀如水內病蟲○水

疥又見外臺秘要所引延年論

千金方稱風疥

云寒熱瘡及風疥諸雜瘡

又本州綱目黑大豆條云風疽瘡疥而引千金方

又云痛疥

云痛疥百瘡不瘥又云久痛疥濕瘡浸淫日廣瘡不可

堪搔之黃汁出瘡後復發○千金翼亦云痛疥百瘡○

按古稱痛瘡者不知今何疾意是疥類故連稱痛疥邪

病源候論云痛瘡者由膚腠虛風濕之氣折於血氣結

聚所生多著手足間遮相對如新生茱萸子痛痒抓搔

成瘡黃汁出浸淫生長折裂時瘡時劇變化生蟲故名

痛瘡又云燥痛瘡若濕氣少風氣多者其病則乾燥但

痒搔之白屑出乾涸折痛此蟲毒氣淺在皮膚故名燥

痛瘡又云濕痛瘡若風氣少濕氣多其瘡痛痒搔之汁

出常濡濕者此蟲毒氣深在於肌肉內故也又有久痛

瘡候○千金方亦有燥痛濕痛方○千金翼方疥癬門

有痛瘡痛疥方○外臺秘要痛瘡久不瘥門所引劉涓

子療久痲疥癬諸惡瘡毒方又乾濕癬門所引淡師方
 療痲疥方等痲疥元名醫別錄黃環條已上皆是疥痲混舉難得
 分明又稱疽痲見名醫別錄崔茵條稱疥疽見千金翼方及由是觀
 之疥與痲非有大異痲亦疥類不可別立門條故今併
 而論之列載考證如前

久疥

見證治準繩又千金方及千金翼方俱云久疥癬

五疥

醫學入門云五疥乾濕蟲砂膿又云砂疥如砂子細箇

醫學入門云五疥乾濕蟲砂膿又云砂疥如砂子細箇
 萬病回春亦同○明醫指掌圖云疥有五乾疥濕疥蟲
 疥砂瘡膿瘡瘡之別醫學綱目作膿胞瘡又萬病回春云疥後膿瘡瘡又秘方集驗云疥瘡膿瘡肥瘡

瘡膿瘡肥瘡

暴疥

見證治準繩

手疥

見醫學綱目

行餘醫言

疥

五

一才堂藏書

細疥瘡

出秘方集驗

牛疥

見證類本州魚脂條云牛疥狗瘡

牛皮疥癩

出萬病回春

赤黑丹疥

見本州細目白瓷器條

馬瘡

見本州細目魚鮓條

蠶稿

同上體腸條

錄補證治要訣云瘡癬疥此雖皮膚小疾不足為害然瘡有惡瘡癬有頑癬疥癩嗜膚尤為煩擾甚至經年累月不能脫油凡病此者不當專用外敷藥須內宣其毒可也此言尤得要領故舉載焉

疥者。痒疾也。故說文云。搔也。韻會舉要。韻會小補。康熙字典。典等俱引說文。作搔。按今說文。元有搔。無癢。周禮天官疾醫。夏時有痒疥疾。後漢書。鮮卑傳。蔡邕議。邊垂之患。手足之疥。瘡。中國之困。曾背之。瘰癧。此皆手爬搔刮之意。而劉熙釋名云。疥。斷也。癢。搔之。齒。類。齒也。可謂鑿矣。韻會舉要云。或作疥。康熙字典云。類。篇。或作瘰。字彙云。癰。同疥。正字通云。瘰。癰。並俗。疥。字。今皆。勿用。正字通引鮮卑傳。其下云。韻會引入疥。註改作疥。謂。

附字辨

疥者。痒疾也。故說文云。搔也。

韻會舉要。韻會小補。康熙字典。典等俱引說文。作搔。按今說文。元有搔。無癢。周禮天官疾醫。夏時有痒疥疾。後漢書。鮮卑傳。蔡邕議。邊垂之患。手足之疥。瘡。中國之困。曾背之。瘰癧。此皆手爬搔刮之意。而劉熙釋名云。疥。斷也。癢。搔之。齒。類。齒也。可謂鑿矣。韻會舉要云。或作疥。康熙字典云。類。篇。或作瘰。字彙云。癰。同疥。正字通云。瘰。癰。並俗。疥。字。今皆。勿用。正字通引鮮卑傳。其下云。韻會引入疥。註改作疥。謂。

文作搔。三書恐誤。說文元有搔。無癢。周禮天官疾醫。夏時有痒疥疾。後漢書。鮮卑傳。蔡邕議。邊垂之患。手足之疥。瘡。中國之困。曾背之。瘰癧。此皆手爬搔刮之意。而劉熙釋名云。疥。斷也。癢。搔之。齒。類。齒也。可謂鑿矣。韻會舉要云。或作疥。康熙字典云。類。篇。或作瘰。字彙云。癰。同疥。正字通云。瘰。癰。並俗。疥。字。今皆。勿用。正字通引鮮卑傳。其下云。韻會引入疥。註改作疥。謂。

鮮卑傳。蔡邕議。邊垂之患。手足之疥。瘡。中國之困。曾背之。瘰癧。此皆手爬搔刮之意。而劉熙釋名云。疥。斷也。癢。搔之。齒。類。齒也。可謂鑿矣。韻會舉要云。或作疥。康熙字典云。類。篇。或作瘰。字彙云。癰。同疥。正字通云。瘰。癰。並俗。疥。字。今皆。勿用。正字通引鮮卑傳。其下云。韻會引入疥。註改作疥。謂。

瘰癧。此皆手爬搔刮之意。而劉熙釋名云。疥。斷也。癢。搔之。齒。類。齒也。可謂鑿矣。韻會舉要云。或作疥。康熙字典云。類。篇。或作瘰。字彙云。癰。同疥。正字通云。瘰。癰。並俗。疥。字。今皆。勿用。正字通引鮮卑傳。其下云。韻會引入疥。註改作疥。謂。

齒。類。齒也。可謂鑿矣。韻會舉要云。或作疥。康熙字典云。類。篇。或作瘰。字彙云。癰。同疥。正字通云。瘰。癰。並俗。疥。字。今皆。勿用。正字通引鮮卑傳。其下云。韻會引入疥。註改作疥。謂。

篇。或作瘰。字彙云。癰。同疥。正字通云。瘰。癰。並俗。疥。字。今皆。勿用。正字通引鮮卑傳。其下云。韻會引入疥。註改作疥。謂。

勿用。正字通引鮮卑傳。其下云。韻會引入疥。註改作疥。謂。

行餘醫言

疥字辨

七

一本堂藏書

疥通作蚘。集韻亦作瘰。篇海別作癬。並非。以是為斷。極佳。
 癩音戈。字彙云。疽瘡。又云。禿瘡。康熙字典云。同痲。而痲下
 云。玉篇瘡也。集韻禿也。一曰創也。正字通云。癩有戈科瓜
 三音。方俗異讀。其為癩創一也。而皆未見有似疥義。此由
 字書之不詳于醫事耶。併考諸醫書。可自知也。○又按肘
 後方云。但是腰脚已下。名為癩。此言可疑也。以其與病源
 以下云。多著手足間者異也。

癬 音鮮 換典切

癬亦疥類。痒疾也。故古連稱疥癬。大槩有二種。一種瘡作
 圓文。如錢形。邊高中低。邊生細粟。瘡甚痒。搔之汁出。漸展
 連生。二、三瘡。四、五瘡。大者作斜形。扁形。大小無定。粟瘡中
 間有細蟲。多生面頰。肩項。兩手。間有生腹背。兩脚者。以其
 似錢形。故俗呼為錢瘡。此證易治。一種瘡生陰股。始如粟
 粒。甚痒。難堪。搔之汁出。或唯白屑起。漸延自陰毛中。及臍
 下。少腹。至臍上。或自會陰。左右展兩臂。上腰。下足。遍體無

所不至。皮漸頑厚。色淡黑。殆如牛領皮。有至苦痒。終夜不寐者。以其陰股特多甚痒。故俗謂之陰癬。多著男子。婦人至稀。此證極難治療。若困其痒。急用外敷速愈藥。則不徒瘡不癢。或發暴水脹。或毒氣內攻。致卒以者。比比而有。可不畏乎。此證為終身之滯患。未奈之何而已矣。但在其陰股始痒之時。就早用藥。或浴溫泉。則可以免至蔓延矣。既及數月者。決不可治也。不可不畏慎。而速施療術也。併舉濫名。開示無益。如白癩。

見神農本草。藿菌條。○又出名醫別錄。白及。吳茱萸根條。○又見病源候論云。白癬之狀。白色。皴皴。而痒。

乾癬

病源候論云。乾癬。但有匡郭。皮枯索痒。搔之。白屑出。是也。風沈入深。故無汁。為乾癬也。其中亦生蟲。○又見外臺秘要。所引崔氏方。○又稱燥癬。見外臺秘要。所引肘後方。

濕癬

同上云濕癬者亦有匡郭如蟲行浸淫赤濕痒搔之多
汁成瘡其裏亦有蟲○又見千金方及外臺祕要必引
古今錄驗

燥濕癬

出千金翼方○又見外臺祕要必引淡師方○又稱乾
濕癬見外臺祕要及必引淡師方崔氏方

風癬

病源候論云風癬抓搔頑痺不知痛痒其裏亦有蟲

圓癬

同上云圓癬之狀作圓文隱起四畔赤亦痒痛是也其
裏亦生蟲

久癬

同上云久癬是諸癬有蟲而經久不瘥者也○又出千

金翼方

細癬

見千金方又出本州綱目羊蹄條

雀眼癬

病源候論云雀眼癬其文細似雀眼故謂之雀眼癬搔之亦痒中亦生蟲

惡癬

出本州綱目葭莖條引千金翼今考千金翼無此名

頑癬

同上銅青條引筆峯雜興方○又見祕方集驗

陰癬

見丹臺玉案又出信女錄云

痴癬

出名醫別錄有名未用羊實條

花癬

出本州綱目巴豆條

梅花禿癬

同上胡麻油條引普濟方

吹花癬

行會醫書

癬

十一

一才堂藏書

證治準繩云面上風癬初起痞癩或漸成細瘡時作痛
痒發於春月名吹花癬

錢癬

出本艸綱目木槿條引王仲勉經驗方

荷錢癬瘡

同上巴豆條引邵以正經驗方

苔癬瓦癬荷葉癬

見三因方○苔癬又出壽世保元

小兒胎癬

本艸綱目桑蠶蟲糞條引聖惠方云小兒頭生瘡手爬
處即延生謂之胎癬

奶癬

外科正宗云奶癬兒在胎中母食五辛父食炙煖遺熱
與兒生後頭面遍身發為奶癬流脂成片睡卧不安搔
痒不絕○祕方集驗作乳癬

五般瘡癬

行餘醫言

癬

十二

二樓堂藏書

見肘後方附方中經驗方。○本州綱目韭條亦引經方

五癰。

醫學入門云五癰濕頑風馬牛。又云風癰即乾癰馬癰。

又曰狗癰。○又明醫指掌圖云癰亦有五風癰頑癰濕

癰馬癰牛癰

杖癰。

見先醒齋筆記

血癰。

廣癰。

出本州綱目煙膠附方引積德堂方

見證治準繩亦名千層癰

楊梅癰。

見丹臺玉案。○此二名與徽瘡混尤過泛濫勿用

蟲癰。癰蟲。

出本州綱目絲瓜條引攝生衆妙方又水銀附方癰蟲

輕粉條引陳藏器又名醫別錄有名未用馬逢條云

牛癬狗癬刀癬

病源候論云俗云以盆器盛水飲牛用其餘水洗手面即生癬名牛癬其狀皮厚抓之鞣強而痒是也其裏亦生蟲狗癬俗云狗舐之水用洗手面即生癬其狀微白點綴相連亦微痒是也其裏亦生蟲刀癬俗云以磨刀水用洗手面而生癬名為刀癬其形無匡郭縱斜無定是也中亦生蟲

牛皮癬

出本州綱目明礬條引直指方○又出魯府禁方

牛皮風癬

出本州綱目明礬條引直指方○又出魯府禁方

同上木槿條引扶壽方又黃牛肉附方引直指方

牛皮頑癬

同上雌黃條引直指方

牛皮惡癬

同上輕粉條

馬皮癬狗皮癬

行餘醫言

癬

外科正宗云馬皮癬微痒白點相連狗皮癬白斑相簇
松皮頑癬類是也

赤水玄珠云風癩松皮頑癬久不瘥

古連稱疥癬或謂疥與癬或混稱不分

千金方千金翼方及外臺秘要所引廣濟方近効方劉

涓子方等以下皆同○本出名醫別錄斑猫條

或云疵疥或云疵癬互稱無別

疵疥出千金方疵癬出千金翼方

雖其同痒疾至相近似故連混無所別而其辨則如前所
舉而不可亂也故重論及焉

錄補鷓鴣掌瘡

多著手掌足底輕者掌中見小白星微痒用爪搔破去之
則皮也以似蟲蝕津所為故俗稱裏蟲重者多生小瘡甚
痒搔破流膿水皮拆裂太似鷓鴣掌故稱鷓鴣掌瘡或致久不
愈足痛膿潰不可步履如陳實功所謂是也

外科正宗云鷓鴣掌風火熱血燥外受寒涼所凝致皮枯

槁。又或時瘡餘毒未盡，亦能致此。初起紫斑，白點，久則皮膚枯厚，破裂不已。

但風字大不當，故今用瘡字。又如龔信云：鵝掌癬，頗佳。優於風字，大遠矣。

古今醫鑑云：楊梅瘡已服輕粉，愈後手癬或手掌上皮退一層，又退一層，生生不絕者，名曰鵝掌癬，又萬病回春云：鵝掌風癬。

又如王肯堂云：千層癬，手心毒者，亦此類也。

證治準繩云：輕則發廣癬，亦名千層癬，多生手心足底，重疊不已。

又云：病穿掌，負子孟穿窠，天蛇亦皆俗名。愈出愈鄙，陋竟。是杜撰之濫名也。

坐板瘡

本艸綱目：胡麻條引筆峯雜興方云：坐板瘡，疥又秘方集驗云：腎腸風坐板瘡，八角刺瘡。

眉癬 煉癬

本艸綱目旋覆花條引總微論云小兒眉毛眼睫因癬退
 入主○又厄子條引保幼大全云眉中煉癬○又云眉煉
 儒門事親云夫小兒在面曰眉煉又云夫小兒甜瘡又不
 瘡者俗呼曰香瘡是也多於面部兩耳前○又云煉眉本
 艸類纂必讀云煉眉即鍊銀瘡○又云煉眉瘡癬本艸綱
 目百藥煎附方引外科精義云小兒面溇瘡又名鍊銀瘡
 乃母受胎時食酸辣邪物所致○又云蕪窩瘡本艸綱目
 肥皂英附方引摺玄方云頭耳諸瘡眉癬蕪窩瘡又牡鼠糞附方

云小兒癩窩生瘡○又云月食瘡見病源候論本艸綱目食作割○又云
 甌哇瘡千金方云凡炊湯經宿用洗體成癬洗面無光洗
 脚即疼痛以上諸瘡皆是疥癬類也故併錄焉

附字辨

癰或作癰音同癰劉熙釋名云癰徙也浸淫移徙處日廣也故青徐謂癰為徙也此說亦幾于鑿乎以徙則可言以鮮則不可言史記越世家云吳王伐齊子胥諫曰吳有越腹心之疾齊與吳疥癩也又俗省作癩正字通云俗作癩者恐非也玉篇云癩蟲名由音同為此說耳決不可用也又康熙字典云癩得案切音旦癩病此亦不可取也

臙瘡 離鹽切 音廉

臙瘡者謂脚脛生瘡多痒少痛搔破出血汁膿水淋漓經年不愈偶愈復發不可根治也或有乾燥皮厚皮肉紫黑者此證頑固數年不瘥陷成結毒者間有之若用外敷藥速愈方或浴冷泉如攝州多田冷泉是也求速効則陷成暴水脹而死若不急死滯成結毒與徽瘡結毒不異又俗用故油紙或故敗傘紙圍裹脛外此雖與敷輕粉藥大惡法異而亦不得不惡唯非在其始萌之時施法則不可治也已成頑

瘡者常食發物魚鳥辣茹類以排毒驅瘀活致新血擯出
 陳膿候勢差減而後浴發瘡溫泉如但州城崎溫泉多日
 號新湯者是也
 長洗及四五回則自然可得瘡去毒拔終致全愈慎勿性
 急謂不能治而迷甘言貪速效以招大害也間有上及膝
 上內外腿者甚者下足趺至穢爛若夫肘瘡

千金方云有久癰餘瘡敗為淡疽者在臑脰間喜生瘡
 中水惡露寒凍不瘥經年成骨疽亦名肘瘡淡爛青黑
 四邊堅彊中央膿血汁出百藥不瘥汁潰好肉處皆虛

腫○按古無膿瘡名此條雖有少異稱肘瘡者始于此
 也故舉載焉○又見何填本艸類纂必讀

肝瘍

詩經巧言篇既微且尪朱傳肝瘍為微孔氏曰郭璞云
 肝脚脛也瘍瘡也膝脛之下有瘡腫是涉水所為

腰瘡

宋莊綽雞肋編云瘡發于足脛骨傍肉多難合北人謂
 之腰瘡南人呼為肝瘡其實一也

臙瘡

見儒門事親

禪口風

見魯府禁方

裙邊瘡

見壽世保元又出祕方集驗

裙風禪口瘡

見證治準繩云婦人名裙風禪口瘡

袴口瘡

出醫學入門

蛀脚臙瘡

見本草綱目馬齒莧條引海上方

血注脚瘡

同上木耳條引奇効良方

脚肚瘡

見醫學入門

脛瘡

血風瘡

同上馬齒莧發明又楓香脂條引神珍方云久造脛瘡
 外科正宗云血風瘡發則搔痒無度破流脂水日漸沾
 開羊艾紫黑堅硬又云風濕流注腿脚致生血風頑瘡
 紫黑癢痒○又本州綱目銀朱條引簡便方云血風
 曠瘡又萬方回春云血風瘡癩瘡蟲瘡及坐板瘡疥癩
 等瘡

腎臟風

證治要訣云癩風因精未調外為風濕內襲從陰囊濕
 汗作痒起流注四肢手又白色悉生瘡瘍俗謂之腎臟
 風按仁齋直指腎臟風癢條云囊間濕痒謂之腎臟風
 世所共知也祕方集驗囊癢下云腎腸風癢痛景岳全
 書云凡腎囊濕痒抓破成瘡俗名腎上風也醫學入門
 云腎臟風瘡此非曠瘡亦非外腎風瘡乃腎虛有火血
 燥或忠色精不出而內敗初起兩足時熱脚跟作痛多

下餘醫言

曠瘡

二十一

一

於內脛或臙上痒極抓破成瘡久則能漸延開失治延及腿股遍身者有之觀以上所說則似非臙瘡而證治準繩云兩臙如癬搔痒久則膿水淋漓或搔起白皮者名腎臟風古今醫統云臙腿生瘡經久不愈類風癬名腎臟風瘡名醫類案腎臟風瘡條云按腎風屬腎虛風邪乘於臙脛以致皮肌如癬或漸延上腿久則延及遍身外證則搔痒成瘡膿水淋漓眼目昏花內證則口燥舌乾腰脚倦怠吐痰發熱盜汗肌瘦今審此元俗稱且

濫名雖致聒辨竟是臙脛之瘡而非他何得非臙瘡乎三因方舉癩風條云男子精血不調外為風冷必襲致陰下濕痒搔之不已流注于脚悉生瘡瘍名曰癩風世謂腎臟風者乃認癩為腎也癩屬宗筋系於肝胃陽明養之陽明主肌肉循經流入四肢故使四肢生瘡正謂之癩風非腎臟風也此元囊瘡故謂癩風雖使元是囊瘡苟已流在脚脛如尋常必有臙瘡則此亦謂臙瘡不為不可也且指陰囊濕痒謂腎臟風固大非也又指足

脛瘡為腎臟風亦益謬矣。要之濫名之所致誤之又誤。有不須言者。讀者宜損此等之杜撰而可也。

裙風瘡

本艸綱目頭垢條引簡便方云。婦人足瘡經年不愈。名

裙風瘡。

驢眼瘡

秘方集驗云。驢眼瘡生脚脛骨週圍如臙瘡樣。

過光瘡

見醫林集要

爛腿瘡類

見景岳全書

鴈瘡。以鴈來時則發。鴈去時便瘡。故稱鴈瘡。究竟臙瘡之有發止者。雖瘡時亦自止耳。其實非長愈也。發時其痒搔之。延及腿脛。或膿或乾。皮厚作白。全與臙瘡一樣。但以其有發止。姑異名耳。後有終年發不止者。乃即臙瘡也。巢元方始言之。

病源候論云。鴈瘡者。其狀生於體上。如濕癬癰瘍。多著四支。乃遍身。其瘡大而熱。疼痛得此瘡者。常在春秋二月八月。鴈來時。則發。鴈去時。便瘥。故以為名。亦鴈過荆漢之域。多有此病。

後世又稱鴈疔。又謂春生者。稱燕疔。

正字通引類篇云。

漫喜多名。華人之習弊。故作種種浮華之稱。却致拘名迷實之害。林泉堂

附字辨

臙字彙云。脛臙。康熙字典引集韻。脛臙也。蓋以脛似物莖之義。脛可以行之義。臙有廉稜之義。自可解釋。而無所不通。而正字通云。臙俗字。舊註音廉。脛臙泥。此說似亦已甚矣。當從字彙字典為脛義可也。先醒齋筆記等作癩。非也。康熙字典云。音繇。廣韻。癩癩。病也。集韻。喉病也。又音廉。臙疾。俱與臙不相干涉。其誤可見也。

瘰癧。瘰癧者。瘰癧也。古者云瘰。又稱瘰癧。後世多不言瘰。唯稱瘰。瘰。但瘰者。已潰之名。而瘰癧者。未潰之稱。又呼其始小者。為結核。雖同一疾。所見異狀。故稱謂隨別。而究之。其實則一也。只有久近大小。潰不潰之異耳。夫瘰之為病也。頸邊始結核。或左或右。或左右俱生。上及耳後。下延缺盆。前至頤後。亘項。按之粒粒可知。其小者如大豆。如銀杏。大者如桃栗。大小圓扁。縱橫不齊。或二三。或五六。或十餘顆累累。

瘰即豆切音漏

瘰。即瘰癧也。古者云瘰。又稱瘰癧。後世多不言瘰。唯稱瘰。瘰。但瘰者。已潰之名。而瘰癧者。未潰之稱。又呼其始小者。為結核。雖同一疾。所見異狀。故稱謂隨別。而究之。其實則一也。只有久近大小。潰不潰之異耳。夫瘰之為病也。頸邊始結核。或左或右。或左右俱生。上及耳後。下延缺盆。前至頤後。亘項。按之粒粒可知。其小者如大豆。如銀杏。大者如桃栗。大小圓扁。縱橫不齊。或二三。或五六。或十餘顆累累。

外科醫言

瘰

二十五

外科醫言

相連疊歷歷可存數小時不腫大則必腫初無痛痒間有痛者又有久不起發經年無何異者及已腫大色紅赤又或痛或不痛已潰出稠膿或出黃汁淋漓多年久難收口或惡寒發熱或上下前後牽引拘急甚者上頰車耳前旁及腋下若出稠膿者可治唯出黃汁者極難治若膿汁多年出不休者後成勞瘵而歿又有小兒十一二之時頸邊生一二小結核者後多成勞瘵已試十數人皆然可畏之甚也又有頰車耳前左右生硬腫經年月潰開細孔黃水

出不休者俗呼為氣腫數年不愈後必至歿元是瘰中之證必以不治之疾也間有開三四孔者即蟻瘻也又觀近時世人所患之瘰多是徽瘡結毒之所發漏也雖膿汁多漏不歿故調治中竅能得全愈予常言今人之瘰全是徽毒之發漏太類便毒故可謂頸便毒者非戲言也蓋頸之為體猶兩山之間溪澗挾處亦與腹腿合縫之處彷彿近似又其所患自結核至發漏亦同所以謂彷彿便毒者不亦宜乎此吾門之所發明而世之所不知也故古之瘰

多矣。而令之瘰，不以其徵毒發漏，雖久出膿，不至死。足以徵知也。靈樞說鼠瘻瘰癧，似未的切。

寒熱篇云：寒熱瘰癧在於頸腋者，皆何氣使生？曰：此皆鼠瘻。寒熱之毒氣也，留於脈而不去者也。曰：去之奈何？曰：鼠瘻之本皆在於藏，其末上出於頸腋之間，其浮於脈中而未內著於肌肉，而外為膿血者，易去也。曰：去之奈何？曰：請從其本，引其末，可使衰去而絕其寒熱。審按其道，以予之，徐往徐來，以去之。其小如麥者，一刺，知三

刺而已。曰：決其生，死奈何？曰：反其目視之，其中有赤脈，上下貫童子，見一脈，一歲死；見二脈，半一歲死；見三脈，二歲死；見四脈，半二歲死；見五脈，三歲死；見六脈，三歲而死。見赤脈不下，貫瞳子，可治也。目中赤脈之說，大可怪也。今試看之，未嘗有之，所以為不的切也。而其為瘰者，此疾之本名，取瘡已潰漏，形如鼠穴，塞一復穿一之義，而瘰癧者，狀腫核未潰，累累相連，歷歷可見之貌，則明白無所惑也。又邪氣藏府病形篇云：肺脈微瀼，為鼠瘻，在頸支

腋之間下不勝其上其應善瘦矣

素問曰鼠瘦寒熱還刺寒府寒府在附膝外解營骨空論

鼠瘦又出神農本草黃耆薇銜假蘇蛇含連翹夏枯草狼毒雄黃礬石殷孽牡蠣斑蝥地

膽等名醫別錄磁石條云鼠瘦頸核又石膽特生礬石通草王瓜常山側子鼠尾草虎骨等

病源候論千金方千金翼方外臺祕要及所引范注方

溪師方救急方集驗方劉涓子方張子仁方備急方古

今錄驗張文仲方以下皆同○千金方千金翼方並作

鼠漏

瘰癧又出神農本草中鹿藿條又連翹假蘇兩條云鼠瘰

李條云瘰癧瘡名醫別錄淫羊藿條病源候論千金方千金翼方外

臺祕要及所引甲乙鍼經廣濟方肘後方范注方文仲

方集驗方劉涓子方救急方延年方經效方經心錄崔

氏方以下皆同

又云馬刀俠癭

經脈篇云腋下腫馬刀俠癭汗出振寒○甲乙經千金

方並稱馬刀瘡○按壽世保元云形長如蛤者為馬刀

又醫燈續焰云馬刀蛤蠟之屬癰形似之挾癭者發于
 結縷之處大迎之下頸側也二癰一在腋一在脛常相
 連絡故俗名歷串又張介賓曰馬刀癰癰也挾癭挾頸
 之癰屬也一曰結核連續者為癩癰形長如蜺蛤者為
 馬刀又曰脇肋下者為馬刀俱出類經注○辨曰馬刀蚌屬
 此貝較長似馬之刀故命名也今癩癰形長似之故亦
 以馬刀呼之耳蓋蛤雖總稱而分之則有別凡長者曰
 蚌圓者曰蛤雖蚌蛤連稱此乃其辨也龔潘張三氏似

未的知馬刀故致其解不明又挾癭亦癩癰之別名而
 非贅癰按字彙正字通康熙字典俱云挾傍也竝也韻
 會舉要云集韻或省作夾書懷為夾註也韻會小補
 亦同或胡頰切音協或古洽切音甲言癩癰形如馬刀
 竝傍也癭故連稱馬刀挾癭也

筋癭脛腫

經筋篇云頸筋急則為筋癭脛腫

神農本草以下其名尤煩如頸下核

出海藻條又名醫別錄玄參條云散頸下核又磁石條云鼠瘦頸核

五漏

同上見地榆條○又有疽瘰疔孔公疥瘰癧瘰條銀等名俱不分明故不舉

蟻瘰

見名醫別錄雉肉鮫鯉甲條○千金翼方作蟻漏

馬刀爛瘡

同上藜蘆條

瘦乳

同上王不留行條

馬刀瘦頸癰達

並出甲乙經○千金方云寒熱酸痛四肢不舉腋下腫馬刀瘦又云胷中滿腋下腫馬刀瘦又云腋下腫馬刀肩腫吻傷此專言腋下核腫為馬刀

九瘰

病源候論云諸瘰者謂瘰病初發之由不同至於瘰成
 形狀亦異有以一方而治之者故名諸瘰而方說九瘰
 者是狼瘰鼠瘰蠅蝻瘰蜂瘰蚘瘰蟻瘰蠹瘰浮疽瘰瘰
 瘰瘰轉脉瘰此頸之九瘰也狼瘰者年少之時不自謹
 慎或大怒氣上不下之所
 生也始發之時在於頸項有根出缺盆上轉連耳本鼠
 瘰者飲食之時不擇蟲蛆變化所生也使人寒熱蠅蝻
 瘰者食果蠆子不避有蟲即使噉之外絕於網內絕於
 腸有毒不去變化所生也始發之時在於頸上狀如蝸
 形癭胗而出也蜂瘰者食飲勞倦渴之多飲流水即得
 蜂毒不去變化所生也始發之時其根在頸歷歷三四
 處俱腫以潰生瘡狀如癰形瘰而復移蚘瘰者因寒
 腹中臙脹所得寒毒不去變化所生也始發之時在其

頸項使人壯熱若傷寒有似疥癬毒蟲孔出蟻蝻瘰者
 恐懼愁憂思慮哭泣不止餘毒變化所生也始發之時
 在其頸項無頭尾如棗核或移動皮中使人寒熱心滿
 浮疽瘰者因志結馳患往反變化所生也始發之時在
 於頸亦在掖下如兩指無頭尾使人寒熱欲嘔吐瘰瘰
 瘰者因強力入水坐濕地或新沐浴汗入頭中流在頸
 上之所生也始發之時在其頸項恒有膿使人寒熱轉
 脉瘰者因飲酒大醉夜卧不安驚欲嘔轉側失枕之所
 生也始發之時在其頸項灌脉轉身如振使人寒熱復
 有三十六種瘰方不可次第顯其名而有蜚蝗蝻等
 諸瘰非九瘰之名此即應是三十六種瘰之數也但瘰
 病之生或因寒暑不調故血氣壅結所作或由飲食毒
 節狼鼠之精入於府藏毒流經脉變化而生皆能使血
 脉結聚寒熱相交久則成膿而潰漏也其生身體皮肉
 者亦有始結腫與石癰相似亦可異者其腫之中按之
 累累有數脉喜發於頸邊或兩邊俱起便是瘰證也亦

發兩腋下及兩顛顛間初作喜不又有蟻瘰蠅瘰鵝鳥痛不熱若失時治即生寒熱也

鶴瘰尸瘰風瘰鞠瘰蜚瘰骨疽瘰蚯蚘瘰花瘰蠍瘰

耗瘰腦瘰癰瘰極瘰蟲瘰石瘰蛙瘰蝦蟆瘰蛇瘰蠶瘰

瘰赤白瘰內瘰雀瘰膿瘰冷瘰久瘰已上二十七名合前九瘰為三十六

即三十六種瘰數也鞠瘰又曰石鞠瘰○諸瘰病狀詳見本書文

多故不盡載○千金方云論曰夫九漏之為病者寒熱

瘰癧在於頸腋者何氣使生此皆鼠瘰寒熱之毒氣也

堤留於脉而不去者也何謂九漏一曰狼漏二曰鼠漏

三曰蠘蛄漏四曰蜂漏五曰虵蟄漏六曰蟻螞漏七曰

浮沮漏八曰瘰癧漏九曰轉脉漏又有漏冷瘰風漏蟻

漏蜚娘瘰蚯蚘瘰蠍瘰蝦蟆瘰蛇瘰蛙瘰馬刀瘰頭當

瘰雀瘰膿瘰石瘰○外臺秘要引集驗方有九種瘰

目同病源候論又廣濟方崔氏方並云瘰有九種又引

千金方皆作瘰○醫學入門云九漏肝主狼漏胃主鼠

浮漏心主蟻螞漏膽主浮蛆漏腎主瘰癧漏小腸主轉

筋漏萬病回春等皆同如是則五藏四府有漏而膀胱

何因不主漏乎三焦何因不主漏乎此皆由強事配當

而然其可笑可斥無復過之者又明醫指掌圖云夫瘰

癰之病者，即古所謂九漏也。形狀不一，生頸項者曰瘰癧，生乳枝者曰馬刀，而亦作蠅蠃漏。又作浮蛆漏，文字異同或當。○名醫別錄地榆蝮蛇肉等條云：諸瘰癧又巽有一誤。鼠條云：諸瘰癧惡瘡消石條云：瘰癧蝕瘡。

瘰。見靈樞。邪氣藏府病形篇。千金方。千金翼方。外臺祕要。

及所引肘後方。廣濟方。集驗方。必効方。備急方。劉涓子。

方。崔氏方等同。千金方。千金翼方。俱或作漏。○按名醫

布條云：瘰癧瘡。鯉魚條云：瘡瘰。

漏九漏。

並見上。

結核。

見千金方。及外臺祕要。所引廣濟方。

頸漏。

見千金翼方。

鼠瘻漏瘻。

並見本事方續集。

陰瘻。

本州綱目牡狗陰莖條引日華子

五癩

同上鴛鴦條引食醫心鏡又芥子條引廣濟方云五種癩疾

三十六種癩

見上又本州綱目馬齒莧條引食療云三十六風結瘡土蜂癩

同上烏鴉頭主治引聖惠方

野雞癩瘡

同上土撥鼠肉主治引陳藏器

蛇盤癩癧

同上海藻條引危氏得效方云蛇盤癩癧頭項交接者

又蕎麥條引阮氏方赤水玄珠云癩癧生於頭項上交故名蛇盤癧

蟠蛇癧

醫學綱目云癩癧多生肩項或赤或白或沈或浮初生如荳久似核年月浸久其大如梅或如雞卵排行為列

行餘醫言

癩

三十四

一本堂藏書

或生二三或生六七俗云蟠蛇癰是也又見壽世保元

流注癰

又云流注癰婦人多有之其性急躁其氣怫鬱其心執着初生在項破後膿注四肢遍體結毒如梅李狀不療自破孔竅相穿寒熱疼痛或流膿汁是名流注癰也又名千歲瘡

癰子瘡

見丹溪心法附餘

單窠癰蓮子癰重臺癰燕窠癰

醫學綱目云單窠癰者生一箇也發於頸項最難治蓮子癰一胞裏十數枚生於項之左右重臺癰生於項頸或左或右初則單窠結在上或在下重疊見之是名重臺癰燕窠癰形似燕窠不可治

瓜藤癰惠袋癰蜂窠癰

壽世保元云延及脅前連腋下者名曰瓜藤癰左耳根腫核者名曰惠袋癰右耳根腫核者名曰蜂窠癰○此

就左右改名者尤杜撰之甚也

風癰。熱癰。血癰。痰癰。氣癰。鼠殘癰。

醫學入門云風癰尖而小熱癰焮腫赤色又名血癰痰癰推動滑軟氣癰圓而動又有鼠殘癰大小不一

錐銳癰

類經圖翼云錐銳癰右邊生起

鯨漏

醫說云有人脚肚上生一瘡久遂成漏凡經二年百藥

不効自度必死一村人見之云此鯨漏耳以石灰二三

升百沸湯泡薰洗如覺瘡痒即是也病者如其言用灰

湯淋洗果痒竟用此洗不三兩次遂乾

馬老鼠瘡

外科精義云療癰馬老鼠瘡

疽癰

千金方云小兒疽癰○此元出神農本草孔公孽條云

疽癰痔已見上

鼠漏。蟻漏。螻蛄瘻。蜂瘻。虬瘻。疥瘻。浮疽瘻。癩瘻。瘰癧瘻。轉
 脉瘻。狼瘻。蝮瘻。鷓鴣瘻。尸瘻。風瘻。鞠瘻。蜚蠊瘻。骨疽瘻。
 蚯蚓瘻。花瘻。蠹瘻。虵瘻。腦瘻。癰瘻。癩瘻。蟲瘻。石瘻。蛙瘻。蝦
 蟆瘻。蛇瘻。螳螂瘻。赤白瘻。內瘻。雀瘻。膿瘻。冷瘻。久瘻。石鞠
 瘻。狼漏。螻蛄漏。蜂漏。虬漏。疥漏。浮疽漏。癩漏。瘰癧漏。轉脉
 漏。風漏。顛當漏。螻蛄漏。浮蛆漏。轉筋漏。蜂蛆漏。歷串。

以上皆見上。○風漏。蟻漏。又見千金翼方。蠹瘻。又見本
 艸綱目。半夏條。引聖惠方云。蠹瘻五孔相通者。蜂漏。又

同上。蠅。娘。條。引陳藏器。

結風氣腫。

千金方云。小兒無故寒熱。強健如故。而身體頸項結核。
 癩瘻。及心腹胷背。裏有堅核。不痛。名為結風氣腫。又外
 臺祕要。所引文仲方云。惡肉。惡核。惡脉。癩瘻。風結腫氣。
 金顛瘡。蝕。究竟此亦瘻耳。

本艸綱目。雞腕胫裏黃皮條。引聖濟總錄云。金顛瘡蝕。
 初生如米。至久則穿蝕。顛音腮。

臂、螻內則作扁。乃扁疾。此雖瘰與扁通。同漏疾。而於頸腫則不可通。故不可用也。瘰癧。瘰之未潰之時。結核兩三。或五六累累相連。重歷歷。可作數。故由其形狀。謂之瘰癧。向所謂瘰癧。未潰之稱者。可以見也。瘰。魯水切。音壘。瘰。即狄切。音曆。正字通云。本作瘰。俗省作瘰。又作瘰。字彙。正字通俱云。俗瘰字。康熙字典云。集韻。瘰病。或作瘰。又作瘰。字彙云。同瘰。康熙字典云。廣韻。同瘰。正字通云。瘰。本字。通作瘰。瘰。瘰。瘰。三字俱僻。難不易通。不可用也。

痔

痔之為疾也。其證多端。或有肛門痛。而瀉下血者。或有止肛門痛者。或有由大便秘結。堅大燥屎。出肛門。破痛血出者。或有止肛門腫痛者。或有肛邊左右前後生鼠乳痛者。或有肛邊腫核疼痛者。或有肛邊乳腫。如指頭。大痛難忍。後破出膿血者。或有頻痒難堪者。或有肛口痒。而復痛者。或有外面無何異。肛內痛。覺似腫。雖裏急。而大便不通。苦痛發熱。欲死者。俗謂之內痔。或有無痛下血數升者。或有

乳腫破出膿水。膿少黃汁多。晝夜不止者。或有肛之左右前後開穴。黃汁常出不止者。或有瘡孔至四五穴者。此即痔漏也。凡痔久不愈者。皆成漏。又有肛門出而不入者。謂之脫肛。脫肛即是痔中之一證。而非別疾。多由堅大燥屎難出。強自努責。而肛門遂脫出耳。故小兒痢疾。多致脫肛。以其皮腸未固。柔軟易脫也。凡一脫肛者。遂成難路。每大便必出。輕者推入之則收。中者不得輒入。百方纔得復本。甚者脫肛腫大。痛不得入。不能坐。唯側卧待愈。用藥如治

而後得水出。腫消。纔納原穴。至重者。脫肛腫大。終不復納。坐立俱不能。只側卧。以俟腫消而已。腫消而後強推入。纔可以納。腸中形狀萬變。不可縷舉。究其所因。皆是由飽食過飲之所為耳。或饕餮厚味。多啖糖果。或沈酒醇酎。常帶酒氣。或好喫炙烤焦香之物。其食飲真秀精純之氣。潤養周身之外。大過有餘。直下腸中。其勢壯強。席卷長驅。衝突肛門。外出成痔。腫痛瀉血也。故痔元盛候。有餘之氣自內推出。而然也。猶食飲有餘之氣上逆。成喘哮也。故痔與哮。

俱是穀氣有餘之疾。但有上逆下衝之異耳。由其且痛苦且瀉血為虛不足者。固多有之。雖然以其有餘之疾。故雖疾甚而不死者多。又有虛弱之人。患此疾者。此亦同因。蓋以虛弱之人。常食當減少。以為違。而常食與平人之食同。則在常人則非過。而在虛弱之人。則既已過矣。且其所減以為違者。亦謂已過矣。况與常人之食。齊乎。所以有有餘之氣下墜成痔也。後世觀由其瀉血膿水致虛不足。乃謂此疾屬虛。如薛已以下皆由不知本因也。又由努責脫出。明醫皆然。

肛門即是自內推出之勢強。可以見也。如小兒痢疾。婦人產後與痢疾裏急是也。若飽暖小兒。雖非痢疾。亦脫肛。此由過愛多食也。又非痢疾裏急。與婦人產後而脫肛者。此非努責而然。即是向所謂有餘之穀氣。且夕下衝。自內推出。而然。亦可以見也。素問已論。因飽食。可據取也。但其說不十分明切耳。其他靈素。唯稱痔者。不過四五條。素問云。因而飽食。筋脈橫解。腸澀為痔。生氣通天論。又云。其女子不孕。癥痔遺溺。嗑乾骨空論。

又云、癩疹瘡瘍癰疽瘰癧、又云、痔、瘡、發、至、真、要、大、論、靈樞云、腎脉微瀦為不月沈痔、邪氣藏府病形篇、

又云、膀胱是主筋、凡生病者痔、瘡、狂、癲、疾、經脉篇、

又云、寒熱痔、熱病體重、腸中熱、熱病篇、

五痔之名始出神農本草、猶未列其目、

見神農本草、黃耆、槐實、桐皮、龜甲、蝟皮、○又見名醫別錄、榘實、鰻鱧魚、

蜜陀僧等條、

或云、疽痔、

同上、五色石脂、雄黃、石硫黃、扁○又見名醫別錄、羊蹄、

疽瘰癧、

同上、孔公、

瘡痔、

同上、牙子、

腸痔、

同上、藥木、露蜂房、

痔核、

行餘醫言

痔

四十二

一

同上鼈甲

痔蟲

同上石灰條云又見名醫別錄燕肉

痔蝕

見名醫別錄青柏

脫肛其名漸多

見神農本草蛞蝓○又見名醫別錄卷柏蝸牛

及巢元方雖備五品以諸痔稱之至孫思邈全從巢氏曰

稱五痔舉之後世多祖據焉王燾又引淡師集驗崔氏等

五痔泛濫之弊之所來不獨後世為然也

病源候論云諸痔者謂牡痔牝痔脉痔腸痔血痔也牡

痔肛邊生鼠乳出在外者時時出膿血者是也牝痔肛

邊腫生瘡而出血者牝痔也脉痔肛邊生瘡痒而復痛

出血者脉痔也腸痔肛邊腫核痛發寒熱而血出者腸

痔也血痔因便而清血隨出者血痔也又有酒痔肛邊

生瘡亦有血出又有氣痔大便難而血出肛亦出外良

久不冝入諸痔皆由傷風房室不慎醉飽合陰陽致勞
 擾血氣而經脉流溢滲漏腸間衝發下部有一方而治
 之者名為諸痔非為諸病共成一痔痔久不瘥變為瘻
 也

千金方云論曰夫五痔者一曰牡痔二曰牝痔三曰脉
 痔四曰腸痔五曰血痔牡痔者肛邊如鼠乳時時潰膿
 血出牝痔者肛腫痛生瘡脉痔者肛邊有瘡癢痛腸痔
 者肛邊核痛發寒熱血痔者大便清血隨大便汚衣又

五痔有氣痔寒溫勞濕即發牡痔生肉如鼠乳在孔中

頗出見外妨於更衣牝痔集驗作酒痔從孔中起外腫五六

日自潰出膿血腸痔更衣挺出久乃縮脉痔更衣出清

血又云槐子圓治燥濕痔痔有雌雄皆主之○千金翼

方立腸痔門載五痔下血等又論曰凡人大便有血即

是痔病勿得慢之慎乾棗油膩豬魚夫患痔在身所服

名藥皆不得力徒棄功夫一無所益欲服餌者當斷之

乃可服也

外臺祕要所引淡師療五痔數年不差槐子丸主燥濕
 痔痔有雌雄為病苦暴有乾燥腫痛者有崩血無數者
 有鼠乳附核者有腸中煩痒者三五年皆殺人忌飲酒
 及作勞色犯之即發千金翼同又集驗療五痔有氣痔溫寒
 濕勞即發牡痔生肉如鼠乳在孔中頗見外妨於更衣
 牝痔從孔中起外腫五六日自潰出膿血腸痔更衣挺
 出久乃縮脉痔更衣出清血千金刪繁文仲同又崔氏論曰凡
 痔病有五若肛邊生肉如鼠乳出孔外時時膿血出者

名牡痔也若肛邊腫痛生瘡者名酒痔也若肛邊有核
 痛及寒熱者名腸痔也若大便輒清血出者名血痔也
 若大便難肛良久不入者名氣痔也此皆坐中寒濕或
 房室失節或醉飽過度必得當時不為患久久不差終
 能困人肘後集同其他廣濟方小品方刪繁方必效方等
 同稱五痔

惠民局和劑方云五腫腸風瀉血糞前有血名外痔糞
 後有血名內痔大腸不收名脫肛穀道四面努肉如脰

名舉痔頭上有孔名瘻一本瘻下有瘡內有蟲名蟲痔七字○王璆百一

選方亦同但云穀道四邊有努肉如乳頭名鼠姦痔有

穴腸出血名漏

本事方續集云大凡五痔皆因虛憊恣食五辛五味雞

魚而成熱毒墜入大腸津液不通氣血凝滯久坐久忍

不糞水冷入河水洗酒後行房及暑月行路坐諸熱地

又移坐冷種種能成斯病一者肛腸生肉腎痔鼠姦或

似櫻桃或大豆時時出血又如出膿名曰鼠姦痔二者

肛邊大乳痛腫無膿血名酒痔飲酒便發三者肛邊努

核疼痛難忍糞則有血或因憂愁患慮冷熱不調無時

而發名曰氣痔或大便澁難氣結不通下血面黃食少

無味名曰口痔四者大便後下諸膿血更加痛澁肛腸

努出名曰脫肛痔五者氣攻兩腎脬大便不通糞血色

下赤黑毒熱不消肛門濕痒一似蟲行名曰風熱內痔

陳言三因方云經云腸澼為痔如大澤中有小山突出

為峙人於九竅中凡有小肉突出者皆曰痔不特於肛

門邊生亦有鼻痔眼痔牙痔等肛門中證狀不一方書
 分出五種曰牡曰牝曰脉曰腸曰氣牡痔者肛邊腫痛
 突出一枚五六日後潰出膿血自愈牝痔者肛邊發癰
 數箇如鼠乳狀脉痔者无頭脉中送小竅注下清血腸
 痔者生在腸內更衣時非按搦不入氣痔者遇憂怒則
 發肛門腫疼氣散則愈治之之法切勿用生砒毒氣入
 腹反至奄忽近見貴人遭此痛不忍言因書以戒後學
 ○後世稱五痔者或以牡牝脉腸氣萬病回春或以牡酒腸

血氣

韓保昇云

舉皆就病源千金及局方本事中牡牝脉腸

血氣酒乳之目易一二來充其數耳不足論也

凡如牡痔牝痔脉痔氣痔血痔酒痔燥濕痔舉痔鼠姦痔
 瘻漏口痔脫肛痔風熱內痔

已見上

及外痔內痔

外臺祕要云許仁則曰此病有內痔有外痔內但便即
 有血外有異外痔下部有孔每出血從孔中出內痔每

便即有血下血甚者下血擊地成孔出血過多身體無

復血色有痛者有不痛者內痔外痔○千金方亦有外痔

腸痔已見上又見外臺秘要引肘後方刪繁方備急方張文仲方崔氏方古今錄驗云肛出下血如雞

肝此已見上又見病源候論千金方千金翼方外腸痔脫肛臺秘要及引肘後方范注方刪繁方集驗

方小品方備急方等

蟲痔

仁齋直指云臟腑本虛外傷風濕內蘊熱毒醉飽交接多慾自戕以故氣血下墜結聚肛門宿滯不散而衝突

為痔也諸痔出血肛門間別有小竅下如血線不與便物共道痔久不愈必至穿穴瘡口不合漏無已時此則變而為瘻矣前乎治法之外抑猶有說焉腸風臟毒之與痔瘻同出而異名也歲積月累淫蝕腸頭濕爛可畏此果何物致然哉虫是也其間執刺又當為之化虫不然古書何以謂之蟲痔○按本州綱目雞肉條引陶弘景曰同生葱食成蟲痔未見本書不知然否而據神農本草名醫別錄俱有痔蟲字則知蟲痔之稱亦當古矣

故併記以備考。○又見本事方。又見本州綱目。擯搗條。熱痔。

同上。

肉痔。

見本事方續集。又見本州綱目。鱗。便。食療。

糞花漏。合官漏。澹珠漏。榮漏。腸風。

同上。

食痔。羊姤痔。

出醫壘元戎

腸風痔。雌雄痔。

見外科精義。又見錦囊秘錄。

濺血痔。

見奚囊便方。

單漏。

熊宗立醫書大全云。又有無痔者。肛門左右。別有一竅。流出膿血。名為單漏。

反花痔。

見病機沙篆，又作翻花。明醫指掌圖醫學正傳古今醫鑑等皆同。

風痔。

見本艸綱目。白僵蠶條引勝金方云，腫痛發歇不定者是也。

鼠痔。

同上。穿山甲條引直指方，又見蜘蛛絲條。

野雞痔。

醫學綱目云野雞痔下血腸風。

外野雞痔。野雞內痔。五野雞病。

本艸綱目烏爛死蠶條引陳藏器云外野雞痔又獼猴

桃實條引陳藏器云野雞內痔病又鰕條引孟詵云五

野雞病又綿條同。按仁齋直指腸風門云大人小兒

大便下血日久多食易飢腹不痛裏不急名曰野雞

雞冠痔。

同上。黃連條引斗門方又見醫學正傳古今醫鑑等。

久痔。

見證治準繩

蟻蝟痔

見古今醫鑑

牛奶痔

出祕方集驗

七痔

明醫指掌圖云古人有七痔之目牡痔者發露肉珠狀如鼠乳時時澀潰膿血牝痔者肛邊生瘡腫痛出血其

頭反陷入脉痔者腸口頻頻發癰且疼且痒出血淋漓腸痔者腸內結核有血寒熱往來登圜脫肛血痔者每遇大使清血隨下不止蟲痔者肛門浸淫濕爛內有蟻蟲蝕其腸為瘡氣痔者大便難強力努之則肛出不收○按古人未有七痔之目雖巢氏於五痔之外舉氣痔酒痔而未嘗稱七痔孫氏以下亦然此以蟲易酒亦好出新奇誇多名之所為耳未又以瘰癧瘻與痔瘻混訛謬莫甚焉

二十四種痔

古今醫鑑云古方分為二十四種名狀不同究其所因亦不過久嗜辛熱炙煨新酒及房慾憂患蘊積熱毒憤鬱之氣所成也或藏於肛門之內或突出肛門之外大如雞冠蓮花核桃之狀小如牛奶雞心櫻桃之形云云而舉二十四證痔歌曰痔證分三八憑君仔細看莫交年月久見者膽心寒菱角看形怪蓮花不可觀穿腸并鼠乳酒色兩相干莫聽翻花怨蜂窠亦不寬雌雄同氣

血子母及腸盤玄珠尤可怪勾腸痛若鑽核桃與流氣見者便心酸粟子於中大雞心在外安珊瑚形可惡那便脫肛難內痔紅不出搭腸裏內盤虫珠更難治日久有雞冠切莫輕刀火令君性命殘用功無半月去病更除根

菱角痔穿腸痔蜂窠痔子母痔腸盤痔玄珠痔勾腸痔核桃痔粟子痔珊瑚痔搭腸痔垂珠痔雞心痔蓮花痔色痔見上○醫學正傳云其為變見名狀種種不同曰牛姪

曰鼠圪曰雞心曰雞冠曰蓮花曰翻花曰蜂窠曰穿腸
曰外痔○古人醫統作蜂窩

痔瘻

見外臺祕要所引廣濟方

本外臺網目蠶紙條引
突囊備急方作痔瘻

痔漏

見千金方

腸漏

見醫學綱目又出明醫指掌圖

三十年痔

見外臺祕要所引古今錄驗又云五痔十年又千金方

云五痔十年又外臺祕要引千金云五痔五十年不差

今考千金方有十年無五十年千金翼方亦作十年

歷年脫肛

同上引集驗方千金方

截腸病

醫學綱目云大腸頭出痛苦乾又落落又出名截腸病

腸盡則死。○究竟此亦脫肛也。
運氣痔。

證治準繩云運氣痔發皆屬寒

酒毒腸風下血

出百一選方

溫毒下血等

古今醫統云便後下血腹不痛名溫毒下血

及謂是濕熱風燥四氣而合

蘭室秘藏云受病者燥氣也為病者胃濕也胃刑大腸
則化燥火以乘燥熱之實勝風附熱而來是濕熱風燥
四氣而合

或謂木乘火勢而侮金

同上云飽食行房恐泄前陰之氣歸於大腸木乘火勢
而侮燥金

或謂痔鬻肝脾腎三經

薛已云

其他亦皆肺大腸表裏合邪之說

劉完素張元素以下至明諸醫派皆同

若非煩眩濫名。必是生剋配當鑿空之妄談。無要領無明
瑩。遂增後世無見識者之迷惑。終啓冥搜妄投之端。何可
不歎乎。又有腸風臟毒之稱。按自唐以前未見其名。蓋在
宋以後。或云腸風痔病。劉完素或云腸風下血。張杲或
云臟毒下血。張杲或云腸風瀉血。痔漏臟毒。許叔微或云
腸風臟毒與痔瘻同出異名。楊士瀛或云腸風臟毒屬痢

疾。陳言或云血清為腸風。血濁為臟毒。許叔微以上諸說

紛紛不歸一定。蓋謂腸風者言腸中受風邪。遂成下血也。

臟毒者言臟腸蘊毒。遂成瀉血也。素是俗稱無深義。究竟

痔疾下血之異名耳。今皆畧書以備考證。

玄明論云。夫腸風痔病者。必發手太陰手陽明經。以應

動脈。謂肺與大腸為表裏。主為傳道。以行糟粕。腸風痔

病有五種。其證亦異。痔門痔瘻總論。

醫說云。痔腸風臟毒一體病也。極難得藥。亦緣所以致

疾不同雖良藥若非對病固難一槩取效常人酒色飲食不節臟腑下血是謂風毒若釋子輩患此多應飽食久坐體氣不舒而得之乃脾毒也○又云予外兄劉向為嚴椽子過之畱飲訝其瘦瘠問之答曰去歲臟毒作凡半月自分必死得一藥服之至今無苦問何藥不肯言再三扣始言只這卓子上有之乃是乾椽燒灰飲下二錢本州曰椽治腸癖解熱毒消宿血有病者宜求之素問腸癖為痔泊宅編○又云人患腸風下血者何也

人腸皆有脂裹之厚則腸實而安腸中本無血血緣有風或有熱以消其脂腸遂薄滲入身中血初患者必服冷藥而愈服之過當則腸寒而脂愈不生其血又再作凡熱者其血鮮冷者其血青黑醫餘○又云臟毒下血洛陽一女子年四十六七耽飲無度多食魚蟹攝理之方蔑如也後以飲啖過常蓄毒在臟日夜二三十度大便與膿血雜下大腸連肛門痛不堪任醫以止血痢藥不効又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血而無膿凡如

此已半年餘氣血漸弱食漸減肌肉漸瘦稍服熱藥則
 腹愈痛血愈下服稍涼藥則泄注氣羸粥愈減服溫干
 藥則病不知將暮歲醫告術窮垂命待盡或有人教服
 人參散病家亦不敢主當謾與服之才一服知二服減
 三服膿血皆定自此不十服其疾遂愈後問其方云樗
 根白皮人參各一两為末二錢匕空心溫酒調不飲酒
 以溫米飲代衍義。腸風痔疾門。其謂風毒脾毒亦濫也且謂腸
 中無血者見死腸故也人身何所不有血此由不知血

之誤以為神氣也又人參散治女病亦可謂惑矣
 本事方云頃年有一人下血幾盈盆頓爾疲茶諸藥皆
 不効予曰此正腸風令服玉屑圓三服止予苦此疾三
 十年蓄下血藥方迄五十餘品其間或驗或否或始驗
 而久不應者或初不驗棄之再服有驗者未易立談大
 抵此疾品類不同對病則易愈如下清血色鮮者腸風
 也血濁而色黯者臟毒也肛門射如血線者蟲痔也腸
 風瀉血痔癩臟毒門

仁齋直指云腸胃不虛邪氣無從而入人唯坐卧風濕醉飽房勞生冷停寒酒麪積熱以致榮血失道滲入大腸此腸風臟毒之或由作也挾熱下血清而色鮮腹中痛挾冷下血濁而色黯腹內畧痛清即為腸風濁則為臟毒有先便而後血者其來也遠有先血而後便者其來也近世俗糞前糞後之說非也抑猶有說焉腸風之與蟲痔特介乎毫芒之間腸風之血自腸中來蟲痔之血肛門邊傍別一小竅射如血線是也迨夫肛門既

脫腐血浸淫於其間則俱化為蟲蠹蝕腸口澹血淋漓

自此又不能約而收之矣

腸風門腸風論○或云腸風下血腸風五痔腸風臟毒久

不止腸風痔瘻腸風瀉血脫肛腸風臟毒痔瘻腸風血痔臟毒下血傷酒臟毒其稱不一又云腸風

臟毒之與痔瘻同出而異名也歲積月累淫蝕腸頭濕

爛可畏此果何物致然哉蟲是也其間孰剋又當為之

化蟲不然古書何以謂之蟲痔諸痔門

三因方云夫有五痔人奏圍則下血或點澹或并箭或清或濁面黃唇白心忪脚弱頭目眩暈此因飽食坐久

腸癖必為亦有飲酒房室過度必致世醫多指此為腸
 風臟毒然腸風臟毒自屬滯下門臟毒即是藏中積毒
 腸風即是邪入藏純下清血謂之風利今五痔下血乃
 是酒痔脉痔其血自肛門邊別有一竅如針孔大溼淋
 而下與洩物不共道不可不知辨腸風論○其門有脉
 下血久羊腸若為腸風臟毒屬滯下門則何以此門載
 痔下血治方治五痔腸痔等方乎矛盾特甚
 證治要訣腸風臟毒門附痔漏云血清而色鮮者為腸

風濁而黯者為臟毒或在糞前或在糞後此乃因登園
 糞中有血却與瀉血不同臟毒者蘊積毒氣久而始見
 腸風者邪氣外入隨感隨見此三因方五痔臟毒腸風
 辨之甚詳臟毒腸風之血出於腸臟間五痔之血出於
 糞門蝕孔處治各不同無擇翁烏連湯治脉痔外無形
 而亦下血一線如箭或點澹不能已此由脉竅中來也
 又云痔漏證狀頗多自屬外科不復繁引既血自內出
 不可全仗外傳

古今醫統云、腸風下血、乃痔漏之源、大便下血、先哲有
糞前糞後、遠近之說、此一端也、大抵此則大腸已受濕
熱之傷、而但未形於外也、此其所以為內痔者、是也、人
不知覺、悉謂腸風、復齋論、深得病情、可謂詳切著明矣、
明醫指掌圖云、挾熱下血、暴發者、則血色清鮮、腹中有
痛、若挾寒而下血、兼積久者、則血色凝濁、而色黯、腹內
微痛、故暴病、則為腸風、蓋腸風者、邪從外入、隨感而隨
見、是也、積久始發、濁者、為臟毒、蓋臟毒者、久積其毒、而

始發是也、有先血後便者、其血來也、近先便後血者、其
血來也、遠俗謂糞前糞後、非也、

其他若證治準繩、景岳全書、證治大還、錦囊祕錄、醫通、
皆是依樣葫蘆、無甚發明、不暇一一舉載、

或以痔脫肛、與腸風臟毒為二門、

三因方、

或以痔漏、與脫肛為二門、

萬病回春、

或以痔漏脫肛腸風臟毒為三門

仁齋直指以下醫書大全明醫指掌圖錦囊秘錄等同

或以脫肛屬痢中痔屬外科

證治要訣

以上諸說總皆由不知脫肛即痔中之一證腸風臟毒即痔血之俗稱故致費辨強解屑屑為為鑿空之贅言亦皆以不曉知諸患證狀雖多終歸一因一病之綱要也

附字辨

痔說文後病也。正字通康熙字典並引增韻隱瘡也。韻會舉要

韻會小補說文為稊釋名云痔食也蟲食之也此說不可俱作隱創

從也陳言曰痔如大澤中有小山突出為峙人於穴竅中

凡有小肉突出者皆曰痔不特於肛門邊生亦有鼻痔眼

痔牙痔等。見三此或一說也蓋峙山屹立貌。字彙正字通

同又山獨立貌。韻會舉要即像乳腫突出謂以痔省之意也又

正字通云同文舉要別作痔篇海作瘡並非按痔小渚也

康熙字典云唐韻集韻並直里切音雉水中高土此亦似

為但不可用僻字耳。脫肛謂肛門脫出也。而有用疝字者

大非也。玉篇云：疝，下病也。字彙以下云：脫疝，下部病。正字通

熙字典，若以疝為脫肛病字，則當單用疝一字足矣。何可

更加脫字乎？而今謂脫疝，則似謂疝病脫去也。其為刺字

背義，何有甚焉者哉？字學者已如此，醫人不知疝非肛門

之肛，空乎？盧和於脫疝下云：俗作肛，非也。丹溪纂要其以不學

無術，反為妄作，說雖不足深責，亦多見其不知量也。此

由全不曉文字也。一本堂行餘醫言卷之六下畢

