



導水瑣言

十武
364
18



明中武
第564
卷

種禿癡見豈解
驚為兒孺耳自
忘生迅雷疾雨
雖堪畏人間至
愛情又尋



道水瑣言序

故侍御醫味田韞卿以方脉聞天下而不著方
論以為意之所解口莫能言唯有道水瑣言一
書即記其屢試而驗者也此雖特舉道水之一
法善及之則一尺之矩可以定天少之方矣今嗣
泰中將梓而以于世問序于余以為太史公
作倉公傳錄其所珍後世欲觀古人珍法者於
是乎取焉因閱其於籍道水之治驗此編未載

新藏記



者頗夥。今舉三則云。一夫嘗患疥癬。已愈滿身
洪腫。溺澁氣促。在醫以利水之劑。無驗。乃為四
物加香附子甘草浮萍湯使服之。不日諸瘡盡
除。所以知利水而不利者。証其脈微而細。膚審
腠枯。心下痞塞。腹滿而無力。病得之因患疥癬。
營滌衛泣。水道由此不利也。一士徇役于江戶。
患兩脚浮腫。筋字肉痺。眾醫以為脚氣治之。無
驗。來于京師請治。韞卿曰。此疝瘕也。即為四逆

散加吳茱萸牡蠣劉寄奴湯与之。未三旬病已
所以知非脚氣者。切其脈沈緊。心下痞硬。脇下
逆滿。臍左有塊。而胃腹無動。氣息如常。故曰疝
瘕。一婦浮腫脚弱。筋字氣急。至夜氣自左脇貫
衝胸膈。煩悶不能寐。眾醫以為脚氣治之。無驗
乃按其腹。心下拘急。胸下痞而有動。然心中不
悸。身多所麻痺。即為大柴胡加龍骨牡蠣吳茱
萸甘草湯与之。一劑而知。十劑而愈。所以知非

脚氣者切其脉弦而緊。病得之肝氣亢而中氣塞。水道由此不利也。之熙曰。古之善用兵者。法初無不同。而不同之用。子儀以寬。光弼以嚴。王翦以贏。謝玄以寡。孫臏滅竈。而虞弼則增竈。皆家之察。四然二反。亦何異乎斯。吳廷紹以楮實湯治喉痺。以薑豆湯治腦痛。亦皆記其方。它日無効。故曰古方法。今病猶拆舊建新之方也。趙玄屋。諸家有醫案。亦不以拆舊建新之方也。趙玄

度好聚醫書。為醫藏。繆仲醇指之曰。此皆誤人之物也。仲醇豈不讀醫書者乎哉。恐泥法費人也。所謂以書御者。不盡馬之情。後學者。由此編得具一副活眼力。尚免為趙玄度耳矣。

文化二年九月

栲亭源之熙撰并書



導水瑣言 卷之四 男 哲筆受

夫水腫ノ病其症サマク有トイヘ凡能其脉症ヲ審ニスルニ三候ニ過スヨク此三候ヲ識得シテ然後ニ藥ヲ施サハ恐クハ大ナル過ナカラシ是水腫ヲ療スルノ一大要領ナリ唯水腫ノ治ノミニ非ス萬病皆此三候ヲ以テ本トス必倉卒ニ診察スルナカレ所謂三候トハ柯ソヤ曰實腫ノ候ニ曰虛實間腫ノ候ニ曰虛腫ノ候ニ實腫ハ

導水瑣言

東郭和田先生口授

男 鋼 校

○夫水腫ノ病其症サマク有トイヘ凡能其脉症ヲ審ニスルニ三候ニ過スヨク此三候ヲ識得シテ然後ニ藥ヲ施サハ恐クハ大ナル過ナカラシ是水腫ヲ療スルノ一大要領ナリ唯水腫ノ治ノミニ非ス萬病皆此三候ヲ以テ本トス必倉卒ニ診察スルナカレ所謂三候トハ柯ソヤ曰實腫ノ候ニ曰虛實間腫ノ候ニ曰虛腫ノ候ニ實腫ハ

其腫多シトイヘ凡治スルコ容易ナリ間腫コレ
ニ次ク虚腫ト夕其次ナリ然レ凡此三症ハヨク
彼ノ三候ヲ識得シテ藥ヲ施セハ治セスト云
ナシ唯極虚ノ腫ハ其腫些少ナリトイヘ凡藥効
ナシ故ニ此ヲ不治腫ト名ケテ療セス不治腫ノ
診法左ニ詳ナリ此ニ贅セス

○凡實腫ハ其腫ンツカリト堅ク勢アリテ手ニ
テ按セハ凹メ凡手ヲハナセハ乍故ノ如ク肉脹
ス虚腫ハ勢ナク其腫フワクト和ラカニシテ按
セ凡其跡急ニ起リ難シ是順症ノ腫状ヲ以テ虚

實ヲ辨スルノ梗槩ニ又虚腫ニテ石ノ如ク硬キ
アリ其候實腫ニ紛レヤスニ實腫ニテフワクト
和ラカナルアリ其候亦大ニ虚腫ニ疑ハシ此二
症ヲ辨スルコ他ナシ唯脉ノ虚實ト腹ノ虚實ト
皮膚ノ虚實ト舌色ノ虚實ト眼中ノ虚實ト腎間
ノ動トヲ參候シテ然後ニ始テ其虚實ヲ知ルヘ
シ吾門是ヲ以テ六診ト云六診ノ内腎間ノ候舌
色ノ候皮膚ノ候皆別ニ口傳アリ又一種腫多ク
有ナカラ其水肌表ニ達セス皮膚ニ皺ヨリタル
者アリは大虚ノ腫ニ又一種腫ノ形状前症ノ如

クナルカ又ハ石ノ如ク堅キ腫ニテ腹腰ヨリ以
下夥シク腫テ臂肩胸背甚シク羸瘦スル者アリ
是亦太虚ノ腫ニ右ノ二種多ハ不治ニ至ル者ニ
又實腫ニテ腰腹以下多ク腫テ上部腫ナキ者ア
リ是ハ臂肩胸背唯腫ナキノミニテ羸瘦スルニ
ハ非ス能ク心ヲ用ヒテ此處ヲ辨シ且テ診ヲ審
ニシテ其實腫タルヲ知ヘシ治法後ニ附ス

凡水腫ノ虚實ハ他病ト異ニシテ實腫トイヘ
氏脾胃ノ虚ヨリシテ發スル者ナレハ攻利ノ劇
劑ヲ用テナク脾胃ヲ損スルヲ勿レ唯病ニ於

テ益無キノミニ非ス人ヲ損ルヲ甚多シ深ク是
ヲ慎ヘシ是水腫ヲ療スルノ一大戒ニ余聲ニ吠
ヘ耳ニ食シテ此説ヲ立ルニ非ス往年此病因ヲ
深ク考ヘス滿腫ノ症ニ遇ヘハ必巴豆甘遂桃花
牽牛ノ類ヲ以テ瀉下ヲ逞ス唯病者ヲ苦惱セシ
ムルノミニニテ効ヲ全スルヲ甚希ニ邂逅ニ効ヲ
得ルヲアリトイヘ氏多ハ遠カラサル内ニ再ヒ
滿腫ス此時ニ至テ再ヒ瀉下ノ劑ヲ投スレ氏其
効始ノ如クナラス漸クニ異症蜂起シテ終ニ救
ヘカラサルニ至ルモノアリ此時ニ當テ余カ滿

導水瑣言
三會章齋藏
腔子一箇モ他ノ手段ナケレハ唯水腫ハ治スヘ
カラサルノ病ト錯悟シ凡一歳餘モ水腫ノ治ヲ
施サ、リキ然レモトヨリ方術ヲ好ノ癖深ケ
レハ手ヲ空シテ治ヲ施サルモ心ニ於テ穩ナラ
ス乃博ク古人ノ方籍ヲ讀ミ始テ其病因ヲ了悟
シ次ニ其法方ヲ取捨シ是ヲ病ニ徴シテ其實効
ヲ推シ方藥ヲ取用ルト至テ簡約ニシテ無數ノ
症ニ應ス縱横ニ治ヲ施スモノ今ニシテ五年餘
ナリ極虚不治ノ症ハ驗ナシトイヘモ其他ノ諸
症ハ効ナシト云フナシ總シテ水腫ハ小水ヨリ

利セスシテ大便ヨリ瀉下ヲ取ルハ益ナキモノ
ト知ヘシ勉テ方症ヲ能對配シ小水ヨリ通シ去
ルヘシ然レモ實腫勢甚盛ニシテ二便閉塞シ利
水ノ劑ヲ投スレモ消滴モ利セス腹脹鼓ノ如ク
呼吸逼迫シ苦悶シテ死セシトスルモノニハ甘
遂末野薔薇實桃花ノ類ヲ投シテ下ヲ取ヘシ然
レモハハクスヘカラス快下利シテ病勢ユル
ハ能ク診候シテ其方症ヲ對シ平和ナル行氣利
水ノ劑ニ轉スヘシ是實ニ已テ得サルノ奇策
ニシテ常法ニ非ス

○凡水腫ノ脉沈實ニシテカアルヲ實トシ吉ト
ス沈微沈細ニシテカナキヲ虚トシ凶トス浮虚
浮大ニシテ是ヲ按テ精神ナク譬ハ風ニ木葉ノ
散ルカ如ク木ノ水ニ浮カ如クナルモノハイヨ
ク虚ニシテ凶ト知ルヘシ腫状舌色其他ノ諸候
凡皆虚候ナルニ其脉反テ弦緊洪大ニシテ強ク
コレヲ按セ凡其脉勢イヨク盛ニシテウツクシ
ク丸ミアルヲ聊モ無ク譬ハ薄キ竹篔ニテ指頭
ヲ彈クヤウナル者ハ是極虚不治ノ脉ニ

○凡水腫ノ舌甚薄キ白胎ニシテ潤澤アルハ實

腫ノ輕症之厚キ白胎又ハ黄胎ノモノハ一層重
シト知ルヘシ然レ凡虚腫ノ舌ニモ白胎黄胎ア
リ腫状ト脈状トヲ参考シテ其虚實ヲ辨スヘシ
白胎ニテ枯骨ノ如ク乾燥スルモノ多ハ大虚ノ
舌ニ黒胎虚實二種アリ此舌口授ニ非レハ明ナ
リカタシ故ニコ、ニ是ヲ略ス厚キ白胎又ハ黄
胎ニシテ舌ノ四邊紅鮮ニシテ譬ハ緋帛ニテ縁
ヲ取リタルカ如クナル者又舌ニ胎ナク火ノ如
クニシテ乾燥セサル者皆虚候之又胎ナク殷然
トシテ火ノ如ク乾燥甚ク或白灰色ニテ乾燥甚

導水珠言
キモノ俱ニ極虚不治ノ舌之又白胎黄胎或胎十
ク赤色ナル舌ニテモ舌ノ左右ノ縁ニ紫黑色十
ル斑點アルモノ是虚候ニシテ結毒アルノ舌之
總テ諸病凡ニ舌傍ニ紫黒ノ點ヲ生スルハ皆結
毒ノ候ト知ヘシ此外舌候數多アレ凡形色相似
テ紛レ易キユヘ此ニ載セス凡舌候脈候トモニ
水腫ノミニ非ス萬病皆是ヲ以テ候フヘシ

○凡水腫大便秘硬ナルヲ實トシ吉トス下利ス
ルモノヲ虚トシ凶トス又大便下利モセス常ノ
通りニテ一日ニ五六度モ通スルアリ又氣急晝

夜ニ五六度モ發シ其發スル度毎ニ大便ヲ催ス
モノアリ此二症皆大虚ノ兆之又實腫ニシテ利
水乏ク水穀分チカタク下利スル者アリ虚腫ニ
シテ大便秘澁スル者アリ仔細ニ其腫状ト六診
トヲ参考シテ混同スヘカラス

○凡水腫ノ症食ヲ嗜ム者ヲ實トシ吉トス食氣
ナキ者ヲ虚トシ凶トス又虚腫ニシテ食ヲ貪ル
者アリ此症皆脾胃虚損ノ甚シキ者ニシテ吉兆
ニ非ス又實腫ニシテ心下痞塞甚シク食ヲ思ハ
サルアリ此症亦前條ノ如ク腫状ト六診トヲ審

ニシテ虚實ヲ辨スヘシ

○凡水腫吐血痰血下血アル者多ハ不治ノ症ト成リ易シ然レモ十中一二救ヘキ者アリ能ク診候ヲ審ニスヘシコレ血症ノ後ニ腫ヲ發スル者ヲ云ニ非ス水腫中血症ヲ兼ルヲ云ニ

○凡水腫ヲ病ム人ハ堅ク鹽ヲ禁スヘシ麥飯ヲ和ラカニタキ昆布ヲ水煮ニシテ其汁ヲカケテ食スヘシ汁ノ内ヘオロシ萊菔淺草海苔ナトヲ和スルモ苦シカラス或昆布ノ鹽ヲ入レ冬瓜赤小豆ナトヲ煮テ食スルモ宜シ鳥獸魚鼈ハ云

ヲ待ス膏粱ノ飯ヲ食スルモ甚宜シカラス唯前ニノフル通ノ至極淡薄ナル食ヲ與ヘシ必飽滿セシムヘカラス夫食飽滿スル寸ハ脾氣轉セス脾氣轉セサル寸ハ水道通セス故淡薄ヲ食セシメ鹽ヲ禁スルハ水道ヲ利センカ爲之是水腫ヲ療スルノ一大手段之脾胃大ニ虚損スル者又極虚ニ至ラサルモシハく下利スル者ハ麥飯ニヨロシカラス陳倉米ナトノ味至テ淡キモノヲ一合或一合五勺ハカリヲ稀粥トナシ斟酌シテ一日ノ食トスヘシ是亦一手段之麥モシクハ米多

ク食セシムルモ其量ニ合ニハスクヘカラス凡
水氣盡ルノ後五十日許モ鹽ヲ禁シイヨク再發
ノ萌モ無レハ徐ニ鹽ヲ食セシムヘシ

○凡水腫ヲ病ム人固ク浴湯ヲ禁スヘシ水腫ヲ
病ム人浴湯スレハ其腫イヨク下ス水氣盡ルノ
後早ク浴湯スルモ宜カラス其腫多ハ再發スル
者ニ大法水氣盡ルノ後輕者ハ三十日重者ハ六
十日許ヲ經テコレヲ許スヘシ必輕忽ニスヘカ
ラス

○凡水腫ヲ病ム人最房事ヲ謹ムヘシ呼吸逼迫

等ノ苦腦モナキ腫ヲ病ム人ハ閑暇無事ナルヨ
リシテ慾情ヲ動シ間々慾事ヲ犯スモノアリ慾
懃ニコレヲ告戒スヘシ若是ヲ謹マサル人ハ其
水通利シカタシ大法水氣盡ルノ後半歲許固ク
是ヲ謹ヘシ若法ノ如クセサレハ其腫再發シテ
頻年腫ヲ患ルモノニ

實腫治法并方

○水腫心下痞硬小便短少ニシテ大便秘硬シ其
腫勢アリテシツカリト堅ク指ヲ以テ按ヤハ暫
ク凹斥手ヲハナセハ乍故ノ如ク肉脹シ其脉沈

實ニシテカアル者は實腫ニ分消湯ヲ用ユヘシ
若水氣多腹部ニ聚リ腹脹甚シキ者ハ三聖丸ヲ
兼用スヘシ每服一錢白湯ニテ送下ス一日ニ二
次若腹脹減シカタキ者ハ増テ三五錢ニ至ル

分消湯方

木 茯苓 猪苓 澤瀉 大腹皮各天

橘皮 厚朴 枳實 縮砂 香附子各中

蜜香 甘草各中 生姜中

右水二合ヲ以テ煮テ一合ヲ取り滓ヲ去リ
分温テ兩度ニ服ス晝夜三劑ヲ用 若胸中

微飲アリテ微喘スル者ニハ蘓子ヲ加フ水
氣脇下ヨリ上衝スル者ニハ呉茱萸ヲ加フ

○腫状脉状及心下ノ痞大抵分消湯ノ症ニ類シ
テ唯心胸痞悶脇肋膨脹シテ飲食ヲ思ハス志氣
鬱結シ快ミトシテ樂マサル者ハ分心氣飲ヲ用
ユヘシ

分心氣飲方

肉桂 茯苓 半夏 通草各中 桑白皮 橘皮

菴活 腹皮 蘓葉各天 芍藥 甘草 生姜

燈心各中

右水煎症ニ隨テ出入加減スヘシ

○腫状脉状大抵分消湯ニ類シテ心下覆盃ノ如ク痞硬最甚シク纒ニ身ヲ動揺スレハ氣息逼迫スルモノ是水モツハラ心下ニ結聚スルニ他ノ藥ニテ救フヘキ者ナシ外臺黑豆湯ヲ用ユヘシ
此症心下ノ診口傳アリ筆授ノ盡ストコロニアラス 若腹滿減シ難キ者ハ三聖丸ヲ兼用スルモヨシ若脇下ヨリ水氣上衝スルヲアラハ木茱丸ヲ兼用スヘシ三四錢目ヨリ五六錢目ニ至ル或方中呉茱萸ヲ加ルモ亦可之

黑豆湯方

桑白皮^大 檳榔 茯苓^各

右三味黑豆煎汁ニ合ヲ以テ餘藥ヲ入レ煮テ一合ヲ取り滓ヲ去リ分千温テ兩度ニ服ス

黑豆煎汁ヲ作ル法

新黑豆一合半洗淨シ砂鍋ニ内レ水一升ニ合ヲ以テ煮テ六合ヲ取り黑豆ヲ去リ汁ヲ用ユ即六合ヲ以テ前藥三劑ノ水トス又黑豆ヲヒキワリ前藥一劑ニ二錢目ヲ合シ水ニ合ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用ユ其効

本方ニコトナラス

○凡其腫状脉状黑豆湯ノ症ニ類シテ心下痞硬
マタ一層甚シク呼吸逼迫シ利水シカタキモノ
吳茱萸橘皮湯ヲ用ユヘシ此方黑豆湯ニ比スレ
ハ其病勢一等劇ナル者ニ宜シ

吳茱萸橘皮湯方

吳茱萸 橘皮 枳實 茯苓 各等分

右水煎 症ニ依テ犀角ヲ加ヘ或一角ヲ兼
用スルコトアリ又ハ半夏厚朴湯ニ犀角一角
ヲ兼服スルモノアリ 虚腫ニハ附劑ニ

一角或犀角ヲ加ルコトアリ犀角ト一角ト効
驗ノ差別アルコト屢實驗ヲ得テ一家ノ口授
アリ

○腫状脉状大抵分心氣飲ノ如クニシテ唯心下
急縮甚シク胸膈滿悶利水シカタク吳茱萸橘皮
湯ナト用ユルニ至ラサル者ハ理氣湯ヲ用ユヘ
シ

理氣湯方

即半夏厚朴湯ノ方内ノ蘓葉ヲ蘓子ニ代テ
橘皮枳實桔梗連莖ヲ加フル方ニ 若心下

和シ難ク利水少ハ麥芽犀角ヲ加フヘシ

○凡其腫狀脉狀大略分消湯ノ症ニ類シテ喘咳甚シク呼吸短促ナルモノ是水胸中ニ聚ルニ先其上ヲ疏スヘシ越婢加朮苓湯コレヲツカサトル或云此症背惡寒ト煩渴トヲ主トシテ用ユト此說的當ノ論ニ非ス惡寒ト渴トハ有ルモアリ又無キモアリ畢竟水氣胸膈ニ聚リ喘咳ナトアルヲ主トシ用ユヘシ

越婢加朮苓湯方

麻黃 石膏 生姜 大棗 甘草 雲朮

茯苓

右水煎 若腹脹甚者三聖丸ヲ兼用ス

三聖丸方

鐵粉煨赤 禹餘糧 蛇含石各等分

右各末トナシ糊ニテ丸トスルヲ梧子大水氣專腹部ニ結聚シ腹脹氣急小水不利スル者此丸大ニ驗アリ然レ凡虛腫腹脹ノ者ニハ効ナシヨク三候六診ヲ審ニシテ過ツトナカレ

○實腫四肢十分ニ腫脹シ心下痞スレ凡硬ニ至

ラス腹部滿スレ疝脹ニ至ラス手ヲ以テ腹ヲ按
ニ空濡ナルカ如クニシテ腹底隱ニトシテカア
ルモノ疏水湯ノ症ニ

疏水湯方

赤小豆 一匁二分

大麥 九分

地膚子 七分

猪苓

茯苓 各四分

黑牽牛 三分

右七味各炒水煎

若心下痞シテ食ヲ思ハ

ス志氣舒暢セサルモノハ宿砂木香青皮各

二分ヲ加フ

○滿身洪腫其腫手ヲ以テ按ニシツカリトカア

リテ其跡忽ニ起脹シ腫脹極テ甚ケレ疝曾テ呼
吸ニ礙ラス氣息平常ノ如クナル者猪苓湯ノ症
ニ又一種腫ノ勢前ノ如クシテ腰以下滿腫スレ
疝臂肩胸背少モ腫ナク呼吸平常ノ如クナル者
是亦猪苓湯ヲ用ユヘシ渴ノ有無ヲ問ハス必此
湯ヲ用テ先下ヲ疏スヘシ大ニ奇驗アリ然レ疝
此ニ症虚腫ニ紛レヤスシ能ク三候六診ヲ審ニ
シテ其實腫タルヲ辨スヘシ又腫状脉状前症
ノ如クニシテ心下痞滿シ快ニトシテ樂マス氣
息少短促ナルハ大橘皮加膠湯ヲ用テ其上ヲ和

レ且其下ヲ疏スヘシ

猪苓湯方

猪苓 澤瀉 茯苓 阿膠 滑石 各等分

右水煎

大橘皮加膠湯方

橘皮 茯苓 猪苓 澤瀉 桂枝 木香

術 甘草 檳榔 生姜 滑石 阿膠

右水煎

虛實間腫治法 并方

○腫滿指ヲ以テ按ニ濡硬其中ヲ得テ肌表ヒカ

くト光澤アリ其脉實ニシテ稍浮數ヲ帶フル者

是實ニシテ虚ヲ兼ヌルノ症ニ 此診口傳アリ筆授ニ盡ストコロニアラス 温藥

ニテ是ヲ導クヘシ大蒜煎ニ宜シ若病人蒜臭ヲ

惡ム者ニハ鯉魚煎ヲ以テコレニ代フヘシ若又

鯉魚ノ腥ヲ惡ム者ニハ鯉魚霜ヲ用ユヘシ

大蒜煎方

赤小豆 一合 蒜 生姜 生商陸根 各三錢目 細剉

右四味先赤小豆ト水トヲ以テ砂鍋ニ入レ

火上ニ安シ次ニ三味ヲ以テ布囊ニ入レ赤

小豆中ニ著シ是ヲ煮ルヲ凡ニ時許赤小豆

熟爛ノ時ヲ候フテ布囊ヲ去リ赤小豆ヲ食
セシム一日ニ一劑若其多ヲ厭者ハ劑半ヲ
減セヨ唯病人ノ食量ニ隨テ増損スヘシ

鯉魚煎方

鯉魚 長七八寸者二頭去其鱗不去其腸

昆布 方三寸二片

花椒 一匙

右水一升八合ヲ以テ煮テ四合ヲ取り其汁
ヲ飲ミ且鯉ヲ食セシム毎日一劑

鯉魚霜方

鯉魚 大者二頭不去其鱗腸

冬瓜 各等分

右土器ニ入レ鹽泥ニテ固濟シ炭火ヲ以テ

燒テ性ヲ存シ末トナシ白湯ニテ送下ス每
服一匙日ニ二三回

○水氣久シク去ス唇口乾燥シ其皮膚堅厚ニシ
テ枯燥シ譬へハ槁木ノ潤澤ナキカ如ク心下痞
硬胸中不利シ微シク喘氣アルモノ是虛ニシテ
實ヲ兼ルノ症ニ木防已加茯苓湯ヲ用ユヘシ

木防已加茯苓湯方

木防已 五分

石膏 二錢

桂枝

人參 各三分

茯苓 六分

右水煎

○其腫狀脉狀大抵大蒜煎ノ症ニ類シテ心下和

導水瑣言
セス築ミトシテ悸動スル者は畜水ト固有ノ積
癖ト併セテ心下ニ聚ル之姜桂加茯苓湯ヲ用ヘ
シ總シテ實腫虚腫トモ多ハ動悸ナキモノニシ
テ唯此間腫ニハ必動悸アリ然レ凡草ニ診察
スレハ脚氣ノ動悸ニ取紛フアルヘシ脚氣動
悸ノ症ハ此治法ト大ニ異リ必治ヲ誤ルヘカラ
ス

姜桂加茯苓湯方

- 柴胡
- 黄芩
- 桂枝
- 乾姜
- 牡蠣
- 甘草
- 瓜蒌根
- 茯苓

右水煎 若脇下ニ上衝スル者ハ吳茱萸ヲ
加フ若脉一層虚候ヲ見ハシ心下和シ難キ
者ニハ附子ヲ加フ

○脉症略大蒜煎ノ症ニ似テ呼吸短息喘咳スル
者ハ千金越婢湯ヲ用エヘシ

千金越婢湯方

即越婢湯ニ木附ヲ加ル方ニ更ニ茯苓ヲ加
フヘシ

虚腫治法并方

○其腫勢ヒ少ク心下痞硬或少シ氣急シ或腹脹

スルモノ是虚腫ニシテ未極虚ニ至ラサル者之
濟生實脾散ヲ用ユヘシ此上シハク下利ナトア
リテ木瓜檳榔草菓ノ類ヲ用ヒ難キ症アリ四苓
散ニ附子橘皮ナト加テ用ル欵又ハ真武湯ヲ用
ルノ場合モアリ
真武湯ニ理中湯ヲ合テ用ルモヨシ
然レモ心下ノ候口傳アリ 能ク三候六
診ヲ審ニシテ誤治スヘカラス

○濟生實脾散方

厚朴 木 木瓜 木香 草菓 檳榔

附子 茯苓 乾姜 甘草

右水煎

○其症實脾散ニ同フシテ唯心下ノ痞コレヲ按
テカナクハ香砂六君子湯ヲ用ユヘシ痞悶氣急
ヲ苦ハ犀角麥芽ヲ加ヘ腹脹甚キハ厚朴ヲ加ヘ
下利スルハ附子ヲ加フ然レモ此診加減ノ法口
授シカタシ能ク心ヲ用ヒテ是ヲ察スヘシ

香砂六君子湯方

白朮 茯苓 人參 甘草 陳皮 半夏

香附子 宿砂 藿香 或去或加

右水煎

○其腫虚濡ニシテカナク按セモ其跡急ニ起リ

難ク或腹以下腫アリテ臂肩胸背羸瘦シ其脉微細或浮虚ニシテ心下大ニ痞悶シテ飲食美ナラサルモノ是虚腫ニシテ實脾ノ症ヨリ又一層脱ノ甚シキ者之壯原湯ヲ用ユヘシ

壯原湯方

- 人参 白朮 茯苓 桂枝 附子 乾姜
- 宿砂 陳皮 破胡紙

右水煎

○其腫状脉状大抵前症ノ如クニシテ腰脚解休シテカスクナク或臍下不仁スル者八味丸料ヲ

用ユヘシ

八味丸料

- 地黄生乾熟隨 山茱萸 薯蕷 澤瀉 茯苓
- 牡丹皮 桂枝 附子生製隨

右水煎

○腫滿堅硬ニシテコレヲ摩スルニ潤澤ナク譬ハ革囊ニ水ヲ盛リテ其口ヲ紮ルカ如ク手當リカサクトシテ堅キ腫ハ陽氣ノ脱スル之或水氣十分ニアリナカラ其腫肌表ニ達セズ肌膚皺アルモノニ症氏ニ陽脱ニシテ多ハ不治ニ至ルモ

ノ之已コヲ得スハ防已茯苓加附子湯ヲ用ユ
ヘシ或附子ヲ去リ本方ハカリ用ルノ症アリ又補中益氣湯ニ附子ヲ加ル
カ又ハ五苓散ナトヲ合シテ用ユルコトモアリ

防已茯苓加附子湯

防已 桂枝各中 茯苓大 甘草中 黃耆小 附子各中

右水煎

附錄

○疥癬頭瘡内攻シテ腫ヲナスモノ是亦虚實
ノ二症アリ其内虚症少クシテ實症多キモ
ノ之能診候シテ虚實ヲ辨別シ症ニ隨テ利

水ノ劑ヲ投スヘシ必瘡ニ拘泥スヘカラス
元來疥癬内陷ヨリシテ起ルコトナレハ當時
滿腫シテ腹脹氣急スルハ皆水ノコト故ニ
先其水ヲ利スルヲ以テ治トス其水快利ス
レハ先ノ内陷セル瘡發表ノ藥ヲ待スレテ
悉皆表發ス是予カ近年ノ新手段ニシテ屢
効ヲ得ル所ノ者ニ若腹脹氣急至テ甚シク
洟滴ノ利水モナク苦悶死セント欲スル者
ニハ甘遂桃花ノ類ニテ一下ヲ取ルヘシ然
レハ同シクハ下劑ヲ用ヒスレテ効ヲ全フ

スヘシ是マコトニ已ヲ得サルノ一計ノ
ミ治驗後ニ附ス

○尼真雖者年二十八疥癬内陷シテ遂ニ腫脹
ヲナス醫二三コレヲ下ス腫益甚シ尋テ發
表利水ノ劑ヲ投ス亦効ナシ困苦已ニ極レ
リ予ヲ延テコレヲ診セシム通身洪腫シテ
腹鼓ノ如ク咳逆短氣喘鳴鋸ヲ拽カ如シ予
乃越婢加朮苓湯ヲ投ス每料重サ十錢兼テ
三聖丸ヲ服セシム初昏ヨリ平且ニ至ルマ
テ湯藥凡五劑丸藥凡四錢平且ノ後腹中鳴

動シ小水利スルヲ一升許喘鳴半ヲ減ス一
時許ニシテ復利スルヲ二升餘喘鳴失フカ
如ク腹脹半ヲ減ス爾後小水日ニ益快利シ
十日ヲ過スシテ滿身カツテ水ナシ然後ニ
先ノ陷スル所ノ瘡ニ夕勃然トシテ發ス乃
藥ヲ敷テ其毒ヲ盡シ藥湯ヲ製シテ浴セシ
ム三十日ニシテ全ク安シ

○縫屋五兵衛者年四十前症ヲ患フ其症稍虛
候アリ予乃千金越婢湯ヲ作テコレヲ服セ
シム十日ニシテ腫脹悉ク平ク

右ノ外治驗數多アレ此ニ録セス能ク三
候六診ヲ審ニシテ其症ニ對スル利水ノ方
ヲ處スヘシ必瘡ニ拘泥スヘカラス是予カ
内攻ヲ治スルノ法ニ

○夫脚氣ノ病其初發多ハ皆膝骨弛緩行歩シカ
タク或踝骨疼痛或足筋攣急或臑脹硬脹シ遠行
シテ疲タル状ノ如ク或兩脚酸疼或麻痺シテ痛
痒ヲ知ラス或環口及臍下不仁シ或兩脚痿弱頑
痺ス各皆小水短澁ニシテ呼吸促迫シ虚里ノ動
盛ナル者之劇者ハ滿胸ノ骨間悉ク皆悸動ス此

症甚恐ルヘキヲニテ多ハ心ニ衝ノ根脚ト知ル
ヘシ凡前ニ説ク諸症ノ内一二症アリテ小水イ
ヨク不利シ遂ニ腫ヲ發スル者ヲ脚氣腫滿ト云
又始終腫ヲ發セスレテ唯痿弱麻痺氣急トハ
カリノ者アリ是ヲ乾脚氣ト云俗醫ヤ、モスレ
ハ輒云フ凡腫脚ヨリシテ發スルモノハ脚氣ノ
腫トト嗚呼は何ノ言ソヤ笑フヘキノ至ニ水腫
ノ初發ハ皆脚ヨリシテ腫ル、モノニ唯前ニ説
ク通リノ諸症アリテ後腫ヲナス者ヲ脚氣腫ト
定ムヘシ右ノ症ナクシテ腫ヲ發スルモノハ皆

平常ノ水腫ニ能ク心ヲ用テ脉腹ヲ察シ猶且腫
ヲ發セサルノ前右ノ諸症有ヤ無ヤト委シク是
ノ問フヘシ若水腫ヲ脚氣腫トナシテ誤治スレ
ハ利水少キノミニテ格別ノ害ナシ脚氣腫ヲ誤
テ水腫ノ劑ヲ投スレハ其變踵ヲ廻ラサス謹テ
誤治ヲナスコトナカレ

○凡脚氣ノ脉大抵水腫ニ同シ故ニ脉候ヲ載セ
ス四肢微冷シ脉伏シテ應セサルモノハ極危劇
ノ候ニ然レ凡此内ナヲ救フヘキ症アリ此診口
授アリ

○凡脚氣ノ舌候亦水腫ニ同シ是亦類ヲ以テ推
ヘシ

○凡脚氣ノ病其因ニ夕水腫ト同事ニテ虚實ニ
症凡ニ皆脾胃ノ虚ヨリシテ發スル者ナレハ其
治吐下ノ劑ヲ用ヒスシテ効ヲ取ルヲ以テ上策
トス然レ凡吳茱萸木瓜檳榔桑白皮童便石膏麻
黄ノ類ヲ用レ凡衝氣少シモ降ラス昏悶苦楚シ
消滴ノ水モ利セス嘔吐スル者ハ能ク三候六診
ヲ審カニシテ却テ瓜蒂ノ類ヲ用ヒ一湧ヲ取レ
ハ豁然トシテ速驗ヲ奏スルコトアリ是脚氣水毒

胸中ニ固泥スルノユヘ湧吐ニ非レハ治スルヲ
 能ハサルモノ之然レ其其實症ナルヲヲ徹識セ
 サレハ却テ命期ヲ促スノ助トナルヘシ若前症
 ノ如クニシテ嘔吐ナク呼吸逼迫腹脹甚シク實
 候疑ナキ者ナラハ甘遂桃花野薔薇實ノ類ニテ
 一下ヲ取り衝氣ユルマハ症ニ隨テ降氣ノ劑ニ
 轉スヘシ右二症口傳アリ能診候ヲ審ニセサレ
 ハ必人ヲ誤ル容易ニ施スヘカラス若虚症ナレ
 ハ前症ノ如クナルニ犀角ヲ用ユルノ症アリ真
 武ノ類ヲ用ルノ症アリ此二症亦口傳アリ

○凡脚氣ノ禁忌亦水腫ニ同シ食禁ヲ嚴ニセサ
 レハ藥ストイヘ厄効ナシ能シ病者ニ告戒スヘ
 シ

○凡脚氣ノ症水藥口ニ入レハ即吐スルモノ是
 劇症ニシテ多ハ急變アリ又病勢イマタ劇ナラ
 サルニ時ニ吐アル者は亦多ハ危篤ニ至リヤス
 シ能シ心ヲ用ユヘシ

○凡脚氣初發手足少シク麻痺ヲ覺ヘ或膈腸硬
 脹シ或少ク氣急或手足微腫シ或否ラス其脉實
 スル者檳蘓湯ヲ用ユヘシ其効却テ小檳榔湯ニ

優レリ

擯蘇湯方

即香蘇散ニ木瓜擯榔羌活木香ヲ加フル方

外臺小擯榔湯方 半夏生姜桂枝擯榔末以上四味水煎

○脚氣乾濕二症ニ拘ラス小水短澁ニシテ氣急
シ手足麻痺甚シク或膝骨弛緩スル者越婢加朮
苓湯ヲ用ユヘシ此症診候口傳アリ

方水腫中ニ出

若心下和シ難ク氣急スル者ニハ木瓜擯榔ヲ加
ヘ或吳茱萸桑白皮ヲ加フ或木茱丸ヲ兼用スル
ト一日夜ノ間三四錢ヨリ四五錢ニ至ル若脉症

虚候アリテ心下和シ難キ者ニハ附子ヲ加フ即
千金越婢湯ニ千金越婢湯ニ木瓜擯榔吳茱萸十
トヲ加フル症モアリ木茱丸ヲ兼用スルトモア
リ症ニ隨テ出入スヘシ

○脚氣乾濕二症ヲ論セス小水不利シ心下痞硬
最甚シク其状覆杯ノ如ク呼吸短促ソノ脉症實
ニ屬スル者外臺黑豆湯ヲ用ユヘシ大ニ奇効ア
リ然レモ此症心下ノ候ヲ識得セサレハ用テ効
ナシ 心下候口傳アリ方水腫中ニ出

○脚氣胸滿氣急シ其氣上冲セント欲スルモノ

大檳榔湯ノ症

大檳榔湯方

檳榔 大

生姜 中

橘皮

吳茱萸

本香

紫蘓

木瓜 各中

右水煎

外臺大小檳榔湯方名ナレ近來醫流ソノ探索ニ便ナラシクテ欲シテ名ヲ命スルノミ

○脚氣心ニ冲シ昏悶シテ死セントスル者桑白皮湯ヲ用ユヘシ

桑白皮湯方

此方外臺方名ナレ假ニ其名ヲ命スルノミ

桑白皮

吳茱萸

右水煎

本方生姜アリ時ノ宜ニ隨テ加減

○京都六七年前ヨリ急劇ノ病流行シ人ヲソコナウ一少カラス其症心腹脹痛シ或胸中痛裂カ如ク腹攣急シ呼吸短促其状全ク結胸凡云フヘシ大抵形状右ノ如クナルユヘ時醫多ク大陷胸湯ヲ用ユ予モ亦手段ナケレハ大陷胸湯ヲ用ユル者凡五六人服藥ノ後暫時ハ病勢ユルムヤウニ見ユレ凡ヤカテ前ノ如ク盛ニナリ其後ハ大陷胸ノ類ヲ用レ凡即時ニ吐出シ次第ニ胸中ニ上冲シ昏悶百苦シテ皆死ス其迅速ナル一或三日或六七日ニ過ス京師ノ俗コレヲ三日坊卜名

ク予屢ソノ病ヲ診スルニ其症結胸ニ似タレ凡
其脉結胸ノ脉ニ非ス皆浮虚或浮弱或沈微沈細
ニシテカナシ因テ思フ此症實ニ非スシテ虚ニ
下劑ノ宜キ所ニ非ス全ク脚氣ノ一種ニテ水毒
急ニ胸中ニ上冲スル者ニト乃外臺卒上氣門ニ
テ桑白皮湯ヲ選ミ出シ專一ニコレヲ用ユルモ
ノ五六人或大便秘結ヲ苦ムモノアレ凡聊モ下
法ヲ行ハス始終此湯ヲ用テ救フヲ得タリ其後
右ノ症ニテ脱候多キモノ五六人アリ乃本方ニ
附子ヲ加テ飲シム亦皆全ク安シ此症極急劇

症ニハ其梗槩ヲ記シ以テ参考ニ備ト云

○脚氣乾濕二症ヲ問ハス小水不利呼吸短促煩

悶スル者吳茱萸橘皮湯ヲ用ユヘシ 方水腫門ニ出

此症桑白皮湯ト大同小異アリ 診候口傳

○脚氣冲心ノ症桑白皮湯或吳茱萸橘皮湯ナト

用レ凡苦味ヲ惡テ嘔吐スルモノニハ沈香降氣

湯ヲ用ユヘシ然レ凡沈香交趾産ノ上品ニアラ

サレハ効ナシ

沈香降氣湯方

- 沈香 五分
- 縮砂 五分
- 香附子 一錢
- 甘草 五分

右水煎 不用鹽

或在ニヨリテ蘘子茯苓ヲ加

フルヲアリ此症病勢最甚シキ者ハ本方ニ
一角ノ末ヲ兼用スヘシ大抵晝夜ニ三錢ハ
カリヲ用ユヘシ大ニ奇効アリ又水氣心胸
ニ畜滯シテ利シカタク呉茱萸橘皮湯ナト
用テ益通利セサルモノニハ半夏厚朴湯加
犀角ヲ用ユヘシ又疥癬内攻ノ腫格別喘滿
スル程ニ至ラス唯腹脹シテ利水シカタキ
者ニ用テ妙ニ

○脚氣上冲死セント欲スル症桑白皮湯ニ犀角

茯苓ヲ加ヘ豁胸湯ト名ケテ用ユ其効殊ニ著シ
此症心下急迫最甚キモノハ豁胸湯ニ沈香降氣
ヲ合テ用ユ若形病凡ニ虚シテ勢ユルキモノハ
真武湯ニ呉茱萸桑白皮犀角或甘草ヲ加ヘテ用
ユ 診候口傳 右ノ二方或童便ヲ加ヘテ用ユルヲモ
アリ

○脚氣心ニ冲シ死セントスル者ヲ救フ方 外臺

檳榔 三顆末 生姜汁 三合 童子小便 二升新者不須煖

右三味攪テ頓服ス劑ノ大小臨時ニ斟酌ス

ヘシ

○脚氣痿弱ノ症附子ヲ用ユヘキ症ニシテ千金
附子湯ナトヲ用ルニ胸中一物アルカ如ク胸肋
膨脹シテ却テ快カラサル者ハ千金越婢湯ニ木
瓜檳榔ヲ加テ用ユル軟甚シキ者ハ犀角麻黃湯
ヲ用ユヘシ此症ニハ二方凡炮附子ヲ用ユヘシ

犀角麻黃湯方

犀角^{二兩} 麻黃^{二兩} 甘草^{一兩} 茯苓^{各三}
防己^{各三} 石膏^{三兩} 附子^{一兩} 木^{一兩} 芎藭^{一兩}
黃芩^{一兩} 石^{三兩} 當歸^{一兩} 生^{三分} 細^{一兩} 桂^{一兩}
防風^{二兩} 右水煎

○脚氣上冲氣急治シテ後麻痺痿弱スル者千金
附子湯ヲ用ユヘシ若氣急全ク去ラスハ檳榔
木瓜吳茱萸ノ類ヲ加ユヘシ若心下結聚久ク去
リ難キハ鼈甲ヲ加フヘシ

千金附子湯方

桂枝 芍藥^各 甘草 附子 木 茯苓^各
人參^{或代生} 姜

右水煎

○脚氣冲心治シテ後痿弱最甚シク小水不利或
腫勢少ク小腹力ナク麻痺スルモノハ味丸ヲ用

ユヘシ煎湯トナシテ用モ亦可

方水腫中ニ出

○脚氣冲心治シテ後小腹疝瘕有テ下焦ノ氣メ
クラス痿弱麻痺久ク愈サル者アリ是千金附子
湯八味丸等ノ症ニ非ス其脉腹ノ虚實ト疝瘕ト
ヲ能ク候ヒテ寄奴湯ヲ用ユヘシ若心下痞硬脇
下逆滿等ノ症ヲ兼ハ呉茱萸牡蠣乾姜ナトヲ加
フヘシ

寄奴湯方

朮 桂枝 茯苓 柴胡 劉寄奴

甘草 本無甘草今加之

右水煎

千金八所灸穴

風市 千金云令病人起正身平立垂兩臂
直下舒十指掩著兩髀便點當手中央指頭髀
大筋上是 此法ノ如クシ穴ヲトルヲ婦
女子ナトノ忌嫌フモノハ別ニ一法アリ類
經圖翼云在膝上七寸外側兩筋間此法ノ如
ク曲膝頭ヨリ七寸上ノ髀ノ大筋ノ上ニ點
スヘシ兩筋ノ間トアレ凡是ハ千金ノ通り
大筋ノ上ニ定ムヘシ

伏兔 千金云令病人累夫端坐以病人手
夫掩橫膝上夫下傍與曲膝頭齊上傍側夫際
當中央是 此法ノ如キハ即膝上三寸陰市
ノ穴之按ニ千金云陰市在膝上當伏兔上行
三寸臨膝取之ト此法ノ如シハ伏兔ノ上三
寸陰市之既ニ伏兔ヲ以テ膝上三寸ニ定メ
其レヨリ上三寸ヲ陰市ト定ムルコト明ケ
シ然ラハ臨膝取之ノ四字誤リ之甲乙經云
伏兔膝上六寸陰市膝上三寸是ヲ以テ考フ
レハ千金陰市ヲ以テ伏兔トシ伏兔ヲ以テ

陰市トシ前後相誤レル之今膝上六寸ノ法
ヲ以テ伏兔ヲ定ムレハ風市ト大抵相並之
然ラハ同シ胃經ナレハ膝上三寸陰市ニ灸
スルモ亦可ナランカ
擯鼻 千金云一云在膝頭下近外三骨箕
踵中動脚以手按之得窟解是 三里ノ穴ヨ
リ上ノ方へ押上レハ膝眼ノ下一寸ハカリ
ノ所ニ行トマル之其ユキトマリノ骨ノ下
ノクホカナル所ニ點ス

膝眼 千金云在膝頭骨下兩傍陷者宛々

中是^り足ノヒサ、ラノ下ニ兩眼ノ如ク、
ホカナル所アリ其クホカナル所ニ點ス兩
眼ノ如キ故膝眼ト云犢鼻モ形犢ノ鼻ノ如
クナルユヘ名クル之

三里 千金云、在膝頭骨節下一夫附脛骨
外是^り足ノムコウス子ノ骨ノ外ノ方ヨリ
押上レハ膝眼ノ下三寸ハカリノ所ニテ行
トマル之其ユキトマリノ骨ノ下ノクホカ
ナル所ニ點ス又一法大指次指ヲ以テ膝ヲ
圍ミ中指ノ當ル所ヲ穴トス

上廉 千金云、在三里下一夫亦附脛骨外
是^り三里ノ下三寸之三里ヨリ斜ニ脛骨ニ

ヨセテ附クヘシ

下廉 千金云、在上廉下一夫 上廉ノ直

下三寸之脛骨ニヨセテ附クヘシ

絶骨 千金云、在脚外踝上一夫亦云、四寸

是^り外踝上四寸トイフモノヨシ外踝ノ上

カトヨリ押上レハ骨ノタユルトコロアリ

其骨ノタエメヲ少ハキホ子ノ方ヘヨセテ

點ス

凡足部ノ穴ヲトル寸法ハ三里ヨリ解谿ニ
至テ折テ一尺一寸トスルヲ用ユヘシ千金
ニハ同身寸ヲ用ユレ凡足ハ足ノ寸ヲ以テ
量ルヘキトシ
右八所ノウチ犢鼻膝眼ナトノ一穴ヲ去テ
三陰交ヲ加フルモ亦ヨシ三陰交ハ内踝上
三寸骨ニツウテ附クヘシ此灸痿弱等ノ症
大ニ驗アリ一穴ニ五十壯毎日灸スヘシ然
レ凡腫滿或上冲ノ氣味アリテ虚候多キモ
ノ八宜カラス右ノ症去テ後唯脚弱又ハ膝

骨弛緩等ノモノ灸スヘシ腫滿上冲ノ氣味
アルモ實症ナラハ灸シテヨシ

○風毒亦脚氣ノ類之然レ凡此病實症多クシテ
虚症スクナシ其症脚腫或焮痛スルモアリ輕キ
者ハ檳蘇散熱氣カロク焮痛忍フヘカラス或皮
膚赤ク色ツキテ皮破レテ水モレント欲スルヤ
ウナルハ當歸拈痛湯ヲ用ユヘシ熱氣甚シク痛
モ准シテ甚シキ者ニハ越婢加朮湯ニ木瓜檳榔
ヲ加テ用ユヘシ此藥ニテ痛去リ難キ者ニハ

大黃一匁

黑牽牛一匁

甘遂五分

右三味ヲ糊ニテ

丸レ毎夜一錢ツ、兼用スヘシ若脉症脱候アル者ニハ千金越婢湯ニ木瓜檳榔ヲ加テ用ユ此症ニハ下劑ヲ用ユヘカラス或桂枝附子湯ナト用ユルノ症モアリ能ク三候六診ヲ審ニスヘシ

當歸拈痛湯方

羌活 當歸 猪苓 知母 白朮 澤瀉

人參 隨症加減 苦參 升麻 葛根 防風 蒼朮

茵陳 黃芩 甘草

右水煎

實症ノ風毒硬腫シテ屈伸スヘカラス其痛咬

カ如クニシテ忍フヘカラス日夜號泣スルモノ禹功散ヲ用ユヘシ

禹功散方

黑牽牛 炒末五十目 小茴香 十枚

右爲末和勻シ熱酒ヲ以テ送下スル一錢日ニ五六次頻ニ快下利ヲ得ルトキハ愈ユ凡一晝夜ニ五六錢ヲ用ユヘシ然ラサレハ効ナシ予屢試ルニ風毒ノ腫痛ハ牽牛ヲ以テ下スヲ上トス他藥ニテ快下ヲ得ルコトアレ其効牽牛ノ如ク速ナラス

○風毒ハ脚氣ノ類タリトイヘ凡唯水氣手足關節肌肉ノ間ニ凝滯シテ痛ヲナスハカリニテ脚氣ノ如ク冲心ノ患ナシ故風毒ハ病淺シテ治ヲナシ易シ然レ凡性ニ脚氣ニ風毒ヲ兼タル症アリ此症單ニ風毒ノ治ヲ施シ却テ人ヲ誤ルコトアリ心ヲ用テ診候スヘシ治法口傳アリ

藥品說

朮 脾氣ノ虚ヲ主トスルハ白朮ヲ用
七利水除濕行氣ヲ主トスルハ蒼朮ヲ用ユ

橘皮

脾氣ヲ和シ行ラスハ陳皮ヲ用ヒ
鬱氣ヲ快クシ行ラスハ青皮ヲ用ユ

劉寄奴

本草家シ切草ヲアツルノ說アリ
又ハンコン草秋ノキリン草ヲ劉寄奴ニアテオトキリ草ヲ小連莖ニアツルノ說アリイツレカ是ナルヲ知ラスコレヲ試ルニシ切草効アリ故シ切草ヲ用ユ

導水瑣言

皇都書肆

含章齋藏



導水瑣言 畢

文化四年丁卯十二月

皇都

書肆

林喜兵衛發行

國手喧々孰是信
供言一匙紙回春
由來錫々無辨得
壽命來生世上人