



扶  
歌  
蘭  
土  
神  
經  
熱  
論  
全

武  
580



門 武 9  
稀 80  
卷



扶歌蘭土神經熱論

一千八百九十年

坪井信道譯稿



一千八百六六年ヨリ一千八百七二年ニ至ル  
マテ河口イセ<sub>地名</sub>ニ於テ流行セル神經熱ヲ  
論ス

一千八百六六年ノ秋ヨリ一千八百七二年ノ春  
ニ至ルマテ獨乙都蘭土ノ北邊戰爭流乱セ  
シ諸地ニ於テ惡性ニメ傳染シ易キ神經熱  
流行セリ此病從古軍役ノ常病ニメ古人是  
レヲ疫ト稱シ又中コ口此ヲ言テ腐敗熱ト  
シ後遂ニ改メ定メテ神經熱トス

武烈乾曰此热病近時他ノ热病比スレハ此  
ヲ患フル者甚タ多ク其忘モ亦殊ニ暴屬十  
リ是レ人々共ニ識ル所ナリ然ルニ世医其  
神至热ト名クル所以ンノ真意ヲ知ラズ卒  
カニ謬リ認メテ他ノ热病トス○且ツ他ノ  
热病ニ在テ神至ニ関涉スル一個ノ傍忘十  
ル者ト所謂正神至ニ関涉スル一個ノ傍忘  
ナレ者ハ諸热病中種々ノ原由アリテ卒然  
トノ傍忘シ、又能ク諸般ノ热病状ヲ為ス然  
凡決メ之ヲ称メ神至热トスルヲ得ス○

此忘當ニ他ノ热忘ニ由テ卒然トノ誘発セ  
ラル・ノミナラス、其受病ノ始メヨリ一般  
不二ノ起原アリテ發作スル者ノ如ク相混  
結メ此ヲ患フル者アリ然凡亦能ク定メテ  
其神至ニ関涉スル一個ノ傍忘ナルヲ知ル  
可キナリ○今本編ニ於テ生力大ニ衰弊セ  
ル諸忘ヲ掲ケテ正神至热ノ標的ヲ説示シ  
其彼此混同メ辨シ易カラサル者ヲ區別ス、  
学者宜ク細カニ此両証ヲ辨別メ其治術上  
ニ於テ亦少ス是レカ分界ヲ為サ、ル可カ

ラサルナリ〇名醫カレ一七七八年  
著スル所ノリユジニシタペイレトヒキアノ勇三百三  
葉「ブリスアタタ」ノ條ニ於テ説示スル所亦  
能ク本編示ス所ノ如ク此ヲ區別ス且ツ其  
説多ク医家ノ規則ト為ス可キトナリ  
或ハ久ク飢渴ヲ忍ビ或ハ不食ノ物ヲ飲食  
シ或ハ心思危懼精神疲勞シ或ハ群居雜沓  
シ或ハ風寒ニ曝露スル等ノ事軍中共ニ免  
ムレサル所ニ殊ニ冬日曠野ニ陣スル氏  
ハ常ニ患フル所ナリ〇余此凶厄ノ際其諸

良

△京  
將  
地ニ在テ治ラ施ス<sup>ス</sup>無慮テ六月凡ソ吾邦  
人徭役賤卒ヨリ上ニ軍中ニ至ルマテ免ル  
、者アル<sup>ト</sup>ナク皆此病ニ罹レリ  
余右ノ諸患者ニ由テ此ノ危極ニノ忘候繁  
茂ナル神至<sup>テ</sup>執ラ試驗スル<sup>ト</sup>得一ハ病人  
至重ナルニ由テ大ニ思念ヲ加ヘ一ハ吾身  
ノ官事ニ関セザルヲ以テ心ヲ斯治ニ委ヌ  
ルニ妨ケ無ク之ニ由テ學術進歩スル<sup>ト</sup>有  
ル<sup>ト</sup>得タリ且ツ余此ヲ以テ自ラ任トス  
乃チ自ラ述ル所ノ考按ヲ以テ茲ニ公ニス

是レ予カ一人ノミナラス他人ニ於テモ利  
益アラニヲラ思ヘハナリ是レ予カ九年前  
ニ在テ録スル所ノ日記及ヒ其別記スル所  
ノ神至熱療法ノ書ニ於テ宜シク之ヲ以テ  
其ノ附録ト為スヘキカ如シ武烈乾曰其書  
ヲ名ケテ神至熱及ヒ神至熱類症經驗ノ書  
ト云フ即チ良医「コレ」カ記スル所ニ之  
ニ加フルニ大學生「コレ」有益ノ序文ヲ以  
テスル者ナリ書肆ニ就ヒテ之ヲ得ヘシ  
右ノ譯書ハ書ヲ得サル人ニ在テ甚緊要ト

△原

ス、且ツ人今予カ記スル所即本編ヲ讀ム者  
古ノ至驗書ヲ讀マサル可カラヌ又右ノ經  
驗書ヲ讀ム原書者ハ本編ニ照サ、ル可カ  
ラサルナリ  
上章ニ説示セル尋常起因ノ外尚吾邦ノ役  
衆ニ於テ又一ニノ病因アリ即チ遠土ニ戰  
争ノ身心殊ニ疲倦シ日夜百般ノ事為共ニ  
其常節ヲ失ヒ且ツ故國ノ父世妻子ノ輩ヲ  
念々トノ思想シ殊ニ南人未夕曾テ慣レサ  
ル北海ノ殺氣ニ凌屬セラレ其地ニ生長土

看セル人ヨリハ此病ヲ受クルト甚ク多ク、  
且ツ其症モ亦暴厲ナリ○嘗ニ此病ノミナ  
ラス、凡一州一國ニ在テ常時流行セル諸病  
旅客此ニ感スルト殊ニ甚シ  
神至熱ノ行ハル々必ス秋ヨリ初冬ニ向ヒ  
其人先ツ下利ス○蓋シ此時ニ方テ天時漸  
ク寒冷、且ツ異國ニ在テ異物ヲ飲食シ、或ハ  
地方ニヨリテハ水性殊ニ其軀ニ適セス、此  
病ニ罹ルト實ニ已ムベカラサル者ノ如シ  
○患者大率諸症發見スルニ先ツテ八日或

ハ十四日餘ヲ續テ下利ヲ患フ蓋シ下利神  
至熱中第一ノ症候ニメ其毒一部ヲ區畫シ  
内外百凡ノ患害共ニ此ヨリ蜂起ス○諸液  
ノ惡性ニ變スルヨリノ毒ニ其至軀甚ク疲  
倦スルノミナラス其腸ノ一部ニ在テ衰弱  
殊ニ甚シトス○且ツ其下利荏苒トメ止マ  
サルヲ以テ全軀彌々疲倦シ漸ク危殆ニ向  
ヒ疫毒盤潛セル部分及ヒ諸症發動スル處  
ニ在テ惡候交々見ハル醫者須ク諸症中ニ  
於テ施療第一ノ部分ヲ察シ其終リニ至ル

マテ忽ニスベカラサルナリ○其始ノ下利  
ヲ祭セシ時ニ於テ速カニ之ヲ防止シ其後  
多時腸胃ヲ健運スルノ劑ヲ服スルハ則  
チ幸ニメ此病ニ罹ラサルヲ得ベシ○季  
冬ニ至テハ神至熱ヲ患フル者アリト雖モ  
下利ヲ重ヌル者ハ稀ナリ  
余カ<sup>カ</sup>日<sup>上</sup>歴視スル所ヲ以テスルニ凡ソ小兒及  
ヒ少年多血ニメ身体衝動シ易キ人ハ此病  
ニ罹ルナリ四十以上ノ人ヨリ多ク且ツ危篤  
ニ至リ易シ其理自ラ明カナリハ兒及ニ收

年ノ身体ニ在テハ其溫暖固ヨリ甚シク殊  
ニ物ニ觸レテ激祭シ易シ其故ニ其衰弱モ  
亦速ニメ諸器頓ニ機轉ヲ失ヒ下利ヲ得ル  
ナリ劇シケレハナリ  
患者大卒諸症祭作スルニ先ツテ身体久シ  
ク疲勞ヲ覺ヘ尋テ食ヲ欲セズ昏冒微ニ祭  
熱ス然レ或ハ是等ノ前兆アルナリ無ク諸症  
直チニ祭作スル者アリ殊ニ季冬ヨリ春ニ  
向テハ健康全滿ノ人ニ於テ卒然トメ此病  
ヲ祭スルナリ多シ○又一症患者ニ接スルナリ



僅ニ瞬間ニノ直千ニ傳染發作スル者アリ  
亦此類ナリ○曾テ記ス一瘍医尚少年ニノ  
甚夕多慾ナル者一日一患者ノ神至熱ニ卧  
セル者ヲ訪フニ其室密閉ノ過温戸牖新氣  
ヲ通スルヲ無ク汚穢腐敗ノ氣室内ニ充テ  
リ瘍医未夕其室ヲ出サルニ己ニ惡心戰栗  
ヲ發シ衆ニ帰ルノ後病勢漸ク増劇シ三日  
ヲ出ヅノ最暴厲危篤ノ神至熱ヲ以テ死セ  
リ是レ向キニ惡心戰栗ヲ覺レシ時方ニ其  
毒ヲ傳染セシナリ

其初ノ大抵聖京健壯ノ状ノ如ク往來寒熱  
シテ支節疼痛ス○此ニ尋テ疲倦甚シク下  
利虚脱頭痛壓ス力如シ此時ニ於テ医者須  
ク其隱伏セル邪毒ヲ尋究精察スルニ  
患者初起ニ在テハ固ヨリ難忘モ無ク真ニ  
輕易ナルカ如ク然リ此時ニ方テ患者風寒  
ヲ避ケス摸生ヲ慎マズ竟ニ自ラ惡性ヲ招  
ク○乃チ神思困重ノ頭痛忍フ可カラズ  
熱中標的 肌熱増進脈動疾數或ハ次序ナク小便  
壅滯或ハ稠厚ナリ○又顛振譫語擊掌目明

ラ恐ニ音響甚ク耳ニ通徹シ易ク且ツ其間  
下利ヲ患フ○以上諸症尚是レ病未タ最級  
ニ至ラサルノ微トス○若其己ニ最級ニ至  
ル者ハ下利益甚ク重墜努責腹中凡氣ヲ生  
シ下躰痠痛メ休マズ或ハ是等ノ諸症自ラ  
静止シ更變メ朦昧瘧瘵撮空摸床ヲ癡シ輕  
音微光ト雖耳目之レニ堪ヘズ或ハ忽チ  
痰ノ面耳聞ク所ナク目明處ヲ愛シ或ハ昏  
睡メ知ル所ナク支躰虛憊スルト甚ク脈細  
ニメ數一「百二十分」止時ノ一人間一百四十動ヲ

得ルニ至ル尋テ呃逆ヲ癡シ吐セント欲メ  
吐セハ小便難澀或ハ淋瀝或ハ粘汗此汗ヲ得ルニ由テ身體  
瘦削ス或ハ疫疹ヲ癡シ或ハ衄血便血或ハ大  
便自利舌胎乾黑尿尿汗唾共ニ腐敗メ惡臭  
ヲ為シ此數ハ臭ニ腐敗ノ微候ヲ説下ス異常ノ口眼喎斜ヲ為ス  
必ス此ヲ以テ定テ危極ノ候トシ又此症ノ  
退クヲ以テ治愈ス可キノ確微トス  
○余此熱病ニ於テ三等ノ階級ヲ別ツ○患  
者未タ譫語セサル者ヲ以テ第一等トシ已  
譫語ヲ癡スル者ヲ以テ第二等トシ諸腐敗

ノ微候ヲ顯ハスヲ以テ第三等トス  
諸忘ヲ童子具フル神至熱ニ在テハ大抵三  
物<sup>キ</sup>基ヲ歴ルニ非サレハ病勢省除スルヲ無  
シ○第一等ノ症ニ於テハ其善候ヲ得ルヲ  
稍速カナリ然レ若シ右ノ日數ヲ歴ルマテ  
遷延トメ警留シ且ツ他ノ諸般ノ忘候ヲ察  
シ其脈狀ニ至ルマテ已ニ其自然ニ及スル  
片ハ其小便必ス稠濁ノ質ヲ為ス是レ此病  
固有ノ尿トス○第<sup>ニ</sup>三等ノ症ニ在テハ暴厲  
危劇ノ諸忘少シモ有除スルヲ無ク右ノ日

數ニ至ル蓋シ此時ヲ以テ死生ノ界國トス  
故ニ右ノ日數ヲ歴レハ則チ幸ニ人其死ヲ  
免カル可キナリ○右ノ時日ヲ過クルノ后  
ハ假令ヒ患者執謔語、瘥様ノ運動及ヒ極メ  
テ甚シキ脱カラ持久シ其治愈屢甚々延滞  
シ且勤モスレハ病再發復セシトスルノ恐  
レ有リト雖レ諸忘<sup>キ</sup>次才ニ退除メ危峻漸ク  
陵夷スルヲ得ルナリ○若シ第<sup>ニ</sup>三等ノ症  
ニ罹リシ者ハ八物<sup>キ</sup>基ヲ歴ルノ後ト雖レ其  
脚以テ起立スルニ堪ハス且ツ此ノ拳動ト

雖氏即于眩暈ヲ祭ス○其諸症全ク退キ生  
力回復スルニ至ルマテハ其速ナル者ト雖  
氏三月ヲ歴ルニ非サレハ其手全ク得ル  
無シ是レ其暴厲ニノ危懼スヘキ也其自  
然妙用ノ部分ニ涵染スレハナリ○或ハ神  
至熱既ニ治ラ得ルノ後謔語久シク休マサ  
ル者アリ○又治後尋ヒテ頑強難治ノ狂病  
ヲ祭スル者アリ○是レ病中屢々辱中ヲ逃  
レ出テ、或ハ水中ニ坐セシ者ニ於テアル  
トヲ見タリ

患者神思朦昧昏惑躰中各部不仁シ其他卒  
中ノ諸症ヲ祭スル者ハ其死近キニ在リ此  
三症茅十一日茅十二日茅十八日等ニ於テ  
余嘗テ歴視セリ  
病勢進退ヲ剛リ生命ノ存亡ヲ決スルハ其  
脈狀ヲ診スルニ如クハ無シ殊ニ搏動ノ後  
急ト其數ノ衆寡トニ由ル○病勢深キト一  
等十レハ脈動ノ急疾十レト亦一等動數殊  
々多ケレハ病強々危フシ

自註  
セミオナリノ字ニ由テ具サニ之レヲ區別

スルニ所謂動類ノ多キ者ハ心蔵頻リニ  
 收縮ノ動脈ノ搏動之ニ隨テ頻數ナル十  
 リ○所謂脈動急疾ト稱スル者ハ動脈十  
 分開張スルヲ得ヌメ復速ニ開縮スル  
 ナリ其甚シキ至テハ脈管頻リニ開縮ス  
 ルカ故ニ心蔵ヨリ攷々トメ輸ニ来ル血  
 ヲ以テ速ニ之ヲ開張スルヲ能ハス故ニ  
 脈動少時休止スル者アリ○故ニ其急疾  
 ナルハ其原由動脈ニ在リ其數ノ衆多十  
 ルハ其原由心蔵ニ在リカテ醫學ニ於テ區

別スルモ亦此ノ如シ○故ニ搏動益々急  
 疾ニメ其數益々多キ者ハ病最級ニ至ル  
 ノ徴ナリ武梨乾曰ク在ノ説者動モスレ  
 ハ此ニ般ノ區別ヲ為スヲ能ハス且ツ本  
 編説示スル所ノ如キモ必竟差別十キコ  
 トニ草々ニ省過スル者アリ○搏動急疾  
 ト稱スル者ハ脈管ノ一分メヨリ一縮ス  
 ルニ至ルマテノ甚夕短促ナルヲ言フ、即  
 十搏動遲緩ノ反ナリ○又動數衆多ト稱  
 スル者ハ之ヲ診スルニ某ノ刻ヨリ某ノ

刻ニ至ルマテニ其數甚々多キ者ヲ言フ  
即チ動數寡ヤト相反對ス  
病勢ト脈狀ノ常ニ相契合スルヲ此ノ如シ  
若シ其脈動天稟ノ常度ニ過キサルハ假  
令ヒ他ノ危懼スベキ諸症ヲ發見スト雖氏  
固ヨリ生命ヲ損スルヲ無シ又脈動急疾十  
ル患者ニ於テ其動數ノ減スルハ諸惡症ノ  
漸ク靜止ノ病將サニ退カントスルノ良候  
ナリ○又心藏ノ強弱血質ノ良否及ヒ全軀  
ノ生カ意識ノ盛衰ヲ則リ知ルヘキト共ニ

此ニ在リ○内外諸症ノ變化モ之ヲ以テ前  
知ス可シ○只是レ一茶頃ト雖モ脈伏變易  
スルヲ有リ宜シク受病ノ始ノ一診ノヨリ  
病全ク愈ルニ至ルマテ細思ノ精察ス可シ  
○其齊シカラサルヲ一緩一急一弱一強一  
動一變シテ絶ヘテ定格十キ者アリ  
熱毒惡厲ナル者ニ在テハ毎日兩回病勢増  
激スルヲ有リテ前或ハ正午ニ於テ一發シ  
日晡或ハ半夜ニ至テ再發ス  
尿ハ病初起スルノ日ヨリ其終リニ至ルマ

テ膠ヲ水中ニ溶化セル者ノ如シ病殊々危  
萬十レハ尿質殊々稠濃ナリ○其甚ク凶惡  
ナル者ニ至テハ尿色麥酒ノ如ク且ツ一指  
横徑ノ白色ナル塗渣有リテ此ニ加フルニ  
膠ヲ以テスルカ如シ○若シ病凶惡ナル者ニ  
於テ忽然トメ尿色清澄ニ變スル寸ハ則チ  
播擲謔妄ノ前兆トス○若シ尿色續テ澄ニ  
来リ塗渣稀薄ヲ為シ其終リニ至リ上邊全  
ク堂徽ニメ佛手相色ノ如ク其器底ニ於テ  
純白ニメ他物ヲ混セサル些ノ滓脚ヲ留ム

ル者ハ其病將サニ故ニ復セントスルノ徵  
ナリ○ヒポクラテス曾曰フ瘀物尿ノ上面ヨリ  
倒懸シ下方ニ向テ漸ク弥蔓シ終リテ半空  
ニ為シ瓶底ニ至テハ穢翳ヲ見サルハ必死  
ノ候ナリ○一患者將サニ退カントスル寸  
ニ至リ其尿全跡澄清メクレインセウニノ状ノ如  
ク中ニ水晶赤状ノ微細ノ物ヲ含蓄シ瓶底  
ニ至テ細葉形及ヒ纖維形ノ物アリクレインノ名  
嘗テ言ヘルナリ曰ク此ノ如キ者ハ必甚  
夕經久メ治シ難シト果メ此患者其後遷延

スル一ニ七日ニ及ヘリ  
患者動モスレハ小便難澁或ハ淋瀝ヲ苦シ  
ム又小便全ク閉止メ消滴モ通セサル者アリ  
是其部ノ甚ク掣奪シ易キヲ以テナリ  
一身振々トノ顛振レ撮空擲床ヲ為ス者ハ  
危極ノ候ニメ其死遠カラストス  
舌本不遂ノ分明ニ尔的等ノ舌音ノ語ヲ為  
ス一能ハス其言辭弁曉ス可カラサル者ハ  
死候トス○此症熱病初起ノ日ニ在テ經千  
ニ之ヲ患フル者アリ是レ病ヲ受ケテ未タ

久シカラスト雖凡其毒已ニ酷惡ナルノ微  
ナリ○是レ其強暴ナル邪力方サニ裡面諸  
部神機妙用ノ処ニ内攻シ此一部ノ不遂將  
サニ及サントス實ニ一大危篤ノ徵ナリ  
患者屢々乾嘔シ因テ遂ニ其服スル所ノ飲  
食茶液等ヲ吐出スル者アリ是レ亦危極ト  
知ル可シ○耳ノ聾スルハ必ス良候トス若  
シ久シク聾スル寸ハ益々佳ナリ若シ發ハ  
クモ有ラスメ衰化シ聰器却テ聰ニ過キ聲  
音甚ク通徹シ易キ者ハ其病増進スルノ候



十リ

患者多クハ受病后芽三物基ニ至テ血質ヲ  
淨除スル良性ノ輕款ヲ發ス是ニ由テ病毒  
ヲ分離シ治ラノ速ナラシム

一患者危篤諸症ノ患フルノ右ノ時日ニ  
至テ續テ吐涎ヲ得ルヲ由七日其治モ甚夕  
遷引セリ然氏此人吐涎ヲ得ルニ非スハ  
殆ント起ツテ能ハサリキ○又患者多ハ諸  
症退カントスル時ニ方テ周身發汗ヲ得是  
ニ由テ甚夕輕快ヲ覺テ總テ此汗ヲ得ルノ

患者ハ大ニ其治ヲ速ニス○或ハ危篤ノ患  
者芽四物基芽五物基ニ至テ周身膿熱セル  
小疹ヲ發出セル者アリ  
其治法ニ至テハ細カニ其病度ヲ測リ腸部  
ノ甚夕衰弱ノ屢々下利セントスルニ意ヲ  
用ヒ十分精良ナル揮發衝動ノ藥ヲ以テ患  
者ノ生カヲ維持シ挽回スルニ在リ  
凡ソ此病ニ<sup>的</sup>當ニ能ク其効ヲ收ムヘキ者ハ  
揮發衝動ノ功アル諸品ノ外絶テ之レ有ル  
テ益シ是ニ反シテ引クス止及ヒ其他此ノ

如キ類ニメ其實堅硬ニメ固收ノ功アル強  
壯藥ハ其切ヲ奏スルヲ無ク且ツ此神經熱  
ニ在テハ是等ノ品ヲ共ヘテ治愈ヲ得可キ  
輕易層淺ノ症アルヲ無シ、凡ソ此病ノ發症  
ハ下利煩悶胃中困難脈動急疾一身甚々虚  
憊スル等ナリ○此ノ如キ諸症ハ腸ノ衰弱  
ヨリ来ルヲ明カナリ然ルニ今固收ノ功アル  
諸品ヲ共フル寸ハ其物躰中堅硬ナル部  
分其衰弱セル腸中ニ入テ全ク消化スルヲ  
能ハス其志在モ輕易ニメ下利ナク又能ク

飲食消化スル者ト雖凡尚且ツコレト云フ  
服ノ屢凶惡ニ進ミシ者ヲ見ル若シ之レヲ  
服スル寸ハ熱増劇煩悶甚シキ衰弱眩暈等  
ヲ起因ス○此ニ於テ余此強壯藥ヲ服メ却  
テ此衰弱ヲ將來スル所以ニノ理ヲ究ムル  
ニ甚々分明ニメ通曉シ易キヲノ論ナリ  
蓋シ衰弱ニ二種アリ即チ真ノ衰弱ナル者  
ト真ノ衰弱ニ非ル者トナリ所謂真ノ衰弱  
ナル者ハ唯是レ精力虚脱スルヲ甚シキヨ  
リ起因スル神至熱ニメ躰中病毒ノ盤潛ス

ル下有ラサル者ナリ此ノ如キ症ニ在テハ  
其病最モ危篤ナル者ト雖モ可キナラズトシテ  
ヘテ実ニ能ク其効ヲ收ム可キナリ然レ本  
編説ク所ノ神至極中ノ衰弱ハ真ノ衰弱ニ  
非スメ其身軀曾テ感受セル邪毒内藏ニ潛  
代シ恣ニ剽掠剝奪スル力故ニ軀中自然ノ  
良能其毒ヲ驅除セント欲メ之レト相攻伐  
スルニ由テ起ルノ衰弱ナリ此衰弱ニ在テ  
ハ假令ヒ其人病ヲ氣中ノ邪毒ヲ受クルモ  
或ハ然ラズメ之ヲ他人ニ傳深メ祭スルモ

一ニ皆揮發衝動スル諸菜ノ功カラ以テ其  
軀中自然ノ良能ノ執勢ヲ憤祭メ將ニ其毒  
ヲ驅除セント欲スル者ヲ佐クルニ非レハ  
其生カラ補益シ身軀ヲ故ニ復セシムル  
能ハス○故ニ邪毒精カラ抑壓スルト甚シ  
キニ非スメ其衰弱虚脱殊ニ甚シキ者強壯  
菜ヲ的當トス是ヲ用ヒテ特ト能ク精カラ  
補益スルノコトナラズ亦能ク其將ニ麻痺不  
遂セントスル者ヲ預防スベシ○今マ此執  
病ニ於テ誤テ可キ事トシテ等ノ品ヲ共フル寸

ハ之ニ由テ及テ生カノ將サニ憤發セント  
スル者ヲ淡滯セシメ重子テ一層ノ衰弱ヲ  
起因ス故ニ神至熱ニ於テ能ク其生カヲ補  
益シ身軀ヲメ其故ニ復セシムル者ハ揮發  
衝動藥ノ外絶テ之レ有ラサルナリ是レ揮  
發衝動ノ藥ハ特リ其生カヲ補益スルノ  
ナラス又能ク邪毒ノ性ヲメ輕拳消散シ易  
カラシムレハナリヨルウバストレ及ヒ其他ノ如  
キ類ニメ其性固收セル諸藥ハ毒ニ邪毒ヲ  
驅除スルヲ能ハサルノニナラス又隨テ其

レヲノ凝泣メ益々固カラシム故ニ其毒慢  
然トメ軀中ニ淹留シ弥々身軀ヲ凌厲シ生  
カラ阻遏スルナリ  
痲初起スルノ日或ハ其第一等ノ者ニ在テ  
ハハレリアナノ色侵ニアルモニウム、アゼキキム  
ホマニ人ノ止痛液少計ヲ和シ十二時ニ手錢  
ヲ典へ接骨木花泡劑下倣之ニ蒲桃酒ヲ和  
シ温服安卧セシム是レ余カ平日施用スル  
所ノ方法ナリ然レ氏此アルモニウム、アゼキキムヲ用ヒ  
ント欲セハ宜ク用意スヘキナリ有リ患者之

ニ由テ動モスレハ下利ヲ發ス、若シ然ル寸  
ハ亘ク速ニ之ヲ服スルヲ止ム可シ  
第ニ等ノ志ニ在テハ、纈草及ヒ止痛液ヲ増  
倍シ之ニ加フルニ「セルペンタリ」ヲ以テシ、蒲桃  
酒ノ服最モ六、亘ク初ヨリハ多カルヘシ外  
用ニハ白及子ノ毬布ヲ以テシ、或ハ芳香精  
烈ナル藥液ヲ以テ之ヲ洗浴セシム可シ  
第ニ等ノ志ニ在テハ尚多クノ揮發衝動藥  
ヲ集收シ其方カラソ敏峻ニメ其病度ニ敵  
セシメスハアラサルナリ、若シ然ラサル寸

ハ其將ニ殄滅セントスルノ生火ヲ維持挽  
回スルヲ能ハサルナリ○然レ唯此敏峻十  
ル諸藥ヲ集收スルノミヲ以テ其治術上ニ  
於テ是レリトスル非ス、尚細思メ他藥ヲ配  
合シ他方ヲ互用シ其生新活發ナル衝動カ  
ト其一種別性ノ良功トヲ以テ患者ヲメ一  
藥ニ慣レテ終ニ其功效ヲ得サルノ患ヒ十  
カラシム可シ、且ツ其法方ヲ処スルノ部分  
モ六、亘ニ身軀中一部分ニノミ於テセス、亘  
ク内外諸部ニ於テ屢々其処ヲ移ス可シ、若

レ唯一部一器ヲ固執ノ処方紫要ノ処トシ  
久シク持重スル寸ハ其部竟ニ其藥氣ニ慣  
レテ再ヒ之ヲ以テ此ヲ衝動セシト歎スト  
雖凡復夕速カニ感覺醒悟スルト益シ故ニ  
其衝動スル藥カヲ鼓舞シテ一身百骸ニ及  
ホスト能ハサルナリ故ニ其藥性ノ各自殊  
異ナルト其功カノ強弱差等アルトニ隨テ  
其條理ヲ謬マタス相番習互用シ内外諸部  
百般較計メ后其既ニ死ニ瀕スルノ患者ヲ  
メ却テ生路ニ就カシムヘシ此ノ如クニメ

始メ却テ其術上ニ於テ足レリト謂フ可キ  
ナリ○余將ニ具サニ之ヲ説カントス  
凡ソ方劑ヲ撰ハント歎スル者患者ノ衰弱  
スルト強ニ甚シキ寸ハ其藥ノ揮發衝動ノ  
功カモ亦強々敏峻ナラサル可カラス就中  
龍腦丁香アエテルアルマホル阿芙蓉桂支  
アエテレトセオリトシテ以テ佳トシ又蒲  
桃酒ヲ以テ最良ノ藥トス○右ノ外性功稍  
々劣レル品ト云凡亦之レヲ間ハ施メ諸藥  
衝ノ功カラ永ク躰中ニ保持セシム可シ其

利

品ハ即チ額草セルペンタリアニ泥葛根等ノ類  
是ナリ蓋シ其功ニツ有リ一ハ之ニ由テ諸  
藥ノ揮發催進セルカラ永ク躰中ニ留マラ  
シム一ハ峻烈ナル諸藥ニ由テ大過ノ衝動  
ヲ起發躰中ノ生カ之レ為メニ疲倦シ危篤  
ナラントスル者ヲ防拒スルヲ得ルナリ  
阿芙蓉ハ其功捷敏峻烈ナル諸藥ノ上トス  
能ク邪毒ノ頑固ナル質ヲ揮發消散シ易  
カラシム實ニ神經熱ニ於テ殊ニ的當ノ品  
トス何者此病終始並患フル所ノ下劑及ヒ

其他腹中ノ諸患ヲ速カニ防止スルノ功ア  
ルヲ以テナリ○然レ此物此ノ如キ峻烈ナ  
ル衝動ノ功カアルヲ以テ此類ノ藥中ニ在  
テ亦殊ニ傾危ノ品トス其術精巧ニメ且ツ  
其度ヲ謹節スルニ非レハ能ク此敏峻劇烈  
ナル者ヲメ終始適宜ノ域ニ在テ患者ノ生  
カラ挑撥損害セサラシムルヲ能ハス蓋シ  
此類ノ品中ニ於テ人身ヲ殘害シ回復ス可  
カラサラシムル者ハ之レヨリ甚シキハ無  
シ○之ヲ用フルノ法第一他藥ヲ以テ基料

食

トシ阿芙蓉ヲ以テ加味ノ如クシ宛モ「スヤセ」  
イノ諸喰饌ニ於ケルカ如ク之ヲ以テ一方  
ノ鋒尖ノ如クシ其至ヤニ至利ナルヲ言フ其フル寸ハ此少  
シク阿芙蓉ヲ以テ能ク其良効ヲ奏セシム  
可シ且ツ之ヲ單用ノ其効ヲ收メントスル  
カ如キノ間ヲ濶ニメ其之ニ共フルノ分量  
ヲ多クスルハ其之ヲ用フルノ間ヲ後メテ  
其之ニ共フルノ分量ヲ少シクスルニ如ク  
ス乃チ太過ノ衝動ヲ繼發スルヲ無キヲ  
得可シ○房三、阿芙蓉ヲ用フルニ方テ次ノ

諸藥ヲ配合スル寸ハ則チソレヲノ太過ノ  
衝動ヲ起發セシメ徐々ニ生氣ヲノ醒覺セ  
シムヘシ實ニ此ヲ以テ阿芙蓉毒ヲ解スル  
ノ品トス可ナリ即チ「石」  
油ナブ「コフエ」石中亦蒲桃酒ヲ以テ最モ勝レ  
リトス○房四或ハ之ヲ用フルヲ其度ニ過  
クルヲ有リテ將ニ衝動ヲ起發セントスル  
ヲ規ヒ得ハ宜シク速カニ其服量ヲ減シ或  
ハ少時間之ヲ共フルヲ無カルヘシ○阿芙  
蓉ヲ過用メ起發スル諸症ハ即チ神思弥々



朦昧既語昏、發汗血滂解スルヨリ四肢麻痺ノ復シ  
難ク、脈動弥々細數ナル等ナリ

此の如き症候は、  
血滂解スルヨリ  
四肢麻痺ノ復シ  
難ク、脈動弥々細數ナル等ナリ  
此の如き症候は、  
血滂解スルヨリ  
四肢麻痺ノ復シ  
難ク、脈動弥々細數ナル等ナリ

首トノ仔細ニ誠々可キハ患者已ニ幾許ノ  
生カラカ復シ得ル、又ニ三日ノ前ニ在テハ  
少シノ阿芙蓉ニ由テ能ク其生氣ヲ催進シ、  
今日ニ至テハ其服量ヲ増加セサル可カラ  
スノ之ニ由テ却テ其生氣ヲ損害スルヲ有  
ラントスルヲ察セサル可カラサルナリ

**自註** 余今阿芙蓉ヲ用フルノ刺絡ヲ施ス  
ト其術甚夕近キヲ微ス、医者此兩法ヲ  
誤ラサルハ即チ其術ノ至妙ニノ極メテ  
良エタルノ確證ナリ、若シ阿芙蓉ヲ用フ

ル<sub>1</sub>甚タ多クシテ其常量ヲ超キ或ハ頻  
リニ之ヲ服セシメテ絶テ定法無キ寸ハ  
必ス故ニ復ス可カラサルノ損害ヲ起發  
シ且ツ療術進歩ノ證ヲ得ル<sub>1</sub>ナシ○固  
ヨリ罪其術ニアリテ其藥ニ在ラサルナ  
リ蓋シ阿芙蓉ノ峻効勝テ稱スヘカラズ  
然レハ刺絡モ亦殊ニ緊要ノ術トス且ツ未  
熟ナル医手ニ在リテハ損害ヲ為ス<sub>1</sub>亦  
甚タシ○此兩法此ノ如ク危懼ス可キカ  
故ニ漫リニ之ヲ施ス<sub>1</sub>無ク且ツ他藥ニ

配合セサルヘカラサルナリ○今世間ノ  
草医ヲ看ルニ「スツベル」及ヒ「リンセツト」用ヒ  
スノ之ニ代フルニ阿芙蓉ヲ以テス是レ  
人身ニ於テ何ノ功益力有ラシ、阿芙蓉ヲ  
誤用シ太過ノ衝動ヲ為ス寸ハ之ニ由テ  
其病ヲメ治シ難カラシムル<sub>1</sub>猶刺絡ヲ  
誤施メ大ニ血ノ衝動カラ奪卻スルト異  
ナル<sub>1</sub>益シ○然レハ刺絡ニ誤ル者ハ阿  
芙蓉ニ誤ル者ヨリハ治ヲ得ル<sub>1</sub>較々速  
カナリトス

**武梨乾註** 右ニ説ク所口余甚夕之ヲ信ス  
 阿芙蓉ヲ用フルヲ右ニ説ク所ノ法ニ從  
 フ寸ハ信ニ無比ノ良藥トメ可ナリ然氏  
 世間或許人カ能ク之ヲ用フルヲ周詳精  
 密ニメ誤リヲ取ルヲ無カラシム○衆医之  
 ヲ用フルヲ甚夕懇到ヲ得ル者有ルヲ無  
 シ或ハ阿芙蓉ヲ以テ精神ヲ醒覺スルノ  
 藥トスル者アリコトハ殊ニ此説ヲ主張  
 ス然レ氏余ヲ以テ之ヲ見レハ甚夕戾レ  
 ルニ似タリ動モスレハ之ニ由テ惡忘ヲ

繼發ス阿芙蓉及ヒ刺絡ハ固ヨリ碩學精  
 術ノ人ノミ能ク其樞機ヲ誤マルヲ無シ  
 トス決メ層淺ノ徒ノ闕リ知ル所ニ非サ  
 ルナリ經驗ノ説ニ云ク刺絡專ラカトス  
 キンシヲ治スル最良ノ術ナリ故ニ其病性  
 阿芙蓉ヲ以テ緊要トスル諸症ニハ絶テ  
 此ヲ施スナ<sup>亦</sup>無シ是ヲ以テ患者刺絡ヲ要  
 スル諸症ニハ阿芙蓉ヲ用フルヲ得ス  
 唯其病ノ本性ト其傍症ト共ニ阿芙蓉ヲ  
 用フ可キ者ニメ而メ後始メテ心ヲ安シ

ナ之ヲ其フ可キノミ余ヲ以テ之ヲ見ル  
ニ若シ藥性ノ血液ヲ催進スルト之ヲ疏  
寮スルトノ両能并ニ病症虛実ノ二候ヲ  
仔細ニ分別セスシテ其藥ヲ用フルヲ能  
ク其正的確ヲ慇マラサル者ハ幾ニト希ナ  
リ是レ特リ阿芙蓉刺絡ノミナラス諸藥  
皆然リ○余トクトルキリ著スル所ノ書ヲ讀  
ンテ大ニ其言ノ世医ニ過ルヲ有ルヲ見  
ル願クハ其論說ニ隨テ阿芙蓉及ヒ其他  
諸藥ノ用法ヲ誤ルヲ無カラシム所謂フ

ルアイウエゴウニ子ニ葛来ノゴウニニ勝ルト  
アリ其說ニ吸蛙及シカリヒカチニシヲ以テ峻  
烈ナル衝動薬トス近時ゴウニ子ニノ学校  
ニ於テ一瘍科即チヨウウエア子ニナリアラニ眼ノアステニセオト  
ステイキンクヲ治スルニ眼ノ周圍ニ吸蛙術  
ヲ施ス其僚友モ亦乏レニ後フ其初メ其  
僚友之レヲ拒ム此術旧トゴウニアニセノ学  
流ニ於テ見ザル所ナレバナリ然レ此術  
強キ衝動ノ効アルヲ盛ニニ称スル人  
アルニ至テ其始メ之ヲ拒ミシ者能ク理

會スルヲ得

麝香ハ此病ニ於テ固コトニ缺ク可カラサルノ品ナリ其性甚ク揮發ナレトモ阿芙蓉ノ如ク生カラ殘害スルノ恐レ無シ是故ニ患者衰弱殊ニ甚シキ時ニ在テ阿芙蓉ニ代ヘ用ヒテ恰モ好ク患者ノ生氣ヲ催進ス蓋シ其功ニツ有リ一ハ之ニ由テ能ク阿芙蓉ノ毒ヲ解シ一ハ神經熱必然ノ發症ニ的當ニメ能ク速ニ之ヲ鎮靜ス○凡ソ麝香ヲ用フヘキ諸症ハ即チ諸筋ノ動場是レ麝香ノ死三志

スハキ振掉在妄譫語腰理緊縮メ無汗ノ症并ニ胸中痙挛ヲ覺ヘ症様ノ喘急劇シキ欬嗽等ニ最モ緊要トス是レ一種別性ノ良功ナリ

龍腦ハ病勢劇盛ナル時ニ方テ六香ト同シク大効アリ能ク他藥ノ劇シキ衝動ヲ支柱シ、又能ク阿芙蓉ヲ解ス○患者脈細ニノ弱痿理解弛シ兩耳聞ク所口無ク眊ル丁多ク疲弊殊ニ甚シキ者ニ於テ此ヲ共フル寸ハ能ク一身ノ精力ヲ挽回スルノ功アリ是レ

阿芙蓉、麝香ノ共ニ及ハサル所ナリ。○然レ  
脈細ニメ、緊、脈理固密ノ汗無キモノニハ、則  
麝香ノ主トル所ナリ。龍腦ハ、則チ然ラズ。特  
リ熱勢ヲ増、發メ、脈理ヲ解弛スルノ功ナシ。  
○此物些ノ患ムヘキ氣味アリ。故ニ之ヲ過  
用スルハ、胃ニ觸レテ、嘔吐、吃逆ヲ發シ、尋  
テ眩暈ヲ起因ス。○故ニ之ヲ與フルト宜シ  
ク、少量ニメ、且ツ之ニ加フルニ、芳香ナル諸  
品、或ハ石腦油及ヒ、其他此類ノ者ヲ以テス  
ヘシ。○又外用ノ此症ニ効アリ。

アエテリセオリトシモ、亦能ク他藥ノ劇シ  
キ揮發ノ勢ヲ緩和シ、漸徐ニ其功ヲ奏セ  
シム。其功秀出セル者ニツテ、曰ク、患者非  
常ノ衰弱及ヒ、危篤ナル掣痛ニ、コレウムア  
エテレウムハ、レリアナラ、良トス。一ナリ、又  
衰弱殊ニ甚シク、遷延故ニ復シ難キ者ニ、於  
テ「アエテルトバルサム」ノ性ヲ含メル「ホフ  
マ」レノ「バルサム」ヒ、タレラ、共ハテ良効アリ  
二十ナリ。

**自註** 余此症ニ於テ「ホフマ」レノ此方大ニ

新方ニ勝レルヲ記セサル可カラサル  
ナリ

此ニ忘ニ臨テ必ス他ノ強キ揮祭衝動ノ創  
ニ加用シ其レヲノ唐突暴施スルヲ益カラ

シム

諸々亞的兒就中名物考ニ單ニ亞的兒ト稱スル者ナリ  
ナリ

偏中石腦由ト  
稱スル者ハ皆  
亞的兒ノ誤之

ヲ勝効アリトス共ニ揮祭衝動彙中ニ於テ  
殊ニ強壯ノ功効リ又能之ヲ用ヒテ阿芙蓉

毒ヲ解ス可シ

蒲桃酒ハ他藥ニ踰ヘテ峻烈ニメ且ワ能ク

長ク人ノ軀中ニ舍メ其良効ヲ奏ス余屢々  
其功跡ヲ目撃セリ上ニ列スル所ノ諸藥ヲ  
與フルヲ後々適宜ノ好蒲桃酒ヲ飲服セシ  
メ其間ニケレシヲ此フル寸ハ假令ヒ揮祭  
彙ヲ服スルヲ度ニ過クルヲ有リト雖モ此  
ニ由テ惡忘ヲ紀祭スルヲ益ク能ク良効ヲ  
奏セシム共ニ諸藥ノ及ハサル所ナリ○  
蒲桃酒ノ此忘ニ於テ殊ニ良効アル所以ニ  
ハ其性モワトモ揮祭ニメ能ク生力ヲ喚發  
シ又能ク之ヲ維持スルノ功アルヲ以テ唐

ニ身軀ヲ衝動スルノミナラス又是諸器ヲ  
ノ其平全ニ復セシメ自ラ能ク生動セシム  
レハナリ○人或ハ焼酒ヲ以テ蒲桃酒ニ代  
用シ其功効相比ス可シト是レ誤リナリ、  
焼酒ハ唯酒中ノ揮發衝動ノ功アル精氣ヲ  
含スルノミニ他ノ功カラ併セ存スル  
ヲ無シ、唯、番桃酒ハ上ニ示メスカ加ク能ク  
生カラ維持シ又諸器ヲメ其平全ニ復セシ  
ムルノ功アルヲ以テ最モ勝レリトスルナ  
リ

尚且フ巫的兒ヲ以テ蒲桃酒ト互用スルヲ  
佳トス殊ニ如醋石腦油ヲ良トス○蒲桃酒  
ハ必ス精良ニメ且フ久シキヲ歴ル者ニ宜  
シカムバク<sup>ニ</sup>ヨ<sup>ニ</sup>ゴ<sup>ニ</sup>ン<sup>ニ</sup>キ<sup>ニ</sup>セ<sup>ニ</sup>響<sup>ニ</sup>等ノ如キ唯  
其精氣ノミヲ含スル者ハ宜シカラス、當サ  
ニ醇酒ニメ<sup>ニ</sup>カ<sup>ニ</sup>ウ<sup>ニ</sup>テ、ホ<sup>ニ</sup>ク<sup>ニ</sup>イ<sup>ニ</sup>ノ<sup>ニ</sup>ル<sup>ニ</sup>ス<sup>ニ</sup>テ<sup>ニ</sup>シ<sup>ニ</sup>フ  
ラ<sup>ニ</sup>ン<sup>ニ</sup>セ<sup>ニ</sup>ウ<sup>ニ</sup>エ<sup>ニ</sup>ン<sup>ニ</sup>シ<sup>ニ</sup>酒<sup>ニ</sup>名<sup>ニ</sup>ノ類ノ如キヲ禁フヘシ  
ヲ<sup>ニ</sup>セ<sup>ニ</sup>レ<sup>ニ</sup>ス<sup>ニ</sup>ウ<sup>ニ</sup>エ<sup>ニ</sup>ン<sup>ニ</sup>シ<sup>ニ</sup>ノ精良ナル者ヲ擇ンテ此  
病ニ患フル片ハ無比ノ良効アリ能ク冒ト  
神経トヲ治ス諸医徑久難治ノ症ニ於テ常



ニ 裁ムル所ナリ ○蒲桃酒ニ 鹿角膠ヲ和シ  
テ最モ良効アリ 鹿角膠ハ 滋補ノ効アルヲ  
以テ 患者一ニ 物基ノ間他物ヲ與フルト 庶  
クノ此物ノニ 由テ生命ヲ持スルニ 足レ  
リ 且ツ是レニ 由テ大ニ 其全治ラ速カニス  
自註 蒲桃酒ヲ以テ十分ノ効ヲ得サル者  
ニ 於テハ 或ハ之ニ 代フルニ 燒酒ヲ以テ  
メ可ナリ 然レ之ニ 加フルニ 常用ノ飲液  
或ハ一ノ芳香ナル 煎湯ヲ以テメ 性味寛  
柔ナラシムヘシ

可

確砂ハ 性功敏峻ニ 殊ニ 強劇ナル 衝動藥  
ナリ 其功實ニ 阿芙蓉ニ 近シ 故ニ 此ヲ用フ  
ルト亦甚ク 謹慎ナラサル 可カラズ 動モス  
レハ之ニ 由テ太過ノ 衝動ヲ 祭シ 血液ヲ 溶  
解シ 不良ノ 祭汗ヲ 催進シ 且ツ 腐敗ヲ 起 因  
ス ○ 余之ヲ 施スト 嘗テ 一回 然レ 尋ヒテ 惡  
症ヲ 起 祭セリ ○ 以上 諸品 共ニ ソノ 十分ノ  
功效ヲ 致サレト 敬セハ 必ス 他藥ト 配合互  
用セサル 可カラサル ナリ ○ 凡ソ 遷延タル  
神至 諸疾ニ 於テ 緊要トスル 所ノ 療法ハ 亦

此熱病ニ於テ的當ノ法トス何者此症神至  
ラ以テ第一ノ患部トスレハ十リ〇神至熱  
ノ劇症ニ於テ唯一味ノ揮發藥ヲ以テ久シ  
ク連用スル中ハ、腑中諸毒ノ藥氣ヲ得テ感  
覺スヘキ者煩ニ頑鈍ト為リ又峻藥ノ諸毒  
ヲ喚發スヘキ功力モ乏ニ由テ稍クニ陵夷  
ス〇然ルニ世鑿動モスレハ一藥ヲ固執シ  
他ノ配分互用ヲ待タス漸ク其分量ヲ增加  
ノ其功効ヲ收メント欲ス故ニ或ハ之ニ由  
テ絶ヘテ其功ヲ得ル下無ク或ハ其連用ス

ル所ノ藥、阿芙蓉ノ如キ峻烈ナル揮發藥十  
ル片ハ輒予之ニ由テ驚怖スヘキ衝動ヲ起  
祭ス〇故ニ他ノ性功寬柔ナル諸品ヲ以テ  
之ト相配合互用スル片ハ、終始其藥カラメ  
生新活陰ナラシメ且ツ其興フル所ノ藥太  
夕劇烈ナラスト雖死ニ以テ其功ヲ奏スル  
ニ足レリ〇或ハ阿芙蓉ヲ過用スル下無ク  
レト欲シ或ハ阿芙蓉ニ由テ已ニ太過ノ衝  
動ヲ發セハ宜ク可ッヘ止ラ其フヘシ、此ニ由  
テ能ク其知覺ヲ新夕ニシ又其甚シキ衝動

ヲ静止ス○凡ソ諸疾殊ニ神經病ニ於テ諸ノ衝動藥ヲ施サント欲スルニ漸ク強力ノ品ヲ擇ンテ之ヲ與フルハ此ニ由テ亦必ス患者惡症ヲ継發ス何者漸ク強力ノ品ヲ擇ミ施スト雖凡其究患者必ス此ニ慣レ復夕其効ヲ得ルト無レ此ニ至テ却テ他人ノ緩柔ナル品ヲ以テ其効ヲ取ラント欲スト雖凡固ヨリ得ヘカラス故ニ已ムトヲ得ズ重子テ其最モ強力ナル品ヲ取テ又其分量ヲ増加シ此フルカ故ニ劇藥竟ニ躰中ニ雜沓

ノ必ス太過危極ノ衝動ヲ起發スレハ十リ○以上説示スル所ノ療法ニ從テ之ヲ治スルハ諸種ノ衝動藥モ各々其功ヲ立ツルトヲ得躰中諸器ノ藥氣ヲ得テ感覺スルノ機轉モ亦衰弊スルト無ク病勢危極ノ時ニ方テ藥カラメ終始適宜ノ域ニ在テ其治金ヲ速カニセシム可キナリ

**自註**此理人々日常相共ニ目撃スル所ナリ然ルニ自ラ悟ラス特リ其好事ノ心ヨリ出テ漫リニ一人ノ私言ヲ為シ強テ固

争スルハ性シム可キノ甚レキナリ○今  
 酒ヲ飲ム者アラシニ毎回同量同種ノ酒  
 ヲ飲ム寸ハ同量異種ノ酒ヲ飲ムカ如ク  
 ニ人ヲ醉ワシメス特リ酒ノミナラス九  
 ソ衝動性ノ物ヲ服セント欲スルニ多種  
 ノ品類ヲ配合スル寸ハ同ク是レ内部ヲ  
 強壯ニスル品ナレバ唯一物ヲ單服スル  
 ニ比スレハ甚タ力アリ右等ノ事件ハ実  
 ニ昭々タル常理ニモ在モ通曉シ易キ所  
 ナラスヤ○藥性種々ノ區別アルニ隨テ

此ノ如キ実理アルヲ知ル寸ハ真ニ施  
 療ノ鳴益ニノ喜フヘキノ甚レキナリ今  
 自ラ余カ論ノ私言ナラサルヲ微ス  
 且ツ之ニ由テ学識ヲ博クシ諸藥ノ用法ヲ  
 理會スルニ足レリ豈ニ永世不易ノ定論ナ  
 ラスヤ○余此邪疫流行ノ時ニ方テ右ノ議  
 論ヲ立ツ余カ此病ニ於テ良効ヲ得シ一  
 皆茲ニ由レリ○如何ゾ此術アルニ非スノ  
 此ノ如ク遷延持久ノ三物<sup>症</sup>基間モ症候危劇  
 ナル患者ニ於テ此ノ猛烈敏峻ナル諸藥ヲ

メ太過ノ衝動ヲ起発スルヲ無ク終始一定ノ度ニ在ラシムルヲ得ニヤ○諸々ノ衝動藥ヲ用フルニ二般ノ法アリ即チ配合ト互用トナリ○配合トハ假令ハ龍腦片香阿芙蓉ヲ合シ或ハ竜腦續中油ホフマンス、バ<sup>ル</sup>サム、アエラ<sup>ル</sup>以テ合劑ト爲スカ如キ是ナリ一ハ之ニ由テ其衝動ノカラ逞フニ且ツ其レヲ久シク射中ニ舍止ス可カラシメ一ハ之ニ由テ各味一種ノ偏性ノ人身ヲ損害ス可キ者ヲ調和ス<sup>〇</sup>互用トハ諸種人

衝動藥ヲ絶ス相番替ニ用フルヲ云フ甚<sup>ク</sup>症<sup>々</sup>々危<sup>ク</sup>萬<sup>ク</sup>ナレハ其諸藥ヲ番替スルヲ<sup>〇</sup>弥々<sup>ク</sup>促<sup>ス</sup>カ<sup>ナ</sup>ラサ<sup>ル</sup>可カラサ<sup>ル</sup>ナリ其虚<sup>ニ</sup>憊<sup>ス</sup>スルコト最モ甚<sup>ク</sup>シキ者ニ至テハ一時ノ間藥ヲ換フルヲ八度或ハ尚此ヲ以テ濶ナリトス此ノ絶ヘス生新ナル衝動カニ由テ其頻<sup>ニ</sup>リニ<sup>〇</sup>沉没スル生カラ喚<sup>ル</sup>發スルニ在リ一ハ其藥ヲ換ヘ一ハ其用法ヲ易ヘ一ハ其施<sup>ス</sup>療<sup>ス</sup>ノ部分ヲ移ス此ノ如<sup>ク</sup>初<sup>メ</sup>后<sup>ニ</sup>始<sup>メ</sup>テ其衝動セ<sup>ル</sup>藥カラメ終<sup>リ</sup>ニ至ルマテ陵<sup>ス</sup>夷<sup>ス</sup>スルヲ無

ラシム可キナリ○毒ニ製煉純粹ノ品ノミ  
ナラス允リ衝動ノ効ナル諸藥ハ必ス之ヲ  
用ヒサル可カラサルナリ之ニ由テ相互用  
シテ藥力倍々生新ナラレテ要ス○允ソ  
新氣ヲ適シ衣被ヲ換ヘ味尊ヲ移シ看護ノ  
人ヲ替フル等其他心ヲ轉思ヒテ移ス可キ  
ノ事件共ニ互用法ニ充ツ唯之ヲ行フテ謹  
慎ニノ誤ヲ取ルテ無ラシテテ欲スルノミ  
或ハ快士ヲメ患者ノ前ニ在テ錯談新話ヲ  
為サシメ此ニ由テ六大ニ生カラ誘發スル

△癆

ナ有リ○患者看シ嬰兒ナル寸ハ屢々俳笑  
軟語ヲ為シ又此ヲ抱持メ其身軀ヲノ終始  
適宜ノ運動ヲ得セシメ之ヲ以テ其緊要ト  
スル所ノ揮發衝動ノ藥ニ充ツ可キノ施療  
ノ部分ヲ論ス○施療ノ間毒ニ多種ノ衝動  
藥ヲ聚收メ頻リニ番替互用スルノミナラ  
ズ又屢々其目的トシ施療スルノ部分ヲ移  
サレ可カラズ看シ唯一部一器ヲ固執メ  
峻烈ナル諸藥ヲ連綿トメ施用スル寸ハ其  
究其部ノ知覺竟ニ頑鈍ヲ為シ生新ナル藥

カト雖氏復夕能夕之ヲ喚發スルヲ益キニ  
至ル故ニ頑吏ト雖氏一部ヲ偏守不可カラ  
サルナリ余屢々之ニ由テ良驗ヲ得タリ○  
曾テ記ス一患者危極ノ症ニ嬰リ既ニ十日  
此上ヲ歷ルモノ甚夕峻烈ナル諸藥ヲ與フ  
ト雖氏少シモ其生力ヲ喚發スルヲ能ハス  
又其沉細ナル脈動ヲ少シモ強実ナラシ  
ムルヲ能ハス○是レ毒ニ諸藥衝動ノ功ヲ  
失スルノミナラス其峻烈ナル衝動藥ヲ以  
テ二物基ノ間モ絶エヌ一胃府ヲ刺戟スル

潑

ヲ以テ此ニ至テ其部卒ニ頑鈍ヲ為シ明々  
シ且ツ其他ノ部分ノ末夕藥氣ニ慣レサレ  
ノ処ニ在テハ尚十分ノ知覺ヲ存スルヲ知  
ル可シ○余此症ニ於テ上ニ引スル所ノ諸  
藥ヲ以テ水鏡方ヲ製シ直腸ニ灌入ス此ニ  
於テ其胃府ニ在テハ少シモ其功ヲ奏セサ  
ルノ諸藥今却テ此部ニ於テ再々生新活潑  
ノ勢ヲ為メ大ニ峻効ヲ得タリ○一人ノ身  
軀ト雖氏各部各自ノ知覺アリテ其物ニ觸  
レテ感覺スルヲ甚夕差等アリ故ニ内服劑

ノ分量ヲ以テ他部ニ施ス寸ハ固ヨリ其効  
ヲ收ムルヲ能ハス是又預メ知ラサル可カ  
ラサルナリ

施療第一ノ部分ハ胃ト皮膚トニ在リ其皮  
膚ニ施スノ諸藥ハ即白苺子ノ毬布塗擦諸  
方製葢創治法ナリ○之ニ由テ能ク其一部  
不動ノ諸患ヲ除キ又一身ヲ衝動スルノ藥  
力ノ輔助ス可シ

大卒白苺子ノ毬布及ヒ多精ノ塗擦方塗擦方  
多クハ  
白苺精ヲ以テシ或ハソロリキヌマトリカ此意恥各ニテヨフマシレバ  
ルサムヒソシニテテラ混和ニセル者ヲ用フ若シ其疲弊スルナリ甚レ

キ者ニ於テハ揮發硃砂精キ者ニ於テハ揮發硃砂精  
ヲ以テヲ以テ兩手及ヒ下軀ニ施

ス○特リ神至熱ノミナラス諸熱病危劇十  
ル者ニ於テ之ヲ以テ藥力ヲ援ク就中白苺  
子ノ毬布ヲ以テ足脛ニ施ス寸ハ能ク速ニ  
瘧語ヲ止メ頭腦ヲ調和ス○病危極ナル  
者ニ於テハ四時毎ニ白苺子ノ毬布ヲ更ヘ  
施ス毎回必ス其処ヲ移ス又一時毎ニ芳香  
ナル塗擦方ヲ施ス此ニ由テ大ニ生カラ回  
復スルヲ得ルナリ  
芫菁膏ハ多ク用フルヲ無シ何者其部ニ揮



扎スルヲ甚久シクノ且ツ下部ノ關節ニ於  
テ動モスレハ悪性ナル潰瘍ヲ起因スレハ  
ナリ然レ患者内藏ニ於テ一部不動ノ痛苦  
ヲ得將サニ変ノ虚症ノ熾衝トナラントシ  
其勢甚ク危急ニノ白芥子ノ懸布ヲ以テ救  
フ可カラサルノ時ニ方テハ則チ芫菁膏ヲ  
貼スルヲ四時ノ間其泡ヲ発スルニ至ル乃  
チ峻烈ナル衝動力ノ一部ニ在テ絶エス挿  
扎スルニ由テ無比ノ捷効ヲ得故ニ能ク頑  
強ナル胃痛或ハ乾嘔或ハ吐逆或遷延タル

躰痛及ヒ肋膜痛ニ峻功アリ、又之ヲ以テ項  
窩ニ貼スルハ能ク經久難治ノ謠語ヲ治  
ス  
熨蒸方ハ蒲桃酒ヲ以テ芳香ナル諸品ヲ奠  
テ之ヲ用フ即チ心窩及ヒ下躰施ス又二時  
毎ニ新ニ熱セル蒲桃酒ヲ以テ之ヲ温メ更  
ニ施ス此法久シク皮膚ニ視貼スルヲ以テ  
能ク一身諸品氣ヲ衝動シ殊ニ一部ノ動ノ  
諸患即チ嘔吐呃逆、<sup>ユ</sup>テオリス<sup>ユ</sup>等ニ於  
テ勝効アリ

然レ此治法ヲ治効第一トス、凡ソ脈ノ救急  
ナルヲ緩ニシ不齊ヲ整ヘ沈細ヲ振ヒ、一身  
ノ生カヲ挽回スルハ此ヨリ速カナルハ十  
レ又能ク心藏ノ操作ヲ健ニシ心意ノ安カ  
ラサルヲ安ニシ搖掣ヲ弛ノ謔語ヲ止メ寒  
慄ヲ鎮メ胸間下軀ノ痛ミヲ和ケ、良汗ヲ起  
催シ、諸竅ノ分離ヲ整フ○余此志ニ遭フ毎  
ニ治法ヲ施スフ甚タ多シ其後死ニ至リシ  
者ハ僅ニ一二人ニ過キス且ツ其人浴後衛  
護ヲ慎シマス風寒ヲ冒ス等ノ了有ルニ由

レリ○此法喜ニ危極ノ時ニ臨ニテ能ク其  
生命ヲ保持スルノミナラス、又能ク之ニ由  
テ速カニ諸症ヲ退身軀ヲメ故ニ復セシム  
可シ之ヲ用フル寸ハ速カニ其生カヲ復シ  
病勢ノ進マントスルヲ止メ諸病ノ將サニ  
起ラレトスルヲ防拒スレハナリ○尋常ノ  
温湯ヲ以テ浴法ヲ行フモ功效甚タ多シ若  
シ之ニ加フルニ香竈ナル諸薬ヲ以テスル  
寸ハ益々佳ナリ、余多ク左ノ方ヲ用フ  
○方

ロームセ、カモメル花

ラフエシデル花

ライム荖葉併用

マヨラナ荖葉併用

メリツサ 荖葉併用以上  
各二号

泥菖根 四号

右並用ス、若シ其人疲弊スルヲ甚シキ者  
ハ之ニ加フルニ一ニ鱈ノ酒或ハ干鱈ノ  
焼酒ヲ以テメ其功カヲ助ク可シ  
凡ソ浴湯ノ全功ヲ收メント欲スル者ハ

一 浴湯ノ熱度勇ニ之ヲ行フ時限ノ長短勇  
ニ其用法ヲ詳カニセサル可カラサルナリ  
○ 熱度 アコミユル 人ノ定度ニ從テ二十七度  
ヲノ二十八度ニ至ルマテヲ以テ終始一様  
ナラレテ要ス、平日用フル所ノ二十四度  
或ハ二十五度ナル者ハ患者ニ害アリ○ 其  
病度ノ減スルニ隨テ浴湯ノ熱度モ亦除々  
ニ減却ス可シ○ 時限ハ病勇三等ニ在ル者  
ハ之ヲ行フテハ司ニユリトニ過クルヲ無シ、  
尚且ツ動モスレハ之ニ由テ耳鳴眩暈頭施

ヲ起因シ俄カニ浴法ヲ体メサル可カラサル  
ルコトアリ、宜ク意ヲ用フ可キナリ。○病勢漸  
ク退キ生力稍進ムニ隨テ其時限モ亦漸ク  
長クスヘキナリ。○浴法ヲ行フニ先ツテ宜  
シク香竈ナル某精ヲ以テ額ト胸トヲ洗ヒ  
此ニ由テ浴中瘧スル所ノ諸患ヲ防ク可シ  
○浴中些ノ拳動ト雖モ千萬注意メ其後患  
ヲ防ク可シ。○何者患者疲弊スルコト固ヨリ  
甚シク僅カニ起立スト雖モ輒キ頭眩ス因  
テ一瞬ノ間モ佇立スルコト能ハス甚他微シ

ク身体ヲ拳動スト雖モ亦復然リ若シ未之  
ヲ行ハサルニ患者已ニ倍々疲労スル寸ハ  
其躰力以テ其法ヲ遂フルニ堪エス之ニ由  
テ反テ惡症ヲ誘發スレハナリ。○用法ハ適  
宜ニ温メタル室中ニ於テ患者ヲ置クコト正  
ニメ倚側スルコト宜ク之ヲ洗フコト宜クニメ  
疎脱ナルコト無カラシムコト宜ク患者浴ヲ  
出テハ温メタル毛布ヲ以テ急ニ其身ヲ被  
ヒ少間徐々ニ之ヲ摩擦シソレテ速ニ乾  
カシメ後午之ニ衣スルニ清新ナル衣被ヲ

以テス可シ○浴法ヲ施ス下宜シク毎日一  
回ナルヘシ○キリステルモ此症ニ於テ  
甚ク良効アリ○其功ニツ有リ○一ハ衝動  
ノ功アリ強壯ニスル諸藥ヲ以テ躰中未タ  
藥氣ニ慣レサル部分ニ向ニ之ヲ施シ其危  
急ノ下劑ヲ静止ス○其方濃厚ナル者糊汁  
一二種ニ阿芙蓉一匁ヨリ二匁ニ至ルマテ  
ヲ和シ用フ○患者多クハ屢々下利セント  
スルノ患アリ此ノ如キ者ニ於テハ宜シク  
之ヲ施ス下毎日一回ナル可シ若シ其症劇

シキ者ニ在テハ之ヲ行フ下倍々頻繁ナル  
可シ○一ハ之ニ由テ患者ノ生カヲ挽回シ  
又能ク死生決ス可カテサルノ症ニ於テ瞭  
然トメ奇効ヲ見ハス下上ニ説ク所ノ如シ  
○此ニ共フルノ方ハ或ハ前方ニ仍リ或ハ  
半鐘ノ番桃酒ヲ以テシ或ハセルベニタリ  
アト纈中ノ瀾劑ヲ共ヘ或ハ一二匁ノ麝香  
及ヒ一二匁龍腦ヲ以テ製セル者ヲ用フ之  
ヲ施ス下少キモ一日一回ヲ缺ク可カラズ  
其量多キモ二鐘ニ出サル可シ

吐方ハ此症ニ於テ甚夕可否アリ  
動モスレハ此ニ由テ  
下利ヲ登スルナリ

○其治功ニツアリ若シ之ヲ施スフ患者ノ  
生力未夕甚夕脱セス下利未夕甚シカラサ  
ル時ニ於テシ且ツ用心周密ニメ此ニ由テ  
下利ヲ起登セシムルヲ無ク其必ス用フ可  
キノ機ヲ計テ之ヲ施ス寸ハ其強キ衝動ノ  
功ニ由テ能ク其神痊質ヲ振蕩健運ス一十  
リ

或烈乾曰ク此條示ス所ノ吐方用法ハ我  
カ学授日常諸病上ニ於テ説示スル所之

○蓋シ吐方ノ功也ツアリ  
第一胃及ヒ胸間ノ諸藏并ニ十二指腸ニ  
於テ能ク其病毒ヲ排泄ス  
第二胸腹ノ諸藏各自界隔セル者ヲ能ク  
衝動撼挽ス  
第三血脉ヲ衝動シ能ク血ノ流動ヲ健運  
ニス  
第四之ニ由テ能ク神経質ヲ一變ス  
凡ソ吐方ヲ施サントスル者先ツ其熱病  
ノ性ト其患者ノ質トヲ仔細ニ照料シ且

ツ此ニ由テ下利ヲ起催スル丁無カラシ  
ナシトテ要ス動モスレハ吐方ニ由テ下  
利ヲ得或ハ全ク吐ラ得スメ唯下利スル  
者アリ是レ諸病皆然リト雖モ神至熱ニ  
於テハ最モ多ク且ツ害ヲ為ス丁殊ニ甚  
タシ是レ扶歌蘭土論スル所口ヲ以テ昭  
々タリ醫宜シク心ヲ用フル丁懇到ニメ  
過テラ取ル丁無カルヘレ○今余カ經驗  
スル所口多ク下利ヲ奈セサル者ヲ論ス  
トスピースガラハ甚タ醫要ノ品ニ非ス

宜シク之ニ加フルニイペカコアナラ以  
テレ或ハイペカコアナラ單服セシム可  
シアラカウエ井レステーシハ殊ニイペ  
カコアナレ勝レリ且ツ神至熱ニ於テ最  
モ良効アリイペカコアナレ能ク其甚シキ  
下利ヲメ寡少ナラシムト雖モアラカ  
ウエ井レステーシノ能ク下利ヲ休止スル  
ニ如カス

起

能ク諸藏ヲメ病毒ヲ免カレシムニナリ○  
其理又若シ此ヲ用フル丁病ノ初擧ニ於テ

スル片ハ其口鼻ヨリメ胃ニ傳入スル所ノ  
疫毒ヲ咯出シ病ノ將サニ強劇ナラントス  
ル者ヲ其初メニ排斥ス一ナリ若シ胃中不  
熟ノ食物有リテ速ニ之ヲ攘除スルヲ能ハ  
サル片ハ后午竟ニ兇極ノ勢ヲ為ノ元運ノ  
生氣ヲ押壓シ腐敗ヲ為ス一日ニ甚シク終  
ニ危極ノ諸症蜂起スルニ至ル故ニ又之ヲ  
其初メニ吐スヘシ○若シ病初起ノ日ニ在  
テ心下苦悶若シクハ惡心若シクハ嘔吐ヲ  
苦シム片ハ必ス之ヲ吐ス多クハ之ニ由テ

久

病即テ愈エ或ハ少シク遷延スルモ危篤ニ  
至ルヲ無シ○故ニ吐劑ヲ與フルヲ勅メテ  
其初起ニ於テスヘシ假令ヒ其久シキヲ歷  
ルモ七日ヲ出サルヘシ尚且ツ茲ニ至テハ  
引ワルキルエハ分時毎ニ「イペカコア」  
五爪ヲ以テシ患者漸ク吐ヲ催スニ至ル之  
ヲ用フルヲ宜シク三回ニ過キサルヘシ之  
ニ由テ患者若シ下利ヲ發セハ速カニ阿芙蓉  
散少許ヲ以テ之ヲ救フヘシ是レ余カ平日  
與フル所ノ用法也○余曾テ一兒ヲ療セリ



諸藥ノ製法服度甚夕悉セリ凡ソ危劇ノ患  
 者ヲ療セシト欲スル者宜シク之ヲ以テ法  
 トスヘシ今掲ケテ左ニ示ス  
 兎年十一天資薄弱神至熱ヲ患フ其脈ヲ診  
 スルニ一引一止ノ間百三十動ヲ得之ヲ加  
 フルニ譫語昏眩筋惕呃逆撮空下利ヲ以テ  
 ス此ノ如キフ已ニ二物基唯死ヲ待ツノミ  
 ○一時毎ニ兎ニ與フルニ在人瀉劑一食匙  
 ヲ以テス  
 ○方

セルペニタリア 一匙  
 纈草 二匙  
 泥昌根 一匙  
 右熱湯三升ヲ以テ之ヲ浸シ温服セシム  
 余乃チ之ニ加フルニ左ノ藥液十滴ヲ以テス  
 ○方

ナプターヒトリアル 即チコトフニ鎮痛液  
 纈那丁發劑  
 ウエーチー 各二匙  
 此ノ劑ヲ施スノ後直チニ引キセレスウエーチー

一匙ヲ共ヘ又四分時ヲ経テ次ノ散藥ヲ服セシム

○方

麝香

各四毛

龍腦

二毛

阿芙蓉

デレイ

白糖

右調勻

又四分時ヲ過テ上ノ瀹劑ニ陳釀ヲテニス  
ウヰイン<sup>ニ</sup>名<sup>ラ</sup>加ヘ一食匙ヲ冷服セシム右ノ

如クノ病児平時ノ間瀹劑一瀹劑ニ酒ヲ加  
ヘシ者<sup>ヲ</sup>セレスウヰイン一散劑一ヲ飲服ス  
○又之ニ疊用スルニ莖餅水ニ四分一ノ赤  
蒲桃酒ヲ加ヘタル者ヲ以テシ又數々鹿角  
膠ニ陳釀<sup>コ</sup>インセウヰイン<sup>ヲ</sup>和シ共ヘ或ハ  
淡膏ナル者肉汁ニ雀麦並汁ヲ交シテ施ス  
○二時毎ニ芳香ナル藥精即龍腦ヲ以テ製  
セル者等ヲ以テ全身ヲ洗淨シ又十二時毎  
トニ芳香ナル藥湯或ハ蒲桃酒ヲ以テ浴法  
ヲ行ヒ毎日一回白苺子ノ毬布ヲ施シ其衰

弱スルヲ甚シキ時ニ在テ六時毎ニ一タヒ  
之ヲ施ス又毎日一回糊粉ニ阿芙蓉蒲桃酒  
ヲ和シ水銃法ヲ行フ○又芳香ナル諸藥ヲ  
取テ小囊ニ盛リ蒲桃酒ニテ煎煮シ屢々心  
下ヲ慰莖ス○余此見ニ於テ右ノ法方ヲ以  
テ諸藥衝動ノカラ逞フシニ物基ノ間少時  
モ急ルヲ毎ク之ヲ施ス其後始メテ其分量  
ヲ減シ其間ヲ濶ニシ稍々ニテ藥ヲ休ムル  
ニ至ルヲ得タリ  
○右ノ如クメ諸劑衝動ノカラ助ケ躰中諸

益ニ於テ斷ヘス操作セシムヘシ之ニ由テ  
生氣ノ衰弱セルヲ維持シソレヲノ復治ノ  
功ヲ遂クルニ至ラシムベシ○若シ唯一平  
時ト雖モ揮發衝動ノ劑ヲ興フルヲ無キ片  
ハ則チ患者脈ト生カト共ニ沉没ノ復シ難  
シ余曾テ一患者ニ於テ衝動劑ヲ急タルヲ  
三時ニ及フ者ヲ見ル其人顔面陥落シ死斑  
ヲ祭シ四肢厥冷神思昏迷又加之脈動頻數  
少キ一「ニ」トノ間百五十動ニ下ラス○  
然レ其人又強ク衝動劑ヲ服スルニ由テ再

ヒ生路ニ就キ且ツ全治ニ至ルヲ得タリ  
○若シ術亘レキヲ得ルハ則チ此ノ如シ  
蓋シ患者ノ生命茲ニ至テ実ニ医手ニ在リ  
其治ヲ得ルヤ即チ瘡術ノ致ス所ナルト云  
然トメ徴スヘキナリ

○今既ニ此ノ気血ヲ催進スルノ瘡術ニ由  
テ如メテ痲毒ヲ排斥シ生力ヲ回復シ腐敗  
ヲ防止スルヲ得脈力漸ク剛実ニメ搏動  
後ナルハ腐敗方サニ休  
ムノ徴諸器ノ機轉新クニ生シ一身漸ク堅  
固ヲ得ハ則チ其揮發衝動ノ劑ニ代フルニ

收斂固保スル強壯劑及ヒ食物ヲ以テス患  
者生力益復セハ之ヲ用フルト益々多カル  
ベシ○箴那ハ上ニ説示セシ如ク此病ニ於  
テ亘レカラサルノ品トス唯當サニ多精ノ  
丁箴劑或ハ冷蒲桃酒ニ和シ服セシムル  
○此時ニ於テ最モ的當ノ品トスルハア  
ニ至ル即チ上ニ説ク所ノアゼルタリ  
エトシ續草ニテ製セル揮發ノ功アル合劑  
ニ加ヘ用フ然レ氏此物ニ其全治ニ至ルマ

テ堅要トスルノ藥ニ非ス○又水楊梅泥葛  
根コルテキスカスカリルテトヲ用テ良効  
アリ○其終リニ於テ躰カ益復シ殊ニ腸胃  
消化ノ機モ強々健運ヲ得ル中ハ則チ上ニ  
季クハ諸品ニ緩耶ヲ加エ共フヘシ此時ト  
雖モ尚動モスレハ下利ヲ發スルノ患アリ  
故ニ千萬細思メ之ヲ共フヘシ蓋シ乏ヲ以  
テ施瘡ノ終リトス○病后一身殊ニ衰弊シ  
多ク時日ヲ経ト雖モ遷延トメ故ニ復シ難  
キハ亘シク上ノ諸藥ニ銅鉄劑ヲ重子用フ

ヘシ銅鉄劑ハ殊ニアエテルマニチアリス  
ラ良トス

諸子子ラレシトハ多ク之ヲ用フルト無  
シ動モスレハ之ニ由テ下利ヲ増進ス是レ  
余カ屢々戒ル所ナリ然モ衄血子宮脱血等  
ニ由テ患者危篤ナル者ニ於テハ六之ヨリ  
勝レルハ無シ終始此症ニ遇ハ、其時期ヲ  
論セス即チ之ヲ共フヘシ他ノ敏峻ナル衝  
動劑ハ功效アルト無シ○余常ニコリキレ  
アレド、ハルルヲ粘滑ナル飲液ニ和シ服セ

レハ其功純粹ナル録養精ニ勝レリ且シク  
之ニ加フルニアルコホルヲ以テメ其腹痛  
及ヒ下利ノ起因スルヲ預メ防クヘシ或ハ  
白朮ニ桂支ヲ和シ其フルモ良ナリ亦且シ  
ク粘稠ナル藥液ヲ以テ之ヲ送下スヘシ○  
又一症神經衰弱スル者ト雖凡其人元來多  
血ニメ血絡太夕盈張スル者ニ於テハ當サ  
ニ諸々ノ「子ラレシユ」ルヲ與フヘシ如此ノ  
症ニ在テハ荏苒タル神至病ト此症ニ於テ  
性味溫熱ニメ衝動ノ功アル諸藥ヲ與フル

片ハ其多血ヲ衝動スルト甚夕強劇ニメ患  
者ニ害アリ○一少年神經熱ヲ患フ其症最  
モ酷悪ナリ病ヲ得テ十二日余ヲメ診セシ  
ム其人本ト多血然ルニ医初ヨリ之ニ與フ  
ルニ揮發衝動ノ諸品ヲ以テス之ニ由テ病  
勢益々増進セリ○脈動強實ニメ馱教諛語  
言止マズ吐熱衄血ス○余ソレヲメ盡夕後  
前ノ諸藥ヲ瘞セシメ新夕ニ之ニ與フルニ  
左ノ方ヲ以テス

○方

エリキシルアシケユム

六分

阿芙蓉

五分

右調勻ス

○右一時毎トニ六滴ヲ取テ粘厚ナル飲液  
ヲコソブニ和シ服セシム○此ヲ由テ拙劣  
稍々ニ減シ復タ神経ノ諸患ヲ發スルヲ無  
ク血モ亦全夕休止シ久カラスメ故ニ復  
ス

○腸ノ甚シク衰弱スルハ此病ニ在テ免カ  
レサル所ニメ且ソ其頻數ナル下利ト其衰

弱ヨリ發スル諸症嘔逆嘔吐重墜努責下血  
等ニ由テ終始患者ヲメ凶惡ニ向ハシメ遂  
ニ非常ノ危篤ヲ起因ス○下利ヲ鎮止スル  
第一ノ劑ハ強壯ニスル少腹ノ塗擦劑及熨  
莖法并ニ水鏡方ナリ其下利甚シキ者ニ於  
テハ之ヲ施スナク且シク頻數ナルヘシ水  
鏡法ハ糊粉及ヒ阿芙蓉ヲ以テ製セル者ヲ  
用フヘシ○病危篤ナル者ニ於テハ少シト  
雖モ生カ虚脱スルヲ殊ニ甚クシ阿芙蓉ノ  
水鏡方ヲ以テ之ヲ防止スルヲ常法トス下

利既ニ休止スルノ後ト雖<sup>レ</sup>且<sup>レ</sup>ク辱々之  
ヲ施ス可シ敷日ノ間夕全ク下利無カラレ  
トヲ要スレハナリ○下利重墜努責腹中雷  
鳴ハ固ヨリ危症ナリ曰<sup>レ</sup>ボガラハ説ニ之ヲ  
以テ懼ルヘシトス今治術漸ク闡ケ生命ヲ  
此危殆ノ際ニ救フト<sup>レ</sup>得<sup>レ</sup>実ニ喜フ可キナ  
リ勇三等ノ症ニ於テハ尋常法方ノ外ニ左  
ノ水銃術ヲ施ス可シ糊粉、阿芙蓉、蒲桃酒、右  
調勻<sup>レ</sup>且<sup>レ</sup>ク其劑量ヲ小ニシ之ヲ施ス  
頻敷ナレ可シ又毛布ヲ取テ<sup>レ</sup>ホ<sup>レ</sup>マ<sup>レ</sup>シノ<sup>レ</sup>ハ

ルサモヒタ<sup>レ</sup>ト<sup>レ</sup>スガ<sup>レ</sup>ル<sup>レ</sup>バ<sup>レ</sup>及<sup>レ</sup>ヒ<sup>レ</sup>ア<sup>レ</sup>セ<sup>レ</sup>ト<sup>レ</sup>ヒ  
ト<sup>レ</sup>ノ<sup>レ</sup>中<sup>ニ</sup>蘊<sup>シ</sup>取<sup>テ</sup>火<sup>ニ</sup>テ<sup>レ</sup>烘<sup>リ</sup>久<sup>ク</sup>以<sup>テ</sup>腹<sup>ヲ</sup>  
熨<sup>ス</sup>此<sup>ニ</sup>方<sup>重</sup>墜<sup>努</sup>責<sup>ニ</sup>神<sup>効</sup>アリ

○患者動モスレハ小便ノ分利ヲ失スル<sup>レ</sup>ト  
有<sup>リ</sup>因<sup>テ</sup>困難<sup>危</sup>急<sup>ノ</sup>症<sup>候</sup>即<sup>チ</sup>ト<sup>ラ</sup>シ<sup>ギ</sup>ユ  
リア<sup>歴</sup>林<sup>テ</sup>イ<sup>レ</sup>ユ<sup>リ</sup>ア<sup>難</sup>イ<sup>レ</sup>ユ<sup>リ</sup>ア<sup>患</sup>フ<sup>若</sup>シ  
此<sup>症</sup>ニ<sup>遇</sup>ハ<sup>レ</sup>且<sup>ク</sup>寛<sup>和</sup>ニ<sup>ス</sup>ル<sup>熨</sup>蓋<sup>方</sup>ヲ  
施<sup>ス</sup>ベ<sup>シ</sup>其<sup>方</sup>「<sup>ル</sup>プ<sup>」</sup>「<sup>イ</sup>オ<sup>ス</sup>セ<sup>イ</sup>ア<sup>ト</sup>」  
ト<sup>レ</sup>ペ<sup>レ</sup>エ<sup>モ</sup>ル<sup>ル</sup>ヲ<sup>加</sup>ヘ<sup>典</sup>フル<sup>ラ</sup>良<sup>シ</sup>ト<sup>ス</sup>  
又<sup>揮</sup>奈<sup>龍</sup>腦<sup>油</sup>ニ<sup>阿</sup>芙蓉<sup>ヲ</sup>和<sup>シ</sup>塗<sup>擦</sup>劑<sup>ト</sup>シ



内服ニハ利尿劑ヲ用フ即チセルトセルワ  
リテ<sup>ル</sup>温泉ニ蒲桃酒洋芹露小茴香杜松子  
ノ煎湯ヲ和スル者并ニ甘消石精ヲ服セシ  
メ之ニ重ヌルニ阿芙蓉ノ水鏡方ヲ以テス  
ベシ常ニ是等ニ由テ治愈ヲ得○此症甚シ  
キ者ハ小便全ク閉止ス或ハ十二時間一解  
ヲ得サル者アリ患者困難言フ可カラス実  
ニ危極ノ候ナリ○此ノ如キニ至テハ上ノ  
諸品共ニ効驗ナシ次ノ方ヲ與フルニ非サ  
レハ故フ可カラサル也

○方

オーリ、アエテル、イユニフ  
オーリ、アエテル、ヘトロセル 各半  
日消石精 ニキ

右調勻

一時毎ニ右ノ劑三十滴ヲ與フ○若シ其分  
利全ク故ニ復セスノ毎十分ノ通利ヲ得  
サル者ハ其終リ脚股必ス水腫ノ状ヲ為シ  
治セサレハ終ニ衰メ真ノ水腫トナル○此  
症ニ於テハ<sup>ル</sup>チンキチュールチキトア<sup>ル</sup>テ<sup>ル</sup>

ヲ以テ上方ニ加ヘ施メ良効アリ  
○僂友木兎乾各一患者ヲ治メ速カニ良効  
ヲ得タリ今茲ニ載セテ治例トス○一有司  
神経熱ヲ患フル丁巳ニ十日身軀甚夕疲倦  
シ又破車ニ乗シ陰雨ヲ冒シ病終ニ加重ス  
○其人惡心甚シク飲食併セ吐シ吃逆下利  
重墜努責ノ振戦ス諸筋纖維殊トニ疲弊シ  
脈動一「リ」ニ「リ」ノ間一百ニ十ヲ得然レ病  
勢未夕頭腦ニ及ヒホサス○乃千纈草ノ瀉  
劑ニ「セ」ルペンタリ「ハ」蒲桃酒、阿芙蓉ヲ加ヘ

典フル丁ニ日微驗ナク心下芤菁膏ヲ施ス  
ニ少シモ惡心ヲ止ムルヲ無シ○因テ又熨  
莖方ヲ典フ  
○方

エッセントガルバヌム  
スピリキユスマトリカル  
バルサムピリタリホフマン  
アセトビニ 各ニ号  
キレキキユールテハイカ 一号

右調勻

右毛布ヲ浸メ少腹及ヒ心下ニ施ス糊粉ニ  
阿芙蓉一匁ヲ加ヘテ六時毎ニ水鏡法ヲ行  
ヒ内服ハ一時毎ニコレニアラヒアゴムニ  
テ製セルコレニシテ阿芙蓉液ニ滴麝香  
一匁ヲ加フル者コレヲウヅキ一匙ヲ共フ  
ルノ外絶テ用フルトナシ○此ヲ共フルノ  
后一二時ヲ経テ午後甚シク寒熱ヲ發シ又  
劇シク湧吐スルト一回吐中膽液ヲ交フ少  
時ニメ嘔吐下利嘔逆共ニ静止セリ○其翌  
患者全ク一變ス脈ヲ診スルニ一コレニ止

ノ間減メ八十動トナリ且ツ齊一ニメカア  
リ惡心嘔逆嘔吐下利重墜努責モ全ク失ス  
ルカ如ク且ツ好ニテ多クコレヘシテ飲ム○  
脈勢益々カヲ得テ間歇熱ニ於テ診スル所  
ノ如シ○其後異状ナク二日ヲ経テ三日ニ  
至テ食欲益々復シ遂ニ飽食ス少時ニメ飲  
食藥劑共ニ吐ス○乃チ一方ヲ製メ之ニ共

○方

桂露

三字

セイデンハム、阿芙蓉液

三月

ナプターロトリオル

一月

ホフマン  
鎮痛液

橙皮舍利別

一号

右調勻

時ニ又湧吐スルヲ二回重子テ下利ヲ発シ  
脈動亦数急ヲ為ス○乃チ阿芙蓉水鏡法ヲ  
施スヲ二度諸症又休止ス○内服唯平時毎  
ニコッセンチアヒスコッ<sup>メトクエス</sup>コルトアユル<sup>砂糖ノ合劑</sup>  
ヲ其フルノニ食物ヲ禁メ與フルヲ無ク鹿  
角膠ニ列應設酒ヲ和シテ食物ニ充ツ外用

心

ハ芳香ナル藥液ヲ以テ毎日一度浴法ヲ行  
フ○此ニ由テ益々輕快ヲ覺ヘ復タ嘔吐ヲ  
發スルヲ無シ第三日ニ至テ食欲再ヒ生ス  
第四日必思稍々寬暢女時ノ間自ラ起坐ス  
ルヲ得○此ニ至テ患者前敗ヲ思ハス又  
恣ニ飲食シ病勢復劇ナリ危急ノ初ノ如シ  
然レ又上法ノ如クメ全治スルヲ得タリ  
○凡ソ邪毒外ヨリ来テ人身ニ中リ每人一  
般ノ症候ヲ發スル片ハ假令其人始メ厲風  
ニ感スルヨリメ之ヲ得ルモ或ハ他人ニ由

氣

テ之ヲ發スルモ齊シク之ヲ呼ンテ傳染病  
ト稱スヘキナリ○若シ既ニ然ルハ本ヨ  
リ其体中ニ釀メ本病ノ起ルト為ルベキ者  
ノ外尚一個外来ノ傳染毒ナル者有テ其内  
邪ヲ誘發シ乃チ一般ノ症候ヲ致スヲ知ル  
ヘキナリ故ニ此病ヲ預防セルト欲セハ先  
ツ之ヲ察セサル可カラサルナリ

預防法ヲ論ス

第一劇シキ冒寒ト共ニ痛風傷冷毒眼喉衝  
ヲ童子患フルヲ軍中ニ在テ常ニ屢々見ル

所ナリ若シ能ク之ヲ防止スルハ即チ本  
病ニ嬰ルヲ免カル可シ○且シク多ク發  
汗スヘシ殊ニ夜中適度ノ汗ヲ得ルハ最モ  
良ナリ

第二毎日適宜ノ裁那ヲ取テ多精ノ丁裁劑  
トナシ或ハ之ヲ以テ粵裁劑ト為シクツ  
シホウシノ粵裁劑ト混和シ服ス又午  
時毎ニキセレシ「コ」テ「カ」ウテマル「カ」ホツ  
クイメル等ノ如キ蒲桃酒ノ久害ニメ銳烈  
ナル者一「コ」ツ「ブ」ラ用フ天時陰寒ノ際ニ於

テハ薄暮毎ニ茶湯ニリユ凶ヲ服ス右ノ如クメ能ク免カル、下ヲ得ヘシ是余カ軍衆ニ於テ屢々裁ムル所ナリ○然レ此ノ如キ運行ヲ起催スルノ諸品ハ之ヲ服スル下其度ヲ節セサル可カラサルナリ若シ之ヲ過用スル下ハ又能ク本病ニ相及スルノ患ヲ察スル下ナリ○此方ノ軍中ノ瘍医魯西亞人ニ學フ所ヲ聞クニ生葱ヲ以テ毎比ノ預防藥トス其之ヲ用フル下ニ莖ヨリ三莖ニ至ル○病已ニ傳染スル者ト雖レ之ヲ服ス

ル下上法ニ倍スル下ハ能ク其毒ヲ消除ス可シ

第三飲食ヲ節シ勞思ヲ省ブケラ緊要トス○凡ソ諸般ノ事為常度ニ過クル下ハ又能ク本病ヲ諸察ス○小事ト雖レ必ス周詳細思セサル可カラズ病勢増劇スル下皆其攝生ヲ慎マズノ別ニ新夕ニ諸症ノ由ヲ為ス下有ルニ由ル

第四若シ人強キ勞動ニ由テ精力大ニ疲倦シ若シクハ空腹ヲ忍ビ若シクハ患者ノ病

最級ニ在テ諸液腐敗スル者ニ近接シ若クハ本病ニテ既ニ死亡セシ者ニ觸レ若シクハ衆人雜沓群居シ若クハ惟悵固密セル外床ニ右テ看護ノ人之ニ由テ病ヲ得ルノ懼由テ害ヲ為スルノミナラス患者ニ亦之ニ<sub>テ</sub>殊ニ甚ク<sub>シ</sub>ス<sub>ル</sub>空氣ノ鬱閉セルニ由テ蒸<sub>レ</sub>奈氣ヲ閉止シ或ハ然ラサルモ連日病床ニ看侍スル片ハ動モスレハ輒チ其毒ヲ傳深ス恐レサル可カラサルナリ○右ノ如キ諸件ニ由テ平全健<sub>運</sub>ノ人卒然トメ病ニ罹リ俄頃ニメ神思不豫尋テ諸忘雜出ス○曾テ右

者ト  
等ノ起因ニ由テ余自ラ疫毒ニ罹リシ<sub>テ</sub>有リ乃チ諸兆交々至リ四肢疲勞神思昏憤眩暈寒慄飲食味ヲ失セリ○此ノ如ク自ラ疫氣ニ感セシ<sub>テ</sub>二三回ニ及ヘリ幸ニノ諸忘頂更ニ休止シ竟ニ病マサル<sub>テ</sub>ラ得タリ<sub>テ</sub>勇五君シ其志輕易ニメ且ツ速カニ其治ヲ施ス片ハ既ニ病ヲ傳深スル<sub>精</sub>者雖凡諸忘未夕發見セサルニ先ツテ平治ヲ得ヘキナリ○患者身軀稟賦ノ機轉ト疫毒侵襲ノ微甚ニ由テ病輕重ヲ為ス<sub>テ</sub>固ヨリ知ルヘキ

ナリ○輕症ニノ久シク了々タラサル者ニ  
於テハ凡ノ躰中ノ諸毒殊ニ胃ト皮膚トニ  
右テ適宜ノ運動ヲ得セシムレハ即チ愈エ  
○一饅ノ好蒲桃酒一凡ノ良食饌「リユ」ラ  
和シタル茶湯ヲ飲ミ交遊娛樂シテ神志酣  
暢スルハ諸毒即チ退除スヘシ○此ニ由  
テ第一胃ノ機轉ヲ佐ク胃府健運ナルハ  
疫毒多ク傳染セス○若シ人疫毒ニ觸レテ  
因テ眩暈惡心ヲ發スルハ毒方ニ胃ニ陷ル  
ノ微ナリ此時ニ方テ速ニ一吐ヲ行ハ、病

全ク治ス可シ○曾テ一人アリ一患者ニ看  
侍スル丁ニ物基逐ニ其死ニ至ル已ニノ身  
躰疫臭ヲ為シ口内ノ氣臭死汗ノ如ク憎寒  
發熱ノ頭痛ス乃チ吐棄ヲ興フ少時ニノ疫  
臭汚穢ノ物ヲ湧吐シ即愈エ  
○病危篤ノ時ニ臨ンテ患者心塵世ヲ蟬蛻  
シ魂ヲ上界ニ逍遙セシムルヲ一大良方ト  
ス因トニ尋常医薬ノ及フ所ニ非サルナリ  
○此ニ於テ不幸モ悲ムニ是ラス劇厲モ危  
フムニ是ラス死モ以テ心ヲ動カスニ是ラ



サルナリ

○一念當サニ思フ可シ凡ソ有相ノ者ハ得  
世ニ漾蕩シ憂喜禍福ノ上ニ行任スル者ナ  
リト

○且ソ他ノ百千ノ凶厄ヲ顧リミテ吾身ノ  
凶厄ヲ受クルト未夕遍カラザルトテ想フ  
可シ

○此ニ由テ神魂安靜喜怒哀樂往クトメ平  
等ナラサル所ナシ又物ノ能ク其心ヲ恆カ  
ス可キ無シ

○若シ人其遭フ所ヲ以テ是レリトシ幸福  
ノ時ト雖モ此心ヲ失ワス凶厄ノ時ト雖モ  
此心ヲ失ワス竟ニ之レカ常性ヲ為ス片ハ  
是レ真ノ幸人ト称ス可キナリ

于時天保九戊戌年晚秋  
江府深川冬木街河岸於  
安懷堂北塾騰寫之終

素吾城

待醫

山本義敬藏書

