

薛氏二十四種

内科摘要
下

中武
584
ク



584
7

內科摘要下卷

薛氏醫按

吳郡薛已 著

新都吳玄有校

脾腎虧損頭眩痰氣等症

閣老梁厚齋氣短有痰小便赤澀足跟作痛尺脉浮大按之則
潛此腎虛而痰飲也用四物送六味丸不月而康仲景先生云
氣虛有飲用腎氣丸補而逐之誠開後學之朦瞶濟無窮之天
枉腎氣丸即六味丸也

都憲孟有涯氣短痰暈服辛香之劑痰盛遺尿兩尺浮大按之
如無余以為腎家不能納氣歸源香燥致甚耳用八味丸料三
劑而愈

孫都憲形體豐厚勞神善怒面帶陽色口渴吐痰或頭目眩暈

薛氏醫按

內科摘要下卷

也言

或熱從腹起左三脉洪而有力右三脉洪而無力余謂足三陰虧損用補中益氣加麥門五味及加減八味丸而愈若人少老態不耐寒暑不勝勞役四時迭病皆因少時血氣方長而勞心虧損或精血未滿而御女過傷故其見症難以悉狀此精氣不足但滋化源其病自痊又若飲食勞役七情失宜以致諸症亦當治以前法設或六淫所侵而致諸症亦因真氣內虛而外邪乘襲尤當固胃氣為主蓋胃為五臟之根本故黃柏知母不宜輕用恐復傷胃氣也大凡雜症屬內因乃形氣病氣俱不足當補不當瀉傷寒雖屬外因亦宜分其表裏虛實治當審之昌平守王天成頭暈惡寒形體倦怠得食稍愈勞而益甚寸關脉浮大此脾肺虛弱用補中益氣加蔓荊子而愈後因勞役發熱惡寒謔言不寐得食稍安用補中益氣湯而痊

大尹祝支山因怒頭暈拘內筋攣時或寒熱日晡熱甚此肝火筋攣氣虛頭暈用八珍加柴胡山梔牡丹皮二十餘劑而愈上舍顧桐石會飲於周上舍第問余曰向孟有涯陳東谷俱為無嗣納寵已而得疾皆頭暈吐痰並用蘇合香丸惟有涯得生何也余曰二症因腎虛不能納氣而為頭暈不能制水而為痰涎東谷專主攻痰行氣有涯專於益火補氣故耳後余慮杭人之請桐石房勞過度亦患前症或用清氣化痰愈甚顧曰我病是腎虛不能納氣歸源治者不悟而歿惜哉

一男子素厚味胸滿痰盛余曰膏粱之人內多積熱與法製清氣化痰丸而愈彼為有驗修合餽送脾胃虛者無不受害先兄體貌豐偉唾痰甚多脉洪有力殊不耐勞遇風頭暈欲仆口舌破裂或至赤爛誤食薑蒜少許口瘡益甚服八味丸及補

龍耳醫辨
中益氣加附子錢許即愈停藥月餘諸症仍作此命門虛火不歸源也

肝腎虧損血燥結核等症二

儒者楊澤之性躁嗜色缺益結一核此肝火血燥筋攣法當滋腎水生肝血不信乃內服降火化痰外敷南星商陸轉大如碗余用補中益氣及六味地黃間以蘆薈九年餘元氣漸復而腫消一男子素善怒左項微腫漸大如升用清痰理氣而大熱作渴小便頻濁余謂腎水虧損用六味地黃補中益氣而愈亦有胸脇等處大如升斗或破而如菌如榴不問大小俱治以前法一男子頸間結核大潰年餘一男子眉間一核初如豆粒二年漸大如桃悉用清肝火養肝血益元氣而愈舉人汪節夫頸臂脇肋各結一核恪服祛痰降火軟堅之劑益

甚余曰此肝膽經血少而火燥也彼執前藥至明年六月各核皆潰脉浮大而濇余斷以秋金將旺肝木被尅必不起後果

脾腎虧損小便不利肚腹膨脹等症三

大尹劉天錫內有濕熱大便滑利小便濇滯服淡滲之劑愈加滴瀝小腹腿膝皆腫兩眼脹痛此腎虛熱在下焦淡滲導損陽氣陰無以化遂用地黃滋腎二丸小便如故更以補中益氣加麥門五味兼服而愈

州守王用之先因肚腹膨脹飲食少思服二陳枳實之類小便不利大便不實咳痰腹脹用淡滲破氣之劑手足俱冷此足三陰虛寒之症也用金匱腎氣丸不月而康

州同劉禹功素不愼起居七情以致飲食不甘胸膈不利用消導順氣肚腹痞悶吐痰氣逆用化痰降火食少泄瀉小腹作脹

用分利降火小便澹滯氣喘痰湧服清氣化痰丸小便愈滯大便愈瀉肚腹脹大肚臍突出不能寢臥六脉微細左寸虛甚右寸短促此命門火衰脾腎虛寒之危症也先用金匱加減腎氣丸料肉桂附各一錢五分二劑下痰穢甚多又以補中益氣送二神丸二劑諸症悉退五六又用前藥數劑并附子之類貼臍及湧泉穴寸脉漸復而安後因怒腹悶惑於人言服沉香化氣丸大便下血諸症悉至余曰此陰絡傷也辭不治果歿

一富商飲食起居失宜大便乾結常服潤腸等丸後胸腹不利飲食不甘口乾體倦發熱吐痰服二陳黃連之類前症益甚小便滴瀝大便泄瀉腹脹少食服五苓藿麥之類小便不通體腫喘嗽用金匱腎氣丸補中益氣湯而愈

一儒者失於調養飲食難化胸膈不利或用行氣消導藥咳嗽

喘促服行氣化痰藥肚腹漸脹服行氣分利藥睡臥不能兩足浮腫小便不利大便不實脉浮大按之微細兩寸皆短此脾腎虧損朝用補中益氣加薑附夕用金匱腎氣加骨脂肉果各數劑諸症漸愈再佐以八味丸兩月乃能步履却服補中八味半載而康

一男子素不善調攝唾痰口乾飲食不美服化痰行氣之劑胸滿腹膨痰涎愈盛服導痰理脾之劑肚腹膨脹二便不利服分氣利水之劑腹大脇痛睡臥不得服破血消導之劑兩足皆腫脉浮大不及於寸口朝用金匱加減腎氣丸夕用補中益氣湯煎送前九月餘諸症漸退飲食漸進再用八味丸補中湯月餘自能轉側又兩月而能步履却服六補湯還少丹又半載而康後稍失調理其腹仍脹服前藥即愈

一男子患前症余為壯火補土漸愈彼欲速服攻積之劑下血甚多余診之曰此陰絡傷故血內溢非所宜也後果歿

一男子胸膈痞悶專服破氣之藥余曰此血虛病也血生於皮土若服前藥脾氣虛而血愈虛矣不信又用內傷之藥反吐血余曰此陽絡傷也後果然

大方世家湖鄉離羣索居山妻趙氏忽嬰痰熱治者多以寒涼偶得小愈三四年餘屢進屢退于是元氣消燥庚子夏遍身浮腫手足麻冷日夜咳嗽煩躁引飲小水不利大肉盡去勢將危殆幸遇先生診之脉洪大而無倫按之如無此虛熱無火法當壯火之源以生脾土與金匱腎氣丸料服之頓覺小水潰決如泉俾日服前丸及大補之藥二十四劑而愈三四年間平康無恙迄今甲辰仲春悲哀動中前症復作體如焚燎口肉盡腐胸

腹腫滿食不下咽者四日夫婦相顧束手待斃而已又承先生視之投以八味丸二服神思清爽服金匱腎氣丸料加參芪歸朮未竟夕而胸次漸舒陟然思食不三日而病去五六矣嗣後日用前二丸間服逾月而起至秋初復患痢又服金匱腎氣丸料加參芪歸朮黃連吳茱萸木香痢遂止但覺後重又用補中益氣加木香黃連吳茱萸五味數劑而全愈大方自分寒素命亦蹇剝山妻抱病沈痼本難調攝苟非先生援拯填壑未免今不肖奔走衣食於外而可無內顧之憂矣然則先生之仁庇固不肖全家之福亦不肖全家之感也斯言也當置之座右以為子孫世誦之不肖嘗侍先生之側檢閱醫案始知山妻奏効巔末遂秉書紀二丸藥之聖且彰先生用藥之神萬一云吳門晚學生沈大方履文再拜頌首謹書

脾胃虧損暑濕所傷等症四 附食生冷入房

大司徒李浦汀南吏部少宰時患黃疸當用淡滲之劑公尙無
嗣猶豫不決余曰有是病而用是藥以茵陳五苓散加苓連山
梔二劑而愈至辛卯得子公執余手而笑曰醫方猶公案也設
君避毀譽殘喘安得享餘年而遂付託之望哉由是禮遇益
應天王治中遍身發黃妄言如狂苦於胸痛手不可近此中焦
畜血為患用桃仁承氣湯一劑下瘀血而愈

太守朱陽山弟下部蓄血發狂用抵當湯而愈

一儒者每春夏口乾發熱勞則頭痛服清涼化痰藥瀉喘煩躁
用香茹飲神思昏憤脉大而虛此因閉藏之際不遠帷幕為患
名曰注夏用補中益氣去柴胡升麻加五味麥門炮薑一劑脉
益甚仍用前藥加肉桂五分服之即甦更用六味丸而痊

一儒者體肥善飲仲秋痰喘用二陳苓連益甚加桑皮杏仁盜
汗氣促加貝母枳殼不時發熱余以為脾肺虛寒用八味丸以
補土母補中益氣以接中氣而愈

一男子夏月入房食水果腹痛余用附子理中湯而愈有同患
此者不信別用二陳苓連之類而死

一男子盛暑發熱胸背作痛飲湯自汗用發表之藥昏憤譫語
大便不實吐痰甚多用十全大補一劑頓退又用補中益氣加
炮薑二劑全愈

肝脾腎虧損頭目耳鼻等症五

給事張禹功目赤不明服祛風散熱藥反畏明重聽脉大而虛
此因勞心過度飲食失節以補中益氣加茯神棗仁山藥山茱
五味頓愈又勞役復甚用十全大補兼以前藥漸愈却用補中

薛氏醫抄 內稱精氣神
益氣加前藥而痊東垣云諸經脈絡皆走於面而行空竅其清
氣散於目而為精走於耳而為聽若心煩事冗飲食失節脾胃
虧損心火太盛百脉沸騰邪害孔竅而失明矣况脾為諸脉之
首目為血脉之宗脾虛則五臟之精氣皆為失所若不理脾胃
不養神血乃治標而不治本也

少宰李蒲汀耳如蟬鳴服四物湯耳鳴益甚此元氣虧損之症
五更服六味地黃丸食前服補中益氣湯頓愈此症若血虛而
有火用八珍加山梔柴胡氣虛而有火四君加山梔柴胡若因
怒就聾或鳴實用小柴胡加芎歸山梔虛用補中益氣加山梔
午前甚用四物加白朮茯苓久須用補中益氣午後甚用地黃
丸

少司馬黎仰之南銀臺時因怒耳鳴吐痰作嘔不食寒熱脇痛

用小柴胡合四物加山梔茯苓神陳皮而痊

尚寶劉毅齋怒則太陽作痛用小柴胡加茯苓山梔以清肝火
更用六味丸以生腎水後不再發

一儒者日晡兩目緊澁不能瞻視此元氣下陷用補中益氣倍
加參芪數劑全愈

一男子亦患前症服黃柏知母之類更加便血此脾虛不能統
血肝虛不能藏血也用補中益氣六味地黃而愈

一儒者兩目作痛服降火祛風之藥兩目如絳熱倦殊甚余用
十全大補湯數劑諸症悉退服補中益氣兼六味丸而愈後因
勞役午後目濇體倦服十全大補而痊

一男子房勞兼怒風府脹悶兩脇脹痛余作色慾損腎怒氣傷
肝用六味地黃丸料加柴胡當歸一劑而安

一儒者酒色過度頭腦兩脇作痛余以為腎虛而肝病亦用前藥頓安

一男子面白鼻流清涕不聞馨穢三年矣用補中益氣加麥門山梔而愈

一男子年二十素嗜酒色兩目赤腫或作或止兩尺洪大按之微弱余謂少年得此目當失明翌早索途而行不辨天日衆皆驚異余與六味地黃丸料加麥門五味一劑頓明
婦人症見女科撮要

脾肺腎虧損小便自遺淋瀝等症六

大司徒許函谷在南銀臺時因勞發熱小便自遺或時不利余作肝火陰挺不能約制午前用補中益氣加山藥黃柏知母午後服地黃丸月餘諸症悉退此症若服燥劑而頻數或不利用

四物麥門五味甘草若數而黃用四物加山藥黃柏知母五味麥門若肺虛而短少用補中益氣加山藥麥門若陰挺痿痺而頻數用地黃丸若熱結膀胱而不利用五淋散若脾肺燥不能化生用黃芩清肺飲若膀胱陰虛陽無以生而淋瀝用滋腎丸若膀胱陽虛陰無以化而淋瀝用六味丸若轉筋小便不通或喘急欲死不問男女孕婦急用八味丸緩則不救若老人陰痿思色精不出而內敗小便道澁痛如淋用加減八味丸料加車前牛膝若老人精已竭而復耗之大小便道牽痛愈痛愈欲便愈便則愈痛亦治以前藥不應急加附子若喘嗽吐痰腿足冷腫腰骨大痛面目浮腫太陽作痛亦治以前藥若痛愈而小便仍濇宜用加減八味丸以緩治之
詳見褚氏遺書精血篇但無治法耳
司徒邊華泉小便頻數濇滯短赤口乾唾痰此腎經陽虛熱燥

陰無以化用六味滋腎二丸而愈

司馬李榕山莖中作痛小便如淋口乾唾痰此思色精降而內
敗用補中益氣六味地黃而愈

考功楊朴菴口舌乾燥小便頻數此膀胱陽燥陰虛先用滋腎
丸以補陰而小便愈再用補中益氣六味地黃以補脾胃而安
若汗多而小便短少或體不禁寒乃脾肺氣虛也

司空何燕泉小便赤短體倦食少缺盆作痛此脾肺虛弱不能
生腎水當滋化源用補中益氣六味丸加五味而安商主客素
膏梁小便赤數口乾作渴吐痰稠粘右寸關數而有力此脾肺
積熱遺於膀胱用黃芩清肺飲調理脾肺用滋腎六味二丸滋
補腎水而愈

一儒者發熱無時飲水不絕每登廁小便澀痛大便壅痛此精

竭復耗所致用六味丸加五味子及補中益氣喜其謹守得愈
若肢體畏寒喜熱飲食用八味丸

儒者楊文魁痢後兩足浮腫胸腹脹滿小便短少用分利之劑
遍身腫兼氣喘余曰兩足浮腫脾氣下陷也胸腹脹滿脾虛作
痞也小便短少肺不能生腎也身腫氣喘脾不能生肺也用補
中益氣湯加附子而愈半載後因飲食勞倦兩目浮腫小便短
少仍服前藥頓愈

甲戌年七月余奉侍 武廟湯藥勞役過甚飲食失節復兼怒
氣次年春莖中作痒時出白津時或痛甚急以手緊捻纔止此
肝脾之氣虛也服地黃丸及補中益氣加黃柏柴胡山梔茯苓
木通而愈至丁酉九月又因勞役小便淋瀝莖痒竅痛仍服前
湯加木通茯苓澤瀉及地黃丸而愈

大尹顧榮甫尾闕作痒小便赤澹左尺脈洪數屬腎經虛熱法當滋補彼不信乃服黃柏知母等藥年許高骨腫痛小便淋瀝肺腎二脉洪數無倫余曰子母俱敗無能為矣後果歿
余甲辰仲夏在橫金陳曰野第會其外舅顧同厓求余診脈左尺澁結右寸洪數余曰此肺金不能生腎水誠可慮果至季冬莖道澁痛如淋愈痛則愈欲便愈便則愈痛而歿

脾肺腎虧損虛勞怯弱等症

庶吉士黃伯鄰發熱吐痰口乾體倦自用補中益氣湯不應余謂此金水俱虛之症兼服地黃丸而愈後背患一癩煩痛寒熱彼因前月嘗偕往視郭主政背疽郭不經意余決其殞於金旺之日果符余言已而郭氏妻孥感其毒皆患惡瘡伯鄰所患與郭患同心甚恐余曰此小瘡也憎寒等症皆陰虛舊症果是瘡

毒亦當補氣血余在筓就以地黃丸料煎與服之即睡良久各症頓退自後常有頭面耳目口舌作痛或吐痰眩暈之類服前藥即愈後任都憲督鹽法道出於蘇必垂顧焉

少司空何瀟川足熱口乾吐痰頭暈服四物黃連黃柏飲食即減痰熱益甚用十全大補加麥門五味山藥山菜而愈

一儒者或兩足發熱或脚跟作痛用六味丸及四物加麥門五味玄參治之而愈後因勞役發熱惡寒作渴煩躁用當歸補血湯而安

儒者劉允功形體魁偉冬日飲水自喜壯實余曰此陰虛也不信一日口舌生瘡或用寒涼之劑肢體倦怠發熱惡寒余用六味地黃補中益氣而愈

一男子腿內作痛用滲濕化痰藥痛連臀肉面赤吐痰脚跟發

熱余曰乃腎虛陰火上炎當滋化源不信服黃柏知母之類而
余甥居宏年十四而娶至二十形體豐厚發熱作渴面赤作脹
或外為砭血內用降火肢體倦怠痰涎愈多脉洪數鼓指用六
味丸及大補湯加麥門五味而痊

余甥凌雲漢年十六庚子夏作渴發熱吐痰唇燥遍身生疥兩
腿尤多色黯作痒日晡愈熾仲冬腿患瘡尺服洪數余曰疥腎
疔也瘡骨疽也皆腎經虛症鍼之膿出其氣氤氳余謂火旺之
際必患瘰癧遂用六味地黃十全大補不二旬諸症愈而瘰癧
具仍用前藥而愈抵冬娶妻至春其症復作父母憂之俾其外
寢雖其年少謹疾亦服地黃丸數斤煎藥三百餘劑而愈
其弟雲霄年十五壬寅夏見其面赤唇燥形體消瘦余曰子病
將進矣癸卯冬復見之曰子病愈深矣至甲辰夏胃經部分有

青色此木乘土也始求治先以六君加柴胡芍藥山梔蕪荑炒
黑黃連數劑及四味肥兒六味地黃二丸及參苓白朮歸芍山
梔麥門五味炙草三十餘劑肝火漸退更加膽草柴胡三十餘
劑乃去芍加肉桂三十餘劑及加減八味丸元氣漸復而愈

脾肺腎虧損遺精吐血便血等症

少宰汪涵齋頭暈白濁余用補中益氣加茯苓半夏愈而復患
腰痛用山藥山茱五味草薢遠志頓愈又因勞心盜汗白濁以
歸脾湯加五味而愈後不時眩暈用八味丸全愈

南銀臺許函谷因勞發熱作渴小便自遺或時閉濇余作肝火
血虛陰挺不能約制午前用補中益氣加山藥山茱午後服地
黃丸月餘諸症悉退

高麗陳石鏡久患白濁發熱體倦用補中益氣加炮薑四劑白

為稍止再用六味地黃兼服諸症悉愈

光祿柴繡庵因勞患赤白濁用濟生歸脾十全大補二湯間服而愈

司廳張檢齋陰囊腫痛時發寒熱若小腹作痛則莖出白津用

小柴胡加山梔膽草茺菀歸而愈

朱工部勞則遺精齒牙即痛用補中益氣加半夏茯苓芍藥并

六味地黃丸漸愈更以十全大補加麥門五味而痊

一男子白濁夢遺口乾作渴大便閉澀午後熱甚用補中益氣

加芍藥玄參并加減八味丸而愈

一男子莖中痛出白津小便秘時作痒用小柴胡加山梔澤瀉

炒連木通膽草茯苓二劑頓愈又兼六味地黃丸而痊

一男子發熱便血精滑○一男子尿血發熱○一男子發熱遺

精或小便不禁俱屬腎經虧損用地黃丸益氣湯以滋化源並

皆得愈

一男子鰥居數年素勤勞苦則吐血發熱煩躁服犀角地黃湯

氣高而喘前病益盛更遺精白濁形體倦怠飲食少思脉洪大

舉按有力服十全大補加麥門五味山茺山藥而愈

儒者楊啟元素勤苦吐血發瘧不知人事余以為脾胃虛損用

十全大補湯及加減八味丸而瘧愈再用歸脾湯而血止

一儒者因飲食勞役及惱怒眉髮脫落余以為勞傷精血陰火

上炎所致用補中益氣加麥門五味及六味地黃丸加五味眉

髮頓生如故

一男子年二十巔毛脫盡用六味地黃丸不數日髮生寸許兩

月復舊○吳江史萬湖云有男女偶合眉髮脫落無藥調治至

數月後復生

一童子年十四發熱吐血余謂宜補中益氣以滋化源不信用
寒涼降火愈甚始謂余曰童子未室何腎虛之有參芪補氣奚
為用之余述丹溪先生云腎主閉藏肝主疎泄二臟俱有相火
而其系上屬於心心為君火為物所感則易於動心動則相火
翕然而隨雖不交會其精亦暗耗矣又精血篇云男子精未滿
而御女以通其精則五臟有不滿之處異日有難狀之疾遂用
補中益氣及地黃丸而瘥

一男子咳嗽吐血熱渴痰盛盜汗遺精用地黃丸料加麥門五
味治之而愈後因勞怒忽吐紫血塊先用花蕊石散又用獨參
湯漸愈後勞則咳嗽吐血一二口脾肺腎三脉皆洪數用補中
益氣六味地黃而全愈

辛丑夏余在嘉興屠內翰第遇星士張東谷談命時出中庭吐

血一二口云久有此症遇勞即作余意此勞傷肺氣其血必散
視之果然與補中益氣加麥門五味山藥熟地茯神遠志服之
而愈翌早請見云每服四物黃連山梔之類血益多而倦益甚
今得公一七吐血頓止神思如故何也余曰脾統血肺主氣此
勞傷脾肺致血妄行故用前藥健脾肺之氣而壅血歸源耳後
率其子以師余余曰管見已行於世矣子宜覽之

肝脾腎虧損下部瘡腫等症九

通府黃廷用飲食起居失宜兩足發熱口乾吐痰自用二陳四
物益甚兩足數而無力余曰此腎虛之症也不信仍服前藥足
跟熱痒以為瘡毒又服導濕之劑赤腫大熱外用敷藥破而出
水久而不愈及用追毒丹瘡突如桃始信余言滋其化源半載得瘥
儒者章立之左股作痛用清熱滲濕之藥色赤腫脹痛連腰脇

腿足無力余以為是三陰虛用補中益氣六味地黃兩月餘元氣漸復諸症漸退喜其慎疾年許而痊

府庠鍾之英兩腿生瘡色黯如錢似癬者三四痒痛相循膿水淋漓晡熱內熱口乾面黧此腎虛之症用加味六味丸數日而愈此等症候用祛風敗毒之劑以致誤人多矣

一男子素遺精脚跟作痛口乾作渴大便乾燥午後熱甚用補中益氣加芍藥玄參及六味丸而愈餘症見外科樞要

脾肺腎虧損大便秘結等症十

一儒者大便素結服抽風順氣丸後胸膈不利飲食善消面帶陽色左關尺脉洪而虛余曰此是三陰虛也彼恃知醫不信乃服潤腸丸大便不實肢體倦怠余與補中益氣六味地黃月餘

而驗年許而安若脾肺氣虛者用補中益氣湯若脾經鬱結者

用加味歸脾湯若氣血虛者用八珍湯加肉苁蓉若脾經津液

涸者用六味丸若發熱作渴飲冷者用竹葉黃芪湯若燥在直

腸用猪膽汁導之若肝膽邪侮脾者用小柴胡加山梔郁李枳

殼若膏梁厚味積熱者用加味清脾散亦有熱燥風燥陽結陰

結者當審其因而治之若復傷胃氣多成敗症

一老儒素有風熱飲食如常大便十七日不通肚腹不脹兩尺

脉洪大而虛此陰火內燥津液用六味丸二十餘劑至三十二

日始欲去用猪膽潤而通利如常

一婦人年七十有三痰喘內熱大便不通兩月不寐脉洪大重

按微細此屬肝肺腎虛損朝用六味丸夕用逍遙散各三十餘

劑計所進飲食百餘碗腹始痞悶乃以猪膽汁導而通之用十

全大補調理而安若間前藥飲食不進諸症復作

一男子年五十餘因怒少食大便不利服潤腸丸大便秘結胸脇作痛欲兼服脾約丸肝脾腎脉浮而濇余曰此是三陰精血虧損之症也東垣先生云若人胃強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱小便數而大便難者用脾約丸若人陰血枯槁內火燔灼肺金受邪土受木傷脾肺失傳大便秘而小便數者用潤腸丸令滋其化源則大便自調矣如法果驗

一儒者懷抱鬱結復因場屋不遂發熱作渴胸膈不利飲食少思服清熱化痰行氣等劑前症益甚肢體倦怠心脾二脉濇滯此鬱結傷脾之變症也遂用加味歸脾湯治之飲食漸進諸症漸退但大便尚濇兩額赤色此肝腎虛火內傷陰血用八珍湯加茯苓麥門五味至三十餘劑大便自潤○一男子所患同前

不信余言服大黃等藥泄瀉便血遍身黑黯復求治余視之曰此陰陽二絡俱傷也經曰陽絡傷則血外溢陰絡傷則血內溢辭不治後果然

職坊陳莪齋年踰六旬先因大便不通服內疏等劑後飲食少思胸腹作脹兩脇作痛形體倦怠兩尺浮大左關短濇右關弦濇時五月請治余意乃命門火衰不能生脾土而肺金又剋肝木憂其金旺之際不起後果然

各症方藥

小柴胡湯 治肝膽症寒熱往來或日晡發熱或濕熱身熱默默不欲食或怒火口乾耳聾咳嗽發熱脇下作痛甚者轉側不便兩祛痞滿或泄瀉咳嗽或吐酸食苦水或因怒而患瘧

痢等症

痢等症

柴胡二錢 黃芩五分 人參 半夏各七 甘草各五

右薑水煎服

加味小柴胡湯

治血虛大勞大怒火動熱入血室或婦女經行感冒發熱寒熱如瘧夜間熱甚或譫語即前方加生

黃芩半夏生薑湯

治膽腑發咳嘔苦水如膽汁

右薑水煎服

桔梗湯

治心臟發咳咳而喉中如梗狀甚則咽腫喉痺

右水煎服

芍藥甘草湯

治小腸腑發咳咳而失氣

甘草各五

人參

半夏各七

甘草各五

生薑各三

甘草各

半夏各二

苦梗三錢

甘草六錢

甘草各四錢

右水煎服

升麻湯

治脾臟發欬欬而右脇下痛痛引肩背甚則不可動

右水煎服

烏梅丸

治胃腑發欬欬而嘔嘔甚則長蟲出

人參

當歸

右為末用酒浸烏梅一宿去核蒸之與米飲搗如泥丸桐子

大每服三十九白湯下

麻黃湯

治肺臟發欬欬而喘急有聲甚則唾血

麻黃三錢

桂枝二錢

甘草一錢

杏仁二十

烏梅三十

細辛

附子

桂枝

黃連一兩

黃連五錢

黃柏各六

蜀椒各四

乾薑一兩

黃連一兩

黃連五錢

右水煎服

赤石脂禹餘糧湯

治大腸腑發欬欬而遺尿

赤石脂

禹餘糧各二兩并打碎

右水煎服

麻黃附子細辛湯

治腎臟發欬欬則腰背相引而痛甚則欬

涎又治寒邪犯齒致腦齒痛宜急用之緩則不救

麻黃

細辛各二錢

附子一錢

右水煎服

茯苓甘草湯

治膀胱腑發欬欬而遺溺

茯苓二錢

桂枝二錢半

生薑五片大

甘草炙一錢

右水煎服

異功散 治久欬不已或腹痛少食而腫氣逆又治脾胃虛弱

飲食少思等症

人參 茯苓

甘草 啞皮各等分

每服三五錢薑棗水煎

洪製清氣化痰丸 順氣快脾化痰消食

半夏 南星去皮尖 白礬 皂角切 乾薑各四兩

右先將白礬等三味用水五碗煎取水三碗却入半夏二味

浸二日再煮至半夏南星無白點為度晒乾

陳皮 青皮去穢 紫蘇子炒 蘿蔔子炒另研

杏仁去皮尖炒研 葛根 神麴炒 麥蘖炒

山查子 香附子各二兩

右為末蒸餅丸桐子大每服五七十九臨臥食後茶湯下

升陽益胃湯 治脾胃虛弱肢體怠惰或體重節痛口舌乾渴

飲食無味大便不調小便頻數飲食不消兼見肺病酒浙惡寒悽慘不樂乃陽不和也

羌活 獨活 防風各五 柴胡 白朮

茯苓湯者不用澤瀉各三人參 半夏 甘草各一兩

黃芪二兩芍藥 黃連 陳皮各四

右每服三五錢薑棗水煎早溫服如小便愈而病益加是不宜利小便也當少減茯苓澤瀉

左脉散 治熱傷元氣肢體倦怠氣短懶言口乾作渴汗出不止或濕熱大行金為火制絕寒水生化之源致肢體痿軟脚軟眼黑最宜服之

人參 五味子 麥門冬各三

右水煎服

清燥湯 治元氣虛濕熱乘之遍身痠軟或肺金受邪絕寒水生化之源腎無所養小便赤少大便不調腰腿痿軟或口乾作渴體重麻木頭目眩暈飲食少思或自汗盜汗肢體倦怠胸滿氣促

黃芪一錢五分 五味子九粒 黃連 神麴炒

猪苓 柴胡 甘草各各 蒼朮

白朮 麥門冬 陳皮 生地黃

澤瀉各五 白茯苓 人參 當歸

升麻各三 黃柏酒拌

右水煎服

清暑益氣湯 治元氣弱暑熱乘之精神困倦胸滿氣促肢節疼痛或小便黃數大便溏瀝又暑熱瀉痢瘧疾之良劑

降天醫安

內科簡要下卷

七

七

薛氏醫案 內科雜症下卷

升麻 黃芪炒去汁各一錢 蒼朮一錢五分 人參 白朮 陳皮 神麴炒各五分 甘草炙

右水煎服 乾葛各三分 五味子九粒炒

香茹飲加黃連各黃連香茹飲 治一切暑毒腹痛霍亂吐瀉或頭痛昏憤 茯苓 白扁豆 厚朴 甘草各二分

右水煎服 麥門冬湯 治火熱乘肺欬唾有血 防風 白茯苓各二分 人參一錢

二神丸 治脾腎虛弱侵晨五更作瀉或全不思食或食而不化大便不實神効 白荳蔻 砂仁 葛花各半兩 木香五分 青皮三錢

葛花解醒湯 治酒積上下分消 陳皮 白茯苓 猪苓 人參各一錢半 白朮 神麴炒

右為末每服五錢白湯調得微汗酒病去矣 澤瀉 乾薑各二錢

益黃散 治脾土虛寒寒水反來侮土而嘔吐不食或肚腹作痛或大便不實手足逆冷等症 陳皮一兩 青皮 阿子肉 甘草炙 丁香各二錢

人參安胃散 治脾胃虛熱嘔吐或泄瀉不食 人參一錢 黃芪二錢 生甘草各五分 炙甘草各五分 白芍藥七分

白茯苓四分 陳皮三分 黃連二分

薛氏醫案 內科雜症下卷

薛氏醫案 內科雜症下卷

薛氏醫案 內科雜症下卷

薛氏醫案 內科雜症下卷

薛氏醫案 內科雜症下卷

薛氏醫案 內科雜症下卷

右水煎服

人參養胃湯

治外感風寒內傷飲食寒熱頭疼或作瘧疾

半夏

厚朴

橘紅各八分

藿香葉

草菓

茯苓

人參各五分

甘草各三分

蒼朮三分

右薑七片烏梅一箇水煎服

藿香正氣散

治外感風寒內停飲食頭疼寒熱或霍亂泄瀉或作瘧疾

或作瘧疾

桔梗

大腹皮

紫蘇

茯苓

厚朴製各一分

甘草各五分

藿香一分

右薑棗水煎熱服

白虎湯

治胃熱作渴暑熱尤効

知母

石膏各二分

粳米手合

右水煎服

竹葉黃芪湯

治胃虛火盛而作渴

淡竹葉二錢

黃芪

生地黃

麥門冬

當歸

川芎

甘草

黃芩炒

石膏煨

芍藥

人參各一分

右水煎服

竹葉石膏湯

治胃火盛而作渴

淡竹葉

石膏煨

桔梗

木通

薄荷葉

甘草各一分

右水煎服

四七湯

治七情鬱結心腹絞痛或為膨脹

人參

官桂

半夏洗七次

各一錢

甘草各五分

右薑水煎服

青州白丸子

治風痰咳嗽或牙關緊急或痰喘體麻

南星 三兩 半夏 七兩 白附子 二兩 川烏 半兩各

右為末絹袋盛井水擺浸仍換水浸三五日晒乾糯米粉丸
如急用以薑汁糊丸亦可

左金丸 一名四金丸 治肝火脇刺痛或發寒熱或頭目作痛或大便
不實或小便淋秘或小腹疼痛一切肝火之症

黃連 六兩 吳茱萸 一兩湯煮片時用
右為末粥丸白木陳皮湯下

當歸龍薈丸 治肝經實火大便秘結小便澀滯或胸膈作痛
陰囊腫脹凡屬肝經實火皆宜用之

當歸 龍膽草 梔子仁 黃連 黃芩 各一兩
大黃 蘆薈 青黛 各伍錢 木香 二錢五分 麝香 另研五分

右為末炒神麴糊丸每服二十九薑湯下

神效黃芪湯 治渾身或頭面手足麻木不仁目緊縮小及羞
明畏日或視物不明

黃芪 二兩 人參 八錢 甘草 炙 白芍藥 蔓荊子 各一兩
陳皮 五錢

右每服五錢水煎臨臥熱服如麻木不仁雖有熱症不用黃
栢加黃芪

益氣聰明湯 治久病或因剋伐脾胃傷損眼目昏暗或飲食
失節勞役形體脾胃不足得內瘴耳鳴之患或多年眼目昏
暗視物不明此藥能令廣大聰明久服無內瘴外瘴耳鳴耳
聾等症

黃芪 甘草 人參 各五錢 升麻 葛根 各三錢
蔓荊子 一錢五分 芍藥 黃栢 酒炒各一錢

神效黃芪湯 神效黃芪湯 神效黃芪湯

右每服五錢水煎臨臥并五更服

芍藥清肝散 治眵多眊燥緊澁羞明赤脉貫睛臟腑秘結

白朮 甘草 川芎 防風 荆芥

桔梗 羌活 芍藥 柴胡 前胡

薄荷 黃芩 山梔 知母 滑石

石膏 大黃 芒硝

右水煎食後熱服

黃連天花粉丸 治症同上

黃連 菊花 川芎 薄荷 天

連翹 黃芩 梔子 黃柏

右為末滴水丸桐子大每服五十九加至百丸食後臨臥茶

湯下

啼鼻通氣散 治眼腫脹赤昏暗羞明癰澁疼痛或風痒鼻塞

頭痛腦酸外翳攀睛眵淚稠粘

鴛不食草 青黛 川芎

右為末含水滿口每用如米許啼鼻內淚出為度

選奇湯 治風熱上壅眉稜骨痛或頭目眩暈

羌活 防風 甘草 黃芩

右每服三錢水煎時服

助陽活血湯 治眼睫無力常欲垂閉餘治同上

黃芪 甘草 防風 當歸 白芷

蔓荆子 升麻

右水煎食後熱服

益陰腎氣丸 治症同上

醫方匯考 內科雜要 卷下

熟地黃 三兩 當歸 酒洗 柴胡 五味子 乾山藥

山茱萸 去核各半兩 茯苓 澤瀉 各二錢半 生地黃 酒炒四兩

右為末煉蜜丸桐子大每服百丸茶湯下日三服

連翹飲 治目中溜火惡日與火癰澁小角紫久視昏花迎風有淚

蔓荊子 生甘草 連翹 各三錢 柴胡 五錢 黃芩 酒製五分

生地黃 當歸 紅葵花 人參 各三錢 黃芪 五分

升麻 一錢 防風 羌活 各二錢

右水煎服

地芝丸 治目不能遠視能近視或防近視

生地黄 焙乾四兩 天門冬 去心 枳殼 麩炒 真甘菊花 各二兩

右為末煉蜜丸桐子大每服百丸茶清或溫酒下

定志丸 治目不能近視反能遠視

白茯苓 人參 各二兩 遠志 去心 菖蒲 各一兩

右為末煉蜜丸桐子大以硃砂為衣每十丸至三十丸米飲食後下日三服

大蘆薈丸 一名九味蘆薈 治大人小兒下疳潰爛或作痛又治肝疳食積口鼻生瘡牙齦蝕爛

胡黃連 黃連 蘆薈 木香 白蕪荑 炒

青皮 白雷丸 鶴虱草 各一兩 麝香 三錢

右為末蒸餅糊丸如麻子大每服一錢空心米飲

四味肥兒丸 一名小肥兒丸 治諸疳發熱日生雲翳口舌生瘡或牙齦腐爛肌肉消瘦遍身生瘡等症與地黃丸兼服

黃連 炒 蕪荑 炒 神麩 炒 麥芽 炒各等分

右各為末水糊丸桐子大每服二三十丸空心白湯下

阿魏膏 治一切瘡塊更服胡連丸

羌活 獨活 玄參 官桂 赤芍藥

川山甲 生地黄 兩頭尖 大黃 白芷

天麻各五錢 槐柳桃枝各三錢 紅花四錢 木鱉子廿枚

亂髮如雞子大一塊

右用香油二斤四兩煎黑去粗入髮煎髮化仍去粗徐下黃丹煎軟硬得中入芒硝阿魏蘇合油乳香沒藥各五錢麝香三錢調勻即成膏矣攤貼患處內服九藥黃丹須用真正者効凡貼膏藥先用朴硝隨患處鋪半指厚以紙蓋用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥若是肝積加蘆薈末同熨

桃仁承氣湯 治血結胸中手不可近或中焦蓄血寒熱胸滿

漱水不欲嚥善忘昏迷其人如狂

桃仁半兩 大黃一兩 甘草二錢 桂三錢 芒硝三錢

右每服一兩薑水煎

抵當湯 治下部蓄血腹內作痛手不可近或發狂少腹滿硬

小便自利大便反黑如狂者在中發狂者在下也

大黃 水蛭炒各半兩 蟪蟲去翅足 桃仁各三錢

右每服五錢水煎服如作丸煉蜜和之

花蓋石散

硫黃赤色明淨者四兩 花蓋石一兩

右各為末拌勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦礫一箇泥乾入藥仍用泥封口候乾用炭周疊煨赤罐冷取出為細末每服

一錢重便酒下

搜風順氣丸 治痔漏風熱閉結

車前子 一兩 五錢 大麻子 微炒 大黃 五錢半 生半熟 牛漆 酒浸

郁李仁 兔絲子 酒浸 枳殼 山藥 各二錢

右為末煉蜜丸桐子大每服三十九白湯下

五淋散 治膀胱有熱水道不通淋澀不出或尿如豆汁或成

砂石或如膏汁或熱拂便血

赤茯苓 一錢 五分 赤芍藥 山梔 各一錢 當歸 甘草 各一錢 二分

右入燈心水煎服

加味逍遙散 治肝脾血虛發熱或潮熱晡熱或自汗盜汗或

頭痛目澀或怔忡不寧或頰赤口乾或月經不調肚腹作痛

或小腹重墜水道澀痛或腫痛出膿內熱作渴等症

當歸 芍藥 茯苓 白朮 炒 柴胡 各一錢

牡丹皮 山梔 炒 甘草 炙各五分

右水煎服

逍遙散即前方去山梔牡丹皮

還少丹 治脾腎虛寒飲食少思發熱盜汗遺精白濁又治真

氣虧損肌體瘦弱等症

肉從容 遠志 去心 茴香 巴戟 乾山藥

枸杞子 熟地黃 石菖蒲 山茱萸 去核 牛膝

杜仲 去皮 薑製 楮實子 五味子 白茯苓 各一兩

右各另為末和勻用棗肉百枚并煉蜜丸桐子大每服五七

十九空心溫酒或鹽湯下日三服

交加散 治食瘧神効

薛氏醫案

內科商要下卷

三

肉苳蔻 生二箇一煨 草苳蔻 生二箇一煨 厚朴 用二錢半製

甘草 生二錢半炙 生薑 生一兩煨五錢

右薑水煎發日五更服

仲景白虎加桂枝湯 治溫瘧

知母 六錢 甘草 錢二 石膏 五錢 桂枝 一錢 粳米 一合

右水煎服此太陽陽明經藥也

柴胡桂薑湯 治寒多微有熱或但寒不熱名曰牝瘧

桂枝 黃芩 牡蠣 甘草 炙 乾薑 各一錢

括蕤根 柴胡 各二錢

右水煎服汗出即愈此少陽經藥也

桂枝羌活湯 治瘧處暑以前發頭項痛脉浮惡風有汗

桂枝 羌活 防風 甘草 各一錢五分

右水煎發而服如吐加半夏麩

麻黃羌活湯 治症如前但惡風而無汗

麻黃 去節 羌活 防風 甘草 各半兩

右如前服加法同已上二方太陽經藥也

白芷湯 治瘧病身熱目痛熱多寒少脉長先以大柴胡下之

餘熱不盡當服此藥

白芷 一兩 知母 一兩七錢 石膏 四兩

右依前服此陽明經藥也

桂枝芍藥湯 治瘧寒熱大作不論先後此太陽陽明合病寒

熱作則必戰慄經曰熱勝而動也發熱汗出不愈內熱也此

湯主之

桂枝 五分 黃芪 知母 石膏 芍藥 各二錢

右水煎此太陽陽明經藥也

桂枝黃芩湯 如服前藥轉劇三陽合病也宜此和之

柴胡一分錢 黃芩一分 人參一分 甘草一分 半夏一分

石膏一分 知母一分 桂枝一分

右依前服如外邪已解而內邪未已從卯至午發者宜大柴胡下之從午至酉發者邪氣在內也宜大承氣下之從酉至子發者或至寅發者邪氣在血也

桂枝石膏湯 治瘧隔日發先寒後熱寒多熱少

桂枝五錢 黃芩一兩 石膏一兩 知母各一分

右水煎分三服此太陽陽明經藥也

麻黃黃芩湯 治瘧發如前而夜發者

麻黃一兩 甘草一分 桃仁三十箇 黃芩五錢 桂枝二錢

右有依前服桃仁味苦甘辛肝者血之海血驟則肝氣燥經所謂肝苦急急食甘以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發此湯發散血中風寒乃三陰經藥也

連九 治痢疾并水瀉暑瀉甚効

黃連淨二兩 吳茱萸去枝梗

右先將二味用熱水拌和入磁器內置熱湯頓一日同炒至黃連紫黃色去茱萸用連為末每末四兩入木香末一兩淡醋米飲為丸桐子大每服二三十丸滾湯下久痢中氣下陷者用補中益氣下中氣虛者用四君子下中氣虛寒者加薑桂

三黃丸 治熱痢腹痛或口舌咽喉齒痛及一切實火症

黃芩 黃連 黃柏各等分

右各另為末水丸桐子大每服七八十丸白湯下

薛氏醫案

內科醫案下卷

也

也

也

也

芍藥湯 治便血後重經曰洩而便膿血知氣行而血止也行血則便自愈調氣則後重自除

芍藥 一兩 當歸 黃連 各半 檳榔 木香

甘草 二錢 桂 二錢 黃芩 五錢

右每服半兩水煎如痢不減加大黃

加減濟生腎氣丸 治脾腎虛腰重脚腫小便不利或肚腹腫

脹四肢浮腫或喘急痰盛已成蠱疴其効如神

白茯苓 三兩 附子 半兩 川牛膝 肉桂 去皮 澤瀉

車前子 山茱萸 山藥 牡丹皮 各一錢 熟地黃 四兩 酒拌 搗碎 杵膏

右為末加煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心服湯下

三因當歸散 治脾土不能制水水氣盈溢滲透經絡發為腫

木香 赤茯苓 當歸 桂 木通

赤芍藥 牡丹皮 檳榔 陳皮 白木 各等分

右每服五錢水煎服

不換金正氣散 治脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發寒熱

或作瘧疾

厚朴 去皮 薑製 藿香 半夏 薑製 蒼朮 米泔

陳皮 各一錢 甘草 各五分

右薑棗水煎服

七味白朮散 治中氣虧損津液短少口舌乾渴或口舌生瘡

不喜飲冷或吐瀉後口乾最宜服

人參 白朮 木香 白茯苓 甘草

藿香 各五分 乾葛 一錢

右水煎服

參苓白朮散 治脾胃不和飲食少進或嘔吐泄瀉凡病後宜此調理

人參 茯苓 白扁豆去皮薑汁拌炒 白朮炒 蓮肉去皮
砂仁炒 薏苡仁炒 桔梗炒 山藥 甘草各二兩

右為末每服二三錢用石菖蒲湯下或作丸

半夏湯 治膽腑實熱精神恍惚寒熱泄瀉或寢寒增風善息

半夏一錢五分 黃芩一錢 遠志一錢 生地黃二錢

秫米一合 酸棗仁三錢 宿薑一錢五分

右長流水煎服

犀角地黃丸 治血虛火盛血妄行吐衄便下若因忿怒而致

加山梔柴胡

犀角鎊末 生地黃 白芍藥 牡丹皮各一錢半

右水煎傾出入犀角末服之

參平肺散 治心火刑肺金患肺痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸

膈痞滿咽嗑不利

人參四分 青皮四分 茯苓七分 天門冬四分 陳皮五分

地骨皮五分 甘草炙五分 知母七分 五味子一十粒 桑皮一錢

薑水煎服

清涼飲 治實熱便秘或喉中腫痛

當歸 赤芍藥 甘草炙 大黃蒸各等分

右每服五錢水煎服

清胃散 治醇酒厚味唇齒作痛或齒齦潰爛或連頭面頸項作痛

黃連炒一錢五分 當歸 生地黃 牡丹皮各一錢 升麻二錢

薛氏醫案 內科 卷下

右水煎服

加味清胃散即前方加犀角連翹甘草

涼膈散 治實熱喉舌腫痛便弱秘結

大黃

朴硝

甘草

梔子仁

黃芩

薄荷葉

各一兩

連翹

四兩

右為末每服四五錢竹葉蜜少許煎服仍量加減

潤腸丸 治伏火風熱大腸乾燥若因失血或因腎不足當滋

腎最忌此丸

麻子仁

桃仁 去皮尖另

當歸尾

大黃

皁角仁

秦艽 各五錢

右另研為末煉蜜丸猪膽汁丸尤妙每服三十丸食前滾湯

下若燥在直腸用猪膽汁導之亦忌煎藥

腎丸 治熱在血分不渴而小便不利或腎虛足熱腿膝無力不能履地

力不能履地

知母

酒炒

黃柏 酒炒各二兩

肉桂 二錢

右各另為末水丸桐子大每服二百丸空心白滾湯下

黃芩清肺飲 治肺熱小便不利宜用此藥清之

黃芩

一錢

山梔 二錢

右小煎服不利加鹽豉二十粒

清心蓮子飲 治熱在氣分口乾作渴小便白濁夜安晝熱或

治口舌生瘡咽乾煩躁作渴小便赤淋

黃芩

炒

麥門冬

地骨皮

車前子

炒

甘草

各一錢半

石蓮肉

茯苓

黃芪

柴胡

人參

各一錢

右每服五錢水煎服

調中益氣湯 治濕熱所傷體重煩悶口失滋味二便清數或

痰嗽稠粘熱壅頭目體倦少食等症

黃芪 一錢 人參 去蘆 甘草 蒼木 各五分 柴胡

橘皮 升麻 木香 各二分

右水煎空心服

三生飲 治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂并痰厥氣

南星 一兩 川烏 去皮生用 附子 去皮生用 木香 二錢

右每服五錢薑水煎

秦艽升麻湯 治風寒客手足陽明經口服喎斜惡見風寒四

肢拘急脉浮緊

升麻 乾葛 甘草 芍藥 人參

秦艽 白芷 防風 桂枝 各三分

右每服一兩葱白二根水煎

愈風丹 治諸風肢體麻木手足不隨等症

天麻 牛膝 同酒浸 草薢 方研 玄參 各六

杜仲 七兩 羌活 十四兩 當歸 熟地黃 自製

生地黃 各一 獨活 五兩 肉桂 三兩

右為末煉蜜丸桐子大常服五七十九病大至百九空心食

前溫酒或白湯下

地黃飲子 治腎氣虛弱舌瘡不能言足廢不能行

熟地黃 巴戟 去心 山茱萸 去核 肉蓯蓉 酒浸

附子 炮 五味子 石斛 白茯苓

石菖蒲 遠志 去心 官桂 麥門冬 去心各

右每服三錢入薄荷少許薑棗水煎服

內科商要下卷

徐方見上卷

卷之二

三

