方輿輗

二

經閉一　赤白沃崩中漏下四十

乳病九十

十武日
5
2

中武少門
號 595
卷 2

方輿輗卷之二目次

經閉
桂枝茯苓丸
桃核承氣湯
抵當湯
大黃牡丹湯
瓜子仁湯
午時散
紅藍花酒
鶏胡茱湯

當皈四逆湯
小柴胡湯
大柴胡湯
柴胡桂枝湯
柴胡加芒硝湯
四順湯
下瘀血丸
消黃丸
地黃煎丸
終始丸

奪命丹
羽澤散
續方
陳自明通經丸科
赤白沃崩中漏下
括蔞根湯
瓜子仁湯
薏苡附子敗醬散
桂枝茯苓丸
芎歸膠艾湯

黃土湯
黃連解毒湯
四逆加人參湯
獨參湯
溫經湯
當皈四逆湯
當歸建中加地黃阿膠湯
當歸四逆加吳萸生姜湯
小柴胡湯
柴胡桂枝乾姜湯
逍遙散
歸脾湯
消黃丸
無憂散
羽澤散
烏苗丸
灸
乳病
蒲公英湯
治產后妬乳方

柴胡桂枝湯
小柴胡湯
十味敗毒湯
排膿湯
梓葉湯
櫻皮湯
加味逍遙散
加味歸脾湯
青橘飲
治乳腫痛方

黒龍散
灸法
續方
神効瓜蔞湯

方輿輗卷之二

有持二名先生口授

経閉

經トハ時ヲ違ワス常ヲ違ヘス來ル故ニ名ク閉トハ一向ニ不通事也經閉ニモイロ〳〵アリ而レヒ経閉ニテ總タル名也其イロ〳〵アル云ハ或多或少或期ニ先キタツテ來リ或期ニ後レテ來リ或三四月ノ閉モアリ或三四年ノ閉モアル也妻寡ヒニ経閉トナシテ可也何トナレハ治法ニ取テハ一ナレハ也方書ニハ経閉ト云門ヲ立テ又次ニ経水不調ト云門ヲ別ニ設ケ

テアリ非也別ニ門ヲ不立メ經閉ニスヘテヨキ也

桂枝茯苓丸方見婦人雜病条

此ニ擧シ桂枝茯苓丸桃核承氣湯抵當湯ニテ經閉ノ三道此三方ニテ總テ也它ノ方モ右ノ三方ニ屬メ右ノ三方ヨリ推メユカルヽナリ其内桂枝茯苓丸ハ經水二三月閉ル者ニ用ユ金匱ニハ癥病ニ用テ塊ヲ下ス藥ニ用テアリシカレ𪜈今コレヲ用ルニハ癥病ニ用テハキカヌヽ且經閉ハ二三月不調トテ塊ヲ結フ者ニアラス常躰ハ一年モ不經ハ塊モナキモノ也其塊アルニ至テハナカヽ桂枝茯苓丸ニテハユカヌ也又別ニ下地塊アリテ此度經閉ノ急ニ下地ノ塊ヲトヽカサヌヲナス者ニ三月ノ間ノモノハ桂枝茯苓丸ニテヨキモノ也コレヲ用テモ不通寸ハ桃核ヲ抵當ニモ及フ也桂枝茯苓丸經閉ニ用ルニハ其人ノ虛實ヲ不問ツ子ニ大黄ヲ加ルヽ此方煎藥ハカリニモアラス丸藥ニメモキクモノ也或煉藥ニメ用テモヨシ頃日タノマレテ丸藥ニメクレイ伝ニツキテ無擾丸藥ニナシ用ルニ輕キハ隨分丸ニメモ効アル也コレハ煎藥ヲノマヌ者カ或ハ灸用ニメ藥ノ世話ノ出來ヌ者ハ丸ヲ用ヘシ此方雉娠中ノ一通リノ處ニハ大黄

ヲ不加用ル也シカレ𪜈加ユヘキ証ナレハイツニテモ加ル也

桃核承氣湯少腹急結者　桃挾　大黄各一錢二分　桂枝甘草　芒硝各六分　右五味以水二合煮取七勺内消令消先食温服當微利

○此方ハ抵當トハリ合セテ用ヒ分ヘシ其証ノ別ハ桃核承氣ハ血下ル者抵當ハ血不下モノ腹ハ急結メモ桃核承氣ノ方ハ桑カニ抵當ハ硬ク併シ是ハ大段也抵當ノ腹ニメモ血下ル者ナラハ桃核承氣ヲ用子ハナラヌ事アリ腹ヨリハ血ノ方カヲモニ目的ニセ

子ハナラヌ也又桃核ハ動ク者抵當ハ不動者也輕重テ云ハ抵當ハ重ク桃核承氣ハ輕キ様ナレトモ數年ノ經閉ニメ重キ様成者ニ桃核ノ証有一年ヤソコラノ輕キ様ナル者ニ抵當ノ証有故ニ二方ノ別ハ新久ヲ以テハ云レヌ事也此桃核承氣ノ血下ルト云治驗アリ今爰ニ人アリ経水月毎ニ下ト雖至テ少也渋ル者ニ桃核承氣効アリ又経水不調ニテ一日ハ有一日ハ無者ニモ此方ヲヤル経ノ一向ナキ月ニモ不調ニトリテ桃核ヲ用ル也其経水有テモ少ナキト云者ハ腹カラ腰ヘカケテ痛ム者ノ其甚キハ腰腹ノ痛ムカ

為ニ譫語スル者アリ是ハ別ニ熱有テ譫語スルニ非
ス腰腹痛ムカ為ニ譫語スル者也夫ニ付テシツカリ
トシタル治驗有月経毎ニ腰腹痛ミチキレル如クニ
テ今月経終レハ來月ノ経ノ時ヲ按シワツライ其下
ル経モ僅ハカリニメ紫黒色ノ血ヲ下ス月々ニナヤ
マスアリ此如ニメ年月ヲ経テ難儀メ居者世間々ゝ
アル者ゝ是ニ一術アリサツハリト根治スル者也右
ノ証ハ持病杯ノ如ニ成テ難義メ居也其術ト云ハ経
水ノ來ル時桃挾承氣ヲニ三貼用レハ痛モ譫語モ止
者也大抵二貼用レハ血不下メモ痛ハユルム者也ソ

ロく腰腹痛ミカケテ経ノ通レカケテ來ラハ此方ヲ
用ヘシ四五貼ヲ不過メ必効アル者也又來月ニ経来
ル時ハ如此スヘシ又問ニテ經終ルト來月経水ノ前
迫本戛方ノ琉珀散ヲ用テヨク也経水來リタラ琉珀
散ハ徹メ桃核承氣ヲ用ル也右ノ如クメ輕キハ半年
重キハ一年ノ間ニハ必効有テ全ク愈ル者ゝ妙成者
也右ノ処杯ニテ桃核ノ効有ヲ見ハ實ニ聖方ト云フ
ヲ知ル也琉珀散ハ黒豆ト酢杯ニテ服シニクキ者也
強テ用ヘシ琉珀ハ方中ニ入テ無レトモ色ヲ以テ名
ケシ者也此藥ヲ懈怠ナリ可用右ノ証ハ滞患トテ持

病ニ成テアリ劇シキノ治術也今又是ヲ平生ノ軽キ
経水ノ不調ニ右ノ如クニ成シ用ルハサスレハ病人
モ煎薬ハ僅ニメ平生ハ散薬故養生モヨキ者也
〇右ニ云シ経水利スル時腰腹痛ニ甚キハ痛ニ不堪
メ叫喚スル者アリ経水ノ来ラントスル前痛ム者ハ
血ヲ不見メモ桃挟ヲヤルヘ然レトモハヤ其時ハ血
隨テ来ル者ヘ此如クナシテ琥珀散ト互ニ服シイレ
ハ或三月ト五月トノ間ニハ宿疾自愈ルヘ若右ノ桃
核承氣ヲ用ル湯ヲ不飲者ハ硝石大圓ヲ用ルヘ又其
腰腹痛甚メ譫語抔モ有程ハケシキハ下地ニ琥珀散

ヲ用レトモ但腰腹痛ノミアレハ桃核承氣ヲ但経水
ノ来ラントスル時ヨリ経水ノ時ハカリ用テヨキヘ
又琥珀散ノ場逐瘀ノ劑ナレハヨキナリ必シモ琥珀
散ニ不限也ナレ共琥珀散ハヨク効アル者故ニ用ル
ヘ右ノ腰腹痛ニ譫語メ経水ノ来ル者ハ其血色常ト
違ヒ赤小豆汁ノ如キ者ヤ或塊物抔ヲ下スモ有ヘ琥
珀散ハ余モ本方ノ通リニ製シ散トシ用ルヘ也其内方
後ニ有烏薬玄胡索ノ入ル変方ヲ用ルヘ此散一日ニ
三度一度ニ五分ツヽ酒ニテ用ルヘ至テ虫ノツキヤ
スキ薬ヘ熟乾地黄トアルハ乾地黄ヲ用ルヘ也〇許叔

微字可知本事方卷十婦人諸疾門云治婦人月經壅滯每發心腹疠痛不可忍及治產后惡露不快血上捻上迷悶不省氣絶欲死琥珀散（琥名ナリ）荆三稜（荆名ナリ）制蓬莪茂（蓬名ナリ）制赤芍藥劉寄奴去梗牡丹皮去心宮桂不見火熟乾地黃菊花去蓋真蒲黃當皈乾秤各一兩細剉右前五味用烏豆一升生姜半斤切片米醋四升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為末每服二錢温酒調下空心食前服一方不用菊花蒲黃用烏藥玄胡索亦佳予家之秘方也若是尋常血氣痛只一服產後血衝心二服便下常服尤佳予前後救人急切不少此藥易合宜多合以救人

○桃核承氣ト桂枝茯苓丸トノ別ハ桃核ニハ如狂少腹急結アリ桂枝茯苓丸ニハ其証ナシ是ヲ弁別トス

○婦人ノ夜分ニ成テ腹滿スル者血証ト定メテ抵當桃核承氣ノ類ヲ用テ百發百中也金匱ノ腹不滿我滿ノ証モ血証ニ定メテヨケレトモ夫ハ當ル者モ有不當モアリ故ニタレカニハ當ニナラヌ也夜分ノ腹滿ニテ決スルハ頗ト違ニナキ者也腹滿ノ事ヲ医ノ方ヨリ不問前ニ病人ヨリ發語スルコモアル也又瘀血帯下トモニ唇吞乾燥セヌ者モアル也故ニ是モ當ニナラヌコ有又目覺ニ口中乾燥スル婦人ナラハ帯下

経閉ノ其内経閉ニテモ此証ヲ見ハス者ハ乾血ノ男子
ニテモ血証ノ即津液ノ亡證也
○瘀血塊ハ處ヲカヘテ左右上下セヌ者ノ假令其候
血塊ニ似タリトモ若左右上下ノ処ヲカヘル者ハ血
塊ニ非ストスルノ又凡血塊ハヤワリトシタル者ノ
久キヲ経ル時ハ硬成者モアレトモ大抵ハヤワリト
シタル者ノ
○少腹急結ヲ以一歩ニ桃核承氣ノ腹ト定テ云レヌ
ノ疝ニテ少腹急結スル者モアリ毒ニテ少腹急結ス
ル者モアリ急ハ拘急ノ結ハ磊塊ノ瘀血ニハ急ヨリ
結カ主ニナル疝ヤ毒ニハ結ヨリ急カ主ニ成ノ又
瘀血ニヨル者ハ左ニアリ又急結ノ結ハ一ツ位ノ
瘀血ニテ一ツ位ノ結アル者ニ非ス又少腹硬満スル
時ハ譬急結有テモ見ヘヌ者ノ即抵當湯ノ所之ノ
シ夫ニテモ外証ヲ參考メ桃核承氣ヲマル事アリ或
ハ少腹急結ニメ抵當湯ノ之ノ一モ有ノ凡二方ノ別
急結硬満新久軽重ニテ別ツ者ハ大法ノナレトモ必
是ニ拘ハルヘカラス又急結ノアル者カ二三年程ノ
間ニ漸々ニ大ニナリ后ニハ一処ニ成テ少腹一面ニ

硬滿スルヿアリ是ニハ下劑ヲ用テモ腹痛スルノミ
ニテ愈ル事ナシ必竟ハ死病ノ灸杯モ無効者ノ即腸
覃石癪杯ノ類ノコレ頽人ニ灸キ者ニテ男子ニハ少
キ者ノ是抵當ノ所之ノ硬滿ニ似タレトモ異也抵當
湯ノ所之ノ硬滿ハ遽ニ硬滿スル者ノ漸ニ硬滿スル
者ニ非ス抵當ハヤハリ急結ニメ滿アル者ノナレト
モ其滿アル故ニ急結ハ見ヘヌノ若滿ノミ去ル時ハ
アトハ急結ニ成ノシカシ抵當湯ヲ用ル時ハ滿ト斥
ニ急結モ去ルノ又少腹滿如敦ト云アリ是抵當湯ノ
腹ニ紛レルヿ有ナレトモ滿如敦ハ水ト血トニヨル

モノ故硬滿ニハ不至ノ少腹滿如敦ハ必竟心下堅大
如盤ノ下ニアル者ノ敦ト云盤ト云皆滿ノ狀ノ常ニ
カワリタル者ヲ云ノ是皆地界ヲ分テアル者ノ又小
便閉ノ腹ハ五文トリノ餅ノ大サナル塊物カ少腹ニ
アリ是亦抵當湯ノ腹ノ如ク硬滿ニハ不至也必竟此
小便閉ノ腹ノ大成者カ滿如敦ト云者ノ凡テ水結ハ
硬ニ及ヌ事ナキノ又金匱ニ抵當湯ノ腹ヲ膀胱滿急
ト云テアレトモ硬ノ義ヲ兼テ見子ハナラヌノ膀胱
滿急ニ抵當湯ハ用ラレヌノ又小腹急結ノ急ハ腹皮
ノ緊滿スルモノト内ノ拘攣スル者トヲ併セ可見尤

婦ノ瘀血アル腹ヲ診スルニ腹ハクサクメ有テモ底
テ引ハリテ結ノアル者ハ即急結ト可言又年若キ女
ノ瘀血アル腹ヲ診スルニ腹皮ヒツハリテ結メアル
者也是モ亦即急結ト云ヘシ○傷寒論ノ屎雖硬大便
反易ト云者ヤハリ瘀血ノ一候ニ成ル千ンハリトメ
アル者也又経閉抵當ヤ桃核承氣ヲ可用處ニハ身黄
ヲ發スルヲアル者ハ傷寒論ニモ其別シ云テアリ成
程余モ四五人経閉ニテ身黄ヲ發ル者ヲ見タリ経閉
ニ身黄ヲ兼テ其工ニ小便ノ不利スル者モアル ハ傷
寒論ニハ小便ノ利不利ヲ以テ黄証血証トヲ分テア

レ圧血証ニモ小水不利モ有也然レトモ血証ノ身黄
ハ黄疸ト違フテ目ノ色ハ常ノ如クニハナケレ圧黄
ハマヽキレヌ者ハ又者ハ瘀血ニヨル發黄ハ瘀血ヲ逐ハ黄
自ラ去ル者ハ又梅毒家ニモ發黄スル者アル者ハ又
瘀血ノ塊ニハ動悸ナキ者ハ死血ナレハハ帯下ノ塊
ハ裏散モアリ動悸モアル者也又婦人ノ経閉男子ノ
瘀血アル者ハ凡血ニヨリテ足ノ内踝ノ邊ニ青筋ヲ
見ハス者アリ筋ハリテ有者ハ是疝ニ似テ疝ニ非ス
併是ハ祈ニ有事ハ桃核ヤ抵當ノ場ニ有者ハ余モ未
タ二三人ナラテハ見及ハヌ也○凡男子婦人ニ腹ノ

少腹ニ乾血ノ塊有テ熱有ナカラ自ラ冷ルトイフ者マハリテナトノ熱有ナカラ自冷ルトイフ者ハ同ク死無乾血ノ候也

逆経ト常ノ吐血ト前ハ逆経ナレハ其人第ニ経水不利トカ或ハ少腹ニ瘀血ノ候有者ノ它ノ候ヲ以テハ分ラヌ〳〵緊

冷ル者アリ是必シモ久寒ニ非ス瘀血家ニモ亦間有者〳〵可審〇常ノ経閉ニ逐血ノ剤ヲ色々投テ不愈者アリ其時腹ニ毒ノ候ナクメモ軽粉ヲ用テ愈ルコトアル腹ノ候ナクメモ其人頸辺ハ膿物ヲ発メ有カ何ソ是迫瘡膿ニテモ出タルカヲ審ニメ夫ヲキツカケニメモ有〳〵軽粉ニテ愈ルハ毒ニヨル故ト見エ是毒有テモ腹ニ見ヘヌ者可成是ハ経閉メモ腹ニ塊ノ見ヘヌ者アルト同理也〇娠人逆経ノ病古ヨリ名アレトモ其候法ナレ経水不利メ吐血スル者ハ逆経トモ見エレトモ経水不利ト云程ナクメ逆経成者アリ吐血

不利ニ因テ吐血ヲナス者ト雖心下ニゼマル者故必心下ニ云分有者也逆経初ニハ四生湯ヨシ腹痛抔有テモヨキ者〳〵其急ナルハ三黄也夫ニテモ不止時ハ下メトラナハナラヌ者〳〵桃核承気ノ可用逆経ノ治法ハ此三方ニアラス〳〵后世逆経ノ制スルニ四物加大黄ノ用テアリ余此処ヘハ大抵四生湯ヲ用ル〳〵但逆上ノ血暈ノ気味テモ有処ヘ用テ可也逆経ハ必カタマリタルヲ吐スル者〳〵瘀血故ト見エ大既急成者ニハ四生ヨリハ三黄瀉心ヲ

ト甚混シ易キ者〳〵其別常ノ吐血ナレハ心下脇下痞鞕スルカ心脇下動アルカ何レ心下ニカ、リ有モノ〳〵逆経ハ心下ニ云分ナク臍下ニ塊有テ其吐血ノ前后堅ク突起シ動気有テ上ニツク努アル者〳〵一婦人逆経ス後ニ歯莖マヽ指頭ヨリ出血ス四生湯ニテ愈タリ逆経ノ吐血ハ平生ノ吐血ヨリ治法モ易キ〳〵最初ニ早ク治スレハ誤ルコトナキ者〳〵又逆経ノ右ノ塊ハ吐血止ミテ一両日モ経ル時ハ其塊沉テ見ヘヌヨウニ成者也今按スルニ逆経ハ刺絡或桃核承気ヲ用テヨカルヘシ〇凡瘀血ノ塊ハ少腹ノ右ニアル者〳〵

用テヨシ后ニハ
或ハ勞ノ見ハシ
テクルコト有者ノ其
時ハ黄芩湯ヲ用ル
也勞ヲ見ハヌ先ニ
早ク大黄劑ヲ用テ
可ノ血物黄芩湯ハ
血証ニテ往来寒熱
咳嗽腹中拘急抔
有テナマムニハ用レ
ハ血証モ治マリ愈ル
ノ此証小柴胡小建
中ノ間ノ処ノ凡テ諸
失血后ニ此証多有モ
ノ凡テ此方宜之
凡逆経治テ后塊
不見メアリ見ヘテ
モ動悸ナキハ治タ
ル者ト知ルヘシ假令
塊見ヘストモ動悸
シツマラヌ者ハ再
発スルモノト知ヘシ
吐血ナトニテモ一旦
血止テモ動悸シツ

一女子年二十二歳乾血勞ニテ少腹ノ右ニ硬満メ經閉スル十六月脉數ニメ未々微細ニ及ハス時々寒熱有テ甚羸痩ス余温経湯ヲ用ユ

抵當湯

少腹硬満者　水蛭　蝱蟲　桃仁　各六分

大黄一銭二分　右四味以水二合煮取一合二勺去滓温服

金匱要畧云婦人經水不利下又云亦治男子膀胱満急有瘀血者

按千金方抵當湯去蝱蟲有虻扶是ハ桃核承氣ノ如ク廣ク不用藥故治驗ノ少キ方ク此方経水トント不通メ少腹ノハル者ニ用ユ少腹ハルニ異同アリ腹ヲオスニ血塊有テ手ニ當ル者ア

マラヌ者ハ発ト可知
又経閉久而成癥状者不拘臓候而與抵當良

リ是ハ抵當ノ証中ニテハ軽キ者ク又一面ニ堅満メ塊ノ見エヌ者アリ是論ニ所謂硬満ク是重キ者也抵當ハ満ノミニテハ用ヒラレヌク満メ硬キ者ハ塊見ヘスメモ用ルク是塊ナキニアラス硬満ノ為ニ阻テラレ塊ノ手ニサワラヌ者ク硬クナクメ満ノミナレハ大黄甘遂湯杯ト紛レルク大黄甘遂湯ハ満ヲモニメ硬ハサノミナキク桃核承氣ト抵當トハ軽重ヲ急結トノミニテハ立ラレヌク譬ハ少腹急結メ有テモ二三年モ経水閉テ一滴モ不通者ハ抵當ヲ用子ハナラヌ者ク此ニ桃核ヲ用テモキカヌ者ク亦治

男子膀胱云云是一治験ニ此証マヽアル者ハ満急ハ桂枝茯苓丸ニモナキ事ハナケレトモ當ニセヌヘシ又勢大ニ違フヘシ先桂枝茯苓丸ニハ満急ハナシトシテヨクヘシ千金ノ抵當湯ニモヨキ方ヘ雑病ニテハ反テ千金ノ方ヨキ妛アリ瘀血ノ小便閉抔ニモ千金ノ方ヨシ又男子膀胱云云ノ証ニモ千金ノカタカ用ヨクメヨキ方ヘ扨抵當湯ニ奇妙ナル治験アリ余ハ不試トモ癩疾ニ用テ効有トモ云シ人アリ后ノ考ニ備ヘクヘキ妛也

○凡経閉ハ三道ニ分テヨクカヨキヘ桂枝茯苓丸トモ抵當湯丸トノ三道也未タ塊ヲ不結者ハ桂枝茯苓丸ヘ塊アリテ血ヲ見ル者ハ桃核承氣也痼メ不動者ハ抵當ヘ此一道ニテ大綱立ツ也然レトモ血下ルモ抵當ノ行事アリ血不下メモ桃核承氣ノ行処アリ又抵當加浮石抔ニテモ一向ニ不動又硝石大圓ノ類ニテモ動カヌ者アリ是他ニセン方ナキ者也春ニ砲砂班猫麒麟血抔ノ入丸アリ此方諸血氣ノ如何メモ不動者ニ用ユ是ヲ用レハ藥煩メ腹痛スル者ヘ佚シ經閉ノ証桃核抵當ナトヲ用テモ其塊不碎塊益深ク成者抔ハ何程ノ破血劑ニテモ碎ケヌ者ヘ佚塊

モ未勢大ナラサル者ハ碎クル者ナレ𪜈勢既ニ大ニ
メ塊モ大ニ凝結シタル者ハ入門ノ硼砂猫杯ノ方ニ
テモ何方ニテモ中々碎ケヌ者ナリ又前ノ抵當加浮
石ヤ東洞ノ浮石丸杯モケ条ニハ不立ト有ニ任セテ
色々トスル時用ル方ノ扱又前ノ三道ノ綱ノ外ニ目
ト成者アリ蛇蟲ニヨリテ経閉スルト毒ニヨリテ経
閉スルト利氣メ治スルトアリ又胸脇ヲ利メ経水ノ
通メ來ル者アリ右ノ毒ニ因者ト雖経閉ナラハ先其
毒ヲ捨テ標ノ経閉ヲ治スルノ治法桃核兼氣抵當ノ
類何ナリトモ常ノ経閉ノ治ヲナス也若ソレニテモ

経閉若滞下白
汰桃核抵當大
黄牡丹温経凡
子仁ナトヲ用テ
モ動カヌ者ハ消
溶丸ヲ其證ノ
方ニ兼用メ其毒
動者也

経不通ト云ハ其毒ヲ治メ輕粉丸消鎔丸ノ類ヲ用レハ
ソレニテ経水通メ來ルコトアルモノノ利氣メヨキ者
ハ獨香附子ヲ用ルノコレハ塊ナキヲ目的トナスナ
リ初メ桂枝茯苓丸類ニ及ヒ破血ノ劑ヲ用テモ一向
ニ効ナクメ一年許ヲヘルニ至テモ腰ニ塊モナクク
サくメ居ル者ニ香附子一味為末日ニ錢許酒ニテ用
ユ白湯ニテ用ルモ可ナレ𪜈酒服最良若散服ニ不堪
者ハ丸トナシ用ルノ二月許モ用レハ経通スル者ノ
是本草ノ方ノ香附子ヲ用テ利氣メ經ノ通スルハ是
偏ニ氣滞ニヨル者ト見ユ香附子ノ此等ニ用ルハ蓋

基シキカラヌ揉ナル仕方ナレトモ是ハ一通立置子
ハナラヌ者ノ又經閉搭別塊モナク逐瘀スヘキ程ノ
者ニテモ其人氣劑ナトヲ兼タル時ハ行氣ノ為ニ香
附子ヲ加ルナリ桂枝茯苓丸ノ類ニ加ヘ用ル也又
胸脇ヲ利メ經水ノ通メ未ルハ柴胡ノ類主之浮心劑
ノ行クナモアル可ナレ𪜈先柴胡ノ類ヨキ者ノ經閉
ニ柴胡ノユク処マヽアル者ノ凡テ柴胡ハ血分ニ揖
リシ者ハヨキ者ノ經閉ニ柴胡ノ行ク処マヽアル者
ノ意ヲ注ヘシ硝石大圓浮石丸抔ハ抵當ヘ屬スルノ
起癈丸抔モ抵當ヘ屬メヨカルヘシ起癈丸ハ腹痛ヲ

目的ニメ用ルノ併シ少腹ニ有テ痛者ハ桃核承氣抵
當或大黄牡丹抔アレハ起癈ヲカラスヒヨキノ起癈
ノ痛ハ大腹カヲヨモテ臍ノ上下ニカヽルノ且起癈ハ
塊ハナキニハアラ子𪜈大黄牡丹湯抔ノ腸癰タチノ
塊ノナス如キ勢ハナキノ又起癈ノ痛ハ心胸ヘハカ
ヽラヌノ故ニ失笑散抔トモ別ルヽノ失笑ハ下ニア
ル痛ニ用ルナレトモ非スト𪜈先上ニカヽル方ノ
且起癈丸ハ血痼ニ用ル方ニテ失笑抔ノ如新血ニハ
不用ノ起癈ハ生漆抔入テ有方故經歴メ痼シタル痛
ヘ行也又前ノ數方ヲハナレテ附子劑ヲヤリテ経ノ

通スルコアリ
キコアリ此等ヘハ灸ヤ温泉抔ニ浴スル法ヲ兼施メ
良右ノ脈証ハ尺内脈來緊也縦令尺内脈緊ナラスト
モ一体ノ脈ニ陰脈ヲ見ハス者ハ其候手足モ厥シ或
ハ身綿ヲ巻子ハ夜モ寐ラレヌト云程ニテ手足モ大
ニ冷ル者ハ其腹ヲ探リ見テモ不熱メ冷ル者ハ併シ
至極ノ熱結ニ至テハ亦腹ノ冷ル者アリ審ニスヘシ
千金ノ抵當湯モ傷寒論ノ抵當湯モ左迫ノ別ナシ其
内今用ルニハ少シノ差別アリ虎杖抵當湯千金抵當湯
ヲ姑ク各ケ云
ハ瘀血ノ水氣ヲ兼テ鼓脹カタチニ成タル処ニ用ユ
ル之即鼈甲湯抔ノ筋也鼈甲湯ハモト千金抵當湯ヨ
リ出タル方也鼈甲湯山脇家方也　鼈甲　桃仁各一銭
大黄二分　右四味以水二合煮取一合日二劑數日後従
二分　虎杖七分
大便去黒物毒垢香膠散兼用甚良此方千金抵當湯ノ
水蛭ヲ本テ鼈甲ニ代シ者也香膠散ハ余ハ不用ル右
ノ瘀血ニヨリテ鼓脹カタチニ成モノ水氣ヲ兼ル者
アルモ妄ハ水氣ヲ兼ル者也其水氣ヲ兼タルト兼サ
ルトノ見分ケハ水氣アレハ按セハクホミ或ハ小便
不利抔ノ類ヲ以テ水氣有コヲ知ルシ千金抵當湯ニ
ハ虎杖入テアリ虎杖ハ利水ノ藥ナル故ニ淋疾抔モ用

テアリ是ヲ以今千金抵當湯ヲ水氣ヲ兼タル者ニ用ル〻叓右ニ云シ田舂積聚門ノ班猫ノ入ル方ハヨク血塊ヲ解ク者テ抵當抔ノ及ヒ難キ塊ヲモ能解ト云余ハ右ノ方ハ未試ス併シ抵當迫用テモ不解小腹硬満ハ中々治セヌ者ハ早ク淺キ内ニ治スヘシ抵當ノ類迫ヲ用テ不消者ハ金匱ノ下瘀血湯ノ如法ニ製メ用試ミタキ者ハ又傷寒論ノ抵當丸ハ屢用テミシニ無効者ハ故ニ余ハ千金ノ桃仁煎ト云テ抵當丸ノ処ヘ用ル〻桃仁煎ハ抵當ノ水蛭ヲ去テ芒消ニ代タル者ハ鱉甲湯ハ腹満ヲ目的ニメ用ユ腹満ナケレハ瘀血ヲ下ス鱉甲湯ハ小便ノ利不利ニモ不拘浮石抔ヲ加用ルコトアリ鱉甲湯ニテ不動者ハ灸ヲ兼テヨシ瘀血ヨリ來ル脹満ニハ灸ノヨキ者ハ鱉甲湯ノ処ヘ虎杖抵當湯ノユクコトモアリ硝石大圓ハ但血塊ヲ目的ニメ用ル方ハ又下瘀血丸ト抵當湯ト経閉ニ用ル時ノ大抵軽重異同ナキハ其内湯ハ丸ヨリ効早キ者ハ併シ内ニ塊有テ血ヲ不見時ハ湯ヨリ丸ハヨキ者ハ故ニ緩急ヲ以テ別ツコトモナラヌハ千金ノ抵當湯ニハ虎杖ノ根ヲ用テアレトモ莖カヨキ者ハ虎杖ハ功能ノ

余虎杖ノ莖ト根ヲ用ヒ分テ見タルニ莖ヲ用タル病人ハ皆治シタリ根ヲ用ヒモノ

皆効カリキサスレハ並ヲ用ヒハ自ラ治スヘキニ痕ヲ用ヒ処ハ不可治ノ証ニテ有ケルモ亦未可知也

ヒロキ者ニテ色々用ルノ阿州稲田九郎兵衛殿ニテ虎杖甘草二味ヲ破傷風ニ用ユト云又或家方ニ虎杖甘草二味ヲ痛風ニ用ユト云此它淋疾瘀血痙抔ニ用テ甚ヒロキ者ノ其内痛風ニ虎杖ヲ用ルハ可疑也又婦人經閉一身肥満メ各別ノ塊モナキハ浮石一味為末白湯ニテ用ユ或東洞ノ浮石丸ヲ用ルモ可也併シ浮石丸ハ餘リ入ラヌ方ノ浮石丸ノ處ヘハ鼈甲湯或大柴胡加浮石ニ或抵當丸抔ヲ兼用メヨキ者ノ柴胡加浮石ハ上ニヲモニハルニ用ユ又満氣下ニサカン成ハ香附子浮石二味為末白湯ニテ用ユ右二味等分

ノ方也是本丹溪ノ方ニテ治疝ノ劑ノ今借テ經閉ニ用ユ凡婦人一年モ經水不來メモ結塊モナキ者ハ抵當抔ニテモ血不下者也桃核承氣抔モ無効モノ也若又有塊而満者ハ抵當下瘀血ノ湯ノ類ニ浮石ヲ加テヨキノ浮石ハ何レ抵當マ桃核ノ証ニ似テ塊結抔ノ満シ或小腹殊ニ満メ塊結ナキ處ニ用ル浮石ハ瘀血ヲ旋ラシ小便ヲ通スヨキアンハイ成者ノ右ノ処抔ハ吉益ニテハ瘀血劑ヲマリテ浮石丸ニ兼用スルノ抔経閉四五月ニ至テモ尚塊ナク拄杖茯苓丸マ桃核承氣抔ニテ逐テモ血ノ下ラヌ者アリ其時ハ香附子

又二三月モ経閉ノアル者カ遽ニ経水通シ小腹急結シ至ラサル者ハ桂枝茯苓丸ヲ用ル也

一味長服セシムヘシ二三月ニメ血下ル者ハ扨桂枝茯苓丸ト抵當丸ト挑挟柔氣三方ノ別ヲ云ハヽ抵當ハ根盤已ニ硬成者ハ桂枝茯苓丸ハ根盤未為硬者ハ挑核柔氣ハ動機有者ハ根盤已硬成者ニテモ動機アル者ハ挑挟柔氣ヲ用ル也是三方ノ別也動機トハ下血ト子痛ト子何レ浮キテアル者也故ニ抵當湯ト軽重ニテ分ツト云必シモ軽重ヲ以云ヘカラサル事アリ併シ先動テアル者ヲ軽シトスル也抵當湯ハ沉テアル者也桂枝茯苓丸ハ婦人二三月モ経閉メ少腹ニ全ク物ナキニ非ス何ヲ手ニ應スルト云ヨウナレハ桂苓丸ヲ用ルノ人又二三月モ経閉ノ少腹鞕滿ナレハ抵當湯ヲ用ユル人ハ其場ヲ下瘀血丸別ニ見ヘ集ヲ用ル事アリ扨又桂枝茯苓丸ハ金匱ニ當去其癥ト有トモ塊アリテシツカリトセル者ニハ無効ク血下ラサル時ノ候ハ香附子ノ可行場ニ似テ少シク腹ニ物アル處ク香附子ノ方扨ハ桂枝茯苓丸ニ屬スルク香附子ノ可行場ハ全ク腹ニ無物ク浮石ノ方扨モ桂苓丸ニ屬メヨカルヘシ凡テ経閉逐血ノ劑多端ク下云ヒ是ヲ總ルヲハ抵當桃挟桂苓丸ノ三方ニ出ルヲナキク啓右ノ三方ニ

屬スヘシ婦人ニ右ノ方下ヨリ脇下マテシツトリト
痃癖ト成テツヽキテアルハ諸病難治者也是ハ支結
ニ非ス支結ハ難治トスルニ非ス支結ハ聚散有者ノ
右ノ塊ハ聚散ナク始終シツカリト有モノノ婦人療
癥杯アツテ右ノ塊アル者ハ療癥ハ軽キトモ難治者
也シカシ治ヲ施テ不見メ辛ヘキニモ非ス弟テ右ノ
変ヲ心得テ置ハ仕損シナキ者ノ経閉杯ニテモ右ノ
ト近スツト痃癖ノ如ク有ハ大病ヲナシ難治者ノ男
子ニテモ右腹ニシツカリト脇下迫塊アルモノハ諸
病トモ難治ナリ今迫男子ノ右ノ塊アル者ヲ三四人

見タルニ皆死タリ前ニ云シ浮石丸ハ浮石桃仁大黄
三味ノ丸ニテ吉益ニテ十二律ノ方ノ一ノ田中子ハ
此丸ヲ通経丸ト名ケ用タリ此方本経水不利ヲ主証
トメ用シ也ナレトモ余用試ルニ浮石ハ常ノ経閉ニ
ハ餘リ無効故ニ肥満ヲ目的トメ用ル之是余ノ用覚
之又浮石ハ其仍用テハ効少シ薬店ヨリ丸マヽナル
ヲ取ヨセ炭火ニ焼テ可用大ニ優ル者ノ亦余ノ仕覚
シ香附子浮石ノ二味ノ方ハ本草ニ見ヘタリ按本草綱目巻
九浮石附方云小腸疝氣毋濕方海浮石香附子等分為末毎服二銭姜汁調下是ハ満モ劇
シカラス経閉ト云ニモ不至処ニ用立若経閉ノ満モ

強キハ浮石丸ジ可用二方軽重ノ別ニ依テ云ヒ浮
石一味ヲ用ル場ハ右ノ香附子浮石二味等分為末日
ニ三銭目許ツヽ用ルハ尚ヨキニ妥々益良右ノ香附
モ浮石モトモニ火ヲ見セテ可用 ○萬病回春巻三
積聚門神化丹 消癖積破血塊下鬼胎通経瓜及諸痞
積血氣塊 硇砂 乾漆 炒 血竭 各三銭 紅娘二十個 去翅
乳香一銭 班猫二十個 去翅足 右為末棗肉丸如豌豆大毎服一
丸至三五丸臨臥或棗湯姜湯或紅花藕水湯下
大黄牡丹湯
○是ハ血塊ノ痛ヲナス者ニ用ユ経閉メ塊ヲ結テ其
塊ノ痛ム者ニ事ニヨルト瘀血カムセテ腸癰タチノ
出來物ノ如ク見ユル者アリ夫ニハ此方益良併シ夫
ハ分リニクキ者ナレ圧其内ニフツト思當ル事アリ
右ノ證ノ一等劇キハ瓜子湯ノ行処ニ只痛モ止マシ
キト思フ劑ノ者ニハ大黄牡丹湯也
○大黄牡丹湯ハ塊ヲ目的トメ用ル也瓜子仁湯モ亦
爾リ其内瓜子仁湯ハ大黄牡丹湯ヨリハ前ノ方ニ併
シ瓜子仁湯ハ薏苡附子敗醤ノ処ヘ行迫モ用ラル、
薬ニ右ノ二方抵當ト桃核承氣ノ間ニツク故其内抵
當湯ニ屬スルカ近カ扨右ノ二方ハ桃核承氣ヤ抵當

ノ前ニ初發ヨリ用ル夏ハ餘リナキ心桃核ヤ抵當ノ類ノ場ヲ過テ其方ニテモ無効処ヘ塊抔ノ形ニヨリテ腸癰ニ取テ治スル仕方ノ大黄牡丹湯ハ余ハ経閉帯下乳癰ニ試効有經閉ニハ桜桃核承氣抔ヨリハ一段重キ氣味也抵當ノ方ニ近シ併シ少腹硬満ニテハ大黄牡丹湯ハヤラレヌ之夫ニテハ抵當ヲ用子ハナラヌ〻大黄牡丹ハ腹候ハ桃核承氣ニ従テ桃核承氣ニテモ動キノ無處ニ用ユ又此方帯下ニテ逐テヨキ者ニ用ユ牡蠣抔ノ留ル場トウラハラ心下血抔ノ苓歸膠艾抔ヲ用テ留テアシキ処ヘ桂枝茯苓丸ヲ用ル様ナル氣味ニテ帯下ノ留テアシキヲアリ其時此方ヲヤリテヨシ爰ニメ軽キハ瓜子仁湯ニテモ良心帯下ニテモ経閉ニテモ二方トモニ用ル心

瓜子仁湯 以上二方見腸癰條

前條ニテ辨セリ

手膝攻頒人良方巻之一 治月水不利臍腹作痛或小腹引腰氣攻胸

脇　手膝　桂枝　芍藥　桃核　玄胡索　當帰

牡丹皮各一両　木香二銭　右八味為末毎服一銭温酒調下或毎服三五銭水煎

〇是モ臍腹作痛トヽカ目的ノ経水二三月或四五月

閉メ臍ノクルリニテ痛ミ或腰或心胸ヘサシハルモアルヿ然レトモ夫ヨリ假用テ産后悪露滞リテ痛ヲナス者ニ用ユ扱エノ二方ト此方トノ別ハエノ二方ハ塊ナケレハ不用ヿセイく有シ処カ少腹急結位ニテシツカリト無塊ヿ若シツカリト塊アレハ大黄牡丹湯ヿ又シツカリト塊アリテ大黄牡丹湯ノ可行処ニテ無痛者ハ桃核承氣ヿ大黄牡丹湯ハ無痛処ニ用テハ面白カラヌヿ痛ナケレハ大黄牡丹湯不用トモ外ニ方ハイクラモ有ヿ桃核承氣抵當ノ処ニ

テモ痛強キ時ハ大黄牡丹湯ヲヤルヿ然シ桃核ヤ抵當ノ処ニモ少シノ痛ハアルヿ又大黄牡丹湯ハ血ノ下トヲ不問ヿ多クハ血不下メ動テキテ夫ヨリ血下ル者ヿ扱抵當ノ処ニテ痛強キハ大黄牡丹湯ヲ用ルトハ云ヒ乍中々キカヌ者アリ反テ痛ノマス事ナト有ヿ桃核承氣ノ場ニテ痛有ルハ大黄牡丹湯ニテ効アル者ヿ又大黄牡丹湯ヲ用テ血不下メ痛ノ愈ルモ有者ヿ大黄牡丹湯此ニテハ泛ヿ用レトモ一體大黄牡丹湯ノ腹ハ腫瘕トテ一腫塊ヲナス處カ異ニメ桃核杯ノ如クニハ非ス地界ヲ分テ妊娠ニ三月

ノ腹ヲ候フ様ニアル者ノ且其処ヲ按スニ痛ム者ノ抵當ヤ桃核承氣ノ塊ハ大黄牡丹湯ノ塊程ニハ不痛者ノ又大黄牡丹ヲ用血モ不下メ痛ミ又ル三其塊モ何レヘイタヤラ沉滅メ見ヘヌモノアリ夫ハ其ナリニテ搆ワス可置沉滅シタル物ヲ是非下サントメ逐血ノ劑ヲヤリテモ血不下者ノ是等ノ心得往々有ルナク其内産后ハ大抵血下ル者ノ是産后ハ血動テ有故ト見ユ

○産后抔悪露モ不下痛モ此方ニテ無効トキハ即本方ニ大黄加用ルカ或桃核承氣ヲ用ノ又午膝散ハ産后不限平常ノ婦人ノ桂枝茯苓丸ヲ用ル処ニ用テ桂苓丸ヨリハ効アル様ニ覚ユ一治験有一頽人經水不利メ閉ト云ニハ非サレ共不順ニテ有シカ二三年以來腹満メ身モ肥大ニ成タリ醫二三是ヲ治メ無効余ニ治ヲ求ム是ヲ診スルニ腹ニ無塊余逐血ノ藥桂苓加大黄抔ヲ用シニ左迄無効后藥ニ退屈メ且下劑ヲ嫌フ故午膝散ニ心付テ丸トナシ用シニ肥大腹満ノ証減シ經閉モ調フ今ニ於テヤハリ午膝丸ヲ與置ク此人下劑ヲ嫌ハスハ抵當丸ノ類ニテモ可用ニ仕合ニテ此効有シ也

紅藍花酒　頑人血氣刺痛　紅藍花 二錢

右一味以酒二合煎減半服一半未止再服〇藻按胞衣不出及産后遍身痛者亦佳

凡産前醉則乏力而四支不用産后酒多恐引入血分四肢致後日有動血及四肢無力髓骨痠痛之患

〇是モ瘀血ニテ為痛者其場ハ大抵失笑散ト同キ者ノ併シ是ハ諸方ヲ用テモ効ノ無時兼用ニスル藥酒ノ心此方斗リニテスマヌ事ハナキノ藥斗リニテ難届抔思時運動センタメニ此ヲ用ルナリ胞衣不下時用ルニモ同意也只産后ニ湿毒骨痛ノ如クニ痛ヲナス者アリ其証ハ最初カラ此方ヲ其隨証方ニ兼用スルノ心此張仲賓ノ説是ノ成裡臨産生后ニハ酒ハ妄ク不可令飲四支懈惰スル者ノ此酒ノ煎法可見常ノ煎藥ヨリハ甚少シ倹シ酒ニタユル人ハ必モ不拘シテ多飲シム其人ノ酒ニタユル程ノマシムル也

此方ノ血氣刺痛失笑ノ場ト近クメ其内失笑ハサシテコミ強シ此酒ノ方ハ失笑ニ比スレハ刺痛緩ノ此方ハ失笑抔ノ如ク心下ノ痛ヲ目的ニセヌノ心満身ノ痛ニモ用ルノ心下ヘ指込痛ニハ失笑カヨキノ倹シ此等ノ方ハ傷寒論ノ方抔ニハ違フテキツト規則ハ不

立者ノ此方胞衣ノ不下ニ用ル者色々ノ事ヲシテモ
不出時用ル者又此方痛風ノ瘀血ニヨル者ニ桂枝茯
苓丸ヲ用ル処ヘ兼用テ良又此方血氣刺痛ノ者ニ
ハ寒熱ニヨラス酒ヲ飲程ノ者ナラハ用テヨキ也

鶏鳴茱湯

○経閉ニ虫ニ因者一通アリ是ハ問アル者ノ其証候
ハ腹カ股ニ必見ハル、者ノ又虫ノ証ニハ頭痛ヤ或
吐氣抔ソフ者ノ併シ是ハ一概ニハ當ニナラヌ者ナ
レトモ妥クハ添者也虫ニ因経閉ハ逐血劑ヲ何程用
テモキカヌ者ノ血モ下ラヌモノノ而メ鶏鳴茱ヲ用
レハ血モ下ル者也

○世ニ鶏鳴茱湯ハ瘀物経閉ヲ下ストテ産后ノ悪露
不尽ニモ用ル者アリ余ハ不取ノ此物ハ蛇アル者ニ
アラサレハ不用ノ東洋山脇ノ時ハ鶏鳴茱湯ノ主治
ハ下蛇虫微物養壽院方画艾湯主治ニ見ユ方ト立テ迚ノ用テ毒ヲ
逐ヒレモノニテ産后ノ瘀血ヤ帯下ニ用テ効有ト云
テ用タリ併此方ハ常ノ毒ヲ逐フ處ニハ用テモ餘リ
無効者也何レ此方ハ蛇虫ヲ下ス藥ト立テ可置凡経
閉諸破血ノ劑ヲ用テモ経水通セスメ蛇虫ニトリテ鶏鳴茱湯ヲ用テ経通
スル事アリ是蛇虫ニヨル者ノ意ヲ注ヘシ

當歸四逆湯

○是ハ経閉ノ時ノアレライ薬ク其証先臍腹ノアタリカ拘急メ或ハ腰カタルカリタリ痛タリ手先マ足先カ冷甚シキハ腹中迫冷ルヲ覚ルト云者モ有也脈沉細ク是一通リノ証ク此方ヲハリ合ニ物云ハヽ温経湯ハ熱ニ有者是ハ寒ニ有モノク且温経ハ上ニ云分アル者是ハ下ニ有モノク是其別ク二方相反スル者ク温経ノウラト見テ置ハ當皈四逆湯ノ証ヨク分ルヽ何レモ経閉ニ用ルク又一種経閉ニ帯下ヲ兼テ止モノアリ夫ニハ分テ當皈四逆ヨキ者也此方大抵加呉茱萸生姜ニシテ用ルク此方ハ経閉抔ノ血ヲ逐程ノ事モナク又ハ桃核承氣抵當ノ類前ノ數方ヲ用レアトヘ行也

○是ハ経閉テハ何レアレライ薬ク経閉ノ格別逐ヲ程ノ事モ無処ヘ用ユ或此方ヲアレライ薬ニメ丸散ヲキツト用ルフモアリ何ニモセヨ此方ヤ當皈芍薬散抔ハ経閉中ニテハアレライ薬也

小柴胡湯

大柴胡湯

○是ハ二方共ニ経閉ノ往來寒熱腹ニテハ脇下ヘ迫ル者ニ用ユ凡経閉ノ証ニテ脇下ヘ迫ル者ハ逐瘀ノ

劑ヲ用テモ血不下者ノ故ニ其時ハ先脇下ヲサハクヘシ奇妙ナル
別ニ逐瘀ノ藥ヲ不用メモ自經血通スル者ノ是上竅
閉テ下竅通スルノ理ト同キ者ト見ユ其内小柴胡ハ
經閉ニハ用場セマシ大柴胡ハ至テ廣キ者ノ治驗モ
多クアリ儒門亶親ニ經閉ニ用ルニ大柴胡ニ當飯ヲ
加ヘテアリ然レハ當飯ヲ加ルニハ不及者ノ大柴胡
テスム者ノ又一種經事滯リテ勞タチニ成アリ是所
謂乾血勞ノ夫等ニハ分テ大柴胡ニテ取モトスフ有
モノノ世人此等ノ処ニハ初ヨリ逍遥散ヲ用レトモ

逍遥散ハ初メカラ用テハハツキリトキヽ目ノ見ヘ
ヌ者也先大小柴胡ヲ用テクチキテ置テアトニテ逍
遥ヲ用レハ逍遥ノ効モ著シク立者ノ又世俗ニ血ノ
道ノ頭痛ト云有夫ハ大カタ大小柴胡ノ証成者ノ又
脇下支結抔ナラハ柴胡桂枝ヲ用ル事モアルノ其上
ニ加大黄ニメ用ル事モアルノコレモヨク経ヲ通ス
ル者ノ又柴胡姜桂湯ノ行事モアリ併シ姜桂ハ帶下
ニハ灸クコレアリ経閉ニハ少ナシ帶下ニハ大小柴
胡柴桂証ハ少ナクメ姜桂ノ証灸ク有モノノ又経閉
ニ柴胡加芒硝ノ行事アルノ是ハ大柴胡ノ証ニメ不

大便若クハ腹ニ塊抔ニテモシツカリトアル時用ル
ヘ但シ柴胡加芒硝ヲ不用メ大柴胡抔ニ別ニ逐瘀ノ
丸ヲ兼用メモヨキ者ヘ経閉ニハ小柴胡ニ加芒硝ハ
不用ヘ多クハ大柴胡加芒硝ヘ又脇下ノ塊ニテモツ
ヨキ時ハ大柴胡加鼈甲ヲ用ル支モアルヘ仍シ小柴
胡ニ鼈甲ヲ加ル事ハナキ也一閑齋ハヨク柴桂ヲ瘀
血ニ用タリ経閉抔ニハ加大黄ニメ用タリ又柴桂ハ
心下支結ニ不拘メ支節煩疼ヲ目的ニメ用ルヿモア
ルヘ又後世ニテ婦人ノ血分ニカヽハリテ柴胡証有
モノ柴物湯ヲ用ルヘ柴物湯ハ後世ノ方ニテ小柴胡
ト四物湯ト合方シタル者也仍シ柴物湯ヲ用ルナラ
ハ小柴胡加當帰ヲ用ルカ簡ニメヨキ也

〇手掌煩熱赤紋ヲ發スル者ハ血熱ノ目的ヘ然レ𪜈
桃核杯ノ場ニハ餘リ不見妥ク乾血ニ有者ヘ手掌煩
熱發赤紋ハ男子婦人トモニ有モノヘ男子ニテモ濕
勞ヤ胎毒ニテ勞ヲ發スル者妥ク此候有物ヘ赤紋ハ
手掌ニ有ヘ偶足跗抔ニモ紋ヲ發スルヿアレ𪜈是ハ
當ニハ難成ヘ風毒抔ヲ發シ或痛風抔ノ后ニアル事
有故ニ當ニナラヌヘ前ノ手掌煩熱發赤紋ニハ多ク
ハ小柴胡加牡丹梔子或大柴胡加當帰抔ヲ用ルヘ也多

ノ柴胡ノ証アル者ノ后世家ニテハ加味逍遥散ヲ用ル処ノ小柴胡加牡丹梔子ハ宋世ノ頃ヨリモアル方ノ牡丹ハ本草ニモ治血中之伏火トアリ何レ血分ニ入タル熱ヲ解スルモノノ勞証抔ニ牡丹ヲ用ルモ同趣意也本事方ニ黄丸ト云アリ此モ柴胡加牡丹梔子ヤ大柴胡加當帰抔ヲ用ル処ノ又右ノ柴胡ノ処ニテ胸脇ヘモアツカラス頭痛抔モナク但手掌煩熱而已ナラハ三物黄芩湯ニテヨシ又水腫ニ膝ヨリ下ニ赤紋ヲ發スルアリ是瘀血ヨリナス腫此候一ツニテモ瘀血トナシテ其治ヲ施スヘシ扨前ニ云シ娠人手掌煩熱赤紋ヲ發スルハ何レ血ニヨル者ノ腹ニ塊アル者ハ逐血ノ劑ニ宜シ右ノ手掌煩熱發赤紋ハ乾血勞抔ニマヽ有者ノ又一種手足ノ掌甲錯甚ク鷲掌鼠ノ如クニ成者アリ此ハ前証トハ別ノ物ノ此ニハ神秘ニハ手癩ノ形ノ如クニ成テ指先ホツレル様ニハイ虫ノ如クニ成也又按スルニ右ノ証ハ刺絡ヲ兼施メヨカルヘシ

柴胡桂枝湯 以上四方具 瘧疝條

柴胡加芒硝湯

於大柴胡湯方中加芒硝

既ニ前條ニ於テ辨シタリ

四順湯 明李根醫學入門

治血熱蘊結壅滯不通或一身盡熱或熱日晡肌熱或夜發熱皆血熱也

甘草各等分　右四味水煎温服 此方舊名四順清涼飲

○此方ノ目的ハ熱ヲ経水ニヨリテ熱ノ出ル者アリ凡テ一切熱ノ出ル又結毒ニヨリテ熱ノ出ル者アリ之ヲ血熱ト云者ハカリニ者ニテ日晡ノ時ヨリ夜分ニ有モノヽ日ノ内モ頭ト無熱ニハアラス子ヒ熱ノ發スルハ多ク夜ニカケテアル者ヽ此方ハ経閉門ニアレトモ一切ノ血熱ニ用ルヽ后世ニテ

血中之伏火ト云テ其主藥ハ牡丹皮ヲツカフテアリ夫等ノ処ヘ此方行ヽ大抵夫ニテモ見ト大小柴胡ノ証ナル者ヽ然レトモ血熱ハ柴胡ニテハ退キ兼ル者ヽ其処ヲ此方ヲ用レハ其熱ヨクサメル者ヽ而モ早ク有効者ヽ此方書ニハ皆四順清涼飲トアリ今私ニ清涼ノ二字ヲ省キテ四順ト名ク此方ノ熱ハ多クハ身熱悪熱アル者ヽ悪寒ノ添フ事ハ少ナシ而シテ稀ニ熱ノ出ル前ニ悪寒アリテ熱出レハサツハリ悪寒止事ヽ勿論此証ハ勞咳ノ如ク手掌煩熱抔アル者ヽ扱此方ヲ虚實ニ分クレハ此方ハ實ヽ虚ニハ小柴胡ニ

牡丹ヲ加フ後世ニテ逍遥ニ牡丹山梔ヲ加ヘテ加味
逍遥散トテ用ル〻其処ヲ小柴胡加牡丹ニテ行〻是
乾血勞ヤ濕毒勞ニトリシ処ニ行〻爰ヘハ又四順湯
ニテハ行ヌ〻又牡丹ヲ濕毒ノ熱ヲ挫カン為ト見ヘ
テ實証ノ内ヨリ多ク牡丹ヲ用テアリ癥瘕秘録抔ニ
アリシカシ牡丹ハ濕毒ハ餘リキカヌ者〻勞ニナラ
子ハキカヌ者〻又后世ニ加味柴胡湯トテ小柴胡ニ
牡丹山梔ヲ加タル方アリ併シ山梔ハ加ルニ不及者
也〇乾血ニ此方ヲ本劑ニメ下瘀血丸ヤ消黄丸ヲ兼
用スル事モアリ是本劑ヲ以テ熱ヲ制シ丸藥ヲ以テ

逐瘀スル乍段〻又桃核承氣抔ノ証ニ日晡ノ熱有ア
リ其時ハ桃核承氣ニテヲス也併シ熱アマリニハケ
シキ時ハ四順ヲ本劑ニメ下瘀血丸ノ類ヲ兼用ニス
ル事アリ或先其熱ヲ四順ニテ制メヲキテ而后抵當
桃核承氣ノ類証ニ隨テ其血ヲ制スル事モアル〻凡
血分ノ熱ハ多ク陰分ニ入テカラ出ル者ニテ日暮方
日暮スキヨリ出ル者ナリ或日晡ヨリ出ルモ有〻何レ血熱ナレハ
ニ至テハ晝夜一身盡熱スルモ有〻何レ血熱ナレハ

下瘀血丸

四順ノ行處也

○是ハ挑承ノ場ヘモ抵當ノ場ヘモ廣ク通ハシテ用ル也

消黄丸 千金卷二求子門硝石大圓治十二癥癖及婦人帶下絶産無子并腹寒食藥而腹中有癖者當先腹大几下之絶産ハ不孕事也斷産ハ止産ノ事ノ

○即消石大圓ハ是血塊ヲ目的ニメ用ル心何程經閉メ有テモ腰ニ塊ナケレハ此丸ハ不用心千金此方ノ主治ニ十二癥癖ト云テアリ成程此方ハ血塊而已ナラス何ノ塊積ニテモ用ル心凡塊積アル者ハ此方ヨクトカス者ノ故ニ千金ニモ博ク云テ十二癥癖ト云ニモノト見ユ

○下瘀血丸ト消黄丸ノ二方ハ軽重ノ劑也消黄軽メ下瘀血丸ハ大小腹ニ通メ用ユ心下ニ有塊ニテモ用ル心併シ消黄モ正面ハ大腹也又下瘀血丸ハ小腹ノミ心余試ルニ傷寒論ノ抵當丸ハ餘リキカヌ者ノ故ニ余ハ其処ヘハ下瘀血丸ヲ用ル心抵當丸ノ処ヘハ消黄ハ用ヒヌ心硝石大圓ハ千金堅癥聚門ニ方ヲ出タリ此方男女ヲ不問メ腹ニシツカリトシタル塊アルカタマリ有ヲ目的ニメ用ル心然レトモ凝結シタル者ハ大抵ハ碎ケ難キ者ノ又下瘀血丸ト抵當丸抔ハ内位ニメ別ナキ心凡經閉瘀血不見血ハ湯ヨリ丸カヨキ丁アリ血下リテ來ル者ハ湯カヨ

キ者也故ニ一薬ニ丸ハユルク湯ハツヨシト云レヌ
也凡経閉本病有者ハ皆夫ノ本証ニ従テ湯劑ヲ用
夫ニ右ノ丸薬ヲ兼用スル事多クアリテ一途ニ血ノ
ミヲ制メ居テナラヌ事アリ
地黄煎丸
○是ハ下瘀血丸ヤ消黄丸ト大抵同証ニメ有テ右ニ
方ヲ用ニクキ処ニ行也下瘀血丸ヤ消黄丸ハ實証ノ
者ニ行也地黄煎丸ハ其人氣血脫メ或ハ羸痩或往來
寒熱或下利抔有テ目前ニ攻ヘキ血塊アリテ攻撃ノ
ナラヌトキ此方ヲ用ル也重寶ナル藥ゝ此方ハ乾血

勞ニナリ抵テヲル処ニ用ユ又既ニ乾血勞ニ成タル
處ヘモ用ル也
○女子十四五歳ノ時初テ経水通スル事一二日有テ
後経水閉ル者ハ多クハ夫ヨリ乾血勞ト成者也是モ
一二月ノ経閉ナレハ左モナケレトモ半季モ三四年
モ通メ后経閉スル者ハ勞ト成者ゝ是余カ段々仕覺
タル事ゝ又右ノ勞ハ余色々治メ見ルニ皆場ノヲクク
レタル者カトウモ治セヌゝ右ノ証モ必竟乾血勞ナ
レハ其治ヲ成テ愈ヘキニ前ニ云如ク場処ノヲクレ
レ故カトウモナラヌゝ凡乾血勞ノ目的ハ経水不

調急結肌膚甲錯手掌斑紋唇口乾燥等也

終始丸

○此丸腹痛ヵ目的ノ〻癈血有テ腹痛スル者ハ一切用ル〻是モ経閉ニ不限結毒ニヨル者ニテモ何ニテモ何レ内ニ血毒有テ腹痛スル者ニ用ユ又此方金匱ノ大黄蠐虫丸ノ行乾血勞ノ処ヘ用ル〻大黄蠐虫丸ハ蠐虫ヶナシ假令有シ処ヵ彼方餘リ多味ニテ用ニクシ故ニ此方ヲ用ユ又此方濕毒勞ニ用ユ又小児疳勞胎毒ニヨル者ニ用ユ右ノ數証ニ活用スルハ腹満ハ目的ニセヌ〻此方本ハ毋波ノ民間ノ方ニテ本ハ治血瘤腹痛トアリ然ルシ今右ニ云如ク活用スルノ何レ此方ハ血ニ拠リタル者ニ用也本ノ主治腹痛ニ用テアレトモ必シモ腹痛ナケレハ不用ト云ニアラサルヘ叓地黄煎丸ト終始丸ト二方ノ別ハ地黄煎丸ハ乾漆入ル〻終始丸ハ生漆入也此生ト乾トニテ大ニチカフ者〻旦終始丸ハ大黄入テアリ故ニ地黄煎丸ハ乾血勞ノ気ト形ト共ニ脱メ有処ニ用終始丸ハ乾血勞ニ用ルトハ云者ノ未タ形気全ク脱セヌ処ニ用ル也后世ノ方ニテ云ハヽ地黄煎丸ハ六味丸ヲ用ル処ノチト性根ノ有様成處〻終始丸ハ右方家ニテ大

黄蠱虫丸ヲヤル処也是其別也○此方経閉ノ腹痛ニ
用ルニモ初發ヨリハヤラヌ〻桃柔ヤ抵當ノ類ヲ用
テモ痛ノ不止者コレヲ用ル〻又此丸ヲ濕毒勞ニ用
ルハ粉丸ヤ消鎔杯ヲ用ルトハ其場異也消鎔丸ノ類
ハ下疳便毒濕瘡有テ勞ヲナス者ニ用ユ終始丸ハ粉
丸ヤ消鎔杯ノ如ク濕瘡出テナクメ濕証ヲ過テ其ウ
ツリ勞ニナリシ者ニ用ル也又此方ヲ小兒ノ疳勞ニ
用ルハ初發ノ時也毓嬰丸ハ未ニ成タル処ニ用ル也
譬ハ乾血勞ノ消黄丸ヤ下疳血丸ノ場ハ終始丸〻地
黄煎丸ノ場ハ育嬰丸也終始丸ヲ疳勞ニ用ルハサノ

三胎毒ヤ虫積ノ堅塊ナクメモ腹ニ少シノ凝結アレ
ハ用ル之又或腹ニ凝結ナクメモ外証ニ胎毒ノ候ア
レハ用ル之凡此方ヲ用テ痒ミヲ發スルハ佳徴也一
病人アリ此丸ヲ用シニ痒ミ發メ腹ヲ掻腹ノ皮一枚
ムケテケルカ段々痒ミ優リテ後腹ノ皮一枚ムケシ
者アリ頭トツヨキフケノ如ク成者アリ又此方ヲセ
八日モ用テモ痒ミ不出ハ無効トモ一概ニ云レヌ也
軽キハ何ノ瞑眩モナクメ愈ル者アリ又痒ミ不出メ
身ウチニホロセノ如キ出來物出ルアリコレ左工佳
徴也

○是ハ本胞衣ヲ下ス藥ニテ夫ヲ經閉ノ諸藥無効者ニ假用ユルノ妙ニ一ツノ意得アリ凡經閉ニ大黄芒硝ノ如キ藥ヲ用テモ動メ時ハ附子ヲ用テ見ルヘシ是ニテ動ク者也此方ニ附子入テアリ后世此方ニ大黄ノ無方ト大黄アル者トニ方アリ從シ有カヨキ〻余ハ大黄アル方ヲ用ユ又后世ニ見眼丸醫學入門卷十四娠人癥瘕痃癖門見眼丸治石瘕狀如懷附子四錢鬼箭羽　石英各三錢澤瀉肉桂玄胡索木香各二錢血竭一錢半水蛭一錢斬一錢半桃仁三十箇三稜五錢大黄三錢為末酒粉丸梧子大每三十丸溫酒下　又入門卷一釋方云眼日氣也藥之消積如雲之見日也トテ腸覃石瘕ニ用テアル方アリ其方ニ附子用テアリ其処ヘ余ハ此奪命ヲ用ル〻又此方ハ瘀血ヨリ来ル皷脹ニモ用ユ又此方通例ハ脉緊成者ニ用ユ然シ未必シモ緊ニ拘ワラヌ〻又熱アル処ヘモ用ユ然シ大方ハ俗ニ云ヒユト云処ニ用ユ熱ナクメ脉緊ナル者是〻又此方腰腹ノ冷ルニハ益ヨシツラク試ルニ寒邪ニ非スメ腰腹ノ冷ル者ハ死血也是屢試シ事也然レハ脉メ寒邪ト見泥ムヘカラス然レトモ十ニ七八ハ死血ハ熱ヲナス者〻故前ノ見眼丸ニ鬼箭入テアリ鬼箭ハヨク血ヲ逐ト云テ喜ク用ル人アリ余ハ未試也鬼箭ハ矢ハツノニヲ用ユ故ニイタレハ捻當

温酒下此方ハ医方口訣ニ出タリ血塊多年逐血ノ剤ヲ與ヘテモ不治者ハ冷結メ不通者アリ此方効アリ此証ハ又寒有テ夫ヲ為ニ経閉スル者也從シ通経丸ハ別ニコレラスルニ不及ノ附子湯ト真武湯ノ類ヲ用テ夫ニ瘀血丸ノ如逐血ノ剤ヲ兼用スヘシ此証傷寒論ノ冷結膀胱ノ行経閉ハ尺内脉未緊ヲ目的トメ用ハ仕覚也

又小腹ヲ按ニ冷者アリ益ヨシ然レトモコレハ有モアリ無モアリ又夜ニイタレハ捻當

濟生方通経丸
治婦人室女月信不通或成血痕疼痛　桂心　青皮　大黄　川芎　乾朮　乾漆　當歸　桃仁
右為細末為丸

杯ノ証ニ足ラズ内緊成有テ疑似スル者也

奪命ハ大抵ハ初メカラ用ル薬ニ非ス此方冷結ニモ用ヒ熱結ニモ用レトモ熱結ニハ先熱結ノ治法ヲナシテモ効無時此方杯ヲ可用

羽澤散 以上六方並有別集

○此方坐薬也坐薬ヲ千金ニ導薬ト云テアリ坐薬ト云ヨリ導薬ト云カヨカルヘキ名目ノ様ニ思ハル也是ハ内ヨリ色々薬治メモ無効トキ此方ヲ兎用スル心初メヨリメツサウニ用ルニ非ス此方経閉門ニ挙テハアレトモ経閉ニハメツタニハ不用也経閉ハ大抵ハ是ヲ用ルニテ不及者ニテ此方十ニ八九ハ帯下ニ用ル心旦是ヲ経閉ニ用テ見ルニ道筋違事ヲ帯下ニ用ル如クニツイチヨツトニハ下ラヌ者ヲ帯下ナレハ早ク下ル心扨帯下ニハ此方也トモ金鳧ノ礬石九ニテモヨケレヒ経閉ニハ千金経閉門子ニ出シ大黄礬石外ニ何ヤラ一味入テ三味ノ坐薬アリ和方ニハ其上ヘ桃仁ヲ加ヘシ四味ノ方アリシカシ是ハ千金ノ方有ハ夫ニテヨキ心羽澤散ハ帯下ニ用ル方也実ハ経閉ニ用ル方ニ非ス経閉ニハ千金ノ方ヨシ又夫ヲハナレテ硫黄ノ入ル坐薬ノ帯下ニ用ルアリ和方ニ多クアリ此方経閉ニハ不用心右ノ硫黄ヲ入ル方

ハ帯下下冷ノ甚キ者ニ用其証腰冷或陰中冷抔スル
者也右ノ硫黄ノ入ル坐薬ハ羽澤散ニ硫黄ヲ加タル
様成方ニテ羽澤ト遠カラヌ方也硫黄ノ入ル方ハ陰
冷ヤ或腰冷痛ニ或又通例ノ坐薬ヲ用テモ無効時ハ
右ノ方ヲ用レハヨキ者ニ陰冷痛ニハ硫黄ノ入タル
方大ニヨキモノナリ依テ其方ヲ別ニ不立乍直ニ羽
澤散ニ硫黄ヲ加用ルカヨキ心餘リニ方數ヲ多クス
ルヨリハ右ノ如ク直ニ羽澤ニ硫黄ヲ加ヘテヨシ
扨凡経閉ハ此門ニ挙レ五六方ノ丸薬ニ本湯ヲ兼テ
足ル者ニ此外ニ灸ヤ温泉ヲ兼ル心灸ハ奪命丹ノ場

ニ用ユ温泉ハ灸抔メ無効時用ル心経閉ノ坐薬ハ諸
薬ノ無効トキ用ル心依テ経閉モ大抵灸ヤ温泉ニ不
及メ丸湯ノ二剤ニテ治スル者ニ乾血労ニスルモ奪
命ノ場ニテハ通シ灸ニテ動カスタメナリ雑病ニテ抵當ノ證抔ハ抵當ヲ用ルナラハ必
灸ヲ兼施スヘシ桃核ノ場ハ灸ハアレ、何動カシタ
キ時用ル也灸ハ膀胱ノ穴腰眼ニスル心此ニ一治験
アリ一婦人アリ年九二三経閉メ腹脹ス抵當湯ヲ本
分量ニ一一目カタメニ抵テ粗畧ナキ様ニメ用サセ且
刺絡抔モ兼テヒタスラ血ヲ逐フノ手立ヲセシニ血

モ不下尚腹満モ不減於是復趣向ヲカ卫テ頻ト血ヲ
ハナレテ腹脹ヲ目的ニ大承気ヲ用シニ依然トシテ
不効於是後初メニカヘリテ色々破血ノ剤ヲ用タリ
只夫トモ不用者ハ坐薬ノミナリケリ然レトモ頻ト
効ナカリシ故セン方無薬ヲヤメサセテ只灸治ヲ十
日程モ施セシニ一旦腹痛メ来テ大ニ脫血セリ是ニ
因テ腹満モイ卫経水昔ニカワラス通メ今ニ壮建ニ
テ世事ヲ整テ居ル

○凡経閉一通リノ軽証ニテ逐瘀ノ薬ヲ用テモ効ナ
キ時ハ羽澤ヲ用テ扶ケシムル事アリ従シ小腹一ハ
イニ塊結シテ諸破血ノ薬ヲ用テ不通時ハ假令羽澤
ヲ用テカヲ扶ケテモ不通モノ心毒ニヨル経閉ニハ
坐薬ヲ用ル事アレトモ是モ大抵ハ坐薬ヲカラスメ
モ通スル者ノ何レ先経閉ニハ坐薬ヲ用ル事ハ大抵
ハナキ者ノ羽澤ハ帯下ニハ有効者也赤白帯下ハ急
ニハ下リ盡サヌ者成ニ礬石ヲ坐薬ニ用ル時ハ直テ
ニ下リ盡ス者也

續方

陳自明通経丸 婦人良方 治月経不行或産后悪露臍腹作
痛 墾地黄 今用乾物 蝱虫 水蛭 桃仁 右四味水煎

温服〇余嘗用此治乾血勞

〇三角子抔ハ抵當ノ場ヘハ皆此方ヲ用ラレタリ從ヒテ抵當ノ場ヘハ此方ニテハ當リニクシ此方ハ抵當湯ノ大黄ヲ去テ地黄ニ代シ方也平生ノ通經ニハヤハリ大黄ノ入ル抵當湯ノ方カ優ルヘシ余カ此方ヲ用ルハ地黄煎丸ノ処ヘ用ルヘシ地黄煎丸ナキ時ハ此方ヲ用テヨシ良方ニハ是ヲ蜜丸ニメ用テ有ナレ圧余ハ大抵ハ湯ニメ用ルヘシ也良方ニハ分量ハ水蛭蝱虻桃仁各五十枚乾地黄四両トアリ石ノ量ニ照メ劑スヘシ此方良方ニモ別ニ虚候ニ用ルト云主治モナケレトモ余ハ地黄煎丸ノ処ヘ用ル心地黄煎丸ナキ時ハ此方ヲ用ル也

〇延経水期方續斷　蒲黄炒　瓜蔞仁　枳殻　紫檀　滑石　右六味煎服此方三角家ノ大秘方ニテ妾リニ人ニ不傳方ヘ経水ノ期ヲ延事抔ノ術ハ平人ハ不用ナレ圧朱門縉紳ノ間アル者抔ハ経水ノ期ヲ延シテホシキ事アリ此方ヲ用ルニハ譬ヘハイツモ月初トモ余ハ地黄煎丸ノ処ヘ用ル心地黄煎丸ナキ時ハ此方ヲ用ル也良方ニハ是ヲ蜜丸ニメ用テ有ナレ圧余ハ大抵ハ湯ニメ用ルヘシ也良方ニハ分量ハ水蛭蝱虻桃仁各五十枚乾地黄四両トアリ石ノ量ニ照メ劑スヘシ此方良方ニモ別ニ虚候ニ用ルト云主治モナケレトモ余ハ地黄煎丸ノ処ヘ用ル心地黄煎丸ナキ時ハ此方ヲ用ル也

〇延経水期方續斷　蒲黄炒　瓜蔞仁　枳殻　紫檀　滑石　右六味煎服此方三角家ノ大秘方ニテ妾リニ人ニ不傳方ヘ経水ノ期ヲ延事抔ノ術ハ平人ハ不用ナレ圧朱門縉紳ノ間アル者抔ハ経水ノ期ヲ延シテホシキ事アリ此方ヲ用ルニハ譬ヘハイツモ月初

ノ三日メヨリ経ノ通スルト云者ナラハ此方ヲ朔日
ノ頃ヨリ用置ヘソウスルト経水延ル者ヘ分量ハ見
ハカラヒニ劑スヘシ此方ヲ用テ経水ヲ延セシトテ
身ノ害ニ成者ニ非ス此方中所仕ノ薬品ヲ觀ヨ皆血
ヲ逐方ヘ屬スル薬ニテ血ヲ渋ラス薬ニハアラサル
ヘ此方カワツタ者ニテ成程是ヲ用レハ延ル者ヘ

赤白沃崩中漏下

○沃ハシリ物ヲ指テ云也赤白沃ハ後世所云帶下ノ
証也此帶下ニ古今定説ナシ此ヲ詳ニ辨セン帶下ト云
ハ人身ニ帶脉下ト云脉絡アリ此ハ十二経ノ外ニ奇経

八脉下ト云カアリ帶脉ハ右ハ脉ノ一也此脉ハ腰間ニ
横テ有テ束帶ノ状ノ如キ者ヘ故ニ其脉絡ヲ帶脉ト
名ク此帶脉ノ下カラ病ヲナス者ヲ帶下ト云カ正義也其徴ハ金匱ノ婦人雜病篇
ヲ捻テ帶下ト云カ所云血海ヘ其処カラ病ヲナス者
ニ色々脉証ヲ云テ其終ニ此皆帶下トク、リテ有ヲ
証拠トメ可也而ルニ某源方以來后世諸家帶下ヲオ
リ物ノ名トメ來レリ此ハ非也后世ニ或水與血兼帶
下也ト帶フル儀ニトリシモアリ是病源候論ノ見
ナオリ物ナレハ赤白沃ト云カ能當レリ沃ハソヽク
ト訓メ流レル儀也帶下ト云ハヒロク赤白沃ハセマ

クメ下リ物ノ儀ノミニ之故ニ帯下ノ説ハ金匱ニ適従スヘシ扨帯下ノ名義ハ是ニテスミタリ次ニ帯下ノ脉証成カ此証ト云者カ中々古世言処ノ如クセマキ物ニハ非ス凡ソ金匱ニ述列子タル羊ノモノニテ証ノ多端成物者テ其變化ニ至テハ此帯下ヨリメ譬ヘハ持病ノ頭痛カ出來タリ或持病ノ痾証抔ニ成テ頓ト帯下ノ離レ切タル病証ヲ招キ出ス者也金匱ニモ千變萬端ト有カ成程爾カリ其千變萬端ノ時ニ乍多キハ男子ノ疝氣疝積ト云ニ似タル者カ多キ心故ニ素問ニモ男子七疝女子帯下痕聚ト疝ト帯下ト張合セテ言テアリ此語抔ハ取ヘキ語也男子ノ疝モ儒門事親抔ニモセヒ疝トワケテアル如ク陰嚢ノ腫ル、計リニ非メ色々アル者ヽ女子ノ帯下モ成程色々有也以上ハ古キ帯下ノ名目テノハナシ也扨此カラ彼下リ物ヲ論セン凡帯下ノ下リ物青黄赤白黒ノ五色何レモ皆アル者ヽ五色ノ内赤白ハ論スルニ不及其青ハ如青泥抔ト云テ有テイカニモ泥ノ如クニアリ黄ナルハ如爛瓜ト云テ有テ瓜孿爛シタル様ニアリ又如黄涎ト云詞モ方書ニ有シト覚エ黒ハ即黒血也成程右ノ如五色イロ〳〵ノ色有者ナレ共其中ニ赤ト白

トカ右多キ故赤白帯下ノ赤白沃ノト名ケテ方書ニ
病名ヲ是ニテスヘテ有ル赤ト白トノ中ニ十ニ八ハ
白沃成者ノ叓此赤ヲ熱トシ白ヲ寒トシ又白属氣而
赤属血抔コレ皆配當ノ説ノ大抵ソコラノモノテハ
アレトモ必シモ拘泥スル事テハナシ併シ大概ハ右
ノ如成者ノ其内張子和カ赤者新積也白者舊積也ト
新舊ヲ分タル論是ハ最妥近シ是ハ早キ譬ヲ以テ云
ハヽ諸膓物也始ハ赤血後ハ白膿ニ成カ如シ又毋臺
玉案ニ無説アリ其病與淋相似然淋病之所下者多散
而薄必覺臭穢帯疾之所下者多滑而稠無腥穢之氣以
此為辨耳トアレトモ孫對徹程ノ人カ是ハキツイ大間
違ニニテ今病者ニ取テ試ルニウラハラノ相違也決
メ不可從也右ノ辨ニテ帯下ノ病因ヲ云ハヽ或帯下ノ下リ物ハ
スナリ叓又帯下ノ病因ヲ云ハヽ或帯下ノ下リ物ハ
湿痰也トモアリ毋溪抔云爾或内傷于七情トモ云
アリ此説右多シ或ハ腎虚ニ属スト云アリ皆其肯綮
ヲ得サルト見エタリ金匱モ前ニ云シ通リ帯下ノ説
ハヨケレトモ其虚積冷結氣ニ因ト病因ヲ論セシハ
全ク適從モ成難シ虚積冷結氣ニテハ未尽也夫ノミ
ニハ限ラヌ事ノ今病者ニ徴ヲ考見ルニ帯下赤白沃

強テ其源ヲ究ムルニ不及只帶下ト云ヲ一脈証ニ立
テ夫ニ従テ治ヲナスヘレ療治モ其アラハレタル脈
証ニ就テ方ハ自由ニ處セラル、也病因定マラ子ハ
治療カナラストト云ニ非ス夫トモニ病因ヲキハメ子
ハ治療ノ出來ヌ者ナラハ深ク究子ハナラヌ事ナレ
トモ其脈証ニ従テ治メ足ルヘク扨適言モ必察スルト
アル如ク俗ニ血ノ道ト云又腰氣ト云事アリ甚ヨシ
俗ニ血ノ道ト云ハ経閉或崩漏ヨリメ諸証ヲ致スニ
依テ先病因ヲ云シ者也又俗ニ腰氣ト云ハ是金匱ノ
帶下ニ當テ金匱ニテハ帶脈ノ下ト云此邦ニテハ腰

間ノ病氣ト云ニテ腰氣ト云タル也即帶脈ノ病也此
腰氣ト云ハ病因ヲ云タルテモナク只腰気ト一脈証
ヲ言タル也是正名ニ凡婦人ニハ十人九人ハ此腰氣
アル者ニテ故ニ中華ニテモ十女九帶下ト云諺アリ
十女九帶ノ語金匱ノ論注ニモアリ金鑑ニモ引テ有
也醫ヲナス者兼テ此理ヲ明メテ娘人ヲ療スヘキ事
ナリ帶下ノ治ヲナスニハ右ノ事ヲ意得置ケハ色々
ト治法ヲナシテユカル、也其治方ハ奥ニ列擧セリ
此ニテ帶下ノ事ハスム也
扨崩中ハ経水カ三月五月乃至半季一年モ滞テ有テ

一度ニトツト血ノ下ルヲ云即俗ニ大血ノ下ルト云
是也其下ル勢岸ノ崩レテ水ノ流去カ如ク或山崩レ
テ源泉上ヨリ水ノ溢レ出ル義ニ取テ崩ト名ケシ也
中ノ字ノ義ハムツカシキヨウナレ𪜈入門マラニ血
流テ内ヨリ出ルヲ以テ中トシト有先是ニ従フヘシ
何レ千金抔ヨリメ舊ク云ナラワセシ病名也其下ル
者或清或濁或清濁雑ヘ下リ或純ラ瘀血ヲ下スモア
リ其証ノ甚キニ至テハ振々欲擗地或寒慄或頭目昏
暈四肢厥逆ニ至ルアリ其疾甚急劇成大病ナレトモ
程ヨク治スレハ両フリテ地カタマルノ諺ノ如クア
トハ却テヨキ者也併シ軽卒ニ見コナサル、病テハ
ナク彼頭暈厥逆抔ノ時一度治ヲ誤ル時ハ暫時目前
ニ人ヲ殺ス也四逆加人参抔ノ如キ附劑ヲマルヘキ
處ヘ芎歸膠艾抔ヲヤリテ居テハクヒキヲ旋ラサヌ
内ニ人ヲ斃ス者也畏ルヘキ事也

漏下ハ血下リテ止ス譬ハ経候ノ五日ト七日トアル
ヘキ者カ十日モ九日モ下リツ、ケ或休息ノ漏下ス
ル者モ有也三ケ月ノ漏下ナラハ其内ニ三日四五日
自ヤミテ有テ復下ルモアリ又一二年ノ漏下ニテ云
ハ、一月トソコラハヤミテ有テ又漏下スル者也故

二一時ヤミシトテ夫ニテ病邪ノユルミタル者扨ト
心得ヘカラス扨漏ト云ハモル、ト訓スレトモ俗ニ
云モル、ト少異也漏字ハ不已ノ義ヲ含ミテ有ル時
計ノ水ノ漏テ晝夜不已ヲ以テ即トケイヲ漏ト喚或
雨タレヲ屋漏水ト云傷寒論ノ發汗遂漏不已扨ヲ照
メ參考スヘシ皆不已ノ義ヲ含テアル字ニ漏下ノ字
義ハ血下リテ止ス右ノ雨タレ扨ノ漏テヤマヌ様ニ
成ニテ名ケシ者ニ扨其漏下ノ証ハ最初ハタチワツ
ライナレトモ後ニ至テ不已ハ往來寒熱盜汗咳嗽ノ
種々ノ証候起テ段々羸瘦メ床ニツキ遂ニ勞ト成テ
不起事ヲ致ス是又打棄オケヌ病ニ故ニ初メ立煩ノ
時早ク治ヲ可為
○世ニ崩漏ヲ混メ云ハ非也崩ハ血崩也脫血也俗ニ
大血ノヲリルトヲ云是ニ今ノナカチト云者是ナリシ
ラチハ帶下ニ即白沃也
○醫説巻九云婦人衝任ニ脉為十二経之海ニ経氣虛
後為勞傷則不能制其血故非時即下淋瀝不斷謂之漏
下其血與穢液相兼而下謂之帶下忽然暴下謂之崩中
其色白為冷赤為熱赤白相兼有冷熱也
醫學入門巻十四崩漏門云崩漏有虛亦有熱熱則流通

虚溜泄血熱則流虚則溜凡非時血行淋瀝不已謂之漏
下忽然暴下若山崩忽謂之崩中有五色以應五臓

括蔞根湯　治帯下方　括蔞根　百合　知母
瓜蔞仁　薏苡仁　柴胡　黄芩　甘中
右八味以水二合煮取一合

○此方ハ所謂帯下ニテ心胸ニ附者ニ用ル心帯下ハ
多ク男子ノ疝ト同クメ寒ニ属スル者ナレトモ中ニ
熱ニ因モノアリ假令本寒也トモ心胸ヘカヽル者ハ
今ハ熱ニ因者也此方ハ即熱ニ因者也此方當飯四逆
ト相反ス當飯四逆ハ寒ニ属スル者ニ且此方ハ上ニ
アリ當飯四逆ハ下部ニアル者ニ用ユ當飯四逆ト寒
熱上下ノ分チアリ此方和方ニ此括蔞根湯ヲ用ル処
ニ大小柴胡及ニ柴胡姜桂ノ証モアル也此方ハ至テ
ヨクキク者也

○此方ノ目的ハ左臍旁ニ塊有テ夫ヨリ胸脇抔ニ拠
リテ苦満モアリ或ハ往來寒熱シ或痞シ大底柴胡ノ
証ト同クメ或ハ腹痛スルモアリ或腹冷或頭ニフケ
ヲ生シ或頭痒ク或口粘リ或肩背強リ或ハ背ニヒキ
ツリ痛抔スルニ用ユ又赤白沃ヲ見ルモノニテモ不
見モノニテモ用ユル也必竟是モ云ハ上熱下寒也温

経湯ノ行処ト近シ然レドモ温経ハ効ノヌルキモノニ
此方ハヨク効ノ有者ニ胸脇ニヨラスメモ肩ヘ凝ル
子フケ抔ニテモ有子何レ上ニ云分アル証アラハ此
方ニテヨシ田中子ハ瓜蒌根湯ノ処ヘ柴胡香附子地
黄牡丹皮ノ四味ヲ用ラレタレドモ効ナキ方ナリ右ノ
方ヲ田中子ハ温経湯ノ場ヘ用ヘラレタリ是モ温経
湯ハアマリ方長クメ且効モヌルキ故ニ右ノ方ヲ立
ラレタリ枯萎根湯ハヒツヽマンテ云ヘハ帯下ニテ
柴胡ノ証アル者ニ用ユ其証柴胡姜桂ノ証ト少ク異
ニメ腹候ハ大小柴胡ト同ク脇下硬満抔アル也譬帯

下ニテモ胸脇満微結メ動氣アレハ柴胡姜桂ヲヤラ
子ハナラヌ心又譬枯萎根湯ノ証ニテモ動氣強クハ
柴胡姜桂ヲヤルモ也併其動氣モ委ク云ハ各其別アリ
柴胡姜桂ノ動ハハアクト浮散ス無力也若其動トク
くトカ有テ來ル者ハ姜桂ニテハ不治者也此時ハ其
動氣ニ目ヲ附ス何也トモ随証方ヲ用ルナリ枯萎根
湯ノ証アレハ枯萎根湯ヲ用ル也又此方ノ証ニハ唇
口ノ粘ル者ハアレトモ唇口ノ乾燥ハナキ也唇口乾
燥スル者ハ温経湯ノ行処也是亦枯萎根湯ト温経湯
トノ別也若假令柴胡ノ腹候有テモ唇口乾燥スル者

ハ腹候ヲ辛テ温経湯ヲ用ルカ又ハ柴胡ノ腹候全ク
アレハ先胸脇ヲ柴胡ニテサハキテヲキテ温経ニテ
唇舌乾燥ヲ治スル也何ニモセヨ柴胡抔ニテハ唇舌
乾燥ハ不治モノ也扨此方往来寒熱ハ有テモ餘リ劇
シカラヌ也若往来寒熱ハケシキ時ハ括蔞根湯ノ証
ニテモ先柴胡類ヲ以テ表熱ヲ挫ク事モ有也括蔞根
湯ハ帯下ニノミ用ル也経閉ニハ上熱下寒抔ノ証ア
リテモ此方ハ不用也経閉ナラハ此場ハ柴胡抔ノ行
ク処ニ括蔞根一名白薬ト云故ニ今余カ家ニテ此方
ヲ白薬湯トモ名クル也今薬店ニテハ括蔞仁ハ皮ヲ
去シ者也皮ヲ去テハ油クサクメ大ニ飲ニクキ者也
故ニ余ハ皮ヲ不去者ヲ取用ユ皮ヲ去タレハトテ別
ニ効アルニアラス殊ニ王肯堂有言云括蔞實連穀剉
用去殻無効ト有此方ハ柴胡括蔞根及仁ヲ大ニナシ
百合知母黄芩ヲ中ニシ甘草ハ小ニ剤和スヘシ〇少
腹冷ルニ熱ニヨル者有テ烏頭附子ニテ不食メ柴胡
黄芩抔ニテ愈ルコアリ一娠人腹中寒ルト云外ヨリ
是ヲ窺フニモ少腹殊ニ冷動氣有テ柴胡姜桂ノ証ニ
侶テ肩背ヘ凝頭ニフケヲ生ス瓜蔞根湯ヲ用テ愈タ
リ此病人ハシメ温経湯ヤ附子剤ヲ用ニカトモ不愈

ニ故ニ瓜蔞根湯ヲ用タリ○凡婦人項背強ヲ患ル者但
項背強ヲ治セントメハ治セヌ者ナリ是多ク疝或帶
下ノ所致也其本病ヲ治スレハ自ラ項背ノ強痛モ愈
ル者也毒ヨリ来ル項背強ニ提肩散行也疝ニヨル者
ハ當皈大黄湯ノ類也ナレトモ如何ニメモ不愈益項
背ニ凝テ石ノ如クカタマル者アリ夫等ニテモ懸泉
ニウタスレハ是非一旦ハ愈ル者也其中ニ夫ニトク
ト治スルモノモ有也○婦人ノ帶下ハ即男子ノ疝也
脈証治法皆同事也但オリ物ノ一塗異成ノミ也毒ニ
ヨル帶下ハ少ナシ凡テ男子ニハ毒ヨヤム者多ク婦
人ニハ毒ヨヤム者少ナシ是経水ニヨリテ毒氣悪血
去者ト見ユ古人既ニ此説アルナリ疝ノ証モ色々有
者ナレトモ赤白汏ヲ疝ニアツル証ハナキ心儒門事
親ニ是ヲ血淋膿淋ニアツル者ハ非也淋ニハ痛アリ
汏ニハ痛ナシ膿淋ハ真ノウミ也白汏ニ似テ尿道牝
戸ハ膿ニ非ス米泔汁ノ如キ者也破漿ノ採成者也若
白汏ニ似テ尿道牝戸ノ痛ム者ハ白汏ニ非メ它病也
又男子ニ在テ膿淋ニメ無痛者ハ尿道ニ出来物有カ
何レ淋ニ非ス又血淋ニメ痛ナキ者ハ尿血也凡帶下
ノ塊ハ左リヘツク者ハ甚キハ右ヘモ及フ也右ニ塊

有ハ毒ニメ解毒湯ノ類ヲ用効アル者アリ又傷寒蓄
血或経閉ノ類ノ如キハ右ヘ附也産后早々ノ瘀血抔
モ必右臍旁ニ附者ヽ甚キハ左ヘモ廻リ小腹一面ニ
成テ有者ナリ帯下ト瘀血ト同シヨウニ塊アリト云
ヒ左右ヲ異ニスルヲ見レハ同キ者ニ非スト見ユ産
后早々ノ瘀血ハ左ヘ及フ程ニハ無者也扨又婦人帯
下ノ塊ニ動氣モナク按メ痛モナキハ外証帯下ニ似
タリトモ帯下トナスヘカラス若其帯下ノ塊ニ動氣
モアリ痛モアレハ帯下ニトルも又瘀血ノ塊ニハ動
悸ナキ物也死血ナレハ心帯下ノ塊ニハ聚散抔モア
リ動悸モ有也扨帯下ノ塊臍旁ニ有テ小便ニ近赤白
ノ物ヲ交ヘ下ス事アリ此等ハ止テハアシキ者也塊
ノ解スルヨウニ成テカラ止ルカ宜也凡テ帯下ヤ産
后ノ悪露抔ハ常ノ下血抔トハ違テ下リ過ルト思程
カテヤウト宜者ヽ悪露抔ハ千度宜ト思ハイツテモ
下リヨウノタラヌ者ヽ併アマリ下ルモ亦反テ悪シ
キ者ヽ又帯下ノ毒ニヨル者ハ通スル時必痛ム者ヽ
夫ハ土茯苓劑ヲヤリテ良也然シナカラ右臍膀ノ塊
アル時ハ譬通スル時不通痛トモ土茯苓劑ヲ投メ可
ヽ通スルトキ不通ヲハ變ニトルヽヤハリ男子ノ淋

疾ト其候法同事也又帶下ニテ右臍旁ニ毒ノアル者ハ解毒スルハ勿論ナレトモ又毒ノ候カ右臍旁ニナクメモ脚痛タリ或下リ物常ノ白沃ニ非スメ如膿ヲ下スハ是ヲ目的ニ解毒メ宜也常ノ白沃ハ乳汁ノ如クウスキ者ニ毒ニヨル白沃ハ膿ノ如キ者ニ膿モノ心併右臍旁ニ毒ノ候有テ解毒スルヿハ最ヨク効アリ不爾シテ右ノ如キ証ヲ目的ニメ解毒メハ効ヲトルヿ遅キ者ニ叓又渦下ト帶下トノ別ハ渦下ハ月経後ニキツヽニテアル帶下ハ月経后ニ限リハセヌニ旦帶下ハ他ニアマリ云分ナク項日ハ何カ下リマスト云様ナ者也旦帶下トハ云ヒ治ハ是非白沃ニテ夫カラ段々赤クナル成ル者也帶下ハ毒ニヨル淋ト同ク初メニハ白クメ後ニハ血ニ成者ニ又帶下ニハ餘リ腹痛ナシ経水ナレハ下ル前ニ十人ニメ八九人ハ腹痛スル者ニ譬腹痛ニ至ラストモ腹中ウヅくスル者也夫モ常ノ腹ノ悪シキト違ヒ自ラ経水アル叓ハ前方ヨリ自身ニ知ル者ニ又帶下赤白沃ハ第一ヌク十中二七八ハ煞ル者ニ其次ニ有ハ白沃ニ赤ヲ交ヘ下スル者也赤汰ハ至テ少キ者ニ叓前ニモ云ヒ如ク帶下ハ廣ク云ヒ者ニテ経水不利ヲモ云ヒ也今云帶下ハ古

ノ帯下ノ一証也金匱ノ婦人雑病門ノ礬石丸ノ証ノ
ミヲ今ハ帯下トヽ云也白物ヲ下スモ是血ノ其徴ハ金
匱ノ礬石丸ノ条ニ中有乾血下白物ト有是也帯下ハ
毒ヨリ来ル者ト血ヨリ来ル者トアリ毒ヨリ来ル者
ハ毒ノ治法ヲ主トスヘシ是真ノ帯下ニ非ス即毒ナリ
血ヨリスル者ハ血ノ瘀スル者ト見ハ桂枝茯苓丸抔
也血下リ過ルト見ハ芎歸膠艾抔也

瓜子仁湯

○此方本腸癰ヲ治スル薬ナレトモ是ヲ帯下ニカリ
用ル也此方ハ帯下ノ赤白沃抔有テ始終下ルケレモ
快ク下ラス腹ニ塊アル者ニ用ユ此方ハ用レハ下リ
物モ快ク下リ塊ヲ消メ治スル者也此方ハ成方ニテ
効アレトモ方中ニアル瓜子仁ヨク帯下ヲ治スル者
ニ瓜子仁ハ即拮蔞仁也拮蔞ハ仁及根トモニ能帯下
ヲ治スル者ニ故ニ拮蔞根湯モ二味トモニ入テヤル
也此方ノユク処ハ大抵坐薬ヲ通用メ行也此証ハ帯
下ノ内ニテモ膿ノ如キ者ヲ下スヲアル也此方ハ何
レ塊カ目的也又瓜子仁湯ハ臍ノ右ニ塊有テモ用ル
也併シ右ニ塊アルハ自ラ痛ム者ハ用レモ痛ナキニ
ハ不用也左ニアル者ハ痛ナクメモ塊ヲ目的ニメ用

ル也又桃柔シテ赤白沃ニ用ル事マヽアリ併シ白沃ニ
ハ不用也桃柔ト瓜子仁湯トノ別ハ瓜子仁湯ハ一方
ニ一顆有モノヽ桃核柔氣ハ少腹急結ニテ少腹中ニ
凝有者ヽ瓜子仁湯ハ一処ニ凝結メアル者ヽ併シ桃
核柔氣ヲ用ル事ハ少ナキ者也此ニ一治驗アリ婦人
身膣滿シ患フ醫ヲ更テ是ヲ治セレムルニ効ナシ三
角子ヲ請テ治セレム三角子是ヲ診スルニ右臍旁小
腹ニ塊アリ乃チ瓜子仁湯ヲ與テ効ヲ得タリ是帶下
ノ變ト見テ治ヲ得シ者ヽ扨帶下ニ桃核柔氣ヲ用ル
事ハアレトモ抵當ハ不用也

薏苡附子敗醬散以上二方並見腸癰條

○此方モ本腸癰ノ藥ニテ今帶下ニ假リ用ユ此方瓜
子仁湯トケシユク場チカフ也其証下リ物過テモフ
止メテホシキ者ト云處ニ行也此湯ヲ用ル処ハ腹ノ
塊モ太抵消テアリ或全ク無モアリ又此証ニハ或臍
腹痛ニ或腰脚冷抔スル者也又瓜子仁湯抔ノ處ハ立
煩ト云勞ノ者ヽ此方ノ処ハヘツタリト蓼氷ニツキ
オルト云ヤウナル者也又此門ニノセテハナケレモ
大黄牡丹湯ノ行処モアルヘシ併シ大抵ハ大黄牡丹
湯ノ証ハナキ者ヽ瓜子仁湯テ良モノヽ瓜子仁湯ト

薏苡附子敗醬散ノ場ハ拍蓌根湯ヤ當皈四逆抔ニテ
モ行ヌ者也
○此方ハ赤物ナクメ白沃ノミヲ下スニ用也譬赤沃
少シ計リ有テモ白沃ノオモニ下ル処ヘ行也但シコ
ノ白沃ノ治ヲ色々旋メモ不愈メ陰証ニ成タル者ニ
用ユ此等ノ場ニ至リテハ毒ヨリ来ル白帶下ニテ陰
位ニ至リタルハ此方ヲ用ル〻毒ヨリ来ルヤ如何ト
ソノ因ヲ以テ治ヲ異ニスルハ初段ノ事〻末ニ成テ
陰位ニ行テハ何ヨリ来ル者ニテモ裏ヲ救ノ處ニ於
テハ一也又此方ノ処ハ沃モ純白成者也瓜子仁湯ノ
処ニ赤白沃トモニ有〻一體瓜子仁湯モ薏苡附子敗
醬モ白沃ニ用ル方也赤沃有テモ白沃ヲオモニ下ス
ト子赤白雑ヘ下ス者ニ用ユ純赤色ノ帶下ニハ不用
也全体赤帶下ノ方ト云テキツト立テナキ也桂枝茯
苓丸抔ハ先赤帶下ノ藥ト云ヒ赤色ノミナレハ漏下
也此間甚紛ラハシキ者〻

桂枝茯苓丸

○此方漏下ニ用ユ内瘀血有テ漏下スル者ニ用ユ帶
下赤白沃ニ用ル事ハ無也然レトモ経冷漏下ナレハ
下テ一際ニ此方ヲ用ルニ非ス漏下ノ証ニテ桂枝茯

芩凡ソ用ヘキ処ヘ或芎歸膠艾ノ類其它色々ノ血ソ
止ル藥ソ用テモ血不止反テ安排アレキ者ナリタト
ヒソレニテ血止テモ跡ニテ腹力脹タリ不食シタリ
気分アレキ也色々悪シキ証出ル者也然ルニ此柱枝
茯苓凡ソ用テ瘀物ソ逐ハヨク血モ止者也此方芎歸
膠艾ト反對ノ藥也
芎歸膠艾湯 以上二方並見姙娠条
〇此方渦下ニ用ル藥ニテ旁ラ赤白沃ニモ用ル心此
方ハ止ル藥也又赤白帶下ノ下リ過テ不止者ハ牡蠣
烏賊骨二味等分ノ方ソ用ル方心此方散服也長服セ

シムヘシ爰ニテハ本方ハ芎歸膠艾或當皈建中杯ソ
用ヒ夫ニ右ノ散ソ兼用スル也又此処ニテアレライ
藥ノ本方ニ紫胡姜桂ヤ當歸芍藥散ノ類ニ右ノ二味
ノ散ソ兼用スルモアル心又黄土湯ニ右ノ散ソ兼
用スル事アリ又帶下赤白沃ソ下メ不止者紫胡姜桂
ソ用テヨキフアリ牡蠣杯ニテヨキ者心或柱枝加龍
骨牡蠣湯杯ノタヤマく行コトアリ又一藥ニ止メタキ
時ハ石灰丸ソ用ル心其方石灰ソ醋醬草ノ生汁ニテ
子リ丸トナス心一日ニ一銭五分程ツヽ用ユ此凡ノ
石灰ノ色ソクロクスタメニ百草灰ソ衣トメ可也 石灰凡方

遠中録帯下門ニ見ユ　此石灰丸シヤル処ヘ用ル薬ニ双白丸ト云テ石灰茯苓二味ノ丸アリ萬病回春巻之六帯下門ニ見ユ　両白茯苓二両為末水丸毎服三十丸空心白湯送下　双白丸治白帯如神石灰一石灰丸ヨキ也石灰丸ハ和方也併シ石灰ヲ用ルハ少ナキ者ノ脱証ニ成テ下リ物不止時ハ勞ニテモナラントメ其人疲テ往来寒熱ノ時抔可用モハヤ咳嗽抔アルニ至テハ効シヤウルコト難シ千金抔ニハ鹿角鹿茸膠龍骨抔ノ方アレド中々急ニ止ラヌ者ノ石灰丸ニテハ急ニ止ル者也其カハリニ餘リ用レハ反テ害アリ石灰丸ハ白沃ニ用テ既ニ勞トナラントスル處ニ用ル也既ニ勞ト成ニ至テハ千金ニアル鹿角ヤ烏賊ノ方行也千金帯下門ニアリ小牛角鰓散トアリ此方ヲ余カ家千金帯下門ノ方ハ赤白沃トモニ用ル也右ノ方ハニテ増損メ丸トナシ用ル也　其方医中秘録崩漏門ニ見ユ　又千金記聞ニモ其辨アリ参考スヘシ又此処ヘ前ニ云シ牡蠣烏賊骨二味等分ノ散ヲ用ユ　其方医中秘録ニ見ユ　其内千金ノ方ハ帯下久ク不止勞状シナス処ヘ用テ滋潤メ血ヲ止ル趣向也牡蠣烏賊骨二味ノ方ハ只血ヲ止ムルニ一途成モノ也故ニ先千金ノ方ヲ具ヘ置テ若其方カケル時ハ二味ノ散ヲ可用

○婦人常ニ温経湯ノ証ニテ其方ヲ長服セレメテ有
ニ或時ニ乍毬ノ如キ白物ヲ下ス夫ニ付テ血モケシ
ハ下リスルツキ杯有テ附子テモ用レナラハ可ナラ
ンカト思ヨウニ見ユル処ヘ余芎歸膠艾湯ヲ用テ治
〃ヲ得タリ後腹痛有テ當皈芍藥散ヲ服スル事二十四
貼ニメ愈

○崩血古方家ニテハ芎歸膠艾湯其重キハ當皈建中
加附子ヲ用ユ后世家ニテハ芎歸膠艾湯其重キハ十
全大補加附子ヲ用ユ余ハ芎歸膠艾ノ重キ者ハ直ニ
四逆湯ヲ用ル也芎歸膠艾湯ハ后世家ニ膠艾四物湯
ト名ク又脫血ニ賀川ヤ世醫ノ四物加附子ヲ用ル処
ヘ四逆加人參ヲ用テ良又世醫ハ四物加附子ヲ用ル
処ノ一等軽キハ四物湯ヲ用ル也四物湯ノ処ハ芎歸
膠艾湯ヲ用ヘシ

黄土湯 方見失血條

○是ハ赤白次ト漏下トノ二証ニ用ル也金匱ニハ本
下血ノ為ニ立タル方ナレトモ余赤白次ニモ漏下ニ
モ假用ル也扨此方金匱ニモ遠血近血ト計リ有テト
ウ云処ヘ行トテ云事無也今此方用覺アリ此方尺内脈
沉緊ノ者ニ用レハ格別功アル也六脈沉緊ナレハ益

ヨレ其内尺内沉緊多シ此脈ハイツニテモ沉緊ニハ
アラサル也浮數ノ者ニハ不可用也一通リノ下血ニ
テモ用ル証ハ同シ

○此方モ芍歸膠艾抔ト同ク止ル藥也然レトモ芍歸
膠艾ハ泛ク用ラルヽ也黄土湯ハ少シフリ有也芍歸
膠艾湯ハ熱有テモ用ルヽ黄土湯ハ熱既ニ去テ未ニ
成シ處ニアラサレハ不用少シニテモ熱有テハ不用
也

黄連解毒湯方見毋毒之條子和曰夫婦人年及五十以上経血暴下
者婦人経血于七七之數々外暴下内経曰火主暴速亦因
暴喜怒憂結恐驚之致然也愼不可作冷病治之如下峻熱
之藥則死止可用黄連解毒湯以清於上云云

○此方ハ黄土湯ト相反ス熱証ノ者ニ用ユ漏下ニ用
ル也帯下ニハ此方ノ証ハ先ナキ者也是モ瘀血ノア
ル者ニ桂苓丸ヲ用ルト同ク爰ニ芍歸膠艾ヤ其外血
ノ止ル藥ヲヤリテハ甚具合アシキ也此方ノ上ノ脈
ハ浮數或洪數也何レ數ヲ見ハス者也其証ハ皆熱ニ
属スル証状ヲ見ハス者也此方急証ニ用ヒ又緩病ニ
モ用ユ急証ニ用ル時ハ四逆加人參ト表裏ス緩病ニ
用ル時ハ黄土湯ト表裡ス時ニヨリテハ此方ニ大黄

ヲ用ル事アリ或生地黄ヲ加ル亦モアリ急病ニ用ル
ハ即本文ニ書擧テアリ子和ノ治驗ヨキ也彼治驗ニ
峻熱ノ藥ト云シハ附子ノ類ヲ云ル者ト見エ併シ是
ハ附子ニ不限事也此ニテハ芎歸膠艾抔ヲ用テモ同
ク害アリ張子和ハ五十ヲ過テ経血暴下スル者ニノ
ミ用テアレヒ今仕覺ヘアリ凡大人五十六十ニ成テ
モ経行不止或其経行十日モアル者アリ夫ニツレテ
色々ノ煩ヲナスモノアリ又夫ニ下血抔ヲ兼ルモノ
アリ右ノ証ニハ黄連解毒大ニ効ヲ奏スル者アリ暴
下ニ用ルヨリハ反テ右ノ証ニハヨクキク者也扨大

抵血ハ熱ヲ得レハ下リ寒ヲ得レハ凝ル者也ト見エ
内経ニ血得寒而凝ト云語アリ又血載火而行ト云語
モ有一説ニハ云ハレヌフナレヒ大抵ハ成程シカル
者也此黄連解毒ノ証抔ハ即血載火而行者也此処ヲ
古方用ヒ局スル者ハ温経湯ヲ用レヒ無効者也詳功
ヲ収ルトモ甚々鋪クキカヌ者也然メ黄連解毒ヲ用
ル時ハ早キハ一臈二臈ニテ止者也（熊宗玄婦人良方補遺以七日為一臈）
臈
重キ者ト云ヒ一月モ此方ヲ服スレハ愈ル者也併
シ婦人年五六十ニ至テ月水ノ下テ不止ハ全体難治
也然レヒ黄連解毒ニテ効ヲ収ル者也此場ニ黄芩一

味為凡用ル方モ有テ芩心丸ト云テアリ入門抔ニモ
此丸出テアリ又黄芩一味ヲ散トシ用ルノ方モアリ
是モ本草ニ載テアリ併シ何ノ方ニテモ黄連解毒ニ
ハ不若者也此黄連解毒三黄意近クメ此場ヘハ三黄
ヨリハ此方ヨキ者也三黄ハ此方程キカヌ者ゝ吐血
衄血ニハ三黄ニ不若也下血ニハ黄連解毒ニ不若也
又黄連解毒ヲ用テ血大抵治マリシ后ハ傷寒論ノ黄
芩湯ノ行事アリ又是等ニテハ多ク夜分ハイチラレ
ヌト云ヨウナル心中煩抔有ハ黄連阿膠湯ノ行事ア
リ黄芩湯ハ必竟芍藥抔有テ調理藥也其場ハ血証全

クヤミシカ或未全ク血証不愈メモ腹引ハリ或熱抔
有テ建中ノ場ニモアラサル処ヲ此方ニテ調理スル
也

○此方老境ニ至テ暴下スル者ニモ用ユ又若年ノ人
ノ漏下ニモ用ル也此方ハ何レ熱ヲ目的ニメ用ユ爰
ノ処ハ腹ニ塊ハ無者也併シ心下ニハ云分アルナリ
其熱ノ証候ハ脈數ニメ其它ニ陰寒ノ証ナキ者ニ用
ユ此方ノ証ニ外ニハ熱ナク手足モ冷ルモノアリ下
血ノ此方ノ行処ニモ外形ハ陰ニ似マカフ者アルヽ
是熱厥ヽ悞ルヘカラス凡テ血下リテモ熱有テモ腹

ニ塊アレハ黄連解毒ノ一ク処ニ非ス此証ハ脈モ數
ニテ証モ熱ノ候ヲ見ハストモ云腹ニ塊ナクメ或ハ其
腹ヒツスコイメルヨウニ成テ羸痩モ有モノニ又此
方ト桂枝茯苓丸抔ノ別ハ黄連解毒ハ逐瘀ノ主意ハ
無メ但単ニ熱ヲ制スル薬素問ニ云血載火而行ト云
処ヘヤル薬ニテ火ヲ制スル為ノ薬也桂苓丸ハ逐瘀
ノ方也桂苓丸モ漏下ニ用ヒ黄連解毒モ漏下ニ用レ
トモ各其別アリ桂苓丸ハ腹ニシツカリトシタル塊
ハナケレトモ何レ少腹凝結メアル也黄連解毒ハ腹
ニ頭ト凝血ハナキ也且桂苓丸ノ一ク処ノ下ル血ハ
折々凝タル瘀血ヲ下ス者也黄連解毒ノ証ノ下ル血
ハ瘀血ニ非メ鮮血ナリ又二方ノ証ノ来ル処ヲ分テ
云ハヽ桂苓丸ノ証ハ経閉メ有テ夫カラ漏下メクル
ト字或経水来テモ不調ニテ往時ヨリ少ク或ハ一月
ニテヨツトニ度モ経ヲ下シナトシテソレヨリ漏下
シナスモノヽ何レ桂枝茯苓丸ノ漏下ハ瘀血ニヨル
也黄連解毒ハ桂苓丸ノ如ク往時ニ経水ノ不調抔無
メ直ニ漏下スル者ナリ是熱ノ為ニ血ヲ馳ラシテ下
ル者ニテ瘀血ニアラサル也子和ハ五十以上ノ血証
ニ此方ヲ用テアレ𪜈五十以内ノ者ニモ此証マヽア

ル者也五十以上ノ老人ニハ附子ノ証ハ少ナキモノ
也皆灸クハ血熱ニ属スル者也併黄連解毒ハ崩下ト
云迫ニハ至サル者也五十以外経水不絶或月ニ二度
モ来ル者ハ大抵ハ此方ノ証成者也本書ノ文ニ暴下
トアレ𪜈脫血ニハアラサル也脫血ト見ハ芎歸膠艾
ヤ四逆加人參抔ヲヤラ子ハナラヌ也又脫血ナラハ
先芎歸膠艾ヲ用テアトニテ黄連解毒ヲ用ユルナリ𪜈
アルヘシ又黄連解毒ノ証ニ似テ三黄瀉心ノユク処
アリ黄連解毒ハ心下硬也心下濡ナレハ三黄瀉心ヲ
用ルナリ併シ黄連解毒モ變ニ至テハ熱深キ者ト見
ヘ心下ニ不拘用ル事モアル也扨前ニモ云ヒ如ク子
和ハ暴血ニ黄連解毒ヲ用テアレ𪜈此方ノ証ハ崩下
ハアマリナキ者也多クハ漏下アルモノ也婦人年五
十以上経血ノ不絶者抔ハ別メナハナカラ黄連解
毒ノ証アル者成ニ其証ミナ漏下ヲナス者也真ノ崩
中ニハアラサル也右ノ黄連解毒ノ行処ニ心下痞塞
メ有者ハ三黄ヲ用ルナモアレ𪜈其内右ノ漏下ノ証
ニハ心下痞塞メ有者ハ三黄ヲ用ル事モアレトモ其
内右ノ漏下ノ証ニハ心下痞塞メ有テモ黄連解毒カ
ヨキ者也又右ノ証浮心ノ行処ハ有ト云𪜈是等ノ処

ニハ參連抔ノ行事ハナキ者也又黄連解毒ハ前ニテ
云通リ大血ノ下ル者ニハ不用也然レ𪜈子和カ云ル
事ナレハ必シモ無ト云ニモアラサルヘキ子冊溪云
實火可浮參連之類虚火可補參苓之類ト有ニヨリテ
后世家羸瘦メ疲レタル病者ノ血証黄連解毒ヲ用ル
フヲ忌ハ非也大事ナキ者也
四逆加人參湯方見臨産后條論曰吐利止而寒脉微而利利止ム
血也四逆加人參湯主之
○此條ニ是ヲ擧レハ崩中ニ用ルノミニ𪜈赤白汰ト滴
下トニハアツカラヌ也此方ノ辨既ニ臨産生后ノ條
ニ具ニス産前后ノ脫血ニ用ルト同一義也
○崩中ト産后トニハ脉浮大成者𠮟悪シキ也沉小成
者ヲ吉トスル也微細モ亦アシキ也滑下ハ緩病ナレハ也脉ニ
ノ浮大洪大ハカマハヌ也滑下ハ緩病ナレハ也脉ニ
テ生死ニカヽルル者ハ産后ト崩中ト𪜈是ハ脉ヲ以テ
目的トスル者也崩中抔ニ微細ノ脉ヲ見ス者ハ暴ニ
脫スルノ候也崩中抔ニ躁擾ノ者ハ微細ノ者ニ比ス
レハマタヨキ也是ハ内ニ保チノアル者トスル也
獨參湯　治崩中及諸失血危急者
人參二錢　右一味以水一合煮取五勺温服不知服至數

劑益暴崩危急之際非少々藥汁之所可得而救治矣庸醫
不辨用人參五分一錢以望其生豈哉其不得功
○是モ四逆加人參ヲ用ルト同シ場ノ四逆加人參ア
レハ獨參湯ハイラヌ也然レ𪜈場ニヨリテ用子ハナ
ラヌ事アリ俗人抔ハ獨參湯ヲ用子ハ安心セヌ者ア
リ且隨分功アル者故此ニ並擧ル之然メ參ヲ用ルニ
醫モ俗モ朝鮮人參ヲ大抵五分ヲ用夫ヲ水二合入一
合ニ煎シ用テ一貼限ニテスマシテ効ナシトスル也
精々用シ処カ一錢目迫也従シ一錢目用ハアマリナ
キ〻且朝鮮人參ト云𪜈五分ヤ一錢目ニテ中々効ア
ル者ニ非ス北山口訣ノ首カキニモ人參少シ計リ用
テハ無効事ヲ云テ有成程爾リ又今右方家抔ニテハ
朝鮮參ハ何程用テモ効ノナキ者ニ覺ユ后世家ニテ
ハ餘リ貴ニスキテ一分用テモ効アルヨウニ思フハ
皆人參ヲ知ラヌ也扨獨參湯ト云者ハ世間ニヨク流
布シタル者ニテ方書コトニ出テアレトモ何カ本マ
ラ未考也故ニ爰ニモ出処ハ不擧ニ有〻本方何ヨリ
出シモノヤ窺メ度者〻扨朝鮮參世間ニアルハ皆贋
物也今是ヲアラムニ細ユノ善悪ニ不拘メ氣味ノヨ
キヲ眞トスヘシ細ユヲヨクメ有モノニハ反テ氣味

妥クハ悪ク細工ノ無物氣味ノヨキ者妥クアリ又鉛ノ入テ有ハ真ニ非ト云ヒ一歩ニ云レヌ也鉛入テアル者ヨキアリ鉛ナキニ偽物アリ鉛ノ有無ヲ以テ云ヘカラス又官参モ効アルヨシ今ノ山脇陰位ノ傷寒ニ官参ヲ獨参ニメ二銭目ツヽ用シニ汗ヲナシテ効ヲ得タリト云然レハ官参モ無効者ニ非スト見ユ又直根モ用ヒナス者也又夫ニ次テ薩摩ノ小人参是モ少シハ効有者ノヨシ其它ノ人参ハ皆アヤシキ者也

温経湯　婦人五十所病下血數十日不止暮即發熱小腹満手掌煩熱唇口乾燥何也師曰此病偏帯下何以故曾経半産瘀血在少腹不去何以知之其証唇口乾燥故知之

呉茱萸六分　桂枝　阿膠　牡丹　生姜　甘草　當帰

芍藥　人参各四分　半夏八分　麥門冬一銭六分　右十二味

以水二合煮取六勺

○此方一通リハ主治ニアル通リ婦人ノ夭癸終ル時不終メ血ヲ下ス者ニ用ル也妥ニ有証ニ此方ノ第一ノ目的ハ唇口乾燥ト手掌煩熱也小腹満ヤ暮即發熱ハ目的ニハセラレヌ也故ニ下文ニ唇口乾燥故知之ト有テ腹満抔云テナシ妥ニ腹満ト有モ微満也若硬満抔ナレハ中々此方抔ハ用テオケヌ也攻撃セヲハ

ナラヌ也扨此條ニ此病屬帶下ト有此証ハ即漏下也
是金匱ノ帶下ノ立カタ也扨金匱ノ帶下ハ餘リ博シ
經閉モ何モ皆帶下トメアリ此ノコトクメハ餘リ博
過ル故ニ別ニ帶下ヲ可立何トナレハ經閉ト帶下ト
治法モ各異也又后世ノ立カタテハ餘リ狹シ是モ悪
シ扨崩中漏下ハ同ク下リ物故ニ方書ニモ赤白帶下
ト一処ニ門ヲ立テアレトモ必竟ハ崩中漏下ハ經閉
ニ屬スル也經閉メコソ崩漏モナス也治法モ一也柱
苓先挑系ノ類經閉ニモ漏下ニモ用ル也以テ其同シ
キヲ見ルヘシ然メ帶下ハ一道立テ有者也治法モ異

也証モ異也婦人勿論經閉メ赤白ヲ下スモアレ𪜈經
水常ノ通リニ多クツフリト下リテノチ赤白汰ヲ下ス
アリ然レハ經閉ト帶下ハ各其別アリ以テ可見扨金
匱ハ帶下ノタテカタハ博過后世ニテハ狹過ル也今
是ヲ折中メニ道ニ可立經閉ニ崩中漏下ヲ屬シ帶下
ニ赤白汰ヲ可屬千金ニ赤白帶下崩中漏下ト云門ア
リ故ニ此方輿ニモ姑ク千金ニ從テ門ヲ立レカ𪜈實
ハ經閉ニハ崩中漏下ヲ屬メ一門ヲ立又帶下門ヲ別
ニ一ツ立テ赤白汰ヲ屬レ凡テ二門ニ立レハ甚良也
后世ニテハ外ノ形ニ因テ赤白帶下崩中漏下ト同門

ニスレトモ内各異ニメ治法モ違アレハ赤白帯下ト
崩中漏下トハ一處ニスルハアシキ事也
○婦人年五十所病下血云云トアレ𪜈此処ハ黄連解
毒ヨキ者ノ黄連解毒ニテ治メ置テ後ノ調血ニ温経
湯ヲ用ル也其調経ノ時ト云ハ黄連解毒ニテ十ニ八
九ハ血モ止シ力𪜈血未全止或熱モアリ或手掌煩熱
抔ノ如キ有テ未全愈時温経湯ヲ用ルノ壮盛ノ婦人
ニテモ経水妄行ノ者ハ熱結ノ黄連解毒ヲ用テヨキ
ノ此場ハ柱苓丸抔ノ逐瘀スル処トハ異成也此黄連
解毒ノ行処ニテハ其人羸痩メオル故ニ后世家ノ醫
ハ此方ヲ用テ居ルヲ見レハ恐ル、程ノ者也是等ノ
時ノ熱ハ灸クハ表ニ浮ンテハ無メ裏ニ有モノノ故
ニ能々審ニ視テ方ヲ處スヘシ又黄連解毒ノ処ヘ三
黄ヲ用テモ最一息成者ノ又柴胡ノ熱入血室ノ場ニ
テモアラサルノ黄連解毒ノ條ニ次主暴速トアリ火
ハ今云癇ノ火熱ニ非ス今ノ癇右ニ云火ニ當テ良也
故ニ三因方ニテ有レ手癇ヲ治スルノ法ヤラニ火ヲ
求メヨト云ヲ是アリ是也叔温経湯ノ方后ニ亦主婦人
少腹寒久不受胎ト云テアレトモ中々此方ニテハキ
カヌ也又兼治崩中去血トアレ𪜈是モ温経ニテ届カ

ヌ也四逆加人參杯ヲ用子ハナラヌ者也又月水未過
多及至期不來メ主治アレトモ是モ温経ニテハマ
リニクシ桂苓丸杯ノ行処ノ桂苓丸ハ経水ノクルイ
有ヲ治スル者也扨温経湯ト括蔞根湯トノ筋ヲ云ハ
少シ異也温経湯ハ漏下ノ藥ノ括蔞根湯ハ今云帯下
ノ藥ナレハ其筋違ヲノミ然レトモ帯下ニテモ温経ノ証
ヲ見ハセハヤハリ温経ヲヤラ子ハナラヌコトナレトモ
用テ見ルニトウモ温経ハキヽ兼ル方ノ假令キク夏
アルモ中々九日ヤ十日ニテハ全効ヲ得カタキ藥也
其処ヲ括蔞根湯ヲ用レハ能効アル也故ニ其処ニハ

括蔞根湯ニテ大抵ハスマスカヨキ者也又温経ノ証
ニテ上熱強ケレハ柴胡下寒強ケレハ附子湯ヤ真武
杯ノ類ヲ與ルコアリ若又血下リ過テ不止時ハ上熱
ト下寒トハ不問メ芎歸膠芝ヲ用ルコアリ又唇口乾
燥手掌煩熱上熱下寒無塊者ハ温経ノ行処ノ塊ヲシ
計リハ有テモ用ル事モアレトモ大抵ハナキ処ヘ用ル
也此方血ヲ不見ハ不用也桂苓丸ハ快ク血ノ不下ニ
用温経ハ血快ク下リ不止者ニ用ユ

當歸芍藥湯 方見姙娠條

○此方ハ本姙娠腹痛ニ用ル方ノ夫ヲ假用ル也廣ク

用ル〻帯下漏下或マレニ経閉ニモ假用ル也何レア
シライ藥也其証ハ腹中拘急メ或痛或不痛或頭眩シ
タリ抔スルハ此方ノ証也此方ノ経閉ニ用ルモ真ノ
アシライ藥ニテ経閉メモ其人攻撃モセラレス腹中
拘急メ痛者抔ニアシライニ用ル也其処ニテモ拘急
強クハ建中劑ヲモ用ルコアル〻然レ𪜈全体経閉ノ
腹痛ハ逐瘀セ子ハナラヌ処ニテ大黄抔ノ行者也然
レ𪜈攻撃ノナラヌ時ハ此方抔ヲアシライニスル事
アル也○此方モ去血過灸ノアシライ藥也前ノ姙娠
諸疾門ニ治去血過灸而眩運ト云主治アリ彼ヲ取テ
可用此方漏下ニ用ユ夫ヨリ治用メ赤白汏ニモ用ル
也

當歸四逆加吳茱萸生姜湯 方見癥痂条

○是ハ帯下ニメモ用下リ物有ト無トシ不問ナリ其
証ハ或ヲ足冷或臍腹ニテ痛腰ヘ抵リ大抵男子ノ疝
ト相似タル者ヲ治スル也是其位ヲ云ハ陰ニ有モノ
ノ陰ニ有トテ別ニ陰証有ト云ニアラ子トモ脉モ沉
緊抔ヲ見ハシ或ヲ足冷タリ抔スルヲ云ナリ此方漏
下ニハ行ヌ也

○勝勢飲 治産前后一切之諸証上熱下寒者此方温

腰膝赤白帶下屬寒者極功　當皈中　水通小
丁子中之小　甘草小　香附子大　川芎　茯苓　桂枝
蒼朮　沙參各中
右十味擺用帶下子宮膣起或致膣
脹及産后膣脫皆治之
此方和方也帶下ノ上熱下寒者當歸四逆加吳茱萸生
姜湯抔ノ場ニメ用テモ無効者ニ此方ニテ効アル事
アリ温経湯抔ノ行処ニモ行也何レ帶下ノ上熱下寒
ノ者ニ慣ク用ル也又産后ノ水膣ニテモ帶下ニヨル
者トシタラハ此方主之也帶下ニヨリテ諸証ヲ見ハ
ス者ハ此方ニテ下體ヲ運動スレハ諸症愈ル者也拍

蕘根湯ハ帶下ニ用ル藥ナレ𪜈彼ハ胸脇ニ有モノ也
近頃一治驗アリ一婦人妊娠臨月ニ當リテ分娩モス
ヘキト思時ニ當リテ腹痛メ其痛ミ肛門抔ヘハリテ
水下ル余初メ當飯芍藥散ヲ用シニ腹痛モ不止水モ
益下ル洗娘抔モ分娩ノ痛トメ待ワフレ𪜈分娩モナ
シ余因テ詳ニ問ヘハ其下ル処ノ水漿水ニ非シテ赤
白次ヲ下スト因テ謂ラク此帶下毒也ト即チフト此
方ニ心附テ是ヲ與シニ此藥ノ力ニモ有マシキカハ
知子𪜈此方ヲ與ルコト二日ニメ無難ニ分娩セシセ京
堂町四條下ル処ニ正勢敬ト云賣藥アリ即此勝勢飲

ニテ壹藥ノ方ニハ揄白皮抔加テ有テ十二味ノ方也
扨帶下ノ上熱下寒ノ証ニ當歸四逆加吳茱萸生姜湯
抔ニテ無効ニ此方ニテ効アル事アレハ方モ廣クセ
子ハナラヌ夏也此方余常如ク煎湯ニメ用ル也扨帶
下ニモ經行不順ノ人抔ニモ唇口乾燥或頭ニ屑抔出
テ倶ニ上熱下寒ノ候アル者也故ニ唇口ノカハキヤ
頭ニフケ抔ノ有ハ帶下ニノミ有ト云ヘヌ者也故ニ
能臍旁ノ左右位地ノ凝結ヲ辨シ得テ左ニ有ハ帶下
トシ右ニ有ハ血ニヨルトメ其治ヲナスヘシ帶下ノ
腹候ヲ詳ニスレハ証ヲ弁テ其治方ヲ用テ効有者也

笈ニ治驗ノ噺アリ三角子敬子一婦人ヲ治ス其人元
ヨリ帶下家ニテ有シカ目ニ翳膜生メ見ヘ悪クナリ
物毎探リ取ラ子ハナラヌ程ニ成テ殆失明ニ至ル其
腹ヲ候ニ左臍旁ニ塊アリ了敬子謂ラクコレ帶下毒
ノナス処可成トテ拍蓼根湯ヲ用シニ段々眼目ノ見
エヨク成殆ト平復ニ及ケル併シ殘念ナル事ハ其婦
如何成故カ何度モ無メ頭ニ死タリ解セヌ事也又同
人ノ治驗ニ婾人アリ水腫ヲ患フ萩野和田カ輩色々
方ヲ與フト云ヒ無効後了敬子ニ請テ治ヲナサシム
了敬子謂ラク諸醫法方ヲ更テ治ヲ尽スニ不治ハ通

例ノ膣氣ニアルマレトテ腹候ヲ詳ニスルニ左臍旁ニ凝結スル者アリテ歴然タル帯下毒アレハ是即帯下ニヨル膣ナルヘシト思テ勝勢飲ヲ用レニ大ニ効有テ膣消メ全愈タリノチ荻野抔闕庭ニテ三角子ニ出會ノ時彼病人ノ膣ハ吾儕色々手ヲ尽シタルニ不治シ故不治ノ証ト思タリシニ君何戞ナク手際ニ治シタル如何成方ヲ子用ニ玉フヤト折々問シカ圧三角子ウサト勝勢飲ヲ用シ戞ハ不言メ余家ニ用覺ノ方有テ愈シタリトノミ云テ居シトモ也

當歸建中加地黄阿膠湯 方見臨産生后條

○此証ハ崩中后或漏下久ク不止者何レ血ノ乾燥スルト云処ヘ此方ヲ用ル也滋潤ノ剤也后世家ニテ人参養榮湯或十全大補湯或八物湯抔ヲ用ル処ヘ行也此方ハアナカチ腹中拘急ニモ腹痛ニモ不拘メ但滋潤ノ為ニ用ル也此方ノ主治ハ千金ニ詳ニ出テアリ併シ此方ノ要トスル処ハ血燥ヲ潤カ主也

○赤白汰漏下ノ久キヲ経テ不止羸痩シテ津液拈燥スル者ニ用ユ它ニ諸証殘リテ有テモ津液拈燥メアレハ夫ヲ主ニ取テ此方ヲ用ル也凡漏下赤白汰ハ初メハ可逐後ニハ可止者也其可止場ヲハツセハ勞状

ニ成テ咳嗽吐沫往來寒熱抔有テ頭ト勞状ヲ見テ后
世家ニテ加味逍遙散ヲ用ル証ニナル者也加味逍遙
ノ場ハ右方ヲ用レハ柴胡湯也帯下漏下ノ証勞状ヲ
ナシテ不愈ハ后ニハ足跗ニ腫抔来テ頭ト勞ニ成テ
死スル者ヘ扨コノ當歸建中加地黄阿膠湯血証ノ心
悸ニモ用ユ后世家ニテハ其処ニ八物湯ヲ用ル也

小柴胡湯

柴胡桂枝乾姜湯 以上二方並見嘔吐條

○此二方ハ腹候脈証ヲ以テ用ル也赤白沃ト漏下ニ
用ル也崩中ニハ用ル事無ナリ此二方ハ分テ灸ク用

ル藥故此ニ二方ノミ擧レカ此ニ大柴胡ヤ柴胡加
芒硝抔ノ行事モアル也其内柴桂ノ行處ハ少ナシ然
シ柴桂ノ証モ廣ク云帯下ニアレ赤白沃ニハ餘リ
灸クハナキ者也柴胡姜桂ハ帯下ニハ分テ効アル者
也括蔞仁括蔞根ハ帯下ニハ甚効アリ縦令根泊ハセ
ス一旦ハ甚ヨク此方効アリ外ノ藥ニテハ中々キカ
ヌ者也早ク効アル方也

○此二方往來寒熱ヤ腹候ヲ以テ可用帯下家抔ニハ
柴胡ノ証灸ク有モノ心其内小柴胡抔ハ其當時ノア
レヲイ藥也其時ニ臨ンテ小柴胡ノ証アルヒハ先小

柴胡ヲ用テ其証ヲ治メ置テ後ニテ帶下ナラハ帶下ノ治ヲナスヘシ小柴胡ニテ漏下ト帶下ハヤム者ニアラス又漏下赤白汰ハスツト末ニ成テ勞状ヲナス時后世家ニテ加味逍遥ヲ用ル処ヘ古方家ニテ小柴胡加當歸地黄抔ヲ用ル場アル也柴胡姜桂ハ帶下赤白汰ヲ治スルニハ大小柴胡ト違フテアレラヲイ藥ニ非メ此方ニテ當下モ止者也右白汰ニ用ル心赤汰ノ雜リ下ル者ニテモ同シ赤帶下ニテモ柴胡姜桂ノ証アレハ此方ヲ用レハ赤帶下ニハ此方ノ証少ナキ者也又柴桂ニ加大黄ヲ用ルフアリ其場ハ漏下抔不止メ往來寒熱有テ支節抔モ痛テ柴胡ノ腹候アル者ハ柴胡加大黄ヲ用ル也此方一閑齋抔ヨク帶下漏下ニ用タリ柴胡湯ノ証ニメ大便硬ノ者ハ大黄ヲ加用レハ此大黄ハ大便ニ不拘メ血分ノ処ヘ行為也是血ヲ逐タメノ大黄也柴胡姜桂ニ一治驗アリ一婦人消カチニテ是ヲ候フニ胸脇ニ逼リテ動氣モアリ余姜桂ヲ與ル事ニ貼ニメ効ヲ得レフアリ

逍遥散方見勞病條　治血虚煩熱月水不調臍腹脹痛痰嗽潮熱

○是ハ小柴胡ト參考メ用ル也凡柴胡証ニメ柴胡ヲ用テモ安排アレキ時用ル心赤白汰ニモ漏下ニモ用

ユ崩中ノ后ニモアルヘ何レ日ヲ引テ羸痩甚ク下利
抔有テ柴胡ノ証ハアレ圧柴胡ノ場ニモ非スト云処
ヘ行也此方后世ノ方ナレ圧随分効アル方也○它ノ
血証后ニ勞状ヲ見ルタルハ大抵治スルモノナレ圧
崩中漏後ノ勞ハ難治者也其内随分モツレヌ前ニ早
ク治スレハ効ヲ得ル者ヘ治方ハ黄連湯逍遥散當皈
散ノ類ニテアレラウテヲキテ可也

皈脾湯方見痢條

○此方ハ凡テ諸失血ノ大抵血証止テ后怔忡レタリ
驚悸レタリレテ夜分寐ラレスト云ニ用ル也後世家

ニテハ血証ノ有内カラヤレ圧大抵血証止テカラ後
ニ用レハヨキ心血証ノ盛ニアル内ニヤリテハ此方
ハ其効ウスキ心爰ニ黄連阿膠湯ヲ用ル爰モアレ圧
皈脾湯ハムツクリメ大病后ニハヨキ者也小建中ハ
甚安ハイノアレキ者ヘ血証ニテ拘急ニテモツヨク
ハ柴胡ヲ用ルカ近キ也故ニ后世家ニモ加味皈脾湯
トテ柴胡山梔ヲ加用タル方アル也此方ト小建中ト
ノ別ハ建中ハ云ハヽ真ニ血液ノ枯燥レタル者也此
方ハ只疲クタヒレタル者也后世家ノ辞ニテ云ハヽ
建中ハ血虚ヘ皈脾ハ氣虚也皈脾湯ニモ拘急抔無事

モ有マレケレ
ニ建中ノ証有テ建中ヲ見テ用テトウモ血証ニハキ
ヽカヌル藥也血証大抵止テ后ニハ用テ見ルニ効有
也假令建中ニテ其証ハ止トモ血証盛成時用テハ建
中ニテ血証ノカタハ頓ト治セヌ者也柴胡ハ血証有
テ柴胡ノ証ヲ見ハス者ニ用テ血証モ治レ柴胡ノ証
モ愈ル者ナレ𪜈建中ハ頓ト柴胡ノ例ニハ行ヌ者也
柴胡ハ吐血欬血抔ニモ用ル也
消黄丸下如豆汁者
○是ハ赤白汝ニモマレニ用ル妛アレ𪜈オモニ瀉下

ニ用ル也勿論崩中ニハ不用也下如豆汁トアレ𪜈是
ニ限テヌ也瀉下ノ紫黒血塊ヲ雜ユ下ス者ニ用ユ如
豆汁ハ其軽キ者也又或下ル処ハ一通リノ瀉下ノ血
ニテ別ニ塊モ豆汁ノ如キヲモ不下者ニテモ腹ニ血
塊有テ漏下スル者ニハ此方ヲ用ル心此方桂枝茯苓
丸ノ場ニテ其軽キ処也故桂枝茯苓丸抔ニ兼用スル
也桃核承氣ナラハ是ヲ兼用スルニ不及也是ハ桂枝
茯苓丸ニテモ最一段届ス塊物アル物アリ瀉下ニ用
ユ赤白汝ニ用ルニハ右臍旁ニ塊有テ柴胡姜桂ヲ用
タレ𪜈最一段ヌキユラレヌト云処ヘ此方ヲ柴胡姜

柱抔ニ兼用スル事モアル也

事モアル也

無憂散下白物如脂者

○是ハ狹キ藥ニテ白帶下ニノミ用ル也凡帶下ノ下リ物ノ治法ハトメル子温メル子也温メルト云モ止ル程也此無憂散ノ証ノミハ漏下ノ桂枝茯苓丸ヤ消黃丸ヲ用ル事同シカタニメ逐テ止ムル藥也故ニ腹ニ塊有テ白物ヲ下スニ用彼烏賊骨ヤ牡蠣抔ヲ用ルト相表裏スル也

○此方白帶下ヲ逐テヨキ処ニ用ル也羽澤散ト同シ

場也其内羽澤ハ逐テモ不尽因テ止テ見テモ不止者ハ何レ毒ノ内ニアル者也如此場ハ内ヨリ服藥ニテ止ムルノ逐ノト云チ段ヲヤメニメ外治ヲ以テ見ル事アリ其時羽澤ヲ用ル也無憂散トハ少シ其場異アル也又羽澤ハ陰門腫痛シタリ或陰門冷タリスル者ニ用ユ陰冷ハ硫黃ノ入ル方ヲ用ユ是等ハ見ル者無メモ羽澤ヲ用ル也或又膿淋ノ如キ物ヲ下メ臭氣強キ者或陰門腐爛抔有ニハ羽澤ヲ用ルヽ右ノ外白汰ニハ蔡メ羽澤ヲ用ルト云ニ非ス術尽シ後ノ事也前ニ云シ証ノ内ニテ陰門腫痛ハ洗藥ニテスム也白帶

下ニ下スヘキ証一種アリ其処ニ無憂ヲ用ル也傷門
夏親ニモ用テアリ一通リ赤白帯下ノ治ヲナシテモ
不差モノハ下メ取ル事アリ無憂ヤ羽澤ヲ用ル時ハ
夫々ニ本証ノ藥ヲ用テ右ノ方ヲ兼施ス也此無憂ノ
行処経閉ニテハ桃核承氣行場ヒ無憂ヲ用ルニ本劑
色々アリ胎萎根湯柴胡劑當皈四逆ノ類泛々本劑ニ
用ル也扨羽澤ハ陰冷ノ白物ヲ不下處ヘヤリテ此方
ニテ別ニ瘀物モ不下メ愈ルアリ又白物本不下処ヘ
用テモ陰門腟痛抔ニ用テ瘀物下リテ愈ル者モアル
也又無憂ヲ羽澤抔ト一處ニ用ルト云事ハ大抵ハ無

也羽澤ハ無憂ノ一段奥ニアル方也又娠人血積抔ノ
様成者ニテ少腹腸間滒々トメ声アル者牽牛末ヲ用
テ効有也従し是ハ禹功散可ナルヘシ是内ニ瘀水有
ニヨル者ゝ無憂ハ尚ヨキ也無憂ハ塊ナキ者ニハ用
ヒヌ也

羽澤散

○是モ帯下ヲ逐フ藥也無憂ハ内ヨリ逐ヒ此方ハ外
ヨリ導キテ逐藥ニテ内外ノ別アルノミ是等ハ帯下
ノ至テ強キ者ニ用ル也軽キ者ニハ用ルニ不及也軽
キ者ハ逐ニハ不及者也

○凡帯下ノ白物シ下ス処ニハ桃核承氣抵當抔ハ無
効者也其処ヘハ無憂ハ久寒有処ヘヨシ故ニ此時ノ
本方ハ當歸四逆抔ヲ用ル也必竟云ハ無憂ヲ用ル処
ハ帯下ニテモ疝也故ニ無憂ハ廣ク男子ニモ用ル也
無憂ハ塊アレハ白汝無メモ用ル也譬ハ括蔞根湯ヤ
柴胡姜桂抔ノ証ニテモ臍旁ニ帯下ノ塊有テ括蔞根
湯ヤ柴胡姜桂ニテモ届カヌモノハ無憂ヲ兼用スル
也無憂ハ何レ兼用也其内無憂ヲ用ルニ余一ツノ用
覺アリ無憂ハ塊有テ腸鳴スル者ニ用ユ其腸鳴ハ自
ラクワラクトナルモアリ又按セハナルモ有也証ニ
ヨリテ無憂ノ行処ニ横骨ノ邊ニテナル者モアル也
柴胡姜桂ノ水氣ノ鳴ハ心下也無憂ハ心下ニナクメ
臍下ニテ鳴者也是腸鳴也是ヨリ治用メ塊無メモ腸
鳴スル者ニ泛ク用ル也無憂ノ主治本事方ニ有ハ長
々ト書テアレ共要處少ナシ千金堅癥積聚門モ牽牛
子一味ノ方有テ方名モナキ方アリ其主治ハ無憂ノ
証ニ取テ甚良也即其主治ニ有ハ堅癥有テ腸鳴有者
ニ用テアリ併可看又羽澤ハ塊無メモ下リ物ノシリ
過ルハ是ヲ用ル也塊アレハ益良塊無メモ下リ物過
テ不止処ヘヤル也又無憂ハ右ニ云シ腸鳴無メモ塊

ヲ目的ニ用ル
ヲ藥ニ覺ル也何レ水氣ノ氣味ノ処ヘ用レハ効アル
ニカワキテカラスル処ヘハ効ナキ也若塊斗リニテ
水氣無ハ硝石大圓ニテ良也扨千金ニ云治婦人患癖
按時如有三五箇而作水聲殊不得寢食常心悶方牽乍
子三升治下節飲服方寸匕日一服三十服後可服好硫
黄一両此主治無憂ノ証ニ取テ甚切也殊不得云云ハ
取サル也又前ニモ云如ク無憂ハ帶下ノ塊アル者ニ
用ユ假令下リ物ナクメモ用ル也羽澤ハ塊ノ有無ニ
不拘メ赤白汰ノ下リ過ル処ヘヤル也其内ニモ無憂

羽澤ノ劑ハ白汰ニ用ル藥也扨世間ニテ白帶下ト云
テ居ル者ニ一種毒ニヨル者アリ是即男子ノ膿淋ト
同ク〆常ノ白汰ノ帶下トハ筋ノ大ニ異成者ニ其毒
ニヨル者ハ必下ス処ノ物臭氣ツヨキ者ナリ平生ノ
帶下ニテモ少シハ臭氣モ有者ナレ共毒ニヨル者ハ
分テ臭氣強キ者也平生ノ白汰ハ其色薄ク〆米汁ノ
抔ノ如クニメ紙ニテフキ取ハ常ノ水ノシユミシトシ
同シ揉ナル者ニ毒ニヨル者ハ男子ノ膿淋ト同メ其
下ル物膿ノ如ニメ濃メ粘リ有者ニ若此ニメ血ノ滞
ル者ハ男子ノ膿血淋ト同筋也毒ニヨル者ハ常ノ白

汝ナル者ナシ皆膿
ハ皆只コレシ白帯
異ニシ治法モ亦各異成事可知白汝ハ水也毒ニヨル
者ハ膿也混スルナカレ其白汝ト毒ニヨル水ト膿
トシ知ルニハ下リ物ノ濃ト淡トヲ以テ断スヘシ又
帯下ニ因テ陰戸或痛或痒シナス者有菊葉煎ニテ洗
テ良扨白帯下ニハ桃核承氣抵當ノ行処ハ少ナキ者
也縦令少腹急結ノ証ナト有テ何程破血ノ剤ヲ用テ
下メ見テモ白物モ血モ不下者也夫ヨリハ多ハ温泉
抔ヲ用或内ヨリハ無憂或坐藥ノ類ヲ用レハヨキ者

也扨前ニ毒ニヨル者ヲ辨シタリ成程毒ニヨル者ハ
其下ル処臭レトモサノミ臭氣ナキ者アル也又帯下ノ
ニヨル者ニテモ甘ト云ヒシツカリト當ニナラヌ者也毒
白汝ハ淡クメ毒ニヨル膿淋カタチノ者ハ色濃レト
云ヒ是モ一概ニハ云レヌ者也成程常ノ白汝ハ色薄メ
水ノ如ク毒淋ノ証ノ下リ物ハ色濃レトハ云ヒ是ヲ
以テ一概ニ断セラレヌ也其別ハ常ノ白汝ニ非メ毒
ニヨル膿淋ノ場ハ尿道ヨリ下ル者ニテ子宮ヨリ下
ル者ニ非ス毒ヨリスル者ハ男子ノ淋ト同キ者故尿
ノ通スル時陰戸痛ミ且淋瀝スル者ナリ是常ノ帯下

ノ白沃ト異成處也右ノ尿ノ通スル時痛シナスト淋瀝トシ以テ其別シナスヘシ前ニ云シ臭氣ヤ色ノ濃淡シ以テ験メ判断セラレヌ也此尿道ヨリ通スル男子膿淋ト同キ者ニハ奥腥湯ニ或加木通ヲ用ル也何レ解毒スル也男子ノ毒淋ト治法一也此ヘハ羽澤ハ不用也羽澤ハ子宮ヨリ下ル常ノ帯下ノ白沃ニ用侭婦人ハ凡テ物毎アラハニ不云メ慎ミカクス者故能々審ニメ治シナスヘシ

○婦人少腹ノ下横骨ノ上際ニ當リテ塊アリ是ヲ按ニ古綿ヲ按如ク重ク按ハ硬ク腸癰ヲ按スヨリ硬キ者アリ今迫ハ瘀血ヤ梅毒痼結トメ桃核承氣ヤ消瘀シ用レヒ頓ト不治ル余不圖心附テ子宮ノ膿ニ非スヤト其治法シ施メ見ルニ皆治シタリ是迫右ノ病証三人有テ三人ナカラ子宮ノ膿トメ治シタリ其三人ノ塊皆正中ニ有テ右ヘヨリタルモアリ其膿ル所以ハ毒ニヨリテ陰戸膿杯メ夫ヨリ子宮ノ口迫膿及フ者ト見ユ又帯下ニテ子宮ノ膿ル物ト見ユ右ノ三人ノ内二人ハ毒家一人ハ帯下有テケル右ノ証ニハ羽澤シ坐薬トスル也坐薬ノ用法ハ一日ニ一度ツヽ可取啓坐薬シ挿ユルニハ乳首ノ如ク圓クスヘシ辯茄

治女人漏下或崩或劇常漏不止身体痩飲食減火或赤或白或黄使人無子者方千七
牡蛎 葪龍肝
赤石脂 白龍骨
雚心 烏賊骨
烏賔糧各等分
右七味治下篩空心酒服方寸匕日三白多者加牡蛎
龍骨烏賊骨
赤多者加赤石
脂烏賔糧黄
多者加葪竜肝
雚心隨病加之
治婦下漏下不止
散方千七
鹿茸 阿膠各三両
烏賊骨當皈各両
蒲黄二両
右五味治下篩空心酒服方寸匕日三夜再服

ノ如ク長クスルハ悪キ也坐藥ニ軽粉ノ入方アリ今用ルニ羽澤散ニ軽粉ヲ加用タラハ愈ヨカルヘシト思ハル也ナレ𪜈未試也羽澤ノマルノ拵様餘リ大ニスルハ悪シ烟管ノ火皿ヲ二ツ程藥ヲ入ルカ丁度宜也絹ハモミニ不限帛ナレハ何テモ宜也

烏賔丸 以上四方並在別集

○是ハ赤白沃及漏下ノ後勞ニ成者アリ其勞ニナラントスル処ニ用ユ是ハ逐テハ無メ先止ムル藥也牡蠣烏賊骨ノ方ト同場ナレ𪜈彼方ハ只下ル物ヲ止ルノ藥也烏賔丸ハ勞ヲ目的ニ用ル藥也故ニ亾血ニヨリテ勞ヲナス者ハ慱ク此方ヲ用ル也

○此方赤白沃漏下ノ止ル者也此方勞状ニ成タル時ハ益良赤白沃漏下ヲ止ル者也烏賊牡蠣ノ方ト同シ併右ノ方ハ只管止ル藥也烏賔丸ハ調中湯所謂補虚勞益氣カト云意アリ此意ヲ酌テ可用烏賔ハ勞状ニナラスメモ只止メタキ処ヘモ用ル故必竟ハ千金ノ方ヤ牡蠣烏賊ノ方ハ無メモスム程ノ者也併シ白帯下ニハ鹿角膠丸牛角鰓丸ヲ云石灰丸抔初メ下リ物ニ止ル丸散アレ𪜈赤沃漏下ニハ無之只此烏賔ハ漏下赤沃ニモ用ル也○凡帯下ヲ止ムル

ルハトウメモカウメモ念ス時ノ仕方ニテ止事ヲ不
得ニ出ル者也成タケハ止ヌカヨキ者也若止メ子ハ
ナラヌ時ハ其方法ヲ用ル也一服ニ止メタキ時ハ石
灰丸ヲ用ル也此方丸シニクキ者ナレ𪜈隨分丸ニ成
者也石灰丸ハ一日ニ一銭五分計ツヽ用ユ若方ナキ
時ハ雙白丸ヲ用モ佳シ吉村倫宜ハ右ノ雙白ノ石灰
ヲ用ル処ヘ賽石灰ヲ用テアリ賽石灰ハ蛤ニテ制シ
タル灰也蛤ニテ制シタルヲ賽石灰ト名クルハ和語
也依シ雙白丸ヲ賽石灰ニセンナラハ効大ニ劣ルヘ
キ也前ノ石灰丸ハ鹿角膠丸ノ処ヘ行也依シ石灰丸

ハ勞状ヲナシタル処ヘハ遅キ也鹿角膠丸ハ滋潤ノ
功アリ故ニ勞状ヲナシタル処ヘモ行也然レ𪜈鹿角
膠丸ヲ別ニ制スルハ邪魔ナル故勞状ニテ鹿角丸
ヲ用ル場ヘハ予ハ烏茜丸ヲ用ル也又牡蠣烏賊骨ニ
味各等分為末散服白湯ニテ用ル方アリ此方方名ナ
シ是ハ田中ノ方也凡帯下ヲ止ムル方烏茜丸ト牡蠣
烏賊骨ノ散ノ方ト石灰丸ト三方アレハ足也牡蠣烏
賊ノ散ハ石灰丸ヨリハ止ムルカ大ニ緩シ故ニ少々
腹満有テモヤルモ也石灰丸ハカ大ニ勁シ𥫱ハ痢疾抔
ニテ云ハ牡蠣烏賊ノ散ハ理中ノ場也石灰丸ハ赤石

脂禹餘糧湯ヲ用ル場ニメヤニワニ止ル趣向也石灰
丸抔ハ腹滿抔有処ヘハ決メアシ、其証ヲ無理ニ止
ルト小便不利或腰脚ニカ、リテ煩ヒヲナシ或心胸
ヲ攻ル者也

灸法

○帶下ノ証ハ下リ物ノ有無ヲ不問メ灸メ良也滿下
ニハ灸ハアシ、俗傳ニ滿下ノ妙灸抔ト云テヒタス
ル灸スルアリアシキ者也

○灸ハ先止ル仕方也前ノ牡蠣烏賊骨ノ處ヤ黃土湯
抔ノ処ヘモ行也是ニテ効無者ハ温泉ノ場ナリ五十
以外ノ経水妄行抔ト云処ヘハ灸抔ハ大ニ悪キ者也
温泉ノ場ニ即當皈湯ヲ用ルモヨキ也凡灸ハ白汰ニ
ハ初發ヨリ施メヨキ也灸メ反テ下リ物多ク成テ愈
ルアリ又夫ナリニ止ルモ有也白汰ニハ百發百中ト
云程ノ者也必灸スヘシ譬灸ニテ全ク不愈トモ必其
効ハアル者也白汰ニハ初中終用ヘシ温泉ハ無憂ヲ
用テモ羽澤ヲ用テモ効ナキ時外ニ仕方ナシ故ニ用
ル也灸ト違テスツト后ニ有者也扨灸ハ先云ハ止ル
方ヘ属スレヒ内ニ痼メ不下者ハ灸ニテ下ルコトモ有
也故ニ白汰ニハ初メヨリモ灸スル也婦人帶下ノ

証ニテ灸メ下リ物ノ無モ灸ニテ下リテクルモ有也
併シ常ノ帯下熱有テ脈緊成者灸スルニ夫ヨリ尺内
ニ不限凡テ緊ノ者ニ用ユ漏下ニ灸ノ行フ十中ニ一
也漏下ニハ但黄土湯ノ行処ヘノミ用ル也白汗ノ者
ニハ脈緊ナラスモ少シ熱抔有テ往来寒熱等有モノ
ニテモ灸ヨキ者也灸治ハ七穴ハ膠及ヒ千金ニアル
臍下ノ三穴ニ灸スル也

〇七穴灸法

身ヲ正立テ其身ノ等シキ長サノ竹ヲ以テ地ヨリ立
テ額ニアテ、臍ニ當ル処ニ墨ニテシルシヲ附乃其
竹ヲ背ニ當テ先ニシルシオキシ臍ニ當ル処ヲ脊推
ノ正中ニ當テ其処ニ點シ同身寸ノ法ヲ以テ左右ヘ
各一寸ツヽ開キテハ點シ又其処ヨリ同身寸ニテ左
右ヘ一寸ツヽ開キテ點スル也又脊推ノ正中ノ點ノ
上ト下ヘ同身寸ニテ一寸ツヽ去テ點スル心總テ七
穴也此灸経閉ニモ効アリ経閉二三月ノ者ハ此灸ノ
ミニテモ動テ來ル者也此灸ヲ経閉ニ用ルハ活用也
本此灸ハ白帯下ヲ止ル灸也凡経閉二三月ノ者ハ藥
ヲ服サヌ者也其時此灸スレハ十ニメ六七ハ此灸ノ
ミニテ経通スル者也壮數多ニ盛ル日ニ三十壮計ツ


ヽスル也其圖左ニ載ス

千金灸法　少腹橫文當腑孔直下


此灸法千金ニアリ其法臍下氣海毋田ノ辺ニ橫筋アリ其筋ノ任脉通リニ當ル処ヘ一穴ヲ點メ又其點ヨリ左右ヘ開ク事各一寸ツヽニ點ス總テ三穴也此灸法頗人ノシヨウカチニ最効アリ帶下ニモヨキ也是ハ七穴ニテモ効ナク重キ者ニ用ユ従ヒ大抵ハ七穴ニテスム者也此灸千金巻七赤白帶下崩中漏下門ニ出テアリ其圖左ニ載ス

○按スルニ千金此灸ノ主治ニ治女人白崩方トアリ

七穴灸法圖



千金灸法圖



○帶下ニ別ニヨキ灸法アリ七穴ト近キ者ニ痔ノ條ニ可辨上ノ七穴ノ灸ハ和方也右ノ七穴経閉テ桂苓丸ヤ抵當ノ処ヘ用ル也抵當抔ヲ用テモ不動者ニハ灸ノカヲ假リテ動カス也桂苓丸ノ処ニテハ灸ノミニテモ動ク者也従レ表熱アル処ニハ灸スヘカラス

○瘀血帶下ノ腰痛或産后瘀壁腰脚ニカヽル者或男子疝氣腰脚攣痛或腰脚冷テ綿ニテ足ヲ包ム如キ腎着湯ヲ可用場抔ハ必風呂ヲ兼用スルカヨキ〻風呂ハ當歸湯ヲ可用方ハ腰痛門ニ出テ有腰湯ニテヨキ者也此方痔脫肛ニモヨレ根治ハセ子トモ快ヨカル者也又陰器癢ノ痒甚キ者是ニ浴メ痒去テ快者也此浴湯ノ法當飯ハ一廻リノ間ハ本ノ物ヲ用テ良湯モ其儘置テヨシ帶下ハ腰湯ヲスルカヨキ者也下焦ヲ温メテヨキ也若當歸湯ニアラサレハ塩薦ヲ煮出メ日ニ二三度モ四五度モ氣根次第ニ浴スル也俗ニ云レヨウカチ抔モ是ヲ用レハ通レノ安ハイヨキ者也或云帶下潮水ヲ湯トナシ浴メ良ト常ノ塩薦ニテスヲヨキ者成ニ況ヤ海水ヲ以テセハ猶ヨカルヘキ也

○如神散 聖惠方 治赤白帶下及血崩

香附子 芍藥 等分

右為末鹽一捻水二盞煎一盞

食前温服

右ノ方赤白汰ノ久ノ不止者ニ用ル方也舊本ニハ載タレ𪜈今ハ不用故ニ今本ニハ不擧也此方無メモ事足ル也此方煎レアケテ塩少シ加ヘテ服スル也此方末ニナスニ不及也或甘草ヲ加テモ可也併レイラヌ薬也此方ノ処ハ黄芩湯小建中湯或桂苓丸ナトユク ナリ

乳病

○乳ノ字ハ男女𪜈ニ通スル字ナレトモ病ニ有テハ男子ニハナク女子ノミ也古今ノ方書ニモ男子ノ乳病ヲ云シ者絶テ見ヌ也但入門ニ男子之乳病與婦人之乳病同今按入門無此論而卷十六乳門有男子乳疾治與婦人微異之語ト論メ有テ勿論入門ニモ別ニ治法モナシ亦按入門乳癰門男子乳疾別有治法先乳病ト同治法也扨乳病ニモ色々有者ナレ𪜈其内ニオモタルハ乳癰ト乳岩トノ二ツ也此二病ハ乳病中ノ重キ証也乳癰ノ証タル最初ニ乳房腫痛ミ根カサシテ結核モ出来ル也然レ𪜈乳癰ハ色カツキテ

赤ミカ出ル也是乳岩ト異成処也其乳癌日數立内煩痛ノ熱ヲモチ其膿脹伝処ニ至リハリキリテ未ル者也右ノ如ク脹ニ至レハ尋テ潰破シ綱膿涌出メ后ハ膿尽レハ何事無念ル者也其方論頭人良方々外科正宗ニモ其外諸方書ニ詳ニ云テアリ併シ乳癰ナレハトテ諸癰ト別ニ異ルコトナレ他ノ癰ト治法同シ別ニ乳癰ノ目ヲ設クルニ不及者也又方書ニ乳癆ト云名アリ是ハ乳癰ノナヲリソ、クレタル者ヲ云也乳岩ハ其初發乳内ニ豆粒ノ如キ大サノ小核ヲ結ヒ漸ク碁石位ニ成テ一年半二年三年ハ痛ミ痒ミモナク膿モセス色モツカスメ何事ナクモツ者也夫ヨリ漸々ニ大ニ成テ始テ疼痛ヲ發ス疼痛ノ出ル様ニ成乳房覆椀ノ如ニ成者也如此ニ至レハ色モ出其色乳癰ノ如クニ紅色ニ非メ紫黒色ニ成者也紫黒色ニ至レハ潰爛スル也乳癰ト違テ潰レハ痛益強ク成者也潰レハ臭氣モ有者也潰テ後ノ痛ミ心ニ徹メ痛ム者也其潰ル処カ巖ノ如ク成故ニ乳岩ト云レ者也又潰レハ其処ヨリ大ニ血ヲ出ス者アリ其血ハ膿血ニ非メ精血ヲ出ス者也如此ニ至レハ押付死スル者也凡此病ニ罹ル時ハ百人ニ一人モ生ヲ得ル者ナレ只養生ヲ

能ク心ヲ清シ静養メ拠ルナク無礙服薬調理セハ歳月ヲ延ル事ヲ得ントハカリ也然レトモ終ニハ死ヲ免レヌ者也入門ニ中年無夫婦人死亡速也ト云リ此語入門巻十六乳核乳癰門ニ見ユ

ン右病乳ニ於テノ重病ノ此外ニ乳ブルヒトテ乳腫痛メ大ニ悪寒シ戦慄メ夫ヨリ大ニ發熱スルアリ是腫痛ニヨリテ寒熱出ル者也此証産后或平常ノ婦人ニモアル方書ニ乳痛風ト稱メ有者此乳ブルヒト見ユ「又」○乳○ト云テ新産ノ婦人小児ナク或小児有テモ乳母ヲオキテ乳ノマスル事ナケレハ乳汁蓄結メ硬リ腫痛ミ乍モ不可近是也此乳腫テモ乳癰抔ト異成処ハ是ハ至テ硬キ者也其証多クハ壮熱大渇是皆乳汁ノ瘀スルニヨル也故ニ其初メ少シ堅ニ有テ痛抔ヲ覚ユル処ニテ早ク乎ヲ以テ乳ヲヒ子リモミ又傍人ヲメ是ヲ吸引シムヘシ乳ヲ操ムニ又テ痛ム者也忍テ行ヘシ乳ヲ吸ヘハ后ハ妬乳ニハナラヌ者也然ラサレハ或痛ミナレテ前ニ言処ノ証ヲナシ膿有テ其熱勢盛ナレハ變ス癰ト成也既ニ潰ル時ニ至レハ乳癰ト同治法也乳痛風ニテモ乳腫痛ニテモ既膿ヲカモシ潰ルニ至テハ乳癰ト同キ者也併シ乳痛風マ

乳腫痛ハ大抵ハ潰ルニ不及者ニ譬潰ルニ及テモ乳癰トハ其勢軽重アル者也右ノ妬乳ハ産后ニ限ル事也平日ノ婦人ニモ如此事モアレ𪜈平生ノ婦人ハ如此ハケシカラヌ者也方書ニ平生婦人ニ妬乳ノ名ヲツケタルモアレトモ夫ハ非也平生ノ婦人ナレハ妬乳ノ名ヲ設クルニ不及者也

○吹乳トテ一病アリ是ハ胎毒ノアル小児ニ乳ヲ呑セ或小児ヲ夜懐キ寐テ小児乳首ヲハナサスメ其口中ノ熱氣乳房ニ吹入テ夫カ凝住メ散セス痛ヲナスアリ此モ初起痛ヲ忍テ揉令稍軟吸令汁透自消散スヘシ是ハ妬乳程ハ劇シカラヌ者也必竟妬乳ノ根ノナキヤウ成者也

○又乳泣ト云有此証ハ前ノ妬乳吹乳抔ト大ニ事カワリテ姙娠中ニ乳ノ自ラ出ル者アリ夫ヲ乳泣ト云也子ノ生レテモ多クハ育セヌナリ按乳泣賀川玄迪有是説乳泣ノ名素靈ニモナシ其它ノ方書ニモ餘リナシ唯乳泣ノ名ハ準縄ニアリ是ハ藥治ニ不及者也乳病中ニテ前ニ云シタケハ名數ヲ設テオカ子ハナラヌ者也此外ニ乳核入門有之抔トテ云ヤウナル名ヲ設ケシモアレ𪜈是等ハ別ニ名ハイラヌ也前ノ乳癰乳岩ニテオシテユ

カル、也此外ニ乳ノ字ヲ冒ラシテ名ケシ病名アリ
乳蛾ト云アリ是ニ単乳蛾雙乳蛾ト云アリ是等ハ其
腫物ノ乳ノ形ニ似タルヲ以テ名ケシ者ニテ乳ノ病
ニ非ス乳字ヲ以テ乳ノ病ト誤リ認ムヘカラス乳蛾
ハチヨツホリト咽候ニ突腫スル乳頭ノ如キヲ以
テ名ク即纏喉風抔ノ一類也纏喉ハ突腫抔ノ如キ形
ハ無メ一面ニハルヽ者也其病ニ於テハ乳蛾ヨリハ
纏喉ハ急ニメ重シ乳蛾ヲ乳蛾風トモ云テアリ又小
児ワルキ乳ヲ飲テ夫ヨリナス者ヲ乳嗽乳癇抔ト云
病名アリ按乳嗽乳癇之名義師説矢鳥是等モ只嗽ヤ癇ニ總テヨキ

也別ニ名ハイラヌ事也又小児ノ初生ノ咳ニ百晬咳
ト云アリ是モイラヌ名ク乳蛾ハ有ヘキ名也併シ方
書ニハ方法ヲ別ニ立テアレヒ今治スル処ハ喉痺咽
喉腫痛抔ト其法同シ

蒲公英湯　蒲公英　薯蕷　當歸　香附子　牡丹皮
右五味以水三合煮取二合其滓再以水三合煮取一合一
日服盡試令男子服之亦覺乳房起脹矣

○此方乳ヲ通スル藥ニテ乳少ナキ者ニ用ユ是ヲ用
レハ多ク成者也通乳ノ方色々アレトモ飲ニクキユ
ヘ効少此方ハ飲ヨクメ効アリ散藥抔ノ方モアレヒモ

多クノ三ニクキ者也此方本俗傳ノ方ニテ一服用レ
ハ効アリト云傳也成程軽キハ一服ニメ効アレ𪜈重
キハ二三服ニ至テ効ヲ見ル者アリ何レ大分ヨクキ
ク藥也一日ニ初煎ト再煎ト合メ用ル也夫ニテ三合
也是一日分也蒲公英ハ陰乾メ用〇乳ノ事ハ凡テ蒲
公英ヨクキク者也乳癰ニモ蒲公英忍冬ノ二味ヲ煎
レオキテ茶ノ代リニ用ル也右ノ二味ノ方ハ華方也
本草綱目巻二十七蒲公英附方引積徳堂方乳癰紅腫
蒲公英一両忍冬藤二両擣爛水二銭煎一鐘食前服腫
覺病即去矣〇醫學入門巻十六乳核乳癌門云草方用
蒲公英金銀花等分水煎濃水入酒少許服之即散
又蒲公英一味煎服茶ニ代テ飲レメテモ佳也忍冬無

凡テ乳病一切ニ蒲公英ヲ用テヨシ是ヲ漬シ物ニメクワスヘシ蒲公英初中終用テヨシ蒲公英ハイマスニモ非ス腫ラスニモアラス肺癰ノ薏苡仁ノ如ク常ニ用エルナリ

メモヨキ也又生蒲公英ヲ漬シ物ニメ食ハス事モ有
也是快者ナレトモ敢テ専ラ是テ効ヲ取ト云者ニモ
アラサル也譬ハ肺癰ノ薏苡ト似タル者也乳癰乳岩
乳腫痛乳痛風凡テ乳病ニハ蒲公英ヨクキク者也右
ノ蒲公英忍冬二味ノ方ハ乳癰既潰ルト未潰トヲ不
問メ用ル也併シ勢強キ時ニハ不用也梓葉湯ハ不ニテ
モ用テ大抵挫ケテモ未タ全ク愈サル処ハ此ヘ右ノ方
ヲ用テ居レハ自ラ全ク愈ル者也右ノ方瘰癧ニモ用
ル故瘰癧門ニ出メ有也併シ瘰癧ニハ右ノ方ヨリ夏
枯草膏ヲ用ルカ効優ル也

○通乳黒散方

露蜂房 黒焼 黄栢 三製

右二味各等分為末温醴酒ニテ五分ツヽ日ニ三度用ユ一廻用ル也此方黒田候ノ方ニテ乳汁ヲ通スル薬也成程キヽ薬ナレヒ服レニクヽメ病人飲シホセヌ者也故ニ今ハ専ラ蒲公英湯ノミヲ用若蒲公英湯ニテモ効ナキ時ハ右ノ黒散ヲ可用又三角家ノ方ニ

露蜂房 果蠃

右二味等分為末白湯ニテ送ル方アリ是モ通乳ノ方也然レヒ白湯ニテ送ル方黒散程ニハキカヌ者也

○茲ニ挙ル方ノ蒲公英ハ黄白ノ二品アリ何レニテモ用ユ食用ニハ白キ花ノ物肯レト云也右ノ方輿ニ載テ有通リノ分量ヲ一剤トメ夫ヲ二貼ニ分テ調合スレハ丁度宜也右ノ如クニツニ分レハ通例ノ薬ノカサ程アル也方輿ニアル通リヲ一貼ニメハ大剤ニ成テ平生ノ薬ノ倍ノカサ有也故ニ今是ヲ調剤スルニハ右ノ分量ヲニツニ分テ二貼トナレ其二貼ノ薬ノ水ヲ方輿ニ挙レ水量ノ通リニナレ可用即二貼ニテ一剤分也是ヲ一日ノ分トス此薬一々秤量ニ分テ法ヲ守リテ調合スヘシ扨又乳汁不通ニ蒲公英湯ニテモ届キ兼ル者ハ兼用ノ餌食ニ醴酒ヲ臨臥ニ喫セ

シムヘシ是ニテ薬ノ勢ヲタスケテヨキ者也

○産后乳汁不通者破血剤ヲ用レハ出ル者アリ主方

桃承ノ類

産後妬乳因無児飲乳或未能飲餘乳蓄結作脹或嫗人血氣
方盛乳房作脹以致腫痛憎寒發熱不吮通之必致成癰若腫
不消用麥芽二三両炒熟水煎服立消景岳全書巻三十九○或曰産后
不自飲児并失児無児飲乳々蓄喜結癰急将麥芽二三銭以
水二合煮取一合半服半洗則能断乳汁免成癰之憂矣

○是方ハ蒲公英湯ト相表裏メ乳汁ヲ止ムル薬妬乳
シナシサス置ハ跡ハ乳癰ニ成者也故ニ早ク麥芽ヲ
可用是モシカシレキ揉ナレ𪜈キク薬也佐レ是モ後レ
テハ効ナキ也早ク可用然レ𪜈景岳ニハ二三両用テ
アリ成程多ク用レナラハ遅ク用テモ可有効子余用
ルハ二三銭目用ル也

○凡産后乳出テモ飲レムヘキ子ナキ者ハ早ク止ム
ルカヨキ也不爾時ハ乳痛風杯ニ成者也止乳ノ方ハ
鉛丹ヲ酢ニテトキ乳房ニ塗ヘシ先大抵ハ是ニテ止
ル者也若是ニテ不止者ハ麥芽ヲ用ル也止乳ノ方ハ
此二方ニテ足ル者也

柴胡挂枝湯

小柴胡湯以上二方並見癪瘕門

○是ハ乳フルヒニテ悪寒発熱スル者ニ用ユ乳フルイハ悪寒モ戦慄ニテ発熱モ強ク壮熱ニテ葛根杯ニテモ可用者ノヤウニ見ユレトモ乳フルヒハ心胸ニアル故カ柴桂湯カ乞具合ヨキ者ノ其寒熱大勢ノクチケタル処ヘ小柴胡ヲ用ル也又寒熱サツハリ愈テ只乳腫痛スル者ニモ小柴胡ヲ用ル也小柴胡ハヨク乳結ヲトク者也又其腫痛ノミニテ寒熱ナキハ柴胡去半夏加薯モヨキ者ノ瓜薯ハ乳ノ腫痛ヲヨク解スル者也渇杯アルハ益ヨシ又前ノ小柴胡ト桂枝トノ別ハ柴桂ハ表証ノ強キ方ニ用ル也小柴胡ハ表証ノ不劇者ニ行也故ニ乳痛風乳腫痛ノ類乳病一切ニ用ル柴桂ヤ小柴胡ニテモ柴胡ノ目的無メ妄リニ用ルニ非ス必往来寒熱乳胸脇下痞硬及支結ノ類ノ柴胡ノ証候ヲ待テ用ル也譬ハ乳痛風皆発熱悪寒スレハトテ柴胡剤ハ用ラレヌ也何レ腹候ヲ以テ柴胡ヲ用ルノ又腹候ニ柴胡ノ証格別ニ不見メモ往来寒熱ナレハ柴胡ヲ用ル也若但発熱悪寒メ腹ニ柴胡ノ証ナクンハ乳痛風ニテモ乳腫痛ニテモ敗毒ヲ用ル也乳癰ニテモ同

治法也併シ乳痛風ノ如キ類ハヨク心胸下ニ云分有テ柴胡ノ証多クアル者也又柴胡去半夏加瓜蔞仁ヲ併加テ用ルナモ有ナリ瓜蔞ハ根ヨリ仁ノ方カヨクキクセ○乳痛風抔ノ類柴胡桂枝湯ヲ用ル処ヘユク行氣香蘇散ヲ用レハ疾ク寒熱止者也柴桂湯モキク薬ナレ𪜈此処ニテハ行氣香蘇散其効早シ柴桂ヲ用テ二日ニメ寒熱ノ止ヘキ者カ行氣香蘇ヲ用レハ半日許ニメ止程ノ効ノ遅速アル者也是ヘ行氣香蘇散ヲ用ルハ三角子ノ仕覚也行氣香蘇ノ本方ハ方彙傷食門ニ出テアリ其本方ニ三稜莪朮青木香木通ヲ加テ方彙ノ疝氣門ニ云テ偏墜ニ用テアリ（四春巻之五癥瘕疝門ニ云）行気香蘇散治偏墜気疼痛初發熱憎寒壮熱甚効依本方加茴香青木香三稜莪朮木通　其偏墜ノ加味ヲナシタルヲ用ル也徃年成ヘクハ方味ヲ簡ニシタキト思テ行氣香蘇ノ本方ヲ用テ加味ノ薬ハ省キテ用試シニ効ナカリキ煩雑ニテモ右ノ加味ノ薬ヲ皆加入テ用ヘレ三角子此方ヲ乳痛風ニ用覚ヘレニツキテ先年三角子ノ話アリ其話レニ女子ノ乳ノ腫痛ハ男子ノ陰嚢ノ腫ルヽト同理也故ニ此方偏墜ノ薬ニテ女子ノ乳痛ニ効アリト云レレフアリ此言ハオカシキヤウナレ𪜈何カレラス乳腫痛ニテ寒熱

アル者ニハヨク効アル方也此方ヲ乳腫痛ニ用ルニモ寒熱アル処ヘ用ル方ニテ熱ヲ止ル薬也腫痛ノ手當ハ傳薬抔ヲメ腫痛ヲ愈ス仕方ヲナスヘシ行氣香襲ハ后世ノ方ニテ必竟仕覺ノ方故格別ニ其証候ハ不立也乳痛風ナレハ發熱悪寒スル者ニテモ往來寒熱スル者ニモ腹候ニ柴胡ノ証カアロウカ有マイカ夫ニ不拘メ用ル也

○小柴胡ハ熱ノ往來抔無メモ只凝ル者痛ムト云ニヨキ也乳ノキリく痛ミ或乳房ノスヂ立テ凝者ニハ小柴胡湯主之也乳房ノキリく痛ミ筋立テ凝ル者多ク氣分ニ屈メ積氣家ニ有者也故ニ柴胡ノ証候ハ離レヌ者也故ニ柴胡ヲ用ル也是モ乳房ノ凝リヲ目的トメ用ルニモアラサレ𪜈自然ニ柴胡ノ証有者也乳腫痛ヲナスニ至テモ初メハヤハリ小柴胡ニテヨキ者也後ニ成テ膿ニテモナラントシ腫物ニ成ソフ成者ハ櫻皮湯ヲ用ル也櫻皮湯ノ場ニハ寒熱ナキ者也若寒熱アラハ其処ニテモヤハリ小柴胡ヲ用ル也或敗毒ノ行事モ有也今疽癰ヲ見ルニ多ク寒熱ヤ或振寒抔アリ柴胡ニテヨキ者也其内柴桂ハ乳フルヒニテ寒熱ナケレハ不用トモ小柴胡ハ悪寒ナクメモ用

或寒熱不劇者ニ用ユ又乳癰ノ柴胡桔ノ處ニテ寒熱
ナケレハ櫻皮湯也又乳癰乳岩トモニ膿テ膿ヲナス
ニ至テハ排膿湯ヲ用ル也大槩梓葉湯ト同場也然レ
ド排膿ヲ多クサセントスルニハ梓葉湯ヲ用ル也排
膿湯ハ少シ軽キ方也梓葉湯ハ解毒ヲ兼テオル故ニ
熱ツヨク若梓葉湯ナキ時ハ排膿湯ヲ用ル也シカシ
乳癰ニハ全體排膿湯ヨリハ梓葉湯ヨキ也然ド痛ツ
ヨキ時ハ梓葉湯ヨリハ排膿湯ヨキ也甘草桔ニテユ
ルミ安排ヨキ故ト見ユ又乳癰桔ノ櫻皮湯排膿湯梓
葉湯ノ場ニハ黒龍ヲ兼用スヘシ○庸醫乳病ナレハ

乳ヘ計リ目ヲツケテ脈証腹候ヲ旁ラニメ只乳ノア
レライノ薬計用テ居ル故効ヲ不得事有也一婦人ア
リ乳癰ニテ數醫ノ治ヲ請シニ皆乳癰ニノミ目ヲツ
ケテ其アレライノ薬ヲ用シニ効ナク益悪ク成初ハ
一ツノ乳ノミニ有ケルカ両乳トモニ患及ヒタリ余
是ヲ診スルニ腹拘攣ツヨクメ大便難也因テ大柴胡
ヲ與ヘシニ大ニ効ヲ得テ乳癰モ益快ク成テ其后マ
ハリ拘急全ク不去故小建中ヲ用タリシニ乳癰尋テ
消散シタリ右ノ二方ヲ與フル内外ヨリ黒膏ヲツケ
オキタリ黒膏ハヨク痛ヲ柔ラケルモノナリ又黒膏

ト青膏トノ別ハ黒膏ハ痛アツテ腫物形チニ異リシ
処ニ用ユ青膏ハ痛アル処ヘハ不用也又既ニ乳癰ノ
形ヲ具ヘシ処ヘハ行ヌ也但漫腫ノ悪汁抔モ不出処
ヘハ行也乳癰ニ常ノ膏薬ヲ附テ見ルニ引ハリツリ
抔メ病人具合アシカル者ニ此黒膏計ハアメニテ煉
ル故它ノ膏ト違テ具合ヨキ者也黒膏青膏倶ニ次ニ
出ス扱乳痛風ニ柴桂ヲ用ル処ニ后世家ニテハ敗毒
散ヲ用ル処ナリ或ハ云柴桂ヲ乳痛風ニ用タリ小柴
胡ヲ乳腫痛ニ用タリスル時ハ柴胡ノ腹候アレハ猶
良無メモ可用

○醫説巻九引醫餘云有婦人方産一両月間頭疼發熱
或發寒熱者何故其説有三一則作癇二則敗血不行三
則傷風先以乎按癇子癇痛者是作癇也宜服順氣散及
瓜蔞末之類以通其癇更以温湯洗之癇通則無事癇若
不痛即悶數血行不行如敗血不行即是血作也急服行
血藥如黒神散没藥當歸ノ類癇既不痛敗血自行而乃
身熱頭疼或發寒熱是傷風也依傷寒法隨証治之

十味敗毒散 方見癰條

乳癰初起腫痛燉赤發熱悪寒或煩渇者
急用此湯腫自消散若至數日之間膿成潰爛膿溝出膿
盡自愈須擇用梓葉湯排膿湯類

○此方ハ乳癰ノ初發ニ用先敗毒ヲ用オキテ而后梓
葉湯ヤ排膿散ヲ用ル也最初カラ梓葉湯ヤ排膿湯ヲ
ヤリテハアレキ者也先敗毒ニテ一先發表スヘシ是
ハ又柴桂湯杯ニモ敗毒程ニハ不届者也

排膿湯　甘草ハ分　桔梗一錢二分　生姜四分　大棗一枚
右四味以水

梓葉湯　治乳癰已成未成者

櫻皮湯以上二方並見癰條

○排膿湯ハ膿ニ成テカラ用ユ其内此方ハ膿ヲ以テ
按スルニ痛ノツヨキカタメニ効アリト覺ユ痛ヲヨク

凡排膿ノ劑ハ膿アル者ハウミヲオシ出シ膿サキ者ハ早クロヲ收ル者也乳癰ハ大抵ハ梓葉湯ニ黒龍散ヲ兼用スル時ハ百發百中ト云程ノ者也

和ケル樣ニ覺ユ又此時ニテモ毒ノ強キ者ハ排膿湯
ヨリハ梓葉湯ヲ用ル也櫻皮湯ハ乳癰ニハ泛ク用ル
也膿ノ成ト不成トヲ不論メ用ル也又潰膿メ后ニテ
モ用ル也其内櫻皮湯ノ本面ノ場ハ潰膿ヨリ前ニ用
ユ是ヲ用レハ毒除テ膿ニナラスト消スル也此方毒
ヲ挫クカ主也故ニイツノ時ニテモ用ル也乳癰ハ敗
毒ト梓葉湯ト櫻皮湯ト三方ニテ大抵スム者也敗毒
ハ寒熱カ目的也寒熱既ニ除キ去ハ敗毒湯ハ不用也
其処ヘハ櫻皮湯梓葉湯ノ類撰シ可用排膿湯ハ梓葉
湯ヨリハ排膿ノ方緩成者也故ニ大抵ハ梓葉湯ニテ

スム者也梓葉湯ハ排膿湯ヨリハ排托ノカ強キ也排膿湯ハカ弱キ藥故田中子乳癰ニ排膿湯ヲ用ルニ忍冬ヲ加用ラレタリ櫻皮湯ト梓葉湯トノ別ハ櫻皮湯ハ急ナル処ヘユク之梓葉湯ハ緩ナル処ヘユクヿ也櫻皮湯ハ急ナル処ヘ用テ夫ニテ毒解メ内消スル者也若急ナル処ト見テ櫻皮湯ヲ用テモ内消セヌ者ハ梓葉ヲ用ル也

○乳岩ニ排膿湯ヲ用テ根治ハセ子トモ病人痛ミモ緩ミ快カル者也它ノ藥ヲ何ヲ用テモ行ヌ者也コレニモ敢ノ方ヨリ湯ハヨキ也梓葉湯ハ乳病ニ用テ最ヨク内托スル者也

○乳癰ノ如何メモ不愈者消銘丸ヲ用テ効ヲ収ムル事余モ治験アリ他醫ノ治験アリし事ヲ余見及ヒタリ此時ハ消銘丸ヲ腹候ニ不拘メ用ル也○牛房子湯

外科正宗　此方方彙乳癰門ノ首メニモ擧テアリ此方乳癰乳疽ノ軽証ニ可用重キ者ハ梓葉湯杯ノ類アレ圧軽キハ此方ヨキ者也

加味逍遙散　方見瘍條

加味歸脾湯　方見癇條　乳巖初起小核結於乳内肉色如故其人内熱夜熱五心發熱支體倦瘦月経不調用加味逍遙散加

味歸脾湯等多自消散若積久漸大峻巖色赤出水内潰深
洞為難治但用此等藥可延歳月若用攻伐危殆迫矣

○二方トモニ乳岩ニ用ユ乳岩ハ治法ノナキ者ノトウソ治セントテ攻撃メモ反テ命期ヲ促カス者ナリ

サレハトテ藥ナシニメモオカレス其二方ヲ証ニ隨テ用レハ一年ニテ死スル者ハ一年半モ持ト云迫也

併シ軽キハ是等ノ方ニテハチル者モ有也ナレトモ峻巖ノ勢ヒナレテハ中々届ク者ニ非ス右ノ二方ハ乳岩ノ后ノアレライ藥ニテ此前ニ用ル藥アリ清橘飲是也是ニテモ届カスメ進ミユケハ逍遥ヤ歸脾ヲ用ル処ヘ行也青橘飲ニテハ十中ニ一人愈ル者アリ

併シ是モ最初ノ事也后ニ成テハキカヌ也總テ乳岩ノ方色々有モノナレトモキカヌ者也扨此逍遥ハ大抵加味ノ者ヲ用ユ此方局方ニ始マリシ方ト覺ヘシ也

此証ハ柴胡ノ場ニテ血氣ノ弱リシ者ニ用ル也血分ヲ調ヘ氣ヲメクラス趣向ノ藥也逍遥ノ主治ヲ云ハ后世ニテ云血中ノ伏火ノ処也逍遥散ハ男子ニモ用ルコトモアレ共多クハ婦人ノ藥也血分ノ藥ナレハ也然レ共男子ニモ用ルコト無キニ非ス湿勞抔ニハ男子ニモ用ル也湿勞ニ用ルモヤハリ血分ニカヽリシ処

乳癌ハ痛ミモハケシク膿モスル也乳岩ハ膿モセス初メ二年ノ間ハオリニキリく痛ノミニテ乳癌ノ如ク痛マヌモノニ假令口アキテモ其マヽニ吾痛ナキ者也又乳岩三年ノ間梅核ノ如キ大キサノ時試ミルニ気散シタノシンテ居ル時ニハ核モ少サキ者ニ心ヲ労スレハ核モ大キク成マヽ成者ニ癌ニ此様成者一種有者也乳岩口アク迄キ者ハ五年程モ有テ死スルアリ口早クアク者ハ四年程ニテ死スルモアリ口明テヨリ半年一年程モツアリ程ナク一月モアリテ死スル者モアルナリ

ナレハ也歸脾湯ハ氣分ヲ調ヘルト云藥也其証ハ腹
至テ虚弱ニメ心煩杯有テ何レ胸中心下ニサヽハリ
有テ動氣亢フルル者ニ用ユ

青橘飲 明孫文胤對蘇氏所著丹臺玉案卷之六　治婦人百不如意久積憂忿乳
内有核不癢不痛將成乳巖

青皮 五錢 醋炒　橘葉 三十片　水煎食前遠服

○乳岩不痛不痒ノ場ニ青皮ヲ用テアク迄灸スヘシ
七九ヨリ以上ニ灸スル也余ノ仕覺ニテ肩髃肘膠左
ヨキ様ニ覺ユ此穴ニ灸スル事婦人良方ニ見ヘタリ
右ノ方ニ灸シオモニ兼用スヘシ灸ハ最ヨキ者也若

膿シナレタル者ハ灸モ前方モキカヌ者也膿ヲナス
ニ至レハ既ニ痒痛モ出テ有ル也爰ニ至テハ先排膿
湯ヲ用テ當座ノ禦キヲナスヘシ是ニテ治スル者ニ
テモナケレ氏棄テオカレヌ也何レ藥ヲ用ルナラハ
排膿湯ヲ用ヘシ和ラキ塩梅ヨキ者ニ青橘飲モ不痛
不痒ノ処ヘ用テ軽キ者ハ治シ重キ者ハ治セサレ氏
先安排ヨクメモ膿モ早クコヌ者也従シ何レ乳岩ト
右疽ハ療治ハ辞退メヨキ者ニ青橘飲ノ処ヘ青皮一
味用テモ佳也其方本草ニ有テ冊渓ヲ引テアリ本草綱目
巻三十青橘皮附方引冊渓方云因久積憂肩乳房内有
核如指頭不痛不痒五七年成癰名乳岩不可治也用青

皮四錢水一盞煎半盞徐
々服之日一服或用酒服也往年此ヘ常ノ撓皮ヲ用試
ルニ青皮程ニハキカヌ也

○疏肝清胃丸　治乳巖紅蛍園古方選注

夏枯草　蒲公英　金銀花　漏蘆　撓葉　菊花
連翹　白芷　山慈姑　瓜蔞仁　甘草　茜根
乳香　沒藥　貝母　紫花地丁　陳皮
右法制等分為末別用夏枯草煎膏為丸毎服五錢開水
送○右方選注ハ清人ノ著述也乳岩ニハヨキ方ノ可
用者ナレ此ヲ用レハ痛ミアリトモ凌キヨキ者也瘕
亂糞ハ常ノ糞ヲ用ユ何レトモ隨証方ニ兼用ス

ルヘシ併レ乳岩ハ何レ根治ノ出來ニクキ者也開水送
ノ三字不通疑ラクハ脫誤アラン

治乳腫痛方　紫花地丁搗絞汁塗乳上其効無比

○乳腫痛ノ方色々アレ𪜈此方右ヨクキク者ナリ紫
花地丁ハ陰乾メ用レニ隨分効アレ𪜈生物ニ不若也
此方柴胡ノ場敗毒櫻皮梓葉湯ノ場ヘモ皆兼用スル
也膿ニ成迫ハ皆兼施ス也膿ニナラサル処ヘ早ク用
レハ消散内消メ治スル者也既ニ膿ニ成ヲ見テハ膏
藥テナケレハキカヌヘシ紫花地丁スミレ𪜈相撲トリ
クサ𪜈云此物白花ノ物良ト云者アリ然𪜈白花ハ少

ナシ故ニ紫花ヲ用ユ此草ヨク毒ヲ解スル者ニテ救
偏瓚言ニモ痘ノ解毒ニヒタモノ用テアリ救偏瓚言
ニハ服用メアリ紫花地丁博ク瘰癧ノ類其它諸腫物
ノ初メニヌリテ用テ見ニ能散ス者也是モ乳岩ニ用
テ見ルニ頗トキカヌ也本草ヲ見ルニ何ヤカヤ腫物
ニ用テアリ又内ヨリ服サセタル方モ本草ニアリ紫
花地丁ハ癰癤抔ニナラントメ陰嚢ノ腫大ニ成処ヘ
傳テ功アリ此方何レモ頻々ニ塗也又此方乳腫痛ノ
ミナラス乳房ニ出来物ノ出テ有時初メ散シ度時ハ
ヤハリ是ヲツケテヨキ也凡乳腫ニメ夫ヨリ寒熱ヲ

發スルヲ此ヲ乳痛風ト云産后抔ニ乳不通メ此病ヲ
ナス者アリ此モ治法ハ同シ平常ノ婦人ニテモ乳凝
テ寒熱スルアリ産后ハ但凝ト云フナシ乳ノ不通ニ
ヨリテ成者ニ平常ニテハ吐乳抔ノ時カマレ或積氣
ニヨリテ寒熱ヲ發メ來ル者アリスヘテ一切乳腫痛
ニ紫花地丁シスリテ滓トモニヌルヘシヨク腫ヲ去
者也多ク方アレ圧此方最ヨシ乳痛風ナラハ産后ニ
テモ平常ノ婦人ニテモ治法ニオヒテハ一也乳痛風
ハ紫桂ノ類ヲ用テ右ノツケ藥ヲ兼用スル也或黒膏
ノ類モ用ル也

○黒膏方　松脂　百草霜　右二味等分相和シテ
ル飴ニテ煉リ通例ノインクヱントノ加減ニメ用ル
也用法ハ腫タル上ニヌリテ紙ヲ益ニヨク心能ツキ
テアル者也此方乳腫痛或乳癰杯ニテ痛堪難者ニ用
ル也此方風毒ニモ分テ良又一切ノ腫物ニ用テ良其
内乳腫痛乳癰ニハ最ヨク効アル者也此方田中子黒
膏ト名ケ用タリ山脇ニテハ龍鱗膏ト名テ方函ニモ
載タリ山脇方函龍鱗膏主治云散血毒凝腫方
其方后ニ　陶按乳腫痛数用大験

○一方　阿仙藥　天花粉　黄連　右三味為末傳此
方婦人乳子ニ乳ヲカマレ痛ニ付テ可也軽キハ此ニ
テモ愈ル者也若重クメ腫ヲナスニ至ル者ハ竜鱗膏
ヲツケテ良右ノ阿仙藥ノ方ノ行処ニ牡蠣末ヲツケ
ルモ良又紅螺ヲツフメツケルモ良紅螺ノ方筌中秘
録ニ見ユ
龍鱗ハ前ニ在ル地丁ヲ傳ル乳腫痛ノ重キ処ニ用ユ
乳ヲカマレタル者ニテモ腫ニナツテハ龍鱗ヲ用ヘ
シ黒膏ハ乳腫痛瘭瘰風毒腫ニ用テ良此方痛ヲ和ケ
腫ヲ散ス本道家ニハヨキ方也又右ノ阿仙藥ノ方ハ
只乳ヲカマレテ傷ツキ或メクレ腐爛ノ者ニ用ユ地
丁ハ乳腫痛ニ用ル方也此其別也

○青膏　乳癰ノ藥色々アレモ五瓜竜ニ如ク者ナシ

五瓜竜ヲ生ニテスリテ絞リ其汁ヲ乳癰ニ塗也此ノ
如クスレハ速ニチル者也然レ𪜈石ノ如ク生葉ノ絞リ
汁ヲツケテハ勢ヒツヨスキルトミエテ腐爛メ痛ム
ト有故ニ余ハ今其方ヲ改テ膏トナシ用ユ其方先五
瓜竜ノ生物ヲトリ剉ミ是ヲ胡麻油ニヒタくニツケ
ヲキ氣ノ出タル時煮ツメテ滓ヲ去蠟ヲ加入テイン
クエントノ加減ノ如ク煉也此ニテハ腐爛モナク甚
効アリ余家ニテハ此方ヲ青膏ト名ケテ甚秘ス妄リ
ニ人ニ不傳也乳癰ニハ紫花地丁モヨクキク者ナレ
𪜈五瓜竜ニハ不如也紫花地丁モ諸腫物ノ散シ薬ニ

ツケル也併シ試ルニ五瓜竜ハ佗ノ腫物ニ用テモ消
散スル者ナレ𪜈它ノ腫物ニ用テハ其処ハ消散メモ它ノ所ヘクヽ
リ出ル故ニ它ノ腫毒ニハ餘リ不用也併シ面部或要
所ヘ腫物出テ其所ニテ潰レテハ悪キト思時ハ右ノ
膏ヲ附テ其所ヲ消散サスレハ他ノ処ヘ出ル者也乳
癰ニハクヽリ出ルト云事ナシ奇妙ニ消スル也併シ
膿ニ成テハ不用也乳癰ノ散シ薬ハ外ニイラヌ也又
是ヲ聞ニ此ツケ薬便毒ノ散シ薬ニメ能効有ト云余
ハ未試也余又按スルニ乳癰抔モ外ヨリ右ノ膏ヲツ

ケ服藥ニモ隨証方ニ五瓜竜ヲ加ヘ用テヨカルヘシ
是未試也思ニ梓葉湯杯ヨリハヨカルヘシ今迄ハ只
乳癰ニハ右ノ膏ノミ用テ服藥ニハ加用サルナリ五
瓜竜膏トナスニハ生物ヲ可用乾物ハ無効
○阜吾ノ入鎮驚散乳癰杯ヲ發セントスル初ニ乾捺
メ能効アル者ノ紅螺ヤ三白散杯ニテヨケレ𪜈此方
能キク者也且小児アル者乳ヲ煩時ハ妥リニツケ藥
ヲモ忌事アリ前カタ雄黄杯ヲツケテ見タリシニ雄
黄ノ藥氣カ兒ノ口ニ入レハ呃氣ヲナス者也鎮驚散
ハ小兒ノ為ニモヨクメ且効アル藥ナレハ用ヘキ方

也是活用也一婦人少サキ瘡乳房ニ出紫黒色ニ成テ
少シ爛レル氣味也ヤハリ乳癰杯ノ下地ト見ヘル也
連翹湯ヲ用テ右ノ乳ノタヽレタル所ヘ右ノ散ヲ傳
タリニ三人用タルニ皆ヨク愈タリ
○一方　芃蘭　蒲公英　右二味煎服一切乳疾ニ効
有ト云別メ乳癰ニヨルト云此湯ヲ初中終トモニ藥
湯ニ換テ朝夕可用此方本藥ヲ用テモ兼用ニ此方ヲ
始終可用○地丁ハスミレ也和哥ニスミレヲ董菜ト
云クイナヲ水雞ト云ヤマフキヲ款冬花ト云此三名
ハ右ヨリ誤レリ

○此方乳癰ノ梓葉湯排膿湯ノ処ニテ兼用スル也ヨク膿ヲ排托スルノ者也此方ハ膿ヲハリ出ス薬故它ノ処ヘハ兼用セヌ〻梓葉ヤ排膿ノ処ニテ用ル也櫻皮湯ノ処ヘモ餘リ兼用セヌ也

灸法○肩尖肘尖　當以指甲掐両肘両肩四所患処覺酸麻方是其穴

○是ハ乳岩ヲ治スル灸也本婦人良方ニ出タル灸ニテフト用テ見シニ効アル者也此灸ニテ軽キハ十中ニ一人ハ愈ユ重メ不治凡此灸ニテ痛アル者ハ痛モ瘰癧モ乳岩ト同因トミヘテ此灸ヲ瘰癧ニ假用ルニヨク効アリ瘰癧モ気癌ノカタニ用ル也瘰癧ニモ初中終用ル也

緩ミ抔メ諸証緩ミナヤミ少ナキ者也乳岩ノ灸ハ色々アレモ此ニ穴ニシク者ナシ肩尖ハ肩髃也肘尖ハ肘髎也トテ肘髎ニ灸スル人モアレモ肘尖ト肘髎ト異也併シ何彼邊ニ灸セシナラハ可有効事也必シモ其所ニ深ク拘ル事ニモアラサルヘシ肩尖ハ成程肩髃ニアタル也又余先年傳ヘシ方アリ乳腫痛ノ痛ム方ヲ按テ見レハ凝テ有者也其処ヘ灸スルモ此灸ニテ熱モサメ痛モ緩ム者也此灸ハ五壮十壮ホトスル也多ハ灸スルハイラヌ者

ノ此灸成程ヨクキク者也併シ其内脊ヲ見ルニ頗ト凝テオラヌ者ハ此灸ハ不施也或又偶其乳ニ當ル脊中ニ穂子ノ大サノ如クニ高ク起リテ或膿痛メ有モノアリ色ツキテ有アリ併シ是ハ稍也多クハ起ラスメレコリアル者ノ其処ヘ灸スヘシ又乳膿痛モ非メ乳癰ヲナス者ハ其患ル方ノ脊ヲ鍼ニテ刺見ルニ不仁メ痛痒ヲ不覺者有其皮外面ハ分ラヌ者ノ得トツキ見ルヘシ其不仁スル処銭程ノ大サ有モノ也故ニ得ト刺可見然メ其処ヘ灸スヘシ多々益良灸ハ最初ニスレハ夫ナリニ収リテ癰ヲナサル者ノ若遅ク見付テ發潰ノ時ニテモ灸メヨキ者也是常ノ癰ニ灸スルモ同理也

○上ノ肩尖肘ノ灸ハ毎日スル也壮數ハ病者ノ心任セニ根起次第ニスル也多々益良恵所覺酸麻ト云テアレヒ此様ニハナキ者也然ヒ効有者也凡乳岩未タ梅核ノ如キ時ハ金瘡ノ治法ニメモヨカルヘケレヒ既ニ岩ヲナス勢ニ成テハ決メカノ類ヲ用ヘカラス翅効無耳ニ非ス反テ命期ヲ促者也五年可治者モ創スル時ハ三年ニ及スメ死スル者也乳岩モ膿出ル処ニ至テハ治法乳癰ト同レ然レヒ乳岩ハ不可治者乳

凡テ乳岩ハ此方ヨリロヲアクルハアレヽロヲアケハ急ニ死スル者ノロアカヌ時ハ夫タケ死モセマラヌ者也

癰ハ可治者也乳岩ノ初發小指頭ノ大サノ核塊乳房
中ニ有テ是ヲ按ハコロ〳〵トメ処ヲ移ス者也此物年
ヲ経テ乳房一ハイニ成也夫ヨリメ潰ル者也大抵乳
岩ハ五年程メ死スル者也或七年程有テ死スルモ有
也乳岩失榮ノ類ハ毒々瘀血ニ因者ニ非ス氣ノ凝滞
ニ因テ成者ト見ユ毒々瘀血ニ因者ナレハ治法有也

續方

神効瓜蔞湯 入門　治乳癰腸癰一切癰疽初起者消已成者
潰及潰後餘毒老幼皆宜其査又可外敷

當皈　甘草 各五 炙　瓜蔞仁 一個
沒藥　乳香 各一 去

水酒各半煎

〇此方入門ニ有酒ヲ加テ煎メアレ𪜈平生ノ如ク水
煎メ宜也或不大便ノ者ハ大黄ヲ加ル也此方方彙ニ
ハ出テナシ此方乳癰乳癌ニ用ユ前ノ牛旁子湯ヨ
リハ毒已ニ成レ者牛旁子湯ハ毒未成者也此方ハ痛
ヲ目的ニメ可用乳没ノ二藥ハ痛ニヨキ者也此方主
治ニモ有通リ腸癰抔ニモ用ユ瓜子仁湯ノ場也従レ
腸癰ハ瓜子仁湯ノ方カヨキ也三条通室町東へ入ル
十一屋傳三郎妻姙娠八月乳腫レサレ𪜈但痛絶ユス
余神効瓜蔞湯ヲ用ル事四日ニメ全愈于際ニキキタ
リ又此方乳癰ノ痛ムニモ宜カルヘシ乳癰抔ニハ大

便結ニ不拘メ大黄ヲ加用テ宜カルヘシ扨瓜蔞仁ヲ
試ニ乎對メ効見ユル也乳病腸癰ノ類ニ用テ見ルニ
其効歴々トシテ見ユルナリ瓜蔞根ハ真物ニアラサ
ル故カ仁ノ如キ効ハ見ヌ也仁ハ余ハ常ノ瓜蔞仁ヲ
売ヲ不去メ其儘用ル也右方皆如此メ用ユ世醫ハ殻
ヲ去テ用ユ非也

○一方　黄土　大黄　二味各等分為末姜汁ト酢ト
ヲ合セテ右ノ末ヲ煉乳房ニ傳ク此方外臺ノ方ニ近
頃斯附薬ヲ用ルニヨク効アル也乳腫痛或乳ノ疵或
乳ノ凝ニ用ユ頃日一婦人乳瘡ニテ疼ヲナス余乃神

効瓜蔞湯ヲ用テ兼ルニ此附薬ヲ用レニ全愈タリ