

• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 510 JAPAN

傷食

癰

癲 狂


驚 恐

好 忘



方輿觀

八



武  
門  
號  
卷

方輿輓卷之八目次

不寐

每夜

傷食

瓜蒂散

鹽湯

大承氣湯

枳實大黃湯

一方

桂枝蘆杏湯

平胃散

養脾湯

附子理中湯

四逆湯

吳茱萸湯

良方吳茱萸湯

療菌毒方

治河豚毒方

又方

備急圓

鍼灸法

癰 癲 狂 驚悸 不寐 好忘

小柴胡湯

大柴胡湯

柴胡桂枝乾姜湯

柴胡龍骨牡蠣湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

小建中湯

大黃黃連浮心湯

浮心湯

黃連解毒湯

將軍湯

白虎湯

風引湯

防己地黃湯

甘麥大枣湯

瓜蒂散

鹽湯

鵝胡菜湯

桃核承氣湯

抵當湯

梔子豉湯

千金酸枣湯

流水湯

歸脾湯

滾痰丸

柳公丸

方輿輶卷之八

有持二名先生口授

八谷文恭子良筆受

○傷食

○傷食ハ格別辨ナシニカレ云傷食ヲ療スルニハ其  
大法ハ吐下ノニツ斗ム此它ニ后世ノ名目ナレ云消  
導云治法カ一ツ附テコワルニ是ハ必竟傷寒ニ瓜蒂  
マ承気ヲ用ル間ニ柴胡ナトノアル様ナル者ニテ吐  
下ノ間ニ一種消導云者アルニ唐ノ方書ヲハシメ此  
方ノ俗間ナトニヨク云油氣ニアタリシ者ニハ杏仁  
シ用或魚ニアタリシ者ニハ山楂子ヲ用又茵ノ毒ニ

アタリタル者ニハ地漿水ヲ用ルナト、云類其アタ  
ル物ニ附テ治法ヲ分タルフ此餘ニ多アリ而凡此ハ  
畢竟俗ニ云小刀細エム大度シ構スハノ具ニアラス  
譬ハ吐下ノニ術ハ所要ニテ在上者ハ吐ニ在下者ハ  
下スノニ道ニアリ是ハ大法也而凡偶小刀細エモセ  
子ハナラヌアリ譬ハ奥ニ醉ニカツラナトニ醉テ  
身ニ発班ナトヲ發ニ或身紫赤色ニナリ或頭痛寒  
或重キ者ハ癇証ナトノ如ク喜突者モアルニ此類ハ  
マタ瓜蒂ヤ承氣ノユク處ニアラス是ハ解毒メヨキ  
者ニ此解毒ニ雄黃ヤ藍葉ノ入ル丸及湯ナトアリ多

ハ丸ニメアル者ニ右ノ解毒シ用レハ速カナル者ニ  
此等ヘ瓜蒂ヤ承氣シ用ルハ所謂割雞用牛刀ノ類ニ  
コレノ件ニ小刀細エモセ子ハナラヌアリ故ニ肘  
後方ナトヲハシメ其外后世ノ方書ニモ小方シ載テ  
アルニコレモナケレハナラヌ者ニ而凡段シ云ヘ  
ハ吐下ノニツニキワマル其外ノ解毒消毒ノ方ハ  
ナ消導ニ属メヨキハ平胃散ヤ和方ノ批把葉湯ナト  
ノ類ニテ消導ノ剂ニ又吐下ノニ道シ云ヘハ吐ノ变  
ハ下ニ吐シ行フテモ不吐ヰハ下シ行フニ而凡下ノ  
变ハ吐ニアラサルニ下ノ变ハ鍼灸熨法ヨキ者ニ凡

傷食下剤シ行フテモ不下メ煩悶メ居ル處ニハ熨法  
ヨキ者ニ右ノ瘡ヘ熨法ラスレハ腹内クワラク鳴リ  
出シ或噫ヲ生シ或去屁ナトスル者ニ是吉候ニ熨法  
ノ知スルニヨル者ニコレヨリメ浮下ヲナス者ニ熨  
法ハ回春ニ姜熨ノ法アリ生姜シ煎シ其汁ニテ熨ス  
方ニ又和方ニ葱熨ノ方アリ其方葱シ煎シ其汁ニテ  
熨ニ此傷食ノ如此瘡處葱熨シ用ルヲハ萃方ニハナ  
キフニ它ノ病ニ葱熨シ用ルヲハ萃書ニアルニ右ノ  
姜熨葱熨モヨキ者ナレモ余ハ煩シ省キテ平生ノ滾  
沸湯シ用ヒコレニテヨキ者ニ此熨法ハツ子ノ傷食

ニハイテ又ヘ此法シ用ル處ハ即霍乱ニテ備急ヤ走  
馬ノ類シ用テモ不下メ揮霍撩乱メ居ル件ノトニ此  
法ヲ行フトカワツタ者ニテコレニテ備急ヤ走馬ノ  
カラタスケテズツト下ソテ走ル者ニ其コレヲ熨ノ  
法手巾ヤ木綿キレヲ熱湯ニヒタシ絞リソレシ用テ  
胸中ヲ熨スヘコレシ熨スニ其巾ヲ以テ両ノ肋骨ヲ  
撫テ温ムヘシ一處ニシツト止メオクヘカラス胸中  
ヨリ鷄尾ノ下マテ両ノ肋骨ニ從テ徐々ニナテオマ  
スヘニ其法賀川ノ按腰ノ第一術ノ如クスヘシ湯ハ  
最極沸湯シ用ヘシ又其中ナトヲ絞ル片湯液沸ナレ

ハ熱メ絞リ得ラレヌ者へ小板ニ枚シ以テ其内ヘ巾  
シ入レハサミ両方ヨリ絞リテ便ナル者萬病回春  
卷之二傷寒門云姜熨法治傷寒胸膈不寬一切寒結熱結水結食  
結痞結痰結大小便結收痞氣結者俱治生姜搗爛如泥  
去汁取渣妙熟絹包漸々操熨心胸膈下其滿痛豁然自  
愈若姜渣冷再入姜汁再炒再熨熱結不炒

又丸傷食吐浮メ后熱出大渴引飲スル者アリ此時ア  
ワテ、解熱ノ剂白虎湯や猪苓湯ノ類ヲ與フヘカラ  
ス但平冒ナトニテアヒシラフテオクヘシ如何様ニ  
渴ヤ熱ノハケシキ証ニテモ平冒ニテヨキ者ニ熱モ  
渴モ自然ニイユル者也コソノ熱ハ發熱ニアラスメ  
身熱ハ類シナス者也右ノ証ヲ發シタル由ハ俗入大

西中子云武帝  
ハ千利足者  
ハアシニ鼓子過  
ハアシニ不動

ニオソレテ狼狽スルモノ也故ニ右ノ吐浮ヲ得テ后  
熱渴ナトシ發ニ父心上シ急ニアワテ、医ヲ迎ニ切  
セニ治シ請フ者也コレテノ處ニユキアタリタル件ハ  
所謂不勞有功伝モノ也

瓜蒂散宿食在上腕當吐之

瓜蒂 赤小豆 各五分 右二味杵為散以杏豉二錢用  
熱湯七勺煮取汁和散溫服之不吐者少加之以快吐為度  
而止止血及虛者不可與之○丹臺玉案卷二瓜蒂散方  
瓜蒂 赤小豆 各五分 為末鹽湯調服夕後宜臥片時欲吐  
且耐之良久用指探之

鹽湯 貪食食多不消心腹堅滿疼痛

鹽一合水三合先以藥鍋上火使熱氣通徹以鹽抹鍋內乘熱投水煮三沸銳意頓服得吐為度若不吐者撩喉必出若無遑火以造湯乃須用水鹽亦佳○今賓曰乾霍亂証最為危候其証則上欲吐而不能出下欲泻而不能行胸腹攬痛腹急悶亂此必內有飲食停阻外有寒邪閑邊若不速治多致暴死宜多用鹽湯探而吐之

丹臺玉案有鹽水飲方云治霍亂初起以此探吐○千金卷之六十二載鹽湯方云治霍亂盡毒宿食不消積冷心腹煩滿鬼氣其方後出此法大勝諸治俗人以為田舍淺近法鄙

而不用守死而已凡有此病即須先用之

○瓜蒂鹽湯只輕重ニテ分クヘシ重ハ瓜蒂輕ハ鹽湯  
ノ証ニ異アルニアラサルノ瓜蒂ノ條下ニ玉案ヲ举  
シハ瓜蒂赤小豆シ鹽湯ニテ用ル徵ニコヽニ引タリ  
瓜蒂ハ鹽湯ヘ压白湯ヘ瓦用ヘシ豆穀ニ不拘ニ又赤  
小豆ナキヰハ獨聖ヲ用ヘシ

○凡吐劑ハ規則ニテ云ヘハ上ニアル者ハ漏越メヨ  
キ入而瓦傷食ハ多ク下劑ニテヨキ者ハ鹽湯モ規則  
ニテ云ヘハ瓜蒂ノヨハキ处ヘユクヘ而瓦今術ニ臨  
テ用ルニハ先疎滌ノイロノ術ヲ行フテモ吐泻セヌ

田中子瓜蒂  
ハ下利アル者ニ  
ハアニ、豉子湯  
ハ下利ニ不拘ヘ

處へ吐剤ヲ行フアリ大抵ハイラヌ者  
大承氣湯 寸口脈浮而大按之反濇尺中亦微而濇故知有  
宿食○脉數而滑者寔也此有宿食下之愈○下利不飲食  
者有宿食也當下之

大黃 八分 厚朴 一錢 六分 枳實 八分 芒硝 一錢 六分

右四味以水二合先煮ニ物取一合去滓内大黃煮取四勺  
去滓内芒硝更上火微一兩沸溫服

○凡傷食ノ下剤、極云ハ備急丸ノ其次ハ大承氣也  
故ニ何カナシニ食傷シ下スニハ備急ハ最ハヤキ者  
又備急ノ處へ紫丸ヲ用ル入アリ是大ニ非ヘ千金

紫丸ノ條ニ食癪ノ字アレハ彼食ノ字ハツケ字ニテ  
癆ノヲ云シモノヘ叔大承氣ト備急トノ別ハ大承  
氣ハ腹滿ノ目的ニ用ニ備急ハ腹滿シ目的ニセヌエ  
タトヘハ此ニ一病人アリ傷食ニテ腹痛スル件ハ備  
急ヲ用ヘ若其處ニメ腹滿アル者ナレハ大承氣ヲ用  
ヘシカレ丘備急ニモ全ク腹滿ナキニアラス  
枳實大黃湯 四春治胸腹有食積大便不通者  
枳實 厚朴 大黃 桂榔 甘草 水煎空心熱服以  
利為度○腹痛甚加木香  
○是大承氣ノ証ニメ輕者ヘ而ラハ小承氣ニテヨカ

ルヘキニ傷食ニハ小承氣ヨリハ此方反テ具合ヨキ  
者ニ故ニ此ニ小承氣ヲ不举メ此方シ举タリ此方後  
ニ以利為度トアレ丘此方シ用レハ多ハ吐スル者ニ  
吐メカラ下ル者ニ又此ニ熱服云フアリ是ニ附テ考  
試ルニ凡ソ傷食ノ藥湯ハ溫服シ過メ熱服スルカヨ  
キ者ニ此方ノミナラス傷食ノ方ハ總テ熱服ニ宜シ  
○此方ハ大承氣ヨリハ緩ニ小承氣ノ場ニメ小承氣  
ヨリハ此方効アリ此場ニモ小シハ腹滿モアレ丘若  
此ニテモ腹滿ハケシケレハ大承氣ニ此方シ用レハ  
多ハ吐メ而メ下ル者ニ凡通例ノ傷食ハ此方ト備急

丸ニテヨキ者ニ尋常ノ傷食ニハ百入ハ百入ナカラ  
枳實大黃湯ニテヨキ伝程ノフニ童者ニハ少レニ備  
急丸シ煎用スルニソレニテ上ニアル者ハ吐ニ下ニ  
アル者ハ下ルニ○前ノ大承氣ノ條ニテ云オトセレ  
故コニ云凡傷食ノ通例ヲ以テ云ハ、先備急シ用  
テモ吐下セス益腹滿ツヨクナリ張裂ル様ニナル者  
マ、アリ其ヰ大承氣ヲ用ヘシ此ニテニ方カラ合ス  
故予快通スル者ニコレニテモ不吐下者ハ即乾霍乱  
ナル者ニテ多ハ久ニ至ル者ニ允テ傷食ハ大久ハ先  
備急丸ヲ用ルヘ備急ハ功力峻トキ者ナレハニ其次

ヘ此大承氣カツクヘ大承氣ト備急トハ緩急ニテ分  
クヘシ

鱠食之在心胸間不化吐復不出速下除之 久成癥病治之

方 橘皮六分 大黃朴消各一錢

右三味以水一合ニ勺煮取六勺頓服即消

○是鱠ニ不限ヘ一切魚毒ヲ消スルニ用エ橘皮ハヨ  
ク魚毒ヲ解スル者也凡魚毒ヲ解スル藥ノ内ニテ尤  
効ナルハ橘皮荆芥山楂橄欖，四味ヘ此外ニ魚毒  
ヲ解スル藥モ彼是アレニ此四味心ヨキヘ譬ハ前ニ  
云シカツシニ醉タル件ニテモ解毒ノ方ナキ件ハ右

人四味ノ内ヲ一味或ニ味ニテモ用テ効アル者ハ橄  
欖ハ骨鰓ニ効アリ昔年入アリ奠骨咽ニタテ、又ケ  
ス既ニ七日ニ至テ氣息オトロヘ死ニ向トス乃テ橄  
欖一味ヲ煎股メ骨又ケテ治ニタリ其病人ノ件ハ橄  
欖一味ノ常ノ藥一貼小トノ量テ用タリ輕者ハ橄欖  
五ツ六ツ斗煎用メモヨカルヘシ叔此ニ举シ鱠食云  
云ノ三味ノ方ハ它ノ毒ニアタリシ者ニハ不用ニ莫  
毒斗リニ用シ

桂枝藿香湯 治傷食輕証方

桂枝 藿香 木香 緘砂 茉萸 菟朮 甘草

右七味以水二合煮取一合

○是ハ傷食ノ輕ニ用エ吐下ニ不及片ノ輕証ニシカ  
ニ初メ輕症トシテ此方ヲ用テモ不治片ハヤハリ吐  
子下シ行ハ子ハナラヌ者ヘ此方ハ枇杷葉湯方中批  
杷葉ヲ去リシ方ヘ枇杷葉ハ用テミルニアリテモ格  
別ニ効マサルニアラス又無メモ隨分効アルヘ故ニ  
去テ用エニカレ片批杷葉有合ス片ハ入レテヨキ  
ナレ片大抵ハ常ニ用ヒ又藥故間ニアハヌフ多シ故ニ  
去テ方名ヲ更テ用ヘ枇杷葉湯ハフルキ和方也云  
ヨキ方ナレハコソ一閑齊ナトモ用ラレタリ一閑齊

ハヤハリ枇杷葉ヲ入レテ枇杷葉湯云テ用タリ又和  
俗ノ方ニ三味湯云テ其方木香藿香益智三味益服此  
平冒方俗ニ權現様ノ御袖藥ト称メ神祖軍中ニイマセシ  
片モツ子ニ此ヲ賛玉フト云傳フナルホト三味湯モ  
大分ヨクキク方ニテ世医モヨク用ル方ヘ余モ昔年  
ハ三味湯ヲ用タリ而片此方最一息ノ處ニテ足ラヌ  
處アルヤウナル方ヘ此ニ比スレハ此ノ桂枝藿香湯  
ハ其効ニ三段モ優ルシ三味湯モ桂枝藿香湯モ其ニ  
ク處ノ筋ハ同シ場所ヘ三味湯ノ益知ハ余常ニ藥籠  
中ニ持合セヌ故其代藥ニ縮砂ヲ用ヘ縮砂モ益知ニ

才トラヌ効ノ者按医史說約傷食門云枇杷葉湯方

枇杷桂實

霍中木小

又搗湯方益木霍傷食腹痛吞酸不吐不泻揮霍燎亂急以三味搗湯須取吐吐淨後煎湯可也

右ノ三味湯モ竜王湯モ權現様、御袖藥ト俗ニ称之三味湯ハ食傷ノ輕ヰ者ヤ俗ニ云積痞ニアリ出シ用エ右ノ方ヲワタガミ藥トモ俗ニ云ヘ甲ノワタガミニ神祖常ニ入レ才カレシ伝傳タリ、叔桂枝霍香湯ノユク處ハ傷食ノ至テ輕ヰ者ニ

平胃散弓方治脾胃不和飲食不進

蒼朮一錢厚朴五分陳皮九分甘草四分姜枣水煎

○是ハ即消導ノ剂也此方ハ宋后ノ方ニメハキツフ

ヨフ出末タル方ノ由ニテ古方家ニテモ后世家ニテモニナ用ヒ平胃散ノ証ハ食不消化メ心下ニ痞塞スル者ニ用ヘ又吐下后食毒全ク不尽處ヘモ用ヘ又ソレカラ通フテ凡脾胃ニカ、リシ病ニハ餘証ヲ不問メ此ソ用ヒナリ故ニ此方ヲ古方家モ后世家モ通メ用ルモコトハリヘタトヘハ古方ノ柴胡湯ノ如キ方ニテヒロク用ヒラレル、く后世ノ方ニ如此ヒロクカヤウ藥ナシ后世方ハミナ一筋ナル者ニ獨リ此方ノミヒロクユクヘ又此方眼疾或頭痛ナトノ類或小兒ノ頭瘡其外一切冒中ノ不和ニヨリテ末ル病ハ外

証ニ不拘メ泛ク用ルヘイツレ飽食膏梁ニヨリテ未  
ル食毒ノ令然モノニハ此方ヲ用ヘ

○此方ハアシライ藥ヘ此方ノユク處ハ常ニ食力胸  
ニ痞テアシキ伝タリ或傷食吐下ノ後ニハ古方ハ用  
ル方ナキヘ其証ハ何カ胃中不和メ物ノ食ヒニクキ  
ナト伝處ニヤルヘ此方ヤ六君子湯ノ方ハ后世ノ方  
ナレ氏ヨク山東タル者ニ○平胃ノ証ニメ停食ノ氣  
味ニテ腹痛スル者ハ加木香也○傷食吐浮ノ后發熱  
シ渴出ル者アリコレハトント大复ナキ者ニテ一日  
モタテハ熱モ渴モ自然ニヤム者ヘ而庄發熱シ渴出

ル故俗人ハ藥ヲ不用ニハ居レヌ者ヘ藥ヲ請フキハ  
平胃散科シ用テヨシ而庄其寔ハ藥ヲ不用メモヨキ  
者ニ○香砂平胃ハ余ハアマリ不用ヘ而庄傷食宿食  
ノ吐下后未全愈メ腹痛メ食毒モ未タクシ残リアル  
ト思フ处ニハ平胃ニ香附縮砂ヲ加用テヨキ者ニ又  
吐下ノ藥ヲ用タル后ノミナラス桂枝霍香湯ナトノ  
アトヘモ附リ藥ニ○平胃モ六君子モ俱ニ脾胃ニア  
ツカル藥ニテ平胃ハ陽位ニアル者六君子ハ陰位ニ  
アルモノ六君子ハ脾胃虛ニ用ル藥ニテ別ニキツト  
腹候脉証モナケレ庄其腹ヲ候ニ濡弱ニメ不食レ下

利ナトアリシ食シ過メモ胸ニ痞ルナト云証ニ用  
ユ小建中湯ナト、近シ右ノ証ニメモ拘挛ナトアル  
ハ建中ヲ用シ又右ノ六君子ノ証ニ欬嗽ナトアルハ  
五味麦門ナトヲ加用シ四君子モ脾胃ニカカル藥ナ  
レ凡四君ハ六君ホトハ内虚ニ及ハヌヘ平胃ノ方ヘ  
近クメ平胃ヨリハ内虚ニ属スル方ヘ四君子ハアマ  
リ不用ヘ杏砂六君子ハ余モオリニ用ヘ脾胃ノメク  
リ甲斐ナキ云處ヘユクヘ其証主治ノ通ヘ杏砂六  
君子湯摘治脾胃虛弱飲食少思或久患瘧痢若覺内熱  
飲食難化胸膈痞悶心腹脹痛噯氣吞酸等

即六君子湯加杏附子藿香砂仁者也

右方彙所載

○小兒ノ水腫ハ多ク平胃剤ニテ治ル者ヘ何則小兒  
ノ水腫ハ十三七八ハ飲食ニヨリテナス者ヘ小兒ノ  
水腫ニアワハ腰候ヲ詳ニメ果メ食ニヨルナレハ中  
脘痞塞メ居ルカ或又平生ノ飲食ノ多寡ヲ詳ニメ而  
メ其証アレハ平胃ノ類シ與フヘシ而凡タマク蛇虫  
或胎毒ニヨリテハレシナス者アリ是十中ニニニア  
ル者ヘ蛇虫ナレハ鵝胡湯ノ類シ用エ別ニ水氣ノ子  
當ハイラヌ者ヘ胎毒ナレハ赤小豆湯連翫湯ノ類シ  
用ヘシ飲食ニヨリテ腫ラナス者ハ平胃ノキ者ハ承

氣ノ類シ用ヘシ或又理中ヤ真武ヘエシフモアル  
キ金方ニ小兒小便不通ノ方ニ車前草小麦ニ味ノ方  
アリキ金卷十四コレラモヤハリ平胃ノ筋ニテ飲食  
ニヨル者ヘ故ニ小兒小便不利メ腫アル者ニ右ノニ  
味ノ方シ用テモヨキヘ或平胃ニ車前草小麦ノニ味  
シ加用テモヨキヘ又大人小兒過食膏梁ニフケリテ  
眼疾シ患ニ或赤痛或赤ミナリメ但ニ卫ノアニキ者  
アリ平胃散ヨク効アル者ヘ或本方ニ菊花シ加用ル  
トモアルニ三角了察子ハ小兒ノ頭瘡ニ平胃加藁木  
防風シ能用テレタリ余ハ不用ヘシカレ丘ヨク効ア

リ伝ヘ此平胃ハ腹候ニ不拘メ用ルヘ大腹ニ筋シ  
フセタル如キノ筋仕脉通リニアルハ脾胃虛ニコレ  
アリテ其人平生泄浮不利ニヤスク或不食ニ或平生  
食ニスキルハ脾胃虛ニトリテウタノ它証アリテモ  
ソレシ亭テ脾胃シ調フル方シ用フヘシ其方建中理  
中六君子ノ類ニ右ノ証ヲアラハス者攻撃ノ剤ヲ用  
ルハアシ、攻撃スル件ハ咽喉乾燥或渴ナト出テ諸  
ノ变証ヲナスニ至ル者ヘ脾胃虛ナラハ不食スヘキ  
ニ反テ食フテモ食フテモ食ニタカリチカガツ卫ス  
ル者アルヘ○余旅行ノ入ニ餞儀ニ贈リ或旅行ノ入

ニ道中ノ用意藥ヲ乞レシ件ハ平冒ニ紫蘿葛根ノニ  
味ヲ加用テ贈ルヘ其主治、時氣アタリ 水ガツリ  
腹ノイタシ クタリハラ 頭痛 ナト、包ミ紙  
ニ一ツカキニ主治ヲ舉テヤルヘ凡旅客ハ時氣ニア  
タリニトテソレノ方ヲ處シ去加スルノモナラヌ  
者又道中ノ時氣アタリ伝ハ多ク水土ニ服セス外邪  
ニアタリナトメ多ク冒中不和ニヨリナス者故此方  
ヨキル而庄今病者アリ時氣ニアタリレトテ此方ヲ  
處スルニアラス其片ハ桂枝湯葛根湯ヲハシメ或夏  
時ナレハ杏薦飲也庄ソレノ脉証ニ従テ方ヲ處ス

ハコナレ庄旅中ニテハソシラノハナラヌ故平冒  
ニ紫蘿葛根ヲ加ヤルヘ此處ハ世間ニテハ霍香正氣  
散ヤ不換金正氣ヲヤル處ニカシ庄右ホノ方ハ冗  
長ノ方故ニ其要藥ヲ取テ平冒加紫蘿葛根ヲ處スル  
ヘ此方旅客ハフリ出ニメ用ユ散ニメモヨキヘ煎湯  
ニスレハ益良也

養脾湯 治脾胃虛冷飲食易傷或胸膈滿悶ニ胸肋虛脹心  
腹絞痛呪吐恶心噎氣吞酸腸鳴米穀不化四體倦怠不思  
飲食 人參 茯苓 麦芽 緘砂 白朮

乾姜 甘草

姜枣水煎

○是ハ至テ虛弱ナル入ノツヨク吐下スヘカラサルニ用ニ其証ハ主治ニ云テアル通りヘ此主治ニアル証カ何ニツ乎三ツ乎雜ル者ニ此方ゴテイシタル方ナレ凡右ノ証ニハヨクキク藥ニ是回春ノ方ニ此處ナトヘ吐下ノ劑ヲ用レハ反テ腹痛ナトハナハタシクナリ或吐下ノ劑ニテ吐下ヲ得テモ其アト委頓ツヨク大氐ニハスグ立ヌ者も而ニ此方ヲ用レハ吐下スヘキハ吐下ニ消導スヘキハ消導スル也而メ其アトモハヤク治スル者ニ此証ニ此方ヲ用レハ服スル内病人コロヨカル者ニ傷食ニ吐下ヲ行フハ

誰モスルヲニ此ラノ処ヘ此方ヲ用レハ仕竟ヘ子ハナラヌヲニ又此方動スレハ食ニ傷ラレヤスキ者ニ用ニ即此主治ニ飲食易傷トアル場ニ是等ハマタ承気ヤ平胃ノ場ニモアラス此ラハ此方ヨキニシカニ此場ニ平胃ノユクノモアレ凡其内此方をヨシ

○此場ニメ右ノ養脾湯ヲ用ヒ得ヌ人ナラハ理中湯加木香ヲ用テヨキニ攻撃ノ剤ヲ此ラノ処ヘ用レハ至テ理屈ノアシキ者也

附子理中湯明吳崑  
医方考中焦痛甚脈沉遲者宜急用此方於理中湯方中加附子等分

理中湯方  
具鳴条

○食滯ニ此方ヲ用ルハ吳山甫ノ主治短クメ能ク尽  
メアリ而レ氏今コレシ用ルニハ多ク吐下ノ后ニア  
ル者ニシカレ氏クワシク云ト初メカラモコレヲ用  
ル証ニナケ子ハナラヌヘ用テミタキ者ニ何レ此証  
ハ痛ニ中腕ニアリテ脉浮數ナトニアラスメ沉遲ナ  
ル者ニ此方ハ后世家或古方家ニテモ用ル方也其用  
レ处ハ吐下後手足厥冷脉絶ナトノ處ヘ用ヘシカル  
シ吳山甫ノ吐下后ニ不拘メ此方ヲ用ルハ一手段云  
フヘシ内ニ寔物アル者ニテモ此方ヲ用レハ是ニテ  
運動メ吐下シナス者ニ此証一種アル者ニ或手足厥

若冷脉絶メ四逆湯ナトニ及フモアルヘ取此方ト備  
急ナトシ用ル場トノ別ハ或吐浮シ經シ后手或腹ノ  
濡硬シ以テ別ツヘシ脉ハ備急ノ場モ此場モ何レ沉  
伏メアリテ其別不明者ニ故ニ吐浮シ經テ后此証シ  
見ハシ或未經吐下メモ腹ノ濡ナル者ハ此方ヲ用ヘ  
若未々吐下シ得ス其腹硬滿スル者ハ備急ノ類シ用  
ニ子ハナラヌヘ備急モ手足厥逆メ脉伏シ或渋ル者  
ナレハ其因大ニ遠クメ其証反テ近シ疑似スルヲア  
ルモノヘ

○此方ハ羸弱ノ人ノ食毒未タ内ニアリテ不吐下メ

痛ムアリ其處へ下剂ヲ用レバ反テ益アシクナル者  
ヘ此場ヘハ附子理中湯ヲ用レハ吐利ノ食毒モ去ル  
者も是一治法也通例ハ吐利后ニアル者之此方ヲ吐  
利セヌ前ニ用ルハ養脾湯ノ一等ハケシキ者ニテ養  
脾湯ニテユカヌ者ニ用ユ又傷食吐下メ后陰ニ入ル  
者ハ理中湯其量キハ四逆湯ナトヘ吐下セヌ前ハ輕  
々養脾湯童ハ理中湯也

四逆湯 治吐下而汗出小便復利或下利清穀裏寒外熱脈  
微欲絕或發熱惡寒四肢拘急手足厥方

甘草八分 干姜六分 附子一枚 右三味以水一合二勺

霍乱ニ當盤  
逆ヲ用ハフアリ  
コレ四逆湯ノ緩  
ナル者く吐利后  
ナトニモハフ

煮取四勺八分○論曰強人可大附子一枚乾姜三兩即是

通脉四逆湯已餘依四逆湯法服

○此方ハ別ニ云分ナシ傷食吐浮后ニ手足ノ厥冷ス  
ル者ニ用シ最吐浮セヌサキニ手足ノ厥冷スルハ此  
方ノユク处ニアラス吐浮セヌサキノ厥冷ハ熱厥ニ  
吐下ノ剤ノユク处也

○是傷食ノ吐下メ后ノ治法ヘ四逆ノ証ハ轉筋アリ  
テモ用シ四肢拘急云モノ四逆湯ニモ云テアレハヘ  
又四逆ト似タハ者ニ吳茱萸湯ノユク处アリ霍乱中  
ニテ用テ氣味ノヨキモノハ吳茱萸湯也

吳茱萸湯方具 吐条 吐食病吐利手足厥冷煩躁欲死者

○是ハ所謂霍乱ニ用ル藥々其証霍乱吐泻后ニ手足厥冷スル者ハ四逆湯ノ証ニソレニメ煩躁ノツヨキ者アリ即此方ノユク處ニ其人多ハ藥水汎ニウケヌ者ハ此場ハ甚危急ノ証ニミユル者ハ此証云ハ、四逆ノ証ニメ煩躁スル者ニシカシモ四逆ノ腹ハ心下濡ナル者ニ此方ノ証ハ心下硬ナル者ニ旦此証ハ呕吐專ラアル者ニ此處シ世医ハ附子理中或ヨクニ子段ラスル医ハ小半夏ヲ用テ霍乱ニ吳茱萸湯ヲ用ルヲハセヌ者ハ此方ハ此場ヘハヨクキク者ニ縱令

傷食ニヨリテ霍乱ノ狀ラナス者ニテモ外邪ヨリシテ霍乱ノ狀シナス者ニテモ何レ前ニ出シ証アレハ此方子陰ニキク者ニシカレ此方殊ニノミニクキ故ニムイキニヤルトウケヌ者ニ徐々ニコレヲ用レハツイニハウケテニ三口ウケテモヨクキク者ニ此方第一吐シ目アテニメ用ヘシ此証暑邪ニアタリタル伝ニモ多クアル者ニ

○是宿食アリテモ吐下ノ后ニテ今ハ其宿食ハナクメ陰位ニ入りシ者ニ此場ハ寔ニ療治ノ為処ニ此場ニテハ它医小半夏加茯ナト迄與フテモ不收病家モ

医者モ衍尽キ枝窮シ徒ニ于ヲ束テ斃シ待テ居ルホ  
トノ場ヘニカルニ此吳茱萸湯シ用ル件ハ藥モ奴リ  
諸証モ隨テユルミテクル者ヘ大ニ愉快ナル者也霍  
乱傷食傷暑ノ類吐利手足冷脉モ絶ヘキニナリ諸藥  
不收附子ノ類モ咽ヘ不入メ吐カヘス程ノ處ヘモ吳  
茱萸湯シ與テヨク奴マル者ヘ速ニ効アル者ヘシ陰篇  
吳茱萸湯ノ証即今ノ霍乱也此病ニハ吳茱萸湯寔ニ秘  
藥ヘ霍乱吳茱萸ニ不至前ノ治法ハ何ニテモヨキヘ  
吳茱萸湯ハ生火ノアル處ニ后世家ハ此處ヘ附  
子理中古方家ハ四逆湯或茯苓四逆シ用之其處ヘ此

吳茱萸湯大ニ効アル吳茱萸湯ナトノ類スヘテ直根竹節  
ノ參ヲ用ルニハ炒テ用ヘシ不尔ハアマリニ苦味甚  
メ服スルニ不堪者ヘ奴霍乱理中四逆ノ類或白虎ナ  
トヲ用ヒ熱厥寒厥ノ治法既ニ尽メ呴噦甚ク治ヲ施  
ニ所ナキ者ニ吳茱萸湯シ與テツツ、用テ回陽セシ者  
アリ此吳茱萸湯ノ証ハ呴噦ハケシシメ水一口モノニ  
エヌ者ヘ霍乱吐利手足厥冷欲火者ニテモ腑中ニシ  
ツカリト動アルハ意ヲス正テ此方シ用ヘシ必狼狽  
スルヲナカレ又如何メモ藥シ一向ニ不收者ハ神闕  
ナトニ灸メ時刻シノフレハ其内ニハ藥モウケルヤ

千金卷之六十  
二治霍乱轉筋  
方用蓼子一抱去  
兩頭以水二升煮  
取一升頓服之

ウニナリテ末者ノ是吳茱萸湯ナトモウケヌ片ノフ  
良方吳茱萸湯 治冒暑代熱腹痛浮痢或飲食過度霍亂吐  
浮或食冷冒寒或忍饑大怒或因舟車傷動冒氣令人吐浮  
並作轉筋逆冷等証遲則不救

吳茱萸 木瓜 食鹽

各半  
兩

右同炒令焦先用磁瓶盛水

三升煮百沸入藥煎至二升已下頗一盞或冷或熱隨病人  
之便服之 按轉筋者足腹之筋拘牽急痛甚至牽縮陰丸  
痛迫小腹發於大吐大浮之後最是急候而此方能救之

○此方竒効良方ニ不限它ノ方書ニモ大分出テアル  
者ナレ庄良方ハ主治クワシキ故此ニ引出セリ此主

治クワシク長タト云テアル庄其要ヲ以テ今テ此ヲ用  
ル目的ハ轉筋也 凡傷食ニ轉筋ヲナス者十人ニ一人  
アル者ニコレヲ打キ方クキハ灰スル者ニ食滯ノ轉  
筋スル理ハトウ云モノヤラ竒妙ナルトナレ庄アル  
者ニ其轉筋スル形狀ハ方后ノ按轉筋若云云ノ文  
アリコレ京岳全書ノ文ニ良方ニハナキニ全書ニ  
此通リ良方ノ主治シ举テ方后ニ介賓ノ此案ヲ云テ  
アリ叔此主治ニモアル通リ舟車ニ醉モ或暑邪ナト  
ヨリ吐浮ノ轉筋スル者ナキニハアラ子庄其内ニテ  
傷食吐浮后ノ轉筋ハ最多キ者ニ多ハ灰ニ至ル者ニ

暑邪ニヨリテ轉筋スル者ハ余モ親シク見タリ舟車ニヨリテ吐浮ノ轉筋スル者ハ未タ親シク不見ヘ叔轉筋ノ証ニ此方ヲ用テ効ナキヰハ千金ノ蓼シ用ル方ヨシ此方モヨキ者ノコノ吳茱萸湯轉筋ハカリニモアラス常ノ霍乱ニモヨキヘ叔此方ノ外ニ平冒散加木瓜ヤ理中加石羔ナトモ傷食ノ轉筋シ治スルノ方ナレ凡此吳茱湯ニハ不若ヘ適所翁ナトハ阜爾タル人ニテアリシカニ此塲ハ理中加石シ用ラレタリ○此方轉筋逆冷カ目的ヘ吐浮メアトニテ轉筋スル者アル者ヘ何カラ走テモ此証アルハ此方ヲ用ヘ此

處三因方ノ木瓜湯ヲヤリテモヨケレ凡此方最ヨキヘ又轉筋ニテモ吳茱湯ニテオストアリ又四逆湯ノ証轉筋スル者アリニカレ凡此吳茱萸湯ノ如ク甚カラヌ者ヘ微急位ノフヘ轉筋ニハ傷寒論ノ吳茱湯ヨリハ此方効マサルヘ良方ニハ用藥ニ暇ナキ者ハ食鹽一味ニテモヨシ伝テアルヘ

○医說卷二云岐伯灸法療脚轉筋時發不可忍者灸脚踝上一壯內筋急灸内外筋急灸外

療菌毒方千金 堀地作坎以水沃中搅令濁名地漿飲之

○此ハ松蕈其外何ニヨラスソサビノ類ノ毒ニアタ

リニ者ニ用エ是モヨクキリ者ニ又竒方ニ茵杳一味  
ヲ煎服メ茵毒ヲ治スルノ方ヲ傳ハリタルヲアリ而  
レ丘菌毒ハ地漿ヲ聖藥トメアルニ又茵毒ニ不限一  
切傷食ニ其アタリタル物ヲ喫ワシメテアリ入門ニ  
出テ除原散ト目メアリ本邦ニテ山東洋コノ法ヲ行  
ヒシフ漫游雜記ニ見エ茵毒ナトモ藥物ナキ件ハ除  
原ノ方モヨカルヘシ又茵毒モハシメ通例ノ吐下ノ  
剤ヲ用テソレニテ効ナクハ地漿ナトシ用ヘシ最初  
カラ地漿ヲ用ルニ不及フヘ漫游雜記曰山東洋常治  
河漏渟滯者益進河漏以  
吐之是當吐方未講之時其  
胸間既有吐才

治河豚毒方本草引衛 生易簡方一時倉卒無藥急以清麻油多灌取吐  
出毒物即愈

○河豚毒ニハ未タ出合ワヌニシカレ丘博ク其方ヲ  
問究ルニ河豚魚毒ハ弟一人糞汁カヨシトニ其次  
ハ藍汁ニ而丘右ノ内ニテ胡麻油を効アルトニコ、  
ヘハ瓠蒂巴豆ノ類ハ至テ達キ者ニ伝ナニカナニ  
河豚毒ニアタリシ者ニアワハ胡麻油ヲ其液ノマス  
カコキヘニ三口モ送レハ直ニ吐スル者ニシカレ丘  
亦一合モ其餘モ送ルヲモアルヘシ往年此油ヲ用ル  
ノ方ヲ傳タリシニ其后本草ヲ閱スルニ彼書ニ河豚

毒杏油ヲ用テアリ故ニ本草ノ所举シ此ニ載タリ又河豚毒ノ解スルニ穢物ヤ藍汁ヲ用ルヲハ俗人モ多クスル也右ノ胡麻油ヲ用ル處ハ急ナル件ハ常ノ燈油ニテモヨキ者ニテソレニテモ吐ク者也

○油ハヨク物ヲ急ニ吐カス者ハ瓜蒂ナトヨリハ早く吐ク者ハ油ヲ用ルヲハ河豚毒ニ限ラス凡テ一切食毒吐下ノ剤ヲ用テモ効ナキ件ハ此方ヲ用ヘシ九傷食ノ治法皆別ナシ何レモ吐下ノ同方也其内別一方ヲ立ヘキ者ハ茵毒ト河豚毒也

嘯菴云中河豚臭毒者ウ覺懊懨須直探吐急取藍汁一盞若

穢物少許若瓜蒂末一錢須臾吐尽則十治八九又曰按食傷丸為暴急瓜蒂得吐遲用後方可也 八九月橘子將熟之時毀葉納胡椒三粒待葉熟取燒之為末含少許於小竹管吹入咽中過咽則吐

○此方モヨクキク伝之故ニ此ニ舉才キタリ掠ヘオキタキ者ニ橘子ノ樹ニアルヲ此ニ云テアル様ニナシ而後葉熟メ后取リテ黑燒ニナシ用ヘ此方ツ子ノ傷食ニモヨカルヘシ臭毒ニハ限ルマニキヘナルホト此ニ云テアル通リ傷食ニハスヘテ瓜蒂ハ遲キ者ニ工ニアル者ニテモ備急丸ノ方カ反テハヤク吐ラ

告一日讀三浦真  
伯所著醫鑑翁

曰飲食害于人  
不啻餧鶴啄敗  
厭要之物間亦  
為嗜好所中傷  
必生塊為終身  
之憂留毒之形  
予嘗親視往昔  
安永年間暮春  
之初遊于江戸  
富賈向阪某病  
患三閱月一時  
名譽輩見以屬  
之必死介山田  
生以請予之救  
療其為證也二  
更惡寒經一食  
時發熱如焚症  
狀如瘧疾曰不  
足以為憂皆以  
為然荏苒踰月  
證候益劇精神

得ルモノ也

○中神宇内子ノ方ニ酒毒食傷ヲ吐スル密柑ニアナ  
ヲアケ其肉ヘ胡柂七八枚入テ其俗乾シアケ為末取  
下シム速ニ吐出スルニ仄蒂ハ煩アリテアシ、此方  
藥煩モナクメヨシニカシ此方它病ヲ吐セントメハ  
不吐者也

備急圓

方在別集

○既ニ前ニ辨ス備急ノ劇キ者ハ走馬湯ノユク處也  
○傷食霍乱不吐下者備急紫圓走馬ノ類ヲ大ニ用テ  
モ不吐下メ坐ナカラ斃ヲ見ル者アリ此時ニ方テ熟

疲弊腹中有塊  
大若拳口真黏  
滑欲冷水漱焉  
其語于予曰今  
茲元三之日食  
河濁麌平素所  
嗜ニ更之后俄  
然惡寒少焉發  
熱汙流如浴頻  
々更衣衾至今  
三月都下良工  
午暇既尽頃日  
請侍医河君而  
調治焉居私于  
妾曰死期迫矣  
宜謀后事我敢  
不來診焉今也  
計尽術寃東奔  
西走惟祈于神  
佛耳先生有教  
之則再造之恩  
死而弗忘歎欷  
酸鼻不忍視焉  
予曰病症雖劇

酒ヲ醉フホト服セシムル件ハ十中ノ一コレニテ吐  
下シテ生ヲ得ル者アリ備急圓本酒服ノ方ナレ凡ニ  
世間ニテハ白湯ニテノミ用ニ酒服ナラハ勢イヨク  
ツヨシメヨカルヘシ凡乾霍乱走馬ノ類ヲ用テモ不  
吐下メ一瞬時許モ經ルニ至テハ生ヲ保テ難キ者也  
ヨシ甘遂ナトノユクノモアレ庄ヤハリ巴菽カヨキ  
又宿酒ニハ桃花煎桃花味煎服ソ用ルカ最其功マサル  
伝ニ腹滿ナトアルハ尚更ヨキ也○一方 食傷不吐  
下者ニ用レハ吐下メ治スルノ方 升麻 蔡金 右

辛元氣未衰庶  
幾僥倖一生於  
萬一乃午涼膈  
散勇用備急四  
使山田生主視  
湯藥至更瞑  
眩數刻浮下兩  
三行神元爽然  
前症全愈食粥  
二枕明發算與  
招予乃往而視  
之則會家人而  
說往日之若楚  
曰神矣先生之  
術冥肉我之戶  
也昨夜浮下惟  
物益是病根双  
在庭上請煩監  
定予就而視之  
清潔可愛形似  
葛鉤使婢破之  
得河漏匙始知  
大率飲食不消

ニ味煎服是田中子ノ能ク用タル方ヘ○凡テ食ノ腹  
痛アル者ハ表証アリテモ表証ヲ弃テオキテヨキ者  
ハ腰痛ナキ者ハ表証ヲ先ニ刮スルヲアリ表証アリ  
吐浮セシムルヰハ一時ニ治スル者ヘコレハ傷食  
腹痛ノ表証アルヰノツヘ

鍼灸法 宿食不吐不下腹痛甚者多灸上脘中脘天枢或用  
鍼吐下為度若吐下而腰痛不已者概屬疝瘕宜灸天枢十  
一十二十三十四腰眼章門○孫文胤曰治霍亂欲絕但胸  
中微有熱氣用鹽填于脐中灼艾不計壯數即甦又曰刺  
商穴出血立愈乾霍亂藥不能治唯此神効屢試屢驗○張

化則留飲受而  
包之也雖嗜好  
之物有不時之  
禍況於鐘錫厭  
惡之飲食乎不  
可不慎焉

介賓曰轉筋十指拘挛不能屈伸灸足外踝骨尖上七壯後  
千金卷之三十一○文胤又曰治吐浮日久服藥不効坐  
危之極 天枢二穴九十壯氣海一穴五壯

○傷食ニハ鍼ハキツフ即功ノアル者ニテ重キ者ハ  
藥テナケ子ハ吐浮セヌ者ナレモ輕キ傷食ハ針シ中  
脘アタリヘニ三本刺セハソレニテサハケカツキテ  
ムカツキ未テ吐浮シカナルヰ灸スルヘ其ヰノ灸  
ハニ道アリ一ハ吐浮シカナルヰ灸スルヘ其ヰノ灸  
ハミナ腹部之又一ハ吐浮メモ痛ノヤマヌヰ灸スル  
ヘ其ヰノ灸ハ背ヨリ腰章門ナトニスルヘ右ノ吐浮

又景岳全書  
刺委中穴出血  
或刺十指頭出  
血皆是良法ト  
アリコレモ乾霍  
乱ノ出血ノ法也  
ツ商ヲ刺ヨリハ  
委中ナ脂頭シ  
刺スヘシヨカル  
ヘレ

前ニスル灸ノサキニ先熨法ヲ行フヘシ大氐ハ熨法  
ニテサハケル者ニ右ノ熨法ラナミテモサハケヌヰ  
ハ灸シスルヘ○此ノ孫文亂ノツ商ヲ刺テ血ヲ出ス  
ハ常ノ食滯ニアラス常ノ食滯ニハ出血ハ効ナキモ  
ノヘコシハ病ニメ傷食ニ類スル者ニ出血スルヘ此  
証寔ハ傷食ニハアラサルヘナルホト痧病ニ傷食ニ  
類スル者アル者ニ其証食更ナトラスレハ痛ヲ發シ  
ナトメ頸ニ傷食ニ似ル者ヘ

コヽノ末ニ載タル文亂ノ又曰云云ノ天扱氣海ノ灸  
ハ常ハセヌトヘ是ハ何モ角モ為尽メトウモイケヌ

伝片スル術ニ其片ハ氣海モコヽニ丘壯トアレ丘三  
十壯モ四五壯モスルヘ而丘氣海ハ多ハ四五壯ヲ  
法トスルヘコレハ吐浮后ノ証ニ吐浮后ニツハリテ  
久モセス生テモセスメコトリシル者アリ其片此シ  
行フヘシ吐浮ノ后昏睡ノ手足微冷ナトシ脉モ微細  
ナトニアル者ニ西洞院御池上ル街佐和屋某者ノ妻  
往年松簾ノ毒ニアタリテ病ヲ發ス乃近隣ノ医ニ治  
シ請フ其医方ヲ處メ吐浮ヲ得タリニカ丘其餘毒尽  
キスメ病証猶在テ時々突ナトシ發ス治ヲ余ニ請フ  
余其証ニ隨テ初メ桂枝加人黃ヲ用ヒ后ニ至テ理中

湯四逆加人參ナトシ用ヒシニ病益アヤウクナリテ  
它医ヲメ治方ヲ請ヒシニ其医參附湯ヤ獨參ナトシ  
用ニ寸効ナク死ニ垂トス其ヰノ証ハ即上ニ云シ  
如ク昏睡脉微細チ足冷等ノ証ナリシカ医コレニ氣  
海天杞ニ灸メ治スルヲ得テ其婦死ヲ免レシヲ  
見タリ此灸法不可不知也扱其ヰ病人ノ灸ヲ發スル  
ハ覃ニ菌毒ニ中リシ故也伝テ灸ヲ發スルヲ菌毒ニ  
中リシ一証候トスル伝人モアリシカ由余ヲ以テ此  
ヲ按ニ傷食灸ヲ發スル者菌毒ニ限ルトニアラサル  
ヘシ它ノ食毒ニテモ灸ヲ發スル者アルヘキヘ全体

笑ヲ發スルハ惡候ニメオモキ証之ナルホトイヤラ  
ニキ者ニ傷寒中ナトニテモ笑ヲ發スル証アル者ヘ  
凶候ニシカレ凡久候伝ニアラス如右重キ証ニハ笑  
ヲ發スル者アレハ傷食毒ニテ笑ヲ發スルモ菌毒ニ  
限ルマニキト思フニシカレ未タ它食毒ニテ笑ヲ  
發シタル者ヲ親ニシク見ヌアナレハ尚它日ノ考試ヲ  
竣テ決スヘシ

○食更セシ後腹ヲ候ニ左股下ニ硬マリアル者ニ后  
復暫メ候ミ其硬マリ中腕ニアル者ニ是食物トニユ

○厚朴ノ腹ハ中脘ハリテ居ルニ厚朴ノ類ニテ効ア  
リ寛中湯ノ類ヨシ柴胡ナトニテハ効ナシ柴胡モ胸  
股下ニ物アリテ中脘ハル者ハ大柴胡ナレ凡但中脘  
ノミハリテ胸股下ニ物ナキハ柴胡ハ効ナキヘ宿食  
ノ腹滿モ中脘ヨリ它ヘ及フモノニ

○一方 半夏 陳皮 木香 縮砂 甘草 生姜  
右六味煎股 此方山腹ノ方ニテ霍乱吐泻后ニ用エ  
余モオリニ用ル

○前ニ举ニ灸法上ニモ云通リ灸ニ通リアリ吐下

サスヘキタメニ用ル者ト痛ヲ止ルタメニ用ル者ト

ニ通リヘ霍乱傷食ノ后腹痛久ク不止ハ多ハ虫ヤ痴  
ヲ喚出ス者アルニ叔孫文胤ノ鹽シ臍中ニ填メ灸ス  
ルノ余モツ子ニスルフヘ此灸ハツ子ノ灸ト違フテ  
大ニメ灼クヘ凡テ脐中ニスルキノ灸ハ大ニスルカ  
ヨレ又霍乱ノ久厥セシラ甦ラスニ脐ニ灸シ大ニス  
ルニ其片ハ鹽ハ不用ニ又傷食霍乱吐下ノ剤シ用テ  
其后吐下ノ不止者アリ是モイカニモ仕方ノナキ者  
之其片ハ吳茱萸湯ヤ四逆湯ニ此灸ヲ兼施メヨキヘ  
玉案ノ灸ハ陰陽シ不撰メ灸スルニ効アル灸ヘ十一  
十二十三十四ノ灸ハ脊際乎ニ行通リヘスルニ此穴

十穴ノ内ハ十穴ハ此ノ十四又ケテ九十九ノ二穴加ハ

ル

良木作衣

○医説卷七云偶食物飽其雖覺躊倦無輒就寐可運動  
徐行約百餘步然后鮮帶鬆良伸腰端坐兩手按掌心復  
交叉未徃約三十過後以兩手自心股間按撩向下約十  
數過令心腹氣通不致壅塞過飽食物隨手消化也

○小兒傷食服藥不吐下四肢厥逆脈殆絕一医與亨利  
屋安加一爻白湯送下卒然而吐得痊毓春園  
小冊

○傷食無吐浮腹痛甚艾灼數百壯以吐而痛止為度中  
脘上脘三陰交天枢尤佳吐后兼疝腹痛湯藥入口則即

痛者灸為最要背部自十一至十四章門亦佳 同上

○心下和而脐下痛者虛或寒疝也 同上

桂山刻氏曰案

千金方云病發

身軟時醒者謂

之癇也身強直

反張如弓不時

醒者謂之癲也

此癇產之辨也

所謂癇即聖

惠方以降称

驚風急驚即

陽癇即

陰癇即

○癇 瘫 狂 驚 悸 不 寢 好 忌

○癇ハ古ハアマリトナヘヌ者トミニユ近来杏川太仲

ナル者出テ喜怒者モ喜欣者モミナ癇伝テアリ詳ニ

行餘医言ニ見タリ而凡其症候ヲ載セシ者ハ詳ニヨ

ク举タリ癇ハ間アリテ発ル故ニ名ク凡ヘ凡バツト

シタル者ノ間アリテ発ル者ヲ癇ト槩メ云ハ、持病

ノ喘息ナトモ癇ト云ハルヘキノ按ニ今云癇ノ証ハ

心疾ト云カヨキハ心疾ノ目ハ赤水玄珠ナトニモア

リ又其它ノ方書ニモ心疾ノ目アリ玄珠ニハ茯苓丸

ノ方アリテ其主治ニ常用療心疾トアリ心法ノ字モ

赤水玄珠三十

六卷

三十六冊萬治度子翻

明醫二全

クハシク云テミシハ配當ニテ其实ハ肺ヨリスルヤラ  
ラ心ヨリ発スルヤラ知レヌフナレ凡先心疾伝カ最  
近ヘ癲ハ今俗ニ癲癪伝是ヘ此症卒ニ倒レテ涎沫  
ヲ吐ク者々驚悸ハ物ニ才トロキテムナサワキス  
ルフヘ不寐ハ夜サヘスルフヘ好忘ハ健忘ヘ  
叔狂ト驚悸ト不寐ト好忘トハ病名ニハセラレヌヘ  
右ノ四症ハ拘ラスメ云テミシハ瘀血ヨリ来ルフモ  
アリ胎毒ヨリ来ルフモアリテ其因一ナラヌ故ニ証  
ニハ取テヨキ者ナレ凡病名トハ云レヌヘニカレハ  
此ニ病名ノ如ニ举ラレヌフナレ凡ソフシテユケハ

ドウモトラマヘル處ナク瘀血ノ門ニモ胎毒ノ門ニ  
モミナ右ノ四症ノ類ラニ一举子ハナラヌ様ニナリ  
テ甚煩クナル故今姑ク先輩ノ説ニ從テ此シ立ツ目  
狂驚悸不寐好忘ナトイロイ因アリテ不一伝ヘ凡今  
云癰症ニ多クソフ者ニテ癰中ノ一大証候ナレハ其  
多クアル一大証候トスル癰ノ門ニ姑ク此シ併セノ  
スルヘ而凡治術ニ臨テハ一一其因ヲ求テ治シ施サ  
子ハナラヌ者ヘ畢竟此篇ニテキツト一病トミテ一  
筋ノ者ハ癰ハカリヘ它ハミナ一筋ノ者ニアラス  
○癰瘍ヲ患ントスル前ニハ時々卒厥スル者々是將



臘中ニ勤スル者モヨクオサマルヘ鉛丹ハ長吉丹ヲ  
用ヘシ是最も上品ノ者ヘ外療ノ外ヨリツクル丹ハ光  
明丹ニテヨキ者々凡テ内ヨリ服セシムル者ハ上品  
ヲ用ヘシ外ヨリ傳ル藥品ハ其次ニテモヨキ者ハ光  
明ハ長吉ニ次シ者ハ硫黃ナトモ肉股セシムル片ハ  
鷹ノ目ト称スルヲ用ヘシ外ヨリ傳貼スル藥剤ニ用  
ルハ鶴ノ目ニテヨシ鷹ノ目ハセ上品鶴ノ目ハコレ  
ニ次ク○一婦人年五十許左腹ニツヨク引ハリテ左  
手ノ食指中指無名指屈メ伸ルヲ不能它医治ヲナシ  
テ不愈ゝ三年余コレニ風引湯大柴胡ノ類ヲ投メ

不愈因テチ金竜胆湯ヲ與ルト半年余ニメ全愈タリ  
又男子半足ニキツリテ時々蹠仆ス風引湯ヲ用テ寸  
功ナシ乃竜胆湯ヲ與ルト半年余ニメ全愈タリ此症  
急者治者も竜胆湯ヲ長服スヘシ

桂枝加龍骨牡蠣湯

○コレハ允ソ建中湯ノ症ニメ勤悸タカフル者ニ用  
ユ此勤ハ胸カラ腹ニアル者ナリ此症ニハ得テ遺精  
ナトカ愈テアル者も而レ反癇ニ此方ヲ用ヰハ遺精  
シ目的ニセスメ勤悸ヲ目的ニメヤルヘシカシ心下  
痞塞スル故乎多ハ遺精スル者も此方ノ症ハ俗医ノ

所謂虚分ノ癇症伝者、富貴安佚ノ人ニ多クアル者  
ニ叔心中悸煩ハ小建中ニモアレ。此方ノ心中悸煩  
ノ處へ小建中ヲ用テミルニワルフハナケレ。此効ナ  
キ者也。此症不寐徃來寒熱夜夢ミルヲ多キナトノ証  
ソフ者也。

○桂枝加竜蠅ハ今云癇症ニ多アル者ニ健忘ニテモ  
狂癇ニテモ不寐ニテモ腹中拘急メ動氣元スル者ニ  
用ヒ何ヒ小建中ノ症ニメ動悸元フル處へユク者ト  
意得ヘシ。動悸尤迄ニナキ者ハ小建中ニ  
小建中湯  
以上ニ方並  
具勞病條 心中悸而煩者

○是モ今云癇ニ多クアル者ニコレハ輕重伝テヨキ  
者カ但心中悸煩ノ症ナレハ小建中ニテヨキ者ナレ  
凡此ヲ按ヒ胸腹ニ動悸ツヨキ者ハ上ノ桂枝加竜蠅  
ノ症ニコノ動悸ノアル處へ小建中ヲ用テモ効ナキ  
故小建中ニ茯苓ヲ加テ茯苓建中湯ナトシ用テミル  
ニソレニテモオサマラヌ者也イツレコヽハ竜骨牡  
蠅テナケ子ハナラヌトシユ

○后世怔仲ト名ル者即煩悸ニ動氣ツヨケレハ怔仲  
ソフ者也又動氣アリテモ怔仲ノソワヌモアリ。怔仲  
一云心忪ニ動氣モ怔仲モ治法ハニシ小建中ヤ茯苓

甘草湯ノ類ノユクフアリ

瀉連湯 治諸氣疾衝心直視煩悶或吐血不止者方

人参 黃連各ニ分 右二味以水ニ合煮取一合加熊膽

汁名熊瀉湯

○是ハ痼症ニテ急ニトリツメシ處ニ用ル方ニ上竈直視スル者ハ參連湯良其甚キハ熊參湯シ用ム扱此參連ノ諸病ニ用ルニアナカニ心下ヲ目的トメ用ム是參連ノ正面ニニカニ心下ヘ不來者ニテモ上竈直視スル者ニ用フナタビ一タビハアルフナレ丘ソレハ信

ニ肯綮ラ得シ伝者ニアラス參連ハ何レ心下ヘコ子  
ハ用ニ又藥モト知ヘシ又心下ヘ未リテモ緩ナル者  
ハ紫胡深心ノ類ノ方ヲ用ム故ニ參連ハ何レ急劇ノ  
証ニメ心下ヘ攻メ未ルヲ目的ニメ用ル藥ト知ヘシ  
○是ハ急ニ心下ニセマリテ痞硬スルヲユハメル藥  
ニテ唯其一旦ニアルノミニテ長ク服ル藥ニ非ヌ今  
ノ俗医多急卒ノ症ニ逢ヘハ其症ヲモ審ニセスメ妄  
ニ參連ヲ投スル入多シ是固ヨリ粗妄ヨリ出ル伝ヘ  
丘亦一時流行メ慣ニナリタリ參連ハ心下ヘ迫リ痞  
硬スル者ニアラサレハ不可用者ニ參連ノ劇者ハ熊

參湯ノユク處も吐血不止者ニテモ心下へ迫リ痞硬  
セヌ處へハ不用也心下痞硬ノ症アリテ吐血シ或衄  
血スル者ニモ効アル<sup>ヘ</sup>龜井子ナトハ咳血ニ參連シ  
用テアリコレモ啖血シ目的ニメハ用ラレヌ<sup>ヘ</sup>心下  
シ目的ニメ用ヘシ此方吐血ニ能ク効アルモ心下痞  
硬ノ症アル處心下濡ナルハ三黃浮心之血ヲ多ク  
吐メ心下痞硬メオル者ハモハヤヤムヘシト思テ用  
ヘシ血未タ多ク不出メ心下痞硬ツヨキ者ハ此上ニ  
尚血ノ出ベキ者アリト心得テヤルヘシ

○急ナルニ臨テ參連湯ト吳茱萸湯トノ別ハ痞硬ノ

メ實有無ヲ以テ別んシカシ參連湯ハ大呑加吳茱萸ヨキ  
ヘ龜井ナトモ參連ニハ吳茱<sup>ヲ</sup>加用ユ又一閑齋ニ參  
連丸云者アリ即參連吳茱ノ三味も本吳茱萸湯ト參連  
湯トノ別ノ者ナリソレシツニシテ用ルハオカシ  
キヤウナレモ何カ知ラスヨク効アリ吳茱萸湯ハ水  
飲カリノ處ニヨク効アリ久テ婦人ノ積氣ニテ  
モ何ニテモムナサキヘサシコム或起暈シテノホセ  
ル云誠男子ナレハ參連ノユク處ニ婦人ナレハ參連  
湯ニ桂枝中丁子一箇ヲ加用ヘシ婦人ハ杳竄ノ藥ヲ  
好ム者ニテ右ノ加味ニテ氣モハツキリトナル者也

右ノ加味ノモトハ元末和方ニ桂枝丁子藿杏三味ノ湯方アリテ右ニ举タル症ニ用ル利氣ノ方アリニカレモ右ノ桂丁藿ノ三味ハカリニテハ心サキノサハリカ弱キ故全參連ニ桂丁ニ味ヲ加一方トナシ用ヘ娘入ノ參連ノユク處ニハ大呑藥メ右ノニ味ヲ加用ルカヨキ者也○參連湯治諸疾沖心直視煩悶或吐血不正者 人參 黃連各五分 或一錢 右ニ味以水二合煮取一合去滓服サ加熊胆亦佳余偶一方書シ閣スルニアリ故ニ参考ノタメニ此ニ举ク此方ノ主治ノ諸ノ不気ノ字ナキモノ是ナルヘシ

大黃黃連浮心湯方具癥 痘

○此主治ニアル憤厥人字ハ列子ノ字ニテ后世ニ云肝積ヘ憤ハイカルニ厥ハ上逆ヲ云俗ニ云ヘハ肝積ニテノホセル伝証シナルホト瘤症ニテノホセル者ハ此方ヤ浮心湯ナトヨキ者ニ瘤症ニテ面部時々クワツトアカクナリ或目ニブリ痛ニ耳ナト熱メナリタリ或頭痛ナトモ添其宅上衝ノ候アル者ニソコラヘハニ味ヤ三味浮心ニ辰砂ヲ加用テヨキ者ニ其童キハ加辰砂石羔ヲヤルニ是憤厥伝ニテ上逆ノハケシキ件ノ加味ノ通例ノ上逆ナレハ本方ノミニテヨ

キ者又又憤厥ニ吐歟血ヲ薦ルフアリ其片ナトハ別  
メニ味ヲ加ヘシ其片ハ辰砂ナクモ石羔ノミシ加テ  
モヨシ后吐ニ癪症ノ吐血ノ方ニ青黛ヲ用シ方多ク  
アレモ青黛ハコヽヘハアマリキカヌ者ニ上ニ云レ  
石羔辰砂ノ類ニ不如モシカニ此方ハイツレ心下痞  
按之濁カ目的ニテ右ニ書シ上逆ノ症アリシトテモ  
心下ノ患ナケレハ此方ハ用ラレヌヘ紫胡ノ類ナリ  
凡何レモ隨証ノ方ヲ用子ハナラヌ又右ノ憤厥工  
逆ノ症ニテ心下痞硬スル者ハ參連乎或三浮心ナト  
シ用子ハナラヌヘ叔癪証不治メ久シ經ル片ハ此ニ

举テアル癪癪瘻瘻ノ四症ヲ見ハス者ニ是ノ瘻弱メ  
立、又若モアリ又瘻ノカルキハ足フルフテタヂタ  
メフミシメノナキ者アリ又シビレテ覺ヘヌ者アリ  
是瘻ノ癰トテ一身力ナク分ニヤツク者モアル者ニ  
是ミナ其モトハ熱ニヨルトニユ故ニ此ニモ熱癪癪  
云タリ小兒ノ立瘻ナトモ即此癪癪ニテ其治方ハヤ  
ハリ浮心ノ類ヲ用ヘシカニ小兒ナトノ立軟ハ半  
年モ一年モユルリトヤラ子ハナラヌ者ニ不尠ハ効  
ナシ是ニテナニニ三ハ治ヲ得ルアリ小兒ノ癪ハ  
大人ニナレハ治セヌ者ニハヤク小兒ノ内ニ治スヘ

○浮心ノ類ハ心下ニカナル者ハ何ニテモ用ニ瀉  
ナレハ大黄々連浮心硬ナレハ半浮ノ類シ叔今世医  
ノ大黄黃連浮心ト三黄浮心トヲ用ル別大ソメ大黄  
黄連浮心ノユクヘキ處シニ三黄浮心ニテスマス  
シ不可從ヘ三黄浮心ニモ心氣不定ノ名ハアレ也彼  
ハ失血ニ用テ各其ユク處異アリ故ニ今世医ノ三黄  
浮心ヲ用ル处ハ呑黨ニテハ大黄々連浮心ヲ用シ朱  
砂石羔ヲ加ルモ大黄黃連浮心ノ方ヘ加ヘシ三味  
浮心ニ朱砂石羔ヲ加テハニツヨヘ右ノニ味ヲ加ル  
其証ハケシキ片鎮心ノ為ニ用シカレモ多ハ

不加メモヨキ者ヘ憤ハイカル罵詈ノ氣ナイルノ類  
今云癇症古言ヘ熱癰癇瘻瘻是風引ニ似テ其輕者ニ  
此ノ憤厥將軍湯ヨリハヨホト輕者ニ將軍湯ハ狂症  
ニ用エ大黄黃連浮心ハ未タ狂ニハ至ラヌヘ梅毒  
經久不愈者ユテ發狂スル者アルニ三黄浮心加辰砂  
三分許用テ効アリニ味浮心ニ加テモ良梅毒ニヨル  
發狂ハ三四日或四五日ノ内ニ藥應スレハ全愈ル者  
ヘ早ク功ヲ取ル者ニ癇症ノ不寐或雜病中ノ不寐  
ニ甘草浮心ノ証ヨクアル者ニ三黄浮心ヤ半夏浮心  
ノ所之モアリテ片付テハ云レ子瓦甘草浮心ハウケ

アンハイヨキ者ニ龜井ノ備考ニ不寐門ニ甘草浮心ノ一方ノミヲ舉テアルハアマリ片付スキタル者ニ黄浮心ノユク処ハ即ニ味ノ浮心シ用カ本道ニテ心下痞按之濡ナル者ニ甘草浮心ノ場ハヨワニナル者ニアリ今云虛人伝ヤウナル人ニヨク甘草浮心ノ場アル者也 痘ヤ中風ナトニテ言語ノマワラヌ者アリ此ヰハ先轉古湯ヲ用テ后証ニ隨テ方ヲ轉スヘシ而レモ大氐ハコレニテ余証モ治スル者也其方石昌蒲シ大合ヒニツ三ツ甘草シ通例ノ如クサシ入煎服ス若轉古湯ノ場ニメ心下痞硬ツヨキ者ハ半夏

浮心シ調合メ其一貼ノカサホト石菖蒲ヲ入テ二貼カケニシ一貼ガケノ水シ以テ再煎セスメ用之言語ノカナワヌ者ハ多ク心下痞硬メアル者也 按山腹東洋臓志附錄氣厥說同氣厥為病有漸者有卒者列子謂之憤厥扁鵲謂之尸厥是也晉唐以後言之者少方術泯然不可復徵也 云云列子曰枳食其皮汁已憤厥之病張湛註曰厥者氣疾也 云云歷觀東洋氣厥說中所載之証候其中有所謂癲者狂者癇者而皆總命以氣厥為是雖近古義乎況乎泛濫無定準倘至有令後人反眩惑之弊耶學者加三思

浮心湯方具失或加朱砂石羔

○此方ト上ノ方トハニ方ノ別トクト分ラヌ其内浮心ハ血分ニカ、ル処ニ用ヒニ味ノ浮心ハ気分ニアリテ血分ニカ、ラヌ処ニ用ヒ是シ以テニ方ヲ分ヘシニカレ氏今ハニ味ノ浮心ノ処モミナ三味ノ浮心ヲ用テ衆医ソレニテスマシテ居ヘ

黃連解毒湯方具丹喜笑不正者心火之盛也

○此方ハ浮心ト大黃、黃連浮心ト参考メ用ヒ子ハナラヌ藥々上ノニ方ノ証ハ主治傷寒論金匱ニアリテクワシク云テアレ氏是方ノ証ハトクトソノ証ノ明

辨ナキニ此方外臺ニアリテ主治モアリ又ソレヨリ後ノ方書ニモ此方ヲ載テ主治ナカクト丁寧ニ云テアレ氏皆但熱ノ証シ計ヘアケシ者ニテ一言以蔽之云様ナ主治ノ目的トナスヘキ証ハ云テナキヘ故ニ此方シ用ルニハ上ノニ方ノ浮心ト參攻メ其用ヘキ處ノ場合ヲ心黙メ知ルヘシ今姑ク黃連解毒ノ場合ヲ云ニ近比ニ病入アリ傷寒ニテ便血ス清水祥助ナル者浮心湯シ用テ便血治マル而メ祥助ヤハリ浮心湯シ依然トメ用居レリ余此ヲ旁観スルニ血症ハヤミテアレ氏脉數ニメ腹濡弱發班メアリ因テ意ヲ

此人腹瀉弱ナレハ続テ浮心湯ヲ用ルモ不可ニ而メ  
熱末去ハ黄連解毒ノユクナルヘシ伝タリ此症ニ  
メ脉數テモナケシハ柴胡加地黃ナトニテヨキ处ナ  
レ丘脉數ナレハ柴胡ノ加芍ナトニテモ按セヌヘ此  
ラノ場ハ黄連解毒ヲ用ルノ處也叔此ニ舉シ証ハ儒  
門夏親ニアル文ニ是モ喜笑不正ニ不限也上ノ憤厥  
ノ甚キ者ニテ浮心ナトニテ効ナキヰハ此方ヲ用ヘ  
此方ニモ重ハ石羔ヲ加フモアリ又大黃ヲ加ルノモ  
アリ又石羔大黃ト一處ニ加ルノモアルニ此方ハ何  
レ浮心劑ノ深重ナル者ニユクヘ此方ハ大黃ヲ不加

メモ浮心劑ヨリハツヨキノ血症ナトノ件ニテモ浮  
心湯ナトシ用テモ血症ナクトヤマス脉數ナル者ハ  
黄連解毒ノユク處也又喜笑ノ症ニハ浮心劑ニテハ  
甲斐ナキ者ニ此症ナレハ初カラ黄連解毒ヲ用ヘ叔  
浮心ナトニモ熱ツヨクアル者ナレ丘其熱ノ至テツ  
ヨキハ黄連解毒ニ譬ハ脉ナトニテ云ヘハ沈ニメ至  
テ數ナトナレハ黄連解毒テナケシハナラヌニ浮心  
ヲ用テハ居ラレヌヘ右ノ沉數最一段越テユケハ熱  
厥ノ處ニユクニ熱厥ニナリテハ尚更黄連解毒ニ病  
ノ大段ラ云ヘハ其間ニ柴胡ヤ石羔ニテモナク芩連

大黄ナトノユク处アル者、其处シ考合メ上ノ浮心  
ノニ方ト此方トシ参考メ用ヘシ黃連解毒ハ熱ヲ目  
的ニメ心下ハ目的ニセヌ

○此方笑ノ不正ニ用エ此等ニテ不正者ハ鹽吐ヲ行  
フヘシ笑不正者ニ外臺ニ鹽吐法アリヨキ者ニカ  
レ喜笑不正者ニテモ柴胡ノ証候アレハ柴胡ヲ用浮  
心ノ類及芩連ノユク症アレハ其方ヲ用ヒ何レ症ニ  
隨テ用ヘシ必シモ黃連解毒ニ不限ヘ而凡黃連解毒  
ノ症多クアル者、此方喜笑不正者ニハ能ク効ノア  
ル方也

將軍湯 治精神不守言語錯亂妄見妄言少卧少饑狂走不  
常者 大黄一物水煎無時服之

○此方モト江州民間ニ氣チガニ

賣藥アリ

余其傳シ受タリシニ其后中山三棟ノ病家要覽ニ此  
方アリタリ此ニ举ニ主治モ要覽ノ文く其后景岳全  
書ヤラヲ見タリシニ此方此主治與ニ举テアリ要覽  
モ彼書ナトヨリ此主治ヲ取書セレ者トニユ又方彙  
ニモ此方出テ癲狂門ニアリ而凡主治此ノ如ククワ  
ニカラス方彙ニハ壽世保元ヲ引テアリ而凡此方通  
例ノ藥ノ如ク用テハ功ナキも土茯苓大飲スル様ニ

多ク用ニ一度ニ一二升モ煎メオキテ渴ナトアル者  
ハ水ヤ湯ノカワリニ此シ用ニ此方ノ用ヲモ最初ハ  
下利スレバカワツタ者ニテナレルト下ラヌ者ニ狂  
氣ハ一日ニ十貼モ二十貼モノム程ニセ子ハ藥モ効  
ナキ者ニシカレば薬幾貼云ヘハ病家モ大ソウニ思  
テ用ニカヌル者故此方ヲ煎メオキテ湯茶ノカハリ  
ニセヨ云ヘハ病家モ左程大義ニ思ハヌ者ニ浮心湯  
ニテモ一日ニ二十貼モ用ルホトニセレナラハ此將  
軍湯ヨリハ効マサルヘキナレばモハヤキワ立ニ藥  
剤云ヘハ俗人大ソフニ思テ一日ニ二十貼モ用ル云

ノハセヌモノニシ

○狂証ニシテ黄淳心ヤ大黃連淳心ヲ用ルヨ  
リハ此方ヲ用ルカ効大ニ優也此方モ大劑ニメ不用  
ハ効ナシ此方和方子ト思ニ居リシ草書ニモ此方  
アリ凡狂氣ノ者ナラハ先此方ヲ与シハタトニサツ  
ハリト不治メモニ三日用テ居ル内ニハ其勢大ニ挫  
ケル者ニ此方藥罐ニ成ば煎シオキ朝ヨリ効マテ其  
人ノ精力ニマカセテ常ノ藥ノ重サナラハ十貼ホト  
モ用ヘシ湯ヤ藥ヲ用ル様ニシケク用子ハ効ナレ坂  
此藥ヲ用ニ趣向アリ此藥シノニ多ク用テオケハ

它ノ旁観ノ医ナトフシリ詎ムフアリテ病家モ信仰  
セヌ者之故ニ茯苓一果ナリ毎香附子一果ナリ毎丸  
ニナシソレラ一日ニ二三度モ用シムヘシ其丸薬ヲ  
重々シク説示メヨシ是病家ヤ它医ノ意シ安ンセシ  
メンタメノ方便ノ術又狂証ヲ治スルニ一術アリ  
内經ニ陽狂ニ奪食云フアリ今術ニトリテヨキ語  
狂気ハナルホト断食セシメテモヨキホトノモノヘ  
下剂ヲ用ヒハ猶減食スヘシ狂証ニ減食セシメテ大  
兼氣ニテ下メ愈フアリ是腹滿ツヨキ片ニ承氣ヲ用  
之減食セサレハ下メモアマリ効ナキ者也

○寧志膏方 辰砂五錢 人參一兩 乳香

二錢半

酸枣仁一兩 右四味煉蜜調用エ此方本草乳香ノ条下  
モ举テアリ分量モ彼ニ就テ考ヘシ寧志膏ハ陽狂  
陰狂ニ用シ陽狂ノハケシキ者ニハキカヌ且  
陰狂ニハ方少キ者故此方陰狂ノ藥トナシオキテ用  
ヘシ何し初カラ用ル藥ニアラスソレノ治シナシ  
テモ不差矣ノ尽タル件用ル藥ノ柳肝丸ノ如キモ亦  
シカリ又寧志膏ヨリ一等ツヨキ方ハ抱膽丸也抱膽  
丸本草ニモ水銀ヤラ黒錫ノ余ヤラニ出テアリシト  
覺エ抱胆丸方有速入門ニモアルも又鎮元丸ハ陽狂

中秘錄稿

ニ用ユ將軍湯ヤ淳心湯ナトシ用テモ不差者ニ用ユ  
コレモ初發カラユク者ニアラス是賀川家ニテ用ル  
方ニテ抱胆丸中ノ乳香ナキ者ニ抱胆丸ハ初カラニ  
テモ將軍湯ナトシ用ヘキ勢モナキ陰狂タチノ者ニ  
用ユ癲癇ニモ用テアレ丘癲癇ニハ効ナレ寧志ト抱  
胆トハ輕重ニテ分ツヘシ寧志ハカロク抱胆ハ才モ  
レ抱胆丸ノ製ニ様ハ鉛ヲ沸水銀ヲ入レカキマセテ  
火ヲ下し冷し而メ藥研ニテオロシアトヨリ乳香辰  
砂ヲ入レルナレ丸ニナリ難キモハ草藥本草  
○治產后發狂方 虎骨 血謁 犀角 各ニ分 麻葉

六七月采收 右毎服五分用大參二服而愈亦傷寒發  
為霜二分 狂腹不拘急者亦効 此方京橋瓜順治ノ方ニテ余モ  
用玉產后發狂ニ此方シ兼用ニスルも將軍湯ヤ淳心  
湯ナト其他隨症ノ方ニ煎用スヘシ

○医說卷五引医餘云病者不可補者一曰瘧疾二曰狂  
疾三曰水氣四曰脚氣此四疾治得稍愈切不可服暖藥  
以峻補之如平々補藥無須於本病工有益乃可

白虎湯 煩渴者 或加參連

○是シ癲証ニ用ルハ煩渴カ目的也此脈ハ長洪而大  
脉フトクメタツフリトアルモノも又面色コゲテ

脊骨ノ痛ト此方ノ証ニ多クソフ者ヘスヘテ石羔ノ  
ユク癇ハ脊骨多ク痛者ヘソレニシテ心下痞硬スル  
者ハ參連白虎ヘ參連白虎ハ華方ニハナシ和方ヘ山  
胫子盛ニ用タリ此方必竟參連ト白虎ノ合方ヘ叔石  
羔ノユクヘキ癇ハ脊骨痛ムト云ヘハトテ上ノ浮心  
ナトノ處ニテ石羔ヲ加ルハ脊骨痛ムニ用ル伝ニア  
ラス是ハ但白虎ノユクヘキ癇ニテ云トシ又此處ニ  
テモ脊骨痛テ目的ニメ用ル伝ニアラスソレニハ必  
シモ不拘也若白虎ノ証ニメ脊骨痛者ハ益白虎ヲ用  
テヨキフラ云斗ノツモ又吉益家ニ石羔黃連甘草湯

伝方アリ此方山服ニテ參連白虎ヲ用ル處ヘヤルニ  
同場處ヘ按ニ石羔黃連甘草湯ハ本夏方ノ鵝石散ニ  
ヨリテ製セニ方トニユ<sub>本夏方卷九傷寒時疫下云治</sub><sub>傷寒發狂或棄衣奔走踰牆上</sub>  
<sub>屋鵝石散</sub><sub>黃連</sub>寒水石<sub>六</sub>右細末毎服ニ曳濃煎  
甘草湯放冷調服

○是ハ瘧癥モナク煩渴スル者ニ用エタトニ煩渴メ  
モ癱瘓スル者ハ風引ノユク处ヘ癱瘓ヘハ白虎ハ風  
引ホトニハキカヌ者ニ又心下アニクメ渴スル者ハ  
大黃黃連浮心加石羔湯主之瘡硬メ渴スル者ハ參連  
白虎ノ所之也

風引湯 除熱癱瘓

大黄 乾姜 竜骨各四 桂枝三兩 甘草 牡蠣各二

兩 各六 三升煮三沸温服

治大人風引ウ小驚癇瘓癱日數  
發医所不療除熱方

寒水石 滑石 赤石脂 白石脂 紫石英

石膏

兩

右十二味

杵廉節以韋囊盛之取三指撮井

花水三升煮三沸温服

治大人風引ウ小驚癇瘓癱日數  
發医所不療除熱方

○此方冗長ニメ人ノ試効ヲキカ子ハナカく用テ

又方レ此方ヲ本邦ニテ試ミシハ奥村子レ此方用テ  
ミシハケシカラヌマウキノ方ニテ它ニカユヘキ方  
ナキニ西土ニテモ此方ヲ互ニ相唱和メ用タリシト  
ミヘテ外臺ニモ此類方多メアリテ僅ニ三味ノ異ナル  
方多々アリ奥村子スヘテ治術ニキツフ意ヲ用

人ニテ遠キ藥ノ人ノ試ミサル方ヲヨク用試ミシ人  
ニ候氏黒散ナト迄モ此人ハ試ミシ人ノ叔此風引ニ  
治驗イロくアリテ沉痼痼疾モ愈ニアレ此症ノ  
第一ハ瘦癰シ主トス瘦癰アル者ナレハ約束ノ通ニ  
キク者也此シ癰瘤或脚氣ナトニ用テミルニ効ナレ  
此ノ主治ニ癰瘤トアレ此瘤難治ノ者乎キカヌ  
シ反テ方后ニアル瘦癰云处へハ寔ニ此ニ云テアル  
通ノ効アル也此方ヲ用ル件ハワケテ藥品ヲ吟味ス  
ヘシ此方振出シノ様ニメ用テアレ此コシニテハキ  
カヌも又三指撮トアレ此コレニテハ藥アマリニス

クナキシ今此ヲ用ルニハ大合しミツヲ一貼トメ  
ソレニ水一合半入一合ニ煮取テ用ヘシ原方ノ煎シ  
様テハ効ナシ此方驚風ナトニハ子際ナル者ニ它医  
ノ参連白虎ナトシ用テ居ル處ヘナト此方ヲ用レハ  
気味ヨク効アル者も此方ハ京師ニテ田中翁始テ用  
テ効アリシニヨリ京師医此方ヲ傳授セシフシ希フ  
テ其時余カ徒ニマテ它医ヨリ尋子未リタリコレヨ  
リメ京ノ医モハシメテ此方ヲ用テ其効アルヲシ知  
テ世ニモテハヤスニ至ル此方治驗多キナカニ徃年  
ウツヂサ氏秦ニ一病人アリ癇ニテ四肢フルニ毛毛子牽引ハ

ケシク其脉ヲ候ニ中ニモ毛子ノニキツケハケシク  
メビクツク故脉ヲ診スル件ハ両人ニ其腕ヲ捉ヘサ  
セテオカ子ハナラヌ程ノツヨキニキツケニテ數年  
不愈三角良察子ヨレニ柳肝散加木瓜ヲ子テ長服セ  
シメニカ瓦効ナシ余乃コレニ与ルニ風引湯シ以テ  
スルニ十日許ニメ其症大ニユルニテ四十日許ニメ  
全愈メリ此件ナトハワケテ午際ナルヲナリケル此  
風引ノ處ハ一通リノ古方家ハ参連白虎マ浮心ヲ用  
又后世家ハ抑肝散ヲ用テ何レモ一年モ三年モヒツ  
ハル處ニ扱此方預メ急變ニ備シタメニ薦テ製シ才

カントスルニハ桂枝干姜大黃ノ三品ヲハブキ其它  
ノ藥ハミナク粗末ニナシ才キ其用ル片ニアタリテ  
右ノ粗末ニ入オキタル藥一劑分ナラハ桂枝干姜大  
黃ノ三味モ一剤分粗末ニナシ總味合メヨリく雜合  
セ煎服スルシ桂枝干姜大黃ノ三品ハ氣ノウスクナ  
リ易キ藥故預メ石羔ノ如キ石藥類ト一處ニ合製メ  
オカレヌ故コレタケノ三黃省キテ入用ノ片ニ當リ  
テ入ル又臨時此方ヲ用ル片ニ當テ制スルニハ總  
藥ミナク糊末ニナシ法ノ如ク用ルシ東洋ナトハ風  
引ノ處ヘハ參連白虎ヲノミ用タリ伝而レ云此處ハ

參連白虎ニテハキカヌモノも

防己地黃湯

治病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脈浮

防己一錢

桂枝二錢

防風三錢

甘草一錢

右四味以酒一盃浸之一宿絞取汁生地黃二斤㕮咀蒸之

如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黃汁和分再服

○此ハ發狂ノ脈浮ナル者ニ用ユ叔此方モトノ通り  
ニメハ煎法殊ノ外ムツカシ今此ヲ用ルニハ四味ヲ  
サツト酒製ニメ通例ノ藥ノ如ク煎メ其上ヘ地黃汁  
ヲ加用キ藥汁一合ナラハ地黃汁モ一合入レルニ即  
等分ニスルベ此ノ藥味ヲ酒製ニスルハ綿密ニスル

卷十一  
自左卷十一  
ニ不及々四味ノ藥シ調合シ土器ニ入レソレニ酒ヲ  
ウチ火ニカケ酒ノカハクシ以テ度トメ水煎メ煎ニ  
アカリテ地黃汁シ入レ服スルヘ此ニ無寒熱伝シ、  
狂状獨語脉浮ノ傷寒ナトニ似タルヲ以テ此症ノ傷  
寒ノ類ニアラサルヲ示セシ者ニ其実ハ寒熱アリテ  
モコレシ用シ

○此方將軍湯ナトヨリハ其症緩ナル者ニ此方ヲ用  
ニ格別急度ニタル規則ハナケレ瓦方中ニ桂枝ナト  
アリテアリテ主治モ脉浮トアル故脉浮ニメ其証ノ不  
劇處ヘ用シ后世ニテ沉香天麻湯ヲ用處ニ此方ヲ用シ

甘麥大枣湯 婦人藏躁喜悲傷欲器象如神靈所作數欠伸

甘草六分 小麥二錢 大枣二分

右三味以水一合ニ勺煮取六勺溫服

○是方男子ニモタマく用レハ專婦人ノ癥症ニ用エ  
意ボソガリテ偶ヘ這入テ泣テ居ハナト云ニ用ユ其  
内此方甘味ヲ嗜ム者ニ尤ヨキナリ亞マキ物シ用レ  
ハ腹ノユルム伝ニ用レハ殊ニヨキ者ニ此症ハ腹ノ  
ヒツハリ多クアル者ニシカシヒツハリシ目的ニセ  
ヌニ悲傷ノ証アレハソレシ目的ニ用ユ或人ノ傳  
此方ヲ用ルニハ右ノ腹ニヒツハリアルヲ目的ニメ

用ヘレ伝ヘリシカレ凡是一槩ノ論ナルヘント思フ  
く又此方悲傷ナシメモ但教欠スル者ニ用テ効アリ  
是亦屢功驗シ經タルトく人ニヨリテ教欠スル者ア  
ル者ニコレハ積氣ナトニヨリテスル者乎

○藏躁悲傷メモ柴胡ノ腹候アラハヤハリ柴胡ヲ用  
ルカヨキノ悲傷ノ証テモ柴胡ノ腹候アレハ柴胡ヲ  
用テ効アル者ニ其處ヘ悲傷ヲ目的ニメ甘麦大枣ヲ  
用テ見テモ効ナキ者ニ一婦人アリ悲傷ヲナス柴胡  
ノ腹ニシカニ悲傷シ以テ故ニ余甘麦大枣ヲ用シニ  
古來効ナシ因テ腹候ヲ以テスルニ柴胡竜虯ノ症ナレハ

即其方ヲ用シニ悲傷遂ニ愈タリ○此方硝石大圓ナ  
トシ煎用スルコアリ或經閑ナトアル片煎用ルニ又  
婦人喜笑者アリ甘麦大枣ヲ用テ効アルヘント思ハ  
ルナレ凡未試儒門夏親ニ黃連解毒ヲ用テアリコレ  
ハ能ク効アル者ニ喜笑ノ右ニ凝リハケシキ者此方  
ヨカルヘレ心下ニセマル者ハ黃連解毒ニ心下ニモ  
右ニモ凝リナキ者モ黃連解毒シイツレ黃連解毒ヨ  
キ者ニ所云心火ノ所為トニユ男女凡ニ治法ハ同シ  
ニカニ此証婦人ニ多アル者ニ此ハ辛才キテモ狂シ  
發スル伝トハナキ者ニ又傷寒中ニヒタモノ笑者ア

リ惡候ヘ必証云ニアラサレ仄重キ証ヘ叔此方藏躁

ノ症アリテ右股下脇旁ノ辺ニ拘挛ヤ塊結ノアル处  
ヘヤルト効アル者ニ毒ヤ帯下ニテ塊アル者ニテモ  
効アルヘモアルハ其症アルヰハ柴胡劑ニテモ効  
アリ是亦一傳ヘ此方金匱ニテモ辨シタレハ猶彼ニ

就テ参考スヘシ

瓜蒂散

方具傷食条

狂癇癲疾可數吐之 法曰癲癇一月四五發

易治一月一發次之一歲一發難治張子和曰癲疾不至於  
目瞪如愚者愈既至於目瞪如愚者不可愈又曰風搐病目  
眩角弓反張發則手足顫掉不能持物疑日不食々則令人

下眼一作瞼

代嘔口眼張眼唇口嚼爛抖撮之狀如線張傀儡夜卧發熱  
衣被尽去遍身燥痒中熱而反外寒胸中有留飲之所以致也  
法當吐之藜蘆瓜蒂散主之

藜蘆瓜蒂散方見儒門復親

○嘔菴曰服吐方既吐之時直視搖搦之候見者直可止其吐

○此ハ發狂ノツヨキニハナケ子ハナラヌ藥ノ將軍  
湯ナトノ一段ツヨキ处ヘユクヘ此方ヨキ云フハキ  
ハ其証ノ發メ居井用ヘ癲疾ニハ此方ヨキ云フハキ  
テ居レ丘用試ミルノモナク入ノ用シモ未タ親  
ク見及ハサルヘ此ノ法曰云云ノ語ナルホト此通り  
く癲癇ハチヨツクト發ルハ易証ヘ發ル間ノ遠キハ

難症へ瘧ト同理へ又此ニアル目瞪如愚ハ今ノ俗間ニ云處ノ癲癩ノ癲ニアラス此症今ノ所謂癪症へ方書ニハ癲癩ノ別トクト不分メ混ニアル者往々アリ意ヲ注クヘシ此ラモ亦然リナルホト病症ニハ目瞪如愚ノ症アル者ニテ此症ハ治セヌ者ニ又癪症ニテ遺矢遺尿ナトスル者ニコレラモ難治ノ者ニ

○癲癩諸藥無効者ハ其安靜ナル件吐剤ヲ用ヘ鵝胡菜ナトシ用テ後ニアル者ニ癲癩ニ吐剤ヲ用ルハ別痰涎ナトシ目的ニセヌヘ 田中翁云癲癩ハ三聖散佳ヘ 凡癲癩ノ發テアル者ニハ藥ハ用ニ不及者

ヘ癲癩シ治スル藥剤ハ平生ニ用ヘ發リシ件ニ用テモ役ニタ、又者ニ

○癲癩ハ昏絕ノ件ニテモ其脈平ナル者ニ是ヲ其徵

トス

○是ハ黃連解毒シ用ル前ニ此ニテ吐カメオキテ黃連解毒シ用ヘシ又夏ニヨルト黃連解毒シ用テモ効ナクヨイ様テモサツハリナラヌハ是ヲ用テ吐メ再黃連解毒シ用ルフモアルヘ此方ハ喜突斗リヘ發

鹽湯方具傷食余

子和曰喜突不止者當以鹽湯湧之内經曰神有餘者穴不休

○是ハ黃連解毒シ用ル前ニ此ニテ吐カメオキテ黃連解毒シ用ヘシ又夏ニヨルト黃連解毒シ用テモ効ナクヨイ様テモサツハリナラヌハ是ヲ用テ吐メ再黃連解毒シ用ルフモアルヘ此方ハ喜突斗リヘ發

狂ナレハ瓜蒂も喜笑ハ発狂ノ輕者ヘ喜笑ノ証ヲ鹽

湯ニテ吐カスフ外臺ニアリテコレガモトヘ

鷓胡菜湯方具  
要条煎施紫丸可也

○是ハ癲癩ニ用ユ大人小兒ニ不限蛇虫ニヨル癲癩ニ用ヘ小兒ニハ此方ニ紫丸シ煎用スルヘワケテ小兒ニ此症多キ者ヘナカ以内ノ者ハ大氏コレニテ治ス且小兒ノ癲癩ハ蛇虫ニヨル者多キ者ヘ大人ノ癲癩ハ此方ニテモ治セヌ者ヘ大人ノ癲癩鷄胡菜ニテ治セシヲ只一人見タリ扱コレシ癲癩ニ用ニ月ノ十四日ニ此方ヲ三貼用ユ其用法昼ニ貼夜一貼用テ十

五日ノ朝ニ紫丸ヲ三分一度ニ用ヘ如此スルフ四五  
月スレハ治スル者ヘコシニテ小兒ノ癲癩ハ多ハナ  
オル者ヘ重ハ如此スルフ一年モスヘシ何レモ其間  
ハ藥ヲヤメテ但十四日ニ用ルノミ是此方ヲ癲癩  
ニ用ルノ傳來ヘヨラ十四日ニ限リテ此藥ヲ用ル伝  
ハ必トセヌナレハ云コレハ唯始終ツトメテ藥ヲ用  
テ火急ニヤリテモキカヌ者故ヨラ限リテ緩々ニ其  
毒ヲ取ル趣向トミユ其寔ハ十四日ニテモ十五日ニ  
テモヨキヲナリナルホトコレラノ証ハ急ニ治セン  
ト欲メ藥ヲ始終タテカケテ用テモソレニテ急ニ治

鵝胡湯ニ起廢丸  
トシ魚用スレハ  
穢物ヤ蛇虫ソ下  
シユルモノ此  
ノ如キモノ不下  
サハ難治人

セヌ者又大人ノ蛇虫ニヨル癲癩ハ鵝胡菜湯ニ起  
廢丸シ薦用スル又大人ニ用ルハ十四日ニ不限始終  
平常ノ藥ヲ股スル如ク毎日鵝胡菜湯ニ起廢丸シ薦  
用メユク又此ヘノ癲癩鵝胡湯ニ繫丸起廢丸ヲ用ル  
ハモト和方ニ此傳方アリ其湯方ハ鵝胡菜蓬根虎安  
シセテ股スル藥アリ其方在篋中其處ハ余黨ハ常ノ  
鵝胡菜湯ニテオスニ紫丸ヲ用ル處モモトノ傳來ハ  
丸方別ニ一方立テアリ其方巴豆辰砂乳香ノ類外ニ  
三味許クニ合せし丸方アリ其處シ今紫丸ヲ用ベ山

股ナトニテモ此處シ紫丸ニテオス伝起廢丸ヲ用ル  
处モモトノ傳來ハ別ニ一方ノ丸薬アリ其方生漆反  
鼻ノニ薬ノ丸薬ニ此處ノ起廢丸ニテオスニ蝮蛇  
起廢丸ナレハ益ヨキニ右ノ傳来ノ方ハモト俗方ニ  
又癰癩ノ一方アリ其方生反鼻シ黒焼ニナレ生漆ニ  
テ子リ丸トシ用ル方アリ其方在篋中生漆ハ別ニ分  
量ナシ只反鼻ノ丸スヘキ程ニナルシ度トスルニ反  
鼻ハ生活ノ物ヲ用ヘ不然ハ無効云此丸シ通例ノ丸  
薬ニ三丸ノ大サニメ此シ一日ニ一分或ニ分ヲ用モ  
佳也此方三角家ノ方ニテコレニツキタル湯方別ニ

一方アリシカレ丘余ハ隨症ノ方ヲ用テソレニ紫丸ヲ兼用スルベ此方瘀血ヤ蛇虫ニヨリテナス癰瘍ニハ殊ニヨカルヘシ此即蝮蛇起瘻丸也

○凡大人小兒丘ニ癰瘍ハ多虫ニヨル者也故ニ虫ノ候アル者ニ假令虫ノ候ナク丘ムサト用テミルヲアリ癰瘍ニ鵝胡菜ヲ用レフ別ニ一奇方アリテ艾ヤ虎肉鵝胡ナトノ入リシ方ニ不立メ常ノ鵝胡湯ニテオスハ右ノ処ヲ別ニ方シ不立メ常ノ鵝胡湯ニテオスハ又右ノ奇方ニ附タル丸藥アリコレモ余ハ紫丸ニテオスハ鵝胡湯ニ紫丸ヲ兼用スルベ若下サレヌ者ハ

蝮蛇起瘻丸ヲ兼用スルも蝮蛇起瘻ハ癰瘍ニ具ヘシ方ニ又癰瘍毒ニヨル者アリソレニハ輕粉丸消鎔丸ノ類シ用ユ其内消鎔丸最ヨシ消鎔ハ毎日二分或弊ツヨキ者ハ三分モ用ユ其上用テ眼眩ノアシキ者ハ此ホニ消鎔ヲ用ルハ腹候ニテ毒ノ有無ヲ窺ヒ用ヘシ○凡癰瘍ニ其治ヲ施メ果メ治センヤ否シ知ルニハ蒟蒻ヲ食ワシメテ試ムヘシ蒟蒻ヲ食フテ發スル者ハ未タ根治セヌ者ニ后前方ヲ法ノ如ク用ヘシ○癰瘍ハ下スニシクハナシ丘巴豆剤ヲ用テ下スシ云

桃核承気湯

方具經

如狂小腹急結者

○此ハ瘀血ノ發狂ニ用ヘ常ノ癪ニアラサルヘ其狂  
ノ瘀血タル所以シサカスハ此ニ云ヘルシ腹急結ナ  
トノ如キ腹候ヲ考テ頃入ナラハ經夏シタツ子男子  
ナラハ血毒或お撰ナトヨリメ内ニ血シ貯テタマク  
狂シナス者アリ此ノ重ハ抵當湯ヘ抵當ノ輕キハ抵  
當丸シ用フアリ又或本方ハ柴胡ナトシ用テ魚用ニ  
破血ノ丸抵當丸ナトノ類シ魚用スルヲアリ本方ニ  
柴胡シ用ルハ柴胡ノ症アル者ニ此子段シナスニ又  
此發狂ニ吐血ナトシ魚ルヲアリ其汗ハ腹ニ瘀血ア  
リテモ三黃浮心ヲ用子ハナラヌエ先此桃核承氣ト

抵當ノニ方ニテ狂癇ノ瘀血ニヨリテ末ル者アルト  
分ルヘ其外ハコレカラ擴充メ療理スルナリ  
○桃核承氣抵當ノ証狂癇ニマ、アル者ヘ男女凡ニ  
アル者ヘ此方ユクヘキ狂症ハマタ前ノ將軍湯ノス  
ゲト大ニ異ヘ不可不辨ヘ此ニ方ノ症健忘ニモアレ  
氏發狂ニハセ多シ腹候ヲ審ニメ新癇シ辨ス右ノニ  
方シ用分ツヘシ桃核承氣ト抵當トノ別ハ輕重ノ分  
ヘ抵當ハ少腹硬滿ヘ桃核承氣ハ硬滿ニハ不至也  
抵當湯方具經發狂小腹硬滿小便自利者

●前条ニ辨ス

梔子豉湯方具心痛條虛煩不得眠

○コレヨリ以下三方ハニナ不寐ヲ主トスル藥々凡  
不寐ノ証ニモイロくアルヘキフナレ凡此シ証ニ  
心勞心配ラスル人ニ不寐ノ症多キ者ニテ滯リナキ  
人ニハ不寐ハツナキ者也故ニ一本堂ナトニテモ不  
寐ハ別ニ門シ立ハハ非ニ病中ノ一曲症ナリ伝テア  
リナルホトセナルノレソ三方ノ内ニテ梔子豉湯ハ  
懊憹伝テイカフ胸中ヲワルカリテ不寐スルニ用エ  
コレ其証ノハケシキ者也又酸枣仁湯ハ奔氣在胸中  
云云力主ニテ動氣アリテ此シ按ニ外ヘモ心ニ自身

ニモサツタニテシツトメ居ラレヌ伝者也是即今ノ  
所云痼也此ノ酸枣仁湯ニ虚勞トアレ丘ソレニ不拘  
も金匱ノ酸枣仁湯ノ不寐ハ虛勞不寐ニテ痼ノ不寐  
ハ用ニハ足リ若キ方ニ故ニ千金ノ酸枣仁湯ナトニハ  
石黑ナト入テアレ丘金匱ノ方ニハナシ金匱ノ酸枣  
仁湯ハ痼ノ不寐ナトニハ無効者也千金ノ方ハ効有入  
○酸枣仁湯ハ虛勞ニ限ラス虛煩不得眠者ナレハ用  
ヘ后世ノ白脾湯ヤ流水湯ナトハミナ此方ヨリ出々  
リ此方金匱ニアル方ハアマリ効ナシ千金ノ方ハヨ  
キヘチ金ノ方ニハ石黑入テアリ允テ沉墜ノ者ニハ

石羔ヨキ々凡不寐ノ証ハ今云癪症ニテ多ハ心下へ  
迫リ末ル者ニアリ故ニ石羔ナトノ沉墜ノ者入テア  
リテヨキ々又酸枣湯ノユク不寐ハ柴胡姜桂ノ如ク  
微結アリテ小サキ勤悸アル者ニ又不寐ニテモ心下  
痞硬ノアル者ハ羊浮ヤ甘浮ヲ用シ不寐ニ浮心ノユ  
クフハ多クアル者

子金酸枣湯 治虚勞煩擾奔氣在胸中不得眠方

酸枣仁 入參 桂心 生姜 石羔 茯苓 知母

甘草 右八味水煎服

○前条ニ於テ辨シタリ

流水湯方具勞病條 从賓曰久病不寐者神効世医鮮用之

○从賓ノ主治バツトレタル者ナレモ大抵如此者故  
ニ此ニ从賓ノ主治ヲ举タリ此流水湯ノ方ハ外臺ニ  
アリ此方虛勞ノ不寐ニ不限シ故ニ从賓モ久病云云  
ト云ニ子シカシ久病云モアマリバツトレタル者ヘ  
何レ虛勞虛煩ノ義シクミテ用ヘシ此方金匱ノ酸枣  
仁湯ト近シメ其輕者ヘキツフ津液ノ枯燥セシ者ナ  
ラハ金匱酸枣仁湯ノユク處ヘ扳此ニ举レ以上ノ三  
方ハ不寐ノ方故此ニ並ヘ举シカル今治術ニ取テハ  
不寐ノ藥ニアラスメ不寐ヲ治スルヲ多シ今テ不寐云

柴胡浮心ノ類ノ証多アリテソレラノ方ニテ効シウルヲ反テ多クアル者也

○金匱ノ酸枣湯ハ虛勞中ノ不寐ニヨキヘチ金ノ酸  
麥湯ハ虛勞中ノ不寐ニハヤリニクキヘ虛勞中ニテ  
酸枣仁湯ノユク塲ハ多ハ下利ナトモアリイカフ腹  
氣モ濡弱ニテ石羔ナトシヤルト下利モマス伝程ノ  
處故チ金ノ方ハ用ニクキヘ酸枣仁湯ト飯脾湯トハ  
大ニ近キ者也飯脾湯モ虛勞ニモ癪症ニモ用ヘ酸枣  
仁湯ノバニハ多ハ胸腹ノ動モアル者也ニカニ其動  
ハゲニカラヌ者也右不寐ニテモ胸腹動悸ハケニキ

片ハ柴胡姜桂ヤ茯苓甘草湯ノ類ヲ用テ先動悸ヲユ  
ルメ子ハナラヌ者也又不寐ニハ全体三浮心ト柴胡  
ノ証多クアル者也酸枣湯ノ証ハ反テツキ者也亦其  
効モ柴胡ヤ浮心ナトノ如速カナラヌ者也又今ノ世  
上ノ不寐ノ証シミルモ多ハ癪家ニアリ是思慮ナト  
高ブル故トニユ不寐久ヲ經シハ狂シ發ル者也忽諸  
スルヲナカレ發狂セントスル入其狂ヲ發ル前ニハ  
必不寐ヲ出ス者也ニカニサニテモ眠ヒハヨキ者也  
其ニ發狂スル不寐ハ五六日モ一瞬モ眠リ卫ヌ者也  
其場ニ至レハ煩躁ナトモアル者也叔不寐ニモイロ

く其筋分ルヘ先紫胡ニテ云ハ、大小ノ紫胡紫胡姜  
桂柴胡竜蠅ノ類シ同ク紫胡ノ劑ナレ凡不寐ニハ紫  
胡桂枝ノ証カウナキ者ヘ又三浮心ノユクスチアリ  
其内甘草浮心ノ証を多シ酸枣湯飯脾湯流水湯ハ一  
ユク不寐アリ石羔ノユク筋ノ不寐アリ又施子豉湯ノ  
類ノ者ヘ又石羔ノユク筋ノ不寐アリ又施子豉湯  
証ニメ不寐スル者ヲ云ヘ又酸枣仁湯ヲ病者ニヨリ  
テ服シ得ヌ者アリ其件ナト流水湯ヲ用フアリ又此  
方弱ニナル者モアレライ藥ヘ流水湯ハ但ユルメル  
者トミユルヘコレハヤハリ流水ニテ煎カヨキヘ

帰脾湯

明薛己  
十六種

治健忘怔忡驚悸不寐等

黃芪

人参

白朮

茯苓

酸枣仁

炒

竜眼

各五

當歸

遠志

各二  
分半

甘草

炙

木香

各二  
分

姜枣水煎

○加柴胡施子仁名加味帰脾湯前証煎熱者用之○按濟生本方無當歸遠志

○是ハ此ニ舉テアル症ノ一症ツ、見ハシタルニモ用ヒ又數証シ相應シニモ用ヘ此方モヒツクルメテ云ヘハ癪ニ屬シ又后世ニテ云ヘハ虛勞ノ者ニ用ル方ニテ寔証ノ者ニアラサルヘコ、ハ半浮テモナク柴胡テモナク別ニ飯脾湯ノ方ノ証アル者ヘ其處ハ

此方シ用レハチギワニヨクキク者ニ后世此方シ伍  
レ入モ別ハ此方ノユク症一道アルヲ合点メ此方  
シ制セシ者トニユシカルニ今テノ后世家ハ半浮ヤ柴  
胡ナトノユクヘキ健忘怔忡ニテモ察メ此方シ用ル  
故ツイニ此方効ナキニ能ク其處シ得レハ大ニ効ア  
ル方ニ后世ノ方ニテモコレラノ方ハ殊ニヨク出来  
タル方ニ此ノ饭脾湯ノ健忘怔忡驚悸不寐ノ症柴胡  
ナトヘ近シメ殊ニ不大便ナトアル者ハ大柴胡シ用  
テミルニ大便ハ通メモ其人反テ心持アシカル者ニ  
ソレラノ处ニテモ此饭脾湯シ用レハ自然ニ大便モ  
當

通メ病人モ心ヨカリ病患モイユル者ニカワツタ者  
ニ此饭脾ノ証老境ニ多クアル者ニ強壯ノ入ハアマ  
リナキ者ニ饭脾湯當饭遠志シ入ル者ヨシ又此方ノ  
証ニモマンサラ熱ナキニモアラ子丘熱ツヨキ片ハ  
柴胡山梔ヲ加ル

○此方ノユク健忘ハ瘀血ニモヨラス又柴胡浮心石  
羔ナトノ症モナキ者ニ老人中風下地ヲナス片多ク  
健忘シナス者ニ其處ニ此方効アリ老境ノ健忘ハヨ  
ク効アル方ニ其症譬ハ自己ノ近キ旁ニアル火盆シ  
此ヘ持奉レト人ニ命セントメモ其火盆ノ名ヲワス

レ或親戚朋友ト姓名ヲ忘却シナトスルヲ老境ニ多  
クアル者ニ壯年ノ人ノ健忘ニハ桃核承氣ナトノユ  
クフモアレ凡老人ニハ逐血ノ劑ノ薬ノユクフナキ者ニ  
又壯年ノ人ニモ帰脾湯ノユク處モアルニ飯脾ノユ  
ク處ハ多ハ面ナトツヤクシ或半身不遂ナトモアル  
者ニシカレ右ノ証ハ飯脾ノ主証云ニアラス此場ハ  
多ク世人ハ中風云ル者ニ飯脾ハ強テ老壯ヲ論ニア  
ラス健忘ノ攻ヘキ証ノナキ處ニ用ニ右ノ証ハ多ク  
上逆ノ候アル者故柴胡山梔ノ類ヲ加ルカヨキ者ニ  
飯脾ノ場シツメテ云ハ、三黃浮心大黃連浮心

或痞硬ニテモアラハ半夏厚朴心ノ類ニテ按メユケ凡  
此場ニハ右ノ方ナトハキ、ノヌルキ者ニ筋ノ違フ  
故トニユ世医又飯脾湯ノ處ヘ右ノ浮心ナトシヤリ  
テ難治云テスマニテカル者多アリ○飯脾此症俗ニ  
云ヘハヨハリシ癥症ヘコレニ動悸ツヨキ片ハ竜蠅  
ノニ味シ加用ルノモアルも○健忘ハ癥ニ屬スル者  
モアレ凡多ハ瘀血ニヨル千金ノ茯苓杏仁甘草湯ナ  
ト効アリ后世家ニテハ飯脾湯ヲ用ニ効アリシカレ  
コレハ老ニヨリテ未ハ者ニ多ハ中風ニナリクチニ  
モヤルニ○帰脾湯ハ健忘ノ証ニテ譬ハ老人ニテ入

来リテ其名シ召ントメモ忘レテ不能言物アリテ其名ラ云ントメモ忘テ云フ不能ソレニ属シタ証カ裏寒ノ様ニミエテ顔色ツヤくし或モ強リ或不能言メウカクスル者ヘ此場ハ外ニ用ヘキ方ノナキ者ヘコレハ壯年ノ者ニハツキ者ヘ又陽症ニテ瘀血ニヨル者ハ桃核承氣ナトヲ用ヘ又壯年ノ人ニテモ攻撃スヘキ勢ノナキ者ハヤハリ此方シヤルヘ又此症劇キ者ハ手足不遂ヤ半身不遂ナトスルニ及フ者ヘ又口舌ノ大ニ強ル者ハ轉舌湯ヲヤリテ后此方ヲ用ヘ

滾痰丸

○此丸ハ飯脾湯ノ証ニメ寔スル者ニ用ヒ或癇症ニメ痰ノ多キ者ニモ用エ叔滾痰丸ノ痰ナケレハ不用藥ノ様ニ思フ人モアレ凡不尔ヘ前ノ飯脾湯ノ健忘怔忡驚悸不寐ノ証ナレハ痰ナクメモ此丸シ用ヘ或饭脾湯ニ此丸シ兼用スルヲモアルヘ

○此方癇健忘驚悸ニヒロク用ヘ癲狂ニハサニ達ヘ不寐ニハ施子豉ナトノ处ヘモ兼用スルヘ痰寔胸滿或不大便ニ用ユ何レニロク用ヘ或浮心ヤ柴胡白虎，處ヘモ兼用スルヘ

柳公丸

以上二方並  
在別集

○コレ外臺ノ方ニテ氣チガヒノ藥シカ丘外臺ニ  
ハ重キ處ニ用テアリ藥ハ輕々ノ方ナレ丘症ハ重レ  
此名ハ何人ノツケシ方名乎柳公丸ノ名ハ本邦ニテ  
ツケタル名トミユ入門ニモ此方出テ軍告參丸伝テ  
アリ又此方肥前疮ノ汙下ヲ經テ不愈者ニ用エ汙下  
トハ薄萍湯ヤ敗毒解毒ノ剂ノ如者シ云々又此方ソ  
レシハナレテ乾癥コセカラニ用ユコセカサハ外ニ藥ノナキ  
者ニ它ノ藥ニテハドウメニテモ治セヌ者ニシカシ  
痴瘡ニ此ソ用ニハ但苦辛一味ヲ常ノ藥ノカサ一貼  
ホトシ濃煎ニメ用テコレニテ吐湯スルカヨシ一吐

ニテダシシト治スル者ニ苦辛シ吐劑ニメ用ル片ハ  
毎日常ノ藥ノ如ニ用ニ非ス先一吐メアトハ不用ヘ  
吐劑シ合点スル病人ナラハ此ニテ吐スルカ最ヨシ  
若吐シ不肯者ハ右ノ柳公丸ヲ長服サセルニ本草ニ  
苦辛荆芥ニ味ノ丸アリテ痴瘡ニ用テアリ此モヨカ  
ルヘキ方ナレ丘多方シ制メハアマリ煩シキ故ニ此  
柳公丸ニテオスヘ

○瘡ノヒキツケル者ハ況杳天麻湯効アリ伝

○瘡ニテ脚ノヒキツケル者芍藥甘草湯ノ之ク所有

○治癲癇方 紫河車一具燒黑メ此シ七日ノ内ニ白湯ニテ送下ス

○一方 治肝積小豆激怒方 山錫杖大及鼻 中

右ニ味水煎服○此方和方ヘ余未タ親ニク試サレ庄効アリ云肝積ニテソレニ豆ニモ腹立怒ル者ニ用ニ

○奥道逸子云山錫杖一名ヤマトウガラシツラアケビ庄云々漢名ナレヤハリ御風草ノ類ニ御風草ハ本草天麻ノ條下ニアリ山錫杖和藥屋ニ乾メアル又字多芍藥ニモ山ニヤクニヤウノ名アリ是同名異物也叔和藥屋ハ京ニテハ二條通車屋町南東角井筒屋

源兵衛シ弟一トス此家ニテハ和藥斗シ藏メ商ナフ  
シ紫花地丁ナトモ此家ニハイツモアルニ丸テ此家ニナキ和藥ハ它ノ藥店ニハナキ程ノノ右ノ家ニ次テハ烏丸ニ條上ル處小田原屋弥古工門又二條通高倉西ヘ入北側田辺屋宇兵衛ニ此家モ亦和藥ノ遠キ藥遠モ貯居ナルシ山錫杖ハ價賤キ者也

○加味驅風豁痰湯 是壽世ノ方ニテ方彙癲狂門ニモ出テアリ癲癇痰喘ノアル者本方ハアシラニニ是方シ用ヲアリシカニ此方アマリ不用藥も附子ハ去テモ用シ

○清心化痰湯 此方濟世方ニ出テ方彙ノ癲狂門ニ  
モ載テアリ癲癪ノ痰アル者ニ此方ヲ用ユ而レハ此  
方ニテ癲癪ヲ治ル伝ニアラス癲癪ヲ治ル方ハ別ニ  
用ル乎兼用ニメ或此方シ本剤ニメ用ル乎く全体コ  
ハ茯苓飲ナトヲ用テモヨケレ瓦幸ニ此方アル故  
用ルナリ

○一方 山施子一味燒黑為末白湯ニテ用ユ此方和  
方ニテ京西陣ノ織屋ナル者杏川太仲ニ傳ヘシ方也  
此方氣逆ニ用ユ或毒ニヨル上衝ニモ用エスヘテ上  
熱ノ氣逆メクワツクトノホス者ニ用ユ此方瘀血ノ

毒ニヨル上逆ニむ良ソレヨリ廣ク癪ノ上逆ニモ用  
ユ而レ凡勸慎タカブリテ上逆スル者ニハ効ナキ也  
又虛勞ナトノ上逆ニハ不用ム又此方酒齶鼻モ用ユ  
或真ノ酒齶鼻ニナラヌメ但鼻ノ酒查鼻ニナラント  
スル形状アル處ヘモ用ユ此ハ余ノ用資也此方酒查  
鼻ニハ上逆ニ用ルヨリ殊ニヨリ効アル也コレテ酒  
查鼻ニ経験セシハ本夏方ニ山施子一味丸トナシ酒  
查鼻ニ用テアリ此ニヨリテ此ヲ是ニ用資ヘタリ

○粒甲丹方 虎胆 阿片 竜胆 射杳 木香

入參 烏蛇 真珠 條東八味極末メ芩連父葉シ水

此条建殊錄  
出ノ處ノ治驗

一升ニ合入五合ニ煎取右ノ八味 煉ルニ此方俗ニ  
眠リ藥伝勢冽ノ津ヨリ出タル方ニ賣藥ノ内ニテ最  
ヨク効ノアルハ此粒甲丹不寐ト薩冽ノ消毒丸ト山  
斜ノ全肩丸ナトハヨク効アル方も此等ノ三方ハ能ク  
ク功アリテ賣藥中ニテモスクレニ者ヘ阿片一味ヲ用テ見ニ  
人シメ眠ラシムル者ヘ試ニ阿片一味ヲ用テ見ニ  
イカヤウナル人ニテモ不眠者ナレ

●一男生而立歲病兼癰々此日必發且其骨軀委弱  
不能自凝坐診之胸肋妨張股下支滿作小紫胡及滾痰  
欠之時以紫圓攻之數月稍能用午足癰不復發毓春園  
ハ冊

○癰症發而如死只脉有景動氣在腹者不歟 同上

○過酒或虛人癰氣屢發心氣如脫悶而不言茫然者心

脫也此症屢發隨輕其間困睡發后汗多諸虛候生者死

此症脉數無力動氣在胸中 同上

○俞辨統醫說卷五引玄女中房經所載云雷電交合之  
子必病癲狂故曰有不戒其容止者生子不備也

古事記

- 中興國號改爲大宋  
○中興國號改爲大宋  
○中興國號改爲大宋  
○中興國號改爲大宋  
○中興國號改爲大宋  
○中興國號改爲大宋  
○中興國號改爲大宋

