



大成論和語鈔
二

十通
591
2



阿武
591
2



醫方大成論和語鈔卷之二

洛下 法橋 岡本為竹一抱子

撰

若發於太陽即熱而惡寒

或ハ始ヨリ陰經ニ受ルモアリ若
始メ太陽經ニ發出スレバ即發

熱ノ惡寒入此
陽症ノ初發也

發於太陰止惡寒而不發熱也

此レ直中
即入ノ陰

症ヲ云。始メ陽經ニ入テ爵熱ヲ致ス不及。始ヨリ太陰經ニ發ス
ル者ハ寒症耳ニ熱症アルコトナレ故ニ止惡寒ハアリト絶テ發
熱スルコト
ナキ者ナリ 傳陽則潮熱狂言如有所見其脈多長浮

潮熱尋常ニ所謂ノ潮熱ハ時ヲ定テ熱ノ來ヲ云然ト傷寒ハ不
然傷寒ノ潮熱ト云ハ必未申ノ時ニ所來ノ熱ヲ云此レ邪熱ガ陽明
胃ノ本府ニ入者也狂言如有所見目ヲ開テ獨妄ニ狂ワレク言テ
已ガ眼ニ何ノ如有所見ニ妄言ス此モ亦邪熱ガ陽明胃ノ本府ニ
入者ナリ凡ソ傷寒陽症ノ陽明ノ症ニ兩アリ只陽明ト云者ハ
陽明ノ經ニ在ナリ又正陽明ト云ハ邪熱盡ニ陽明胃ノ本府ニ入者也

大成論和語鈔卷之二

ヲ以ス和解トハ裏熱ヲ和シ表熱ヲ解スルノ劑ナリ小柴胡湯ハ此レ和解ノ主方ナリ此固一定之法ノ術ハ此固古今ニ定シタル治法ナリ然又須考得病之日傳變期方可施

治 右ニツノ法アリト雖凡然凡所得病ノ始テ病ツキノ日限ヲ考テ病テ幾日ニテレハ何ノ經ニ傳テ何ノ病症ニ變ト云期ヲ考テ方ニ其治法ヲ施ベレト也期日時ノ約束ヲ云ナリ大抵傷寒ノ邪ハ始テ病ノ日ハ大陽トス二日ハ陽明三日ハ少陽四日ハ大陰五日ハ少陰六日ハ厥陰ニ在トス故ニ三日ニ至ニテラ表症トス四日以下ヲ裏症トス然凡必コノ日期ノ如ナラズ一經ヲ二三日病アリ或ハ半日ニノ他經ニ傳アリテ常例ヲ以テ求テ得カタレ故ニ日數ヲ以テ未カタレ惟ソノ證候ニ從テ表裏傳變ヲ診察ノ可ナリトス

病在皮膚者爲表

其邪氣皮膚ニ在テ此ヲ表症トス即三日ニテハ邪

宜麻黃桂枝之類驅散寒邪

三日ニテハ治法ハ麻黃湯桂枝湯ノ類ヲ以テ在表ノ寒邪ヲ驅散スベレト也驅散發散ノ義ナリ

麻黃湯 杏仁 麻黃 甘草 桂枝 桂枝湯 桂枝 甘草 芍藥ナリ

○按スルニ病在表者麻黃桂枝ノ二湯ヲ以テ發散スルハ冬日正傷寒ノ治法ナリ春夏ノ温熱病ノ表症ヲ治スルガ如ク又別法アル者也

得汗之後脉靜爲愈

發散ノ治法ヲ行ニ從テ汗出コトヲ得テ其汗後ノ脉ヲ候ニ汗不出前

ヨリハ脉靜ニ收リレハ病ノ愈ニレトス此汗ニ從テ邪熱ノ退ヲタレハナリ若汗出ノ後モ脉ナラ躁ノ不収者ハ其命危トス 有

汗不得服麻黃無汗不得服桂枝

麻黃ハ麻黃湯ナリ桂枝ハ桂枝湯ナリ

世俗誤リテ麻黃ノ藥ハ出汗桂枝ノ藥ハ止汗者ト覺ルハ非也此言意ハ麻黃湯ハ發表ノ強劑桂枝湯ハ發表ノ弱劑也故ニ傷寒表症ニ自汗等ノ有者ハ發散スベレト雖凡麻黃湯ノ發表ツヨキノ劑ハ難用桂枝湯ノ發散ヨロキノ劑ヲ以テ輕ク發表スルニ宜若又傷寒表症無汗者ハ桂枝湯ノ如キ發散ヨロキノ劑ハ其力ヲ難シ麻黃湯ノ發散ツヨキノ劑ニ非バ其表ヲ發スルニ不足ト云仲景 張仲景ハ長沙ノ大守ナリ氏ハ張名ハ機ノ義ナリ 字ハ仲景東漢ノ人也傷寒論ヲ作ル 至切之論 以上ノ如キハ仲景至極ノ切要ノ法論也 不可不謹 以上ノ法論ヲ謹守リテ疎略ニスル

勿レト 四日五日之間

此ノ時ニ邪熱大 陰脾經ニ在ナリ

病在胸膈痰氣

緊滿於上

足ノ大陰ノ本經ハ膈ヲ行 其絡脉ハ胸ヲ行 故ニ病 在胸膈痰氣ガ上 胸膈ニ緊シク滿悶ル者ハソノ

治 當以瓜蒂

瓜蒂アマ瓜ノ蒂ハ陽明經ノ濕熱ヲ除キ 能胸膈 ノ痰涎ヲ引去ナリ 故ニ仲景ノ瓜蒂散アリテ瓜蒂 法

赤小豆同ク用テ

黑豆 黑豆ヲ以テ作者ナリ 決豆豉 塩豆豉アリ 人ヲノ吐セシムル 塩ヲ交ル塩豆豉ハ能ク人ヲレテ吐セシム

之類吐之而愈

此等ヲ用テ吐速セシメテ吐ニ 從テ胸膈緊滿ノ邪氣ヲ去

六日七日之

間

此邪熱ガ經ヲ過テ 胃府ニ入ノ時ナリ

其病人腹傳胃

邪熱ガ深ク腹内ニ 入テ直ニ胃府ヘ傳

入者也此ヲ正陽 明ノ症ト云也

藏府結燥

藏府ノ間カ邪熱ノ爲ニ結滯燥熱 ス蓋藏府ノ結燥ハ大便秘結ノ不

通ヲ以テ

狂言潮熱

詳鈔ハ上ニ見タリ 皆裏熱ノ至極也

須大黃芒硝

此表 氣湯

ノ藥品俱ニ裏熱

之類下之而愈

大便ヨリ推下セ

古今治

法掇曰如此

仲景以故古今傷寒ノ 治法ハ掇テ曰一如上也

却又得病之日

便四肢厥冷

此重テ真陰ノ症ヲ云 熱症ニハ非ス 夫陽症ノ傷寒

コトアリ 此レ四五日ノ以後ニ然リ 却又得病 日ニ便四肢厥冷トハ彼陽 症ノ四五日經テ後ニ四肢厥冷スルニハ非ス 此症ハ却テ又 病ツキノ初日ヨ

リ早便キ足厥冷一有ト也 寒邪陽經ニ不入ノ直ニ陰經ニ入テ寒症ヲ致 者ナリ 治法微冷ノ者ハ理中湯 甚キ者ハ四逆湯ノ類ヲ以テスル也

名爲陰厥

此ヲ陰厥ノ症トス 陽症ノ陰經ニ入

欲絶者丹田

臍下二寸ノ

氣海

臍下一 寸半在 穴灸之 厥冷ノ甚メ絶命セント欲スル 者ハ丹田氣海ノ兩穴ニ灸メ下

元ノ陽氣

此レ陽症ノ中ノ一症

ラ復セシム

又有經日微厥而後發熱者

此レ陽症ノ中ノ一症

熱病ヲ見コト二三日ヲ經テ陰經ニ入ラントスルノ時ニ四肢

微ク厥冷ノ後 又多發熱ヲ見者ナリ 此レ裏熱復發然リ

爲熱厥

發熱微厥ヲ

熱甚 其熱勢 甚クメ

舌黑

舌黒コゲタルハ 裏熱ノ極也

鼻煤者

鼻ノ色ウス黒フスオリ今人 全孫九賢 多以水漬布帛冷

タルガ如キモ亦熱極候也其布帛ヲ 搭之於胸其冷布帛ノ重疊

ヲ漬ツケテ何片重疊 搭之於胸タルヲ病者ノ胸上

○按スルニ古法雖如此今本朝ノ虛怯ナル者ニ行ベキノ術ニハアズ

又有不厥而即變陽證九ノ熱邪ノ裏ニ入ントスル時ハ必手

ヲ不見即裏症ニ變スルコト有ト也 陽證正陽明ノ裏證ト成テ熱

或胸腹志悶恙ハ怒也甚怒リタル時ノ如ニ 牽引疼痛坐

卧不安胸腹ノ間ガ牽ツリ引ハリ疼痛ノ坐ノモ固ノモ甚ク

氣喘息則喘息ニ肺喘胃喘ノ別アリ腹滿テ喘息スルヲ 又

不可拘以日數即宜下之ヲ以テノ證ヲ見ス者日數ニ不拘テ

府ニ入者トメ急ニ大便ヨリ推下ス宜ト也 拘以日數傷寒ノ大

法一日ヨリ三日ニ至テヲ在表トス宜發散四五日ニ至テハ熱在裏

府結燥大府ハ大腸乃大便也六七日ハ大便秘結 上不能食下大便

其脉細緊如繭筋ホソクノ然也緊ハ脉急ニノ柔抑テ

皆日當下却テ如此病症ヲ見時ハ衆人皆下

有頭痛傷寒ノ症頭痛アル 惡寒此モ亦

有汗表症 或小便清利裏熱ナレハ小便赤澁ナリ

乃表證未除仍宜汗之大便ノ不通ゴト六七日ニ不能食ハ裏

痘アル者ハ此表症未除者ナレハ仍汗ヲ發ノ表熱ヲ除クヘトス蓋傷寒ノ
 大法當下者ハ毫ノ表症ナキニ至テ可也毫ノ表症アル時ハ更ノ不可下ガ
 故也 **或裏寒表熱** 此一句ハ誤ナリ後世ニ於テ傷寒ニ裏寒表熱ノ症
 有コトナレ蓋傷寒ノ熱ヤ寒邪閉表テ陽内ニ鬱ノ熱症ヲ致ス然則豈
 裏寒表熱ヲ致ノ義アラニヤ裏寒表熱ハ此雜病ナリ眞ノ傷寒ニハ
 非ル **或裏熱表寒** 傷寒傳經ノ熱邪三陰經ニ入テ裏熱極ル
 ナリ 時ハ手足厥冷等ヲ發ノ表寒ヲ見ハス **皆**
當先救其裏後治其表 皆トハ裏寒ノモ裏熱ノモ皆宜先ツ
 治スヘト也裏寒ハ先其寒ヲ
 温裏熱ハ先其熱ヲ治セト也 **應汗而反下之則熱畜於**
裏或爲瘀血發而爲狂證者有之 彼表症ノ應汗病症ヲ
 誤テ裏症トモ反テ大
 便ニ推下則裏ニ實邪ナキヲ下ガ故ニ裏虛ヲ致テ其虛ニ乘ノ表熱
 反テ裏ニ入テ熱邪ヲ裏ニ畜ヘ或ハ又瘀血トナル蓋汗與血一物也表症
 ノ汗スベキヲ汗サザレバ汗血滯リテ瘀血トナル遂ニ發
 出シテ狂證トナル者ハ彼血熱裏熱ニ因テ然者也 **結而爲痞**

爲結胸者有之

誤テ下ガ故ニ熱ヲ中焦ニ結滯ノハ爲痞熱ヲ上

胸ノ分別ハ **結胸者心下緊滿而痛按之如石手不可**

近 **心下ハ俗ニ云ムナサキ也結胸ノ症ハ心下緊ク滿張テ按テ見レハ堅**

胸ノ分別アリ小結胸ハ惟心下緊滿ノ常ニハ不痛按之ハ痛ナリ大

結胸ハ心下緊滿ノ痛常々ニ在者也治法モ亦大小ノ結胸各不同大結

胸ハ下小結胸ハ惟 **痞者但緊滿而不痛** 痞症ハ心下緊ク滿

其熱ヲ解スルノ三 **證雖相類用藥却有**

不同 **汗之則津液枯竭又有亡陽譫語者**

若熱邪在裏下

七陽トテ汗ニ從リテ陽氣ヲ損亡ノ謔語スル者アル也蓋汗與
氣相並行故ニ妄ニ汗スレバ因テ陽氣ヲ損亡スルコトヲ致ス 謔

語爲實鄭聲爲虛 凡言謔語鄭聲ノ三等アリ。聞言テ如

有所見勢タケゾニ言者ヲ狂言トス。實ナリ合自テ平常ノ事ヲ言者
ヲ謔語トス。聞言テ平常ノ事ヲ言ニ同。コトヲクリカヘシクリカヘテ言テ
鄭聲トス。謔語鄭聲俱ニ虛症トス。謔語ハ虛中ノ實
ナリ鄭聲ハ精神ノ大ニ虛脱トス。虛中ノ虛トスル也 若應吐而反

温之則毒氣鬱結於胃發而爲斑 邪氣胸膈ニ在テ頭

スヘキノ症ナリ然ラ醫誤テ反テ温藥ヲ以テ温則熱藥ノ毒氣ガ胃ニ鬱
結ノ其熱毒ヲ外カ肌肉ニ發出ノ班ヲナス也蓋胃ハ肌肉ヲ主ガ故ナリ

班周身ニ細ニ蚊ノ喰タル痕ノ如ニ 其色 發班ノ如錦紋者生 班
赤班ニ發出スルヲ發班ト云也 色ナリ 色 爛班爛陽毒ト

赤潤ツヤ有テ錦ノ織紋ノ如ナルハ 黑者即死 班色ノ黑者ハ胃
熱薄ノ胃氣ノ虛セザルガ故ニ生ト云 臨證用藥 其病證ニ臨テ淺深虛

云熱毒ノ深ノ胃ノ氣ノ虚脱ス 臨證用藥 實ヲ察メ藥ヲ別用
ル者ナレハ即死スベト云ナリ

ヨ誤コト 若不辨其陰陽觀其傳變審而行之則必致
勿ト也

錯亂恠證百出流而爲壞證傷寒甚至不救 陰陽 陰

症ハ直中即入ノ寒症也陽症ハ熱症ナリ傳變熱邪ノ經脈ニ傳變ルヲ
云恠證異カワリタル恠キ病症ヲ云百出サマク見レ出ラ云壞證傷

寒ノ病愈シコナウテ次第ニ元氣衰ヘテ邪氣ハ留滯ノ治法ニ難及ノ證
トナル者也○言心ハ傷寒ノ病ソノ因多端ニ難辨故ニ若ソノ陰症陽症ヲ

辨其傳變ノ期ヲ考觀テ審ニノ行ズノ所候所察不明トキハ必治法ノ
錯亂タルコトヲ致テ恠キ病證百端見レ出テ次第ニ流傳メ遂ニ壞證ノ

傷寒トナリ其病甚ノハ救レ 以此傷寒一證不可不謹 如此
サルニ至テ死スル者アリト也 治法

ニ以ノ錯タガヒ有ハ遂ニ至不救ガ故ニ傷寒ノ一症ハ謹考メテ治法ノ
過ナキコトヲ致セヨ諸病ノ中ニ於テ大病ト稱スル者ハ傷寒ノ三

ナリ傳變難察治法易錯 病愈之後切不可輕用補藥

實ニ不可不謹者是レナリ 輕ノ字ヲ眼トス。妄ノ補藥ヲ不可用ト云ニハ非ス。能餘熱ノ退ヲ
考。元氣ノ虚實ヲ察メ餘熱モナク元氣ノ疲モ有コトヲ妄ノ補藥

用ベレト也故ニ輕ト云。立ニ輕ク補劑ヲ
用則餘熱ヲ補トクメテ病復ハシカレハ也 **尤忌** 禁制スル
房室 **房室** 房事ナリ傷寒癒テ百日
ノ間房事ヲ禁スルナリ

サハ禁スル也況ヤ **飲食過度** 傷寒癒テ後百日ノ間粥ヲ食テ養生ス況
勞傷ニ於テヤ **勞傷** 四肢形骸ヲ勞ツカウヲ云傷寒癒
テ百日ノ間手足ヲ洗頭ヲ梳コト

仲景傷寒論ニ差テ後勞復篇アリ凡傷寒差テ後
百日ノ間ハ少ノ不養生アレハ病必再發スルコトナリ **尙因之再作**

再發ノ **未易治也** 尙以上ノ不養生ニ因テ病再作スル
義ナリ 治療シ易シテアラス不可不謹ナリ **致有脚氣** 脚

ノ初發ガ傷寒ノ表症ニ似タリ誤テ傷寒ト
致コト勿ト也此ヨリ傷寒ニ似者ヲ舉ル也 **痰飲** 痰症
ナリ **食積** 食傷

虛煩 此書ノ第三十一篇ニ
虛煩門アリ考ベシ **四證與傷寒相類更宜審之** 脚

痰飲食積虛煩ノ四ノ病證ト傷寒ト相類似スルコト有コトヲ致ス醫
變ニ又傷寒ナルカ傷寒ニ非ルカヲ審ニ分別ノ治療スベシ誤テ傷寒トノ
治療スルコト **但脚氣則脚膝軟痛卒起即倒** 此ヨリ傷寒ト

勿レトナリ **四證トノ分別**

フ云也脚氣ハ脚膝軟痛卒起即倒ヲ以テ傷寒ト異トスルナリ
傷寒ニハ如斯コト有コトナレ **卒** 俗云フト云意 **倒** 足ニカナウフ地ニ倒レ

ルラ **痰飲則頭不痛** 傷寒ハ頭痛ス痰症ニハ頭痛ナレト也然レ
云也 **痰飲** 痰症ニ頭痛ナレト云ベカラス痰厥ノ頭痛

アリ此二句ハ孫 **項不强** 凡外感ノ症ハ項強ルナリ故ニ傷寒モ亦タ
允賢ノ誤ナリ **項强** ルナリ痰症ハ項不强ヲ以テ異トス

食積則身不痛左手脉平和 傷寒ノ症ハ身ニ痛アリ食傷ハ
脹痛ナドハスレモ四肢ニ痛ナド

ハナキ也且右手ノ脉ハ内傷ヲ候左手ノ脉ハ外感ヲ候故ニ傷寒ハ
左手ニ病脉アリ食積ハ左脉及テ平和ニモ右手ニ病脉ヲ得ナリ

虛煩則不惡寒身不痛爲異 虛煩ノ症ハ傷寒ニ似タリト雖
ヒ虛煩ニハ惡寒ナク身ニ痛ナ

キ也傷寒ハ惡寒ノ身熱ニ痛アル也此ヲ傷寒ト異
トスル也 **惡寒** 俗云サムケ **異** ナカイト云意ナリ **更不可有誤**

作傷寒治之 右ノ四證ハ如此傷寒ト異ナル所ノ有ヲ以テ能ク分
別ノ誤テ傷寒ト意得テ治療スルコト有コト勿ト也

其中 傷寒ノ邪氣ノ中ヤウニ陰症 **變易** 傷寒ノ邪氣ノ種種

陽症等アリテ同ナラス **變易** ヲツリ易ク變易

大哉論和歌抄卷之三

トハ 非止一端 其端種々ニノ一也 茲略舉其說以備倉卒

倉卒ハ急用ノ意ナリ 湯寒ノ證因ハ多端ナレバ 茲大成論ニハ大略ノ肝要ナル論說ノミヲ 援擧テ以テ倉卒ノ間ノ急用ニ備ルトナリ 凡ソ繁多ナクハ其事ハ全ト雖 正急用ニ於テ其要ヲ求ニハ反テ難致 故ニ此ニシテ然リ 其詳又當於仲景論中

千金 唐ノ孫思邈 百問 宋ノ李知先ガ傷寒百日也 或ハ活人書ニ云ナリ 內求之 傷寒ノ論說ハ仲景ノ傷寒論ノ中又ハ千金方又ハ傷寒百問ノ内ニ於テ考求ス也 且感冒 風寒ノ邪氣ヲ輕皮云カイキ 類ナリ 本與傷寒治證一同但有輕重之分耳 風寒ノ

傷寒ト治法モ病證モ同ナル者ニ但 其輕重ノ分別アルノミ也 感冒ハ治症俱ニ輕ニ傷寒ハ治症俱ニ重ト云ノ分アルノミ也 故重者

爲傷輕者爲感冒 重者ヲ傷寒 傷風トス 輕者ヲ感冒ノ輕者ノ中ニモ風ト寒トノ異アレハ

風有寒又須詳別 又コレヲ詳カ分別ノ風寒ノ治ヲ誤ラ勿シ

夫感寒則必惡寒 此ヨリ感冒ノ中ノ寒アリ 面色黧慘 黧廣也 深黒也

慘愁イタムナリ 黧慘ハ寒邪ニ因テ面色ノ黧慘タルヲ云然レ此本ト感冒ノ輕症ヲ云ナリ 感寒ニ於テ黧慘ノ色有ベカラス 或ハ中寒ノ重者ハ陰邪極リ陽氣ウタレテ黧慘ナルコト有ナリ 故ニ此症ハ中寒ヲ論ス 且下文ニ其脉沉遲ト云則彌中寒ノ症ナリト云ノ說アリト雖 正又下文ニ發熱ノ二字アルヲ以テ中寒トシ難シ 中寒ハ内外寒極者ヲ發熱ヲ致者ニ非ス 按スルニ黧ハ黒ノ義ニ非ズ 前鈔ニ千家詩ノ注ヲ引テ黯々ハ凄慘之意ト凄慘ハ寒氣ニ慘ノ意ナリ 然則面色黧慘ハ只寒氣ニ擊テ面色ノ惡ク慘病タルヲ云ナリ 俗云サウゲタツノ義ナリ

項背拘急 項背ノ拘リ強リテ 亦或頭痛發熱 前ニ辨スルガ如クニ

發熱ト云則中寒 其脉沉遲 沉遲ハ極寒ノ脉ニ感寒ノ脉ニ非

ニハ非ス 感寒ナリ 中寒ニ非ス 此脉ト證ト相對セス 然レ此書ニ於テハ如此ノ 差ハ間存セリ 大槩ニ見ベトス 當以五積散

香正氣散 養胃湯 表散之 寒邪ノ重者ハ五積散 輕者ハ養胃湯 香正氣散 内生冷ニ傷ラルコトヲ

大成論 卷之二

九

兼者ハ養胃湯ノ類ヲ以テ表邪ヲ發散スベシト也
五積散養香正氣散養胃湯ハ諸書ニ見タリ不及記
感風則必惡風

此ヨリ感風ノ症云
面色光浮
面色浮腫テ上
光アルヲ云也
身熱發熱如瘧
惡寒發熱ノ性

來アリテ瘧ノ如クナリトナリ
鼻塞
風邪ガ肺分ニ塞ル故
聲重
俗ニガイキ
時引清涕
涕清

ハ俗云ニツバナ也
或咳唾稠粘
或ハ咳嗽ノ所出ル唾カ
其脉多浮

數
風熱ノ脉ナリ
當以十神湯敗毒散治之
ラ重者ハ十神湯輕者ハ敗毒散ヲ用ベシトナリ

二方俱ニ諸書ニ見タリ不及記
或風寒兼之當用和解之藥
此和解ハ前ニ謂ニ在
半表半裏者和解

解之ヲ和解ト不同也只風寒ヲ相兼テ和解スルヲ云也九味羌活湯
八解散香薷散ノ類ヲ云ナリ○按スルニ此一條不審何如トナレバ上文ニ所
謂ノ感風則必惡風云云ノ語ハ獨リ風邪ノ感スル者ナルベシ故ニ茲風寒兼

之ト云者ナラニ然レバ上文ノ感風云云ヲ以テ獨風ノミトセバ何ゾ傷寒門ニ
此ヲ論スルヤ前ノ風論ニ在ベキナリ又上文ヲ以テ風寒相兼者タラバ此
或ハ風寒兼之云云一條ヲ衍トスベシ且上文ノ十神湯ハ獨リ風ノミノ劑ト

ニ難レ只此或ハ風寒兼之云云
ヲ削ハ可ナルベキモノナリ
體虛之人不可過發散恐致

他疾
ラ感冒ト雖ハ氣躰虛弱ノ人ハ發散ヲ過カラス發散ヲ
大過セバ恐レキコトハ他疾ヲ引キ出スコト有ベシトナリ
並述

干後
ニ虛人ニ用テ所宜ノ發散ノ劑ハ
一々ニ此論ノ後ニ述出ストナリ
審之審之
ラ上ヲ總テ言ナリ以上ノ

諸論ヲ審ニシテ治法ヲ誤コト勿ト也審
字ヲ重テ言者ハ念比ニ戒タル義ナリ

瘧
俗云ヲコリ也瘧字ハ虐字ノ意也ソチウト訓ス此疾ハ邪氣
ト正氣ト爭イ戰テ邪氣ヲ以テ正氣ヲ虐ガ故ニ瘧トハ

言也瘧ノ義ハ素問ノ瘧論ニ詳ナル御問答アリ且此論中ニ所引ノ
素問陰陽應象大論ノ夏傷於暑秋必發瘧瘧スルノ義ニ因テ時
一切ノ諸瘧ノ理ヲ知ニ足リ

夫瘧之爲疾名
病狀不一
古書ニ所謂

瘧瘧
内經ニ所謂ノ瘧瘧ハ寒ナウノ單ニ熱ノ三發スル者ヲ言ナリ
此書ノ瘧瘧ハ單ニ熱ノ三單ニ惡寒ノ三發スルヲ瘧瘧ト云

大哉論中談極多ニ

大哉論中談極多ニ

大哉論中談極多ニ

大哉論中談極多ニ

内經ト 寒瘧 先惡寒ノ後發 温瘧 先發熱ノ後惡寒 食

不同也 胃瘧ト云ナリ食物ノ不節ニ因テ起者也其症ハ善 壯瘧 壯メケダモノト訓ス陽瘧也發

多ク發熱ハ少ク者ヲ云也 雖不同 如右ニ病名種々ニノ雖 皆由外感風寒暑濕之

氣與衛氣相搏而後成之 衛氣ハ乃人ノ表ヲ所衛ノ正氣也 瘧ノ疾ニ内傷ヨリ生スル者ア

リト雖其モ亦外邪ヲ無不兼故ニ言瘧ハ皆外感風寒暑濕ノ四氣 感傷シテソノ邪氣ト衛氣ト相搏戰テ争ニ因テ而後此病

ヲ成 雖經云 素問陰陽應象大論也此意 夏傷於暑秋必 瘧

瘧 茲所謂ノ暑ハ陰暑ナリ陰暑トハ夏月ノ火暑ヲ防ガント 瘧 瘧ト云テ扇テ冷ヲ受或ハ風ニ吹レ水ニ入ナド冷氣ノ爲ニ閉ラレ

タルヲ云然ハ夏月ハ人々ノ陽氣ノ張ガ強故ニ冷陰ニ閉ラルト雖病イ 不發セズノ秋ニ至ル秋ハ收斂ノ冷風ヲ以テ人々ノ腠理ヲ閉彼ノ夏

時ヨリ收陰ニ閉ラレタル入モ亦衆人ト同ク秋收ノ冷風ニ閉ラレテ鬱熱サ カニ成テ遂ニ瘧疾ヲ致ス故ニ夏傷於暑秋必瘧瘧ト云也瘧モ瘧

ノ義ヲヨリノ總号也或ハ老瘧ヲ瘧ト云或ハ二日發ヲ瘧ト云或ハ日 發夜發ヲ以テ瘧ト瘧トヲ分者ハ皆誤也諸瘧ヲ通シ皆瘧瘧ト稱者也 然

四時有感 内經ニハ夏傷於暑秋必瘧瘧ヲ致スト云トハ雖ハ秋ノ三 瘧アリト雖其病因ハ皆右ノ内經陰陽 應象大論ノ意ヲ以テ知ルベキ者ナリ 鬱積七情 喜怒憂志悲恐

沉積ノ致アリ或ハ怒テ肝氣ヲ鬱 積ノ致者ハ肝瘧ヲ多スノ類ナリ 飢飽失時 飲食ノ宜時ヲ失 致

冷脾胃不和 脾胃ノ氣ヲ不和調セザラシムトヲ致ニ因テ發者ハ食瘧 胃ノ不調ヲ兼者多ク胃氣タクニレクバタトヒ

瘧病ノ生スルコト有疔瘧ヤスカルベキナリ 痰留中脘 脾胃ノ氣不 調ノ氣液滯留ノ痰ヲ生シ中脘ニ留滯スレハ衛氣ノ行益遊リ邪氣彌執

散ノ瘧疾ヲ致ス故ニ丹溪ノ謂瘧ナクノ瘧ヲナサストハ是也中脘中焦胃 府ノ中 皆成瘧疾 瘧ノ病ヲ生スト也 其初發也 瘧疾ノ初發

部ヲ云 瘧ノ病ヲ生スト也 其初發也 瘧疾ノ初發

瘧ノ病ヲ生スト也 其初發也 瘧疾ノ初發

瘧ノ病ヲ生スト也 其初發也 瘧疾ノ初發

瘧ノ病ヲ生スト也 其初發也 瘧疾ノ初發

瘧ノ病ヲ生スト也 其初發也 瘧疾ノ初發

瘧ノ病ヲ生スト也 其初發也 瘧疾ノ初發

瘧ノ病ヲ生スト也 其初發也 瘧疾ノ初發

瘧ノ發スルタビ 欠伸 邪氣衛氣ノ分ニ逆ノ陰陽爭ヒ引ガ故ニ欠ス邪氣ノ

每ニハ然トナリ 爲ニ正氣通迫ノ爵ス其爵ニ從リテ手足ヲ伸ス

畏寒 全陽氣ナシ陽退キ陰獨存ノ故ニ甚ク惡寒ス 戰慄 汗ニク

頭痛 外邪故ナリ 或先寒 惡 後熱 瘧ト云ナリ 或

先熱 熱 後寒 惡寒ス此ヲ 或單寒 惡寒ノミヲ 單熱 發熱ノ

瘧ト云 或寒 惡 多熱 發 少 此ヲ壯 或熱 發 多寒 惡 少

此ヲ壯 一日一發者易治 俗云日一瘧也邪氣在衛分淺ニ故

治易 二日 問日一日ヲ有テ 起ル者ヲ云 三日 問日二日ヲキテ

者ナリ 三日發スル者ハ邪氣深ノ衛氣ニ遠ニ故ニ問日 一發者難治 日

二三日ヲ隔 邪氣ノ深ヲ以テ尤治ニ難シトス 瘧脈自弦 弦ハ肝

且正氣逼迫ノ候ナリ瘧ハ寒熱 往來ヲ發 弦數者多熱 弦

ノ肝胆ニ屬シ邪ノ爲ニ正氣逼迫スレハナリ 弦數者多熱 本脈

トノ其所兼ノ脈狀ヲ以テ寒 弦遲者多寒 遲ハ 弦而小緊

熱等ヲ分辨ス數ハ熱脈ナリ 者宜下 裏熱或ハ食積トス故ニ

者宜下 治法宜下トハ云ナリ 弦遲者宜温 陽氣不行寒邪

温ト 浮大者宜吐 邪在上焦或ハ痰結或ハ食積塞上ガ故ニ 治療

之法當先發散寒邪 治法ハ種々アリト雖先 行ベキノ術ハ表

取ニ非シハ瘧 不可驟用截補之藥 截ハ今本朝ニ云キリ藥ヲ

疾ヲ治スル足 疾ノ相爭カ故ニ截ト云蓋邪ト衛トノ會スル道ヲ截ハナス意ナリ言ハ

其ハ外邪ヲ發散シ盡サズノ驟イソギテ草菓常山等ノ截藥人參

白朮等ノ補藥ヲ用ルコト勿レトナリ大抵截藥ハ參朮等

ノ補劑ヲ兼用テ胃氣ヲ強メ截ニト欲ス故ニ截補ト云 若截

タレテ浮腫トハ成ナリ **不能即愈致成癆瘵者有之** 癆疾愈ソ

浮腫ハ腫氣ナリ **發散之藥熱多者宜小柴胡湯** 小柴胡湯ハ

次第ニ瀉腫テ癆瘵ノ病ニ變スル者アリ **發散之藥熱多者宜小柴胡湯** 湯ハ半

表半裏寒熱往來ノ主劑ニテ **參蘓飲** 此亦發散ノ劑且方中ノ清

黃芩柴胡ハ寒冷ノ藥ナレハ也 **脾湯** 方中ニ黃芩柴胡ノ寒冷アリテ熱多癆瘵ノ截

脾湯 藥トス○以上ノ三方ハ諸書ニ出タリ不及記 **之類** 癆瘵ノ

半發散ノ劑ニ於テモ熱多者ナラバ小柴胡湯 **寒多者** 若又寒多者

參蘓飲清脾湯ノ類ヲ用ルニ宜シトナリ **養胃湯** 胃ヲ温メ寒濕癆ヲ去ノ劑

養胃湯 ナリ方中尤モ温劑ナリ **四獸飲** 此亦温劑ノ截藥也人

菓半夏棗生薑烏梅右刻塩以計ヲ以テ淹コト半時バカリ紙ニ裹水ニ濕

慢火ニ炮熟シ焙リ乾シ毎服半兩水ニ錢煎六分發ハル日ノ未發前ニ用也

發散不退然後以常山飲 知母川芎草菓良薑烏梅薑棗煎

トナラントス **勝金圓** 檳榔常山ヲ末ノ麩糊ニ丸コト梧桐子ノ

ルヲ主治ス **截之** 發散ノ治ヲ用ト雖モ癆瘵イダ退スバ常山飲

ニ非スト雖モ發散ノ退スバ **截而不愈久則脾氣虛敗唯宜**

截藥ヲ用テ愈スベシト也 **多進養脾驅痰之藥脾氣一盛自然平復**

モ不愈コト久則脾氣虛弱敗傷スルニ因テ也 唯治法多脾胃ヲ養ヒ痰

飲ヲ驅去ノ藥ヲ進用ベシ脾胃ノ氣サヘ一度盛ニテハ癆瘵ハ自然ニ平愈

本復スル也凡ソ癆瘵ノ不愈者中焦ノ虛也 **此證既愈尤當節**

胃ノ氣サカントシバ邪氣容ノ地ナラノ自愈也 **飲食謹勞傷防其再作**

心肺胃ノ氣ヲ調テ其病ノ再作 **如煙瘴之地** 煙霞瘴霧ノ地ナリ

作ルコトナキ様ニ防グベシト也 **施以治法** 癆瘵ヲ患者多シ如此ハ又ソノ方角土地ヲ考テ所宜

云嶺南山谷 濕熱ノ地也

居人常患癆瘵又當隨其方土所宜藥性

大哉論治癆瘵

ノ藥性ニ隨テソレクノ治法ヲ以テ施スニトナリ蓋シ煙瘴ノ氣ニ感レ
病者ヲ瘴癘ト云コレガ治療ハ其土地ノ山谷海川等ニ從テ不同ガ故ニ如
此ニ言
ナリ **客旅** 旅行ノ
酢ヲ云 **往來瘴地常宜服平胃散草菓飲**

草菓飲ハ紫蘇草菓良薑
川芎青皮白芷甘草煎服ス **先以防之** 旅人ナント彼ノ煙瘴ノ地ニ
飲ノ類ヲ服ノ前カドヨリ中焦ヲ平ニシ濕熱ヲ不受ヤウテ先以テ預
メ瘴疾ノ不生ヤウニ防ラクベシト也此内經ニ所謂ノ治未病ノ術ナリ

痢

俗云レブリハラナリ内經ハ腸澼ト号ク腸胃ノ澼積ヲ下
セバ也仲景コレヲ澼下ト云後世ニ痢ト命ク蓋大便ノ通
利ヲ痢ガ故ナリ難經ニハ大便泄ト稱ス痢病ニ内因アリ外因アリト
雖内因ノ者ヲ多シトス外因ト雖 疴少ク内因ヲ無不兼皆飲食
濕熱ノ積滯腸胃ノ間ニ留滯ノコレガ通下セザルガ故ニ裏急後重ヲ
飢ニ行コト數千度ニ至ル故ニ治法疎通ノ劑ヲ以テ之ノ積滯ヲ推
下スニ
在ノ三 穀ヲ食フ者ハ...

今人患痢者古方謂之滼下是也

古方ハ仲景也仲景ニ
來ハ滼下ト云腸胃ノ滼

ヲ下セ **得病之由** 痢病ヲ患ル **多因脾胃不和** 本ヨリ脾胃
ハナリ **不得化** 不和則化
不化則積滯

飲食モ **飲食過度** 其不和ナル中焦ハ飲食
滯易シ **停積于腸胃** 常度ニ過ルコト有因テ

之間 **不得化** 其過度ノ飲食ガ
腸胃間ニ停リ積テ **不得化** 化ハ消化也脾胃ノコナシ
ク云コナスコトヲ不得ト也

而又爲風寒暑濕之氣干之故爲此疾 内飲食ノ積滯
寒暑濕ノ邪氣ノ干コト有テ内外ノ邪

交腸胃ニ留積ノ遂ニ此痢疾ヲ致ト也 **傷熱下痢則赤傷冷**

則白 此言心ハ赤ハ陽熱白ハ陰寒トス故ニ傷熱則所下ノ痢色赤傷
冷則所下ノ痢色白ト也然疴劉河間ハ所謂泄瀉ノ赤白色ハ冷

熱ニ分配スレ痢色ハ赤白俱ニ濕熱トスレ蓋泄瀉ハ多ハ消化セズノ
下則寒冷ニ屬者多トス痢ハ皆如膿ニ消化ノ下則寒冷ノ者アル

ナレ皆此レ濕熱ノ所致ナリ赤ハ濕熱在血分 **傷風純下清血**

白ハ濕熱在氣分トス此ノ書ト不同也 **傷濕則下如豆羹汁** 豆羹汁ハ
風ハ同氣相求テ傷肝肝藏
血故ニ傷風則純ヲ瀉血ヲ下ス

ナリ赤黒色ナル者ヲ下也濕ハ陰濁ノ氣ナリ故ニ
此ニ傷ラル者ハ下スコトモ亦豆羹汁如ナル濁汁下

赤白兼下 冷熱ノ氣交リ血スレバ赤白色ノ者ヲ兼下也
河間ハ此亦誤リトス水火陰陽寒熱ハ權衡ノ如

ニノ相並テ甚コト不能ト云 又有如魚腦髓者
詳ニ原病式ニ見ヘタリ 魚腦髓者頭ノ

五髓中ノ膏也然此腦髓ノ魚ノ腸ノ如キ者下ラズ
此腸胃ノ虛極ニノ藏毒ト号半死半生也 治法當先用通

利之藥 疎滌臟腑積滯然後辨以冷熱風濕之證用

藥調治 痢病ノ治法ハ先大便通利ノ藥劑ヲ用テ藏府ノ間ニ
積滯ル所ノ物ヲ大便ニ推下テ後ニ其冷熱風濕ノ證ヲ

辨テソレクノ藥ヲ用テ治療スベト也 疎滌大便ヲ疎通ノ腸胃ノ
滯ヲ滌ケ如ニ除去ヲ云 然後惟先第一大便ヲ通利スルヲ本ニ其

病在ノ冷熱風濕等ヲ考テ 熱赤者清之 其ノ熱ヲ清テ
藥ヲ用ヨト也 調治治療ノ義也 熱赤者清之 其ノ熱ヲ清テ

冷白者温之 温劑ヲ用テ其 風濕者分利之
冷白者温之 温劑ヲ用テ其 風濕者分利之

兼用テ調治スト也 此治法未嘗温涼兼用ルノ法似難行蓋
温涼兼用テ温冷ヲ兼治セント欲セバ温劑ハ涼ノ害トナリ涼藥

ハ温ノ害トナルベシ按スルニ冷熱相兼者以勝者調之ト言則可ナラズ
○以上ノ熱赤者清之トハ上文ノ然後辨以冷熱風濕之證用藥ノ義也

痢ヲ治者ハ只大便ヲ推下ヲ以テ本トス痢ノ裏急後重ノ則ニ行
コト數十度者ハ腸胃ニ積物アリテ此方下盡サルガ故ナリ是

大便ヲ推下テ腸胃ノ滯物ヲ盡則大便
ノ度數減ノ裏急後重モ亦自退トヲ得也 仍須先調助胃氣

如此冷熱風濕ヲ辨ノ治療スル上ニモ仍先
胃氣ヲ調助ルノ治ヲ兼施ベシトナリ 切ト云意也 不可驟用

嬰粟穀訶子之藥 止澁之復停滯不能疎泄未有不
致危者 痢病ニ切必驟テイソキテ嬰粟穀並ニ訶子等ノ藥ヲ用テ

其大便ヲ急ニ止澁スコトヲ致テ勿レト也蓋嬰粟穀訶子ノ二
藥ハ俱ニ大便ヲ止ノ劑也痢ハ惟推下ベキニ反テ止藥ヲ用則積物

腸胃ニ停リ滯リテ其分疎通下泄セザレバ生命ノ危コトヲ致ザル者ハ
大成論中痰濕卷之三

大或論中痰濕卷之三

有_レジト也_レ疎泄_レモ亦大便_二下_レシ泄_レ云ナリ痢病ノ下_レベキヲ誤リテ止_レル時ハ遂ニ休息痢ト云ニ成リテ甚_ク治療_レ難キ也 凡下痢

之脉宜微小_ニ 此陰脉火イマダ旺ナラズ陰イマダ枯シズ 邪モ亦甚_クシカラサルノ脉故ニ宜シト云 不宜浮

洪_ニ 此陽脉スデニ陰瘦陽熱ノ 宜滑大_ニ 滑ハ津アルノ脉ナレハ也 大ハ胃氣衰ガレバナリ蓋

大ハ脈ノ小弱ナラザル 不宜弦急_ニ 弦ハ津ノ枯タレバナリ急ハ胃ノ

ヲ云洪大ノ大ニハ非ス 氣ノ緩和ヲ失ハナリ大法泄 痢ハ陰病故ニ陰脈ヲ得_レ者ハ宜トス陽脈ヲ得_レ者ヲ惡トス 身寒則

素問通評虛實論ニモ痢ノ脉ハ沉則生浮則死ト云至_レ是也 生身熱則死_ス 痢病ト雖_レ身ノ寒ハ元陽ノ脫虚ニテ宜キニ非ズ

然_レ寒則生ト云者ハ身ノ不熱ヲ云ノ三痢ハ大便 二行コト數十度ナルヲ以テ陰液ヲ損_レ易ク陽熱ヲ動_レ易ク故ニ

身ノ不熱ハ陰液不_レ亡火未_レ滅ガ故ニ病ハ重ト云生_レト云身熱者ハ陰 液損虚ノ火熱ノ旺スルガ故ニ死ト云素問通 問有_レ瘧痢兼作

者_ニ 内外ノ邪氣ヲ相合テ間ニ瘧ト痢ト 惟當分利陰陽_ノ理

解助胃_ヲ 分利_ニ 水穀ノ分利ニ非ズ分別ノ通利スルノ義ナリ陰 陽痢ニモ瘧ニモ各陰陽ノ別アリ先_レ寒者ト寒多キ

者トハ陰瘧ナリ先_レ熱者ト熱多_ク者トハ陽瘧也痢症ニ手足冷ル 者ハ陰症也熱者陽症也赤痢ハ陽ナリ白痢ハ陰也○瘧痢兼作ル

者ハ其症ノ陰陽ヲ分別ノ痢ハ其大便ヲ通利_ニ脾ヲ調理_メ胃氣ヲ 助_ベキナリ瘧痢俱_ニ脾胃ヲ疲_レシムルガ故ニ惟_ニソノ中焦ヲ助理スル

コトヲ 因_ニ毒物致_レ痢者宜_ニ解_レ之_ヲ 食物ノ毒氣ニ因ナリ或_レクサ

主トス 毒ニ因テ痢疾ヲ致_ス者ハ惟_ニソノ 不可_ニ一_レ藥而論_也 痢ヲ治ス

毒物ヲ解スベキ也_レ解_レ俗云毒消也 種々ニテ不同_ク程ニ繁_ク道ニテ議論ス

カラス臨機應變ノ治療セヨト也 嘔吐_ノ 吐逆也嘔ト吐トハ安道方源洵集ノ嘔吐乾嘔噦咳逆

云ハキ出ス物ノニアリテエツキノ聲ナキヲ吐ト云也然則嘔吐ト云ト

キハ一切ノ吐逆ヲ總タル論ナリ嘔吐ハ寒因熱因外感内傷アリト雖 疝所屬ハ中焦 脾胃ニ在_ル者也

人身以胃為主

人身身命之所養者八何ソヤ水穀ニ在ノミ

精神藏府津液筋骨コレヨリ養スト云コトナレ

故ニ人ハ胃ノ府ヲ以テ肝要主ト爲トハ云ナリ

穀ラ和麻表櫻豆コレ五穀也胃ノ府ニ頼テ五穀ヲ但有所傷非不

能食且有嘔吐之患但胃ノ府ノ傷ラルコト有ハ食飲スルノ

且ソノウヘノ意患病ノ義故胃虛之人或爲寒氣所中或爲暑氣所

干或爲飲食所傷或氣結而痰聚皆能令人嘔吐

氣ノ實ニタル者ハ大饑ヲサルコト有ト雖厄病變ヲ致ニ至ラズ若胃虛ノ

人ハ或寒氣ノ爲ニ中ラルレバ寒嘔ヲナス或暑氣ノ爲ニ中ラルレバ熱嘔

ヲナス或飲食ノ爲ニ傷ラルレバ食嘔ヲナス或七情ノ氣ノ鬱結ニ因レ

バ氣嘔ヲナス痰胃口ニ聚レハ痰嘔ヲナス皆此胃虛ノ人ヲ嘔吐せシム

ルニ至ル

者ナリ

又有痰血停積胃口嘔吐之閉雜以涎血

或熱ニ因リ寒ニヨリ食ニ因リテ痰血ヲ生シ其ノ痰血ガ胃ノ上口ニ停ニリ

穢テ嘔吐ヲ致ス者アリ其症ハ嘔吐ノ出ス物ノ悶々涎血ヲ雜ユルト也

涎血トハ吐物ニ雜リテ

當辨其脉證施以治法

以上ノ如クニ

中

食滯氣痰瘀血等ヲ辨ノ其々ニ施ニ所宜ノ治法ヲ以スベト也

寒則脉沉緊

四肢厥冷

飲

食不下

當以溫暖之藥調之

挾者則脉弦數

停食則

消化之

痰聚則

又當清涼之

煩躁而渴

又當清涼之

停食則

消化之

痰聚則

又當清涼之

煩躁而渴

又當清涼之

停食則

消化之

痰聚則

順氣溫胃

彼ノ氣結テ痰胃口ニ聚者ハ鬱氣ヲ順ノ胃
氣ヲ温メヨ九痰ハ寒ニ因テ凝温ニ因テ行ハ也

停積

者多由憂思過度損傷經絡

停積ハ上ノ文ノ痰血停積
胃口ノ養也若痰血留口ニ

停リ積者ハ多ハ憂思等ノ氣鬱過度テ經絡ヲ損イ傷ルガ
故也憂思七情ヲ含ム七情ノ中ニ憂思ハ氣道ヲノ鬱結セシム
ルコトノ甚キ者ナレハ也經絡十二經十五絡カ經絡ハ血ヲノ流行ヒ
シムルノ道ナレバナリ又ノ說ニ靈樞邪客篇ニ心包絡謂之ヲ外經ト
云則此經絡ハ心包絡也ト心ト心包ト同ニ血ヲ主リ且諸ノ氣
ノ根トス故ニ憂思ノ氣結シ又痰血ヲ聚則心包絡ヲ傷ニ至テ
吐血
其脉實大者難治虛細者易愈
此モ亦痰血胃口
ニ聚ルノ脉也脉ノ
實大者ハ陽熱ニ由スルナリ虛細ハ陰脉熱未々旺ノ脉ナリ凡ソ
血ヲ泄ノ症ニ陽脉ハ惡陰脉ハ吉トス吐血ノ間ニ涎血ヲ出則
此モ亦失血ナリ故ニ實大ノ陽脉
ラ已虛細ノ陰脉ヲ相應宜トスル也
吐血之證名狀不一
ノ病々病狀種々
至若脚氣內攻婦人懷妊
ガ内攻或懷

胎惡阻ニ因テ

中毒

一切ノ食毒ニ中テ
嘔吐スル者ヲ云也

困酒

酒ニ困ラ云大酒ニ
困テ嘔吐スルヲ云

俱

有嘔吐

以上ノ如ニ至テモ
亦嘔吐ノ病在ナリ

又須各從其類以求之此證受

不可輕用利藥

又各其病類ニ從テ治法ヲ求テ瘳ズベトナリ此
嘔吐ノ病證ハ支斷ノ輕ク大便通利ノ下藥ヲ用

コト勿ト也蓋嘔吐ハ逆ノ上者也此ニ下利ノ劑ヲ用則上行下行相反逆ノ
害ヲ致セバナリ又利藥ハ利氣ノ劑ヲモ言也獨下利ノ劑ノミナラズ利
氣ノ藥ハ皆辛香散發ス故ニ輕ク利氣
ヲ用ハ上焦ノ元氣ヲ耗散スレバナリ
唯腹滿膨脹視其何部

不利然後利之

和ニテテクレト訓ス若唯腹滿テ膨脹ハ胸腹
ノ中ニ於テ何ノ部位ノ通利セザルヲ考視テ然

ノ後ニ此ヲ通利セヨト也假令臍上ハ心臍邊ハ脾胃左脇ハ肝右脇ハ肺
臍下ハ腎ノ部位ヲ考テ其所不利ハ藏府ノ氣ヲ通利セヨ
部ヲモ分別セズノ輕ク
利藥ヲ用コト勿ト也
二因詳論及此不可不審
以上ノ
論法ハ

陳無擇カニ因方ノ詳ナル論說ヲ此ニ擧及ス程ニ
以上ノ議論ヲ審ニ考未ズンハ有ベカラズトナリ

泄瀉

俗云クダリハヌ也泄瀉モ亦外感内傷アリト雖内傷ヲ兼ズト云コトナレ皆中焦ノ和セザルニ因テナリ

故ニ治法モ亦中焦調和ヲ主トノ施コトヲ致ス也

泄瀉之證經中

内經

所謂飧泄

食物ヲナレズニ下ラ云ナリ

澹泄

内經ニ澹泄

名ナレ字書ニ澹ハ水動負也然則澹泄ハ水瀉ノコトナルベキナリ又或云澹ハ澆ノ字ノ誤ナラント直格方曰澹泄ハ大便稀薄ト然則澹泄モ亦

洞泄

洞ハ筒ト通ス言心ハ飲食咽ニ下入トキ水瀉ノ義ナリ

ノ筒ノ上ヨリ物ヲ入レハ即下

濡泄

此モ亦水瀉ノ義也

溢泄

内經其外ノ諸書ニ溢泄

ノ名ナレ素問六元正記大論ニ血溢ノ名アリト雖凡泄瀉ニハ非ズ血溢ハ上七竅ヨリ血ノ溢出ラ云然則溢泄ノ義不審或云溢泄

水穀注下

水穀不分ノ下ヲ云也一説ニ泄瀉ノ總名トハ誤ナリ

内經ニ所謂ノ以上ノ諸名ハ比皆是泄瀉ノ名ナリ

大腸爲五穀傳送之官

素問靈蘭秘傳

論ニ大腸者傳道之官變化出ト大腸ハ胃中ニテ消化シタル五穀ノ糟粕ヲ傳リテ其ヲ下大便道へ送り行者ナリ故ニ五穀傳送ノ官トハ云ナリ官ハ役

脾胃虛弱飲食過度

此言心ハ大便泄瀉ハ大腸ノ病ノ如ト雖凡其本トハ

脾胃ニ屬ス蓋大腸ハ胃中ニテ消化シタル五穀ノ糟粕ヲ傳送スルノ役耳ニテ大腸ハ傳送スル所ノ源ハ胃ニ在ナリ故ニ脾胃虛弱ナル身ニノ飲食常度ニ過テ脾胃ヲ損ヒ其大過ノ食飲腸胃ニ滯テ遂ニ泄瀉ヲ致者有

或爲風寒暑濕之

氣所中皆能令人泄瀉

脾胃虛弱ニテ飲食過度等ノ有ルルコト有者ハ皆能人ヲ

如傷於風其脉必浮下必帶血

風脉也風ハ動搖ノ氣タリ故ニ風邪腸胃ノ間ヲ傷者ハ其脉浮ニメ大便瀉下ニ血ヲ雜ヘ山也蓋風邪腸胃ニ動スル故ニ帶血ナリ

帶大便ニ血ヲ

當以胃風湯等驅散之

風邪ヨリ瀉スル者ハ治スルニ胃風

湯ノ類ヲ以テ其風邪ヲ驅散スルニ驅散ハ發散ノ義ナリ○按スルニ風ニ所因ノ瀉ト雖凡帶血者ハ發散ニ不宜且胃風湯ハ

白朮 白芍藥 川芎 人參 當歸 肉桂 茯苓 芍藥 本發散
ノ劑ニ非ス然レ何ゾ驅散スヘシトハ云ゾヤ學者宜詳審 **如寒氣**

所傷脈必沉細 脈ノ沉テ細ハ寒邪ニテ **腹肚** 腹ハフノ總名也 肚臍ノノハ

ハフ **切痛** 刀ヲ以テ切テ甚痛 **下必青黑** 所下ノ物或青色或黑色或青黑

色ヲ交出ス云此皆陰 寒氣ノ乘ジタル色トス **當以附子理中湯** 人參 附子 白朮 乾姜 甘草ナリ **治**

中湯 右ノ附子理中湯ノ附子ヲ 去テ青皮陳皮ヲ加者ナリ **等溫腹之** 此等ノ方劑ヲ

氣ヲ温メヨト **若傷於暑則脈沈微** 暑ハ熱邪タリ其脈モ亦洪也 暖温ナリ 大等ノ陽脈ヲ得ヘレ何ゾ

沈細ノ陰脈ヲ得ヤ蓋暑ニ傷ラルレバ汗泄元氣脱テ陽虛ス故ニ 脈反テ沈微ナリ内經ニ寒ハ傷形熱ハ傷氣ト云是也 微細ノ

系ヲ推ガ如ナルヲ **煩渴引飲** 胸中煩熱咽渴テ多湯水ヲ **其** 引飲者ハ暑邪ノ所致ナリ

云陽氣虛疲ノ脈 **下如水** 大便ノ瀉下スルコト如水トハ冷水ノ義ニハ非ズ但水ナリ 下ドヨアケルガ如ヒトイキニ泄下スルヲ云此水穀ノ分

利セザル **當以五苓散** 澤瀉 猪苓 茯苓 白朮 肉桂 ナリ **來復丹** 中暑者門 二見タリ

以分利之 凡胃中ニ消化スル所ノ水穀ハ俱ニ小腸ニ下テ小腸ノ 中ト下口ニ於テ水ハ膀胱ニ分レ入テ溺ニ出穀ハ大腸ニ分

入テ大便ニ出此ヲ水穀分利ト云泄瀉ノ病ヲ致ヤ彼ノ水穀ノ 分利ヲ失テ水穀俱ニ大腸ニ入ガ故ニ大便如水ニ成テ泄下ス

ル也故ニ泄瀉ノ治ハ猪苓澤瀉ノ類ヲ以テ水ヲ引テ小便ニ 通セシムル時ハ大便自堅コトヲ得テ泄瀉愈此ヲ水穀分利ト

云水穀分利ハ諸瀉ノ通治ト雖 或夾食則 或暑邪ニ傷 暑邪ノ症ハ瀉以テ水穀分利行者也 食ヲ相兼ル

症ナラバ **又當以胃苓湯** 胃苓湯ハ世ニ出 下 藜感圓 藜香 トナリ 所知ナリ不及記 中 藜感圓 藜香

感應圓トノ合方也胃苓湯 **若濕氣所中其脈沈緩** 此陰濕 藜感圓ヲ用ト也 藜感圓

腰脚冷痺 濕邪ハ先下焦ニ滯ル故ニ **小便自利** 溺ヲ不覺夕 腰脚冷痺ルコトヲ致ス 通スル也此

寒濕下焦ニ **不渴** 此モ亦寒濕故也濕ニ寒濕ト濕熱トアリ濕 熱症ハ小便赤澁ニ渴ス今此ハ寒濕故ニ小 在ガ故ナリ

便自利ノ其下黃黑色 濕泄ハ大便所下ノ色ニ黃黑ヲ見ス也
蓋濕ハ脾胃ノ兩藏ニ著カ故也黃ハ脾

色黒ハ腎色也 當以參濕湯 蒼朮 白朮 乾姜 茯苓 陳皮 丁香
甘草ナリ此レ寒濕ノ主藥ナリ 藿香

正氣散調之 此等ノ劑ヲ以テ濕ヲ去リ脾胃ヲ調和ス
因停食而泄者下

必臭類抱壞鷄子 停食ハ食滯也抱壞鷄子ハ鷄ノ卵ヲ温メ
握ニテ腐タルヲ云其氣甚惡臭也食滯

泄瀉ハ所下ノ大便必甚臭ノ抱壞鷄子ニホヒ
或噫氣作酸 如クナリト此レ中ニ鬱スル滯食ヲ下ガ故ナリ

先服感應圓 百草霜 杏仁 乾姜 巴豆 肉豆
蔻 木香也食積ヲ下ノ劑ナリ

推其食積而後理脾 感應圓ヲ以テ先其所滯ノ食積ヲ
推下ノ後ニ中焦脾胃ヲ調理スル劑

氣體虛弱及年高之人 年高ハ脾氣虛敗而自
利者 素ヨリ氣射虛弱ノ人。或八年高老人ナドノ脾氣ガ虛

敗テ大便瀉ノ自利者アリ 自利ノ不覺ニ大便ヲ下也

又當投 投ハ進也藥ヲ以テ柱散 附子 白茯苓 人參 木香
也脾胃虛寒ニ元氣不足ノ

泄瀉ヲ 寇附圓 肉豆蔻 附子 良薑 訶子 乾姜 赤石脂 陽起石
主治ス 龍骨 白礬 白茯苓 桂心 細辛也此モ亦脾胃虛

寒ノ泄瀉不止者ヲ治ス四柱散ヨリ 若脾胃氣虛清晨 清晨ハ
モ温コト丸強クテ且止ル劑ナリ 俗ニ云

アサアカツキ也脾胃瀉ノ症ハ必清晨寅ノ時ニ下ル蓋脾ハ丑ノ時ニ旺シ腎ハ
亥子ノ時ニ旺ス故ニ脾胃ノ旺分ヲ過則兩藏ノ虛ヲアラフノ實ノ時ニ

泄瀉ス 世下一二次 脾胃瀉ノ症ハ晝ハ止テ清晨 二神 二神丸
ルナリ 二一一度程ツ、下ル者ナリ 八補骨

脂肉豆蔻ヲ末ノ生薑ヲ煮 四神圓 右ノ一神丸ニ木香 茴香ヲ加也
麩ノ棗肉ト合ツキテ丸トス 或ハ二神丸ニ神麩 麥芽ヲ加也

ル方モ 主之 主治ス 又有腎氣虛而泄者 又脾胃氣ノ三虛ノ
アリ ルヲ云 獨腎氣ノ三虛ノ

大便泄瀉スル者アリ其瀉スル 又須金鎖正元丹 五倍子 茯苓
ヤ夜ノ五更七時ニ必下ルナリ 苓巴戟補

骨脂 肉苁蓉 葫蘆巴 龍骨 以固之 正元丹ヲ以テ腎
朱砂也腎虛ノ泄瀉ヲ主ル也 氣ヲ固クスルナリ 凡

治瀉之法先理其中焦分利水穀然後斷下九泄瀉ヲ

療治スルノ法式ハ先白朮等ヲ用テ其中焦脾胃ヲ調理ノ澤瀉猪苓ノ類ヲ以テ小便道ヲ通ノ水ト穀トヲ分テ通利スレバ大便ハ自堅クナリ分利ノ義ハ見前泄瀉ハ小便ニ所通ル水液ガ大便道ニ交リ入リ因テ也故ニ水穀分利ノ能小便ヲサヘ通セシムレバ大便自下止也然後斷下右ノ如シ中焦ヲ調水穀分利ノモ瀉未止者ハ訶子因豆蔻等ニ止ヨト也斷下ハ止ラズ也泄瀉ハ先不可止惟水穀分利ノ自止ムヤウニスル也如此ニノモ不止醫之大法如此泄瀉ヲ治スルノ大法者斷下セシバナラヌナリハ上文ノ如クナリ醫之醫療若脚氣泄瀉者類求之脚氣ノ症ハ濕熱ニ屬ス故ニ脚氣ニ多ハ泄瀉ノ義ナリ

若脚氣泄瀉者類求之脚氣ノ症ハ濕熱ニ屬ス故ニ脚氣ニ多ハ泄瀉ノ義ナリ滑泄一證最忌五虛滑泄者也言心ハ若脚氣ノ泄瀉ナラバ各脚氣門ニ其ハ治法ヲ求ヨト也五虛者五虛ハ五藏ノ虛症ヲ見スナリ至真要大論ニ五虛

義見 脈細心ノ虚也 皮寒皮膚ノ寒ハ肺ノ虚ナリ 少氣息氣ノ微少ナルハ肝ノ虚ナリ

前後小便泄利大便 飲食不入胃ノ虚也 者是也是ヲ五 若得藥厚カユ 粥薄カユ

入胃泄瀉止則可治也内經ニハ瀉注止則治ニ作也五虛ノ症ニハ飲食ヲ受ツケス者ナリ若五虛ヲ見ト雖凡或必ニテモ飲食ヲ受ツケルコト有テ其ニ從テ泄瀉モ少ク止リコトニナル者ハ胃ノ氣未絶者ナリ故ニ治法ヲ得テ治ヘキ症トナリ

霍亂霍亂ハ四時俱ニ病也病因モ外邪ニテモ内傷ニテモ發スル也上ハ吐逆シ下ハ大便瀉利ノ吐瀉一時ニ發スルヲ

然則揮霍ノ間ニワカニ發ノ腸胃ノ氣ノ繚乱ヲ致カ故ノ病名也俗

夏ノ暑ニ中ニ症ヲ霍乱ト云ハ誤也蓋夏月ハ
冷飲食ヲ過テ霍亂ヲ發者ノ多ニ因テ然リ

霍亂之證多兼卒吐瀉多トハ不定辭也乾霍亂ハ吐瀉セザル也濕霍亂ハ吐瀉スル也世ニ乾霍亂ハ

少ノ濕霍亂ノ者多故ニ云霍亂ノ症多ハ吐瀉兼起トナリ皆由飲食不節飲食ニ過不及アリテ節カラザル

ニヨリ或過殮臍膈乳酪之物臍ハ鳥腸ナリ日本ニ云ナレモノ或タキノ類也膈ハ細切肉トス也

乳酪ハ羊牛馬ノ乳ヲ煉タル物也此皆中焦ニ滯易物トス故ニ此等ヲ食イ過ニ由テ中焦升降ノ化ヲ器テ霍亂ヲ致也殮食也過殮ハ食コト

ノ大過ヲ云傷于五藏過食ニ因テ五藏ヲ損傷シ停積胃脘脘ハ管ト同胃府

上下ロアリテ管ニ似タリ故ニ胃府ヲ胃脘ト云彼ノ大過ノ食物ガ胃府ニ停リ積テト也脾弱不能運化脾ハ胃中ノ飲食ヲ消化スルノ藏ナリ若脾氣ノ強者ハ飲食少ク過コト有ト雖モ滯コトモ無モノ也若其脾氣虛弱ナレバ其ヲ運化スルコト不能ノ中焦ニ塞ル也

又為風寒之氣所干又中焦ノ不調上ニ風寒ニ感傷

運化脾胃コナレヲ云

陰陽隔絕中焦ノ滯ニ因テ上下陰陽ノ升降ガ隔リ絶テ揮霍變亂而成此證揮霍ノ義ハ右ニ見タリ揮霍ニトハ手ヲ反ガ如クニ

一ワカニ腸胃ノ氣ガ變亂ノ此霍亂證ヲ成也輕則上吐下吐瀉一時ニ起ハ濕霍亂ニモ乾霍亂ニ對スレハ輕症也此陰陽隔絶スルガ故ニ吐瀉スル也

瀉ハ俗ニ云カラスナヘ又コムラガヘリナリ此吐瀉ニ因テ兩脚轉筋脾氣疲筋脈燥ガ故也或又邪氣足ニ陰ニ入テモ然甚者遍躄甚重症ハ遍ク身躄皆轉筋スルナリ此脾土虛

轉筋ノ木火ノ旺スルコト甚ク筋脈ノ燥コト極シバナリ腹痛中焦ノ不

疼痛化ガ故也手足厥冷陽氣ノ若欲絕者若病甚

者ナラバ倉卒之際急速ニ宜於臍中灼艾灼ハ燒也灸

臍中ニ或塩ヲ入テ其上ニ灸ス臍中ニ或塩ヲ入テ其上ニ灸ス及用蓼蓼ハ辛温順氣通經

也用ニ兩頭ヲ切去テ使ナリ一把煎湯泡洗泡洗ハ濃ツケテ洗ナリ彼

切去テ使ナリ一把煎湯泡洗蓼ノ煎汁ヲ以テ轉筋ノ

所ヲ洗テ次投以薑附湯乾姜附子ナリ理中湯人參白朮甘草ナリ之

類此等ノ劑ヲ用テ中焦ノ其脉洪大者易治洪大ノ脉ヲ得者ハ

陽氣未脫虚脉微二脉虚微ナルハ元陽ノ腎縮腎ハ外腎陰囊ナリ縮ハ腎氣

虚脫舌捲者難治此ハ心腎元陽ノ又有霍

亂而不吐瀉者此ヲ乾霍亂ト云止其類吐不吐吐ヘキ様ニ覺テ

類利不利大便下ヘキ様ニ覺テ頃刻之間輒時ノ中便致下ト云意

悶絕吐モセズ下モセズ悶乱ノ當多灌鹽湯引其必吐宿

食殆盡然後以嚴氏加減理中湯人參白朮乾姜甘草ナリ治中

湯理中湯ニ青皮陳皮ヲ加者也欬欬調之急ニ悶絶セントセバ鹽湯ノスル

引出テ宿滯ノ食物ヲ殆盡シテ後ニ嚴用和ガ加減理中湯或治中湯ヲ

以テ欬々ニ調和セシメヨト也鹽湯又ルキ程ヨキ者也此胸ニ中テ吐セシガ爲ナリ

宿食食滯也欬欬漸々徐々ノ既愈之後煩熱多渴者霍亂

愈テ後ニ胸中煩熱テ多唾ノ渴コト有者ハト以麥門冬湯人參

十リ此蓋霍亂吐瀉ニ因テ脾肺ニ虛熱ヲ生ノ然リ白朮

夜苓半夏甘草陳皮麥門冬小麥也調之ルナリ夏月中暑亦能令人霍

亂吐瀉夏月ノ暑邪ニ中テモ亦能ノ人ヲノ霍亂吐瀉セシムルト也

多ガ故ニ今ノ俗夏月ノ暑ニ中テ臨證復當詳審霍亂ノ症モ種

病者ヲ霍亂ト云者也實ニ誤トス種アリバ時時

ノ病症ニ臨テ復ゾノ病因治法ヲ詳ニシテ可ナルベシ審モ詳ナリ

秘結秘ハ閉也閉也大便ノ秘結テ難通ヲ云也大便秘結モ其因種種アリ詳ニシテ治シ用ベシ

秘結之證不問氣虛體實之人秘結ノ病證ハ氣弱虚實

分ナク何モ皆ト云意也分ナク何モ皆ト云意也

攝持 養生ノ義 **垂理** 宜道理ニ 垂タカハ **三焦** 上中下 氣道 澁 澁滯

運掉 掉ハ轉也運掉ハ一處ニ運掉ノ流行 不行 通行順行 澁

結於腸 大小腸 **胃之閉** 滯胃ノ氣ガ腸胃ノ間 澁 澁

患 大便秘結ノ病 患ヲ致スト也 **有風秘** 風ハ燥ス者也故ニ風邪肺大腸ニ 寒

秘 寒ハ閉塞凝滯ノ氣也故ニ寒邪腸胃ニ **氣秘** 七情ノ氣鬱ニ 熱

秘 實熱ノ秘結澁 濕秘 濕モ亦氣血ヲ澁ラシテ滯ラス 及因病

發汗利小便過多以致津液枯竭 又因病多汗ヲ發スル 利スルコト常度ニ過テ多クト有ニ因テ津液

耗氣之餘皆成秘結 失血ハ血ヲ泄シ失ノ義血虛也産後 血 血ヲ虛失シ又氣モ能衰ス

血婦人産後失血 血ヲ虚失シ又氣モ能衰ス

也ソノ失血耗氣ノ餘ニ氣液ガ衰ヘ燥ヲ以テ秘結スルコト有也餘アゲノ 三ト云意也皆發汗小便通利ノ病後ニモ産後ニモ皆秘結アリト也

但當審人氣躰虛實脉息 脉ハ息ニ從テ動ス 沈數 沈ハ

トシ氣鬱トシ寒トス數 若何然後用藥 氣躰ノ虛實診脉ノ 虚力實力寒力熱力如何ヤウニ有ト云病因ヲ審メト云義也

治療之 法熱實者通利之 大黃芒硝ノ類ニ直ニ其結滯ノ 寒虛者

溫行之 溫補ノ劑ヲ用テ虚ヲ補寒ヲ 氣結而澁者潤滑

之 氣鬱結ノ澁リ滯者ハ鬱ヲ開キ氣ヲ順スル藥ヲ用テ大便道 風濕而秘者驅

利之 風濕ノ滯ニ秘結者ハ其風濕ノ邪氣 津液枯竭者

九ノ氣滯レバ津液ヲ滯テ不行故ニ大便燥ス 風濕而秘者驅

利之 風濕ノ滯ニ秘結者ハ其風濕ノ邪氣 津液枯竭者

補益之

前二所謂ノ多發汗或多少小便ヲ通シ或産後ノ婦人等

補益ノ潤セバ自

津液枯竭燦テ秘結セハ當歸地黃麥門ノ類ニ血液

大便ハ通利スル也

臨證更宜詳審虛實用藥不可一槩

而論

秘結ノ症モ如此種々病因不同病人ニ臨テ其病症ノ虛實

ヲ詳ニノ藥ヲ用ベシニ槩ニ論スルコト勿ト也

一槩ニ色ニ定ル

コトヲ云一槩ニ極テ論治スヘカラス病症モ治法モ百

端ニ各不同程ニ槩ニ道ニ意得テ論治スヘカスト也

醫方大成論和語卷之三

