




門中御
卷
612

同治

重訂唐王嘉先生外臺秘要方卷第七

心痛心腹痛及
寒疝三十二門

心痛方八首

九種心痛方三首

諸蟲心痛方一十八首

冷氣心痛方五首

惡症心痛方三首

心痛癥塊方二首

心背徹痛方四首

卒心痛方一十四首

中惡心痛方五首

同氏
齊

小臺必

七卷目錄

一

經余

多唾停飲心痛方二首

心下懸急懊痛方四首

心痛不能飲食方二首

久心痛方六首

雜療心痛方三首

腹痛方四首

卒腹痛方七首

心腹痛及脹滿痛方一十首

心腹脹滿及鼓脹方一十四首

卒心腹脹滿方六首

腹脹雷鳴方三首

腹內諸氣及脹不下食方一十一首

灸諸脹滿及結氣法二十二首

胃脅痛及妨悶方四首

脅肋痛方二首

胃膈氣方三首

寒疝腹痛方九首

寒疝心痛方三首

卒疝方三首

七疝方三首

寒痛不能食方四首

寒疝積聚方四首

心痛方四首

唐王肅先生外臺秘要方第七卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等 上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

門侄林 雲來父仝校

心痛方八首

病源心痛者由風冷邪氣乘於心也其痛發有死者有不死者有久成疹者心為諸藏主而藏神其正經不可傷傷之而痛為真心痛朝發夕死夕發朝死心有支別之絡脉其為風冷所乘不傷於正經者亦令心痛則乍間乍甚故成疹不死

疹

疹

時若

又心為火與諸陽會合而手少陰心之經也若諸陽氣虛少陰之經氣逆謂之陽虛陰厥亦令心痛其痛引喉是也又諸藏虛受病氣乘於心者亦令心痛則心下急痛謂之脾心痛也足太陰為脾之經與胃合足陽明為胃之經氣虛逆乘心而痛其狀腹脹歸於心而痛甚謂之胃心痛也腎之經足少陰是也與膀胱合膀胱之經足太陽是也此二經俱虛而逆逆氣乘心而痛者其狀下重不自收持苦泄寒中為腎心痛也診其心脉急者為心痛引背食不下寸口脉沉緊苦心下有寒時痛

關上脉緊心下苦痛

左手寸口脉沉則為陰陰絕者無心脉也苦心下毒痛第十六卷中

備急療心痛方

桂心末溫酒服方寸七須臾六七服乾薑依上法服之亦佳忌生葱
文仲集驗附後同出第三卷中

延年療心痛藥方

吳茱萸一兩半 乾薑一兩半 桂心一兩 白朮二兩

人參一兩 橘皮一兩 附子一兩半 蜀椒一兩
出汗

甘草一兩 黃芩一兩 當歸一兩

細切

及目汗

小臺必妥

七卷

二

經餘居

右十一味，搗篩為散，蜜丸，一服五丸，如梧子大，日三服，稍加至十五丸。忌猪肉、生葱、海藻、菰菜、桃李、雀肉等藥。盡更合酒飲，無拘食前後任意。肘後有桔梗一兩，出第十五卷中。

救急療心痛方

取驢糞絞取汁五六合，及熱頓服，立差。肘後同。

又方

東引桃枝一握，切以酒一升煎取半升，頓服，大効。肘後同，出第八卷中。

必効療心痛方

當歸末，酒服方寸匕，頓服。備急文仲同。

又方

生油半合，溫服差。肘後備急張文仲同，並出第五卷中。

古今錄驗療心痛黃連湯方

黃連 八兩

右一物，咬咀，以水七升煮取一升五合，絞去滓，適寒溫飲五合，日三服。猪肉冷水。肘後范汪同，出第八卷中。

九種心痛方三首

廣濟療九種心痛，蛔蟲冷氣，先從兩肋，胃背撮痛，欲變吐。

當歸鶴蟲散方

當歸 八分 鶴蟲 八分 橘皮 六分 人參 六分

檳榔 十二分

枳實 六分

芍藥 六分

桂心 五分

右八味搗篩為散，空腹煮薑棗飲，服方寸匕，日二服，漸

漸加至一匕半。不利，忌生葱、生冷物、油膩、粘食。出第四卷中

千金療九種心痛：一蟲心痛，二注心痛，三氣心痛，四悸心

痛，五食心痛，六飲心痛，七冷心痛，八熱心痛，九去來心痛。

悉主之。并療冷衝上氣、落馬墮車，附子丸方。

附子 一兩

巴豆 人 一兩去心皮熬

人參 一兩

生狼毒 一兩炙令極香

食茱萸 一兩

乾薑 一兩

右六味搗末，蜜和，空腹服如梧子三九，一日一服。弱者

二九，卒中惡心痛，口不能言，連年積冷流注，心胃痛者。

不傳

亦服之，好好將息，神効。忌野猪肉、蘆筍。必効經心錄同

又療九種心痛方

取當太歲上新生槐枝一握，去兩頭，水三升，煮一升

頓服之。並出第十三卷中

諸蟲心痛方一十八首

廣濟療諸蟲心痛，無問冷熱，蛔蟲心痛，檳榔、鶴蝮散方。

當歸

桔梗

芍藥

橘皮

鶴蝮 各八分

人參 六分

桂心 六分

檳榔 十分

右八味搗篩為散，空腹煮薑棗湯，服方寸匕，漸漸加至

二七，不利，忌豬肉、生葱、油膩、小豆、粘食等。

又療蛔蟲心痛積年久不差方

取苦酒五合燒青錢二文令赤安酒中則取雞子白一顆去却錢瀉著酒子頓服之差無所忌

又主心腹攪結痛不止仍似有蛔蟲者當歸湯方

當歸

橘皮

細辛

甘草炙

生薑

各四分

大黃

八分別漬

鶴蝩

二分

右七味切以水六升煮取二升分溫三服如人行四五里進一服不利未差三日更作服之忌海藻菰菜生菜救急同出第四卷中

小品溫中當歸湯療暴冷心腹刺痛面目青肉冷汗出欲

桔

霍亂吐下脉沉細者及傷寒毒冷下清水變作青白瀉下及白瀉後還復下清水者悉主之此方可以調諸冷痛也

當歸

人參

乾薑

茯苓

厚朴炙

青木香

桂心

桔梗

芍藥

甘草

炙各二兩

右十味切以水八升煮取三升分溫三服日三服不耐青木香者以犀角一兩代之忌海藻菰菜猪肉醋物生葱等

又凡厥心痛與背相引喜痙癢如物從後觸其心身偃僵者腎心痛也

著

從居間
痛真

種行

種

外臺秘要

五

經餘居

厥心痛腹脹滿不欲食食則不消心痛尤甚者胃心痛也

厥心痛痛如錐鍼刺其心心痛甚者脾心痛也

厥心痛色蒼如死灰狀不得太息者肝心痛也千金同

厥心痛卧舉徒居痛間動作痛益甚色不變肺心痛也

真心痛手足清至節心痛甚旦發夕死夕發旦死

心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止腹中熱喜涎出

是蛭蟲咬也出甲乙經第一卷中

千金療心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止多熱喜

涎出是蛭蟲咬也並宜溫中當歸湯服兩三劑後若不効

有異宜改方增損湯其溫中當歸湯在前一品方中此是

增損湯方

芍藥 六兩

黃芩 四兩

厚朴 四兩

桔梗 四兩

柴胡 四兩

當歸 三兩

升麻 三兩

右七味切以水八升煮取二升半分三服忌豬肉出第十三

卷中

張文仲療蛔蟲心痛鶴蝨散方

鶴蝨二分末溫酢一盞和服之蟲當出備急千金同

又乾漆丸方

乾漆熬搗蜜和丸服十五丸日再備急同

又方

小臺必要

七卷

六

經餘居

取槐上木耳燒灰末如棗大正發和水服若不止飲熱水一升蛔蟲立出必効方云酒下備急同

又方

發時取鹽一匙內口中水下立定蟲即出備急同出第一卷中延年療蛔蟲惡吐水心痛鶴蝨丸方

鶴蝨三兩擣篩蜜和爲丸用蜜漿水平旦服二十九

日只一服古今錄驗用十兩云韋雲忠心痛十年不差令服此便愈

又鶴蝨丸療蛔蟲心痛方

鶴蝨 六兩 吳茱萸 五兩 橘皮 四兩 桂心 三兩

檳榔 四兩

各依前法
相逐得食
不腹則得食
余可過於
難方內見
服之便差

匕

右五味擣篩蜜和爲丸如梧子大一服二十九蜜湯下日二服加至三十九以蟲出爲度忌生葱出第十五卷中救急療心痛不可忍似蛔者胡粉丸方

生真胡麻 一合 胡粉 半合熬擣

右二味先以猪肉脯一片空腹啖嚥汁勿嚥肉後取胡粉和胡麻搜作丸以少清酒使成頓服盡十歲以上斟酌增減忌生冷猪肉魚雞蒜酢滑等七日若是蛔吐水者是也出第八卷中

必効療蝨心痛方士弱氏曰蝨井中小虫蓋痛一處若小

取鰻鱺魚淡炙令熟與患人喫一二枚永差飽食佳

非蝨蝨
切誤作

又方

熊膽如大豆和水服大効

又茱萸丸方

吳茱萸 一升

桂心 二兩

當歸 二兩

右三味搗篩蜜和丸如梧子酒服三十九日再服漸加至四十九以知爲度忌生葱

又丁香散方

丁香

七枚

頭髮灰

一棗許

右二味並末和酒服之

又鵲巢檳榔湯方

鵲巢

二兩小兒用一兩

檳榔

二七枚

右二味以豬肉汁六升煮檳榔取三升去滓內鵲巢末

先夜不食明旦空腹頓服之須臾病下及吐水永差神

効七日禁生冷酢並出第五卷中

冷氣心痛方五首

廣濟主冷氣心痛脇下鳴轉喉中妨食不消常生食氣每

食心頭住不下桔梗散方

桔梗

當歸

芍藥

茯苓

橘皮

厚朴

白朮

草撥

豈薤子

四分

檳榔

六分

桂心

六分

訶梨勒皮

六分

人

多

處滑高天

大腹切碎皮子

右十二味，搗篩為散，空腹煮薑棗飲服，方寸匕，日二服。加至一七半，不利，忌生葱、猪肉、酢物、桃李、雀肉等。實不用桔梗，出第四卷中。

深師療胃滿短氣心痛吐涎虛冷防風茯苓湯方

防風 二兩

茯苓 二兩

桂心 六兩

甘草 二兩

半夏 四兩

乾薑 四兩

人參 三兩

右七味切，以水一斗，煮取三升，絞去滓，分三服。良忌酢物、生葱、海藻、菰菜、羊肉、饅頭。出第十六卷中。

崔氏療心痛與冷氣痛者特相宜烏頭丸方

烏頭 三兩

附子 三兩

赤石脂 三兩

蜀椒 二兩

物

去目及
閉暑者

頭又服三九

他。他云

又

右六物，搗篩，蜜和為丸。痛發時，溫清酒服三九，如梧子。覺至痛處，痛則止。若不止，加至五六九，以知為度。若早朝服，無所覺，至午時又服三九。此方丹陽有隱士出山，云得華佗法，其療略同。若久心痛，每旦服三九，稍加至十九，盡一劑，遂終身不發。忌生葱、豬肉。張文仲備急同，出第四卷中。

延年療冷氣久刺心痛不能食方

當歸

桂心

桔梗

吳茱萸

人參

白朮

高良薑

已上各六分

橘皮 三分

右八味，搗篩為散，蜜和為丸，如梧子大，一服十九，酒下。

日二服加至十五二十九為度忌生葱桃李猪肉雀肉等

又療心痛冷痛腹滿如錐針刺及蟲嚙心痛當歸湯方

當歸 三兩

桔梗 二兩

吳茱萸 三兩

桂心 三兩

芍藥 二兩

大黃 二兩

右六味切以水六升煮取三升三合去滓內鵲蝨一兩攪溫一沸分三服空腹服之微利為度忌猪肉生葱出第十五卷中

惡症心痛方三首

廣濟療惡症撮肋連心痛當歸湯方

當歸 八分

青木香 六分

檳榔 十顆

麝香 一錢

右四味切以小便一大升半煮取六大合絞去滓下麝香末分溫三服服別如人行四五里進一服微微利忌生菜熱麪猪犬肉粘食蒜陳臭物出第四卷中

崔氏療症在心腹痛不可忍方

取東引桃枝削去蒼皮取白皮一握以水二大升煮取半升一服令盡則差如不定更依前服之無忌

又療心腹痛不可忍似症病者或暴得惡症攪刺欲死桃人大黃湯方

鬼箭羽 二兩

桃人 六十枚 芍藥 四兩

鬼白 二兩 剉去皮

一
鹿醢切別
湯飲熱
內之

癰

癰

外臺秘要

七

總餘居

橘皮 二兩

當歸 二兩

生薑 五兩

桂心 二兩

柴胡 二兩

朱砂 二兩
湯成下

麝香 一分
研

朴消 二兩
湯成下

大黃 三兩
別浸

右十三味切以水九升急火煮取三升溫分三服如人行相去六七里服但得快利三四行必差忌生葱生血物並出第四卷中

心痛癥塊方二首

廣濟療心痛癥塊硬築心氣欲絕當歸湯方

當歸

桔梗

芍藥 各八分

厚朴 十分

橘皮 八分

人參 六分

高良薑 十分

桃人 五十枚
去皮尖

生薑 八分

右九味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服服別相去如人行六七里進一服不利忌猪肉生冷油膩雞魚粘食小豆大蒜出第四卷中

張文仲療心下堅痛大如枕邊如旋棹

音盤

名為氣分水飲

所結方

枳實 七枚

白朮 三兩

右二味切以水一斗煮取三升分三服腹中軟即當散也忌桃李雀肉等此張仲景傷寒論方薄急肘後同出第一卷中

心背徹痛方四首

小臺必要

八七卷

七

經余居

仲景傷寒論心痛徹背背痛徹心烏頭赤石脂丸主之方

烏頭二分炮附子一分炮赤石脂二分乾薑二分

蜀椒一分

右五味擣篩蜜和丸先食服如麻子大一服三丸少少

加之忌猪肉冷水千金必効文仲范汪經心錄等同出第十五卷中千金分兩小別

張文仲蜀椒丸療胃中氣滿心痛引背方

蜀椒一升半夏一升附子一兩

右三味擣篩蜜和為丸如梧子大一服五丸日三忌猪

羊肉錫等出第三卷中

范汪療心下切痛引背胃下蓄氣胃中有宿食茱萸煎方

吳茱萸一升蜀椒五升甘草二兩

乾地黄一斤

右四味以清酒三升漬三宿絞取汁銅器中煎令沸麥

門冬五升去心乾漆一斤內煎中色黃絞去之內石斛

五兩阿膠一斤白蜜六升凡九味以湯煎令可丸取如

棗大含稍稍咽之日三甚者日五六服膝脛重痛者加

石斛少氣加麥門冬服藥五日愈當下瘕忌海藻菘菜

蕉蕒等奉車都尉陳蓋試有驗

又芫花湯主卒心痛連背背痛徹心心腹並懊痛如鬼所

刺絞急欲死者方

成擇

蓄在

成擇

藥溫中下
氣稍益體
中病
癰

芫花 十分

大黃 十分

右二味擣下篩取四方寸七著二升半苦酒中合煎得一升二合頓服盡須臾當吐吐便愈老小從小起此療強實人良若虛冷心痛恐未必可服前出第十卷中

卒心痛方一十四首

肘後療卒心痛方

先煮三沸湯一升以鹽一升合攪飲之若無火以作湯仍可用水鹽或半升服之古今錄驗同

又方

吳茱萸 二升

生薑 四兩

切

豉 一升

酒 六升

右四味煮取二升半分三服

又方

白艾成熟者三升以水三升煮取一升去滓頓服之若為客氣所中者當吐蟲物出范汪同

又方

取竈下熱灰篩去炭分以布囊盛令灼灼爾更燄以熨痛上冷者更熬令熱

又桂心散方

桂心

當歸

各一兩

梔子人

十四枚

右三味擣為散酒服方寸匕日三五服亦主久心痛發

一似字缺
下書

作有時節者忌生葱

又桂心丸方

桂心 一兩

烏頭 一兩炮

右二味搗篩蜜和為丸如梧子服三九稍增之忌生葱
豬肉

又療暴得心痛如刺苦參湯方

苦參 二兩

龍膽 二兩

升麻 二兩

梔子人三兩

右四味切苦酒五升煮取一升分二服當大吐乃差
第一卷中

集驗卒心痛桂心湯方

桂心 八兩

右一味以水四升煮取一升半分二服忌生葱
同出第一卷中

張文仲療卒心痛方

取敗布裹鹽如彈子燒令赤末以酒一杯和服之
備急同出第五卷中

又方

閉氣忍之數十過并以手大指按心下宛宛中取差
肘後備急同

又方

苦酒一升破雞子一枚著中合攪飲之好酒亦佳附後

又方

蒸大豆若煮之以囊盛更番熨心上冷復易之附後

救急療卒心痛不能起止方

井華水一大升

蜜半合

右二味相和婦人患令男子度與飲男子患令婦人度與飲必愈出第八卷中

必効療卒心痛人參湯方

擘

人參

桂心

梔子

黃芩

甘草

各一兩炙

右五味切以水六升煮取二升分三服則愈奇効忌海藻菰菜生葱附後同出第五卷中

中惡心痛方五首

廣濟療卒中惡心腹絞刺痛氣急脹奄奄欲絕瓜蒂散方

雄黃

四兩研

赤小豆

四分熬

瓜蒂

三分

右三味搗篩為散空肚溫漿水服一錢七半當吐止不吐加至兩錢七忌生冷油膩粘食陳臭等

又療卒中惡心腹刺痛去惡氣麝香散方

麝香研一分 生犀角屑二分 青木香二分

右三味搗篩為散空肚以熱水服方寸匕立愈未止更服之不利忌五辛並出第四卷中

集驗療卒暴心痛或中惡氣毒痛不可忍方

大黃四兩 芍藥四兩 升麻三兩 黃芩三兩

鬼箭三兩 鬼白二兩 桂心二兩 桔梗三兩

柴胡四兩 朱砂別研二兩 朴消二兩

右十一味切以水九升煮取二升七合分三服先分朱砂作三分一服內一分攪朱砂調服之此湯快利若痛不止宜服後方忌豬肉生葱生血物千金云寒氣卒客於五藏六腑中則

發心痛方千金同

又方

赤芍藥六兩 桔梗五兩 杏仁五兩去尖皮

右三味切以水六升煮取二升半分三服日三忌豬肉

千金同出第一卷中

千金療卒中惡心痛方

苦參三兩切 好醋一升半

右二味以醋煮苦參取八合強人頓服老小二服出第十三

卷中

多垂停飲心痛方二首

病源心痛而多唾者停飲乘心之絡故也停飲者水液之所為也心氣通於口心與小腸合俱象火小腸心之腑也其水氣下行於小腸為洩便則心絡無有停飲也膀胱與腎俱象水膀胱為腎之腑主藏津液腎之液上為唾腎氣下通於陰若腑藏和平則水液下流宣利若冷熱相乘致腑藏不調津液水飲停積上迫於心令心氣不宣暢故痛而多唾也出第十六卷中

范汪療胃中寒熱心痛清唾滿口數數欲吐食不化乾薑九方

乾薑 一分

桂心 一分

礬石 一分熬半夏 一分

湯洗

蜀椒 一分

右五味搗篩蜜和丸如大豆許服二丸日三不知稍加
以知為度忌生葱羊肉餒出第十八卷中

集驗療心痛唾多似蟲者方

取六畜心隨得生切作四瓣刀縱橫各一割破之內
少真朱砂著中平旦吞之蟲死愈矣無真朱砂可用
雄黃麝香也肘後云切作十四瓣刀縱橫各割之以
真丹一兩粉內割中旦悉吞之入雄黃
麝香佳肘後經心錄同出第一卷中通按生食果安否

心下懸急懊痛方四首

病源心與小腸合為表裏俱象於火而火為陽氣也心為

橫 橫 作

諸藏主故正經不受邪若為邪所傷而痛則死若支別絡為風邪所乘而痛則經久成疹其痛懸急懊者是邪迫於陽氣不得宣暢擁瘀生熱故心如懸而急煩懊痛也出第十六卷中

仲景傷寒論心下懸痛諸逆大虛者桂心生薑枳實湯主之方

桂心 三兩 生薑 三兩 枳實 五枚炙

右三味切以水六升煮取三升去滓溫分三服忌生葱范汪同出十五卷中

肘後薑附丸方

附子 二兩炮 乾薑 一兩

右二味搗篩蜜和丸如梧子服四丸酒飲並得日三服忌猪肉冷水本方云治心肺傷動冷痛出第一卷中

古今錄驗療人心痛懊懣怕悶築築引兩乳又或如刺因極桂心湯方通按怕音怕躁急也

桂心 半兩 茱萸 二兩 芍藥 三兩 當歸 二兩

生薑 半斤無生薑以乾薑五兩代之

右五味切以水一斗二升煮取四升服一升晝三夜一良有驗忌生葱出第八卷中

千金心下痞諸逆懸痛桂心三物湯主之方

桂心 二兩

膠飴 半斤

生薑 二兩

右藥切以水四升煮二味取三升去滓內飴分三服忌生葱出第十三卷中

心痛不能飲食方二首

病源心痛而不能飲食者積冷在內客於脾而乘心絡故也心陽氣也冷陰氣也冷乘於心陰陽相乘冷熱相擊故令痛也脾主消水穀冷氣客之則脾氣冷弱不勝於水穀也心為火脾為土是母子也俱為邪所乘故痛復不能飲食也出第十九卷中

廣濟療久心刺肋冷氣結痛不能食高良薑湯方

高良薑 十分

當歸 十分

橘皮 八分

厚朴 十分

桔梗 八分

桃人 五十枚去尖皮

吳茱萸 八分

生薑 八分

訶梨勒 五分

右九味切以水八升煮取二升八合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里再服忌猪肉生冷油膩粘食小豆等出第四卷中

肘後療常患心痛不能飲食頭中疼重烏頭丸方

烏頭 六分

椒 六分

乾薑 四分

桂心 四分

右四味搗末蜜丸酒服如大豆四丸稍稍增之忌生葱

出第一卷中

兩人碎

六

久心痛方六首

病源心為諸藏主其正經不可傷傷之而痛者則朝發夕死夕發朝死不暇展療其人心痛者是心之支別絡為風邪冷氣所乘痛也故成疹不死發作有時經久不差也出第十六卷中

熱赤

廣濟療心痛三十年不差月上旬殺蟲雷丸鶴蝨散方

雷丸 八分

鶴蝨 八分

貫衆 八分

狼牙 八分

桂心 八分

當歸 八分

檳榔 八分

右七味搗篩為散空腹煮蜜水半雞子許服方寸七日二服若重不過三服則差不利忌生葱生冷油膩猪魚

人

小豆大蒜等出第四卷中

范汪療久心痛烏頭赤石脂丸方

赤石脂

乾薑

桂心

椒汗

烏頭炮

右五味等分末之蜜和丸如梧子服三丸日三以知為度赤石脂當取斑斑赤中者忌猪肉冷水生葱出第十卷中必効療三十年心痛方

桃人七枚去皮尖

右一味研湯水合頓服酒服亦良

肘後經心錄同出第五卷中

古今錄驗療久心痛腹痛積年定不過一時間還發發甚

及目
去閉暑

兩人熱

則數日不能食又便出乾血窮天下方不差甄立言為處
犀角丸服之數日更差方

犀角二分

麝香二分

朱砂四分 桔梗二分

莽草二分

鬼白二分

附子二分 桂心二分

貝齒五枚

甘草六分

芫花二分 巴豆二十枚

赤足蜈蚣二枚 去足炙

右十三味搗篩蜜和丸如梧子飲服一丸日漸加至三九
以利為度忌生葱猪肉野猪肉蘆笋生血物一方無附子千金有
雄黃二分 出第八卷中

療心痛如蟲嚙痛宛轉欲死不救方

抗下

正食錄其
上便
絳

又濃搗地黃汁和麴作冷淘不用鹽服一頓蟲即出
不出再服必出便差正元十年通事舍人崔抗女患
心痛垂氣欲絕忽記此方服便吐出一物可方一寸
以來狀如蝦蟇無目足微似有口蓋被此物所蝕抗
云往年見親表患心痛因偶食地黃餅飢遂吐一蟲
猶動其時亦不謂地黃冷淘能害此蟲因盛於小竹
筒以數莖地黃冷淘投於竹筒中須臾視之已化為
水然覺此冷淘殺蟲心痛無不永絕抗自得此方救
三四人皆如神効出手抄方

經心錄療四十年心痛不差方

外臺秘要 卷之八 經餘居

黍米瀉汁溫服隨多少出第一卷中

雜療心痛方三首

廣濟療心痛又心撮肋心悶則吐血手足煩疼食飲不入

桃人丸方

桃人八分去皮尖當歸六分芍藥八分訶梨勒六分

甘草六分炙延胡索四分人參六分檳榔十四枚

右八味擣篩蜜丸如梧子以酒空腹下二十九漸加至

二十九日再服取快利忌海藻菰菜生菜熱麴蕎麥猪

大肉粘食出第四卷中

古今錄驗真心痛証手足青至節心痛甚者旦發夕死夕

發旦死療心痛痛及已死方

高其枕柱其膝欲令腹皮蹙柔瓜其臍上三寸胃管

有頃其人患痛短氣欲令人舉手者小舉手問痛差

緩者止出第八卷中

救急療心痛冷熱方

取伏龍肝末煮水服方寸匕若冷以酒和服差范汪經心

錄同出第八卷中

腹痛方四首

病源腹痛者由腑藏虛寒冷之氣客於腸胃募原之間結

聚不散正氣與邪氣交爭相擊故痛其有冷氣搏於陰經

小臺必要 卷之七 經餘居

者則腹痛而腸鳴謂之寒中是陽氣不足陰氣有餘者也
 診其寸口脉沉而緊則腹痛尺脉緊臍下痛脉沉遲腹痛
 脉來觸觸者少腹痛脉陰弦則腹痛凡腹急痛此裏之有
 病其脉當沉若細而反浮大故當愈矣其人不即愈者必
 當死以其病與脉相反故也其湯熨針石別有正方補養
 宜導今附於後養生方導引法云股脛手臂痛法屈一脛
 臂中所痛者正偃卧口鼻閉氣腹痛以意推之想氣徃至
 痛上俱熱即愈又云偃卧展兩脛兩手仰足指以鼻內氣
 自極七息除腹中弦急切痛又云偃卧口內氣鼻出之除
 裏急飽咽氣數十令溫中寒乾吐嘔腹痛口內氣七十所

大振腹咽氣數十兩手相摩令熱以摩腹令氣下出第十卷中
 張文仲當歸大黃療冷氣牽引腰背肋下腹內痛方

當歸 三兩 芍藥 八分 桂心 三分 乾薑 六分

茱萸 五分 人參 一兩 大黃 一兩 甘草 二兩

右八味切以水六升煮取三升去滓溫服一升日三忌

海藻菰菜生葱出第三卷中

范汪四物當歸湯主寒腹痛方

當歸 桂心 乾薑 各三兩 甘草 二兩

右切以水八升煮取三升一服一升日三服虛冷激痛

甚者加黃耆芍藥各二兩忌海藻菰菜生葱千金無甘草有附子

小品療寒冷腹痛茱萸湯方

吳茱萸二兩

甘草炙

人參

桂心各一兩

生薑五兩

半夏一升

小麥一升

當歸二兩

右八味切以水一斗五升煮取三升分溫服一升日三

服忌海藻菘菜羊肉錫生葱千金桂二兩生薑切一升

古今錄驗芎藭湯療卒寒腹中拘急痛方

芎藭

當歸

桂心

芍藥

甘草炙各一兩

黃芩半兩

乾薑半兩

杏仁三十枚去皮尖

右八味切以水五升煮取二升分再服忌海藻菘菜生

兩人煮

世第八卷中

卒腹痛方七首

肘後療卒腹痛方

粳米二升

右一味以水六升煮取六七沸飲之

又方

掘土作小坎以水滿坎中熟攪取汁飲之差並出第一卷中

張文仲療卒腹痛方

令病人卧高枕一尺許柱膝使腹皮踧氣人曾令人

瓜其臍上三寸便愈能乾咽吞氣數十過者彌佳亦

漆便齊

灸

療心痛用後備急同

又方

灸兩足指頭各十四壯使火俱下良備急用後同並出第一卷中

千金療胃腹中卒痛生薑湯方

生薑一斤搗取汁

食蜜八兩

醍醐四兩

右三味微火上熬令相得適寒溫服三合日三出第十卷中

集驗療卒腹痛葛氏方

桂末三七酒服人參上好乾薑亦佳忌生葱附後文仲同

又方

食鹽一大把多飲水送取吐附後張文仲同並出第一卷中

心腹痛及脹滿痛方一十首

病源心腹痛者由腑藏虛弱風寒客於其間故也邪氣發作與正氣相擊上衝於心則心痛下攻於腹則腹痛上下相攻故心腹絞痛氣不得息診其脉左手寸口人迎以前脉手少陰經也沉者為陰陰虛者病苦心腹痛難以言心如寒狀心腹痛痛不得息脉細小者生大堅疾者死心腹痛脉沉細小者生浮大而疾者死其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云行大道常度日月星辰清靜以雞鳴安身卧漱口三咽之調五藏殺蠱蟲令人長生療心腹痛出第十六卷中

廣濟療心腹中氣時時痛食冷物則不安穩及惡水桔梗散方

桔梗

茯苓

各八分

枳實

人參

厚朴

芍藥

橘皮

桂心

檳榔

麥門冬

去心

右十味搗篩爲散空肚煮薑棗飲服方寸七日三服漸加至一七半熱以茶飲下不利忌猪肉酢物生葱生冷油膩小豆粘食熱麵炙肉等物又療卒心腹痛氣脹滿不下食欲得瀉三兩行佳當歸湯方

當歸

茯苓

桔梗

橘皮

高良薑

檳榔

各八分

生薑

八分

右七味細切以水七升煮取二升三合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里服訖利三兩行宜停後服忌猪肉酢物生冷油膩魚蒜粘食小豆並出第十五卷肘後療心腹俱脹痛煩滿短氣欲死或已絕方

梔子

十四枚

豉

七合

右二味以水二升先煮豉取一升二合去滓內梔子更煎取八合絞去滓服半升不愈者盡服之備急文仲同

又方

外臺必用

七卷

經餘居

綿裹

烏梅二七枚水五升煮一沸內青大錢二七文煮取一升半強人可頓服羸人分再服當下愈文仲同

又方

茱萸二兩

生薑

四兩切

豉三合

右三味酒四升煮取二升分三服即差

又療心腹相連常脹痛狼毒丸方

狼毒二兩炙

附子半兩炮

右二味擣篩蜜和丸服如梧子一日服一九二日二丸三日三丸自一至三以為常服即差忌猪肉冷水

又方

再服三九
日服三九
當避食

擣葱

深師療久寒冷胃膈滿心腹絞痛不能食忽氣吸吸不足

前胡湯方

前胡一兩

羊脂二兩

大棗

二十枚

當歸

一兩

茯苓一兩

白朮一兩

芍藥

六分

桂心

一兩

半夏二兩

乾薑

一兩

麥門冬

六分去心

吳茱萸

三百粒

右十二味切以水八升煮取三升分三服相去如人行

洗

摩

二 三

擻

十里進一服忌酢物生葱羊肉錫桃李雀肉等出第十卷中

小品當歸湯療心腹絞痛諸虛冷氣滿方

當歸 三兩

乾薑 四兩

甘草 三兩

芍藥 二兩

厚朴 三兩

黃耆 二兩

蜀椒 一兩

半夏 三兩

肉桂 三兩

人參 三兩

右十味切以水一斗煮取三升二合強人可一升羸人服八合大冷者加附子一枚炮忌海藻菰菜羊肉錫生葱古今錄驗千金同

急繞痛

脹痛方

古今錄驗通命丸療心腹積聚寒中絞痛又心迫滿脅下

大黃

遠志 去心

黃芩

麻黃 去節

甘草

炙已上各四兩

芒消 三兩

杏仁

六十枚去皮尖豉 二合

巴豆

五十枚去心皮熬別為脂

右九味擻合下篩蜜和丸如梧子大先食飲服三九日

三忌野猪肉蘆笋海藻菰菜出第八卷中

心腹脹滿及鼓脹方一十四首

病源心腹脹者藏虛而邪氣客之乘於心脾故也足太陰脾之經也脾虛則脹足少陰腎之經也其脉起於足小指之下循行上絡膀胱其直者從腎上入肺其支者從肺出絡於心藏虛邪氣客於二經與正氣相搏積聚在內氣并

小臺必

七卷

三

經餘居

詠

膠

熬

人

變

於脾脾虛則脹故令心腹煩滿氣急而脹也診其脉遲而滑者脹滿也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云伸右脛屈左膝內壓之五息引脾去心腹寒熱胃臆邪氣依經爲之引脾中熱氣出去心腹中寒熱胃臆中邪氣脹滿久行之無有寒熱時節之所中傷名爲眞人之方出第十六卷中

廣濟療心腹脹滿臍下塊硬如石疼痛不止芍藥丸方

芍藥

當歸

白朮

鼈甲

炙各八分

訶梨勒

十顆去核

乾薑

人參

各六分

豆蔻

雄雀屎

各四分

郁李人

十分去皮

右十味擣篩蜜和爲丸如梧子大空肚以酒下二十

漸加至三十九日再服不吐不利忌生菜熱麪葱薑桃

李雀肉蒜粘食等物

又療鼓脹氣急衝心硬痛鼈甲丸方

鼈甲

芍藥

枳實

人參

檳榔

各八分

訶梨勒

大黃

各六分

桂心

四分

橘皮

四分

右九味擣篩爲末蜜和爲丸空肚以酒服如梧子大二十九丸漸加至三十九日二服微利爲度忌生葱薑菜炙

肉蒜麪等

又療鼓脹氣急通草湯方

通草

茯苓

玄參

桑白皮

白薇

澤瀉 各三兩

人參 二兩

郁李人 五兩

澤漆葉 升切一

右九味切以水一斗煮取三升去滓分溫四服服別相

去如人行六七里進一服不利忌熱酒膩酢粘食等

又療鼓脹上下腫心腹堅強喘息氣急連陰腫坐不得仍

下赤黑血汁日夜不停者茯苓湯方

茯苓 二兩

防已 半一兩

橘皮 一兩

玄參 一兩

黃芩 半一兩

澤瀉 半一兩

杏仁 二兩半白木 半一兩

兩入熬

麩

大豆 半一升

郁李人 半二兩 桑白皮 半二兩 澤漆葉 升切

猪苓 半一兩

右十三味切以水一斗先煮桑白皮大豆澤漆葉取五

升去滓澄去下淀內諸藥煎取二升絞去滓分三服欬

者加五味子二兩停二日服一劑忌酢物桃李雀肉麩

麩蒜炙肉粘食 油膩等 茯苓一云茯苓神防已一云防風

又療患久心痛腹滿并痰飲不下食人參丸方

人參

白朮

枳實 各六分

茯苓 八分

厚朴 六分

青木香 六分

橘皮 五分

大黃 六分

檳榔 六分

小臺必更

七卷

三

經餘

淡

人

右九味擣篩蜜和丸空腹煮生薑棗湯下如梧子二十
 丸日二服漸加至三十丸不利忌酢物桃李雀肉等
 又療心腹脹滿柴胡厚朴湯方

柴胡 厚朴炙各十分 茯苓 橘皮

紫蘇各八分 生薑十二分 檳榔五分

右七味切以水七升煮取二升五合絞去滓分溫三服
 服別相去如人行六七里進一服微利忌酢物生冷油
 膩粘食

又療心腹脹滿腹中有宿水連兩肋滿悶氣急衝心坐不
 得郁李人丸方

郁李人八分 牽牛子六分 甘遂熬四分 防葵三分

菴藟子 桑白皮 檳榔各四分 橘皮

澤瀉各二分 茯苓 澤漆葉炙 杏仁去皮尖各三分

右十二味擣篩蜜和丸空肚飲服如梧子五丸日二服
 服到十九微利為度忌酢物生冷油膩熱炙肉蒜等
 又療患氣發心腹脹滿兩肋氣急紫蘇湯方

紫蘇一握 訶梨勒皮 當歸 生薑各八分

人參六分 檳榔十顆 生地黄汁半升

右七味切以水六升煮六味取二升絞去滓下地黄汁
 分溫三服服別如人行四五里溫進一服利三兩行忌

合子碎

別一

兩人熬

人

人

煩

生菜熱麩炙肉魚蒜粘食陳臭等並出第二卷中

深師療腹脹滿彭彭逆害飲食熱不得卧流汗厚朴湯方

厚朴炙

桂心

芍藥

半夏

洗各三兩

枳實三枚炙

甘草二兩炙

麥門冬

四兩去心

黃芩

一兩

乾薑二兩

右九味切以水一斗煮取二升半絞去滓服八合日三

小便難加木三兩人參四兩忌生葱海藻菰菜羊肉錫

出第十六卷中

千金厚朴七味湯主腹滿氣脹方

厚朴半斤炙

甘草炙

大黃各三兩

大棗

十枚

枳實五枚

桂心二兩

乾薑五兩

右切以水一斗煮取五升去滓內大黃取四升服八合

日三嘔者加半夏五合利者去大黃寒加生薑至半斤

忌海藻菰菜生葱羊肉錫此本仲景傷寒論方並第十

集驗療胃滿有氣心腹脹中冷半夏湯方

半夏一升

桂心四兩

生薑八兩切

右三味切以水七斗煮取二升絞去滓適寒溫飲七合

忌羊肉錫生葱等出第六卷中

古今錄驗消化丸療人腹脹心滿腸胃結食不消化嘔逆

頭痛手足煩疼此方出太醫院藥常用芫花丸方

小臺必要

七卷

三

經餘居

大者四破

洗

煎

芫花一兩熬

大黃

葶藶子熬

甘遂

黃芩各二兩

巴豆四十枚去心皮熬別研

消石一兩

右七味搗合蜜和丸如梧子先食服三丸日再服一方無消石忌野猪肉蘆笋等出第十卷中

必効青木香丸主氣滿腹脹不調不消食兼冷方

青木香六分

檳榔六分

大黃十二分

芍藥五分

訶梨勒五分

枳實五分

桂心四分

右七味搗篩蜜和丸如梧子飲服十五丸漸漸常加以利爲度不限丸多少不利者乃至五十六十九亦得忌生葱韓同識類服大効古今常用

左側

人

又療腹脹滿堅如石積年不損者方

取白楊東南枝去蒼皮護風細剉五升熬令黃酒五升淋訖則以絹袋盛滓還內酒中密封再宿每服一合日三並出第二卷中

卒心腹脹滿方六首

肘後療卒心腹煩滿方

剉薏苡根濃煮取汁服三升

又方

黃芩一兩

杏人二十枚去尖皮

牡蠣一兩熬

右三味切以水三升煮取一升頓服之

兩人熬

外臺秘要

三

經餘居

又方

灸兩手大拇指內邊瓜後第一文頭各一壯又灸兩
手中央長指瓜下一壯愈肘後此方本治卒吐逆

此本在雜療中其病亦是痰飲霍亂之例兼宜依霍亂條
中法療之入平居有患者亦少皆因他病兼為之耳或從
傷寒後未復或從霍亂吐下後虛躁或是勞損服諸補藥
痞滿或觸寒熱邪氣或食飲協毒或服藥失度並宜各循
其本源為療不得專用此法也並出第一卷中
備急療卒心腹脹滿又胃脅痛欲死方
熱煮湯令灼灼爾以漬手足冷則易秘之肘後張仲同

又桂心散方

枳實

桂心

右二味等分下篩以米汁服一匕忌生葱

肘後張文仲同並出第一

卷中

救急療卒患心腹脹滿刺痛方

生薑大有功能遠行宜將自隨煮汁服良患久痢虛
損嘔逆不下食見食則吐取三兩細切搗絞取汁微
煖點少多蜜頓一服則下食大効出第七卷中
腹脹雷鳴方三首

范汪療腹中寒氣脹雷鳴切言胃脅逆滿附子粳米湯方

小臺必要

七卷

三

經餘居

八破去滑

附子

一枚

半夏

半升

甘草

一兩

大棗

十枚

粳米

半升

右五味切以水八升煮米取熟去米內藥煮取三升絞

去滓適寒溫飲一升日三忌海藻菘菜猪羊肉錫仲景傷寒

論同集驗加乾薑二兩出第十五卷中

延年療患腹內氣脹雷鳴留背痛方

丹參

三兩

枳實

炙各三兩

桔梗

白朮

芍藥

各二兩

生薑

四兩

檳榔

七枚

右七味細切以水九升煮取二升七合去滓分溫三服

忌猪肉桃李雀肉生冷油膩魚蒜等出第十五卷中

又丹參湯療腸鳴發則覺作聲方

丹參

茯苓

各三兩

桔梗

二兩

生薑

四兩

細辛

厚朴

炙

食茱萸

各二兩

右七味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服每

服如人行七八里忌生菜猪肉酢物出第四卷中

腹內諸氣及脹不下食方一十一首

廣濟療腹內諸氣脹滿昆布散方

昆布

海藻

人參

玄參

橘皮

升麻

各三兩

芍藥

桂心

乾薑

各二兩

小麥

一升半

醋

一升半

漬

之一宿出暴醋盡止

小臺必

七卷

三

經余

右十味搗篩爲散別搗小麥作散合藥散一處更搗干
杵酒服方寸匕日三服漸加至二匕不利忌熱麪炙肉
生葱蒜粘食等物

又療冷氣薏苡人飯粥方

細伐薏苡人炊爲飯氣味欲勻如麥飯煮粥亦好豉
漿粥並任意無所忌

又療氣蘇子粥方

蘇子不限多少研如麻子作粥依食法著葱豉薑並
得無所忌

又療氣膀胱急妨宜下氣方

蕪荑搗和食鹽末令調以綿裹如棗大內下部久時
或下惡汁并下氣佳無所忌

通按膀胱急妨謂小便
急不得出而妨問也

又療氣昆布臛法

高麗昆布一斤白米泔汁浸一宿洗去鹹味以水一
斗煮令向熟擘長三寸闊四五分仍取葱白一握二
寸切斷擘之更合熟煮令昆布極爛仍下鹽酢豉醬
調和一依臛法不得令鹹酸以生薑橘皮椒末等調
和宜食粳米飯粳米粥海藻亦依此法極下氣大効
無所忌

又療心頭冷硬結痛下氣檳榔湯方

夕臺秘製

檳榔十顆

生薑

青木香各三兩 橘皮

枳實炙

甘草炙

大黃各二兩

右七味切以水六升煮取二升半絞去滓分溫三服服別如人行四五里進一服取微利忌生菜熱麪炙肉海藻菰菜等

又療一切氣妨悶不能食檳榔丸方

檳榔七箇

芍藥五分

枳實七枚

人參五分

大黃十六分

青木香六分

桂心四分

右七味擣篩密和丸空腹服如梧子二十九日再服漸加至二十五丸微洩為度忌生菜熱麪炙肉蒜粘食生

葱等物

又療氣小芥子酒方

小芥子一升擣碎以絹袋盛好酒二升浸之七日空腹溫服三合日二服漸漸加之以知為度酒盡旋旋添之無所忌

又療久患氣脹烏牛尿方

取烏牛尿空心溫服一小升日一服氣散則止無所忌並出第二卷中

近効燒鹽通一切氣尤療風方

取鹽花以生麻油和之以濕布一片急裹以繩子繫

外臺秘製

七卷

三七

經餘居

茶

如打牆鎚許大置瓦子上以炭火四面燒望之如火氣訖更勿加炭待火盡冷訖吹扇去灰收取鹽擣破如患心腹脹滿氣隔不通取碁子大含嚥之立差如煮訶梨勒檳榔及茶湯用此鹽療一切病韋特進用之極効驗

訶梨勒

青木香

右二味等分擣篩融沙糖和衆手一時捻爲丸隨意服之氣甚者每服八十九日再稍輕者每服四五十九丸則得性熱者以生牛乳下性冷者以酒下不問食之前後禮部蕭郎中處得云自服大効

灸

通按
雷鳴
沸皆
言
氣擊
有
聲

灸諸脹滿及結氣法二十一首

千金療臚脹脅腹滿法

灸臚俞百壯三報穴在第七椎下兩傍各一寸半翼同

又療脹滿水腫法

灸脾俞隨年壯穴在第十一椎下兩傍各一寸半翼同

又療脹滿雷鳴酒沸法

灸大腸俞百壯三報穴在第十六椎下兩傍各一寸半翼同

又療脹滿氣聚寒冷法

灸胃管穴在心鳩尾下三寸灸百壯三報之翼同

守齊

又療脹滿繞臍結痛堅不能食法

灸中管百壯穴在臍上一寸一名水分異同

又療脹滿瘕聚帶下疼痛法

灸氣海百壯穴在臍下一寸半忌不可針異同

又療脹滿結氣如水腫狀小腹堅如石法

灸膀胱募百壯穴在中極臍下四寸異同

又療脹滿腎冷瘕聚泄痢法

灸天樞百壯通按銅人經天樞二穴俠臍二寸異同

又療冷脹胃滿心腹積聚痞疼痛法

灸肝俞百壯穴在第九椎下兩傍各一寸半異同

灸

又療五藏六腑積聚脹滿廕瘦不能飲食法

灸三焦俞隨年壯穴在第十三椎下兩傍各一寸半

異同並出第十六卷中

又療結氣法

扁鵲曰第四椎下兩傍各一寸半名關俞主胃中膈

氣灸隨年壯通按關當作厥四椎兩旁一寸半乃厥陰俞也

又三心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣寒冷霍亂心痛吐下

食不消腸鳴泄痢法

灸太倉穴一名胃募在心下四寸胃管下一寸灸百

壯

育

別上有二字
漫漶不可讀

擻

又主結氣囊裹針藥所不及法

灸育募二穴在從乳頭邪度至臍中屈去半從乳下

行度頭是灸隨年壯

通按銅人腧穴依法量度乃得日月膽募之穴然主療別肝募期門穴在此穴上五分然主療與此頗同

又凡臍下絞痛流入陰中發作無時此冷氣療之法

灸臍下三寸名關元百壯

又療短氣不語法

灸肘後兩筋間名天井百壯

又方

灸大椎隨年壯

方

灸肺俞穴在第三椎兩傍各一寸半百壯

又方

灸肝俞第九椎百壯

又方

灸尺澤百壯

又方

灸手十指頭各十壯

又方

灸小指第四指間交脉上七壯

又少年房室多短氣者法

灸鳩尾頭五十壯並出第十七卷中

胃脅痛及妨悶方四首

定源胃脅痛者由膽與肝及腎之支脉虛為寒氣所乘故也足少陽膽之經也其支脉從目銳眥貫目下行至胃循脅裏足厥陰肝之經也其支脉起足大指聚毛上循入腹貫膈布脅肋足少陰腎之經也其支脉起肺出絡心注胃中此三經之支脉並循行胃脅邪氣乘於胃脅故傷其經脉邪氣之與正氣交擊故令胃脅相引而急痛也診其寸口脉弦而滑弦則為痛滑則為實痛則為急實則為躍弦滑相搏則胃脅搶息痛也

又卒苦煩滿又胃脅痛欲死候此由手少陽之絡脉虛為風邪所乘故也手少陽之脉起小指次指之端上循入缺盆布膺中散絡心包風邪在其經邪氣迫於心絡心氣不得宣暢故煩滿乍上攻於胃或下引於脅故煩滿而又胃脅痛也若經久邪氣留連搏於藏則成積搏於腑則成聚也並出第十六卷中

廣濟療氣結築心胃脅悶痛不能喫食訶梨勒散方

訶梨勒四顆炮去核 人參二分

右二味擣篩為散以牛乳二升煮三四沸頓服之分為

下

主滑。食度。

人

半夏

洗。一升

生薑

一斤

桂心

六兩

檳榔

二兩

二服亦得。如人行三二里進一服。無所忌。又療胃脅不利。腹中脹氣急妨悶。半夏湯方。

右四味細切。以水八升。煮取二升四合。絞去滓。分溫五

服。服別相去。如人行六七里進一服。快利為度。忌羊肉

餒生葱油膩小品。有吳茱萸三十顆。無檳榔。餘並同。

又療胃脅妨悶。胃中客氣。大便苦難。大黃丸方。

大黃

十二分

厚朴

四分

枳實

四分

芒消

八分

杏仁

六分

去

葶藶子

四分

熬

右六味。搗篩。蜜和丸。空腹以飲服。如梧子十九。日二服。

兩人熬

稍稍加。以大便微調為度。忌生冷油膩粘食。出第二卷

千金療冷氣脅下往來。胃膈痛引脅背悶。當歸湯方。

當歸

芍藥

吳茱萸

桂心

人參

大黃

甘草

各二兩

茯苓

枳實

各一兩

乾薑

三兩

右十味細切。以水八升。煮取二升半。一服八合。日三服。

治尸注亦佳。忌海藻菰菜生葱酢物等。出第十六卷中

脅肋痛方二首

小品療脅下偏痛發熱。其脉緊弦。此寒也。當以溫藥下之。

大黃附子湯方。

十六卷作十

七卷

三

聖餘

大黃 三兩

附子 三枚

細辛 二兩

右三味切以水五升煮取二升分三服若強盛人煮取三升半分為三服服別如人行四五里進一服忌猪肉冷水生菜等 仲景同

淡

又半夏茯苓湯療胃膈心腹中痰水冷氣心下汪洋嘈煩或水鳴多唾口清水自出脅肋急脹痛不欲食此皆胃氣弱受冷故也其脉喜沉弦細遲悉主之方

半夏 五兩

生薑 五兩

茯苓 三兩

旋復花 一兩

陳橘皮

人參

桔梗

芍藥

甘草 炙各二兩

桂心 一兩

三

去下便調也

足也

胃膈氣方三首

廣濟療胃膈氣脹滿喫食心下妨虛熱脚手煩疼漸羸瘦不能食四肢無力枳實丸方

枳實 六分

犀角 四分

前胡 四分

青木香 八分

麥門冬

去心八分

赤茯苓

八分

苦參

六分

芍藥

六分

右八味擣篩為末蜜和丸如梧子以飲空腹下二十九

漸加至三十九日二服不利忌生菜熱麪油膩炙肉酢蒜

又療胃膈滿塞心背撮痛走注氣悶宜服此柴胡湯方

柴胡 六分 當歸 六分 青木香 六分 犀角 六分

檳榔 十箇 甘草 二分

右六味切以水七升煮取二升半絞去滓內麝香末分

溫三服如人行四五里微利為度忌海藻菰菜生熱

麴蕎麥猪魚蒜

又療胃膈間伏氣不下食臍下滿柴胡湯方

柴胡 三兩 枳實 三兩 生薑 三兩 白朮 三兩

合子破

三

甘草 炙一兩 檳榔 七箇

右六味切以水六升煮取二升絞去滓分溫二服服別

如人行六七里進一服小弱人微利禁生冷蒜腥海藻

菰菜桃李雀肉等並出第一卷中

寒疝腹痛方一十三首

病源疝者痛也此由陰氣積於內寒氣結搏而不散腑藏

虛弱風冷邪氣相擊則腹痛裏急故云寒疝腹痛也

卷中

廣濟療丈夫虛勞寒疝腹痛并主產後方

生乾地黄 三兩 甘草 炙二兩 茯苓 二兩 人參 二兩

七卷

四

經余居

。臂

。杷

。炮不咬咀

。党

去皮生用二方五枚

千金本方方后
引外臺又引
范汪方云以桂
枝湯和前烏

外臺秘要

當歸 二兩

大棗 十四枚

白羊肉 去脂三斤

右七味切以水三斗先煮羊肉取一斗去羊肉內諸藥
煮取五升內葱白一把煮取四升絞去滓分溫五服服
別相去如人行十二三里後藥消進少食食消服藥忌
蕪荑海藻菰菜酢物餘無忌出第四卷中
仲景傷寒論寒疝遶臍苦痛若發則白汗出手足厥寒若
脉沉弦者二物大烏頭煎主之方

大烏頭

五枚

白蜜

二斤

右藥以水三升煮烏頭取二升去烏頭內蜜煎令水氣
盡得二升強人服七合弱人五合一服不差明日更服

日止一服不可再也忌猪肉冷水千金同

又寒疝腹滿逆冷手足不仁若一身盡痛灸刺諸藥所不
能治者抵當烏頭桂枝湯主之方

秋烏頭

實中大者十枚

白蜜

二斤

桂心

四兩

右三味先以蜜微火煎烏頭減半去烏頭別一處以水
二升半煮桂取一升去滓以桂汁和前蜜合煎之得一
升許初服二合不知更服至三合又不復知更加至五
合其知如醉狀得吐者為中病也忌猪肉冷水生葱等
范汪方同云

。兩

桂心 三兩

芍藥

三兩

甘草 二兩

生薑

三兩

七卷

頭煎服

摩

大棗十二枚

右五味切以水七升煮取三升去滓取五合和前烏頭蜜令得一升餘並同前法服仲景傷寒論千金同

又療寒疝腹中痛引脅痛及腹裏急者當歸生薑羊肉湯主之方

當歸三兩

生薑五兩

肥羊肉一斤去脂

右三味切以水一斗合煮取三升去滓溫服七合日三痛即當止若寒多者加生薑足前成一斤若痛多而嘔者加橘皮二兩木一兩合前物煮取三升加生薑者亦加水五升煮取三升二合服之依前經心錄范汪同無忌

又療寒疝腹中痛者柴胡桂枝湯方

柴胡四兩

大棗六枚

黃芩一兩

人參一兩

甘草一兩炙

半夏二合

桂心

生薑各一兩半

芍藥一兩半

右九味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服又云人參湯作如桂枝法加半夏此胡黃芩復如此胡湯法今著人參作半劑忌海藻菘菜羊肉饒生葱並出第十五卷中小品寒疝氣腹中虛痛及諸脅痛裏急當歸生薑等四味主之方

當歸

生薑

芍藥各三兩

羊肉三斤

七卷

四

經餘居

湯

本

洗 摩

右藥切以水一斗二升煮肉爛熟出肉內諸藥煎取三升分溫服七合日三數有效古今錄驗經心錄范汪同出第一卷中

集驗療寒疝氣來往衝心腹痛桂心湯方

桂心四兩 生薑三兩 吳茱萸二兩

右三味切以酒一大升煎至三合去滓分溫三服如人行六七里一服忌生葱

又療寒疝下牽少腹痛附子丸方

附子二兩 桃人三兩去皮尖 蒺藜子一升去角尖熬

右三味搗篩末蜜和丸梧子大空腹酒下十九漸加至十五丸及二十九日再服忌生菜熱麪炙肉笋蒜猪魚

去度兩熱

又療積年腹內宿結疝冷氣及諸癖癥等香豉丸方

香美爛豉暴乾微熬令香即止

小芥子去土石微熬令赤即止 各一升

右二味搗篩蜜和丸梧子大空腹酒服二十丸漸加至三十九日二服初服半劑以來腹中微絞痛勿怪之是

此藥攻病之候

又療疝瘕冷氣方

採鼠李子目乾九蒸九暴酒浸服三合日兩服漸加至三服能下血及碎肉積滯物

齊

熱

古今錄驗楚王瓜子丸療心腹寒疝胃脅支滿食飲不化

寒中腹痛及嘔痢風痙頸項強急不得俛仰方

桂心 五分

柴萸 三兩

白薇 一分

烏頭 二分

蜀椒 五分

芍藥 四分

防葵 二分

白芷 三分

右九味末之合蜜和爲丸如梧子先食服一九日三不知稍稍增之以腹中溫身中懷懷爲度忌生葱猪肉冷水方中無瓜子未詳方名范汪等同出第八卷中

寒疝心痛方三首

病源夫疝者痛也陰氣積結所生也陰氣不散則寒氣盛

言

寒氣盛則痛上下無常處冷氣上衝於心故令心痛也

二十卷中

京本
以下
仲景
行宋
脫簡
紀本
全存

范汪大茱萸丸療心腹寒疝胃中有逆氣時上搶心痛煩滿不得卧面目惡風悸掉惕時驚不欲飲食而嘔變發寒熱方

吳茱萸 半升

細辛

芍藥

柴胡 一方用前胡

旋復花

黃芩

紫苑

人參

白朮

茯苓

乾薑

桂心

附子 炮

甘草 炙

半夏 洗

當歸 各半兩

右十六味搗篩以蜜和爲丸如梧子先食服三九日三

不知稍加忌生葱羊肉餛酢物桃李雀肉猪肉生菜海藻菰菜除此更無所忌一方有蜀椒無桂心又一方有乾地黃無黃芩深師同出第十

四卷中

齊

小品解急蜀椒湯主寒疝氣心痛如刺繞臍腹中盡痛自汗出欲絕方

蜀椒二百枚汗

附子一枚炮

粳米半升

乾薑半兩

半夏十二枚洗

大棗二十枚

甘草一兩炙

撻微

右七味切以水七升煮取三升澄清熱服一升不差更服一升數用療心腹痛因急欲死解結逐寒上下痛良忌猪羊肉餛海藻菰菜肘後古今錄驗范汪方無甘草除同經心錄同出第一卷中

今錄驗療心痛寒疝牡丹丸方

牡丹去心

桂心各二兩

烏頭炮二枚

右三味末之合蜜和爲丸如大豆旦起未食服三丸日二不知稍增之藥少急寧少服并治遁尸發動無烏頭附子亦可用炮之忌胡荽猪肉冷水生葱等出第八卷中

卒疝方三首

集驗療卒疝暴痛方

灸大敦男左女右三壯立已穴在灸經圖上

出第六卷中

文仲療卒得諸疝少腹及陰中相引絞痛白汗出欲死方擣沙參下篩酒服方寸匕立愈肘後備急同

又若不差服諸利丸下之走馬湯亦佳此名寒疝亦名陰疝張仲景飛尸走馬湯方

巴豆二枚去心皮熬

杏仁一枚去尖皮

右二味取綿纏搥令極碎投熱湯二合捻取白汁服之須更差未差更一服老小量之通療鬼擊有尸疹者常蓄此藥用驗忌野猪肉蘆笋備急同出第十卷中

七疝方三首

病源七疝候七疝者厥疝癥疝寒疝氣疝盤疝附疝狼疝也厥逆心痛足寒諸飲食吐不下名曰厥疝也腹中氣乍滿心下盡痛氣積如贅名曰癥疝也寒飲食則脅下腹中

疝下同

畜

繫

經

齊

盡痛名曰寒疝也腹中乍滿乍減而痛名曰氣疝也腹中痛在臍傍名曰盤疝也腹中臍下有積聚名曰附疝也少腹與陰相引而痛大便難名曰狼疝也凡七疝皆由血氣虛弱飲食寒溫不調之所生也出第二十卷中

文仲小器七疝丸主暴心腹厥逆不得氣息痛達背脊名曰尸疝心下堅痛不可手迫名曰石疝臍下堅痛得寒冷食輒劇名曰寒疝脅下堅痛大如手痛時出見若不痛不見名曰盤疝臍下結痛女人月事不時名曰血疝少腹脹滿引膀胱急痛名曰脉疝悉主之方臣等看詳七疝已載前序

椒四分汗

桔梗

芍藥

乾薑

厚朴炙

細辛

附子炮各二分

烏頭一分

右八味末之蜜和丸服如大豆三丸加至七八丸日三服忌猪肉冷水生菜出第一卷中

古今錄驗七疝丸療疝諸寒臍傍痛上支胷中滿少氣太

醫丞樊之方

蜀椒五分

乾薑

厚朴炙

黃芩

細辛

芍藥

桂心各四分

桔梗二分

烏喙一分

柴胡一分

茯苓一分

牡丹皮一分

石十二味擣篩蜜和丸梧子大先舖以酒服七九日三不知漸加以知為度忌猪肉冷水生菜酢物胡荽

注同出第十卷中

集驗疝氣桃人湯方

桃人去皮

吳茱萸

橘皮

海藻各三兩

生薑

茯苓

羌活

蒺藜子去角各三兩

右八味切以水三大升煮取九合分為三服空心服忌

酢物

寒疝不能食方四首

深師療虛冷心腹寒疝胃脅支滿飲食不消腹中痛久痢

芎藭七分

烏頭四分

防葵三分

蜀椒九分

及雙人
苓

京本
以下宋板關
紀本全行

又

白薇 二分

桂心 十分

白芷 五分

茱萸 六分

乾薑 八分

右九味擣篩蜜和丸如梧子飲服二九日三稍加至五六丸以知為度忌猪肉冷水生葱范汪同

又主虛冷痰癖痢食不消心腹痛氣弱不欲食虛憊羸瘦

吳茱萸丸方

吳茱萸 十分

紫苑 三分

白薇 三分

烏頭 十分

桂心 六分

煎胡

芍藥

細辛

芍藥

黃芩

各五分

右十味下篩蜜和酒服如梧子五九日三稍加之忌猪

肉冷水桃李生葱生菜等

謹按別本有此方元欠五味恐後古今錄驗治寒疝積聚是金方出第十六卷中

范汪療手足熱腹中寒疝不能食飲數心腹痛十一物七

熬飯後丸方

茯苓 五兩

乾薑

六兩今倍併十二兩

大黃

一斤

柴胡

十兩

芍藥 七兩

蜀椒

一兩汗

芒消

一升今減五合

加桂心

五兩

杏仁

一升去皮尖

葶藶子

一升

附子

三兩

炮

三兩

右藥乾薑茯苓不熬餘皆熬擣篩以蜜和丸如梧子飲

服七九日三龍朔元年三月十七日詔書十一物七熬

方忌猪肉冷水醋物生葱等

出第十四卷中通按除乾姜茯苓當九熬今云七者

以桂心附子蓋加之

集驗療寒疝不能食方

取馬藹子一升每日取胡桃許以麵拌熟煮吞之然後依常飯日再服服盡必愈亦除腹內一切諸疾消食肥肌仍時燒塲熱以殺羊毛作氈裹却氈上熨之日一度尤佳

寒疝積聚方四首

病源夫積聚者由寒氣在內所生也血氣虛弱風邪搏於腑藏寒多則氣澁氣澁則生積聚也積者陰氣五藏所生始發不離其部故上下有所窮已聚者陽氣六腑所成也

齊 拯

故無根本上下無所留止但諸藏腑受邪初未能為積聚邪氣留滯不去乃成積聚其為病也或左右脅下如覆杯或臍上下如臂或胃管間覆大如盤羸瘦少氣或酒漸寒熱四肢不收飲食不為肌膚或累累如桃李或腹滿嘔泄寒則痛故云寒疝積聚也其脉駛所更反而緊積聚浮而牢積聚牢強急者生虛弱急者死出第二十卷中深師破積丸療寒疝久積聚周走動搖大者如鼈小者如杯乍來乍去在於胃管大腸脹滿不通風寒則腸鳴心下寒氣上搶胃脅支滿荒花丸方

荒花 一分

蜀椒 一分

大黃 六分

細辛 六分

洗炒

桔梗 五分

烏頭 四分

茱萸

芍藥

茯苓 各三分

龍膽 二分

半夏 一分

右十一味搗篩蜜和丸如梧子大飲服五丸日三當下如泥病愈忌猪羊肉錫酢物生菜等

牢

又當歸丸療心腹勞強寒疝邪氣往來堅固結聚苦寒煩

中食不生肌方

桔梗 二分

葶藶子 熬五分

藜蘆 炙二分

厚朴 炙五分

杏仁 五十枚

附子 炮五分

桂心

人參 各三分

沙參 三分

特生礬石 一兩燒

兩煎

右十味搗篩蜜和如梧子飲服三九日三稍加之忌猪

肉生葱冷水出第二十二卷中

搶大

古今錄驗療久寒三十歲心腹疝瘕瘕積聚邪氣往來厥

逆搶心痛久痺羸瘦少氣婦人產乳餘疾胃脅支滿不嗜

食手足惰煩月水不通時時便血名曰破積聚烏頭續命

丸方

食茱萸 五分

芍藥 五分

前胡 五分

乾薑 十分

烏頭 十分

紫菀

黃芩

白朮

白薇 各三分

芎藭

人參

乾地黄 各五分

蜀椒 十分

桂心 十分

右十五味搗篩蜜和為丸如梧子大先食服三丸日三不知稍加至七丸忌生菜葱猪肉冷水桃李雀肉蕪荑等范汪同出第十卷中

集驗療腎冷及疼疝氣滯後灌方

鹽花一大合 漿水半大升

右二味和煖灌下部少間即下膿日一度再灌之即止

心病方四首

病源心病者由陰氣積於內寒氣不散上衝於心故使心痛謂之心疝也其痛也或如錐刀所刺或四肢逆冷或唇口變青皆其候也出第二十卷中

范汪療心病復繞臍痛上支脅心下痛方

芍藥

桔梗

細辛

蜀椒汗

桂心

乾薑各三分

附子一分

右七味末之合蜜和為丸如梧子服七丸以酒下日二服忌猪肉冷水葱生菜等

又療三十年心病神方

真射莖

藏好者

新好茱萸

一名殺子

右二味等分搗篩蜜和丸服如麻子二丸日三藥勢盡乃熱食良已用得差劉國英所秘

又主心病方

實

灸兩足大指甲寅之際甲寅各半炷隨年壯良通按寅當作肉

又心痛發時心腹痛欲死方

灸足心及足大指甲後橫理節上及大指岐間白黑肉際百壯則止足心者在足下偏近大指本節際不當足心中央也並出第十八卷中通按足心在足下近大指本節即湧泉穴也

右從事即充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子孟較勘

校

重訂唐王嘉先生外臺秘要萬卷第七終

