



武 9
612
12



明
醫
卷
12

醫
書

重訂唐王壽隆先生外臺秘要方第十二卷目錄

癖及疝氣積聚癥瘕
留痺奔弛三十八門

療癖方五首

癖結方三首

寒癖方五首

久癖方二首

癖羸瘠方二首

疝癖方四首

疝氣方三首

癖及疝癖不能食方一十四首

癥癖等一切病方四首

醫
書

癖硬如石腹滿方二首

食不消成癥積方四首

心下如桎結癥方二首

癥癖瘕氣灸法四首

積聚方五首

積聚心腹痛方三首

積聚心腹脹滿方一首

積聚宿食寒熱方四首

療癥方三首

暴癥方六首

鼈癥方四首

米癥方三首

食癥及魚肉成癥方二首

髮癥方二首

蝨癥方一首

鼈癥方一首

蛇癥方一首

蛟龍病方一首

胃痺方二首

胃痺短氣方三首

胃痺心下堅痞緩急方四首

胃痺噎塞方二首

胃痺欬唾短氣方四首

胃痺心痛方四首

胃痛方二首

奔弛氣方三首

奔弛氣衝心胃方四首

雜療奔弛及結氣方六首

灸奔弛法六首

唐王燾先生外臺秘要方第十二卷

宋胡散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等

上進

檢

新安後學程衍道敬通父訂梓

療癖方五首

病源夫五藏調和則榮衛氣理榮衛氣理則津液通流雖復多飲水漿亦不能為病若擬養乖方則三焦痞隔三焦痞隔則腸胃不能宣行因飲水漿便令停滯不散更遇寒氣積聚而成癖癖者謂僻側在於兩脅之間有時而痛是也其湯熨鍼石別有正方補養宜導今附於後養生云

煎

忽

行 極

人

覺勿飲水更眠令人作水滯又云飲水勿急咽久成水滯
又云舉兩膝夾兩頰邊兩手據地蹲坐故久行之愈伏梁
伏梁者宿食不消成癖腹中如杯如盤宿癰者宿水宿氣
癖數生癰久則腸化為筋骨變為實出第二十卷中
廣濟療腹中癖氣方

牛膝 八分

桔梗 六分

芍藥 六分

枳實 八分炙

白朮 六分

鼈甲 八分炙

茯苓 八分

人參 六分

厚朴 六分炙

大黃 六分

桂心 六分

檳榔 六分

右十二味搗篩蜜和丸空肚溫酒服如梧子二十九日
二服漸加至三十九老小微利忌生冷油膩小豆粘食

桃李雀肉大

莧菜醋生葱猪肉出第二卷中

千金翼江寧衍法師破癖方

白朮 三兩

枳實 三兩炙

柴胡 三兩

右三味切以水五升煮取二升分溫三服照三十劑永
差忌桃李雀肉出第十九卷中

必效療癖方

取車下李人微湯退去皮及並入與乾麩相半搗之
為餅如猶乾和淡水如常溲麩大小一如病人手掌
為二餅微炙使黃勿令至熟空肚食一枚當快利如
不利更食一枚或飲熱粥汁即利以快利為度至午

後利不止，即以醋飯止之。利後當虛，病未盡者，量力一二日更進一服，以病盡為限。小兒亦以意量之，不得食酪及牛馬肉，無不効。但病重者，李人與麩相半，輕者以意減，病減之後服者，亦任量力，頻試差，神効。

又方

大黃 十兩

右一味，搗篩，醋三升和煎，調內白蜜兩匙，煎堪丸，如梧子一服三十九，以利為度，小者減之。

又方

牛黃 三大 麝香 一當門 朱砂 準麝 生犀角 小棗許

以上四味，並研令極細，湯成後內之。

大黃 一兩

芎藭 一兩

升麻 一兩

甘草 半兩

鼈甲 半兩

丁香 五十枚

右十味，切以水三升，先煮大黃等六味，取強半升，絞去滓，內牛黃等四味和絞，分為三服，每服如人行十里，久忌如藥法。若利出如桃膠肉醬等物，是病出之候，特忌牛馬肉，其藥及水，並是大兩大升，此藥分兩是十五，以上人服。若十歲以下，斟酌量病減之，忌葷菜、海藻、菘菜、生血物等。並出第三卷中。

癖結方三首

病源此由飲水聚停不散復因飲食相搏致使結積在於脅下有時弦且起或脹痛或喘息短氣故云瘕結脉緊實者瘕結也出第三十卷中

廣濟療瘕結心下硬痛巴豆丸方

巴豆三枚去心皮熬 杏仁七枚去尖 大黃如雞子大

右三味搗篩大黃取巴豆杏仁別搗如膏和大黃入蜜

和丸空肚以飲服如梧子七丸日一服漸加以微利下

病為度忌生冷滯膩出第二卷中

千金狼毒丸主堅瘕方

狼毒五兩塗薑汁炙 半夏三兩洗 杏仁三兩 桂心四兩

皮熬

小豆野猪魚蘆笋等

去天皮兩人者熬

二

附子二兩炮 細辛二兩 椒三兩汗

右七味搗篩別搗杏仁蜜和飲服如大豆二丸出第十卷中

救急中候黑丸療諸瘕結痰飲等大良方

桔梗四分 桂心四分 巴豆八分 芫花十二分熬

杏仁五分

燥

去皮炙兩人者熬

右五味先搗三藥成末別搗巴豆杏仁如膏合和又搗

一千枚下蜜又搗二千枚丸如胡豆漿服一丸取利可

至二三丸兒生十日欲癩發可與一二丸如黍米諸腹

不快體中覺患便服之得一兩行利即好附後千金同服四神丸下

之亦得出第三卷中

急猪肉生葱蘆笋

十一卷

十二卷

醫藥

寒癖方五首

病源寒癖之為病是飲水停積脅下痞強是也。因遇寒即痛所以謂之寒癖。脉弦而大者寒癖也。出第二十卷中
肘後療腹中冷癖水穀癥結心下停痰兩脅痞滿按之鳴轉逆害飲食方

大蟾蜍

一頭去皮及腹中物支解之

芒消

大人用一升中人七合羸小五合

右二味以水七升煮取四升溫服一升一時頓服一升若未下更服一升中人七合羸小五合得下者止後九日十日一遍作之

又方

大黃

三兩

甘草

二兩

蜜

一升

棗

二十枚

右四味切以水四升先煮三物取二升一合去滓內蜜再上火煎令烊分再服忌海藻菘菜

又方

巴豆

三十枚

杏仁

二十枚

桔梗

六分

藜蘆

四分

皂莢

三分炙去皮子

右五味搗蜜和丸如胡豆未食服一九日三欲下病者服二丸長將服百日都好差忌猪肉蘆笋狸肉古今錄驗同並
出第三卷中

深師主久寒癖胃滿短氣心腹堅嘔吐手足逆冷時來時

辟字

三一

黃連六餅

去皮心熬

去兩人及皮熬

子字糝粘

去痛不欲食食即為患心冷引腰背強急吳茱萸丸方

吳茱萸 八分

附子 三分

厚朴 五分

半夏 五分

桂心 五分

人參 五分

礬石 五分

枳實 五分

乾薑 五分

右九味下篩蜜和酒服如梧子二十九日三不知增之

出第十六卷中

忌猪羊
內錫毒
冷水

延年白木丸主宿冷癖氣因服熱藥發熱心驚虛悸下冷
上熱不能食飲頻頭風旋喜嘔吐方

白朮 六分

厚朴 兩分

人參 五分

白芷 三分

橘皮 四分

防風 五分

吳茱萸 四分

芎藭 四分

四 歐

署 蕪

薯蕷 四分

茯苓 五分

桂心 四分

大麥蘖 四分

乾薑 四分

防葵 四分

甘草 五分

右十五味搗篩蜜和丸如梧桐子酒服十五丸日再加

至二十九丸

出第十六卷中

久癖方二首

忌桃李雀肉海藻松菜醋物生葱

搏

病源久癖謂因飲水過多水氣擁滯遇寒熱氣相搏便成
癖在於兩脅下經久不差乃結聚成形段而起按之乃水

鳴積有歲年故云久癖 出第二十卷中

集驗療冷熱久癖實不能下虛滿如水狀方

前胡 四兩

生薑 四兩

枳實 三兩

半夏 四兩

通按
實不能
下當是
此食不
能下

白朮 三兩 茯苓 四兩 甘草 二兩 桂心 二兩

右八味切以水八升煮取三升分三服千金同出第六卷中

色美肉饒 李雀肉生葱 醋物海藻 菘菜

浩

古今錄驗曾青丸療久寒積聚留飲宿食天行傷寒者服之二十日愈久服令人延年益壽殷仲堪云扁鵲曾青丸療久癖積聚留飲宿食天行傷寒欬逆消渴隨病所在久病羸瘦老小宜服藥或吐或下或汗出方

曾青 二分 寒水石 三分 朴硝 二分 茯苓 三分 大黃 三分 附子 三分 巴豆 二分

石 去心皮熬

右七味各異擣下篩巴豆消相合擣六千杵次內附子擣相得次內茯苓擣相得次內大黃擣相得次內曾青

黍

擣相得次內寒水石擣相得次內蜜和擣于杵大人服大豆二丸小兒五歲以下如麻子一丸二三歲兒如黍米一丸如服藥以薄粉粥清下當覆卧令汗出吐下氣發作服二丸霍亂服三丸泄痢不止服一丸可至二丸一方用曾青三分忌猪肉冷水蘆笋大酢崔氏同出第十卷中

癖羸瘠方二首

刪繁療癖羸瘠膏髓酒方

猪肪膏 三升 牛髓 二升 油 五升 薑汁 三升 生地黄汁 三升 當歸 四分 蜀椒 四分 吳茱萸 五分 桂心 五分 人參 五分 五味子 七分 芎藭 五分

乾地黄 七分 遠志皮 五分

右十四味切搗九味下篩為散取膏髓等五種汁加水一斗同汁煎取水并藥汁俱盡但餘膏在停小冷下散攪令調火上煎三上三下燥器貯凝冷為餅方寸以清酒一升煖下膏取服之晝兩服夜一服非但療癰亦主百病忌生葱蕪荳

又枸杞子散方

枸杞子 五升 乾薑 五兩 白朮 五兩 吳茱萸 一斤

蜀椒 三合 橘皮 五兩

不限多少
夏採

右六味切搗五味三篩下為散取枸杞子燥釜器貯研

暴如作米粉法七日暴之一暴一研取前藥散和之又研隨飲酒食等即便服一方寸七和酒食進之如此能三年服非但療百病亦長陽氣並出第五卷中 疝瘕方四首

廣濟療疝瘕氣兩脅妨滿方

牛膝 十分 桔梗 八分 芍藥 八分 枳實 八分
人參 六分 白朮 八分 鼈甲 八分 茯苓 八分
訶梨勒皮 八分 柴胡 六分 大黃 十分 桂心 六分

右十二味搗篩蜜和丸如梧子空肚酒飲及薑湯任服二十九日二服漸加至三十九利多即意減之常取

桃李雀肉
猪肉冷水
生葱

微通洩為度忌生硬難消油膩等物及菟菘一方用五
加皮無人

千金翼癩十年疔癬方

桃人 六升 豉 六升乾暴去皮熬擣篩 蜀椒 三兩青閉 乾薑 三兩生擣下篩

右四味先擣桃人如脂冷擣干杵如乾可下少許蜜和

擣令可丸空肚酒服三九如酸棗大日三本方下有疑法此不載出

第十九卷中

崔氏療疔癬積冷發如錐刀所刺鬼疔往來者方

烏頭 八分 人參 八分 桂心 八分 附子 八分

乾薑 八分 赤石脂 八分 朱砂 三分研

赤石脂八分
三字模糊

右七味擣篩蜜和為丸如梧子以煖酒服七九稍稍加之至十九慎生冷醋滑猪魚雞蒜小豆油膩牛馬肉生血物生葱等

又療疔癬方

鼠屎 天合炒令黃濕者熬乾者不須熬即用

右一味以水二升煮五六沸及熱濾取汁置碗中急內

稠砂一小兩乃蓋頭經宿明日平旦溫為兩服稍晚食

無所忌一方稠砂作朱砂並出第七卷中

疔氣方三首

廣濟療疔氣方

牛膝 六分 芍藥 六分 桔梗 八分 枳實 三分

六 獲粘 五

十二卷

九

經余

八模粘
六模粘

厚朴八分 橘皮四分 茯苓六分 人參五分

蒺藜子五分 訶梨勒六分 柴胡八分 檳榔四分

大黃六分

右十三味搗篩蜜和丸空肚煮大棗飲服如梧子二十丸日再漸漸加至三十九如利多以意減之忌生硬難消物及油膩猪肉醋物出第二卷中

疰 肋

延年半夏湯
宜於考注

延年療兩肋脹急疰滿不能食兼頭痛壯熱身體痛方

枳實三兩 桔梗二兩 鼈甲二兩 人參二兩

前胡二兩 生薑四兩 檳榔七枚并破 桂心二兩

右八味切以水九升煮取二升五合去滓分溫三服如

生冷魚蒜
麩食

人行七八里久禁生葱莧菜出第十六卷中

救急療腹中疰氣連心以來相引痛緊急方

白朮三兩 枳實三兩 柴胡四兩 鼈甲二兩

右四味切以水七升煮取二升五合去滓空肚分三服

相去七八里人能連服三四劑始知驗禁生冷猪肉并

毒魚大須慎之頻服有效忌莧菜生葱出第七卷中

癖及疰癖不能食方一十四首

廣濟療癥癖疰氣不能食兼虛羸瘦四時常服方

牛膝六兩 生地黄九兩 當歸三兩 桂心四兩

肉苁蓉六兩 遠志三兩 五味子五兩 麴末五合
去心 熬 炒令黃

藥

白朮 三兩 人參 三兩 茯苓 六兩一分

大麥藥末 一升五分 合熬黃

不利

桃李雀肉 生葱燕蕪 醋物

右十二味搗篩為散，空腹溫酒服，方寸七，日二服，漸加至一七半。夏中煮生薑及檳榔飲下，加麥門冬六兩。此方甚宜，久服令人輕健。忌牛肉、生葱、蘿蔔等。出第二卷

人參 沙參 玄參 丹參

苦參 各一兩 大黃 四兩 附子 一兩 巴豆 四十枚

蜀椒 一合 乾薑 半兩 防風 二兩 塵蟲 十五枚

葶塵 一合 熬

去心皮熬

野

右十三味搗下篩，蜜和為丸，如梧子，先食服一九，日三

忌猪肉、蘆笋、生血等物

又療癖飲，并醋咽吐水，及沫食飲不消，氣逆脹滿方

檳榔 十兩 其子熟 高良薑 三兩 桃人 一升 去皮兩人 者熬別搗如泥

大腹

右三味和搗，縮篩以白蜜和九，酒服如彈丸二枚，日再服，漸加至四五丸，加減任意，自量。並出第七卷中。

延年人參丸，主痲癖氣不能食方

人參 八分 白朮 六分 枳實 六分 橘皮 四分

桂心 七分 甘草 五分 桔梗 五分

右七味搗篩，蜜和為丸，如梧子大，一服十五丸，酒下，日

六 似七字 畫缺

二服加至二三十丸。

林生冷猪
肉生葱、雀肉
桃李海藻
菘菜

又療冷氣兩肋脹滿、疝氣不能食方。

白朮 三兩 人參 二兩 茯苓 三兩 枳實 三兩

生薑 三兩 桔梗 二兩 桂心 一兩

右七味切以水八升煮取二升五合去滓分温三服如

人行七八里久。

忌生冷猪
肉魚桃李
雀肉醋物
生葱

又桃人丸主疝癖氣漫心脹滿不下食發即更脹連乳滿頭面閉悶欬氣急者方。

桃人 八分去火皮熬 鼈甲 六分 枳實 六分 白朮 六分

桔梗 五分 吳茱萸 五分 烏頭 七分炮 檳榔 五分

防葵 五分 芍藥 四分 乾薑 五分 紫苑 四分

細辛 四分 皂莢 二分去皮子 人參 四分 橘皮 四分

甘草 四分

右十七味擣篩蜜和丸如梧子服十九日再服加至二

十九忌葱猪肉菘菜等 海藻菘菜 桃李雀肉

又浸藥酒用下前藥方。

紫蘇 三兩 牛膝 三兩 丹參 三兩 生薑 六兩

生地黃 三升 香豉 三升 紫苑 三兩 防風 四兩

橘皮 三兩 大麻人 一升五合熬

右十味細切縮袋盛以清酒二斗五升浸三宿後温一

蓋用下桃人丸酒盡更添忌蕪荑

又檳榔子丸主腹內疝癖氣滿胃背痛不能食日漸羸瘦四肢無力欬嗽心驚方

檳榔子四分 桔梗四分 當歸四分 人參五分

桂心四分 前胡四分 橘皮三分 厚朴三分

白朮四分 甘草五分 烏頭四分 乾薑四分

茯苓四分 龍甲五分 大黃四分 龍齒六分

右十六味搗篩蜜和為丸如梧子大服十九飲汁下日二服加至二十九酒下亦得忌醋菹菜生葱等

又療疝癖胃背痛時時欬嗽不能食方

十五
海藻
猪肉桃李子
雀肉大

桂心四分 細辛四分 白朮六分 厚朴三分

附子五分 乾薑五分 橘皮三分 龍甲四分

防葵三分 吳茱萸三分

右十味搗篩蜜和為丸如梧子大服十五丸酒下日二服加至二三十九忌菹菜醋物生葱等

又療疝癖發即兩肋弦急滿不能食方

檳榔子六分 枳實六分 桔梗四分 龍甲四分

人參六分 白朮六分 桂心三分 龍膽草五分

前胡四分 萎蕤五分 大黃五分 甘草六分

右十二味搗篩蜜和為丸如梧子大服十九酒下日一

猪肉奈桃
李雀肉
生菹

十五

海藻松菜
桃李雀肉

延羊療兩助
服急方宜
參考九方

五 似五字

服加至二十九忌葷菜生葱猪肉等

又半夏湯主腹內左肋痲痺硬急氣滿不能食胃背痛者

方

半夏 三兩

生薑 四兩

桔梗 二兩

吳茱萸 二兩

前胡 三兩

鼈甲 三兩

枳實 二兩

人參 一兩

檳榔子 十四

故打破

右九味切以水九升煮取二升七合去滓分温三服如

人行八九里久忌猪羊肉錫苜菜等

又療冷痲痺氣發即痲氣急引膀胱痛氣滿不消食桔梗

九方

藥

海藻松菜
桃李雀肉

桔梗 四分

枳實 四分

鼈甲 四分

人參 四分

當歸 四分

桂心 三分

白朮 四分

吳茱萸 三分

大麥藥 六分

乾薑 四分

甘草 五分

右十一味搗篩蜜和為丸如梧子大一服十九酒下日

再服稍加至二十九禁生葱猪肉苜菜等

又黃耆丸療風虛盜汗不能食腹內有痲痺氣滿者方

黃耆 五分

白朮 六分

鼈甲 五分

白薇 三分

牡蠣 四分

茯苓 六分

桂心 三分

乾薑 四分

枳實 四分

橘皮 三分

當歸 四分

檳榔子 六分

人參 六分

前胡 四分

附子 四分

小臺必要

十二卷

七

經餘居

練 膊 健
肉 桃李雀

右十五味搗篩蜜和為丸如梧子大一服十五丸酒下
日再服加至二十九忌醋物猪肉冷水莧菜生葱並出第十
六卷中

必効練中丸主痺虛熱兩脅下痺痛惡不能食四肢酸弱
口乾唾涕稠粘眼澀頭時時痛并氣衝背膊虛腫大小便
澀小腹痛熱衝頭髮落耳鳴彌至健忘服十日許記事如
少時無禁忌方

大黃 一斤

朴消 十兩

芍藥 八兩

桂心 四兩

右四味搗篩蜜和為丸如梧子平旦酒服二十九日再
稍加至三十九以利為度能積服彌佳縱利不虛人神

良忌生葱

又髓甲丸主痺氣發動不能食心腹脹滿或時發熱方

髓甲 八分

白朮 十分

枳實 八分

芍藥 六分

麥門冬 八分

人參 八分

前胡 六分

厚朴 六分

右八味搗篩蜜和為丸如梧子飲服二十九漸漸加至

三十九冷即酒服極効禁莧菜並出第二卷中

癥癖等一切病方四首

千金翼療癥癖乃至鼓脹滿方

烏牛尿 一升

右一味微火煎如稠糖空肚服大棗許一枚當鳴轉病

○生物粉酪
油膩等亦
忌

出隔日更服慎口味等

三稜草煎主癥癖方

三稜草 取一大束

右一味水五石煮取一石去滓更煎取三斗汁銅器中

重釜煎如稠糖出內器中且以酒一盞服一七日二

服每服常令酒氣相續並出第十九卷中

崔氏療腹中癥癖兼虛熱者不可用純冷專瀉藥宜羈縻

攻之方

鼈甲 八分 龜甲 八分 桑耳 八分 大黃 八分

吳茱萸 八分 防葵 八分 附子 四分

若

右七味下篩蜜和為丸如梧子飲苦酒服十丸日再服

漸漸加一丸以微洩為度無所忌日晚服馬莧汁三四

合以差為期亦是單煮煖此汁服前藥更佳馬齒菜即

馬莧也忌猪肉冷水今詳前方用鼈甲不宜服莧菜云

出第七卷中

又溫白丸療癥癖塊等一切病方

紫苑 三分 吳茱萸 二分 菖蒲 二分 柴胡 二分

厚朴 二分 桔梗 二分 皂莢 三分 烏頭 十分

茯苓 二分 桂心 二分 乾薑 二分 黃連 二分

蜀椒 二分 巴豆 一分 人參 二分

外臺秘要

十二卷

經餘

右十五味合搗下篩和以白蜜更搗二千杵丸如梧子
一服二丸不知稍增至五丸以知為度心腹積聚久瘕
癖塊大如盂碗黃疸宿食朝起嘔變支滿上氣時時腹
脹心下堅結上來搶心傍攻兩脅徹背連胃痛無常處
繞臍絞痛狀如蟲咬又療十種水病八種痞塞反胃吐
逆飯食噎塞或五淋五痔或九種心痛積年食不消化
或婦人不產或斷緒多年帶下淋瀝或痰瘧連年不差
又療一切諸風身體頑痺不知痛痒或半身疼痛或眉
髮墮落又療七十二種風亦療三十六種遁注或癩或
癩或婦人五邪夢與鬼交通四肢沉重不能飲食昏昏

默默只欲取死終日憂愁情中不樂或恐或懼或悲或
啼飲食無味月水不調真似懷孕連年累月羸瘦困弊
遂至於死或歌或哭為鬼所亂莫之知也但服此藥者
莫不除愈臣知方驗便合藥與婦人服之十日下出癥
癖蟲長二尺五寸三十餘枚下膿三升黑血一斗青黃
汁五升所苦悉除當月有子臣兄墮馬被傷腹中有積
血天陰即發羸瘦異常久著在牀命在旦夕臣與藥服
之下如雞肝黑血手大一百片白膿二升赤黃水一升
許其病即差臣知方驗謹上禁生冷飴醋猪羊魚雞犬
牛馬鵝肉五辛葱麪油膩豆及糯米粘滑鬱臭之屬

癖硬如石腹滿方二首

廣濟療腹中疝氣癖硬兩脅臍下硬如石按之痛腹滿不下食心悶欬逆積年不差鼈甲丸方

鼈甲八分 牛膝五分 芎藭四分 防葵四分
州者

大黃六分 當歸四分 乾薑四分 桂心四分

細辛四分 附子四分 甘草四分 巴豆二七
枚志皮敷

右十二味擣篩蜜和丸平旦空腹温酒下如梧子四九

日三服漸加以微利一兩行為度忌生葱金盞菜出第二

必効療腹滿癖堅如石積年不損方

護風

取白楊木東南枝去蒼皮細剉五升熬令黄酒五升

淋訖卽以縮袋盛滓還內酒中密封再宿每服一合

日二出第三卷中

食不消成癥積方四首

類

集驗療凡所食不消方
取其餘頻燒作末酒服方寸匕便吐去宿食卽差
仲備急同陸光祿說有人食桃不消化作病時無桃
就林間得楠桃子燒服之登時吐病卽差千金同出
第六卷中

備急食魚鱸及生肉佳胃隔中不消化吐之不出多成癥

病方

海藻菘菜猪魚生牛肉菜

練

朴消如半雞子一枚

大黃二兩切

右二味以酒二升煮取一升去滓盡服之立消無朴消用芒消消石亦佳肘後同

又宿食不消大便難練中丸方

大黃八兩

葶藶熬

杏仁去皮尖熬

芒消各四兩

右四味擣篩蜜和丸如梧子服七丸日三不知稍加至十九姚方並出第三卷中

古今錄驗療卒食不消欲成癥積艾煎丸方

白艾一束

薏苡根一把

右二味合煮汁成如飴取半升一服之使刺吐去宿食

便 五尺圍

神驗出第十卷中

心下大如杯結癥方二首

病源積聚癥結者是五藏六腑之氣已積聚於內重因飲食不節寒溫不調邪氣重奪牢癥盤結者也久即成癥出第十九卷中

肘後療心下有物大如杯不得食者方

葶藶二兩熬

大黃二兩

澤漆四兩洗

右三味擣篩蜜和擣千杵服如梧子二九日三不知稍加千金文仲集驗古今錄驗同云療癥堅心下大如杯食則腹滿心腹絞痛

又癥癥方

小書必要

十二卷

七

經錄居

斤

竈中黃土一升

生葫一升

右二味先搗葫熟內土復搗以好苦酒澆令氾浥先以塗布一面仍捨病上又塗布上乾復易之取令消止並出

第一卷中

癩癬疔氣灸法四首

崔氏癩癬癩方

令患人平坐取麻線一條繞項向前垂線頭至鳩尾橫截斷即迴線向後當脊取線窮頭即點記乃別橫度口吻吻外截却即取度吻線中摺於脊骨點處中心上下分之各點小兩頭通前合灸三處其所灸處

橫

損

日別灸七壯以上十壯以下滿十日即停看患人食稍得味即取線還度口吻於脊中點處橫分灸之其數一準前法仍看脊節穴去線一二分亦可就節穴下火如相去遠者不須就節穴若患人未損可停二十日外還依前灸之仍灸季肋頭二百壯其灸季肋早晚與灸脊上同時下火也

又灸癩癬法

其癩有根其根有著昔者有著膊上者遣所患人平坐熟看癩頭仍將手從癩頭向上尋之當有脉築築然向上細細尋至膊上至築築頭當膊即下火還與

前壯數無別王丞云背上恐不得過多下火只可細細日別七炷以來

又療癰左右相隨病灸法

第一屈肋頭近第二肋下即是灸處第二肋頭近第

三肋下亦是灸處左右各灸五十壯一時使了千金云灸

癰癰方患左灸左患右灸右脊屈肋數第二肋上第三肋下向肉翅前初日灸三次日五周而復始至五十止忌大蒜條不忌

又灸瘰氣法

從乳下即數至第三肋下共乳上下相當稍似近肉

接腰骨外取穴乳即是灸處兩相俱灸初下火各灸

翅翼

腰內

三壯明日四壯每日加一壯至七壯還從三壯起至

三十日即罷

右前兩種灸法若點時拳脚枕枕點即拳脚枕枕灸若舒脚點時

還舒脚灸並出第七卷中

積聚方五首

病源積聚者由陰陽不和腑藏虛弱受於風邪搏於腑藏之氣所為也腑者陽也藏者陰也陽浮而動陰沉而伏積者陰氣五藏所生始發不離其部故上下有所窮已聚者陽氣六腑所成故無根本上下無所留止其痛無有常處諸藏受邪初未能為積聚留滯不去乃成積聚

肝之積名曰肥氣在左脅下如覆杯有頭足久不愈令人發瘖瘡連歲月不已以季夏戊巳日得之何以言之肺病當傳肝肝當傳脾脾季夏適王王者不受邪肝欲復還肺肺不肯受故留結為積故知肝之積以季夏戊巳日得之也

心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下以秋庚辛日得之何以言之腎病當傳心心當傳肺肺以秋適王王者不受邪心欲復還腎腎不肯受故留結為積故知伏梁以秋庚辛日得之也

覆

脾之積名曰痞氣在胃管覆太如盤久不愈令人四肢不

癰 覆

收發黃疸飲食不為肌膚以冬壬癸日得之何以言之肝病當傳脾脾當傳腎腎以冬適王王者不受邪脾欲復還肝肝不肯受故留結為積故知痞氣以冬壬癸日得之也肺之積名曰息賁在右脅下覆大如杯久不愈令人洒淅寒熱喘欬發肺癰以春甲乙日得之何以言之心病當傳肺肺當傳肝肝以春適王王者不受邪肺欲復還心心不肯受故留結為積故知息賁以春甲乙日得之也

腎之積名曰賁狹發於少腹上至心下若狹賁走之狀上下無時久不愈令人喘逆骨痠少氣以夏丙丁日得之何以言之脾病當傳腎腎當傳心心以夏適王王者不受邪

時 飢

腎欲復還脾脾不肯受故留結為積故知賁飭以夏丙丁日得之也此為五積診其脈駛而緊積聚脈浮而牢積聚脈橫者脅下有積聚脈來小沉實者胃中有積聚不下故食即吐出脈來細更附骨者積也脈出在左積在左脈出在右積在右脈兩出積在中央以部處之診得肺積脈浮而毛按之辟易脇下氣逆背相引痛少氣善忘目瞑皮膚寒秋愈夏劇主皮中時痛如蝨緣狀其甚如鍼刺之狀時痒白色也診得心積脈沉而芤時上下無常處病悸腹中熱面赤咽乾煩掌中熱甚即唾血主身痰癥主血厥夏差冬劇色赤也診得脾積脈浮大而長饑則減飽則見臍起

飢 瓜 茫 生

與穀爭累累如桃李起見於外腹滿嘔泄腸鳴四肢重手足脛腫厥不能臥是主肌肉損色黃也診得肝積脈弦而細兩脅下痛邪走心下足脛寒脅痛引少腹男子積疝也女子病淋也身無膏澤喜轉筋爪甲枯黑春差秋劇色青也診得腎積脈沉而急苦脊與腰相引饑則見飽則減病腰痛少腹裏急口乾咽腫傷爛目眈眈骨中寒主生髓厥喜忘色黑也診得心腹積聚其脈牢強急者生脈虛弱急者死又積聚之脈實強者生沉者死其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云以左足踐右足上除心下積又云病心下積聚端坐柱腰向日仰頭徐以口

生腹自

內氣因而咽之三十過而止開目又云左脅側卧伸臂直脚以口內氣鼻吐之通而復始除積聚心下不便又云以左手按右脅舉右手極形除積及老血又云閉口微息正坐向王氣張鼻取氣逼置臍下小口微出十二通氣以除結聚低頭不息十二通以消飲食令人輕強行之冬月令人不寒又云端坐拄腰直上展兩臂仰兩手掌以鼻內氣閉之自極七息名曰蜀王橋除脅下積聚又云向晨去枕正偃卧伸臂脛瞑目閉口不息極張腹兩足再息頃間吸腹仰兩足倍拳欲息微定復為春三夏五秋七冬九蕩滌五藏津潤六腑所病皆愈腹有病積聚者張吸其腹熱乃

止癥瘕散破即愈矣

出第十九卷中

范汪破積丸療積聚堅癥方

大黃 一斤

牡蠣 三兩 熬

凝水石 一兩

石膏 一兩

石鍾乳 一兩

理石 一兩

右六味搗合丁篩和以蜜丸如梧子先食服酒飲任下

三九日三不知稍增以知為度

又順逆丸主久寒積聚氣逆不能食方

大黃 十分

黃芩 四分

厚朴 四分

乾地黃 四分

桂心 四分

滑石 四分 熬

杏子 四分 去尖皮熬

黃連 四分

麥門冬 四分 去心

右九味搗合下篩和以蜜丸如梧子服十九日再服後食不知稍增以知為度忌蕪荑生葱豬肉

又搗鑿丸療腹中積聚邪氣寒熱消穀方

甘遂一分 芫花一分 芫花一分 桂心一分

巴豆一分 杏人一分 桔梗一分

右七味芫花芫花熬令香巴豆杏人去皮熬令變色已各異搗下細篩搗合丸以白蜜搗萬杵服如小豆一九日三行長將服之傷寒增服膈上吐膈下利小兒亦服婦人兼身亦服名曰捶鑿以消息之忌豬肉蘆筍生葱並出第十三卷中

延年療腹內積聚癖氣衝心肋急滿時吐水不能食兼惡寒方

龍甲六分 防葵四分 人參四分 前胡四分

桔梗四分 檳榔八分 白朮八分 大黃八分

枳實四分 厚朴三分 當歸四分 附子四分

乾薑四分 甘草五分 吳茱萸三分

桃李雀肉
海藻深松菜

右十五味搗篩蜜和為丸梧子大一服十五丸酒下日再服加至三十九丸忌葷菜豬肉生冷魚蒜

又白朮丸主積聚癖氣不能食心肋下滿四肢骨節酸疼盜汗不絕方

子

白朮 六分 黃耆 六分 牡蠣 四分熬 人參 六分
 茯苓 六分 烏頭 六分炮 乾薑 六分 芍藥 四分
 當歸 六分 細辛 四分 麥門冬 四分去心 桂心 五分
 前胡 四分 甘草 六分炙 防葵 三分 龍甲 四分炙
 紫苑 三分炙 檳榔 六分 桔梗 三分

右十九味擣篩蜜和為丸空肚酒下二十九日再加至三十九忌菹菜桃李雀肉大醋猪肉生葱並出第十六卷中

積聚心腹痛方三首

海藻菘菜生菜

病源積者陰氣五藏所生其痛不離其部故上下有所窮已聚者陽氣六腑所成故無根本上下無所留止其痛無

又迫

去皮天兩
人者熬

有常處此皆由寒氣搏於藏腑與陰陽氣相擊下上故心腹痛也診其寸口之脉沉而橫脅下有積腹中有橫積聚痛又寸口脉細沉滑者有積聚在脅下左右皆滿與背相引痛又云寸口脉緊而牢者脅下腹中有橫積結痛而泄痢脉微細者生浮者死出第十九卷中

范汪通命丸療心腹積聚寒中疴痛又心胃滿脅下急繞臍痛方

- 大黃 四分 遠志 四分去心 黃耆 四分 麻黃 四分去節
- 甘遂 四分 鹿茸 四分炙 杏仁 六分炒 豉 一分合
- 巴豆 五十枚去皮熬 芒消 三分

右十味搗合下篩和以蜜丸如小豆先食服三九日再
忌蘆筍野猪肉一方無鹿茸黃耆用黃芩出第十四卷

又療心腹積聚食苦不消胃脅滿除去五藏邪氣四物丸
方

大戟五分 芫花四分 杏仁二分 巴豆一百枚
去皮去兩人者熬別搗湯中練九沸易水暴令燥研

右藥搗合下細篩以雞子中黃亦可以蜜和丸如小豆
日三日增一九覺勿復益欲下頓服七丸下如清漆陳
宿水婦人乳有餘疾留飲者下水之後養之勿飲冷水
長壯者服五丸先食忌野猪肉蘆筍出第十三卷中

古今錄驗匈奴露宿丸療心腹積聚膈上下有宿食留飲

將

神方出僧深

甘草三分 大黃二分 甘遂二分 芫花二分

大戟二分 葶藶子二分 苦參一分 消石一分

巴豆半分
去皮熬

右九味細搗合蜜和丸如小豆服三九當吐下不吐下
稍益至五六丸以知為度先少起忌海藻蘆筍菘菜野
猪肉范汪同出第十卷中

積聚心腹脹滿方一首

病源積聚成病蘊結在內則氣行不宣通還搏於腑藏故
心腹脹滿則煩悶而短氣也出第十九卷中

小臺必要

十二卷

三

經餘居

深師烏頭丸療心腹積聚脹滿少食多厭繞臍痛按之排
 手寒中有水上氣女人產後餘疾大人風癩少小風驚癩
 百病者元嘉中用療數人皆良有一人服五服藥即出蟲
 長一尺餘三枚復出如牛膽黑堅四枚中皆有飯食病即
 愈方

烏頭	七枚	乾薑	五分	皂莢	五分	菖蒲	三分
桂心	四分	柴胡	三分	附子	三分	人參	三分
厚朴	三分	黃連	三分	茯苓	三分	蜀椒	五分
吳茱萸	四分	桔梗	三分				

右十四味搗篩蜜和為丸服如梧子二九日三稍加至

十五丸忌猪肉冷水醋物生葱羊肉餛出第二十三卷中

積聚宿食寒熱方四首

病源積聚而宿食不消者由腑藏為寒氣所乘脾胃虛冷
 故不能消化留為宿食也診其脉來實心腹積聚飲食不
 消胃中冷故也出第十九卷中

千金翼三台丸療五藏寒熱積聚臚脹腸鳴而噫食不作
 肌膚甚者嘔逆若傷寒瘧已愈令不復發食後服五丸
 飲多者吞十九丸長服令人大小便調和長肌肉方

大黃	二兩	熟消石	一升	葶藶	一升	前胡	二兩
厚朴	一兩	附子	一兩	茯苓	半兩	半夏	一兩

杏仁一升去尖皮熬細辛一兩

右十味搗篩蜜和搗五千杵酒服如梧子五丸稍加以知為度忌猪羊肉饒生菜酢物深師同出第二十卷中

古今錄驗氣痞丸療寒氣痞積聚結不通繞臍切痛腹中脹滿胃逼滿風入藏憂患所積用力不節筋脉傷羸瘦不能食飲此藥令人強嗜食益氣力方

烏頭二分甘草二分葶藶子二分大黃二分

芎藭二分芍藥二分甘皮二分

右七味下篩蜜和丸如梧子一服三九日再不知漸至五九七九一方桂心二分去甘皮忌海藻菘菜猪肉冷

通草即甘草皮疑是

水等一方有通草無甘皮

又小烏頭丸療久寒積聚心腹繞臍切痛食飲不下方

烏頭三兩甘草三兩茱萸半兩細辛二兩

半夏二兩洗三十遍附子二兩藁本二兩

右七味下篩蜜和丸如梧子大先食服五九日再不知稍增之忌羊猪肉冷水生菜海藻菘菜錫

又五通丸主積聚留飲宿食寒熱煩結長肌膚補不足方

椒目一兩附子一兩厚朴一兩杏仁三兩去皮

半夏一兩洗葶藶三兩芒消五兩大黃九兩

右八味搗葶藶子杏仁使熟和諸藥末和以蜜搗五千

杵吞如梧子二九忌猪羊肉飭冷水出第十卷中

療癥方三首

病源癥者由寒溫失節致腑藏之氣虛弱而食飲不消聚結在內漸滌生長塊段盤牢不移動者是癥也言其形狀可徵驗也若積引歲月人則柴瘦腹轉大遂至於死診其脉弦而伏其癥不轉動者必死出第十九卷中

范汪療癥病丸方

射罔

二兩熬

蜀椒

三百粒

椒青

右二味擣末下細篩以雞子白和丸半如麻子半如赤小豆先服如麻子漸服如赤小豆二九不知稍增之以

知爲度

出第十三卷中

集驗療心腹宿癥及卒得癥方

取雄雞一頭飼之令肥肥後餓二日以好赤朱泔飯極令朱多以飼雞安雞著板上取糞暴燥末溫清酒服五分七可至方寸七日三若病因急者晝夜可五六服一雞少更飼餘雞取足出第六卷中

備急熨癥方

吳茱萸

三升碎之

右一味以酒和煮熱布裹以熨癥上冷更炒更番用之癥移走逐熨都消乃止也肘後方云亦可用射罔五兩

外臺秘要 卷中
菜黃末以雞子白和塗癥上出第三卷中

暴癥方六首

病源暴癥者由藏氣虛弱食生冷之物藏既本弱不能消之結聚成塊卒然而起其生無漸名之暴癥也本由藏弱其癥暴生至於成病斃人則速出第十九卷中
肘後療卒暴癥腹中有物堅如石痛如刺晝夜啼呼不瘳之百日死方

取牛膝根

二斤 咬咀 暴令極乾

右一味酒一斗浸之密器中封口舉著熱灰中溫之令味出先熱服五六合至一升以意量多少又用葫蘆根

蜜

亦準此大良

千金

集驗經心錄張文仲同

又凡癥堅之起多以漸生而有覺便牢大者自難瘳也腹中微有結積便害飲食轉羸瘦瘳多用陷冰玉壺八毒諸大藥今上取小小易得者方

取虎杖根勿令影臨水上者可得石餘淨洗乾之擣作末以秫米五斗炊飯內攪之好酒五斗漬封藥消飯浮可飲一升半勿食鮭鹽癥當出亦可但取其根一升乾擣手杵酒漬飲之從少起日三亦佳此酒瘳癥乃勝諸大藥張文仲同

又方

經心錄

十二卷

三

經餘居

他

大黃 半斤 朴消 三兩 蜜 一斤

右三味合於湯上煎可丸如梧子服十九日備急文

同惟崔氏用朴消半斤蜜一升半服二十九日再服餘

千金翼療卒暴癥方

蒜十片去皮五月五日戶上者良 伏龍肝鴨卵大一枚 桂心一尺二寸

右三味合擣以淳苦酒和之如泥塗著布上掩病處三日消附後千金同凡蒜或無桂心亦得用也 忌生葱

又方

商陸根擣蒸之以新布籍腹上以藥鋪布上以衣覆冷即易取差止數日之中晨夕勿息千金集驗附後同並出第十九

卷中

古今錄驗療暴得癥方

取葫藿根一小束淨洗瀝去水細切以醇酒浸之取淹根三宿服五合至一升日三若欲速得可於熱灰中溫令藥味出服之此方無毒已愈十六人神驗藥盡復作將服之出第十卷中

鼈癥方四首

病源鼈癥者謂腹內癥結如鼈之形狀也有食鼈觸冷不消而生癥者有食雜物冷物不消變化而作者此皆脾胃氣弱而遇冷不能剋消故也癥者其病結成推之不動移是

也。得

也 出第九卷中

廣濟療鼈癥服白馬尿方

白馬尿一升五合溫服之令盡差

又方

白馬尿一升 雞子三枚破取白

右二味於鐺中煎取三合空腹服之不移時當吐出病

無所忌 千金同

又療鼈癥蟹爪丸方

蟹爪三分 附子六分 麝香三分 半夏六分 洗十遍

生薑四分 鼈甲六分 防葵六分 郁李人八分

右八味搗篩蜜和為丸如梧子空肚以酒下二十九日再服以知為度忌生冷猪肉苽菜 並出第二卷中

油膩熱藥 蒼高麥陳 臭粘膩羊 肉錫

集驗療鼈癥伏在心下手揣見頭足時時轉者并心腹宿癥及卒得癥方

白雌雞一隻絕食一宿明旦以膏熬飯飼之取其尿

無問多少以小便和之於銅器中火上熬令燥搗篩

服方寸匕日四五服消盡乃止常飼雞取屎並畢殺

雞單食之 附後同出第六卷中

米癥方二首

病源人有好啞米 啞謹按說文於革切笑也集韻無此字但有飢乙革切飢也今詳啞者飢而喜

小經必更 十二卷 經餘居

禁淡

食之義轉久彌嗜啞之若不得米則胃中清水出得米便也下同止米不消化遂生癥結其人常思米而不能飲食久則斃人出第十九卷中

廣濟療米癥其疾常欲食米若不得米則胃中清水出方

雞屎一升

白米五合

右二味合炒取米焦擣篩為散用水一升頓服取盡少時即吐吐出癥如研米汁碎若無癥即吐白沫痰水乃懼米不復食之無所忌并全同

又療米癥久不療羸瘦以至死方

葱白兩虎口切

烏梅三十枚碎

右二味以水三升宿漬烏梅使得極濃清晨噉葱白隨飲烏梅汁令盡頃之心腹煩欲吐即令出之三晨療之當吐去米癥差無所忌並出第三卷中

食癥及食魚肉成癥方二首

病源有人卒大能食乖其常分因饑值生葱便大食之乃吐一肉塊繞畔有口其病則愈故謂食癥特由不幸致此妖異成癥非飲食生冷過度之病也出第十九卷中

廣濟療食癥病食葱差方

有一人食飯七升并羊脂餅番不論數因於道中過饑急食生葱須臾吐出一實薄而圓繞畔有口無數

飢實

媛

飢

小意必類

十二卷

經

經餘居

卽以食投之立消盡飯七升乃止吐此物後其人食病便愈此名食癥無忌出第二卷中

千金療食魚肉等成癥結在腹內并諸毒氣方

狗糞五升

右一味燒灰末之綿裹以酒一斗漬再宿濾取清分十服日三服三日令盡隨所食癥結卽便出矣出第十一卷中

髮癥方二首

病源有人因食飲內誤有頭髮隨食而入胃成癥胃喉間如有蟲下上來去者是也出第十九卷中

廣濟療髮癥乃由人因食而入久卽胃間如有蟲上下去

來唯欲得飲油方

油一升

右一味以香澤煎之大銚鑊貯之安病人頭邊以口鼻臨油上勿令得飲及傳之鼻面並令有香氣當叫喚取飲不得與之必疲極眠睡其髮癥當從口出飲油人專守視之并石灰一聚見癥出以灰粉手捉住抽出須臾抽盡卽是髮也初從腹出形如不流水中濃水隨髮長短形亦如之無忌千金同

又療胃喉間覺有癥蟲上下偏聞葱豉食香此是髮蟲故也方

油煎葱豉令香二日不食張口而卧將油葱豉置口邊蟲當漸出徐徐以物引去之無所忌出第二卷中

蝨癩方一首

病源人有蝨蝨性好齧之所齧既多而腑臟虛弱不能消之不幸變化生癩而患之者亦少俗云患蝨癩人見蝨必齧之不能禁止蝨生長在腹內時有從下部出亦斃人出第十九卷中

千金療蝨癩由嚙蝨在腹生長為蝨癩方

故篋子一枚

故梳子一枚

右二味各破為兩分各取一分燒作灰末之又取一分

以水五升煮取一升用頓服前末盡少時當病出無所

忌廣濟同出第二卷中

鼈瘕方一首

病源鼈瘕者謂腹內瘕結如鼈狀是也有食鼈觸冷不消而生者亦有食諸雜冷物變化而作者皆由脾胃氣弱而遇冷即不能剋消所致瘕言假也謂其形假而推移也昔曾有人其奴俱患鼈瘕奴在前死遂破其腹得一白鼈仍故活有人乘白馬來看此鼈白馬忽尿墮落鼈上即縮頭及脚尋以馬尿灌之即化為水其主曰吾將愈矣即服之果如其言得差故養生云六月勿食澤中水令人成鼈瘕

崔氏療龍瘕方

大黃 六銖

乾薑 半兩

附子 九銖

人參 九銖

。側子 半兩

桂心 六銖

貝母 半兩

白朮 一兩

細辛 十八銖

。蜚蠊 大一寸者七枚熬

右十味擣下篩以酒服半方寸七日三忌猪肉冷水

生菜生葱桃李雀肉

蛇瘕方一首

病源人有食蛇不清因腹内生蛇瘕也亦有蛇之津液誤入飲食內亦令人病瘕其狀常苦饑而食則不下喉噎塞

飢

食至胃內即吐出其病在腹摸揣亦有蛇狀謂蛇瘕也

崔氏療蛇瘕大黃湯方

大黃 半兩

芒消 一枚

如雞子

烏鰂魚骨 三枚

黃芩 半兩

甘草 如人指

皂莢 六枚

如猪牙者炙去皮子

右六味咬咀以水六升煮之三沸下絞去滓內芒消適寒溫盡服之十日一劑煮作如上法欲服之宿無食平

且服當下病也

千金同出第九卷中忌海藻菘菜

蛟龍病方一首

病源蛟龍病者云三月八月蛟龍子生芹菜內人食芹菜

大

不幸隨入人腹變成蛟龍其病之狀發則如癩出第十九卷中

廣濟療蛟龍病三月八月近海及水邊因食生芹菜為蛟

龍子生在芹菜上食入人腹變成龍子須慎之其病發似

癩面色青黃少腹脹狀如懷妊宜食寒食餠方

寒食粥餠三升日三服之吐出蛟龍有兩頭及尾開

皇六年又賈橋有人喫餠吐出蛟龍大驗無所忌金

方同出第二卷中

強

胃痺方二首

病源寒氣客於五藏六腑因虛而發上衝胃間則胃痺胃

痺之候胃中悞悞如滿噎塞不利習習如痒啞裏澁唾燥

甚者心裏強痞急痛肌肉苦痺絞急如刺不得俛仰胃前

皮皆痛手不能犯胃滿短氣欬唾引痛煩悶白汗出或徹

背脊其脉浮而微者是也不治數日殺人其湯熨鍼石別

有正方補養宣導今附於後養生方云以右足踐地左足

上除胃痺食熱嘔出第二十卷中

仲景傷寒論療胃痺理中湯方

人參三兩 甘草三兩 白朮三兩 乾薑三兩

右四味切以水八升煮取三升去滓溫服一升日三夜

一頻服三劑愈張仲景云胃痺心中痞堅留氣結於胃

胃滿痺下逆氣捨心埋中湯亦主之 子

金同出第十六卷中

心海藻
菘菜桃
李雀肉
等

小臺必聖

十二卷

三

經錄

深師療胃痺麝香散方

麝香 四分 牛黃 二分 生犀角 一分

右三味研服五分匕日三忌生冷物葱蒜出第十六卷

胃痺短氣方三首

千金論曰夫脉當取太過與不及陽微陰弦即胃痺而痛所以然者責其極虛故也今陽虛知在上焦所以胃痺心痛者以其脉陰弦故也平人無寒熱短氣不足以息者實也仲景傷寒論同胃痺之病喘息欬唾胃背痛短氣其脉沉而遲關上小緊數者栝樓湯主之方

栝樓 一枚 薤白 一斤 半夏 半升 生薑 四兩

枳實 二兩

右五味切以白截漿一斗煮取四升服一升日三劑後仲景傷寒論無生薑枳實半夏等三味同小品云用水一斗忌羊肉餛

又胃中氣塞短氣茯苓湯主之方

茯苓 三兩 甘草 一兩 杏仁 五十枚去

右三味咬咀以水一斗煮取五升溫服一升日三服不

差更合仲景傷寒論同並出第十三卷中

深師療胃痺連背痛短氣細辛散方

細辛 乾地黃 甘草 各二兩 桂心

忌大醋 海葶 葶 達

息海藻
菜大醋
黃生葱
李雀肉等

胎

茯苓 各五兩

枳實 各

白朮

生薑

栝樓實 各三兩

右九味搗篩酒服方寸匕日三古今錄驗千金同出第十三卷中

胃痺心下堅痞緩急方四首

千金論胃痺之病令人心下堅痞急痛肌中苦痺絞急如刺不得俛仰其胃前皮皆痛手不得犯胃中幅幅如滿咽塞習習痒喉中乾燥時欲嘔吐胃滿短氣欬唾引痛煩悶白汗出或徹引背腹痛不即療之數日殺人出第十三卷中
范汪療胃痺心中痞堅留氣結於胃中胃滿脅下逆氣搶心枳實湯方

陳枳實 四枚

厚朴 四兩

薤白 八兩

桂心 一兩

栝樓實 一枚

右五味先以水五升煮枳實厚朴取二升半去滓內餘藥又煎三兩沸去滓分溫三服除心氣良古今錄驗千金同此本仲景傷寒論方

齊

忌生葱

古今錄驗療胃中隱然而痛脊膂肩痛方

枳心 一分

乾薑 一分

人參 三分

細辛 三分

烏頭 一分

山茱萸 三分

貝母 三分

右七味搗下篩和以蜜丸如小豆大酒若粥汁吞二九稍稍益以胃中痛止溫溫為度忌生葱生菜猪肉冷水

外臺必

十二卷

經

徐

冷

又療胃痺偏緩急薏苡人散方

薏苡人五百枚 附子十枚大者 甘草三兩

右三味擣下篩服方寸匕日三忌海藻菘菜猪肉冷水

又療胃痺偏緩急薏苡人散方

薏苡人一千五百枚 附子大者十枚

右二味擣下篩服方寸匕日三不知稍增之忌猪肉冷

水此方出僧深范汪同仲景方用薏苡人十五兩並出第八卷中

胃痺噎塞方二首

仲景傷寒論胃痺之病胃中幅幅如滿噎塞習習如養喉中澀唾燥沫是也橘皮枳實湯主之方

橘皮半斤 枳實四枚 生薑半斤

右三味切以水五升煮取二升分再服附後小品文仲深師范汪古今

錄驗經心錄千金同出第十五卷中

千金通氣湯療胃滿短氣噎塞方

半夏八兩 生薑六兩 桂心三兩 吳茱萸四十枚

右四味切以水八升煮取三升去滓分溫三服忌羊肉錫生葱此方無桂心用橘皮出第十三卷中

胃痺欬唾短氣方四首

仲景傷寒論胃痺之病喘息欬唾胃背痛短氣寸脉沉而遲關脉小緊數者栝樓薤白白酒湯主之方

黃四十三字
紙裂

斤

通按一
藏音再
辭也
釋米汁
也

栝樓實 一枚

薤白 切半升

右二味以白截酒七升煮取二升去滓温分再服

深師
范汪

同出第十五卷中

肘後論胃痺之病令人心中心中堅痞急痛肌中苦痺絞急如刺不得俛仰其胃前及背皆痛手不得犯胃滿短氣欬唾引痛煩悶白汗出或微引背脊不即療數日殺人療卒患胃痺方

雄黃

巴豆

去皮心熬

右二味先搗雄黃細篩內巴豆務熟搗之相和丸如小豆服一九不覺稍益忌野猪肉蘆笋

又方

枳實

炙

右一味搗篩以米汁先食服方寸匕日三夜一

又或已差復更發方

取薤根

五斤

右一味搗絞取汁飲之立愈

並出第一卷中

胃痺心痛方四首

仲景傷寒論胃痺不得卧心痛徹背者栝樓薤白半夏白

截漿湯主之方

大栝樓

一枚

薤白

兩切三

半夏

半升洗

右三味以白截漿一斗煮取四升去滓温服一升日三忌羊肉錫古今錄驗同范汪同出第十五卷中

千金療胃痺心痛方

灸臆中百壯穴在鳩尾上一寸一云膺膈中行直兩乳內間是忌饌

又療胃脅滿心痛方

灸期門隨年壯穴在第二肋端乳直下不容旁一寸半是並出第十三卷中

古今錄驗小草九療胃痺心痛逆氣膈中飲不下方

小草三分 桂心三分 蜀椒三分 乾薑二分
細辛三分 附子二分

右六味擣合下篩和以蜜丸如梧子大先食米汁服三九日三不知稍增以知爲度忌猪肉冷水葱生菜范汪

胃痛方二首

范汪療胃痛枳實散方

枳實 八分炙 桂心 五分

右二味擣下篩酒服方寸七日三忌生葱深師同

深師療胃痛枳實散方

枳實 四枚炙 神麴 一兩熬 白朮 一兩

右三味擣篩酒服方寸七日三忌桃李雀肉等出第十卷中

賁氣方四首

病源夫賁者腎之積氣也起於驚恐憂思所生也若驚恐則傷神心藏神也憂思則傷志腎藏志也神志傷動氣積於腎而氣下上遊走如狔之賁故曰賁狔其氣乘心若心中踊踊如車所驚如人所恐五藏不定食飲輒嘔氣滿胃中狂癡不定妄言妄見此驚恐奔狔之狀也若氣滿支心心下煩亂不欲聞人聲休作有時乍差乍劇吸吸短氣手足厥逆內煩結痛温温欲嘔此憂思賁狔之狀也診其脉來祝祝一云觸祝者病賁狔也腎脉微急沉厥賁狔也其足不收不得前後出第十三卷中

車蓋

所負者如禍崇罪負鬼神信之

小品黃帝問金冶子曰驚為病如奔狔其病奈何金冶子對曰驚為奔狔心中踊踊如事所驚如人所恐常五藏不定食飲輒嘔氣滿胃中狂癡欲走閉眼謬言開眼妄語或張面目不相取與眾師不知呼有所負賁狔湯主之黃帝曰善黃帝問金冶子曰憂思賁狔何以別之金冶子對曰憂思賁狔者氣滿支心心下煩亂不欲聞人之聲發作有時乍差乍劇吸吸短氣手足厥逆內煩結痛温温欲嘔眾師不知呼有觸忤奔狔湯主之黃帝曰善師曰病如奔狔者氣從少腹起上衝喉咽發作欲死復還者皆從驚恐得之腎間有膿故也范注同

師曰病有奔狫有吐膿有驚怖有火邪此四部病者皆從驚發得之火邪者桂枝加龍骨牡蠣湯主之若新亡財為縣官所捕迫從驚恐者療用鴟頭鉉此意相近鉉一云角為馬鞭末即於羊角復餘物未定未定者上所言奔狫者病人氣息逆喘迫上如狫奔走之狀奔狫湯主之

又療卒傷損食下則覺胃中偏痛慄慄然水漿下亦爾問病與相應急作此方

生李根

一斤細剉之

麥門冬

一升去心

人參

二兩

桂心

二兩

甘草

一兩炙

右五味咬咀以水一斗煮取三升分三服范注同

息海藻
菘菜生葱

二

之

上

又奔狫湯療虛勞五藏氣乏損遊氣歸上上走時若群狫相逐憧憧時氣來便自如坐驚夢精光竭不澤陰痿上引少腹急痛面乍熱赤色喜怒無常耳聾目視無精光方

葛根

八兩乾者

生李根

切一升

人參

三兩

半夏

一升洗

芍藥

三兩

當歸

二兩

桂心

五兩

生薑

二斤

甘草

炙二兩

右九味切以水二斗煮得五升溫服八合日三不知稍

增至一升日三忌羊肉鴛生葱海藻菘菜等

出第十一卷中

肘後療卒厥逆上氣氣支兩脅心下痛滿淹淹欲絕此謂奔豚病從卒驚怖憂迫得之氣從下上上衝心胃臍間築

小經必百

十二卷

聖

臣余君

築發動有時不療殺人方

甘草 二兩 人參 二兩 吳茱萸 升一 生薑 一斤

半夏 一升 桂心 三兩

右六味切以水一斗煮取三升分三服此藥須預畜得病便急合服之 千金方桂五兩甘草三兩張文仲同。

賁豚氣衝心胃方四首

廣濟賁豚氣在心吸吸短氣不欲聞人語聲心下煩亂不安發作有時四肢煩疼手足逆冷方

李根白皮 八兩 半夏 七兩 乾薑 四兩 茯苓 三兩
人參 二兩 甘草 二兩 附子 一兩 桂心 四兩

寄

右八味切以水一斗煮取三升絞去滓分三服別相去如人行六七里忌生冷羊肉餛海藻菘菜油膩醋物生葱粘食 范汪同。

又療賁豚氣在胃心迫滿支脇方

生薑 一斤 半夏 四兩 桂心 三兩 人參 二兩
甘草 二兩 吳茱萸 兩一

右六味切以水一斗者取三升絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里忌生葱熱麩羊肉餛粘食海藻菘菜 范汪同並出第四卷中。

集驗賁豚茯苓湯療短氣五藏不足寒氣厥逆腹脹滿氣

外臺秘要

十二卷

四六

經餘居

虛

忌海藻菘菜生葱羊肉餛出第一卷中

賁走衝胃膈發作氣欲絕不識人氣力麻瘦少腹起騰踊如純子走上走下馳往馳來寒熱拘引陰器手足逆冷或煩熱者方

茯苓 四兩

生葛 八兩

甘草 三兩

生薑 五兩

半夏 湯洗一升

人參 三兩

當歸 二兩

芍藥 二兩

李根白皮 升切

右九味切以水一斗二升煮取五升服一升日三夜二

服忌羊肉鴿海藻菘菜酢物等

又療賁氣上衝胃腹痛往來寒熱賁氣湯方

甘草 二兩

芍藥 二兩

當歸 二兩

半夏 湯洗四兩

黃芩 三兩

生葛 五兩

芍藥 三兩

生薑 四兩

甘李根 白皮切一升

右九味切以水二斗煮取五升去滓溫服一升日三夜

二服忌海藻菘菜羊肉鴿等並出第四卷中

雜療奔弛氣及結氣方六首

深師療勞寒熱愁思及飲食隔塞虛勞內傷五藏絕傷奔氣不能還下心中悸動不安七氣湯方

桔梗 二兩

人參 三兩

芍藥 三兩

茱萸 七合

黃芩 二兩

乾地黄 三兩

枳實 五枚

桂心 二兩

乾薑 三兩

甘草 二兩

橘皮 三兩

半夏 三兩

右十二味切以水一斗煮取三升去滓分三服忌海藻
菘菜羊肉錫生葱猪肉蕪荑等千金無桂心橘皮桔梗
有厚朴栝萎蜀椒

集驗療賁氣從下上者湯方

生葛 五兩 半夏 五兩 黃芩 二兩 桂心 二兩

芍藥 三兩 人參 二兩 生薑 五兩

甘李根白皮 五兩

右八味切以水一斗五升煮取五升去滓溫分爲五服
日三夜二服忌羊肉錫生葱出第四卷中

小品壯蠟賁湯療賁豚氣從少腹起懂胃手足逆冷方

壯蠟 三兩 桂心 八兩 李根白皮 一斤 甘草 三兩

右四味切以水一斗七升煮取李根皮得七升去滓內
餘藥再煮取三升分服五合日三夜再忌生葱海藻菘

菜范注同

又療手足逆冷胃滿氣促從臍左右起鬱胃者奔豚湯方

甘草 四兩 李根白皮 一斤 葛根 一斤 黃芩 三兩

桂心 二兩 栝樓 二兩 人參 二兩 芎藭 一兩

右八味切以水一斗五升煮取五升去滓溫服一升日
三夜再忌海藻菘菜生葱范注同

又方桐君說

伏出雞卵殼中白皮 梨木灰 麻黃 去節

梨

紫苑各等分

右四味擣下篩作丸散隨宜酒服十九丸如梧子散者方
十七療三十年喉中結氣欬逆立差也亦可水煮為湯
以意分之經心錄同並出第一卷中

大

千金奔氣湯主火氣上奔腎膈中諸病每發時迫滿短氣
不得卧劇者便惰欲死腹中冷濕氣腸鳴相逐成結氣方

桂心 五兩 生薑 一斤 人參 三兩 半夏 一升

吳茱萸 升 甘草 三兩

右六味切以水一斗煮取三升去滓分為四服忌羊肉
錫生葱海藻菘菜出第十七卷中

灸奔豚法六首

千金療奔豚腹腫法

灸章門一名長平二穴在大橫外直臍季肋端百壯

又主奔豚衝心不得息法

灸中極一名玉泉在臍下四寸五十壯

又主奔豚上下腹中與腰相引痛者法

灸中府二穴在雲門下一寸乳上三肋間氣脉是百

壯一云百五十壯

又主奔豚上下者法

灸四滿夾丹田旁相去三寸七壯

傍

又主奔狎法

灸氣海在臍下一寸半百壯

又法

灸關元在臍下三寸五十壯亦可百壯並出第十七卷中

校

右通功郎充兩浙東路提舉茶鹽公幹辦公事張寔較

重訂唐王壽先生外臺秘要方第十二卷終

