



武 9
612
23



明中武
第 212
卷 23

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十三卷目錄

瘰癧咽喉癰
瘰二十八門

瘰癧方一十八首

氣瘰方一十首

五瘰方八首

灸瘰法一十三首

瘰方三首

白瘤及二三十年瘤方三首

喉痺方二十一首

咽喉中閉塞方三首

喉舌生瘡爛方八首



小臺秘要

二十三卷目錄

經餘居

喉咽生瘡方四首

咽喉腫方五首

喉卒塞痛及卒毒攻痛方三首

懸癰腫方三首

咽喉雜療方四首

寒熱癰瘰方一十一首

癰瘰結核方四首

惡核癰瘰方四首

癰腫癰核不消方五首

鼠瘻及癰瘰方一十一首

毒腫癰瘰方四首

灸癰瘰法六首

九瘻方三十一首

諸瘻方一十五首

腋臭方三十七首

漏液方三首

七孔臭氣方三首

令人體香方四首

雜療汗出不止方一十首

唐王燾先生外臺秘要方第二十三卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等

上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

癭病方一十八首

癭病源癭者由憂恚氣結所生亦由飲沙水沙隨氣入於脉
 搏頸下而成之初作與癭核相似而當頸下也皮寬不急
 垂槌槌然是也恚氣結成癭者但垂核槌槌然無脉也飲
 沙水成癭者有核癩癩然無根浮動在皮中又云有三種
 癭有血癭可破之息肉癭可割之有氣癭可具針之養生

癭按
 提也
 木作
 融融
 若白
 腹則
 應方

方云諸山水黑土中出泉流者不可久居常食令人作瘦
病動氣增患出第三十一卷中

肘後療頸下卒結囊漸大欲成瘦海藻酒方

海藻一斤去鹹 清酒 二升

右二味以絹袋盛海藻酒漬春夏二日一服二合稍稍
含咽之日三酒盡更以酒二升漬飲之如前滓暴乾末
服方寸匕日三盡更作三劑崔氏文仲同

又方

昆布海藻等分末之蜜丸含如杏核大含稍稍咽汁
日四五並出中卷

深師療瘦方

桂心 昆布洗 海藻洗 甘草炙

白麩熬錢三分 龍膽草 海蛤研 土瓜根

半夏洗 吳茱萸 牡蠣熬各一兩

右十一味為散酢漿水服五分匕先食日三十日知盡
藥愈節食鹽羊肉錫生葱菘菜

又方

海藻二分洗 龍膽草二分 昆布二分洗 土瓜根二分

半夏二分洗 小麥炒二分

右五味為散先食酒服方寸匕日三二十日知三十日

愈忘羊肉錫並出第二十九卷中

小品瘰癧病者始作與瘰核相似其瘰癧病喜當頸下當中央不偏兩邊也乃不急臄直灣切重臄病也然則是瘰也中國人息氣結瘰者但垂臄臄無核也長安及襄陽蠻人其飲沙水喜瘰有核瘰癧耳無根浮動在皮中其地婦人患之腎氣實沙石性合於腎則令腎實故病瘰也北方婦人飲沙水者產乳其於難非針不出是以比家有不救者良由此也

瘰癧方

小麥 一升

醇苦酒一升漬小麥令釋漉出暴燥復漬使苦酒盡暴

通按 其於二子當是也

通按 釋解也 所米

已程是 服也

麥燥擣篩以海藻三兩別擣以和麥末令調酒服方寸

匕日三禁鹽生魚生菜豬肉肘後崔氏備急云瘰三十

同出第十卷中肘後用海藻五兩

集驗瘰癧酒方

是水雨經露出柳根 三十升

右以水一斛煮得五斗同米三斗釀之酒成先食服一升日三范汪同出第四卷中

崔氏海藻散瘰癧方

海藻八兩洗去鹹汁 貝母 二兩 土瓜根 二分

小麥麩 二分

右四味作散酒服方寸匕日三

又方

秣米三升依酒法炊

右一味取圓葉白楊皮十兩去上蒼者慎勿令見風細切以水五升煮取二升濃汁漬麩末五兩用前件秣米依酒法酸之熟訖封塞一七日然後空腹服一大盞日再服三日內即効神驗無比並出第四卷中

張文仲隱居効驗療癭方

昆布洗

松蘿各三分

海藻五分

右三味搗蜜丸如杏核大含咽津日三夜二大佳傳急前後

同

又療癭司農揚承服効第一方

昆布六分

海藻七分

松蘿

乾薑

桂心各四分

通草五分

右六味擣篩蜜丸如梧子一服吞七丸即住在頸下癭處欲至食時即先飲少酒下却九子後然進食禁酢蒜鹽酪臭肉倉米等若癭大者加藥令多取差

又第二方

昆布洗

海藻洗各一斤

右一味細切好酒五升浸七日量力取數服酒盡以酒

更浸兩遍藥力盡當以此酒下前九藥益善備急肘後同

又方

小麥 三升

右以三年米酢三升漬麥暴乾乾更浸使酢盡又暴乾搗篩為散別搗昆布為散每服取麥散二匕昆布散一匕且飽食訖清酒和服之若不能飲酒者以水和服亦得服盡即差多服彌善無所禁但不用舉重及悲啼煩惱等事肘後備急集驗同

又含丸方

檳榔人 三兩

馬尾海藻 三兩

昆布 三兩

右三味末之蜜丸如雞子黃大每日空腹含一九徐徐令津液取汁咽之忌鹽竝楊丞方服驗肘後備急同竝出第六卷中

救急療瘦要切方

鼠粘草根 一升天升湯洗

右細切除皮者一升一物以水三升煮取一升半分溫三服服相去如人行四五里一服宜頓服六劑病即差一方削除皮細切取三大升搗篩為散蜜和丸如梧子一服二十九日再服之稍稍加至三十九以無灰酒進之出第五卷中

古今錄驗療氣瘦方晉州熙公奏徐公方

通按 問荆味 苦不無 毒主粘 氣麻痛 上乳氣 急形似 木賊 船生脂 師燭半 之食隔

外醫秘製

問荆 一兩出

羯羊靨 脂五具去

白欬

椒目

甘草 炙各一分

小麥麩末 二兩

右六味搗篩為散羊靨一種別搗為末相和好漿浸更搗作丸如小棗大一服五丸無禁

又方 縣令祖師家進二方

羊靨一百枚煖湯浸去脂炙大棗二十枚去皮作丸服忌慎如常藥法

又方

取羊靨一具去脂含汁汁盡去皮日一具七日含便差

又療瘦海藻散方

海藻 十分

昆布 一兩

海蛤 一兩

通草 一兩

菘蘿 洗

乾薑

桂心 各半

右七味下篩酒服一錢七日三出第四十一卷中附後

氣瘕方一十首

廣濟療氣瘕氣胃膈滿塞咽喉項頸漸羸昆布丸方

皂布 二兩洗

通草 二兩

羊靨 二兩

海蛤 一兩

馬尾海藻 一兩洗

右五味蜜丸如彈子細細含咽汁無食前後忌生菜熱麪炙肉蒜

筭

又療冷氣築咽喉噎塞兼瘦氣昆布丸方

昆布 八分

乾薑 六分

犀角 六分

吳茱萸 四分

人參 八分

馬尾海藻 四分

葶藶子 六分

杏人 八分去皮尖熬

右八味搗篩蜜丸如梧子空腹以飲服忌生冷粘食陳

臭等餘忌同前

又療氣妨塞方

昆布 三兩

菘蘿

通草

柳根鬚 各三兩近水生者

右四味搗篩蜜丸如彈丸大以海藻湯浸細細含之咽

盡勿停忌舉重生嗔憂悲等

恐杏 能細連

又療瘦細氣方

昆布 十二分

馬尾海藻 十分

合人 各一分去皮尖熬

通草

麥門冬 去心

連翹 各六分

乾薑

橘皮 各六分

茯苓 八分

松蘿 三兩

右十味搗末以袋盛含之乃以齒微微嚼藥袋子汁出

入咽中日夜勿停有問荆加四分佳忌嗅及勞油膩粘

食益由第二卷中

深師蘓子膏療氣瘦方

臘月豬脂 升一

蘇子

桂心

大黃

當歸

乾薑

橘皮

蜀椒

各三分

右八味切以水六升煮取二升去滓內豬脂消盡服差忌生葱出第二十九卷中

崔氏云凡水瘦氣瘦可差石瘦不可治療氣瘦方

平日手挽瘦令離項也勞切其下根脉斷愈一日一度搗易愈者七日如難差者三七日愈

通按
指取也

又方

昆布 二兩 洗 海藻 二兩 洗 龍膽草 一分 雨 馬刀 半兩 炙
海蛤 半兩 研 大黃 一分 熏黃 半兩

右七味搗蜜丸如梧子大破除日以綿裹一九含咽津朝暮空喉服忌五辛豬肉

又方

海藻 二兩 洗

右一味以淳酒四升漬二宿漉去滓細煖含咽之盡即更造取差為度范汪同並出第四卷中

必効主氣瘦方

白頭翁 半兩 昆布 十分 洗 海藻 七分 洗 通草 七分
玄參 連翹 各八分 桂心 三分 白欬 六分

右八味搗篩蜜丸如梧子五丸若冷用酒服禁蒜麪豬魚生葱出第五卷中

古今錄驗療瘦有在咽喉初起游氣去來陰陽氣相搏遂

通接
解藥
詳

停住喉中前不去腫起如斛羅諸瘰不差小麥湯方

小麥 三升

昆布 二兩 洗

厚朴 炙 一兩

橘皮

附子 炮

海藻 洗 各二兩

生薑 五兩

半夏 洗 五兩

白前 三兩

杏仁 一百枚 去尖皮

右十味切以水一斗煮取三升半分五服相去一炊頃

忌豬肉錫羊肉冷水出第四十一卷中

五瘦方八首

深師五瘦丸方

取麈麝以酒清炙乾令沒再內酒中更浸炙令香圍汁味

盡更易十具愈千金翼同出第二十九卷中

范汪瘰五瘦方

昆布 三兩 洗

海蛤 二兩 研

松蘿 三兩

海藻 三兩 洗

通草

白欬

桂心 各二兩

右七味作散酒服方寸匕日三千金翼同出第四十二卷中

千金瘰石瘦勞瘰泥瘦憂瘰氣瘰方

海藻 洗

龍膽草

海蛤 研

通草

昆布 洗

礬石 燒

松蘿 各三兩

小麥麴 四兩 熬

半夏 洗 二分

右九味作散酒服方寸匕日三禁食魚豬肉五辛生菜

羊肉錫十日知二十日愈

小臺必妥

二十三卷

九

經餘居

通按
到桂草
聖濟總
錄作到
桂草為
是

又方

葛蒲 二兩

海蛤 研一兩

白欬 一兩

海藻 洗一兩

松蘿 一兩

桂心 一兩

椒 汗一兩

羊躑 百枚

半夏 一兩

續斷 一兩

神麴 三兩

到桂草 一兩

右十二味搗作散以羊牛髓和為丸如梧子日服三九

忌羊 肉生葱等翼同

又方

小麥麩 一升

特生礬石 燒一斤

海藻 洗一斤

右三味以陳酢一升漬小麥麩暴乾更漬令酢盡乾各

搗下篩每服兩方寸匕日四五服含乃咽之薑辛生菜同前及

大誦大語吹火用氣翼深師用小麥麩一斗餘同並出

千金翼五癆方

海藻 一兩

昆布 洗

半夏 洗

細辛

土瓜根

松蘿 各一兩

白欬

龍胆草 各二兩

海蛤 二兩

通草 二兩

右十味作散酒服方寸匕日再忌羊肉錫生菜葱不得勞動同前

又方

昆布 二兩

右一味切如大指酢漬含咽汁盡愈

又方

小童必要

二十三卷

經餘三

海藻 一斤

小麥麩 一斤

右二味以陳醋一升浸漉暴令乾復漬令酢盡作散酒服方寸匕日三忌怒出第十一卷中

灸瘰法一十三首

千金灸諸瘰法

灸肩髃左右相宛宛中男左十八壯右十七壯女右十八壯左十七壯再三以差止

又法

灸風池百壯風池夾項兩邊兩穴兩耳上髮際中

此条千金聖濟作灸風池百壯又灸兩耳後髮際百壯乃是兩條然明堂無髮際穴

通按 千金 翼相 字下 有崇 字

又法

灸大椎百壯兩邊相去各一寸半小下垂各三十壯

又法

灸頸衝頸衝在伸兩手直向前令臂著頭對鼻所住

處灸之各隨年壯凡灸五處九穴翼深師並同

穴在肘上七寸其灸五處九穴即風池髮際大椎大杼頸衝五處共九穴也

又瘰上氣并短氣方

灸肺俞一百壯

又瘰上氣胃滿法

灸雲門五十壯

通按 大椎兩 寸半 大椎穴

又瘦上氣方

灸胃堂百壯

又瘦惡氣法

灸天府十五壯

又瘦方氣法

灸衝陽隨年壯在肘外屈橫文頭是

據此是曲池穴衝陽在足跌上

十五

又療瘦法

灸天瞿三百壯橫黃三開寸灸之

又瘦氣面腫法

通按明堂無大瞿穴

灸通天五十壯在耳上二寸

又灸瘦法

灸中封隨年壯在兩足跌土曲尺宛宛中

並出第二十五卷中

又灸瘦法

灸耳後髮際有一陰骨骨間有一小穴亦有動脈準

前灸大効已上穴所在具三十九卷明堂中

出第六卷中

瘤方三首

肘後云皮肉中忽腫起初如梅李漸長大不痒不痛又不

堅強按之柔軟此血瘤也不療乃至如盤大則不可復消

而非殺人病爾亦慎不可破方乃有大療今如覺但依瘦

通按中封在足內踝前十此云附土疑誤又按前方並出千金第二十五卷非卷也

家療療若不消更引別大方出中卷

深師療癰脂細癰方

吳茱萸分一

礬石燒

芫蕪

當歸

大黃

黃連

芍藥

白欬

黃芩各二分

右九味合搗下篩和雞子塗著細故熟布上隨癰大小薄厚貼之燥輒易之著藥當熟作膿脂細細從孔中出探知膿血盡著生膏肉若膿不盡復起起故也生肉膏方如左

又生肉膏療癰瘡潰漏及金瘡百瘡悉療之方

真當歸

附子炮

甘草

白芷

芫蕪各一兩

薤白一兩

生地黄三兩

右七味咬咀以豬膏三升半合微火煎白芷地黄去滓稍以傅瘡上日三良千金並同出第二十九卷中

千金云凡肉癰勿療療則殺人慎之慎之出第二十五卷中

千金翼療癰病方

麋鹿二種肉割如厚脯火炙令熱搗掩可四炙四易痛膿便愈不除更炙新肉用之良出第二十四卷中

白癰及二三十年癰方三首

千金翼白癰方

先極搔刮以繩縛之即愈又取東向木空中水熱刮
癰上洗之日三即愈

又方

白礬 硫黃 等分

右二味末以酢和封上 出第二十四卷中

千金陷腫散主二三十年癰瘰及骨痛石瘡肉瘡膿瘡血
瘡或大如杯不孟升斗十年不差致有漏潰令人骨消肉盡
或堅或或潰貴令人驚惕寐寤不安體中掣縮愈而復發
療之方 千金翼云陷麥散

烏賊魚骨 白石英 石硫黃 紫石英

鍾乳 乾薑 丹參 琥珀

附子 胡鷲屎

右十一味為散貯以韋囊勿令泄氣若瘡濕即傅之若
瘡乾無汁者以豬膏和傅日三四以乾為度若汁不盡
者至五劑十劑止勿措意不作也著藥令人不疼痛若
不消加芒硝二兩益佳忌豬肉出第二十五卷中翼無

喉痺方二十一首

病源喉痺者喉裏腫塞痺痛水漿不得入也人陰陽之氣
出於肺循喉嚨而上下也風毒客於喉間氣結蘊積而生
熱故喉腫塞而痺痛脉沉者為陰浮者為陽若右手關上

今本三十
四卷

脉陰陽俱實者是喉痺之候也亦令人壯熱而惡寒七八日不治則死其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云兩手拓兩頰手不動樓肘使急腰內亦然住定放兩肋頭向外附伸腰氣散盡勢大悶始起起來去七通去喉痺出第三十卷中

廣濟療喉痺急疼悶妨不通方

通按
馬蘭根
是馬蘭
根

馬蘭根切一升 升麻三兩 瞿麥二兩 射干十兩
犀角二兩 通草二兩 玄參三兩
右七味切以水八升煮取二升去滓細細含咽一日令盡得破膿慎熱麪炙肉蒜

又療喉痺方

馬蘭子八分 牛蒡子六分

右二味擣為散每空腹以煖水服方寸匕漸加至一匕半日再並出第二卷中

肘後療喉痺者喉裏腫塞痺痛水漿不下入七八日即殺人療之方

巴豆一枚開其口

右一味以綿裹固堅令有繩出外以巴豆內鼻中隨腫左右時時吸氣半時晨即差無巴豆用杏人以塞耳如之文仲范注同

又方

熬杏人熟搗蜜丸如彈子含咽其汁亦可搗杏人末帛裹含之小品文仲備急范汪同

又方

礬石一兩水三升漬洗手足

又方

生地黄汁二升蜜二升合微火煎之取二升稍稍含之

又方

射干

當歸各三兩

又方

右二味切以水三升煮取一升稍稍含之吐去更含

剝葫塞耳鼻孔日再易之有效

又方

菖蒲根嚼燒秤錘令赤內一杯酒中沸止飲之文仲備急

又療喉痺方

射干一片含咽汁

又方

升麻斷含之喉塞亦然

通按
剝葫
一作
荊葫

又方

桔梗 三兩

右一味切以水三升煮取一升頓服之忌豬肉

又方

取芥子搗碎以水及蜜和滓傳喉下燥輒易

又傳專用神効方

桔梗

甘草

炙各二兩

右二味切以水一升煮取服即消有膿即出忌豬肉海

藻菘菜

備急同

又療垂死者方

擣馬蘭根一握少以水絞取汁稍稍咽之口噤以物拗灌之神良

古今錄驗雞子湯療喉痺方

半夏末

方寸七分

右一味開雞子頭去中黃白盛淳苦酒令小滿內半夏

末末中攪令和雞子著刀子鏤令穩炭上令沸藥成置

杯中托反煖稍咽之但腫即減忌羊肉錫肘後文仲同此與仲景苦酒湯

同半夏不可作未剖之可也

又療喉痺塞射干丸方

射干

二兩

豉

三合

芎藭

杏仁

去尖皮各一兩

外臺秘製

犀角 一兩 屑

升麻 二兩

甘草 一兩 炙

右七味搗下篩蜜和丸含之稍稍咽津日五六忌海藻

又射干湯療喉痺閉不通利而痛不得飲食者若閉喉并諸疾方

當歸 二兩

升麻 一兩

白芷 三兩

射干

甘草 炙

犀角 屑

杏仁 去尖皮 各一兩

右七味切以水八升煮取一升十分服神良忌海藻菘菜 出第二十九卷中

近効療喉痺方

大附子 一箇 刮去

定作四片

右一味以蜜塗火上炙稍熟即含咽汁甜盡又取一片準前含如已作頭即膿出如未作頭立消神驗忌豬肉冷水

又方

朴硝 消 一兩細細含咽汁一食頃差

又若腫全盛語聲不出者方

大附子 一枚 炮裂削 去皮切如豆

右一味含一塊咽汁半食間即差烏頭亦得忌豬肉冷水

外臺秘製

二十三卷

大

經餘居

咽喉中閉塞方三首

廣濟療咽喉中寒鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下方

升麻 通草 黃蘗 玄參 各八分

麥門冬 十分 竹茹 前胡 各六分 芒硝 十分

右八味切以水八升煮取二升五合去滓內硝溫分三服服別如人食頃自利去硝

又方

生雞子一顆開頭取白去黃著米酢拌燂火煖沸起擊下沸定更三度成就熱飲酢盡不過一二卽差

通按 煖音唐 煖火也 煖音郁 煖也 煖 也一作 溫

近効療喉痺喉咽塞喘息不通須臾欲絕神驗方

馬蘭根葉 二兩

右一味切以水一大升半煮取一大盞去滓細細喫須臾卽通絡石草亦療煎法分兩亦同

喉舌生瘡爛方八首

肘後療喉口中及舌生瘡爛方

含好淳苦酒卽愈 文仲備急同

又方

一酒漬蘘荷根半日含漱其汁

又方

杏仁 二十枚 甘草 一寸 黃連 一分

右三味末綿裹含之 千金同

又方

礬石 二兩 燒去汗汁 黃連 一分 末

右二味同研內口中令布瘡上

又方

黃連 一兩

右一味切以水三升煮取一升稍稍含冷吐忌豬肉冷

水

張文仲療口中及舌生瘡爛方

取牛膝根酒漬含漱之無酒者但亦取含之 肘後同

又方

劉黃蘗含之 肘後同 並出第七卷中 肘後云口口口口 含之蜜漬含亦口

備急療喉中及舌生瘡爛方

劉薔薇根濃煮汁含漱之冬用根夏用枝葉 文仲肘後同出

第四卷中

咽喉生瘡方四首

廣濟療咽中生瘡吐血不下食方 方怡雲口此方余用已 驗但不大便者先看輕

重消息下之 後用此方

生地黃 五兩 青竹茹 玄參 雞蘇 各二兩

五季漫漶

茯苓

升麻

麥門冬

去心各三兩

右七味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服服相去如人行七八里不能多服含細細咽亦得忌生冷熱麩炙肉油酢出第五卷中

千金療口中塞及咽喉不利生瘡口燥膏方

豬膏 一斤

白蜜 一斤

黃連 一兩

右三味合煎去滓攪令相得含如半棗日四五度

又療熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入膏方

當歸

射干根

升麻

各一兩

附子

半兩炮

白蜜

四兩

右五味切以豬膏四兩先煎之成膏下著地勿令大熱內諸藥微火煎附子色黃藥成絞去滓內蜜復上微火煎令相得盛器中令凝取如杏子大含之日四五度稍咽之出第六卷中

古今錄驗升麻湯療咽喉生瘡方

甘草

一兩炙

升麻

石膏

碎縮裏

牡丹皮

各一兩

右四味切以水七升煮取三升一服七合日三忌海藻菘菜出第二十九卷中

咽喉腫方五首

肘後咽喉卒癰腫食飲不過方

用薤一把搗傅腫上冷復易之用苦酒和亦佳范注同

又方

吞薏苡人子二枚

延年療喉中熱腫方

鼠粘根切一升

右一味以水五升煮取三升去滓分溫三四服忌蒜麪

出第十九卷中

古今錄驗羚羊角豉湯療喉痛腫結毒氣衝心胃方

豉一升半

犀角二兩

羚羊角一兩

芍藥三兩

升麻四兩

杏仁一兩去

梔子七枚

甘草炙一兩

右八味切以水七升煮取一升半去滓分三服忌海藻

菘菜

又五香湯療諸惡氣喉腫結核方

沉香二兩

薰陸香一兩

麝香二分研湯成下

青木香二兩

雞舌香二兩

右五味以水五升煮取一升半去滓分三服出第二十九卷中

喉卒塞痛及卒毒攻痛方三首

范汪療卒喉中塞痛不得飲食方

取敗筆一枚燒屑以漿飲服一方寸匕良驗出第十卷中

文仲療喉中卒毒攻痛方

通按
商陸
名章柳
此章陸
禾知是
否

章陸根切炙令熱隔布熨之冷轉易立愈姚云苦酒
熱熬傅喉亦療喉痺肘後小品同

又方

搗艾傅之並出第七卷中

懸癰腫方三首

肘後療懸癰腫卒長數寸如指隨喉出入不得食方

開口捧頭以筋抑舌及燒小鐵於管中灼之令破灼
止若不須為苦可三為之寧小根不盡勿火
火畢以鹽隨烙處塗之

又方

搗鹽綿纏筋頭點鹽傅以揩之日六七度文仲備急

千金療懸癰垂暴腫長方

乾薑 半夏等分

右二味末之以少少著舌本與同出第六卷中

咽喉雜療方四首

范汪療咽喉不利下氣丸方

射干根 附子炮 人參 杏仁去皮熬

右四味合搗下篩蜜丸如梧子含一丸咽汁日三夜一

忌豬肉冷水千金同

又療口中咽喉不利當歸含丸方

當歸末二兩 杏仁一兩熬去皮火

右二味搗合下篩以蜜和為丸如梧子二九含漸漸咽
汁日三夜再

又療咽喉中痛不利九方

升麻

茸草炙

鬼臼

射干根

丹砂各一兩

雄黃一兩

杏人一枚

去皮尖

麝香

半兩

右八味搗下篩和以蜜丸如梧子飲服一九日三漸加
之酒下亦得咽痛失聲不利用良忌海藻菘菜千金同
十卷中

崔氏療口咽咽內瘡痛欲失聲方

桂心二兩

杏人一枚

去皮尖

黃蘗

一兩

右三味搗末合和綿裹含如杏人許咽汁消盡更含日

三夜二忌臧食

出第四卷中

寒熱瘰癧方一十一首

病源此由風邪毒氣客於肌肉隨虛處而停結為瘰癧或
如梅李等大小兩三相連在皮間而時發寒熱是也久則
變膿潰成瘻也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於
後養生方導引法云踞踞以兩手從脚入據地曲脚加其
上舉尻其可用行氣愈瘰癧乳癰出第三十四卷中

甲乙鍼經寒熱瘰癧論黃帝問曰寒熱瘰癧在於頸腋者
皆何氣所生岐伯對曰此皆鼠瘻寒熱之氣也稽留於脉

而不去者鼠瘦之本皆在於藏其末上出於頸腋之間其
浮於脉中未著於肌肉而外為膿血者去易問曰去之柰
何對曰請從其末引其本可使衰去而絕其寒熱審安其
道以予之徐徃徐來以去之其小如麥者一刺知三刺而
已決其生死法及其人目視之其中有赤脉從上下貫瞳
子見一脉一歲死見一脉半一歲半死見二脉二歲死見
二脉半二歲半死見三脉三歲死此赤脉不下貫瞳子者
可療千金同出第八卷中

廣濟療癩瘰九方

鸛骨

狸骨炙

射干

玄參

升麻炙

青木香

沉香

犀角屑

丁香

羚羊角屑

丹參

甘草炙各四分

人參

沙參各三兩

獺肝六分

連翹子六分

光明沙二分研

右十七味搗篩蜜丸以飲服十五丸日二服漸加至三十丸空腹服之不利忌生冷油膩血食並酢熱肉海藻菘菜粘食陳臭生血物等

又療癩瘰方

連翹子

射干

玄參

芍藥

青木香

芒硝消

升麻

梔子人藥

前胡 當歸 甘草 炙 大黃 各二兩

右十二味切以水一斗煮取三升分三服服別相去如

人行六七里快利忌同前方並出第五卷中

劉涓子療寒熱瘰癧散方生冷猪肉海藻菘菜蒜酢

狸骨 炙 五兩 烏頭 炮 七分 黃連 六分

右三味擣下篩先食以酒服一錢七日三良忌猪肉冷

水范汪同出第十卷中

千金療瘰癧方

白蠶蠶為散以水服五分七日三十日差深師救急同

又方

於患人背兩邊腋下後文上隨年壯灸之

又方

灸耳後髮際七壯

又方

槲白皮 三斤

右一味細切以水七升煮取三升去滓真珠砂方寸匕

和汁一升且向日服之強行須臾吐鼠出三朝服良

又方

狸頭一枚炙擣下篩且白飲服方寸匕日再服之

又方

通按 三朝服 良四字 有誤

狼糞灰封上良

又療寒熱癰瘰散方

連翹 土瓜根

龍膽草

苦參

黃連 括樓

芍藥

常山皮各兩

狸頭骨一枚

右九味搗下篩酒服五分匕日三忌豬肉冷水

翼集驗古今錄

驗同一方云無狸頭骨加之名狸頭散餘同並出第二十四卷中

救急癰瘰瘰方

馬齒莧陰乾燒灰臘月豬膏和之以暖泔清洗瘡拭

乾傳之日三出第三卷中

癰瘰結核方四首

廣濟癰瘰瘰息肉結硬薄方

白欽 甘草炙

青木香

芍藥

大黃各三兩 玄參三兩

右六味搗為散少減以少酢和如稀糊泥塗故布貼上乾

易之勿停忌豬肉五辛熱肉飲酒熱麪等

又癰瘰結核令消散方

黃耆七分 玄參八分

連翹子

人參

升麻 青木香

伏苓

蒼耳子

甘草炙

朴硝清

桂心各四分

枳實炙去瓢

外臺秘要

大黃

羚羊角屑

麥門冬

去心各五分

鼠粘子

苦參

各九分

右十七味搗蜜丸如梧子以酒下十九日三夜四漸加

至二二十九以知為度忌同前方註出第五卷中

肘後療頸下生瘡瘰癧如梅李宜使消之方

海藻一斤洗

右一味以酒三升漬數日稍稍飲之文仲備急等同

又方

人參

甘草炙

乾薑

白飲

各四分

右四味搗篩酒服方寸匕日三忌同海藻註劉涓子文仲備急同出第六卷中

惡核瘰癧方四首

文仲五香連翹湯療惡肉惡脉惡核瘰癧風結腫氣痛方

青木香

沉香

雞舌香

各二兩

麝香

半兩

薰陸香

一兩

射干

紫葛

升麻

桑寄生

獨活

通草

連翹

各二兩

大黃三兩

淡竹瀝二升

右十四味切以水九升煮取減半內竹瀝更煮取三升

分三服忌五辛

千金方無紫葛雞舌香有丁香古今錄驗同出第五卷中

延年丹參湯療惡肉核瘰癧諸風氣結聚腫氣諸病並主

之方

小臺必妥

二十三卷

五

經餘居

葫蘆

丹參 各兩

耳草 各兩

秦艽

獨活

烏頭 炮

牛膝 各兩

躑躅花

蜀椒 各半兩

右九味切以水八升煮取三升溫服一升忌海藻菘菜

猪肉冷水古今錄驗有白芨餘並同

又玄參湯主惡核瘰癧風結方

玄參

升麻

獨活

連翹 各二兩

木防已

菊花 各一兩

右六味切以水八升煮取三升分服一升日三文仲同

又丹參膏主惡肉結核瘰癧脉腫氣痛方

丹參 八分

白欬

獨活

連翹子

白及 各四分

升麻

葫蘆 各一分

防已

玄參

杏仁 各五分去皮尖

右十味細切以生地黄汁淹漬一宿以鍊成猪膏四升

微火煎五上五下藥成絞去滓以摩二病處日三四

癰腫瘰癧核不消方五首

經筋犀角丸瘰癧瘰癧方

犀角 四分

升麻 三分

大黃 六分

牛蒡子 八分

烏蛇 十分炙去頭尾 玄參 八分

右六味末之蜜和丸如梧子大每旦一丸午後煎牛蒡湯

下三十五九

又方

龍骨 八分

牡蠣礪 八分

右二味末之酒下三錢七日三度良

又大黃膏方

大黃 六分

附子炮 四分

細辛 三分

連翹子 四分

巴豆 一分

右五味以苦酒浸一宿以臘月猪膏煎三上三下去滓以綿濾之用傅之日三五度塗之良

集驗療寒熱瘰癧散方

連翹 六分

土瓜根分 四分

龍膽草分 五分

黃連 四分

苦參 六分

栝樓分 四分

芍藥 五分

右七味為散食後溫酒下五分七日三

又方

陵鯉甲二十一枚燒擣末傅瘡上千金同

鼠瘻及瘰癧方一十一首

文仲療瘰癧方

苦參四大兩擣未生牛膝和丸如梧子食後煖水下十九日三服

又方

昆布 四分 海藻 四分

右二味各洗去鹹，搗末，蜜和，丸如杏核許，大含之，日三度良。差。

救急 療鼠瘻久不差方

取狼鼠不限多少，常作羹粥，任喫之，必驗。千金經効同

范汪 療鼠瘻癰癰方

迴按
右灸右
肩一本
脊左灸
右肩

取臘月猪膏，正月鼠頭燒令作灰，以膏和，傅之，愈。若不差者，療癰，右灸右肩頭，三指度以下，指灸，炷皆如雞子大，良。若不能堪者，可如中黃，亦可已。試有良驗。

又療頸鼠瘻累累者方

貝母

乾薑

藜蘆

桂心

蜀椒

各一分汗

右五味，搗下篩，先食，吳茱萸一分，以酒服，一服，忌生葱。

又療鼠瘻癰癰身熱方

猪椒 二十斤

右一味，以水淹足，煎熟，去滓，置瓶中，覆瓶口，以瘡當土，熏候熱極，乃止痛，膿血鼠當從瘡出，便愈。

又寒熱鼠瘻癰癰散方

狸骨 炙

龍骨 各五分

躑躅 熬半兩

鼠粘子

當歸

王不留行

土瓜根

各一兩

右七味擣合篩先食酒服方寸匕日再夜並出第四卷中

白馬牛羊猪雞等矢屑各一斤

漏蘆各一斤

右七味並於石上燒作灰研絹篩之以猪脂一升三合煎亂髮一兩半令沸髮盡乃內諸藥屑微火上煎五六沸藥成先去瘡上痂以鹽湯洗新綿拭瘡令燥然後傅膏若無痂猶須湯洗口再若著膏當以帛覆無令風冷神驗療癩以膏傅上亦日再古今錄驗范汪同

又療寒熱癩癧散方

白曾青半兩 當歸 防風 括樓根

芎藭 黃耆 狸骨炙 甘草炙各二兩

細辛 乾薑 露蜂房各一兩炙 礞石燒半

大附子炮 桂子各半兩 斑蝥去首足炙 芫青去首足炙各五枚

右十六味擣下篩為散以酒服一錢七日再忌猪肉冷

水海藻菘菜古今錄驗范汪同並出第八卷中

又療鼠瘻方

蛇腹中鼠蝦蟇燒末酒服方寸匕甚効

又方

以柈葉擣末傅腫上熱炒鹽熨之即消良効並出第五卷中

通按 桂子辛 温主效 嗽下氣 不主瘰 癧此用 者取其 辛温疏 散通行 血脈下 氣耳即 白蘇子

毒腫癰癧方四首

崔氏大五香湯療毒氣苦肌肉中腫痛結脉寒熱如癰癧痛不可近急者數日殺人苦心煩悶便當急速與湯并以滓薄腫脉上方

青木香

雞舌香

沉香

升麻各五分

藿香

犀角屑

吳茱萸

桂心

麻黃

甘草

炙各三分

薰陸香

四分

細辛二分

右十二味咬咀以水七升煮取二升分三服不差復合若齶齶惡寒加附子中形者一枚炮令坼八破用忌生冷菘菜海藻猪肉冷水生菜五辛古今錄驗同

又五香湯療毒腫癰癧方

麝香研

青木香

雞舌香

藿香

薰陸香

當歸

黃芩

升麻

芒硝各三分

大黃五分

右十味咬咀以水六升煮取二升去滓內硝分二服相去如人行七八里再服諸卒尸注惡氣亦瘥出第五卷經心錄射干湯療惡毒身強痛癰癧方

射干

桂心

各二兩

麻黃去節

生薑

甘草

炙各四兩

杏仁

四十箇去皮尖

右六味切以水四升煮取三升去滓分三服忌海濱禁食同前

又升麻湯療風毒咽水不下及療癰腫方

升麻

芍藥

各四兩

射干

三兩

杏仁

去尖皮三兩

麻黃

去節二兩

甘草

炙二兩

楓香

葛根

各三兩

右八味切以水八升煎取半分三服忌同前

海藥卷中第三卷

灸癰癧法六首

千金灸癰癧法

兩腋中患癰處宛宛中百壯上

又法

擣生商陸根捻作餅子置漏上以艾炷灸餅子上乾

熟易之灸三四炷

又法

灸五里大迎各三十壯

又法

葶藶

三合

豉一升

右二味合擣令極熟作餅如大錢厚二分許取一枚置瘡孔上作艾炷如小指大灸餅上三壯一日易三餅九

炷隔三日一灸

真同古今錄驗兼主瘻不可灸頭瘡葶藶氣入腦殺人劉涓子同

又法

一切癰癧在頂上及觸處但有肉結凝以作癭瘡及

癱節者以獨頭蒜截兩頭留却心作孔大艾炷稱蒜大
小貼癱子上灸之勿令上破肉但取熱而已七炷一
易蒜日三易日日灸之取消止翼同

又方

七月七日日未出時取麻花五月五日取艾等分合
擣作炷灸癱子一百壯並出第二十四卷中

九癩方三十一首

廣濟療癩有九種不過此方

芫青四匙 海藻八分 昆布八分 雄黃研八分
足羽熬 牡蠣四分 地膽二十分 青木香三分
狸骨炙三五

右八味擣篩為散酒服一錢七口二服病從小便出如
爛筋忌生冷粘食猪肉陳臭物出第五卷中

劉涓子療鼠癩方

死蟻燒作灰 右一味苦酒和塗之數過即愈先以鹽湯洗古今錄驗千金同

又方

五月五日樓桃擣末先鹽湯洗拭之令乾以末傅瘡
上樓桃未詳

又方

烏頭炮 附子炮各二兩

通按
樓桃一
作核桃

右二味咬咀著五升淳苦酒中漬之待乾復內苦酒中燥復內以苦酒盡暴令乾擣末酒服方寸七日三忌猪肉冷水等

又張子仁療鼠瘻要方

柞木皮 五升

右一味以水一斗煮熟去皮煎令汁得二升稍稍服盡當有宿肉出即愈備急文仲古今錄同並出第六卷中

肘後療苦鼻內肉外查瘤膿並出者是蜂瘻方

取蜂房火炙焦末酒服方寸七日一

深師療鼠瘻方

鰻鱺魚

兩

野豬皮

兩

瞿麥

一兩

巴豆

十五枚

臘月豬脂

五分

班猫頭二十枚

去

五月五日蟾蜍

炙

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

右七味擣野豬皮下篩合諸藥更擣下篩內鰻鱺魚以膏和擣干杵平旦未食服如梧椰子二枚覺者寒熱不

覺暮復投明日旦起更服三九稍稍增之慎勿食熱食

煩悶殺人蟲當從小便出以堪甘盛之永便視乃有百數

耳不可以見亦大便出此方驗服日要愈忌猪肉蘆笋等

又方

馬齒礬石 燒

真珠粉

右二味擣下篩為散厚塗瘡上不過三愈

宋本
瞿麥
在

通按
堪字疑
誤

四字漫滅

四字漫滅

四字漫滅

又方

松脂

硫黃

狼毒各二兩

猪腦一具

白歛二兩

右五味熬猪腦取汁狼毒白歛咬咀以水三升煮取一升內腦汁中煎令得五合細末硫黃松脂下篩內中攪令相得綿裹內瘡中七日知一七日病除神良

集驗凡有九種癩

一曰狼瘻始發身熱頭腫有根起於缺盆上轉連耳本種大此得之因憂恚氣上不得下其根在肺空青主之商陸為佐

病源三四

通按
即本種
屬金作
可根腫
在肺作
在肝也

二曰鼠瘻始發於頸無頭尾如鼯鼠瘻核時上時下使人寒熱脫肉此得之由食大鼠餘毒不去其根在胃狸骨主之知母為佐

三曰蟻蝨瘻始發於頸頂狀如蟻蝨腫潰連生瘡其汁赤黃得之食瓜蠅蝨餘毒及果實不去核其根在大腸荏子主之桔梗為佐

四曰蜂瘻始發於頸癰癰三四處俱腫起相連潰潰移此得之多飲流水水有蜂餘毒不去其根在脾雄黃主之黃芩為佐

五曰蚘蟬瘻始發於頸初得之如傷寒此得之因飲食中

通按
蚘蟬音
反得大
腫也

小瘻必要

八二十三卷

七

經餘居

有蚘蟬毒不去其根在腎礬石主之防風為佐

六口癬蝨癩始發於頸上下無頭尾如棗核塊塊多在皮

中使人寒熱心痛滿此因喜怒哭泣得之其根在心礬石

主之白朮為佐

七日浮疽癩始發於頸如兩指使人寒熱欲臥此得之因

思慮憂憶其根在膽地膽主之甘草為佐

八日素癩癩始發於頸有根初苦痛癩癧覺之使人寒熱

得之新沐頭濕結髮汗流入於頸所致其根在腎雌黃主

之芍藥為佐

九日轉脉癩始發於頸如大豆浮在脉中淫淫脉轉苦驚

通按

十金疽

作且後

旁同

惕身如振寒熱始得之時驚臥失枕其根在小腸斑猫主之白芷為佐

癩癧九種方

空青 研鍊之

商陸根

狸骨 炙

知母

菴子

桔梗

雄黃

黃芩

礬石 燒

防風

礬石 燒汁 盡

地膽 蒸

白朮

甘草 炙

雌黃

芍藥

斑猫 去足 羽熬

白芷 各二分

右十八味擣其論病者特加其分餘種令分等細篩未空青最在後內之苦酒服一刀圭日三服三十日知五

外臺秘要 卷一 三

十日愈七十日平復病者百日禁食魚肉忌生菜桃李
雀肉海藻菘菜犬肉生血物餘無所忌大豆為一刀圭小兒
服之半大人全服八歲以下寧從少起過度令人淋淋
即減之出第九卷中

千金問曰何謂九癩答曰一日狼癩二日鼠癩三日蝮蝮
癩四日蜂癩五日蚰蝨癩六日蟻蝨癩七日浮沮癩八日
癩癩九日轉脉癩謂之九癩
又癩狼癩發於頸頭腫有根起於缺盆上轉連延耳根腫
大此得之因憂恚氣上不得下其根在肺空青主之商陸
為佐方

空青 研二分 蝟腦 二分 獨活 一分 蝟肝 一分

芎藭 半兩 女婦草 一分 黃芩 當歸 藺甲 炙

斑猫 去翅翅足熬 乾薑 當歸 茴香

礬石 燒 地膽 各一分 蜀椒 三十

右十五味作散下篩酒服方寸七日三十五日即止忌

生血物菟菜劉涓子古今錄驗同

又癩鼠癩發於頸無頭尾如鼯鼠使人寒熱此得之因食
大鼠餘毒不去其根在胃狸骨主之知母為佐方

陵鯉甲 炙 山龜 殼炙 甘草 炙 桂心

雄黃 乾薑 等分

外臺秘要 卷二十三 經餘居

千金作乳 婦毒草

右六味作散下篩服方寸七日三蜜和內瘡中無不愈

先灸作瘡後與藥良忌海藻生葱劉涓子備急古今錄驗文仲同

又療鼠瘻瘡差復發及不愈出膿血不止方

以不中水猪脂咬阻生地黃內脂中令其脂與地黃

足相淹和煎六七沸去滓桑灰汁淨洗瘡去惡汁以

地黃膏塗上日一易范汪同

又療鼠瘻方

得蛇虺所吞口中鼠燒未服方寸七日再不過三服

此大驗但難遇耳并傳瘡中范汪同

又療鼠瘻方

死鼠一枚中形者

亂髮如雞子一枚

右二物以臘月猪膏令淹鼠髮煎之令其鼠髮都盡消

膏成分作二分一分稍稍塗瘡一分以酒服之即愈矣

鼠子當從瘡出神良秘不傳翼備急文仲集驗范汪同

又療螻蛄瘻發於頸項狀如螻蛄腫潰連生瘡其汁赤黃

此得之食瓜螻蛄餘毒及果實不去核其根在大腸荏子

主之桔梗為佐方

桂心

乾薑

桔梗

礬石燒

獨活各一分

附子一分

椒一百粒汗

芎藭半分

龍骨半分

荏子一分

右十味搗下篩，棗二十枚合搗，以酢漿九加大豆溫漿下五升。古今錄驗劉涓子同。忌猪肉冷水生菜。

又方

榭葉灰先以油清煮榭葉取汁洗拭乾內灰瘡中。

又療蜂癭發於頸，瘰癧三四處俱腫起相連潰潰移，此得之飲流水有蜂毒不去，其根在脾，雄黃主之，黃芩為佐方。

蜂房一具 龍甲一分 茴香一分 吳茱萸二分
椒一百粒 乾薑一分

右六味搗下篩作散，傅瘡孔中，日十度，十日止。忌莧菜。又療蜂癭初生時，狀如桃，而痒搔之則引大如雞子，如覆

手者方

熬鹽熨之三宿，四日不差，至百日成癭，其狀大如四五寸，又廣三寸，中生蜂，作孔，乃有數百。治法以石硫黃隨多少燃燭燒令汁出，著瘡孔中，須臾皮中見蜂數十，唯蜂盡即差。

又療蚰蟬癭發於頸，初得如傷寒，此因食中有蚰蟬毒，不去其根在腎，礬石主之，防風為佐方。

白朮四分 知母 雌黃 乾地黃
獨活 青黛 斑貓去首羽 白芷

栢脂 芍藥 海藻一云海苔 當歸各一分

蝟皮 四分

椒 一百粒 去汗

桃白皮 一分 正

東本在泉上

右十五味擣下篩作散服一錢七日三

劉涓子古錄驗

又療瘰癧發於頸無頭尾如棗核塊塊多在皮中使人

寒熱心痛滿此因喜怒哭泣其根在心礬石主之白木為

佐方

白朮 一分

礬石 一分

空青 兩三

當歸 二分

細辛 一分

蝟肉 炙

枸杞根

斑猫 去翅 足熬

地膽 各一分 熬

乾烏腦 三大 豆

右十味擣下篩散服方寸七日三酢漿服之病在上側

即在下高枕卧使藥流下劉涓子古今錄驗同

七日浮沮瘦發於頸如兩指使人寒熱欲卧得之日思慮

憂憶其根在膽地膽主之甘草為佐方

雄黃 一分

乾薑 一分

龍膽 二分 一作龍骨

石決明

續斷

菴苧根 各一分

細辛 二分

大黃 半分

地膽 一分 熬

右九味擣下篩為散傅瘡日四五忌生菜

劉涓子同古 今錄驗無雄

黃有硫黃餘同

又瘰癧癭發於頸有根初苦痛歷歷覺之使人寒熱此

得之新沐頭濕髻髮汗流入於頸其根在腎雌黃主之芍

藥為佐方

茯苓

續斷

礬石

燒令汁盡

乾薑

雌黃

芍藥

桔梗

椒

乾地黄

常山

空青

狸肉

烏腦

并腎

斑猫

去翅足熬

附子

一兩

礬石

二分燒

虎指

各一分一云虎腎

宋本在斑猫下

右十七味搗篩為散蜜丸如大豆

夜酒服十九日三服

今錄驗同

又療轉脉癢發於頸如大豆浮在脉中濯濯脉轉苦驚惕身如振寒熱得之於驚卧失枕其根在小腸斑猫主之白芷為佐方

綠青 二分

礬石

半分燒

防風 一分

甘草

半分

大黃 二分

桂心

二分

人參

二分

當歸

二分

升麻 一分

地膽

一分熬

白朮

一分

鍾乳

一分研

斑猫

一分去翅足熬

白芷

一分

續斷

一分

麝香

一分

麥門冬

一分去心

右十七味搗下篩蜜丸酒服如大豆十九日三勿食倉米慎房百日

劉涓子古今錄驗同並出第二十四卷中忌海藻菘菜桃李雀肉生葱

崔氏療九種瘦方

芫青

二十枚去足翅熬

地膽

十枚去足羽熬

斑猫

三十枚準上

生犀

如棗核大屑

豉

四十九粒

大豆黃

一百枚生用

小臺必要

二十三卷

四

經人必

今本千金在二十二卷

本草綱目 卷之二十三 經餘居

牛黃 棗核大

蜈蚣 一枚肥大者折取一寸半微火熬

右八味搗篩蜜丸如梧子初欲服藥少夜食明日飲服二丸須臾可煮酢漿薄粥稍稍冷飲之其瘰癧有形狀皆從小便出至日西甚虛悶可煮湯食蔓菁菜羹醬食之其餘脂膩醋脯一切名口味五辛果子之類並不得食人強隔日一服人弱兩三日一服服藥以瘰癧差蟲盡為度若差仍作二十日許將息藥欲盡豫合勿使斷絕藥氣不能將息便不須服救急千金同出第五卷中忌猪肉燕蕒大驗

張文仲療鼠瘻方

石南

生地黄

雌黃

茯苓

黃連 各二兩

右五味作散傳瘡日再

忌猪肉燕蕒大驗 備急同

又療鼠瘻諸惡瘡方

苦參 三斤

露蜂 五兩

麴 二升

右三味以水三斗漬藥三宿去滓黍米二升釀熟飲日三一方便得蝟皮一具劉涓子同並出第五卷中

備急劉涓子鼠瘻方

山龜殼 炙

桂心

雄黃

乾薑

狸骨 炙

甘草 炙

右六味等分搗篩為散飲服方寸匕日三蜜和內瘡中

小臺秘要

二十三卷

四

經餘居

無不愈先灸作瘡後與藥良忌生葱海藻菘菜

又方

礬石 三分燒

斑猫 一分去首足羽熬

右二味擣下篩用酢漿服半匕須臾瘰蟲從小便出

繁文仲同出第五卷中

古今錄驗療鼠瘻麝香塗方

麝香 研

雌黃 研

右二味等分並為散取蝦蟇背白汁和塗瘡孔中日一

度

又療鼠瘻著頭生小者如杏大者如梧

通按瘰一作漏

斑猫 一分去首足羽熬

牡蠣 二分熬

海藻 四分先洗去鹹味

右三味擣下篩酒服五分七日三病宿從小便出如魚

胞忌蒜並出第四十一卷中

諸瘻方一十五首

劉涓子瘻腫病方

斑猫 四十枚去首足羽熬 桂心 四分

芫青 十枚去首足羽熬

葛上亭長 三十枚熬

右四味擣下篩酒服半錢七日一忌生葱

又療瘻方

斑猫 四十枚去首足羽熬

地膽 三十枚去首足翅熬

蜥蜴 三枚灸

小臺必更

二十三卷

四

經餘居

右三味搗之千杵蜜和如大豆服二丸

又療癩衆方不差効驗方

牡蒙 數兩

右一味搗之湯和適寒溫取一升許薄瘡上冷易經宿佳

又療癩生肉膏方

桑薪灰三升水四升淋之復重淋之取三升石灰熬令黃內灰汁中以兩重帛裹絞去滓更魚目煎取二升勿用急火煎隨癩孔深淺初時作服散而差孔若深四寸新藥與孔裏薤白使濡安藥薤白入藥孔裏

通按 此條疑 錯簡

通按 鼠蛇作 虫之類

若深四寸隨癩根而灸兩處每處與四十壯唯勿灸

癩孔隨深淺去膿散與膏安著瘡孔裏十五過少遷

延日月取差肉滿膿亦斷神良無比出第六卷中

肘後論此本在諸方瘡條中病類既多今狀出爲別一篇

凡癩病有鼠蛇蜂蛙蚓類似而小異皆從飲食中得其精

氣入人肌體變化成形瘡既穿潰浸諸經脉則亦殺人而

鼠蟻最多以其間近人故也

通治諸癩方

以八月中多取斑猫蟲卽內苦酒中半日許出暴乾使十取六七枚著銅器中微火上遙熬令熟搗作屑

巴豆一粒去皮熬之。又拔取黃犬背上毛二七枚亦熬作屑。好朱以錢五分七都合和。以苦酒頓服之。蟲當盡出。若一服未効。先時可預作三兩劑。後日服。遠不過三兩劑。通按朱一作末

又方

宋本在貓刺根上虎刺根

杜蘅

枳根

酸棗根各一

斑猫一枚一方云三分去頭足翅熬

猫刺根各一把

右六味搗蜜丸。日一服。如棗一枚以小丸著瘡中。

又方

若先著下部邊。或上出耳後頸項諸處者。苦參切五

升以苦酒一斗漬三四日。宜服一升。亦加之。但多作以知為度。不過三四度必差。

又療癩方

榭木皮長一尺闊六寸。去黑皮細切。以水一斗煮取五升。去滓。內白糖十挺。煎取一升。分三服。以銅器接吐出。看視之。**病矣**

又方

新生兒矢。一百日以來。皆收置**密**器中。五十六日。取塗瘡孔中。

又方

通按
脫一作

鯉魚腸切作五段火上脫之洗瘡拭乾以腸封之冷
即易自暮至旦乾止覺痒開看蟲出差

崔氏療癩方

獬白皮 切取五升

右一味以水八升煮令泣泣絞去滓重煎令成膏日服
半棗漸加至一棗許亦著瘡上無忌患瘡唯宜煮飯首
着鹽醬又不得多食之出第五卷中

備急療癩生肉膏方

棟白皮 二兩
鼠肉 二兩
雄白 三兩
當歸 四兩
生地黄 五兩

右五味以臘月猪膏三升煎薤白黃色膏成傅瘡孔上
令生肉附後文仲同

又葛氏云苦著口裏方

棟杖東引根切

右一味水煮取濃汁含之數吐勿咽附後同並出第五
卷中

備急療諸癩方

取葶藶子擣細羅取好白蜜和丸每欲著藥先温泔
洗著瘡孔中以丸內之若塞以物道開日三度瘡痛
是差候勿停藥大效出第五卷中

必効療諸癩方

先以泔清温洗以綿拭之取葵葉微火煖貼之引膿
不過三二百葉膿盡出即肉生思雜諸魚鱗房室腋臭方三十七首

病源人腋下臭如葱豉之氣者亦言如狐狸之氣者故謂

之狐臭此皆血氣不和蘊積故氣臭思晉切出第三十一卷中

肘後療人體及腋下狀如狐狐思晉切世謂之胡臭方

炊甑飯及熱丸以拭腋下臭仍與犬食之七日一如

此即差文仲備急同

又方

煮雞子兩枚熟去殼及熱各內腋下冷弃之三路口

勿反顧三為之文仲備急並同

又方

燒好礬石末絹囊盛之常以粉腋下不過十度小品集驗

文仲備急同

又方

青木香二兩 附子一兩 礬石半兩 白灰一兩

右四味細末著粉腋下汗出因以粉之亦差

又方

青木香一斤 石灰半斤熬

右二味常以粉身亦差並擣末傳之

又方

乾薑

胡粉

白灰 等分

右三味合作末粉之范注同並出第五卷中

千金療胡臭漏腋有天生胡臭有為人所染臭者天生者難療為人所染者易差然須三年傳白礬散勿止并服五香丸乃可得差勿言一度傳藥即差止可傳藥時暫得一度差耳凡胡臭人通忌食芸薹五辛療之終身不差胡臭方

辛夷

芎藭

細辛

杜蘅

蒙本各三分

右五味改咀以苦酒漬之一宿煎三日取汁傳之以差為度小品集驗必効范注同

欲傳時

五香丸主口臭及身臭止腫痛散血氣方

豆蔻子

丁香

藿香

白芷

青木香

當歸

桂心 各一兩

零陵香 一兩

茸菘香 二分

香附子 二兩

檳榔 二枚

右十一味擣下篩蜜丸如大豆日三夜一時含之咽津五日內口香十日身香二七日衣被香三七日下風人聞香四七日靜洗手水落地香五七日把他人手亦香禁五辛下氣去臭第一出第六卷中

香膏

小臺必便

二十三卷

五

經余

又石灰散主胡臭方

青木香

楓香

丁香

薰陸香各二兩

陽起石

橘皮各三兩

礬石四兩

石灰一升

右八味搗下篩以綿作篆子麤如四指長四寸展取藥著上卽以絹囊盛之繫著臂先以布拭指令痛然後夾之

又方

水銀胡粉面脂研和傳之大驗救急同

又方

辛夷

細辛

芎藭

青木香

右四味等分搗下篩作散重單敷之

又方

伏龍肝作泥傳之良

又方

牛脂和胡粉三合煎令可丸塗腋下一宿卽愈集驗同

又方

三年苦酒和石灰傳之

又方

赤銅屑以酢和銀器中炒極熱以布裹熨腋下冷復易差止

卷之五十一 雜考

又方

附子炮

石灰熬

青木香兩

礬石三分

米粉一升

右五味搗篩常粉之

又方

馬齒草一束

右一味搗碎以蜜和作團以紙裹之以泥糊紙厚半寸暴乾以火燒熟破取更以少許蜜和使熱勿令冷先以生布指之夾藥腋下痛久忍不能得然後以手中勒兩臂差出第二十五卷中

今本廿四卷

醫氏療胡臭有效方

先用泔清淨洗又用清酢漿水淨洗訖微指使破取銅屑和醱酢熱指之不過三四度差

又方

胡粉

銅青

右二味等分研以人乳和塗腋下若成瘡且停瘡美即塗以差為度出第四卷中

張文仲療胡臭若股內陰下常汗濕且臭或作瘡者方

但以胡粉一物粉之即差常用大驗備急同

又隱居効驗胡臭方

小臺必

二十三卷

五二

經餘

雞舌香

藿香

青木香

胡粉

各二兩

右四味搗散作粉綿裹內腋下常傅即差

備急同出第七卷中

救急療腋臭方

銅屑 一升

石灰 三升熬

右二味合和囊盛粉之有汗便粉之

又方

甘草 炙

松根白皮

甘瓜子

大棗

各四分

右四味為散食後服方寸七日三

出第三卷中

又方

雞矢

白礬石

熬令汁盡

黃礬

熬

附子

炮

木蘭皮

青木香

各一大兩

右六味搗為散粉之又石龍衣一大兩蛇蛻皮是也
以子口夜半燒為灰服之

又方

常以鹽綠和醃酢塗之一遍一年再塗永除以胡粉
和水銀和令相入塗腋下十日以來無氣

出第八卷中

又方

黃礬

細辛

芎藭

各二兩

雄黃

一兩

右四味搗下篩為散先以泔清洗腋拔去毛令血出以
粉敷下

出第九卷中

通按
醱酢作

必効療腋臭方

好磁砂三兩

好白礬熬

蜜陀僧各三兩

酢酪二兩
干去

胡粉二分

金屑八分

鉛錫

生銅屑各二分

右八味並研令細酢一升新銅器中盛藥密封其口二
七日看上青綠色鬱鬱然其藥即成還須研令極細至
用時若乾更以好酢和藥以塗病處若有毛先拔去以
石灰水淨洗拭使乾以生布指令微赤可作瘡一日一
塗洗遠不過十日即待腋瘡差訖更取銅屑細研成粉
粉病處日五六即止病差終身不得帶麝香食胡荽

又方

通按
瘡瘡毒
二音灸
物爛也
重火熱
鍊也

取五月五日承露百草陰乾火燒為灰用井華水和
灰為團重火鍊如燁灰色鍊訖即以醱酢和為餅厚
如掌大小徑二寸以來即於兩腋下挾即易夾時一
身連頭並悶二日後若病不差復著藥微發亦不甚
臭還依法療之永斷

又金錯屑塗法

金錯屑一銖

銀錯屑一兩

赤銅屑

香附子

胡粉

錢錯屑

各一兩 三年醋三升

右七味以羊酪一升於銅器中煮得二沸以用塗之

又方

小臺必妥

二十二卷

五十四

經塗居

三年醱酢二升碎銅一斤 鹽半合 灰二合

右四味浸藥攪藥色青即塗腋下日三四塗三日小愈
月全差

又方

大銅錢二七文 白梅二七箇 鹽一升

右三味以五月五日水一升共置坛子裏挂戶上百日
畢可取用塗不得婦人為塗藥食粘食蒜發

又方

以酢五合內銅器中以錢十四文胡粉五銖銖置中泥
頭七日後以粉十銖銖和之訖去腋下毛日再傅之合

藥勿令人見秘之

又方

以首子男兒乳汁浸塩研銅青拔去毛使血出塗差

又方

醱醋浸青木香置腋下夾之即愈

又方

錢三七文 胡粉三兩 馬齒草鹿莖三兩 青木香二兩
大酢半升

右五味切先以醋漬錢五六日然後總漬諸藥一搗煮
五六沸置磁器中先以石灰汁洗病處拭乾訖塗之以

差為度並出第三卷中

古今錄驗療胡臭青羊脂粉方

胡粉

銅青等分

右二味先以塩湯洗兩腋下及著藥且淋洗又以青羊脂和傳數日差

又錢汁傳方

錢二七文

右以礪石磨令平以夾腋下神良范汪同並出第三十卷中

又漏腋方三首

病源腋下常濕仍臭生瘡謂之漏腋此亦是氣血不和為

風邪所搏津液蘊瘀故令濕臭出第三十一卷中

集驗療漏腋腋下及足心手掌陰下股裏常如汗濕致臭

六物胡粉傳方

乾枸杞根半兩 胡粉一兩

乾商陸根一兩 滑石宋本甘草下兩

乾薔薇根半兩 甘草半兩

右藥擣下篩以苦酒和塗腋下當微汗出易衣復塗著藥不過三傳便愈或更發復塗之不可多傳傷人腋餘處亦塗之小品文仲備急范汪同出第九卷中

經心錄漏腋方

正朝且以小便洗文仲備急集驗小品范汪千金同

又方

擣馬齒草腋下夾之令燥後復易之先用雌黃石灰等分合水煎一兩沸如泥泥之毛落然後塗諸藥良並出第五卷中

七孔臭氣方三首

千金療面目口齒七孔臭方

沉香 五兩 甘草 二兩 白瓜瓣 半 芎藭 二兩
丁香 五兩 藁本 二兩 麝香 二兩 當歸 二兩

右八味擣下篩蜜丸食後含如小豆五粒日三秘不傳久服令人舉體皆香救急同出第六卷中

救急療人七孔臭氣方

甘草 五分 芎藭 四分 白芷 三分

右三味作散下篩食後飲服方寸匕日三

又方

瓜子一分 芎藭 藁本 當歸

杜蘅各一分 細辛 二分 防風 一分

右七味擣下篩食後溫水服方寸匕日三令人體香方四首

肘後令人體香方

白芷 薰草 杜若 杜蘅

藁本 等分

右五味末之蜜和旦服如梧子三九暮服四九三十日
足下悉香文仲備急范汪同

又方

甘草 炙

瓜子

大棗

松根皮 等分

右四味擣下篩食後服方寸七日三二十日覺効五十
日身體並香百日衣服床幘悉香文仲備急范汪千金同

又方

瓜子 人

芎藭

藁本

當歸

杜蘅

細辛 各二分

白芷

桂心 各五分

甘草 二分 炙

右九味擣下篩食後服方寸七日三五日口香二十日
肉香文仲備急同出第五卷中

千金療諸身體臭方

竹葉 十兩

桃白皮 四兩

右二味以水石二斗煮取五斗浴即香出第六卷中
雜療汗出不止方一十首

集驗療止汗粉藥方

牡蠣 二兩 熬

附子 半兩 炮

麻黃根 二兩

右三味擣篩以白粉一升和合粉汗汗止忌猪肉

外臺必要

二十三卷

兵

聖余若

又汗後遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸
桂枝加附子湯方

大棗 十三枚 附子 一枚去者桂心 三兩 芍藥 三兩

生薑 三兩 甘草 二兩

右六味切以水七升煮取三升溫服一升
患猪肉冷水海藻松菜生葱
延年同此本
張仲景傷寒

千金止汗方

青松葉 一斤

右一味擣令汁出清酒一升漬二宿近火一宿初服半
升漸至一升頭面汗即止
出第八卷中

延年澤瀉湯療大虛煩躁止汗治氣方

澤瀉 各二兩 茯苓 各二兩 牡蠣 熬 白朮 各一兩

生薑 半升

右五味切以水八升煮取二升分服一升日再服
又都梁散療汗出如水及汗出衄血吐血小便血殆死方
忌桃李雀肉
酢物

都梁香 二兩 紫苑 人參 青竹茹

菴蓉 各一兩 乾地黄 二兩熬

右六味擣下篩水服方寸匕不効須臾再服忌蕪荑
又療大病之後虛汗不可止方

杜仲 牡蠣 等分熬

右二味擣下篩向暮卧以水服一錢七午前汗止者不
再服服之令人乾燥若汗不止者復服一錢不過再必
愈有驗天行及百病後虛吸漏汗遂温之無不止者
又療大病後虛汗出不禁者方

案粉

豉等分焦炒

故竹扇如手掌大燒取灰

右三味合擣以絹囊盛粉體立止最驗當先熬末粉之

千金並同

又粉散療大病後身體虛腫汗出止汗方

麻黃根三兩

防風

乾薑

細辛各二兩

白欬一兩

右五味合下篩以粳粉五升熬令黃合和以粉出第
十一卷中

古今錄驗療汗出不止木桂散方

麻黃

桂心各五分

白朮

附子炮

菖蒲各三分

右五味擣末酒服方寸匕日三末食服忌羊肉錫猪肉桃
李雀肉等

雷丸

桂心

牡蠣各五分熬

右三味擣下篩粉身日三出第
二十六卷中

朝奉郎提舉藥局兼太醫令醫學博士臣裴宗元較正

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子
孟較訪

重訂唐王肅先生外臺秘要方第二十三卷終

