



中武
612
2A



明武
612
卷 24



重訂唐王靈先生外臺秘要方第二十四卷目錄

癰疽發背九門

癰疽方一十四首

癰腫方二十五首

石癰方五首

癰疽方一十四首

附骨疽方八首

癰疽方一十六首

緩疽方四首

發背方四首

癰疽發背雜療方二十六首



外臺必效

二十四卷目錄

卷目

唐王燾先生外臺秘要方第二十四卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等——上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

癰疽方一十四首

靈癰疽篇

集驗癰疽論黃帝曰夫子言癰疽何以別之岐伯荅曰榮衛稽留於經脉之中則血泣而不行不行則衛氣從之從之而不通壅遏不得行故熱大熱不止熱勝則肉腐肉腐則為膿然不能陷肌膚於骨髓骨髓不為焦枯五藏不為修故命曰癰黃帝曰何謂疽岐伯荅曰熱氣純盛下陷肌

小經必更

二十四卷

經餘居

膚筋髓骨肉內連五藏血氣竭盡當其癱下筋骨良肉皆無餘故命曰疽症者其上皮天癩以堅亦如牛領之皮癰者其上皮薄以澤此其候黃帝曰善出大素第十六卷中經言五藏不調致疽六腑不和生癰一日燥疽急者二三日殺人緩者十餘日殺人二日癰疽急者十餘日殺人緩者一月死三日緩疽急者一年殺人緩者數年四日水疽所發多在手足數年猶可療疽者數十種要如此于氏法癰之末所發緩地不殺人所發若在險地宜令即外消若至小膿猶可療大膿致禍矣

- 一為腦戶
- 二為舌本
- 三為玄癰
- 四為喉節

五為胡脉 六為五藏俞 七為五藏繫

八為兩乳 九為心鳩尾 十為兩手魚

十一為腸屈之間 十二為小道之後 十三為九孔

十四為兩膈腸 十五為神主之舍一本云主客之舍

凡十五處不可傷而況於癰乎若癰發此地遇良醫能

不及大膿者可救至大膿害及矣范注同

候賊風證但夜痛應骨不可按抑不得迴轉痛處不壯熱

體亦不乍寒乍熱但覺體癢癢然冷欲得熱熱慰痛處即

小寬時有汗此是賊風證也宜即得針灸服療風藥溫也

方在療風候上大法宜知二候如此也

通法
癩疹一
本作索
索

又初得附骨疽，即服漏蘆湯下之，傅小豆薄，得消也。
又下利已，腫處未消者，可除大黃，用生地黄及乾地黄，隨時也。熱漸退，餘風未歇者，可服五香連翹湯，除大黃餘熱未消，可傅升麻膏。若失時不消，成膿者，用火針膏散如療癰法。又有膈疾，喜著四肢，其狀赤脉起，如編繩急痛，壯熱其發於脚者，喜從躡蹠起至踝，赤如編繩，謂之膈病也。又其發於臂者，喜腋下起至掌也，皆由四肢勞熱氣盛為涼濕所折，風結筋中，成此疾也。不即療取消，潰去膿，則筋攣縮也。其若但置不消，復不潰，其熱歇，氣不散，喜變作膈也。

通按
膈疾
辨二音

又療之宜服漏蘆湯，令下，外以鋒針針去血氣，針寫上結脉處，傅小豆薄，則消也。皆可依療丹法消之。及潰成膿，出火針，傅膏散，如療癰法也。
又亦用苳蕉根薄之。差。
又癰發腫高者，病源淺，腫下者，病源深。大熱者易療，小熱者難療。初便大痛傷肌，晚乃大痛傷骨，都堅者未有膿，半堅半軟者有膿。發腫都軟，血痛也，非癰。吳音曰：謂諸氣結，亦有腫，久久不消，成癰。療之宜散氣，氣已散，若初腫處有浮氣，年衰皆發癰。療之宜反年盛，並折散熱，可無此憂。

于氏法夫癰疽脉洪麤難療脉微瀋者易療諸浮數之脉應當發熱而反惡寒者癰也此或附骨以有膿也

趙乃言無虛勞腹中疾或發血癰瘡瘡狀墳起頭墨正爾

置不當灸療療之火熨便焦爛剝去焦痂則血泄不可禁必死癰起於節解遇頭醫不能即消令至大膿者豈膏藥可得復生乎

又發癰堅如石走皮中無根癰也久不消因得他熱之疾時有發為癰也

又發癰至堅而有根者名為石癰療之法當服酒非酒即藥亦不宣但當稍飲取令相得和散便止凡癰腫有肥人

用點宜栝樓根和平體宜赤小豆賦方

以赤小豆五合內苦酒中熬之畢擣為散以苦酒和之塗拭紙上貼腫從發腫兩頭以下

又論少小有渴年四十以外多發癰疽有膈痰而渴者年盛必作黃疽年衰必發癰疽也

又黃帝口願聞癰疽之形與其期曰岐伯曰略說癰疽之極者十八種

又癰疽發咽名曰猛疽猛疽不療則血化為膿膿不寫塞咽半日死其化膿者寫已則含豕膏無冷食三日而已

去無食

靈癰疽篇

又發於股筋名曰股脫疽其狀不甚變而癰腫膿搏骨

通按發於股筋靈和作發於股筋名曰脫疽急療三十日死髀內曰股股外曰髀膝上股下骨稱曰股筋也

又發於脇名曰改營改營者女子之疾也久之其狀大癰

膿其中乃有生肉大如赤小豆療之方

劉連翹草及根各一升以水一斗六升升煮令竭取三

升即強飲厚衣坐釜上令汗出至是已

又發於尻者名曰銳疽其狀赤堅大急療之不療三十日

死

又發於脛者名曰兔囓其狀赤至骨急療之不療害人

又發於足上下者名曰四淫其狀大如癰不急療百日死

通按此疽靈和作此

又發於肩及臑首名曰疵疽其狀赤黑急療之此令人汗

出至是不害五藏癰發四五日逆喘之

上炎百壯石子當碎出也不出可益壯從癰發高下以移此注並同

又石癰者始發皮核相親著不赤頭不甚堅微痛熱熱漸

自歇便堅如石故謂之石癰難消又不可得自熟縱愈皆

百餘日也又發癰兩頭牽而傍推無根者又不痛結筋非

癰也發癰狀如蛇雖極大此肉痛非癰也腫一寸至三寸

癰也三寸至五寸癰也五寸至一尺癰疽也一尺至三尺

名曰竟體疽腫成膿九孔皆出諸氣憤鬱不遂志欲者多

發此疾癰及疽血瘤鼠乳石癰結筋癰癰皆不可就針灸

靈和竟體

針角少不及禍者

凡癰疽之疾未見膿易療之當上灸三百壯四邊間子灸各二百壯實者可下之虛者可補之有氣者下其氣服古斯內塞散得愈迨房三年凡癰瘡審知膿者破之皆當近下邊膿出後當膏藥^充之常使開潤勿令燥合也若其人羸勿一頓盡膿徐徐令後稍出乃盡癰方潰其上皮薄人喜當上破之此終不愈當下破之乃得膿耳勿要其皮厚也凡癰有膿當破無膿但氣腫若有血慎不可破針灸也按之四邊堅中軟此為有膿審也一邊軟亦有膿都堅者此為^或但有氣也都軟者此為有血血痛也當審堅軟

虛實為要若堅^疽後若更變熟爛有軟處^{不可破者}

疽^溫當暖裹置耳若灸刺破療必暴刺不可救及結筋腫^偽

^切肉鼠乳皆不當療也又服內塞散不與他療相害晝夜

十餘度服散當以酒

又發於腋下堅赤者名曰米疽療之用砭石欲細而長陳

啓之塗以豕膏六日已勿裹其癰堅而不潰者為馬刀挾

纒急療之^{太素經曰頸前}

又發於股陰者名曰赤弛不急療六日死在兩股之內不

可療一云六十日死

又發於膝者名曰疵疽其狀大癰色不變寒熱如堅石勿

石之死須其柔色異乃石之者生

冷石炭之柔乃破之半例

又諸癰腫之發於節而相應者不可療

太素經云膈入節門故不可療也

又發於陽者百日死

又發於陰者三十日死

丈夫陽器曰陽婦人陰器曰陰

又發於踝者名曰走緩其狀肉色不變數石其輪而止其

寒熱不死

冷石

又發於足傍者名曰厲疽其狀不大初從小指發急療之

去其黑者不消輒益不療百日死

傍不足外漫也

又發於胷者名曰背疽狀如大豆三四日起不早療下入

腹入腹不療十日死

太素經云寒熱不六十日早死

又發於足指者名曰脫疽其狀赤黑死不療不赤黑可療

療不衰急斬去之得活不去者死

又發於膚者名曰舌疽其狀如穀實瓜萋常苦寒熱急療

之去其寒熱不療十歲死死後出膿

又發於頸者名曰天疽其狀大而赤黑不急療則熱氣下

入淵腋前傷任脉內熏肝肺十餘日死

太素經曰項一云

發頭

以前十八種並與千金翼劉消子

千金論曰夫癰疽初發人皆不以爲急此實奇患唯宜速

療若療不速病成難救以此致禍者不一發皆外皮薄爲

癰皮厚爲疽宜急治之去癰壞後有惡肉者以豬蹄湯洗

通按
初從靈
棍作初
如

通按
於膈
痛作其

去積次傳食肉膏散惡肉盡傅生肉膏散及摩四邊令善
肉速生當斷絕房室慎風冷勞煩待筋脉平復乃可任意
耳不爾新肉易傷傷則重潰發發則禍至慎之慎之
凡癰疽始發或似小節或復大痛或復小痛或如米粒
大白膿子此皆微候宜善察之見有少異即須大驚忙須
急治之及斷口味速服諸湯下去熱毒若無醫藥即灸當
頭百壯其大重者灸四面及頭上二三百壯壯數不慮多
也復薄冷藥貼膏種種救療必差也
又其用藥貼法皆須當瘡中處開孔口令淺瘡熱氣出亦
當頭以大針針入四分即差

身中忽有痛處似打蟲名曰氣痛痛不可忍遊走不住發
作有時痛則小熱痛定則寒此皆由冬受溫風至春暴寒
風來折之不成溫病乃作氣痛也又宜先服五香連翹湯
摩丹參膏又以白酒煮楊柳皮及煖熨之有赤氣點點刺
出血也其連翹湯可服數劑及竹瀝湯勿以一劑未効便
謂膿也遂不服耳中間將白薇散佳

素問曰寒氣客於經絡血凝滲澀不行擁結爲癰疽也不
言熱之作也其後成癰又陽氣湊集寒化爲熱熱盛則肉
腐爲膿也又以酢和蜂蛤灰塗之乾即易差即止
凡腫根廣一寸以下名癰一寸以上名小癰如豆粒大者

名魁子皆始作急報五香連翹湯下之數劑取差止並出第二

廣濟療癰疽排膿散方

- 黃耆 十分膿多倍
- 青小豆 一分熱口乾倍
- 芎藭 三分肉不生倍
- 芍藥 三分痛不止倍
- 白欬 三分有膿不合倍
- 栝樓 三分若渴小便利倍
- 甘草 三分

右七味為散酒服方寸七日三服不利忌海藻菘菜熱麩魚蒜等千金同一方無白欬甘草

又療發癰疽排膿散方

- 人參 二兩
- 當歸 二兩
- 桂心 二兩
- 芎藭 一兩

- 厚朴 一兩炙
- 甘草 一兩炙
- 防風 二兩
- 白芷 二兩
- 桔梗 一兩

右九味擣篩為散以酒服方寸七日二服不利若瘡未合常服之忌生冷菘菜海藻生葱蒜並出第五卷中

劉涓子療癰疽先宜傅大黃食肉膏方在發背部千金方食惡肉散後用大黃附子等十物者乃定次兌膏方

- 當歸
- 芎藭
- 白芷 各二兩
- 烏頭 一兩
- 巴豆 二十枚去皮
- 松脂 二兩
- 豬肪 二分

右七味咬咀內膏中微火合煎三沸已內松脂攪令相得以綿布絞去滓以膏著綿絮兌頭大瘡雖深兌之膿

自出就允盡卽生善肉瘡淺者不足允著瘡中日三惡肉盡卽止

又療癰疽發壞出血生肉黃耆膏方

黃耆 一兩

芍藥 一兩

當歸 一兩

大黃

芎藭

獨活

白芷

薤白

生地黃

各一兩

右九味切猪膏二升半煎三上三下膏成絞去滓傳允瘡中摩左右日三文仲同並出第四卷中

又療癰疽瘡生肉黃耆膏方

黃耆

細辛

生地黃

蜀椒

當歸

芍藥

薤白

白芷

芎藭

丹參

各一兩

猪膏

一升半臘月者

甘草

菴蓉

獨活

黃芩

各一兩

右十五味以苦酒一升二合夏月漬一宿冬月二宿微

火煎三沸煮酒氣盡成傳之忌海藻菘菜生葱慈菜蕪荑

又療癰疽始作便壞熱毒發瘡膏方

羊髓 一兩

甘草 二兩

胡粉

五分一兩法五兩

大黃

一兩半

猪膏 二升

右五味切合膏髓煎二味烱肉甘草大黃三上三下絞去滓內胡粉絞令調和傳瘡上日五度

又療癰疽已潰白芷摩膏方

白芷 甘草各二分 烏頭三分 雄白十五挺

青竹筴雞子大一枚

右五味切以猪膏一升合煎白芷黃膏成絞去滓塗瘡四邊勿著瘡中並出第五卷中

深師內塞散療癰疽潰漏血脉空竭方

黃耆 細辛 芍藥 薏苡人

白芷 瞿麥各二兩 赤小豆七兩 乾地黄

人參 防風各二兩

右十味切先以新成白苦酒置新器中內赤小豆須臾

出銅器中熬令燥復須內苦酒中更熬尺五反止合搗

為散酒服方寸七日夜六七過腹痛甚倍芍藥口未閉

倍薏苡人膿多倍黃耆此第二十八卷中

刪繁療癰疽等毒潰爛猪蹄洗湯方

猪蹄一具治如食法 薔薇根一斤 甘草五兩 芍藥五兩

白芷五兩

右五味切以水二斗煮猪蹄取八升去滓下諸藥煮取

四升稍稍洗瘡出第九卷中

千金翼黃帝問曰有疽死者奈何岐伯曰身有五部伏菟

一桃非漫滅下 二膊云 背三五藏之踰四項五五部有疽死也刪繁同本

此靈樞

又王不留行散主癰疽及諸雜腫潰皆服之亦療癰腫不潰苦困無賴方

野葛皮分半 五色龍骨兩五 王不留行子二升千金方用三合翼云一升
桂心一兩 當歸二兩 乾薑一兩 栝樓末六合

右七味為散食訖溫酒服方寸七日三以四肢習習為度不知漸漸加之此浩仲堪方隨日濟開黎施行實為神散癰腫即消此方妙千金同出第十四卷中

癰腫方二十五首

集驗癰腫大按乃痛者病深小按便痛者病淺按之處

陷不復者無膿按之即復者有膿若當上破者膿出不盡不盡稍深蝕骨骨碎出當以魚導側際從下頭破令膿出盡出盡則骨生愈矣若惡肉不盡者食惡肉藥去之膏塗之即愈食肉藥方

取白荻灰水淋之煎令如膏此不宜預作作之十日則歇并可以去黑子黑子藥注住便即拭去不時拭則傷膚又一方以桑皮灰亦妙

凡破諸病肉厚處當先廣封四面不爾瘡披裂氣泄便死不可救也以前范注同有久癰餘瘡為敗癰深疽有脛間喜生瘡中外惡瘡霜寒凍不差經年或骨疽亦名脛瘡深爛青

小臺必要

二十四卷

三

經餘居

黑四邊堅強中央膿血惡汁出百藥療不差汁清好肉處
皆腫亦有碎骨從中出者可溫赤龍皮湯洗之夏月日日
洗之冬月三日四日一洗潰肉多者可時傅白蘭茹散食
去之可一日之中三四傅之止後長傅家猪屎散得差也
取猪矢燒作灰下綿篩以粉痘敗瘡中令滿汁出脫
去便傅之長傅須差也若更生青肉復著白蘭茹散
如前法也出第八卷中

千金翼 凡五子日夜半 五丑日雞鳴 五寅日平旦
五卯日日出 五辰日食時 五巳日禺中
五午日日中 五未日日昃 五申日晡時

五酉日日入 五戌日黃昏 五亥日人定
右以此日時遇疾發者皆不起也出第二十三卷中

廣濟療癰腫膿潰內服藥外宜貼膏方

松脂 <small>一斤</small>	脛脂 <small>三合</small>	椒葉 <small>一兩</small>	白蠟 <small>三兩</small>
蛇銜 <small>一兩</small>	黃耆 <small>一兩</small>	芍藥 <small>一兩</small>	白芷 <small>一兩</small>
當歸 <small>一兩</small>	細辛 <small>一兩</small>	芍藥 <small>一兩</small>	

右十一味切以水先煎脂蠟烊盡內諸藥三上三下白
芷色黃膏成用剪故帛可瘡大小塗膏貼上日夜各一
又療癰腫膿潰瘡中有紫肉硬不消以此散充頭內蝕之

方

石硫黃一分 馬齒礬石二分 漆頭蘭茹二分

麝香二分 雄黃二分 雌黃一分

白礬二分 丹砂二分

右八味搗篩為散攪令調熟以傅瘡中瘡惡肉上貼膏日二易千金并翼深師同並出第三十卷中

劉涓子療癰腫方

白歛 烏頭炮 黃芩各等分

右三味搗下篩和雞子白傅上即愈出第十卷中

療癰腫有熱黃耆貼方數用神驗

甘草炙 大黃 白歛 黃耆

芎藭

右五味各等分搗篩以雞子黃和如濁泥塗布上隨赤熱有堅處大小貼之燥易甚効

刪繁療癰腫白歛薄貼方

白歛 當歸 芍藥 大黃

莽草 芎藭

右六味各等分搗篩下雞子黃和如泥塗布隨大小貼之燥易

又療癰腫堅核不消白歛貼之方

白歛 大黃 赤石脂 芍藥

莽草

黃芩

黃連

茺莖

右八味各等分，搗篩，以雞子黃和如濁泥，塗布上，隨核大小貼之，燥易。

又療癰腫黃耆貼之方

通按腫一作疽

黃耆一兩半

黃芩一兩

芍藥一兩

黃連

白芷

芍藥各二兩

當歸一兩半

右七味搗篩，以雞子白和如膏，諸暴腫起處，以塗著布上，已貼燥易，腫處不覺貼冷便愈，熱勢毒者，加白歛一兩尤佳。

兩尤佳

又療癰腫黃耆貼方

黃耆

大黃

白芷

牡蠣蒸

白歛

右五味各等分，搗篩，和雞子貼，燥易。

又療癰腫已潰四物黃連薄貼方

黃連

黃蘗

地榆

白芷

各二兩

右藥搗篩，雞子白和塗布，薄攤上，對瘡口穿布出癰氣，令疎氣。

又療癰腫一物栝樓薄貼方

以栝樓根隨多少止，一物切五片，內苦酒中熬燥，搗節之，苦酒和塗紙上，以貼癰腫上，服散人宜用，並出。

千金療癰腫松脂貼方

當歸

黃耆

黃連

芍藥

蠟

黃芩

芎藭

大黃

各二兩
細切

松脂 一斤

臘脂 一斤

右十味切以微火煎之三上三下綿布絞去滓向火炙

塗生戕紙上隨大小貼之一日三度易之即差

又療腫蒺藜散方

蒺藜子 一升熬
令黃

右一味擣篩以麻油和之如泥炒令焦黑以塗故布上

剪如腫大勿開頭搯上無蒺藜子用小豆和雞子如前

乾則易之甚妙

又搯湯方

大黃

黃芩

白欬

各三兩

芒消

六分

右四味以水六升煮取三升以故帛四重內汁中以搯

腫上煖復易晝夜為之異同

又癰腫痛煩困方

以生楸葉十重貼之以布綿裹帛緩急得所日二易止

痛消腫食膿血良無比勝於衆貼冬以先收乾者臨

時鹽湯沃潤用之亦可薄削楸皮用之

備急張文仲
附後同

又諸癰腫牢堅諸藥不療方

削附子如碁子厚一指正著腫上以少唾濕附子火
灸附子令熱徹附子欲乾輒令更唾濕之常令附子
熱氣入腫中無不愈者此法絕妙並出第二十三卷

千金翼黃耆湯主癰腫熱盛口乾除熱止渴方

黃耆

升麻

栝樓

乾地黄

各二兩

麥門冬

去心

芍藥

各三兩

黃芩

一兩

梔子

二十枚

右八味切以水一斗煮取三升分三服劉涓子用升麻一兩梔子十四枚餘藥同

又白欬薄貼主癰腫方

白欬

大黃

黃芩

各等分

右三味搗篩和雞子白如泥塗布上薄貼腫上乾則易之可以三指撮藥末內三升水中煮三沸綿注汁拭腫上數十遍以寒水石末和塗腫上以紙覆之乾則易之一易輒以煮汁拭之日夜三十度劉涓子同

又療癰腫方

伏龍肝以大酢和作泥塗布上貼之乾則易之消矣
又凡腫已潰未潰者方

以膠一片水漬漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰還合者膿當被膠急撮之膿皆出盡未

有膿者腫當自消矣

又方

燒鯉魚作灰，酢和塗之。一切腫上，以差為度。至良。又溫中湯，主癰腫，取冷過多，寒中下利，食完出方。

甘草 炙

乾薑

附子 各六分

蜀椒 二百四十枚 汗

右四味切，以水六升，煮取二升，分三服。忌海藻、菘菜、猪肉、冷水。劉涓子同出第二十三卷中

張文仲劉涓子療癰消膿木占斯散方

木占斯

朴心

人參

細辛

敗醬

乾薑

厚朴 炙

甘草 炙

防風

桔梗 各一兩

栝樓 一兩

右十一味，搗為散，服方寸匕，入咽覺流入瘡中，若癰及

疽，灸亦不能發壞者，可服之。瘡未壞者，去敗醬已壞發膿者，內敗醬。此藥時有化癰疽，令成水為妙。

隱居必効方消癰腫

白斂 二分

藜蘆 一分

右二味搗為末，以苦酒和如泥，貼腫上，日三大良。以上三首同出第五卷中

石癰方五首

千金堅如石，核復大，色不變，或作石癰，療之鍊石散方。

鹿角入兩燒燒白斂三兩麤理黃石一斤酢五升先燒石令赤內酢中復

右三味搗篩作細末以餘醋拌和如泥厚塗之乾即塗取消止盡更合諸漏瘰癧藥悉皆主之並須火針瘡上塗膏

又方

單磨鹿角半夏塗不如上方佳也集驗文仲小品古今錄驗同

又療石癰堅如石不作膿方

以生商陸根爛搗傅之燥則易又治腦漏及諸癰瘡古今錄驗同

又方

以蜀桑根白皮陰乾搗末消膠以酒和傅上蜀桑根白皮即拔出

備急療若發腫至堅而有根者名曰石癰也方

灸腫三百壯當石子破碎出如不出益壯乃出其癰疽石癰結筋瘰癧皆不可針角針角殺人集驗文仲千金同出

第四卷中

癰瘡方一十四首

劉涓子療癰瘡諸腫有熱方

地黃三斤洗細切

外臺秘要

二十四卷

七

經餘居

右一味以水一斗煮取三升去滓煎湯令小厚以塗紙
當瘡中央貼之日再三易數用大良并療牛領上腫

第十卷中

集驗療癰及瘡如結實赤熱者方

以水磨半夏塗之燥復更塗得流便消也出草中可
自掘生半夏乃佳此療神驗勿不信也出第八卷中

千金療凡瘡無頭者方

吞葵子一枚即出勿多服頭多也

又方

燒葛蔓灰封上自消

又方

牛糞封之佳

又方

以鼠粘葉貼之

又方

用水和雀糞傅之

又方

狗頭骨 芸薹子

右二味等分爲末和酢封之

又療癰瘡潰後膿不斷及諸物刺傷不差方

取石硫黃三兩粉之一味筋一片，髓頭令碎，少濕之內石硫黃中，刺瘡孔，以瘡差為度。通按筋字可疑

又乾地黄丸，主虛熱消瘡癩疔。

乾地黄 四兩

大黃 六兩

桂心 二兩

芍藥 三兩

茯苓 三兩

王不留行 二兩

黃芩 二兩

麥門冬 二兩
去心

遠志 二兩

升麻 二兩

人參 二兩

甘草 二兩
炙

枳實 二兩
炙

右十三味，搗篩蜜和丸，如梧子大，酒服十丸，日三，加至

二十九，長服令人肥健。異同

又地黄煎方，補虛除熱，可將和服，取利也。散石癰疽癩疔。

悉宜服百日，癰疽永不發也。

取生地黄隨多少，三搗三押，取汁令盡，一味以新布重絞其汁，澄清置銅器中，湯上煮之，減半，復下更新布絞去麤碎，結濁者，滓穢盡，復煎之，濃竭令如飴糖，置甕器中，酒服如彈丸，大日三，勿加，至百日，服之有驗。

又梔子湯，主表裏俱熱，三焦不實，身體生瘡，或發癰癧，大

小便不利方。

芒硝 二兩
消

大黃 四兩

梔子 二七枚

黃芩 三兩

知母 二兩

甘草 二兩
炙

右六味切以水五升煮減半下大黃煮取一升八合去滓內芒硝消二兩分三服忌海藻松菜並出第十三卷中

千金翼論曰一切癰疽皆是瘡痕根本所患癰之後膿汁不止得冷卽是鼠癩是以漏膿次之大須急救之

馬齒草

五升 槲白皮

一斤水五升 煮

麝香

半臍乾之仍研作末

杏仁

半升油煎令黑搗如膏

右四味以甕器貯之合和以三四重綿綿密繫口病已成

瘡者以泔清淨洗拭乾剪作貼子塗藥貼著瘡上日三

易若未作瘡如作癩癰子者以艾一升熏黃如棗大乾

棗如棗大末之釜月下土三味並末和艾作炷灸三七

壯本方療鼠癩出第二十三卷中

又主癰腫方

生椒末麴末釜月下土末之以大酢和傳之並出第二十卷

卷中

附骨疽方八首

千金診診附骨疽法凡附骨疽者無故附骨成膿故名附骨

疽喜著大節解中丈夫產婦喜著膝髀嬰兒亦著脊背丈

夫急者先覺痛不得動搖按之應骨痛經日便覺皮肉漸

急洪腫如肥狀是也小兒纔近便大啼呼卽是肢節有痛

候也大人緩者先覺肥洪洪然經日便覺痺痛不隨小兒

千金肥作肌洪作烘

小醫必要

二十四卷

三

歷余

四肢不能動搖亦如不隨狀著肢節解中有洪洪處不知是附骨疽令遍身成腫不至潰死體皆青黯大人亦有不別見附骨疽呼為賊風風腫也

又凡人身體患熱當風取涼風入骨解中風熱相搏便成附骨疽其候嗜眠沈重忽忽耳鳴又秋夏露卧為冷所折風熱伏結而作此疾急者熱多風少緩者風多熱少小兒未知取風冷何意而有此疾由其血氣盛肌嫩漸為風冷折之即腠理凝結故也

又凡骨疽者久瘡不差差而復發骨節孔中出名為骨疽方

以猪膽和楸葉搗封之

又方

搗白楊葉下篩傅之

又方

穿地作坑坑口小裏大深三尺取乾雞屎五升以艾及荆葉和之令可燃火令煙出內疽孔坑坑中以衣擁坑口勿洩煙半日許當有蟲出

又癰疽敗及骨疽方

末龍骨粉瘡四面厚二分

又方

用自死蝦蟇一枚頭髮一把以猪膏一片折半內二物煎之消盡下之欲冷內鹽一合攪和以膏著瘡中日一易蟲出如髮蟲盡愈

又骨疽百方療不差方

可瘡上以艾灸之三日三夜無不愈也並出第二十三卷中

備急若骨疽積年每一年一發汁出不差方

取膠熬擣末粉勃瘡上及破生鱧魚以掄之如食頃刮視其小蟲出更洗更傅蟲出盡止備急文仲同

又療疽瘡骨出方

黃連 牡蠣 各二分熬

右二味末先以鹽湯洗以粉之文仲同出第四卷中

療疽方一十六首

集驗論胃中痛少氣急入閤中以手掩左眼竟視右眼見光者胃中結癰也若不見光癰疽內發若吐膿血此不療之疾宜以灰掩膿血上不爾著傍人也又齒間臭熱血出是癰疽也七日死療所不差宜以灰掩地血癰疽喜著指與代指相似人不別者亦呼作代指不急療其毒逐脉上入竅殺人也南方人得此疾皆斬去指恐其毒上攻藏故癰疽著指頭者其先作黥瘡然後腫赤黑黥癢痛入心是也出第八卷中

千金瘰癧論說曰瘰癧者肉中忽生點子如豆粒小者如黍粟劇者如梅李或赤黑青白不定一種其狀有根不浮腫痛瘰癧心根深至肌少久便四面悉腫胞黯黯紫黑色能爛壞筋骨也毒散逐脉入藏殺入南方人名爲爛著毒著厚肉處卽割去之亦燒鐵烙胞上合焦如炭亦胞上灸百壯爲佳單擣酸草葉傅腫四面防其長大飲葵子汁或藍青汁或犀角汁升麻汁竹瀝汁黃龍湯諸單瘰癧折其手耳其病亦喜著指故與代指相似人不識之呼作代指遂急療之亦逐脉上入五藏殺人南方人得之皆斬去指頭若指初指頭先作黯胞然後腫赤黑黯瘰癧入心是也復

有惡肉病者身上忽有肉如赤豆粒突出便長推出如牛馬乳上如雞冠狀不療自長出不止不痛痒此由春冬時受惡風入肌脉中變成此疾瘰癧之宜服漏蘆湯外燒燂日日爲之令焦盡竟以升麻膏傅之積日乃差備急同出第二十三卷中

今本千金
二十二卷

劉涓子瘰癧疽侵淫廣大羊髓膏方

羊髓 二兩
大黃
甘草 炙
胡粉 各二兩

右四味吹咀以猪膏二升半合煎微火三上三下絞去滓傅日四五深師云兼瘰癧赤黑爛壞成瘡出第五卷中

千金瘰癧著手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈復發方

黃耆 六分

款冬花 二分

升麻 四分

附子 一分

苦參 一分

赤小豆 一分

右六味下篩酒服半錢七漸增至一錢日三服范汪方無苦參有赤小豆

又方

虎糞白者以馬尿和之暴令乾燒灰粉之翼同

又方

胡粉

青木香

龍骨

滑石 各二兩

右四味下篩以米粉一升和之稍以粉之日四五

又方

竈室塵

竈突中墨

竈釜底土 各升

右三味合研令勻以清水一斗煮三沸取汁洗瘡日二

三度

又凡癩疽手足肩背忽礫礫如赤小豆刺之汁出者是癩之方

剥却瘡皮温泔清洗胡鷲窠和百日男子矢塗之

又方

熬蕪菁子熟擣綿帛帛裹傅之勿止文仲備急附後同

又方

熬麻子末摩上日五六度

又方

麩和酒傳之

又方

鯽魚三寸長者亂髮如雞子大猪脂一斤煎以成膏塗之

又療瘰癧秘方世所不傳神良無比

射干 甘草 升麻 枳實 炙各二兩

大黃 十分 麝香 二分 乾地黃 二兩 犀角 六分 屑

前胡 三兩 本方云三分

右九味切以水九升煮取三升分三服差止不限劑數

異同深師加黃芩十分徐回忌海藻菘菜蕪荑

又療疔漏蘆湯方

漏蘆 白欽 黃芩 麻黃 去節

白薇 枳實 升麻 芍藥

甘草 各二兩 炙 大黃 三兩

右十味切以水一斗煮取三升分三服無藥單用大黃下之良張文仲備急并真並同

又升麻膏方

升麻 白薇 漏蘆 連翹

黃芩 枳實 各二兩 炙

蛇銜

梔子人枚二十 蒴藿四兩

右十味切搗破令細後然以水三升漬半日以猪膏五升煎水氣竭去滓傳諸丹毒皆用及熱瘡腫上並日三易

中藥升升麻搗湯方升麻

升麻三兩 漏蘆 芒硝各二兩 梔子二十枚

黃芩三兩

右五味切以水一斗合蒴藿五兩煮取七升冷搗諸丹腫上常令濕內宜服漏蘆湯甚化

又療瘰疬侵淫多汁日就浸大胡粉散方

胡粉三分 黃連三分 甘草二分 蘭茹二分

右四味下篩以粉瘡上日三翼文仲備急深師同並出

千金翼薄榆湯主瘰疬侵淫欲作未成或如桃李核或如雞子赤嫩方

甘草炙 黃芩 大黃 黃連

當歸 芒消各一兩

右六味切以水一斗煮取三升絞去滓鑊中下芒消一沸攪之貼布帛中以搗腫上數百遍劉涓子深師同出

緩疽方四首

集驗論有緩疽者初結腫形似癰回回無頭尾其色不異

但痛深有根核又與皮肉相親著外耳一名內癰其有大者如拳小者如桃李狀積日不消喜變紫色黯黑久即皮肉俱爛如牛領瘡狀便通體遍青黯色而不作頭穿潰出膿初作服五香連翹湯鏡去血以小豆薄塗之其間數針鏡去血又薄之取消也若不消色未變青黯者以鍊石薄之若失時不得療已爛者猶服五香連翹湯及漏蘆湯下之隨熱多少投方也外以升麻湯搗洗之薄升麻膏若生臭惡肉者可以單行一物白蘭茹散傳之青肉去盡便停也好肉既生但傳升麻膏良不生單傳一物黃耆散也若傳白蘭茹散積日青惡肉不盡者可以漆頭赤皮蘭茹取

半錢匕和三大錢匕白蘭茹散中合和傳之惡肉去盡以淳用白蘭茹散也視好肉欲生可傳黃耆散也黃耆散方白蘭茹散方漆頭蘭茹散方並一味單行隨多少搗篩為散出第八卷中

范汪飛黃散療緩疽惡瘡食惡肉方

取丹砂著瓦盆南雌黃著中央礬石北曾青東白石英西礬石上石膏次鍾乳下雄黃覆雲母薄布下各二兩先搗篩瓦盆中以一盆覆上羊毛泥令厚作三隅竈燒之以陳葦一日成取其飛者使之甚妙又療緩疽以飛黃散食惡肉令盡作土竈熏之方

夕壹秘要 卷之五 雜會居

雄黃 一兩 雞白尿 一兩 藜蘆 一兩 丹砂 一兩

乾鰻鱧魚 一兩

右五味搗下篩青布裹之熏經三日乃止止畢要以蛇

銜膏摩之良蘇范江方緝蛇銜膏崔氏方附於後並出

崔氏蛇銜膏療癰腫瘀血產後血積耳目暗等牛領馬鞍

瘡方

蛇銜 一兩 大黃 附子去黑皮 芍藥

當歸 細辛 黃芩 大戟

椒去目 莽草 獨活各一兩 薤白十四莖

右十二味並切之以苦酒淹之一宿以不中水成鍊備

膏二升龍銜藤一兩合膏煎名龍銜膏今又有龍草似

蛇銜而葉大耳亦有取其根合煎者亦名龍銜膏出第一卷中

小品療緩疽初作即以小豆薄塗之亦消也出第十卷中

發背方四十一首其乳石發背自有正方在第三十八卷中具述

千金論曰凡發背皆由服餌五石寒食更生散所致亦有

單服鍾乳而發者又有空平不服諸石而自發背者此是

上代有服之者其候率多於背兩脚間起初如粟米大或

痛或痒仍作赤色人皆初不以爲事日漸長大不過十日

遂至不救其臨困時方圓徑三四寸高一寸瘡有數十孔

以手按之諸孔之膿皆反出尋即失音不言所以養生者

小臺必要 二十四卷 經餘居

小覺背上痛痒有異，卽取淨土、冷水和泥，捻作餅子，徑一寸半，厚二分，以麤艾大作炷，灸泥上，貼著瘡上，灸之一炷。一易餅子，若粟米大，時可灸七餅，卽差。若榆莢大，灸二七炷，卽差。至錢許大，日夜灸不住，乃差。并服五香連翹湯，及鐵漿諸藥攻之，乃愈。又常以冷水射之，漬冷石熨之，日夜勿止，待差住手。此病忌麪酒肉五辛等，亦有當兩腎上發者。

又論曰：凡服石人，皆須大勞役，四體無得自安，如其不爾，多有發動，亦不得遂。便恣意取暖，稱適已情，必須違欲，以取寒凍，雖當時不寧，於後在身，多有所益，終無發動之慮。

發背方

凡腫起於背，胛中，頭白如黍粟，四面相連，腫赤黑，令人悶亂者，名發背也。卽禁房，慎蒜麪，不速灸治，卽入肉，殺人。灸當瘡上七八百壯，有人不識，多作雜腫療之，皆死。

又方

取亂髮灰，酒服方寸匕，差。

又方

以三年酢滓，微火煎令調和，以牛脂封上，日一易。

又方

取狗牙灰酢和傳之

又方

取猪羊脂封之亦療發乳

又方

以蛇頭灰水和傳之

又方

飲鐵漿三升下利為佳

又方

以鹿角灰酢和塗之古今錄驗同

又方

燒古蟬末之如粉雞子白和傅上日三即差止

又發背及癰疽潰漏并末潰毒腫方

栝樓

榆皮

胡鷲窠

鼯鼠土

女人月水布洗取汁

右五味並須等分以月水汁和如泥封腫上乾即易之

潰者四面封赤覺即封從一日至五日令差虞同

又療癰疽潰漏發背及小小瘰癧李根散方

李根

半夏洗

栝樓各一

甘草二兩

葛根三兩

桂心四兩

當歸二兩

通草一兩

芎藭一兩

白斂一兩

桔槩二兩

厚朴炙

黃芩各一兩 芍藥四兩 附子一兩

右十五味為散酒服方寸七日三瘡大困者夜再服

患發背骨出身有三十餘癰癢服此差忌羊肉鰾海藻

菘菜猪肉冷水生葱

又治諸虛不足發背癰疽經年差後復發或由大風聚結

毒氣在內閉塞夏月已來出攻于背久不瘳積聚作膿血

為瘡內漏大肉塞排膿散方

山茱萸 五味子 煖苓 乾薑各六分

當歸四分 附子二分 肉蓯蓉八分 石斛五分

菟絲子三分 巴戟天八分 瞿麥三分 地麥地膚

遠志八分 人參五分 甘草五分 麥門冬八分

石韋四分 芍藥四分 芍藥五分 乾地黄八分

桂心五分

右二十味為散酒服方寸七日三夜一稍加至兩七長

服終身不發癰癢忌同前猪肉冷水海藻菘菜生葱蕪荑醋物等

又內補散瘰癧瘡發背方

蜀升麻 黃芩 人參各二分 乾薑

白斂 桂心 甘草炙 附子炮

防風各一兩 芍藥二兩 赤小豆一合

右十一味為散酒服方寸七日三夜再服

又內補散主癰疽發背已潰排膿生肉方

當歸

桂心

人參各二兩

芎藭

厚朴多

桔梗

甘草炙

防風

白芷各一兩

右九味為散酒服方寸七日三夜再瘡未合服勿停忌海藻
范汪同
菘菜生葱

又瞿麥散王排膿止痛利小便方

瞿麥 二兩

芍藥 二兩

桂心 半兩

赤小豆 半

芎藭 半兩

白斂 半兩

黃耆 一兩

當歸 二兩

麥門冬 二兩
去心

右九味為散先食溫酒服方寸七日三忌生葱
陳真肉汁等

又薏苡人散主令癰自潰長肌肉方

薏苡人

桂心

乾薑

白斂

當歸

肉蓯蓉 各一兩

右六味為散先食溫酒服方寸七日三夜再
真同
忌生葱

又黃耆竹葉湯主胃背遊熱癰疽方

生地黄 八兩

黃耆

甘草 炙

芍藥

黃芩 各三兩

人參

石膏 碎綿裹

芎藭

當歸 各二兩

生薑 五兩

大棗 三十枚 擘

半夏 四兩 洗

淡竹葉 升切

麥門冬 去心 各三兩

右十四味以水一斗二升煮竹葉取九升去滓內藥煮取三升分四服相去如人行五六里再服日三夜一忌海藻菘菜羊肉錫古今錄驗同

又排膿內塞散主大瘡熱已退膿血不止瘡中肉虛疼痛

防風

茯苓

白芷

桔梗

遠志

去心

甘草

人參

芎藭

當歸

黃耆

桂心

附子

厚朴

赤小豆

煎

右十四味搗散酒服方寸七日三夜一忌酢猪肉海藻菘菜生葱

又麝香膏主諸惡瘡及癰疽發背惡肉方

麝香

雄黃

真珠

礬石

右四味細篩以猪膏攪令如泥塗惡肉盡止更傅生肉膏佳

又療癰疽敗壞生肉膏方

生地黄

辛夷

獨活

當歸

黃耆

大黃

芎藭

薤白

白芷

芍藥

黃芩

續斷

右十二味切以臘月猪脂四升煎傅之佳

又方

大黃

附子炮

芍藥

雄黃

真珠

白欬

礬石燒

黃芩

蘭茹

雌黃

莽草

右十一味先以猪膏一升半煎六沸去滓內蘭茹礬石末攪之塗瘡上惡肉盡止劉涓子曰

又方

蘭茹

礬石

雄黃

硫黃

右四味為散內瘡口中惡肉盡止勿使過好肉也

又發背土初欲作腫即服此方

梔子人

大黃

升麻

黃芩

甘草

右五味切以水九升煮取三升半分三服使利便止不

下更進一服忌海藻菘菜從瞿麥散以下九方並療發

背部中已次之支仲備急同並出第二十三卷中

范汪療癰腫發背虎牙散方

虎牙

乾薑

附子炮

當歸

甘草

防風

桂心

玉不留行

茯苓

右九味搗下篩服方寸七日飲服之出第三十一卷

又療癰發背排膿內補鐵屑散方

小經必

二十四卷

三

經餘居

當歸

人參

細辛

甘草 炙

茯苓

黃耆

桂心

防風

黃芩

鐵屑

芍藥

芍藥

右十二味各等分合搗為散服方寸七忌海藻松菜生菜生

同前葱酢物

又療癰腫牢核發背成膿莽草膏方

莽草

芍藥

當歸

細辛

附子 炮

黃芩

烏頭 炮

牛膝

躑躅

野葛

茯苓

防風

杜蘅 各一兩

猪脂 二斤

右十四味切用猪肪合煎去滓傅瘡上日再忌猪肉冷水生木天

同前

又卓氏白膏療癰疽發背金瘡已壞及未敗火瘡諸癰瘡患療之方

當歸

附子 炮

細辛

芍藥

續斷

牛膝

通草

甘草 炙

白芷 各二兩

蜀椒 三合

芍藥

黃耆 各一兩

右十二味咬咀以猪膏二升煎之微火上以白芷色黃藥成殺去滓以傅瘡上日三忌同前海藻松菜猪肉

又療發背發乳房及諸惡瘡膏方

黃連

當歸

馬齒

芍藥

薯蕷 各兩

珍珠 十四枚

礬石 半兩 燒

黃藥 半兩

石韋三分

生竹皮三合

猪肪一斤

右十一味向咀細切中勝美酒一升合煎石韋焦膏成去

滓有病稍稍傅上亦可酒服棗核大一枚忌猪肉冷水同論並出

第四十一卷中

救急療發背百無不差方

取猪羊脂切作片冷水浸取貼上暖微易之五六十

片即差若初貼少許即寒寒定好眠甚妙

又療發背若初覺赤腫腫上作小瘡疼不可近方

急用針刺上七八針取冷水用筒擊射腫上日夜不

止疼歇腫消出第五卷中

又療發背方

取白麩投圍腫四畔令童子七人尿漬之

又方

以馬糞封之乾易婦人發乳亦差

又方

取蔚臭草搗取汁服一雞子滓封上熱即易之

又方

搗地菘汁一升日再服以差止

又方

大黃

石灰熬

小豆

右三味等分末白酒和塗立效忌羊肉熱麪大酢並出

第六卷中

近効凡發背皆發出自腸胃流入五藏仕流多脚氣為主
或有先服乳石并熱肉麪并失饑房室過度皆作此疾縱
身不曾服乳石先代服亦有此病或有下里人服麪過度
亦有患者請依後方萬不失一發背亦覺有腫即須審看
根硬軟如硬頭一點白燒四邊紫黑色時掣痛憎寒不食
狀若天行此石癰知是此狀即須當上灸一百壯艾炷大
如鼠屎許大凡發背初亦一點白四邊赤色漸漸長大或
蓋蓋并燒許大因遊生飯漿小小瘡如粟米許大亦時時

抽掣痛此兩狀皆是死病一日內堪醫十日以外不濟就
中冬月得此病即延得三五日其發背初覺即須當頭灸
二十一壯如盃許大即五花灸之各二十一壯即服牛蒡
子栝樓葛粉第二服犀角湯瀉之不然服犀角丸亦得大
効也忌梨鯉魚麪酒肉漿水粥真鴻臚賈顯錄
凡發背候憎寒壯熱身如拘束或口乾不用食瘡初出如
青紫色者毒重赤者輕膿如稀泔者極重膿稠白赤者輕
張道士昇玄房陵口錄留

又療惡寒啞啞似欲發背或已生瘡腫隱癩起方

消石 三兩

右一味以煖水一斗和令消待冷取故青布疊三重可似欲赤處方圓濕布揜根熱即換之頻易差

又療發背及一切毒腫方

生麻油六分 黃丹一分 地膽兩錢 搗碎

生栗子四十九枚取大小中者熬焦去皮碎細碎

右四味和於銅器中盛用炭火重湯煎候沫溢出與器口欲平取小麥一合分二人嚼取筋急內藥中攪使與相和膏擊下安銅器冷水中成膏訖以故綿塗膏貼所苦處晨夕換膏

又療前瘡定訖令生肌方黃四頁外云極效

麝香兩錢 棗皮灰兩半 生麻油六分

右三味依法和用火重湯上煎十餘沸稀稠前藥相似取故綿塗膏貼瘡上膏漸取瘳滅唯得喫白羊頭肉但是豆並不得喫餘如藥法

又療癰腫犀角九主腸癰乳癰發背一切毒腫服之化爲水神驗方

犀角十二分 蜀升麻 黃芩各四分 大黃五分

防風四分 巴豆二十二枚 心皮熬令黃 人參四分

當歸四分 黃耆四分 乾蓼藍 黃連

甘草炙 梔子各四分

右十三味搗爲末，別搗巴豆成膏，內末和，以杵研搗令相得，鍊蜜和搜，更搗二三百杵，煖湯服三丸，如梧子得利三兩行，喫冷粥止，卽差不利，加至四五丸，初服取快利後漸減，九數取鴨澹微洩爲度，老小以意增減，腫消及和潤乃止，利却黃水卽覺輕，皮皺色變，一切腫皆內消，神驗不可論，忌熱麪蒜猪肉蘆笋魚海藻菘菜生冷粘食，以上並主發背。

癰疽發背雜療方二十六首

劉涓子療發背發乳口已合皮上急痛生肉摩腕折丹參膏方

丹參

防風

白芷

細辛

芎藭

黃芩

芍藥

牛膝

大黃

梔子

獨活

當歸

各一兩

右十二味切，以臘月猪脂五升，微火煎三上三下，膏摩病日三四，不須向火。古今錄驗同，出第五卷中。

肘後療諸癰疽發背及乳方

熬桑粉，今黑雞子白和之，以塗練上，貼癰小穿練上，作小口，以泄毒氣，令散燥，復易之，此藥神效。文仲備急同。

又方

以釜底土搗取散，以雞子中黃和塗之，加少豉，彌良。

以五月蒟及少鹽佳文仲備急同一木無下一法

又方

取茱萸一升搗之以苦酒和貼癰上乾易之佳

刪繁療癰疽發背九物大黃薄貼方

大黃

黃芩各三兩

白芷二兩

寒水石五兩

白欬五兩

黃蘗二兩

石膏

赤石脂

黃連各三兩

右藥下篩以三合投粉麋藥二升中和之薄塗紙貼腫上燥易之腫下止不下厚傅之忌生冷熱麪大酢

又罌皮散療諸癩及浮核壞敗并主男子發背女子發乳

等癰疽或膿血肉瘤方

蝟皮一具

杜仲八分

續斷五分

附子炮

地榆各五分

厚朴八分

藁本五分

當歸

桂心各五分

小露蜂房一具

右十味搗篩為散服方寸七日三服酒進取差止忌猪

肉生葱冷水

又陵鯉甲散療發背乳房癰腫方

陵鯉一頭

桂心三分

當歸二分

右三味搗篩為散服方寸七日三服酒進出第九卷中

千金療癰疽發背猪蹄湯方

外科聖藥

猪蹄一具治如食法黃耆

黃芩三兩薔薇根

黃連 狼牙根各八兩

芍藥各三分

右七味以水三斗煮蹄令熟澄取二斗清切藥煮取一斗洗瘡一食頃以綿拭燥若生肉膏日二差生痂止痛加當歸甘草各二兩

又療癰疽發十指或起膀胱及發背後生惡肉方

猪蹄 一具

當歸

大黃

芍藥

芍藥

黃芩

獨活

莽草各一兩

右八味蹄取膝下斷治如食法以水二斗煮取八升內藥煮取四升去滓漬瘡兩食頃拭令燥以麝香膏傅之

其方在前發背部中只有四味者是也

又生肉膏主癰疽發背已潰令生肉方

甘草炙

當歸

白芷

菴蓉

蜀椒

細辛各二兩

烏喙六枚

薤白二十莖

乾地黄三兩

續斷一兩無以蛇銜替之

右十味以好酢半升相和漬二宿猪膏三斤煎令三沸三上三下膏成使用劉涓子同

又癰發腹背陰匿處通身有數十者方

取牛糞乾者燒擣下重絹以雞子白和以塗之乾復

易射後張文仲備急同

小醫必覽

二十四卷

三

經塗居

宋版千金同
元明版千金可
作依

又若已結膿使聚長者方

以生枯樓根細搗苦酒和傅上燥復易之末赤小豆亦佳

又凡發背為癰疽已潰未潰者方

以香豉三升少與水和熟搗成強泥可腫作餅厚三分已有孔勿覆孔可腫上布豉餅艾列其上灸其豉使溫溫熱而已勿令破肉也其熱痛急易之癰疽當減便得安或一日二日灸之若先有瘡孔孔中汁出即差備急文仲并巽同

又癰腫發背並作及經十日以上腫勢熾熱毒氣猛盛日

夜疼痛百藥不治者方

蝦段雞子 一枚 新出狗矢 如雞子大

右二味攪令調和微火熬之令稀稠得所捻作餅子腫頭堅處貼之以紙貼上以綿抹之時時看之覺餅子熱

即易勿令動轉及歇氣經一夜定其多日患者三日貼

一度差止謹按千金論曰此方穢惡不可施於貴勝然其愈疾一切諸方皆不及爽自外諸方還復

備貞作儀注而已學者常當曉斯以備諸急云耳並出第二十三卷中

千金翼諸癰腫發背及癰瘡已潰爛疼痛方

蒸糜穀更遞熨之當即愈 一云薔薇穀更炙之

又連翹五香湯主一切惡核瘡腫方

通按
蝦音段
不成子
也

連翹

射干

升麻

獨活

各二兩

桑寄生

二兩

通草

二兩

大黃

三兩

丁香

一兩

青木香

二兩

沉香

二兩

薰陸香

二兩

麝香

二兩

右十二味咬咀以水九升煮減半內竹瀝二升煮取三升分三服未差中間常服佳

又五香湯主惡氣毒腫方

沉香

青木香

丁香

各一兩

薰陸香

一兩

麝香 半兩

右五味切以水五升煮取一升半分三服集驗方用雞舌香一兩不用丁香出第二十四卷中

崔氏療發背及諸瘡久不差有效方

先以甘草湯洗瘡拭極乾乃嚼胡麻傅上乾即易從旦至日西去胡麻乃取黃連末滑石末中半相和以傅瘡上數數易明日又依前傅胡麻及黃連等末更不須洗瘡不過六七日即差必効備急同

又連翹湯療患瘡腫而渴方

連翹 三兩

蜀升麻

各二兩

黃芩

三兩

枳實

二兩

乾藍 三兩

芍藥

二兩

玄參

二兩

白欬

二兩

甘草 二兩

羚羊角

屑二兩

通草

二兩

黃耆

二兩

大黃 三兩

右十三味切以水八升煮取二升半分三服利一兩行
後更服去大黃乾藍卽不利忌海藻菘菜

又犀角飲子方

犀角 三兩屑
羚羊角 三兩屑

右二味以水八升煮取三升渴卽飲盡更作之時熱恐
壞懸著并底甚妙

又五香連翹湯療惡瘡熱毒腫惡毒氣入腹兼取利以
洩毒氣方

連翹 三兩
蜀升麻 二兩
薰陸香 二兩
淡竹瀝 一升
麝香 一分
青木香 二兩
丁香 一兩
獨活 二兩

寄生 三兩
射干 二兩
甘草 二兩
沉香 三兩

大黃 四兩水一升別漬
朴消 二兩熬乾別內

右十四味切以水一斗煮取二升半絞去滓然後內大
黃朴消竹瀝煮一兩沸去滓內麝香分溫三服服別
相去如人行十里久以得利一二行為度慎雞猪魚蒜
生令酢滑油膩麪食小豆五辛葵菜等備急文仲同並出第五卷中

備急葛氏療始發諸癰疽發背及乳房方

皆灸上百壯肘後文仲同夏末雞子白和塗良姚云生者神驗
以水和塗之肘後文仲古今錄驗小品並同

又方

以酢和墓上上朱萸擣薑小蒜薄貼並良肘後文仲同並出第四卷中

救急療熱毒風丹并發背犀角膏方

犀角六分 升麻十六分 羚羊角六分 梔子人二七枚

薤白切一分 吳藍八分大藍亦得 玄參六分 續斷

大黃 白欽 射干 白芷各六分

蛇銜切一分 寒水石十二分 黃芩六分 慎火草切一分

麻黃六分去節 右十七味切以竹瀝三升生地黃汁五合漬藥一宿內

猪脂二三升微火上煎十上十下候白芷黃膏成去滓塗

病上出第五卷中

文仲療發背及婦人發乳及腸癰木占斯散方

木占斯 厚朴炙 甘草炙 細辛

栝樓 防風 乾薑 人參

桔梗 敗醬草各一兩

右十味為散酒服方寸匕日七夜四以多為度病在上當吐病在下當下膿血此謂腸癰之屬其癰腫即可服兼療諸疽痔若瘡已潰便早愈發背無有不療不覺腫去時長服去收醬亦療婦人諸產癰瘕益良是劉涓子方千金范汪刪繁古今錄驗同出第

五卷中

古今錄驗療諸癰瘡發背有膿血當歸貼方

當歸 一分

蟾蜍 一分

丹參 一分

附子 一分

蠟蜜 一分

梔子 十枚

桂心 一分

膠 一分

右八味合煎以貼瘡上出第二十一卷中

宋右從事郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事趙

孟較勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十四卷終

