

武口  
612  
22





門中武  
編 6/2  
卷 33

重訂唐王(憲)先生外臺秘要方第三十三卷目錄

婦人上三十七門



求子法及方一十二首

久無子方五首

養胎法并禁忌一十三首

妊娠隨月數服藥及將息法一十九首

妊娠嘔吐及惡食方九首

妊娠胎動方九首

動胎腰腹痛方三首

頓仆胎動方四首

胎數傷及不長方三首



妊娠傷寒方四首

妊娠患瘧方二首

妊娠下痢方四首

妊娠心痛方八首

妊娠腹痛方三首

妊娠漏胞方五首

妊娠下血及尿血方七首

妊娠小便不通利方五首

妊娠子淋方五首

妊娠大小便不利方五首

妊娠子痛方三首

妊娠水氣方三首

損娠方六首

數墮胎方四首

妊娠得病欲去子方三首

落胎去胎方四首

產乳序論三首

年立成法一首

十二月立成法一首 并圖

推日遊法一首 并圖



體玄子爲產婦借地法一首

日曆法二首

安置產婦法二首

產難方二十四首

逆產方一十二首

橫產方四首

子死腹中欲令出方一十五首

胞衣不出方二十首

唐王壽先生外臺秘要方卷三十三

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等 上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

求子法及方一十二首

千金論曰夫婦人之別有方者以其血氣不調胎妊生產崩傷之異故也是以婦人之病比之男子十倍難療經言婦人者衆陰所集常與濕居十四歲已上陰氣浮溢百想經心內傷五藏外損姿顏月水去留前後交互瘀血停凝中道斷絕其中傷墮不可具論矣然五藏虛實交錯惡肉

生熟二

小經必更

三十三卷

經余居



內漏氣脈損竭或飲食無度損傷非一或胎瘡未愈而合  
陰陽或行步風來便利於懸厠之上風從下入便成十二  
痛疾所以婦人別立方也若是四時節氣爲病虛實冷熱  
爲患者故與丈夫同也唯懷胎妊孕而挾病者避其毒藥  
耳其雜病與丈夫同則散在諸卷中可得而知也然而女  
人嗜欲多於丈夫感病倍於男子加以慈戀愛憎嫉妬憂  
患染著堅牢情不自抑所以爲病根深療之難差故養生  
之家特須教子女學此三卷婦人方令其精曉卽於倉卒  
之秋何憂畏也夫四德者女子立身之樞機產育者婦人  
性命之長務若不通明於此則何以免其夭殞者哉故傳

常

姘之徒亦不可不學當宜繕寫一本懷挾隨身以防不意  
也

又論曰人之性情皆願賢已而疾不及人至於學問則隨  
情逐物墮於事業詎肯專一推求至理莫不虛棄光陰沒  
齒無益夫婚姻養育者人倫之本王化之基聖人設教備  
論厥旨後生莫能精曉臨事之日昏爾若愚是則徒願賢  
已而疾不及人之謬也斯實不達賢已之趣而妄徇虛聲  
以終無用今具述求子之法以貽後嗣同志之士或可覽  
焉

徇

又論曰夫欲求子者當先知夫妻本命五行相生及與德



晦

合併本命不在子休廢死墓中生者則求子必得若其本命五行相剋及與刑煞衝破并在子休廢死墓中生者則求子了不可得慎無措意縱或得者於後終亦累人若其相生并遇福德者仍須依法如方避諸禁忌則所誕兒子盡善盡美難以具陳矣禁忌法

凡欲要兒子生吉良者交會之日常避丙丁及弦望朔晦大風大雨大霧大寒大暑雷電霹靂天地昏冥日月無光虹蜺地動日月薄蝕此時受胎非止百倍損於父母生子或瘖瘡聾聵頑愚癩狂癲跛盲眇多病短壽不孝不仁又避日月火光星辰之下神廟佛寺之中并竈圖廁之側塚

墓屍柩之傍皆悉不可夫交會如法則有福德大智善人降託胎中仍令父母性行調順所作和合家道日隆祥瑞競集若不如法則有薄福愚癡惡人來託胎中則令父母性行凶險所作不成家道日否殃咎屢至雖生成長家國滅亡夫禍福之驗有如影響此乃必然之理何不再思之

男女受胎時日法

凡男女受胎皆以婦人經絕一日三日五日爲男仍遇男宿在貴宿日又以夜半後生氣時瀉精者有子皆男必壽而賢明高爵也若以經絕後二日四日六日寫精者有子皆女過六日皆不成子又遇王相日尤吉

寫月



推王相日法

春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸

推貴宿日法

正月一日六日九日十日十一日十二日十四日二十一日二十四日二十九日

二月四日七日八日九日十日十二日十四日十九日二十一日二十七

三月一日六日七日八日十日十七日二十日二十五日

四月三日四日五日六日八日十日十五日十八日二十

五月一日二日三日四日五日六日十二日十三日十五

日十六日二十日二十五日二十八日二十九日三十日

六月一日三日十日十三日十八日二十三日二十六日

二十七日二十八日二十九日

七月一日十一日十六日二十一日二十四日二十五日

二十六日二十七日二十九日

八月五日八日十三日十八日二十一日二十二日二十

三日二十四日二十五日二十六日

九月三日六日十六日十九日二十日二十一日

二十二日二十四日



十月一日四日九日十四日十七日十八日十九日二十日二十二日二十九日

十一月一日六日十一日十四日十五日十六日十七日十九日二十六日二十九日

十二月四日九日十二日十三日十四日十五日十七日二十四日二十七日

若春合甲寅乙卯 夏合丙午丁巳 秋合庚申辛酉 冬合壬子癸亥

與上件月宿日合者尤佳 出第二卷中 千金翼論曰夫求子者服藥須有次第不得不知其次第

蘇灸

謂男服七子散女服盪胞湯及上藥并服紫石門冬丸則無不得効矣不知此者得力鮮焉其七子散盪胞湯紫石門冬丸 出第五卷中在次下千金并翼方中

廣濟療無子令子宮內炙丸方

麝香 二分 研

皂莢 十分 塗酥炙 削去黑皮子

蜀椒 六分 汗

右三味擣篩蜜丸酸棗人大以綿裹內產官中留少綿線出覺憎寒不淨下多即抽綿線出却丸藥一日一度換之無忌晝夜皆內無所忌

又方

蛇牀子

石鹽

細辛

乾薑



土瓜根 各四兩

右五味搗散取如棗核大以綿裹內子宮中以指進之  
依前法中間病未可必不得近丈夫餘無所忌 並出第三卷中

又療婦人百病斷絕緒產白薇丸方

白薇

細辛

厚朴 炙

椒 汗

桔梗

鼈甲 炙各五分

防風

大黃

附子 炮

石硫黃 各六分

牡蒙 二分

人參

桑上寄生 各四分

半夏 洗

白殭蚕

續斷

秦艽

紫苑

杜仲

牛膝

蜜蟲 去翅足熬

水蛭 各二分

紫石 炙研

朴消

桂心

鍾乳

當歸 各八分

右二十七味搗篩蜜丸空腹溫酒服如梧桐子十五丸  
日二漸加至三十九不吐不利忌生冷油膩飭生血物  
人莧生葱生菜猪肉冷水粘食陳臭 出第二卷中

五味子

牡荊子

菟絲子

車前子

乾地黄

薯蕷

石斛

杜仲

鹿茸 炙

遠志 去心

蒺藜子 各八分

附子 炮

蛇牀子

芎藭 各六分

山茱萸

天雄 炮

黃耆

人參

茯苓

牛膝 各五分



外臺秘要

桂心 十分

巴戟天 十二分

菴蓉 七分

鍾乳 三分無亦得

右二十四味，擣篩為散，酒服方寸匕，日二服。不知增至二七，以知為度。忌生冷、酢滑、猪雞魚蒜油膩，不能酒者，蜜和丸服亦佳。行房法：一依素女經，女人月信斷一日為男，二日為女，三日為男，四日為女，已外無子，仍每日午時前、半夜後、陽時為男，下精欲得去玉門入半寸，不爾過子宮，一方加覆盆子八分，忌蕪荑生葱。經心錄并翼同

又朴消盪胞湯，療婦人立身已來全不生，及斷緒久不產三十年者方。

朴消

牡丹

當歸

大黃

桃人

去皮尖生用，各三兩

細辛

厚朴

桔梗

芍藥

人參

茯苓

桂心

甘草

牛膝

橘皮

蜚蟲

水蛭

炙各六枚

附子

一兩半炮

右十八味切，以清酒五升，水六升，合煮取三升，分四服。日三夜一，每服相去三辰，少時更服如常。覆被取少汗，汗不出，冬日著火籠，必下積血及冷赤膿如赤小豆汁。本為婦人，子宮內有此惡物，令然。或天陰臍下痛，或月水不調，為有冷血不受胎。若斟酌下盡，氣力弱人困不

小臺秘要

二十三卷

七

經心錄



外臺秘要 卷三十三 婦人經閉 經閉 經閉  
堪更服亦可二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿  
一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能忍服盡  
大好一日後仍著導藥翼方無桔梗甘草並出第二卷中  
千金翼坐導藥方

皂莢

一兩炙去皮子

大黃

戎鹽

礬石燒

當歸

各二兩

五味子

乾薑

各三兩

細辛三兩

蜀椒

汗二兩

葶藶子

苦瓠

各三分千金作山茱萸

右十一味搗篩內輕絹袋子如中指許大長三寸盛之  
令滿內子門中坐任意勿行走急小便時即出之仍易  
新者一日當下青黃冷汁汁盡止即可幸御自有子若

未見病出亦可至十日安之千金無葶藶一方又有砒  
霜三分廣濟同著藥後一日乃服紫石門冬丸其方如

左

紫石英

七日研之

天門冬

各三兩去心

紫葳

甘草炙

桂心

牡荊子

千金作牡蒙

烏頭炮

乾地黃

辛夷人

石斛

卷柏

禹餘糧

當歸

芎藭

各三兩

烏賊魚骨

牛膝

薯蕷

各六分

桑寄生

人參

牡丹皮

乾薑

厚朴炙

續斷

食茱萸

細辛

各五分

柏子人

一兩

署



並

右二十六味，搗篩，蜜和，酒服十九，如梧桐子，日三，稍加。全三十九，慎如藥法。經心錄同，并出第五卷中。延年療婦人子藏偏僻，冷結無子，坐藥方。

蛇牀子 三兩 芫花 三兩

右二味，搗篩，取棗大紗袋盛，內產門中，令沒，指袋少長，便時須去，任意臥著，慎風冷。出第四卷中。

久無子方五首

廣濟療久無子白薇丸方

白薇

牡蒙

藁本

當歸

乾地黄

各七

芎藭

人參

柏子人

石斛

桂心

附子

五味子

防風

吳茱萸

甘草

牛膝

桑寄生

各六

薑黃

七分

禹餘糧

八分

秦椒

二分

右二十味，搗篩，蜜丸，如梧桐子，空腹酒下二十九，加至

三十九，日再服，不利，忌生葱、生菜、熱麩、蕎麥、猪肉、葵菜、

蕪荑、菘菜、海藻、粘食、陳臭物等。

又療久無子，斷緒，少腹冷疼，氣不調，地黄湯方。

乾地黄

牛膝

當歸

芎藭

卷柏

防風

桂心

牽牛子末

右八味，切，以水六升，煮取二升，三合，去滓，分三服，服別



閉

和一分牽牛子未服如人行四五里更進一服以快利  
止忌熱麪蕎麥炙肉生葱蕪荳蒜粘食等物出第三卷中  
千金療月水不利關塞絕產十八年服此藥二十八日有  
子金城太守白薇丸方

白薇

細辛各五分

人參

杜蘅

厚朴炙

牡蒙

半夏洗

白殭蚕

秦艽

當歸

紫苑各三分

牛膝

沙參

乾薑各三分

蜀椒汗

附子炮

防風各六分

古今錄驗不用杜蘅用牡蠣三分熬

右十七味末之蜜和丸先食服如梧桐子三丸不知稍

長

二三

增至四五丸此藥不可將服覺有身則止用大驗忌錫  
猪羊肉冷水生葱生菜崔氏延年同有桔梗丹參各三

分出第二卷中

千金翼白薇丸主久無子或斷緒上熱下冷百病皆療之

方

白薇

車前子各三分

當歸

芎藭

蛇牀子

各四分

紫石英

菴藺子

石膏

藜本

卷柏各五分

澤蘭

太一禹餘糧

覆盆子

桃人熬

白芷

麥門冬去心

人參各六分

桂心

蒲黃各十分

細辛



乾薑

乾地黄

椒汗各十分

茯苓

赤石脂

遠志去心

白龍骨各八分

橘皮二分

右二十八味，搗篩為末，蜜和酒服十五丸，如梧桐子，日再增至四十九，以知為度，亦可至五十九，慎猪雞魚蒜生冷酢滑生葱生菜蕪荑驢馬等肉，覺有身則止，藥祕之，勿妄傳也。出第五卷中

經心錄茱萸丸，療婦人陰寒十年無子方。

吳茱萸

一升 蜀椒

一升去目汗末

右二味，蜜丸如彈子丸，綿裹導子腸中，日再易，無所下，但開子藏，令陰溫，即有子也。出第六卷中

養胎法并禁忌一十三首

千金論曰：舊說凡受胎三月，逐物變化，稟質未定，故妊娠三月，欲得觀犀象，猛獸，珠玉寶物，欲得見賢人君子盛德，大師，觀禮樂，鍾鼓俎豆，軍旅陳設，焚燒名香，口誦詩書，古今箴誡，居處簡靜，割不正不食，席不正不坐，彈琴瑟，調心神，和性情，節嗜慾，庶事清靜，生子皆良，長壽忠孝仁義聰慧無疾，斯蓋文王胎教者也。

又論曰：兒在胎，日月未滿，陰陽未備，府藏骨節皆未成足，故自初訖于將產，飲食居處皆有禁忌。

又妊娠食雞子及乾鯉魚，令子多瘡。

醫心方引養  
生要集  
鯉魚



黯

又妊娠食雞肉糯米令子多土白蟲

又妊娠食雀肉并豆醬令子滿面斑黯黑子

又妊娠食山羊肉令子多病

又妊娠食兔犬肉令子無音聲并缺脣

又妊娠食驢馬肉延月

又妊娠食樵并鴨子令子倒出心寒

又妊娠食騾肉難產

又妊娠食雀肉飲酒令子心淫情亂不畏羞耻

又妊娠勿向非常之地大小便必半產殺人

又妊娠勿食羊肝令子多厄

又妊娠勿食髓令兒短項

又妊娠食冰漿絕產並出第二卷中

妊娠隨月數服藥及將息法一十九首

千金妊娠一月名始胎飲食精熟酸美受御宜食大麥無

食腥辛是謂才正

又妊娠一月足厥陰脉養不可鍼灸其經足厥陰內屬於

肝肝主筋及血一月之時血行否澀不為力事寢必安靜

無令悉畏

又妊娠一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉重腰

痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服烏雌雞湯方

胎 灸



婦人經閉... 經閉... 經閉...

烏雌雞一隻治如食法 茯苓二兩 吳茱萸一升

芍藥 白朮各三兩 麥門冬五合 人參三兩

阿膠二兩 甘草一兩 生薑一兩

右十味切以水一斗二升煮雞取汁六升去雞下藥煮

取三升內酒三升并膠烱盡取三升去滓溫服一升日

三服

又若會傷一月胎者當預服補胎湯方

細辛一兩 防風二兩 烏梅一升 吳茱萸五合

乾地黄 白朮各一兩 大麥五合 生薑四兩

右八味切以水七升煮取二升半去滓分溫三服若寒

多者倍細辛茱萸若熱多渴者去細辛茱萸加栝樓根

二兩若有所思去大麥加柏子人三合忌生菜蕪荑桃

李雀肉等物一方人參一兩

又妊娠二月名始膏無食辛臊居必靜處男子勿近筋節

皆痛是謂胎始結

又妊娠二月足少陽脈養不可鍼灸其經足少陽內屬於

膽膽主精二月之時兒精成於胞裏當慎護驚動

又妊娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎卒中

風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所下乍寒

乍熱艾湯主之方

灸

必... 三十三卷... 經...



六

丹參 三兩

當歸

人參

麻黃 去節

艾葉

阿膠 灸各二兩

甘草 灸一兩

大棗 十二枚

生薑 一兩

右九味切以酒三升水一斗內藥煮減半去滓內膠煎

取三升分溫三服忌海藻菘菜

又若曾傷二月胎者當預服黃連湯方

黃連

人參 各一兩

吳茱萸 五合

生地黃 五兩

生薑 三兩

右五味切以醋漿七升煮取三升分四服日三夜一每十日一作若頗覺不安加烏梅一升加烏梅者不用

直用水耳忌猪肉冷水蕪荑一方當歸半兩

又妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐清虛是謂外象而內感者也

又妊娠三月手心主脉養不可鍼灸其經手心主內屬於

心無悲哀無思慮驚動

又妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不赤即黃

卒驚恐憂愁嗔恚喜頓仆動於經脉腹滿繞臍苦痛腰背

痛卒有所下雄雞湯方

雄雞 一隻治如食法 甘草 灸

人參

茯苓

小臺必更

三十三卷

古

經餘居

瞋

灸



阿膠 各二兩

黃芩

白朮 各一兩

麥門冬 去心五合

芍藥 四兩

大棗 十二枚

生薑 一兩

右十一味切以水一斗五升煮雞減半內藥煮取半內

清酒三升并膠再煎取三升分三服一日盡之當溫臥

忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等 一方當歸芍藥二兩不用黃芩生薑

又若曾傷三月胎者當預服茯神湯方

茯神

丹參

龍骨 各一兩

阿膠

當歸

甘草 炙

人參 各二兩

赤小豆 一升

大棗 十二枚

右九味切酢漿一斗煮取三升分四服七日後服一劑

腰痛者加桑寄生二兩忌海藻菘菜 深師有薤白二兩麻子一升

又妊娠四月始受水精以成血脉宜食稻粳羹魚鴈是謂

成血氣以通耳目而行經絡

又妊娠四月手少陽脉養不可鍼灸其經手少陽內輸三

焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食

又妊娠四月為離經有寒心下溫溫欲嘔胃膈滿不欲食

有熱小便難數數如淋狀臍下苦急卒風寒頸項強痛寒

熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胃 **心煩**不得

安卒有所下菊花湯方

菊花 如雞子大一枚 麥門冬 去心一升 麻黃 三兩去節 阿膠 三兩

其其

灸



甘草 二兩 當歸 二兩 人參 一兩 生薑 五兩

半夏 二兩 大棗 十二枚

右十味以水八升煮減半內清酒三升并阿膠煎取三升分三服温臥當汗以粉粉之護風寒四五日忌羊肉海藻菘菜餒等

又若曾傷四月胎者當預服調中湯方

芍藥 四兩 甘草 炙 芎藭 續斷 各一兩

生李根白皮柴胡 白朮 各三兩 烏梅 一升

當歸 一兩 生薑 四兩 厚朴 炙 枳實 炙各二兩

右十二味切以水一斗煮取三升分四服日三夜一八

日復服一劑一方半夏二兩忌海藻菘菜桃李雀肉等物

必

肌灸

又娠五月始受火精以成其氣臥必晏起沐浴浣衣深其居處厚其衣裳朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和以茱萸調以五味是謂養氣以定五藏

又娠五月足太陰脉養不可鍼灸其經足太陰肉輪於脾五月之時兒四肢成無大飢無甚飽無食乾燥無自灸熱無大勞倦

又娠五月毛髮初生有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛



頓欲仆卒有所下阿膠湯方

又方旋覆花湯

阿膠 四兩

人參 一兩

麥門冬 一升

去心 生薑 六兩

吳茱萸 七合

旋覆花

當歸

芍藥

甘草 炙

黃芩 各一兩

右十味切以清酒三升以水九升煮減半內清酒三升

并膠微火煎取三升半分四服日三服夜一先食再服

便愈不差更服忌海藻菘菜

又若曾傷五月胎者當預服安中湯方

甘草 炙

芍藥 各三兩

當歸

人參

乾地黄

芍藥 各二兩

五味子 五合

麥門冬 去心一升

大麻人 五合

生薑 六兩

大棗 三十五枚

黃芩 一兩

右十二味切以水七升清酒五升煮取三升半分四服

日三夜一七日復服一劑忌菘菜海藻蕪荑

又妊娠六月始受金精以成筋身欲微勞無得靜處出遊

於野數觀走犬馬食宜鷲鳥猛獸之肉是謂變腠理紐筋

以養其力以堅背脊

又妊娠六月足陽明脈養不可鍼灸其經足陽明內屬於

胃上其口目六月之時兒口目皆成調五味食甘美無大

飽

又妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體腫

灸 紐



驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼麥冬湯方

麥門冬去心 甘草炙

人參各一兩

乾地黄三兩

黃芩二兩 阿膠四兩

生薑六兩

大棗十五枚

右八味切以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取三升分三服每服如人行三四里中即進糜粥忌海藻菘菜蕪荑

又若曾傷六月胎當預服柴胡湯方

柴胡四兩

芍藥一方作紫葳

白朮

甘草炙各二兩

麥門冬三兩去心

茯苓一兩

芎藭二兩

乾地黄五兩

生薑六兩

大棗三十枚

右十味切以水一斗煮取三升分四服日三夜一中間進糜粥勿食生冷及堅強之物七日更服一劑忌海藻

菘菜蕪荑桃李雀肉等一方用黃芩二兩

又妊娠七月始受木精以成骨勞身搖肢無使定止動作屈伸以運血氣自此後居處必燥飲食避寒常食粳稻以密腠理是謂養骨而堅齒

又妊娠七月手太陰脉養不可鍼灸其經手太陰內屬於肺肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲

又妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脉若



傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項腰背強葱白湯方

葱白

長三四寸十四枚

半夏洗

麥門冬

去心各一升

生薑八兩

甘草

炙

當歸

黃耆

各三兩

阿膠

四兩

人參

一兩半

黃芩

一兩

旋復花

一把

右十一味切以水八升煮減半內清酒三升并膠煎取

四升溫服一升日三夜一溫臥當汗出若不出者加麻

黃二兩者煮服如前法若秋後勿強責汗忌羊肉傷海藻

菘菜等

又若曾傷七月胎者當預服杏人湯方

杏人

去双人皮尖碎

甘草

炙

鍾乳

研各二兩

麥門冬

去心

雙

升

紫菀

一兩

吳茱萸

各一兩

乾薑

二兩

五味子

粳米

各五合

右九味切以水八升煮取三升半分四服日三夜一中

間進食七日服一劑忌海藻菘菜

又妊娠八月始受上精以成膚革和心靜息無使氣極是

謂密濇理光澤顏色

又妊娠八月手陽明脈養不可鍼灸其經手陽明內屬於

大腸大腸主九竅八月之時見九竅皆成無食燥物無輒

失食無恐大起

又妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動

灸



不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或黃或使寒慄腰背苦冷痛而目視茫茫芍藥湯方

芍藥 四兩

人參

當歸

甘草 炙各三兩

白朮 一兩

厚朴 二兩 炙

薤白 切一升

生薑 四兩 切

右八味切以水五升酒四升合煮取三升分三服日再夜一忌海藻菘菜桃李雀肉等

又若曾傷八月胎者當預服葵子湯方

甘草 炙三兩

芍藥 二兩 一方四兩

葵子 二升

白朮 三兩

生薑 六兩

大棗 二十枚 擘

厚朴 二兩

右八味切以水九升煮取三升分三服日三十日服一

刺忌海藻菘菜桃李雀肉等

全多作致

醴

灸

温

又妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮多才力

又妊娠九月足少陰脉養不可鍼灸其經足少陰內屬於

腎腎主續縷九月之時兒脉續縷皆成無處濕冷無著灸

衣

又妊娠九月若卒下痢腹滿懸急胎上衝腰背痛不可轉

側短氣半夏湯方

半夏 洗

麥門冬 去心各五合

乾薑 一兩

當歸

吳茱萸

阿膠 炙各三兩

大棗 十二枚 擘



右七味切以水九升煮取三升去滓內白蜜八合微火上温分四服痢即止忌生血物錫等

又若曾傷九月胎者當預服猪腎湯方

猪腎 一具

茯苓

桑寄生

乾薑

乾地黄

芎藭 各三兩

白朮 四兩

麥門冬 一升 去心

附子 中者一枚炮

大豆 三合

右十味切以水一斗煮腎令熟去腎內諸藥煎取三升半分四服日三夜一十日更一劑忌猪肉冷水蕪荑桃李雀肉酢物等

又妊娠十月五藏俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使

關節人神皆備但俟時而生集驗延年同並出第二卷中

小品療妊娠五月日舉動驚愕動胎不安下在小腹痛引

腰脛公洛切小便疼下血安胎當歸湯方

當歸

阿膠 炙

芎藭

人參 各一兩

大棗 十二枚 擘

艾 一虎口

右六味切以酒水各三升合煮取三升去滓內膠令烊分三服腹中當小便緩差也古今錄驗救急同出第七卷中

妊娠嘔吐及惡食方九首

集驗療婦人妊娠惡阻嘔吐不下食湯方

青竹筍

橘皮 各五兩

生薑

茯苓 各四兩



半夏五兩湯洗

右五味切以水六升煮取二升半分三服不差頻作忌

羊肉錫酢物等千金經心錄同

又療妊娠嘔吐不下食橘皮湯方

橘皮

竹筴

人參

白朮

生薑四兩

厚朴炙二兩

各三兩

右六味切以水七升煮取二升半分三服不差重作忌

桃李雀內等千金故急經心錄同出第十一卷中

古今錄驗療妊娠不欲食或吐春月所宜服柴胡湯方

甘草炙

柴胡各三兩

麻黃一兩去節前未

大棗

十二枚擘

食茱萸一升

右五味切以水六升煮取三升適寒溫服一升日三療

食噫醋除熱下氣多所宜與上同但春秋冬夏去茱萸

加枸杞一斤六月加小麥一升石膏三兩秋去石膏加

甘草一兩九月去麻黃加乾薑一兩十月加芎藭三分

忌海藻菘菜

又療惡食人參湯方

人參四兩

厚朴炙

生薑

枳實

甘草炙各二兩

右五味切以水六升煮取三升分三服忌海藻菘菜竝



崔氏半夏茯苓湯療妊娠阻病心中憤悶空煩吐逆惡聞食氣頭眩重四肢百節疼煩沉重多臥少起惡寒汗出疲極黃瘦方

半夏洗

生薑各五兩

旋復花一兩

橘皮二兩

茯苓二兩

細辛

芎藭

人參

桔梗

甘草炙各二兩

芍藥二兩

乾地黄三兩

右十二味切以水一斗煮取三升分三服忌猪羊肉鴿菘菜海藻生菜蕪荑

千金云若病阻積月日不得治及服藥冷熱失候病變客

閱

段意方引  
品方垂重  
非委與千  
全作垂弱

熱煩渴口生瘡者除橘皮細辛用前胡知母各二兩若變冷下痢者除乾地黄用桂心二兩若食少胃中虛生熱大便澀塞小便赤少者加大黃三兩除地黄加黃芩一兩餘依方服一劑得下後消息看氣力冷熱更增損方調定更服一劑湯便急服茯苓丸令能食便強健也

又茯苓丸療妊娠阻病患心中煩悶頭眩重憎聞飲食氣便嘔逆吐悶顛倒四肢垂重不自勝持服之即効要先服半夏茯苓湯兩劑後可將服茯苓丸方

茯苓

人參各一兩

桂心熬

橘皮

白朮

甘草炙

葛根熬

乾薑



後

半夏 洗

枳實 炙各二兩

右十味搗篩蜜和丸如梧桐子大飲服二十九漸至三

十九日三忌海藻菘菜羊肉錫桃李雀肉酢等千金同

附後只五味又云娠忌桂故熬

又療娠常苦煩悶此子煩也竹瀝湯方

竹瀝 三兩

防風

黃芩

麥門冬

去心各三兩

茯苓 四兩

右五味切以水四升合竹瀝煮取二升半分三服不差

重作忌酢物

又方

時時服竹瀝隨多少出第十卷中

近効療娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐方

青竹筍

麥門冬

去心各三兩 前胡 二兩

陳橘皮

一兩炙令黃焦香氣出佳

蘆根

一握取肥白嫩者

右五味切以水二大升煮取半大升去滓分再服食後

一服無麥門冬用小麥三合煮之勿令裂即熟四肢煩

蒸者加地骨皮醫人夏侯極錄

娠胎動方九首

廣濟主安胎胎病漏肚痛方

當歸

芩藟

阿膠 炙

人參 各一兩

大棗

十二枚擘

外臺秘要

三十三卷

二四

經餘居

極熱



秫 秫

右五味切以水三升酒四升合煮取二升半分三服五日一劑頻服三四劑無所忌出第三卷中

當歸 乾地黃 黃連

芍藥各一兩 雞子一枚 秫米一升

右七味切以水七升攪雞子令相得煮秫米令如蟹目沸去滓內諸藥煮取三升分四服忌蕪荑經心錄同

又膠艾湯療損動母去血腹痛方

阿膠二兩 艾葉二兩

右二味以水五升煮取二升半分三服出第七卷中經心錄同

一斤 晉

集驗療娠胎動不安腹痛葱白湯方

葱白切一升 阿膠炙 當歸 續斷

芎藭各三兩 銀隨多少

右六味切以水一斗先煮銀取七升去銀內餘藥煎取二升半內膠令烱分三服不差更作千金同

又療娠二三月上至八九月胎動不安腹痛已有所見方

艾葉 阿膠炙 芎藭 當歸各三兩

甘草一兩

右五味切以水八升煮取三升去滓內膠令烱分三服



千金文仲備急同  
三  
系會

日三

又療妊娠六七月胎不安常處旋復花湯方

旋復花一兩 厚朴炙 白朮 枳實炙

黃芩 茯苓各三兩 半夏洗十遍 芍藥

生薑各二兩

右九味切以水一斗煮取二升半先食分五服日三夜

忌羊肉錫醋桃李雀肉等千金同出第十一卷中

刪繁療女人懷妊胎動不安葱豉安胎湯方

香豉二升 葱白切一升 阿膠二兩

右二味切以水三升煮二物取一升去滓下阿膠更煎

膠烊服一日一夕可服三四劑出第七卷中經心錄同

文仲徐王効神驗胎動方

當歸六分 芎藭四分

右二味切以水四升酒三升半煮取三升分三服若胎

死即出比用神驗血上心腹滿者如湯沃雪救急經心錄同崔氏

用水醋二升煎二十沸服

又安胎寄生湯療流下方

桑上寄生五分 白朮五分 茯苓四分 甘草十分

右四味切以水五升煮取二升半分三服若人壯者可

加芍藥八分足水二升若胎不安腹痛端然有所見加

外臺秘要 三十三卷 六 經餘居

後世名方  
婦湯



乾薑四分即安忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等崔氏小品經心

同出第七卷中  
動胎腰腹痛方三首

廣濟療婦人妊娠動胎腰腹痛及血下方

當歸 三兩

葱白 切一升

芎藭 三兩

艾葉 二兩

鹿角膠 二兩

芎根 三兩

右六味切以銀汁一斗煮取三升絞取滓內膠上火膠烱分三服服別相去如人行六七里未好差停一日更進一劑無所忌出第三卷中

小品芎根湯療勞損動胎腹痛下血胎動向下方

芎根

乾地黄 各二兩

當歸

芍藥

阿膠 各

甘草 各

一兩

右六味切以水六升煮取二升去滓內膠烱分三服忌海藻菘菜蕪荑出第七卷中

救急療姙娠動胎去血腰腹痛方

芎藭

阿膠 灸

當歸

青竹筍 各三兩

右四味切以水一斗半煮銀二斤取六升去銀內藥煎取二升半分三服日再夜一不差更作一劑集驗千金文仲古今錄驗備急經心錄同出第四卷中

頓仆胎動方四方



集驗療妊娠二三月上至七八月頓仆失踞胎動不安傷損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心短氣膠艾湯方

當歸

芎藭

耳草

阿膠

芍藥

各二兩

艾葉

三兩

乾地黄

四兩

右七味切以水五升好酒三升合煮取三升去滓內膠

更上火令膠烊分三服日三不差更作忌海藻菘菜蕪

蕪文仲同出第十一卷中

文仲葛氏若由頓仆及舉重致胎動去血者方

擣黃連下篩酒服方寸匕日二愈血乃止忌猪肉冷水

等物

肉

又方

赤小豆二升熬令香著雞子十四枚破內小豆中更

熬令黃黑末和酒服一匕日三服

又方

膠

當歸

耳草

第七卷中

右三味切以水五升煮取二升分再服忌菘菜海藻

胎數傷及不長方三首

廣濟療婦人懷妊數傷胎方

鯉魚

粳米



右二味如法作臛少著鹽勿著葱豉醋食之甚良一月  
中頓三過作効安穩無忌集驗文仲備急崔氏延年同  
出第三卷中  
集驗療婦人懷胎不長方

鯉魚長一尺者水漬沒內鹽如棗煮令熟取汁稍稍  
飲之當胎所腹上當汗如鼻狀雖有所見胎雖不安  
者十餘日輒一作此令胎長大甚平安出第十一卷  
中

古今錄驗療妊娠養胎白朮散方

白朮

芎藭

各四分

蜀椒

三分

牡蠣

二分

右四味擣下篩酒服滿一錢匕日三夜一但苦痛加芍  
藥心下毒痛倍加芎藭吐唾不能食飲加細辛一兩半

夏大錢二十枚服之復更以醋漿水服之若嘔亦以醋  
漿水服之復不解者小麥汁服之已後其人若渴大麥  
粥服之病雖愈盡服之勿置忌桃李雀肉等裴伏張仲  
景方出第

十一  
卷中

妊娠傷寒方四首

廣濟療妊娠傷寒頭痛壯熱支節煩疼方

前胡

知母

各三兩

石膏

五兩

大青

黃芩

梔子

各一兩

葱白

切一升

右七味切以水七升煮取二升三合絞去滓分三服服  
別相去如人行七八里再服不利忌熱麪羊肉集驗文  
仲備急



外臺秘製

救急同出  
第三卷中

千金療姪娠傷寒方

葱白 十莖

生薑 二兩  
切

右二味以水三升煮取二升半頓服取汗

又方

鯽魚一頭燒作灰擣末酒服方寸七取汗

並出第二卷中

救急療婦人姪娠十月若傷寒壯熱赤斑變為黑斑湯血

方

升麻

梔子 各四兩

大青

杏仁 去皮

黃芩 各三分

葱白 切

右六味切以水六升煮取半分三服出第四卷中

姪娠患瘧方二首

集驗療姪娠患瘧湯方

常山 二兩

甘草 一兩  
炙

黃芩 三兩

烏梅 十四枚  
擘

石膏 八兩

右五味切以水一升半合漬藥一宿煮三四沸去滓初

服六合次服四合後服二合凡三服忌海藻菘菜生葱

千金救急古今錄驗同

千金姪娠患瘧方

常山

竹葉 各三兩

石膏 八兩  
碎

糯米 一百粒

小經必錄

三十三卷

三

經餘居



右四味切以水六升煮取二升半去滓分三服第一服未發前一食久服之第二服取臨欲發餘一服用塗頭額及胷前五心藥滓置頭邊當一日勿進水及進飲食過發後乃進飲粥忌生葱菜集驗文仲備急同出第二卷中

姪娠下痢方四首

千金療姪娠下痢方

白楊皮一斤以水一大升煮取二小升分三服

又姪娠及產已寒熱下痢方

黃連一升 梔子二十枚 黃蘗一斤

右三味切以水五升漬一宿煮三沸服一升一日一夜

又令盡嘔者加橘皮一把生薑二兩與同出第二卷中

文仲療姪娠下痢不止方

黃蘗 乾薑 赤石脂各二兩 石榴皮一斤

右四味切以水八升煮取二升分三服出第七卷中

古今錄驗療姪娠下痢方

酸石榴皮 黃芩 人參各三兩 檉皮四兩

粳米三合

右五味切以水七升煮取二升半分三服千金經心錄同出第二十一

四卷中

姪娠心痛方九首



千金療妊娠心痛方

青竹筍 一升

羊脂 八兩

白蜜 三兩

右三味合煎食前頓服如棗核大三枚日二服

又方

蜜一升和井底泥泥心下

又方

青竹皮一升酒二升煮三沸頓服之

又方

破雞子一枚和酒服之

又方

麻子三升水八升煮取五升分三服

又方

橘皮 三兩 豉 二兩

右二味搗為丸如梧桐子服二七丸

又方

燒牛屎焦末水服方寸匕日三 並出第二卷中

文仲葛氏療妊娠卒胎上迫心痛方

取琴弦急帶之立愈 出第七卷中

古今錄驗療妊娠卒得心痛欲死木湯方

白朮 六兩

黃芩 三兩

芍藥 四兩



右三味切以水六升煮取二升半分三服半日令盡微下水令易生忌桃李雀肉出第三十四卷中

妊娠腹痛方三首

千金療妊娠腹中痛方

生地黃三斤搗絞取汁酒一升合煎減半頓服

又方

燒車釭脂末內酒中服又服一升蜜良並出第二卷中

古今錄驗療妊娠腹痛或是冷痛或是胎動葱白當歸湯方

葱白一虎口 當歸二兩

頌

右二味切以水酒共五升煮取二升分再服亦將小便服相去一炊頃出第三十四卷中

妊娠漏胞方五首

小品療妊娠數月日猶經水時時來者名曰漏胞若因房室勞有所去名曰傷胎視說要知如此小豆散療數傷胎將用之方

赤小豆五升濕地種之令生牙乾之

右一物下篩懷身數月日經水尚來以溫酒服方十七日三得効便停千金救急經心錄同出第七卷中

集驗妊娠血下不止名曰漏胞血盡子死方



雞子十四枚取黃以好酒二升煮使如飴一服之

又方

生地黄汁一升酒四合合煮三四沸頓服之不止頓

服救急千金文仲備急古今錄驗經心錄同並出第

十一卷中

崔氏療妊娠漏胞方

乾地黄四兩

乾薑二兩

右二味擣篩酒服方寸七日再服集驗文仲經心錄同

又方

乾地黄擣末以三指撮酒服之不過三服甚良千金同並

第十卷中

水

妊娠下血及尿血方五首

千金療妊娠卒下血方

葵子一升

右一味以酒五升煮取二升分三服差

又方

生艾葉一升

右一味以酒五升煮取二升分三服冬用莖

又方

生地黄切一升

右一味以酒四升煮取二升分三服亦療落身後血



又方

燒秤錘令赤內酒中沸定取出飲之

又方

葵根莖燒作灰以酒服方寸七日出第二卷中

又仲療娠下血方

取黍膏燒末服一七日出第七卷中千金云黍莖

古今錄驗療娠下血豆醬散方

豆醬二升漉去汁熬令燥末酒服方寸七日五六服

出第三十卷中

娠娠小便不通利方五首

千金療娠小便不通方

燕青子七合擗為末水和方寸七服日三出第二卷中

千金翼療娠小便不利方

葵子一升 榆白皮一把

右二味以水五升煮五沸服一升日二服千金同

又方

葵子 茯苓各一兩

右二味為散水服方寸七日三小便利止千金同並出第五卷中

古今錄驗療娠卒不得小便方

杏人二十枚去皮尖蒸令變色

小臺必要

三十三卷

二五

經餘居



證類外臺  
脘下有下字

右一味搗服如大豆大七枚立得利  
又療姪娠不得小便方

滑石水和泥臍二寸並出第三十四卷中

姪娠子淋方五首

小品療姪娠患子淋宜下地膚大黃湯

地膚草

大黃各三兩

知母

黃芩

茯苓作

芍藥

枳實灸

升麻

通草

甘草各二兩

右十味切以水八升煮取三升分三服得下後淋不好  
差還飲地膚葵根汁忌海藻菘菜酢物

又方

猪苓五兩

右一味搗篩以白湯三合和方寸匕為一服漸至二七

日三夜二盡不差宜轉下之服甘遂散出第七卷中甘遂散在後大小

使不利中

千金療姪娠患子淋方

葵子一升以水三升煮取二升分再服經心錄同

又方

葵根一把水三升煮取二升分再服出第二卷中

經心錄療姪娠患子淋小便數出少或熱痛酸疼及足腫

煩



地膚飲方

地膚草三兩以水四升煮取二升半分三服日三夜

一劑文仲小品同  
出第六卷中

姪娠大小便不利方五首

小品療姪娠子淋大小便並不利氣急已服猪苓散不差宜服其遂散下之方

太山赤皮其遂 二兩

右一味搗篩以白蜜二合和服如大豆粒多覺心下煩得微下者日一服之下後還將猪苓散系得下日再服漸加可至半錢匕以微下為度中間將猪苓散黃蘗寄

生湯在療子淋方中

經心錄同出第七卷中于淋方中  
唯有猪苓散無黃蘗寄生湯

古今錄驗療姪娠得病六七日以上身熱入藏大小便不利安胎除熱葵子湯方

葵子 二升 滑石 四兩

右二味以水五升煮取一升盡服須臾當下便愈 出第二十

四卷中

姪娠子癰方二首

小品療姪娠忽悶眼不識人須臾醒醒復發亦仍不醒者名為痙病亦號子癰病亦號子冒葛根湯若有竹近可速辦者當先作瀝汁後辦湯也其竹遠不可即辦者當先辦



湯此二療會得其一種其竹瀝偏療諸瘧絕起死也非但  
偏療妊娠產婦絕死者有效小兒忽癩瘡金瘡療之亦驗  
作竹瀝法

取新伐青淡竹斷之除兩頭節留中央一節作片以  
塼竝側令竹兩頭虛布列其上燒中央兩頭汁出以  
器承之取服

又主瘧胃葛根湯療妊娠臨月因發風瘧忽悶憤不識人  
吐逆眩倒小醒復發名爲子癩病方

貝母

葛根

牡丹皮去心

木防已

防風

當歸

芎藭

佳肉切熬

茯苓

澤瀉

甘草炙各二兩

獨活

石膏碎

人參各三兩

右十四味切以水九升煮取三升分二服貝母令人易  
產若未臨月者升麻代之忌海藻菘菜酢並出第七卷

妊娠水氣方三首

集驗療婦人妊娠手脚皆水腫攣急方

赤豆五升

商陸根

一斤一方加澤漆一斤

右三味以水三斗煮取一斗常稍稍飲之盡更作千金

第十一卷中

千金療妊娠腹大胎間有水氣生魚湯方

千金作鯉魚湯

小經必更

三十三卷

經

經餘



外臺秘要 卷三十三 經餘

生鯉魚二斤 生薑五兩 白朮三兩 芍藥

當歸各三兩 茯苓四兩

右六味切以水一斗二升煮魚熟澄清取八升內藥取三升分三服忌桃李雀肉酢物等集驗同出第二卷中

崔氏療妊娠體腫有水氣心腹急滿湯方

茯苓 白朮各四兩 旋復花二兩 杏仁去皮尖

黃芩各三兩

右五味切以水七升煮取二升半分二服飲之忌桃李

雀肉酢物等千金救急古今錄驗集驗同出第十卷中

損娠方六首

服別溫 苓

廣濟療婦人因損娠下血不止方

當歸 白龍骨 乾地黄各八分 地榆

阿膠 芍藥 乾薑各六分 熟艾四分

牛角鯁十分炙令黃 蒲黃五分

右十味擣篩為散空腹以飲服方寸匕日二服漸加至

二匕差止不吐利忌生冷油膩猪魚蒜蕪荑出第三卷中

千金落娠胎墮下血不止方

丹參十二兩

右一味切以酒五升煮取三升分三服集驗文仲備急同出第二卷中

又方

外臺秘要 卷三十三 經餘



地黄汁和代赭末服方寸匕

又方

桑螵蝥屎燒酒服方寸匕出第四卷中

救急療損娠方

取朱砂末一錢匕生雞子三顆打取白和朱砂頓服

胎若死即出如未死即安出第五卷中

古今錄驗療婦人墮娠血不盡來去喜煩滿鹿角屑豉湯方

鹿角一兩 香豉一升

右二味以水三升煮令三沸漉去滓然後內鹿角屑攪

令調頓服須臾血下出第三十七卷中

數墮胎方四首

刪繁療婦人懷胎數落而不結實或寒冷熱百病之源黃耆散方

黃耆 吳茱萸 乾薑 人參

茸草炙 芎藭 白朮 當歸

乾地黄各二兩

右九味搗散清酒服一匕半日再服加至兩匕為劑忌

海藻菘菜蕪荑桃李雀肉等經心錄同出第七卷中

千金療雄娠數墮胎方



灸

又方

妊娠三月灸膝下一寸七壯

赤小豆末酒服方寸匕日二亦主妊娠數月月水尚來者並出第二卷中

經心錄紫石門冬凡主風冷在子宮有子常落或始為婦便患心痛乃成心疾月水都未曾來服之肥悅令人有子方

遠志去心

澤瀉

肉蓯蓉

桂心各二兩

紫石英

天門冬去心

五味子三兩

禹餘糧

蜀椒汗

烏頭燒

卷柏

烏賊骨

寄生

石南

當歸各二兩

杜仲

甘草炙

石斛

柏子人

辛夷

人參各二兩

雲母一兩燒

右二十二味末之以蜜丸酒服二十九如梧桐子稍加至三十四十九日三忌海藻菘菜猪肉冷水生葱鯉魚

千金同出第六卷中

妊娠得病欲去子方三首

小品療妊娠得病事須去胎方

通按麥芽神曲墮胎如神凡有孕者不可妄用

麥蘖一升末和煮二升服之即下神効

又方

七月七日法麴三升煮兩沸宿不食且頓服即下

並出第二



文仲療姙娠得病欲去胎方

取雞子一枚以三指撮鹽置雞子中服之立出此與阮河

南療產難同册後千金出第七卷中經心錄同

落胎去胎方四首

廣濟療落胎方

栝樓 四兩

桂心 五兩

牛膝 三兩

瞿麥 二兩

右四味切以水七升煎取二升三合去滓分三服服別如人行八九里進之無忌

又方

取牛膝六七莖綿纏槌頭令碎深內至子宮頭忌生葱猪牛肉並出第三卷中

小品療羸人欲去胎方

甘草 炙

乾薑

人參

芎藭

生薑

桂心

蟹爪

黃芩

各一兩

右八味切以水七升煮取二升分三服忌海藻菘菜生葱出第七卷中

千金欲去胎方

大麴五升清酒一升煮三沸去滓令盡分五服當勿食且再服其子如糜令母肥盛無疾苦千金不傳

瓜



產乳序論三首

矢枉

崔氏夫人生壽夭雖有定分中間枉橫豈能全免若調攝會理或可致長生若將護乖方乃胎乳傷促且中人之性識異弘遠言及產育情多鄙之都未知此道幽深博施處廣僕寒帷之暇頗敦經史逮乎藥術彌復關懷今歷選群方兼申短思苟非切要詎能載錄晚述職孤城空莊四絕尋醫訪道理闕多疑豈得坐而相守以俟其斃此書所記故緣於此蓋擬備諸私室未敢貽厥將來必有以為要亦所不隱也余因披閱巒公調氣方中見巒公北平陽道慶

守

脫戒

者其一妹二女竝皆產死有兒婦臨月情用憂慮入山尋余請覓滑胎方余報言少來多遊山林未經料理此事然當為思量或應可解慶停一宿余輒憶想畜生之類緣何不聞有產死者姪女偷生賤婢獨產亦未聞有產死者此當由無人逼佐得盡其分理耳其產死者多是富貴家聚居女婦輩當由兒始轉時覺痛便相告報傍人擾擾令其驚怖驚怖畜結生理不和和氣一亂痛切唯甚傍人見其痛甚便謂至時或有約髻者或有力腹者或有冷水澀面者努力強推兒便暴出畜聚之氣一時奔下不止便致運絕更非佗緣至且以此意語慶慶領受無所聞然猶苦見

且



析析

邀回家乃更與相隨停其家十餘日日晡時見報云兒婦腹痛似是產候余便教屏除牀案遍一房地布草三四處懸繩繫木作衡度高下令得躡當腋得憑當衡下敷慢氈恐兒落草候傷之如此布置訖令產者入位語之坐臥任意爲其說方法各有分理順之則全逆之則死安心氣勿怖強此產亦解人語語訖閉戶戶外安牀余共慶坐不令一人得入時時隔戶問之何似答言小痛可忍至一更令爛煮自死牝雞取汁作粳米粥粥熟急手攪使渾渾適寒溫勸令食三升許至五更將末便自產聞兒啼聲始聽人入產者自若安穩不異云小小痛來便放體長吐氣痛卽

答

答

止蓋任分氣之効也慶問何故須食雞肉汁粥答云牝雞性滑而濡庶使氣滑故耳問何不與肉答云氣將下恐肉不卒消爲妨問何故與粥答云若飢則氣上氣下則速產理不欲令氣上故耳慶以此爲產術之妙所傳之處無不安也故知巒公隱思妙符神理然則日遊反支之類復何豫哉但以婦人性弱臨產驚遽若不導以諸法多恐志氣不安所以簡諸家方法備題如左其間取捨各任量裁凡婦人產難必須先簡此書推所投月日知犯忌各須豫慎不得犯之其次應須帳幕皮醋藏衣等物之類並早經管入月卽須使足若不豫備臨急用逮事必致闕唯舊經

檢

有檢

周遮



事者始達此言豫備不虞古之善教也

又凡產者雖是穢惡然將痛之時及未產已產皆不得令

死喪污穢家人來視之必產難若已產者則傷子

又凡產法唯須熟悉不得逼迫要須兒痛欲出然後抱腰

傍人不得驚擾浪作形勢但此事密公法中已經商畧無

用師巫妄述已能橫相牽挽失其本性今故重述特宜防

也

崔氏年立成圖法一首

女人年十三

行年在庚申反支在正月七月禍害在南方  
黃衣師看產產婦宜著黃衣臥西南首  
懸尸在辰戌日閉肚在辛酉壯在申

女人年十四

行年在巳亥反支在八月二月禍害在西南  
赤衣師看產產婦著赤衣臥南首懸  
尸在卯酉日閉肚在壬申壯在癸

女人年十五

行年在戊午反支在三月九月禍害在西北  
黑衣師看產產婦宜著黑衣臥北首  
懸尸在寅申日閉肚在癸酉壯在壬

女人年十六

行年在丁巳反支在四月十月禍害在東北  
青衣師看產產婦宜著青衣臥東首  
懸尸在丑未日閉肚在申酉壯在辛

女人年十七

行年在丙辰反支在五月十一月禍害在東  
北方黃衣師看產產婦宜著黃衣臥東北  
首懸尸在子午日閉肚在乙酉壯在庚

女人年十八

行年在乙卯反支在六月十二月禍害在北  
北方黑衣師看產產婦宜著黑衣臥西北  
首懸尸在巳亥日閉肚在丙酉壯在丁



女人年十九 行年在甲寅反支在正月七月禍害在東南  
巽絕命在南方南生氣在西方兌宜喚西方

白衣師看產產婦宜著白衣臥西首  
懸尸在辰戌日閉肚在丁八壯在丙

女人年二十 行年在癸丑反支在二月八月禍害在西方  
兌絕命在西南坤生氣在東南巽宜喚東南

方青衣師看產產婦宜著青衣臥東南  
首懸尸在卯酉日閉肚在庚八壯在乙

女人年二十一 行年在壬子反支在三月九月禍害在南方  
方離絕命在東南巽生氣在西南坤宜喚

西南方黃衣師看產產婦宜著黃衣臥西  
南首懸尸在寅申日閉肚在辛八壯在甲

女人年二十二 行年在辛亥反支在四月十月禍害在西方  
南坤絕命在西方兌生氣在南方南宜喚

南方赤衣師看產產婦宜著赤衣臥南  
首懸尸在丑未日閉肚在壬八壯在癸

女人年二十三 行年在庚戌反支在五月十一月禍害在  
西北乾絕命在東北艮生氣在北方坎宜

喚北方黑衣師看產產婦宜著黑衣臥北  
首懸尸在子午日閉肚在癸八壯在壬

女人年二十四 行年在巳酉反支在六月十二月禍害在  
東方青衣師看產產婦宜著青衣臥東

首懸尸在巳亥日閉肚在甲八壯在辛

女人年二十五 行年在戊申反支在正月七月禍害在東  
東北黃衣師看產產婦宜著黃衣臥東北

首懸尸在辰戌日閉肚在乙八壯在庚

女人年二十六 行年在丁未反支在二月八月禍害在北  
方坎絕命在東方震生氣在西北乾宜喚

西北方白衣師看產產婦宜著白衣臥西  
北首懸尸在卯酉日閉肚在丙八壯在丁

女人年二十七 行年在丙午反支在三月九月禍害在東  
南巽絕命在南方南生氣在西方兌宜喚

西方白衣師看產產婦宜著白衣臥西  
首懸尸在寅申日閉肚在丁八壯在丙

女人年二十八 行年在乙巳反支在四月十月禍害在西  
方兌絕命在西南坤生氣在東南巽宜喚

東南青衣師看產產婦宜著青衣臥東南  
首懸尸在丑未日閉肚在庚八壯在乙



女人年二十九 行年在甲辰 反支在五月十一日 禍害在西南坤宜

喚西南黃衣師看產 產婦宜著黃衣臥西 南首懸尸在子午日 閉肚在辛酉 壯在甲

女人年三十 行年在癸卯 反支在六月十二日 禍害在西南坤宜 喚南

方赤衣師看產 產婦宜著赤衣臥南首 懸尸在巳亥日 閉肚在壬申 壯在癸

女人年三十一 行年在壬寅 反支在正月七日 禍害在西方坎宜 喚

北方黑衣師看產 產婦宜著黑衣臥北 首懸尸在辰戌日 閉肚在癸酉 壯在壬

女人年三十二 行年在辛丑 反支在二月八日 禍害在東方震宜 喚

東方青衣師看產 產婦宜著青衣臥東 首懸尸在卯酉日 閉肚在甲辰 壯在辛

女人年三十三 行年在庚子 反支在三月九日 禍害在東方震宜 喚

東北方黃衣師看產 產婦宜著黃衣臥東 北首懸尸在寅申日 閉肚在乙酉 壯在庚

女人年三十四 行年在乙亥 反支在四月十日 禍害在西方坎宜 喚

西北白衣師看產 產婦宜著白衣臥西 北首懸尸在丑未日 閉肚在丙申 壯在丁

女人年三十五 行年在戊戌 反支在五月十一日 禍害在西方兌宜

喚西方白衣師看產 產婦宜著白衣臥西 首懸尸在子午日 閉肚在丁酉 壯在丙

女人年三十六 行年在丁酉 反支在六月十二日 禍害在東南巽宜

喚東南方青衣師看產 產婦宜著青衣臥東 南首懸尸在巳亥日 閉肚在庚辰 壯在乙

女人年三十七 行年在丙申 反支在正月七日 禍害在西南坤宜 喚

西南方黃衣師看產 產婦宜著黃衣臥西 南首懸尸在辰戌日 閉肚在辛酉 壯在甲

女人年三十八 行年在乙未 反支在三月八日 禍害在西方兌宜 喚

南方赤衣師看產 產婦宜著赤衣臥南 首懸尸在卯酉日 閉肚在壬申 壯在癸

小臺必娶 三十三卷

經余



女人年三十九 行年在甲午反支在三月九月禍害在西  
 北方黑衣師看產產婦宜著黑衣服臥北  
 首懸尸在寅申日閉肚在癸八壯在壬  
 女人年四十 行年在癸巳反支在四月十月禍害在東北  
 良絕命在西北乾生氣在東方震宜喚東方  
 青衣師看產產婦宜著青衣臥東首  
 懸尸在丑未日閉肚在甲八壯在辛  
 女人年四十一 行年在壬辰反支在五月十一月禍害在  
 東北良絕命在西北乾生氣在東方震宜  
 喚東方青衣師看產產婦宜著青衣臥東  
 首懸尸在子午日閉肚在乙八壯在庚  
 女人年四十二 行年在辛卯反支在六月十二月禍害在  
 東北方震絕命在北方坎生氣在東北良宜  
 喚東北黃衣師看產產婦宜著黃衣服臥東  
 北首懸尸在巳亥日閉肚在丙八壯在丁  
 女人年四十三 行年在庚寅反支在正月七月禍害在北  
 西方坎絕命在東方震生氣在西北乾宜喚  
 西北方白衣師看產產婦宜著白衣臥西  
 北首懸尸在辰戌日閉肚在丁八壯在丙

女人年四十四 行年在巳丑反支在二月八月禍害在東  
 南方巽絕命在南方離生氣在西方兌宜喚  
 西方白衣師看產產婦宜著白衣臥西  
 首懸尸在卯酉日閉肚在庚八壯在乙  
 女人年四十五 行年在戊子反支在三月九月禍害在西  
 方兌絕命在西南坤生氣在東南巽宜喚  
 東南方青衣師看產產婦宜著青衣臥東  
 南首懸尸在寅申日閉肚在中八壯在甲  
 女人年四十六 行年在丁亥反支在四月十月禍害在南  
 方離絕命在東南巽生氣在西南坤宜喚  
 西南方黃衣師看產產婦宜著黃衣服臥西  
 南首懸尸在丑未日閉肚在壬八壯在癸  
 女人年四十七 行年在丙戌反支在五月十一月禍害在  
 西南坤絕命在西方兌生氣在南方離宜  
 喚南方赤衣師看產產婦宜著赤衣服臥南  
 首懸尸在子午日閉肚在癸八壯在壬  
 女人年四十八 行年在乙酉反支在六月十二月禍害在  
 東北良絕命在西北乾生氣在東方震宜  
 喚東方青衣師看產產婦宜著青衣臥東  
 首懸尸在巳亥日閉肚在甲八壯在辛



女人年四十九行年在甲申反支在正月七月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮宜喚

東北方黃衣師看產產婦宜著黃衣臥東北首懸尸在辰戌日閉肚在乙酉丑在庚

凡禍害絕命上產婦不可向之大小便又不得向產犯者凶產後血不止

凡生氣之上宜產婦向之坐令兒長壽母子俱吉

凡閉肚之上臨月及已產未滿月皆不得向其處大小便及棄不淨水犯者令人閉塞難產失顏色腹痛面痿黃令臍絞痛咽喉不利凶

但按八壯地作入肚振下文

凡八壯之地產婦廬帳門不得向之開又不得於其處產令閉塞難產大凶

宜從入肚為是

產吉

凡運鬼力士犯者令產婦運悶至欲產日宜解袋口即易

凡反支月不得使血露汚地或令子死腹中或產不順皆須先布灰草然後救馬驢牛皮於其上產吉

凡懸尸之日不可攀繩宜懸馬轡攀之吉

凡行年本命相俱坐攀轡吉

不聖行



并

十二月立成法一首 並圖

正月三月五月七月九月十一月 福德在丙壬

二月四月六月八月十月十二月 福德在甲庚

夫人臨產必須避諸凶神逐月空福德之地若神在外於



舍內產若在內於舍外產令於 福德及空地為產帳其

舍內福德處亦依帳法













四字雙行  
小書





庚申招雷公

庚酉天癸三軒轅大時  
辛戌咸池三特豐隆

亥雷公

壬藏衣吉云安產婦帳

子軒轅大時云狂虎

丑豐隆具時

七月空  
在丙壬

未招雷公  
丁午丙巳  
丙寅候  
未招雷公  
丁午丙巳

藏衣吉

辰身白虎

甲卯身虎云夫  
寅夫夫云天狗

巳豐隆具時

申招雷公  
庚藏衣吉  
酉招雷公  
辛戌咸池具時

八月空  
在甲庚

辰大夫  
乙卯狂虎  
甲安產婦帳  
寅



亥天狗天候  
壬子  
癸丑豐隆具時

巳豐隆具時



未丁午丙巳  
丙寅候  
未丁午丙巳  
丙寅候

庚申招雷公












月

大時招搖咸池。辰時雷公豐隆。軒轅月白虎大夫。狂虎天  
候。天狗運鬼力士等十三神。日別具注。如圖。產婦犯之大  
凶。宜依月空處坐吉。其兒衣亦依天德月空之處藏之。吉  
但臨產及未滿月。皆不得在懸尸。閉肚之上。小便亦不得  
棄浣衣不淨水。慎之。仍不得以雜物弊其上。

推日遊法一首



日遊圖



常以癸巳日入內宮一十六日至巳酉日出癸巳甲午乙

未丙申丁酉在紫微北宮

戊戌巳亥庚子辛丑壬寅在南宮

癸卯一日在天廟西宮

甲辰乙巳丙午丁未戊申在御女東宮

右日遊在內產婦宜在外別於月空處安帳產吉

巳酉庚戌辛亥壬子癸丑甲寅在外東北維

乙卯丙辰丁巳戊午巳未在外東方

庚申辛酉壬戌癸亥甲子乙丑在外東南維

丙寅丁卯戊辰巳巳庚午在外南方



辛未壬申癸酉甲戌乙亥丙子在外西南維

丁丑戊寅巳卯庚辰辛巳在外西方

壬午癸未甲申乙酉丙戌丁亥在外西北維

戊子巳丑庚寅辛卯壬辰在外北方

右日遊在外宜在內產吉凡日遊所在內外方不可向之產凶

體玄子為產婦借地法一首

東借十步 西借十步 南借十步

北借十步 上借十步 下借十步

辟方之中揔借四十餘步此中產婦安居無所妨礙無所

畏忌諸神擁護百鬼速去急急如律

右借法及所投月即寫一本貼著產婦所居正中北壁

上更不須避日遊及支及諸神等此類用有驗故錄耳

日曆法二首

甲子日 在內面向東北 乙丑日 在內面向西南西

丙寅日 在內面向西南 丁卯日 在內面向西南

戊辰日 在內面向西南 巳巳日 在內面向西北

庚午日 在內面向西北 辛未日 在內面向西北東

壬申日 在內面向東南 癸酉日 在內面向西北東

甲戌日 在內面向東南 乙亥日 在內面向東北



丙子日	在內面向西南 東北二角吉	丁丑日	在內面向西南西 北東南三角吉
戊寅日	在外面向西北 西南二角吉	巳卯日	在外面向東南西 北三角吉
庚辰日	在內面向東北 西北二角吉	辛巳日	在內面向西北西 南東北三角吉
壬午日	在內面向西南 東北二角吉	癸未日	在內面向東南 東北二角吉
甲申日	在內面向東南 西北二角吉	乙酉日	在內面向東南西 北三角吉
丙戌日	在內面向東北 西南二角吉	丁亥日	在內面向東北西 南東南三角吉
戊子日	在內面向西南 東北二角吉	巳丑日	在內面向東南西 北三角吉
庚寅日	在內面向東南 西北二角吉	辛卯日	在內面向東南 西北二角吉
壬辰日	在內面向西南 東北二角吉	癸巳日	在內面向西南東 北三角吉
甲午日	在內面向西南 東北二角吉	乙未日	在內面向東南西 北三角吉

丙申日	在外面向西北 東北二角吉	丁酉日	在外面向西北東 南三角吉
戊戌日	在外面向東北 西南二角吉	巳亥日	在外面向東北東 南三角吉
庚子日	在外面向東南 東北二角吉	辛丑日	在外面向東南西 北三角吉
壬寅日	在外面向東南 西南二角吉	癸卯日	在外面向東南西 北三角吉
甲辰日	在外面向西南 西北二角吉	乙巳日	在外面向西北西 南東北三角吉
丙午日	在外面向西南東 北三角吉	丁未日	在外面向西北東 南三角吉
戊申日	在外面向西北 東北二角吉	巳酉日	在外面向東南西 北三角吉
庚戌日	在外面向東北 東南二角吉	辛亥日	在內面向東南 西南二角吉
壬子日	在內面向東南東 北三角吉	癸丑日	在內面向東南 西南二角吉
甲寅日	在內面向東南 西北二角吉	乙卯日	在內面向東南西 北三角吉



丙辰日	在內面向西南西 北東北三角吉	丁巳日	在內面向西南西 北東北三角吉
戊午日	在外面向西南西 北東北三角吉	巳未日	在外面向西北東 南東北三角吉
庚申日	在內面向西北東 南東北三角吉	辛酉日	在內面向西北東 南東北三角吉
壬戌日	在內面向東南 西北二角吉	癸亥日	在內面向西南 東北二角吉

凡日曆十二辰並有神殺禁忌不可向產日別須簡看

凡甲乙日 生子勿著白衣宜著黑衣  
吉臥無西首勿庚辛日起

丙丁日 生子勿著黑衣宜著青衣

壬癸日 生子勿著黃衣宜著白衣  
臥無北首勿

戊巳日 生子勿著青衣宜著赤衣  
臥無東首勿甲乙日起

庚辛日 生子勿著赤衣宜著黃衣

壬癸日 生子勿著黃衣宜著白衣  
臥無四角首勿戊巳日起

安置產婦法二首

凡產時先以朱砂點產婦項後宛宛中又點鼻孔間柱兩傍宛宛中牛穿据處即向產處呪之曰此地空閑安居產婦某姓就此吉處諸神擁護百鬼速去莫相觸忤三呪之訖即燒火於產處四方以井華水四器亦置產處四方各橫刀於水上其刀浮磨拭之又法捉一刀子先向產處呪曰一尺刃子七寸刃拒以及支而治運如此三呪訖釘刀子著產處地上然後坐產已上並出第十上卷中

產難方二十四首

崔氏凡婦人產難死生之候母面赤舌青者兒死母活母

通按  
舌青寫  
作舌赤



青  
死血之  
狀于安  
得活

面赤舌赤口中沫出者母死兒活母唇口青口兩邊沫出者母子俱死文仲同出第十土卷中

廣濟療難產三日不出者方

取死鼠頭燒作屑并花水服千金崔氏救急同

又方

槐子十四枚蒲黃一合內酒中溫服須更不生更服之千金集驗崔氏同

又方

吞生雞子黃三枚并少苦酒崔氏集驗備急文仲同

又方

吞皂莢子二枚亦效千金崔氏小品同並出第三卷中

小品療產難歷日氣力乏盡不能得生此是宿有病方

赤小豆二升阿膠二兩

右二味以水九升煮豆令熟取汁內膠令烊一服五合不覺不過再即產崔氏千金同

又方

取馬銜一枚覺痛即令左手持之崔氏同

又方

取槐東引枝手把之崔氏同

又方



手捉鷓鴣頭甚驗崔氏同並出第七卷中

集驗若日月未至而欲產者方

未知母蜜和兔屎大服一丸痛不止更一丸千金崔氏小品同

又方

取夫衣帶五寸燒作灰酒服立下崔氏廣濟文仲同並出第七卷中

備急療難產方

取槐子吞三枚崔氏同

又方

取鑿柄入孔裏者燒末酒服之立下崔氏同

裏

又方

弓弦三寸箭籥二寸各燒末酒服之崔氏同

又方

取羚羊角屑燒末酒服之千金崔氏同

又若母已死兒子不出方

但以水銀如彈丸格口內喉中捧起令下食頃又捧令起子便落崔氏同

又方

擣蒲根絞取汁一二升灌口中此亦治母生子死驗崔氏同

頃



又療母子俱死者產難及胎不動轉者方

榆白皮

三兩

葵子

五合

甘草

炙

桂心

各一兩

右四味切以水四升煮取二升服一升須臾不產更服

一升忌海藻菘菜生葱崔氏小品同

又產難數日欲絕秘方

書奏作兩行字凡二十字文曰帝乙生子司命勿止

即出其胞及其子無病其母封其中央以朱印之令

產婦持之崔氏小品同

又產難六七日母困方

取好膠二兩清酒一升半微火烱膠內新雞卵一枚

脫  
翠  
共  
行  
脫  
頁

曰

鹽一寸七相和頓服即產不產更服

崔氏同

又產難母如死不知人事方

用陳葵子末三指撮酒服口噤者去齒下藥即愈立

驗崔氏同

又療婦人產難方

書紙曰坐為蒲卧為魚女屬母兒屬夫急急如律令

即產婦吞之又書兩道兩手各執一凡書三本崔氏同並

出第一卷中

救急療產難方

取廁前用草二七枚燒作屑服之千金崔氏同崔氏云日用籌

外臺秘要

三十三卷

六

經余居



又方

取牛屎中大豆書一片作入字一片作出字還合吞之良崔氏同並出第四卷中

千金療難產方

令夫唾婦口中二七過立下集驗崔氏同出第十卷中

逆產方一十二首

小品療逆產方

鹽塗兒足底又可急搔爪之并以鹽摩產婦腹上即愈崔氏千金集

又方

鹽和粉塗兒兩足下即順矣千金崔氏同

又方

又彈丸二枚擣末三指撮溫酒服集驗千金崔氏同並出第七卷中

集驗療逆產方

燒錢令赤內酒中飲之崔氏同

又方

夫陰毛二七枚燒以猪膏和丸如大豆吞兒手即持丸出神驗千金崔氏同

又方

朱書左足下作千字右足下作黑字崔氏同



又方

生不出手足先見燒蛇脫皮末服刀圭亦云三指撮  
面向東酒服即順崔氏千金同

又方

真丹刀圭塗兒腋下崔氏同

又方

以手中指取釜底黑煤交豐兒足下順出千金文仲  
崔氏備急  
同並出第十一卷中

刪繁療逆產難產數日不出者方

取挑人中破一片作可字一片作出字還合吞之

崔氏同

又療逆產方

取車肚中膏畫腋下及掌心崔氏文仲備急小品千  
金集驗同

又療逆產胞衣不出方

取龜屋上黑壁酒服之千金崔氏同並出第七卷中

橫產方四首

小品療橫產及側以手足先出方

可持麤鍼刺兒手足入二分許兒得痛驚轉即縮自  
當迴順文仲備急千金崔氏集驗同

集驗療橫生方



取梁上塵三指撮酒服之千金文仲崔氏同出第十  
文仲療縱橫不可出

用菟絲子末酒若米汁服方寸七即出車前子亦好  
服如上法千金崔氏同

又方

服水銀如大豆一枚備急崔氏同

右以前橫產逆產二條條流雖別療法蓋同可以意量  
逐善參用也

子死腹中欲令出方一十五首

集驗療子死腹中方

真珠二兩酒服盡立出崔氏同

又方

取竈下黃土三指撮酒服之立出當著兒頭上千金  
崔氏

又療胎死在腹方

取三家雞卵各一枚三家鹽金一撮三家水各一升  
合煮令產婦面東向食之立出千金備急崔氏同

又方

取麩麥一斤以水八升煮取二升分再服不出更服  
文仲千金崔氏同

千金卷三  
金作各

瞿



又方

葵子一升阿膠五兩水五升煮取二升頓服出間日

又服崔氏千金文仲備急同並出第十一卷中

崔氏療子胎在腹中恐虎不下方

當歸

芍藥各二兩

右二味以好醪醋二升煮藥二十沸頓服之若胎已死

即下如胎未死即便安穩也

又療子死腹中又姪兩兒一兒活一兒死令腹中死者出

生者安此方神驗萬不失一

蟹瓜一升

甘草二尺炙切

阿膠三兩炙

右三味以東流水一斗先煮二味取三升去滓內膠令

烱頓服不能頓服分再服若人困按口下藥入即汗煎

藥宜東向竈以茅葦薪煮之集驗廣濟千金備急文仲

又療姪身熱病子死腹中又出之方

易頭一枚

右一味細擣水三升煮取大二升稍稍摩臍下至陰下

胎當立出

又方

以苦酒濃煮大豆一服一升死兒立下不能頓服再

服之亦得千金同

外臺秘要

欲

瓜



外臺秘要 三十三卷 六九

又療子胎在腹內已死方

甘草炙一尺 蒲黃合一 筒桂四寸 香豉二升

雞子一枚

右五味切以水六升煮取一升頓服胎胞穢惡盡去大良千金集驗同並出第十卷中

文仲療或半生胎不下或子死腹中或半著脊及在草不產血氣上溢心母面無顏色氣欲絕方

猪膏煎一升 白蜜升一 淳酒二升

右三味合煎取二升分再服不能隨所能服之備急刪繁千金 崔氏同

湯

又子死腹中不出方

以牛屎塗母腹上立出備急崔氏千金同

又方

榆皮兩切一 熟朱兩一

右二味以苦酒三升煮取一升頓服死兒立出集驗千金備急 崔氏同並出第二卷中

救急療子死腹中方

服水銀三兩立出集驗千金備急文仲小品同

又方

取夫尿二升煮令沸飲之集驗千金崔氏同並出第四卷中

外臺秘要

三十三卷

六九

升



胞衣不出方二十首

廣濟療胞衣不出方

末竈突中土三指撮以水服之集驗千金備急文仲同

又方

取夫單衣蓋井上立出千金集驗救急崔氏小品同

又療胞衣不出方

取苦酒服赤米一兩千金集驗崔氏同

又方

雞子一枚苦酒一合和飲之即出集驗千金崔氏同

又方

朱

當戶燒黍穰即出 崔氏同並出第二卷中

小品療胞衣不出方

取皂莢燻末著臍孫中噫即出崔氏同

又方

鹿角末三指撮酒服之崔氏同

又方

兒衣不出吞此符吉麗

延年療婦人傷娠及胎死腹中胞衣不出產後疾病及諸

困竭欲死方

刺取羊血及熱飲之不能者人含吐與之能多益善



若不能咽、噉少鹽、又水濕其面、此方神驗。崔氏文仲備急同。

又胞衣不出方

以洗兒水服半杯即出。崔氏同。

又療胞衣不出、腹中滿、則殺人方

但多服猪膏、又大豆一升、苦酒一斗、煮取三升、分三服。崔氏同。

又方

吞雞子黃兩三枚、解髮刺喉中、令得嘔、即出。若因極死者、以水一升、煮栝樓一枚、三兩、沸寫口中、汁下即出。出第十四卷中。崔氏云水一升、煮蠅蛄一枚、三沸服。

膜

救急療胞衣不出、并兒橫到死、腹中母氣欲絕方

半夏二兩 洗 白斂二兩

右二味、擣篩、服方寸匕、小難一服、橫生二服、到生三服、兒死四服、亦可加代赭、瞿麥各二兩。廣濟集驗小品備急文仲崔氏同。

又方

小豆小麥相和、濃煮汁飲之、立出。小品千金備急崔氏同。

又療胞衣不出方

取炊單、當戶前燒之。廣濟集驗千金崔氏同。出第四卷中。

必効療胞衣不出、令胞爛、牛膝湯方

牛膝四兩 滑石八兩 當歸三兩 通草六兩

通按 炊單 一作炊 一作炊 草

千金



葵子一升

嬰麥四兩

右六味切以水九升煮取三升分三服忌牛狗肉廣濟集驗

千金崔氏同通草一方作莽草

又方

服蒲黃如棗大良集驗千金崔氏同

又方

生男吞小豆七枚生女吞二七枚千金崔氏並同

又方

生地黄汁一升苦酒三合煖服之不能頓服再服之集驗千金崔氏同

又方

澤蘭葉三兩

滑石五兩

生麻油二合

右三味以水一升半煮澤蘭取七合去滓內滑石生麻油頓服之廣濟集驗千金崔氏同並出第四卷中

魘

出

關鬼

已上三符主產難產婦吞之吉

魘

產難燒此符水和服之吉

厲

逆產橫產吞此符

右題以白充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔較勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三十三卷終

校 魘 魘



