信眞

浦論
悪熱
麻水
恒仲
邪崇
対証
大便閉
體氣

虚労失血
悪寒汗証
顚狂癇証
驚悸虚煩
厥証濁証
関格遺精
大便閉
疝痛懸癰
肝証
諸虫

特別
ヤ9
613
4

奎 刑 增 補 萬 病 回 春 卷 之 四

太醫院院使 金谿雲林龔廷賢子才 編輯
門人 醫官同邑 胡廷訓
慈谿羅國望
弟 醫官 廷器 校正
書林 後學 余一貫 增補

書林 兼善堂 余泗泉 刊行

補元血

平 脈弦大芤損而虛大而無力陽衰易汗數而無力陰火熾盛尺弱上損浮大裏枯尺寸俱微五勞之軀血氣左濡氣虛右推左右微小氣血無餘勞瘵脈數或潛細如潮汗咳血肉

脫者殆、

內經曰、久視傷血、久臥傷氣、久坐傷肉、久立傷骨、久行傷筋、若夫七情五心之火飛越、男女声色之慾過差、是皆虛損之所由也、機要曰、虛損之疾、寒熱因虛而感也、感寒則損陽、陽虛則陰盛、凡損自上而下、一損損於肺、皮聚而毛落、二損損於心、血凝而少、不能榮於臟腑、婦人則月水不通、三損損於胃、飲食不爲肌膚、治宜以辛甘溫、過於胃則不可治矣、感熱則損於陰、陰虛則陽盛、若損自下而上、一損損於腎、骨痿不能起於床、二損損於肝、筋緩不能自收持、三損〻於脾、飲食不能消、脾則不可治矣、又曰、心肺損而一色黑、腎肝損而形瘁、難經曰、治損之法、損其肺者、益其氣、損其心者、補其榮、血損其脾者、調其飲食、適其寒溫、損其汗者、緩其中、損其腎者、益其精、皆是虛損病因治法之大要也、

○四君子湯　治脾胃虛弱、飲食少思、或久患瘡瘍、若胸膈虛痞、痰嗽呑酸、或脾胃虛弱、善患瀉痢等症、

人參去芦　白朮炒　茯苓去皮　甘草炙　各一錢

右剉一劑、生姜三片、棗一枚、水煎温服、加陳皮、名異功散、

○六君子湯　治脾胃虛弱、飲食少思、或飲食難化、作酸、屬虛火、須加炮姜、其功甚速、

即前方、加半夏陳皮、

○香砂六君子湯　即六君子、加香附藿香砂仁、

○四物湯　治血虛發熱、或寒熱往來、或日晡發熱、頭目不清、或煩燥不寐、胸膈作脹、或脇作痛、尤當服之、

當歸酒浸　熟地黃　各三錢　白芍二錢　川芎一錢五分

凡仙傳藥酒、
治參朮健脾、
健天至補心、
咽滋腎〻

右劑一劑水煎温服

○加味四物湯　即前方加山梔柴胡牡丹皮

○八珍湯　治肝脾傷損血氣虛弱惡寒發熱或煩燥作渴或寒熱昏憒或胸膈不利大便不實或飲食少思小腹脹痛時

人參　白朮　茯苓　白芍

熟地黃　川芎　甘草各五

右劑一劑姜棗煎服

○十全大補湯　治氣血俱虛發熱惡寒自汗盜汗肢體倦怠或頭痛眩暈口乾作渴下利又治久病虛損口乾食少咳而驚悸發熱或寒熱往來盜汗自汗晡熱內熱遺精白濁或二便見血小腹作痛小便短少大便乾澁或大便滑泄肛門下墜小便頻數陰疽瘡瘍等症

即八珍湯加黃芪肉桂各一錢

○補中益氣湯　治中氣不足或誤服尅伐四肢倦怠口乾發熱飲食無味或飲食失節勞倦身熱煩悶大而無力或頭痛惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩悶微細軟弱自汗體倦少食或中氣虛弱而不能攝血或飲食勞倦而患瘧痢等症因脾胃虛而不能愈者或元氣虛弱感冒風寒不勝發表宜用此代之或入房而後勞役感冒或勞役感冒而後入房者急加附子愚謂人之一身以脾胃為主脾胃既實則肺得其所養肺氣既盛水自生焉水升則火降水火既濟而合天地交泰之令矣脾胃既虛四藏俱無生氣故東垣先生著脾胃內外傷筆記論之然皆以固脾胃為本所製補中益氣湯又冠諸方之首觀其立方本旨可知矣故曰補腎不若補脾正此

謂也前所治症緊舉其畧餘當倣此而類推之是方之妙并註以表明之

人參 黃芪蜜炒 白朮炒 茸草炙各一錢半 當歸一錢
陳皮五分 柴胡 升麻各三分

右剉一劑薑棗水煎空心午前服

○六味丸 一名地黃丸 一名腎氣丸 治腎虛作渴小便淋閉氣壅痰涎頭目眩暈眼花耳聾咽燥吞痛腰腿疼軟苛症及腎虛發熱自汗盜汗便血諸血失搖水泛為痰之聖藥血虛發熱之神劑

又治腎陰虛弱津液不降敗濁為痰或治效逆又治小便不禁滋腎劑火導氷使水開利而脾土

禁收精氣之為病

健實熟地黃八兩 山藥 山萸肉 去核乾 澤瀉 茯苓 去皮 牡丹皮各三兩

右各另為末和地黃膏加煉蜜為丸如梧子大每服百丸空心滾水下

○八味丸 治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思大便不實或下元冷憊臍腰疼痛夜多漩瀉即前方加肉桂附子各一兩而經云益火之源以消陰翳即此藥也

○加減八味丸 治腎水不足虛火上炎發熱作渴口舌生瘡或牙齦潰爛咽喉作痛或形體憔悴寢汗發熱五臟齊損即六味丸加肉桂一兩五味子四兩

○加減金匱腎氣丸 治脾腎虛腰重腳腫小便不利或肚脹脹痛四肢浮腫或喘急痰盛已成蠱症其效如神此症多因

脾胃虛弱治失其宜元氣復傷而變症者非此藥不能救

白茯苓三兩 川牛膝酒洗去蘆 肉桂 澤瀉 車前子
山茱萸去核 蓯蓉酒洗去蘆 牡丹皮 附子製 熟地黃
鹿茸酒炙酥 酒炒

右為細末和地黃加煉蜜為丸如梧子大每服七八十丸空心米飲下

○加味八珍丸 大補氣血壯脾胃益虛損

當歸酒洗二兩 白芍酒炒一兩半 熟地黃酒蒸晒乾二兩
人參去蘆二兩 白朮去蘆炒二兩 南芎一兩
陳皮一兩 驚棒怔仲加遠志茸草水泡去骨一兩酸棗仁炒一兩

陰虛火動屬虛勞者去人參一兩加黃柏知母俱用酒炒各一兩

右為細末用首男胎衣一具長流水洗淨次入射香二三分再揉洗用布絞乾以好酒二升煮極爛如泥和前藥如乾再入酒糊為丸如梧桐子大每服百丸空心鹽湯送下或酒亦可晚上米湯下

○天真丸 治一切虛損形容枯槁四肢羸弱飲食不進腸胃滑泄津液枯竭又服生血補氣煖胃和脾駐顏延壽

羊肉二斤五兩四錢去筋膜皮用竹刀劈開 當歸身酒洗四兩 肉蓯蓉酒洗心三兩四錢 鮮山藥三兩四錢
天門冬去心三兩四錢無灰好酒十壺

右四味為末入煉黃蜜蒸炒為丸晒乾為末一兩六錢四分入參末一兩白朮末六錢四分糯米炒熟為末三兩四錢共一處搗勻煮丸如梧桐子大每服百餘丸湯酒送下鹽湯亦可早晚各進一服并治一切亡血過多虛弱等症大有功効

◎補天大造丸 滋養元氣延年益壽壯陽充滋坎水為天地交泰若虛勞之人房室過度五心煩熱服之神効平常之人年過四十以來服之接補以續期頤地仙

紫河車一具此乃混沌皮也取男胎首生者佳如無得壯盛婦人次胎亦好先用米淅水將紫河車浸軽〻擘開換洗令淨不動筋膜此乃初結之真氣也將竹器盛長流水中浸一刻以生氣提回以小瓦盆盛於木甑內蒸之武火蒸極熟如糊取出先傾自然汁在藥末內暑和勻此天地正氣汁也將河車放石臼內木杵擂千餘下如糊樣遍將藥汁同和勻擂千餘杵藥來手為丸此全天元真氣以久補久最妙世所少知醫用失焙酒煮及去筋膜又入龜板大誤故特出之

懷生地黃酒浸一兩五錢 懷熟地黃酒蒸一兩 麥門冬泡去心一兩五錢 枸杞子七錢 當歸酒洗一兩 五味子七錢 牛膝去苗酒洗一兩半 杜仲去皮酥炙一兩半 小茴酒炒一兩 川黃柏去皮酒炒一兩 白朮去蘆炒一兩 陳皮去白一兩 乾姜炮二錢 側柏葉擂向東壁枝隔紙焙乾各一兩 如血虛加當歸地黃倍之如氣虛加人參黃芪甘草如腰痛加杜仲破故紙小茴巴戟去心山茱萸去核如腎虛加覆盆子炒小茴巴戟去心山茱萸去核加地骨皮知母酒炒牡丹皮如骨蒸加鱉甲酥炙續斷酒洗如有骨蒸附條參俱酒炒各一兩

右為細末用蒸紫河車汁將車共擂為丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲送下若河車肥大加至一百丸必靜坐勿令鐵器傷用石和搗杵或石磨磨之不耗散為妙

熏膀力 比丸高目

湯送下一百丸有病者一日二服

○延齡固本丹　治五勞七傷諸虛百損顏色衰朽形體羸瘦夢泄遺精小腸疝氣婦人久無子息下元虛冷中年陽事不舉精神短少未至五旬鬚髮先白并左癱右瘓步履艱辛腳膝疼痛小腸疝氣婦人久無子息下元虛冷

天門冬去心炒　麥門冬去心炒　生地黃酒洗蒸　地黃酒洗蒸

山藥　牛膝去苗酒洗炒　杜仲去皮姜汁炙酒炒　巴戟酒浸去心

枸杞子　山茱萸酒蒸去核　白茯苓去皮　五味子

人參　木香　栢子仁各二兩　老川椒

石菖蒲　遠志去骨心酒浸焙乾　兎絲子酒浸焙乾成餅

肉蓯蓉酒洗各四兩　覆盆子　車前子　地骨皮各一兩半

赤石脂一兩半

婦人加當歸酒洗

右為細末好酒打稀麵糊為丸如梧桐子大每服八十丸空心溫酒送下服至半月陽事雄壯至一月顏如童子目視十里小便清流服至三月白髮返黑久服神氣不衰身輕體健可昇仙位

○傳經驗藥酒方

○八珍酒　和氣血養臟腑調脾胃鮮宿醒強精神悅顏色助勞倦補諸虛久服百病消除比他香燥藥酒大不同也

當歸酒洗二兩　白芍燥二兩　生地黃酒洗四兩

人參去蘆　白朮去芦炒　白茯苓去皮　粉草炙

五加皮酒洗晒乾　小肥紅棗去核　核桃肉

右藥咀片共裝入絹袋內用好糯米酒四十斤煮二炷香埋淨土中五日夜取出通二七日每晨午夕溫飲一二小盞

○神仙延壽酒　治症同前虛人有熱者宜此

生地黃二兩熟地黃三兩天門冬去心二兩麥門冬去心二兩
當歸二兩 南芎二兩 白芍藥二兩 人參五錢
白朮去蘆油炒二兩 白茯苓去皮二兩 甘菊花去蘆二兩
小茴香鹽酒炒二兩 巴戟水泡去心二兩 牛膝去蘆酒洗二兩 杜仲去皮酒炒二兩
破故紙炒一兩 木香五錢 枸杞子二兩 肉蓯蓉二兩
知母去毛酒炒二兩 砂仁一兩 黃柏酒炒三兩
右剉用絹袋盛藥入罈內用酒六十斤煮三炷香為度取出
埋土中二日夜去火毒舂碎隨量飲之
○固本返魄酒 治症同前風人無熱者宜此
當歸酒洗 巴戟酒浸去心 肉蓯蓉酒洗杜仲酒炒去絲
人參去蘆 沉香 小茴酒炒 破故紙酒炒
石菖蒲去毛青鹽 木通 山茱萸酒蒸去核

石斛 天門冬去心熟地黃 陳皮
枸杞 兎絲子酒浸蒸 牛膝去蘆 酸棗仁炒
覆盆子炒 胳肭獸一兩 川椒去子 神麯炒三兩
白豆蔻 木香各三錢 砂仁 大茴
益智去殼 乳香各五錢 虎脛骨酥炙二兩 羊藿四兩 要新者
糯米一升 大棗一升 生姜二兩搗汁 遠志甘草水泡去心一兩
山藥搗四兩 煉蜜四兩 用小黃米明流燒酒七十斤

右各依製為末糯米棗肉粘飯同姜汁山藥汁煉蜜四兩和成塊分為四塊四絹袋盛之入酒壜內浸二十一日取出熟服早晚各飲一二盞數日見効

○仙酒方
一用小麥八十四斤一半炒熟入新布口袋內懸井中浸七日

取出曬乾再入生麥一斗磨麵聽用
一用黃精九蒸九曬八兩為末聽用
一用懷慶熟地黃八兩生地黃八兩枸杞子八兩同為末聽用
一用淡秋石八兩
一用紅鉛六錢四分為末聽用
一用精壯女子乳汁十六碗同麵藥末添長流水調合成塊或
五月五日六月六日用紙裹包謹密收在冷淨空房陰乾
七日造仙酒每用百花蓋一十六斤即蜂蜜同河水十六斤
井水十六斤此陰陽水二同入銀鍋內煎熟好淨鐵鍋亦可
待冷聽用亦用酒娘三斤即新酒糟同麵二斤打爛同入磁
缸內用香椿枝攪二三遍用紙封口三四日開口用椿枝每
日攪二三遍前後十日酒熟細袋濾過澄清名為仙酒

○扶衰仙鳳酒　治男婦小兒諸虛百損五勞七傷瘦怯無力及婦人赤白帶下神効

用肥線鷄一隻將繩吊死退去毛取不用將鷄切四大塊再切入生姜四兩豚婁半斤用好酒五大壺共三味裝入一大壜內用泥封固壜口重湯煮一日一夜涼水拔去火毒每服以空心將鷄酒連姜婁隨意食之

○徐國公仙酒方　張尚書傳于龔像源

頭醮好燒酒一壜用龍眼去殼二三斤入酒內浸之日久則顏色嬌紅滋味香美專補心血善壯元陽療怔忡驚悸不寐等疾早晚各隨量飲數盃悅顏色助精神大有補益故名仙酒

○紅顏酒一名不老湯

胡桃仁泡去皮小紅棗四兩白蜜四兩酥油二兩

杏仁 泡去皮尖不用双仁煮四五沸日乾二兩

右用自造好燒酒一金華鐘先以蜜油滾開入酒腊將三藥入酒內浸三七日每早服二三盃甚妙

○仙茅酒 仙茅 四兩出四川用米泔水浸去赤水沉日乾淫羊藿 四兩南五加皮 四兩洗淨

右剉片用黃絹袋盛懸入無灰酒一中鍾內三七日後取早晚飲一二盃殊妙

○駐世珍饈 常用補虛

當歸酒洗 南芎 白芍酒炒 熟地黃 兎絲子酒製 杜仲姜酒炒 牛膝去芦酒洗 一杜仲去系 山藥 青鹽 大茴 山茱萸去核 枸杞子酒洗 川椒炒 乾姜 甘草炙

○本綱仙茅來名婆羅門參昔有婆羅門秀此草以療飢因名之文理黃色多延○葉書如茅而軟莖略圓而有縱文又似初生菠薐狀高二晚飲一二盃殊妙許至冬盡○駐世珍饈常用補虛

柘春初乃生三月有花如梔子花黃色不結實其根皆如指大如拇指有節旁有短細肉脅山藥也

褐色內肉黃白色三月八月采根暴乾用之○婆羅門僧

婆羅門僧方於言玄宗故今江南呼為婆羅門參言其功補如人參也

右各等分為細末用臊猪肉不拘多少切片酒炒熟入藥再炒不可用水磁器收貯空心食之好酒送下忌生冷

○取龍虎水法

龍屬木虎屬金即童男童女取之時謹擇有五種不用男五種者生速變半濱也生者外腎不舉速者聲雄皮粗變者腥臊狐臭半者黃肥多病濱者亦癡癩瘡疽女五種者羅紋服交陰戶上有橫骨紋者狐臭鼾氣服者實女也交者聲雄髮粗皮膚粗糙無顏色脉者瘡疥病患殘疾二陽器務宜擇骨清目秀滿月之相三停相等唇紅齒白髮黑聲清膚肥細膩年方十三四十五大未破者用黍稷稻糧紅豆紅棗猪肉鯽魚等味與彼食之忌忘忌葱韭薤五辛三厭穢污三水戒諠譁手舞足蹈耗散精華未取之時先調百日十月起

三月止置磁罐內收貯以蓋之積至二三石聽候煉用

○陰煉龍虎石

將前積二水置磁缸三四口於靜僻處淨去處每缸置放五六分下明礬白木各二兩松水五分龍虎水加井水五分下明礬白木各二兩松柏葉各二兩取楊柳枝三四莖一札順攪千餘下蓋之勿動看待水澄清去蓋逼去清水仍加井水又攪又逼攪二三百轉蓋之澄清又盡逼去清水仍加井水又攪又逼又濾如此十餘次直待水香為止逼去盡用米篩三四箇內鋪白綿紙將渾龍虎石放入篩內候水乾移在日色內處以竹刀盡成骨牌路曬乾如粉之白即可陰煉龍虎石用磁盒收貯合藥用此藥能補心生精養血之至藥也

○陽煉龍虎石

擇露天空地砌竈二眼坐東朝西安三尺二寸二尺四寸大鍋二口鍋近處安缸四口先積下龍虎水二缸或三缸方洗淨鍋秀先於大鍋內入五瓢慢火熬熬至起沫以單扇去沫撒去油沫直待熬至不起沫方起過小鍋內細火熬大鍋內仍添二三瓢又熬去沫又起小鍋內如此少少漸添漸起以盡為度大鍋慢火熬用鏟子不住手鏟待水減成膏上用一小盆合住鍋口周圍用泥封固嚴密止留一孔出水氣看水氣從盆孔內盡出金星青氣急以泥封孔眼缸底用溫布一方不可水大常只以水潤之小火燒至鍋底紫色退火冷定至第二日先去口上泥淨揭開取在缸上的已成靈藥紅黑白各色易收聽候用另釘黃芽將鍋底內黑膏子

錘起另入一小鍋用磚支起大火燒待黑煙淨連鍋通紅退火涼吟酌量下井水或露水尤妙燒滾先置淨缸一口於室內上安竹篩內鋪綿紙濾過清水入缸篩內黑滓不用將濾下清水看如冰清碧就磁盆煎出淨石來如舊有此黃色還用前小鍋煎乾再煆一次涼吟仍下水煎滾照前濾入缸內直看濾下水如井水一般清碧以磁盆用磚去支起徐徐添炭火煎前淋種的清水滾以竹錘不住手錘只待煎錘焙乾暑帶潮取出傾在紙上務於日色曬乾收雪之白即是陽煉龍虎石

○取紅鉛法

擇十三四歲美男謹防他五種破敗不用五種者羅紋服女非為補益之妙丹務擇眉清目秀齒白唇紅髮黑面光肌膚細膩不肥不瘦三停相等好骨架他生年月日起約至五年四十八日之先後先看他兩腮如桃紅花額上有光自熱氣喘腰膀酸痛困倦呻吟即是癸將降矣先預備絹帛兒褲洗淨或羊胞做一囊盛或用金銀打就的一個月器或候他花開與他繫合陰門令他於椅凳上平坐不可斜倚如覺有紅取下再換一付多製餘處用絹帛夾展更換收入磁盆內待經盡同右法五千四十八日近有十二三歲而來十六七而至何也皆因稟受父精毋血厚薄不同亦有長成因受乳食致令氣血各有不平故難以期定惟在觀他動靜察他形色是其期也

如得年月應期乃是真正着金至寶為接命上品之藥如前後不等只作首鉛初至金鉛二次紅鉛二次紅鉛三次以後皆屬後天紅鉛只堪製配合藥不宜單作服食既明採取之法聽後製服三腥五羶濁氣必須仔細修煉方成至藥者焉

○製紅鉛法

先將烏梅一斤煎水一桶去梅凝冷定如取得有紅鉛或黑或帛俱入梅缸內洗下用烏梅水時先看紅鉛有一筒止用梅水三碗或多或少隨意加減不可太過不及梅水洗下來鉛再加井水或河水用大磁盆盛之滿以來槩攪數十轉用蓋蓋之勿動待水清輕輕逼去清水將澄下鉛仍加水又打又攪又澄如此七次或九次數足逼去水盡止剩得紅漿一碗或半碗取出庶用盆盛盆貯中刷一孔量容多少以軟絹鋪紙把鉛漿傾入紙上蔭水盡方取於日色處晒乾此即製服腥羶穢垢之法方合入藥配合服之專主助血養神其功甚大收貯聽用

○製金乳粉法

擇美男先看雙童肥白有精神者即是氣血盛而乳可用矣亦用頭生二八三七純可擣聚過期血弱不可用也取下一碗或半碗對露水均平擣百遭過夜其乳自分逼去水將乳入磁盆內晒乾碾細成粉漸取漸製積得半斤四兩聽候配紅鉛成丹也

○三元丹　治諸虛百損補氣生精安魂定魄益壽延年

紅鉛　嬌乳酪一錢

右用便盆或新磚自生者方可

虛無秋石一錢

一右俱爲細末、用鷄子一箇、盛一孔、將清黃傾出、用紙展平裝
二前藥入內、紙糊嚴密、放蓋定內、以鷄抱之、三七、取出、乳和爲
九如梧桐子大、每服三九、五更時、人乳送下、稍有汗出、不可
見風、

○神仙小聖藥

紅鉛半盞、真女首經更佳、二三次出者次之、其
色紅黃爲上、純紅者爲中、紫黑者不用、
朱砂五錢、用辰州豆片者、
先將紅鉛取來、拌入朱砂、放磁盆內、日晒月照、四十九日、畢
飛仙池文武火升三炷香、其藥自然過一邊、冷定開看、與金
箔相似、用鷄翎掃下、約一分八厘爲上等、其次一分二厘、又
烏金紙包入小眼藥罐內、以黃蠟封口、外用豕胞皮通身包
裹、仍放火瓶內、以綿緊塞、瓶口用竹葉厚脬緊札、用絡以長

繩引、公井中去火毒四十九日、足取出、擇吉日、將藥置於桌
上、南向香紙供獻、俱南向用好乳香末半分、研細末、以人乳
二三滴、將聖藥和勻、作三九服者、對天南向、跪拜祝畢、吞藥
入口、將人乳送下、即歸室中靜養三七日、然後方許出門動
作、顏色返童、髮變黑、服藥一度、可延壽一紀、

彭祖小接命藥膠方

夫人稟天地之靈氣、稟精血而化生、陰陽交媾、胚胎始凝、如
太極之未判、似混沌之未分、男子之左腎先具、外精裹血而
陰焉中處、女子之右腎先具、外血裹精而陽焉內存、腎乃生
脾、脾次生乎肝、肝乃生肺、肺復生乎其心、凡在其中、四門皆
閉、九竅不通、惟有其臍則與母氣相通、母呼則呼、母吸則吸、
十月胎定、百神俱備而與母分離、剪臍落地、猶恐臍竅不閉、

有傷嬰兒之真氣隨用艾火黃
氣而不漏漸長成人四門皆開九竅俱塞因七情六慾之牽
誘五味五音之感通真元喪失真氣破傾人之幼年血氣衰
敗精氣羸弱漸覺有患或生於厚味傷其六腑喜怒哀樂損
於五藏致使忘既胃不交陰陽偏盛五勞七傷漸進着體七藏
八節陸續沾身流患日久頽軀衰命良可惜也譬諸草木皆
稟天地而生根壯枝盛本弱末衰若水灌土培根潤而復生
矣人至中年氣血漸衰疾病易起止知療患不知壯根固本
之法人生處世迄不如草木而能回生也凡人生育之時腎
帶一落用艾火以黃蠟固人之中年已後忽臨其身
如草木復其燒培以法黃蠟固其腎豈不去惡除疾而保
余哀憫後人不終天年而夭喪特傳濟世之方普授延年之

妙藥壯固根蒂保護形軀黃蠟本原卻除百病蠲五臟之疾痼
患保一身之康泰其中藥品真性忠良採陰陽之正氣祀活千
年之妙此方遵高尚賢士可傳復有迴生濟世之
之每年中秋日黃蠟一次却疾心腸
之宿疾婦人月信不調赤白帶下男子下元虛損遺精白濁
陽事不舉並皆黃蠟之功如黃蠟蒸之時令食飽肉臥用荷
麥麵水和搜一團徑過寸餘如
槐皮一塊去粗皮止用半分厚
之百餘和勻毛窠皆遍上至泥丸下周湧泉冷汗如雨久之
覺饑再食再灸不可令痛痛則反泄真氣灸至行年歲數為
止無病者連日灸之有病者三日一次灸至腹內作聲作痛

大便有涎沫等物出為止只服參湯無食白肉黃酒以助藥力若患風氣有毒熱在藤理者加女子紅鉛拌藥則易汗出而疾隨愈棉皮如胃焦色即易新的凡炙之後應可驗今將製藥品味開列于後

乳香　沒藥　假鼠鬚去頭尖者鹽青鹽　兩頭尖　川續斷絲二　麝香五分

右共為細末用

○益壽比天膏　此藥最能添精補髓保固真精不泄善助元陽滋潤皮膚壯筋骨理腰膝下元虛冷五勞七傷半身不遂或下部虛冷腰膝酸痲陽事不舉男子婦人服之能除赤白帶下沙淋血崩無不生效若能通二十四道血脉堅固真體返老還童

假鼠鬚入肉牡蠣也其尾兩頭尖者是又名假鼠鬚

本經自兩頭尖頭陰乙名烏賊骨本經即兩頭尖是

治喘戶過敗毒不泄真精大驗靈驗非至仁不可輕泄

鹿茸　附子炮去皮牛膝去苗虎脛骨酥炙蛇床子　兔絲子　川續斷　遠志肉　肉蓯蓉　九味冬去心　麥門冬　杏仁去皮尖下

川練子炒山茱萸炒巴戟去心破故紙　杜仲去皮　木別子去殼肉豆蔻　紫稍花　谷精草　穿山甲

大麻子去殼各一兩　甘草二兩淨末看衆桑搥柳枝打七下　右搗細用真香油一斤四兩浸一晝夜慢火熬至黑色用飛過好黃丹八兩黃香四兩入內柳棍攪不住手再下雄黃倭硇龍骨赤石脂各二兩將銅匙挑藥滴水成珠不散為度又下毋丁香沉香木香乳香沒藥陽起石硃蟾酥蛩蛩各二錢射香一錢為末共搗入內又下黃蠟伍錢將膏紙磁罐內

封口嚴密入水中浸五日去火毒每一箇重七錢紅絹囊開貼臍上或兩腰眼上每一箇貼六十日方換其功不能盡述

○九仙靈應散　治男子陰濕陽痿久不舉

黑附子一箇　蛇床子一兩　紫梢花　遠志　菖蒲一寸　海螵蛸　木鼈子　丁香各二十一個

右為末每用五錢水三碗煎至一碗半溫洗陰囊并濕處日洗二次留水溫洗多洗更好

虛勞

骨蒸勞熱盜汗遺精為上盛下虛脚手心熱皮虛怯症者自因元氣不足心腎有虛或并傷氣血或酒色過度漸至真陰虧損相火隨旺則銷鑠真陰而為嗽為喘為

痰為熱為吐血衄血為盜汗遺精為上盛下虛脚手心熱皮焦午後怕寒夜間發熱或日夜不退或憎雜怔忡嘔噦頭暈胸腹作痛飽悶作瀉痞塊虛驚面白唇紅頭目眩腰背酸疼四肢困倦無力小水赤色衄來數大或虛細弦急怪症多端犯此難治虛勞不受補者難治皆是陰虛火動俱用滋陰降火加減或臥生眠睡者難治咳痛生痰聲啞者難治久清離滋坎湯後服滋陰清化膏六味地黃丸之類愈後用坎離既濟丸乃收功保後之藥也勞症者無是虛損之極痰與血病先起於虛怯已後成勞治藥一同勞衄數大而虛又有傳屍勞瘵之症乃臟中有蟲蝕心肺者名曰瘵此是傳屍瘵骨肉相傳乃至滅門者有之矣

虛勞者陰虛而相火動也門虛火動者難治

虛勞不受補者

○滋陰降火湯　治陰虛火動發熱咳嗽吐痰喘急盜汗口乾此方與六味地黃丸相兼服之大補虛勞神效

當歸酒洗一錢　生地黃八分　熟地黃姜汁炒一錢　白芍酒炒一錢　甘草炙五分　天門冬去心麥門冬去心各一錢　白朮去蘆一錢　陳皮七分　黃柏去皮蜜水炒知母各五分

右剉一劑生姜三片大棗一枚水煎臨服入竹瀝童便姜汁少許同服

骨蒸勞熱者陰虛火動也加地骨皮柴胡如服藥數劑熱不退加炒黑乾姜三分

盜汗不止者氣血衰也加黃芪酸棗仁

痰火咳嗽氣急生痰加桑白皮紫菀片芩竹瀝

咳嗽痰中帶血者難治也加片芩牡丹皮阿膠梔子紫菀屑

一角竹瀝

乾咳嗽無痰及喉痛生瘡聲啞者難治也加片芩瓜蒌仁貝母五味子杏仁桑白皮紫菀梔子

咳嗽痰多津液生痰不生血也加貝母款冬花桑白皮

喉痛生瘡聲音不清或咽乾燥虛火盛也用山豆根磨水噙之再用吹喉散噙化丸俱見咽喉

痰火作熱煩燥不安氣隨火升也并痰火怔忡嘈雜加酸棗仁山梔炒黃連竹茹辰砂竹瀝痰火驚悸同治

血虛腰痛加牛膝杜仲

血虛腳腿枯細無力痠弱加黃芪牛膝防己杜仲去天門冬

夢遺泄精者虛火動也加山藥牡蠣杜仲故紙牛膝去天冬小便淋濁加車前萹蓄麥冬辭前蓄牛膝山梔去芍藥

陰虛火動小腹痛者加茴香木香少許去麥門冬
陰虛火盛足常熱者加山梔牛膝去麥門冬
陰虛火動脾虛者宜滋陰降火健脾也
○清離滋坎湯　治陰虛火動咳嗽發熱盜汗痰喘心慌腎虛脾弱等症

生地黃　熟地黃　天門冬去心麥門冬去心
當歸酒洗　白芍酒炒　乾山藥　山茱萸酒蒸去核
白茯苓去皮　牡丹皮　白朮去芦　澤瀉
黃柏蜜水炒　知母　甘草炙

盜汗加酸棗仁牡蠣○嗽盛加五味子款冬花○痰盛加貝母瓜蔞仁○熱盛加地骨皮玄參○心慌加遠志酸棗仁○遺精加龍骨牡蠣煅○胸中不快加陳皮○泄瀉加蓮肉陳

陰虛火動為諸症者宜先養血而濟之也

皮去知母黃柏、

右剉劑水一碗半煎至一碗空心温服痰盛加竹瀝一盞姜汁一二匙熱加童便一盞入藥同服如吐血咳血加鮮生地黃搗汁一盞同服此病陰血太虛每日五更飲人乳汁一鍾甚效與湯藥相間服之久久奏効

腎虛不能制火者此方主之

○六味地黃丸　治形体瘦弱無力多困腎氣久虛寒汗發熱五臟陰損遺精便血消渴淋濁等症此藥不燥不濕專補左尺腎水燕理脾胃少年水虧火旺陰虛之症最宜服之

熟地黃蒸搗如泥　山茱萸酒蒸去核　乾山藥
白茯苓去皮　牡丹皮　澤瀉

治心腎不交消渴引飲加五味子二兩麥門冬三兩名腎氣

八味丸、○虛勞加紫河車一具○燕補右尺相火加附子官桂各二兩、名八味丸、○如漏傷於陰致相火勝者、加黃柏酒炒三兩、知母鹽水炒三兩、

右為細末、煉蜜和丸如梧桐子大、每服七八十丸空心白鹽湯下、腎水不能攝閉十棗吐痰嗽棗湯下、

○增補云、腎非獨水也、命門之火亦名之曰陽虛火動、河間氏所謂虛則火無所制而熱證生矣、

腎虛則熱是也、今人足心熱陰股熱脊痛牽是此証老人得之為順、少年得之為逆、乃咳血之漸也、熱地黃山茱萸味厚者也、經曰味厚為陰中之陰故能滋少陰補腎水、澤瀉味甘鹹寒甘從濕化鹹從水化、寒從陰化故能入水藏而瀉水中之火、丹皮氣寒味苦辛、寒能勝熱、苦能入血辛能生水、故能益少陰平虛熱、山藥茯苓味甘者也、甘從土化、土能防水故用之以制水橫之邪、且益脾胃而培萬物之母也、

凡年初被感、慾太早者、根本受傷及稟賦薄者、又數喪之後、隱疹不敢實告、以致元氣虛憊、或遺精盜汗神疲力怯飲食不生肌肉、面白五心發熱、夏先畏熱冬先怕寒、腰疼膝重頭暈目眩、故曰水一點則失必勝火動則肺金受剋而痰嗽矣、或勞汗當風、面出粉刺已上症、見虛損成矣、宜以此藥服之、可保無虞矣、

咳嗽痰喘不絕、聲音急則治其標也、

○玄霜雪羹膏　生津止渴除咯血吐血漱血、久不止及治勞心動火勞嗽久不愈消痰止嗽清血歸經、

雪梨大十箇去心取汁　鮮生地黃搗取汁　藕汁　蜜各一盞

二麥門冬搗爛五錢 蘿蔔汁五鍾

右六汁再重湯去滓將清汁再入火煎煉入蜜十六兩飴糖八兩姜汁半酒盞入火再熬如稀飴糊則成膏矣○如血不止咳嗽加側柏葉搗汁一鍾非白汁半鍾茜根汁半鍾俱去滓入前汁內煎成膏服之

陰虛火動而嗽咳者緩則知其本也

○滋陰清化膏 清痰火源化腎乃人身之化源

生地黃酒洗熟地黃酒浸天門冬去心各白茯苓去皮山藥炒各二兩杞子白芍藥酒炒各一兩五味子七錢甘草一錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸空心津液嚥化下

意苡仁炒各一兩甘草生五錢

嗽甚加陳皮貝母各

○坎離膏 治勞瘵發熱陰虛火動咳嗽吐血咯血咳血

衄血心慌喘急盜汗

黃柏 知母各 四生地黃 熟地黃 天門冬去心各

麥門冬去心 各 杏仁去皮尖 各

蜂蜜四兩

先將黃柏知母童便三碗側柏葉一把煎至四碗去渣又將天麥門冬生熟地黃入汁內漬水二碗煎汁去滓再搗爛如泥另用水一二碗熬熟絞汁入前汁將杏仁桃仁用水擂爛再濾勿留渣同蜜入前汁內用文武火熬成膏磁罐收貯封固入水內去火毒每服三五錢側柏葉煎湯調空心服忌銅

鐵器

咳嗽吐血喘急不能食者脾肺虛損也

○寧嗽膏　治陰虛咳嗽火動發熱咯血吐血大衄肺氣

天門冬去心二兩　杏仁去皮尖百部去心百合酪四
款冬花蘆五兩　紫菀三兩　雪白木去蘆油入脂

右俱為粗末長流水煎三次取汁三次去渣入飴糖八兩蜜
十六兩再熬又入阿膠四兩白茯苓四兩為末水飛過晒乾
二味入前汁內和勻如稠成膏每服三五匙

痰嗽喘熱而泄瀉者此脾傷也

○參苓白术散　主之方見泄瀉不止不思飲食

○瑞連丸　治元氣大虛脾胃怯弱泄瀉不止不思飲食

乾山藥炒　蓮肉去心皮各一斤　白术去蘆油炒　茯苓去皮各二兩

揀參去蘆鐵器　白茯苓去皮橘紅各一兩　白芍酒炒各一兩

甘草炙五錢

右為末用豬肚一箇洗令淨煮爛搗和藥末為丸如梧桐
子大每服百丸空心米湯送下再煮服白雪糕方見內傷

痰嗽喘熱而痢疾者脾腎俱傷也

○和中湯　治虛勞亦白痢疾或腹痛重急後重

當歸身酒洗上　白芍酒炒上　白术去蘆上　茯苓去皮下
黃連去鬚炒　木香少許　甘草炙下

紅痢加阿膠炒上　白痢加乾薑炒下

右劑一劑水煎食前溫服如久不止再煎服宜腸散方見痢疾

○駐車丸　治下痢止痢如車之駐也子母用此治陰虛勞嗽血為痢者殊效

川黃連炒三錢 真阿膠蛤粉炒 赤茯苓去皮 兩

右為細末酷打稀糊為丸如梧桐子大每服三五十丸米

飲送下

痰嗽喘熱脾虛飽悶發腫者難治也

○分消湯主之方見蔵腑

病後調理者乃收功保後之劑也

○坎離既濟丸 治陰虛火動勞瘵之疾

當歸酒洗 兩 南山芎一兩 白芍酒炒 兩 熟地黃酒蒸

生地黃酒洗 天門冬去心 麥門冬去心 五味子 兩

山藥炒 兩 山茱萸酒蒸去核 牛膝去苗酒炒 兩 黃柏去粗皮九蒸九曬 兩

水炒 兩 鹽水炒 兩 鹽知母去毛酒浸 兩 龜板去邊酥炙黃 兩

右為末忌鐵器煉蜜為丸如梧桐子大每服五六十丸空心鹽湯送下

補遺方

○肾化仙方 治五勞七傷吐膿吐血吐痰咳嗽喘急

甜梨汁 生姜汁 白蘿蔔汁 白糖酪二

右共熬成膏後入人參一錢為末入前汁內和勻為丸如彈子大至晚嚥化一丸不過十丸其病可除

世人惟知百病生於腎飲酒食肉厭飽入房不謹節慾喜怒為傷其精則腎水空虛不能平其心火心火縱炎傷其肺金是純腎水之源金水衰虧不能勝其所水

肝木盛則剋脾土而反生火火
陰不足其病獨熱而不化故陽有餘而
陰不足其病獨熱而不化故陽有餘而
警世二絶
酒色財氣傷人賊多少英雄敗此處
便是九霄雲外客
浮生何事多偏性酷令花酒傷生命
使盡黃金藥不靈
一監生劉誠庵乃卻年十八歲患虛勞熱嗽痰喘面赤自汗晝
夜不能倒臥瘦不過一旬日命在須臾一家傍徨諸醫
無所措手召予脈視大如微數乃陰虛火動之症予令其五
更將壯盛婦人乳汁一鍾重湯煮令加作三四十口服之至天
明服河車丸一服少頃將大小米大山藥蓮肉紅棗核

桃仁數个煮稀粥食之飽餉又煎生洞雜滋坎湯二劑加竹瀝
一童便姜汁少許頻頻服之服至半年又進前粥碗許加白雪糕
食之過半餉又照前藥二劑頻服至盡將脫又進前粥碗許
又煎前藥二劑夜間睡則藥不止醒則即服如此三晝夜藥不
住口火乃漸息方得臥倒以後却減前藥一半過半月病減
十之六七每日止服湯藥一劑調理數月而愈此症危急至
甚非予用此法救之若照尋常日服一二劑者幾乎不起夫
一杯之水不能救輿薪之火正此之謂也今後患此症者當
照此服譬若當照此治未有不愈者也甚有脾胃弱已作瀉
者不在此限

增補虛勞門方直

增補黃芪湯

黃芪四兩　人參　白朮　桂心各三兩
附子三十銖生姜八兩大棗十枚
五臟皆有勞勞其肺者短氣虛寒皮毛枯澁津液不通氣力損之脉來遲緩者此方主之○肺主氣又於悲哀喘咳則成肺勞肺勞故令氣短而聲不長氣為陽又虛則寒故令虛寒肺主皮毛肺勞則無津液以充膚澤毛故令枯澁氣有餘則一物潤津氣不足則無以化液故令口乾而津液不通氣壯則強氣餒則弱今肺為勞傷故氣力損之脉來遲緩者為虛寒人參并温者也故能補氣經曰損其肺者益其氣是故用之桂心虛則陰湊之而為寒熱能壯氣是故用之白朮芍藥兼脾胃藥也經曰虛則調其飲脾是肺之母是故用之是方也以治肺勞虛寒之証故為全當

若肺熱脉數者非所宜也忌主二母散

增補二母散

知母去毛炒　貝母去心炒　共為末

肺勞有熱不能服補氣之劑者此方主之○治肺有二法氣虛而陰湊之則如前方之温補金寒而火乘之則如此方之滋陰宜温補者易會宜滋陰者難治是方也二母皆苦寒之品若能堅金寒

增補人參固本丸

人參二兩天門冬去心麥門冬去心生地黃淨熟地黃各四兩

肺勞虛熱此方調之○本猶根也肺主氣而氣根於腎水故用人參益氣二冬清氣兼滋地補

腎生地涼腎劑之為丹用之於所謂北水之主以制陽光是也非固本而何或問補腎何以用人參余曰大氣周流無藏不宜故人參之用亦無處不宜今得滋陰之品以君之則

增補天王補心丹

人參去蘆　白茯苓　玄參炒　丹參炒　遠志炒
桔梗各五錢　生地黃四兩　五味子炒　當歸酒洗　柏子仁炒
麥門冬去心　天門冬去心　酸棗仁炒　酥各一兩

過勞其心忽忽喜忘大便難或時溏利口內生瘡者此方主之○心者神明之藏過於憂愁思慮久久則成心勞心勞則神明傷矣故忽忽喜忘心生血血濡則大便潤血燥故大便難或時溏利者心火不足以生脾土也口內生瘡者心虛而

火內灼也人參養心氣當歸養心血天麥門冬所以益心津生地丹玄所以解心熱拈仁遠志所以養心神五味棗仁所以收心液茯苓能補處拈硬能利膈詰藥等於補心勞心之人宜常服也此方之德未考所自倡云昔者志公和尚日夕講經鄧天王潤其勢也錫以此方因得名焉載在經藏今未辨其真偽異日廣求補遺而萬之

增補平角地黃湯

生地黃角傷　生地黃

勞心動火吐血衄血者此方主之○心屬火而主脈過勞其則火妄動而脈溢越竇而出則為吐為衄者勢也經曰治病必求其本故以涼心之藥主之生地能解心熱白芍丹皮酸寒之物也酸者入肝寒者勝熱所以心

白芍藥　牡丹皮

病而治肝者肝乃心之母木能生火故從所而治之方迎奪之矣也

增補半夏湯

半夏 宿姜各二錢 茯苓去皮 白朮炒杏仁去皮尖 橘皮去白各一錢 竹葉二十片 大棗五枚

脾勞四肢不用五臟皆華脈滿宿食舌根苦直不能嚥唾者此方主之○脾主四肢水穀之味通於脾脾弱不能消磨勞於運化久久則成脾勞脾主四肢故令四肢不用五臟皆受氣於脾脾勞而傷則五臟皆無以受氣故華而夫其常經曰脾主行氣于三陰脾勞則三陰之氣皆滯塞不行故令脈滿三陰之氣至胸中而還故令肩息脾之經脈上扁挾咽連舌本散舌下故令舌根苦直不能嚥唾半夏之毒耳脾喜燥而惡濕宿姜等之辛以制半夏之毒耳脾喜燥而惡濕故用白朮燥脾茯苓滲濕脾喜通而惡塞故用杏仁利氣橘皮泄氣竹葉氣清能去土中之火芍藥味酸能瀉土中之木大棗之甘取其耳而益脾耳

增補補中益氣湯

人參 甘草炙 絡 升麻三分 當歸 白朮炒 陳皮去白 柴胡各五分

勞倦傷脾中氣不足懶於言語惡食瘧泄日漸瘦弱者此方主之○脾主四肢故四肢動動不息又過飢餒無以養氣以養則傷脾脾傷故令中氣不足懶於言語脾氣不足以勝穀氣故惡食脾弱不足以制中宮之濕故瘧泄濕脾主飢肉故瘦弱五味入口甘先入脾是方參芪歸朮甘草皆甘物也故可

和則能辯五色矣今肝為勞傷故令目視不明經曰味為陰
味厚為陰中之陰枸杞味厚故足以養厥陰之陰炙以純酒
取其浹洽氣血而已他如六味地黃丸亦可主用古謂肝腎
之病同一治又謂虛則補其母腎是肝之母故地黃丸亦宜
增補六味地黃丸加黃柏知母方

熟地黃八兩　山藥各四兩　澤瀉
牡丹皮去梗　白茯苓各三兩　黃柏鹽炒　知母鹽炒各二兩

腎勞腎虛偏仰小便不利有餘瀝囊濕生瘡小腹裏急便赤
黃者此方主之○腎者藏精之藏也若人強力入房以竭其
精久久則成腎勞腎主精之主封填骨髓腎精既入房而竭
則骨髓日枯矣故骨痿偏仰前陰者腎之竅腎氣足則能管
攝小便而漫溺惟宜腎氣丸則氣足則能管攝小便而不利既便而有餘瀝

政入脾而補中氣中氣者脾胃之氣也人生與天地相似天
地之氣一升則萬物皆生天地之氣一降則萬物皆死故用
升麻柴胡為佐以升清陽之氣所以法象乎天地之升生也
用陳皮者能疏通脾胃一能行其溫之滯也是謂黃芪建
中湯亦可主用見傷寒門

增補枸杞酒

枸杞子一升　酒二斗同煎

肝勞面目青口苦精神不守恐畏不能獨臥目視不明者此
方主之○肝者將軍之官謀慮出焉故謀而不決歸而數怒
又久則勞其肝肝東方之色也病則色微於面目故令面目
色青口苦者肝移熱于府而膽汁上溢也肝藏魂肝勞則邪
居魂室故令精神不守且恐畏不能獨臥即也肝通氣於目肝

斯之謂失其開闔之常也腎者水藏得氣則水氣留之
水氣留之則生濕熱故令舌苔生焉也小腹裏急者此真水
枯而真火無制真水枯則命門之相火無所長真火無制故
炒膀胱少腹之筋膜而作裏急也便赤黃者亦皆火之所為
熟地山萸黃柏厚朴為陰中之陰故足以補腎間之陰
血山藥茯苓甘淡者也其能制濕淡能滲濕故足以去腎虛
之陰濕澤瀉丹皮酸寒者也其能制熱酸能斂陽下寒能勝熱故足以去
腎間之濕熱黃柏知母苦寒者也濕能滋陰苦能濟火故足
以服龍雷之相火夫去其為陰之火滋其濟火之水則腎間
之精血日生矣王氷曰壯水之生以制陽光此之謂也

增補人參養榮湯

人參去芦黃芪炙 陳皮 白芍藥酒炒當歸酒洗 甘草炙

曰茯苓 五味干炒 遠志去心 白朮炒 柱心一熟地黃
脉極者忽忽喜忘少顏色眉髮墮落此方主之○脉者血之
府脉極者血脉空虛之極也此由失血所致心主血而脾肝極
則無血以養心故令忽忽喜忘榮血有餘則令人悅澤顏色
榮血不足則令人色夭而顏色少也眉髮者血之所養榮血
不足故令眉髮墮落人參黃芪皆草陳皮皆補氣
藥也榮血不足而補氣此大易之教陰生於陽之義也陰者
五臟之所主故用當歸澤瀉芍藥調肝熟地滋腎五味益肺
遠志安心五臟和而陰血自生矣柱性辛熱熟者入心而益
火辛者入經而利血又能為生脉之原故假之引諸藥入心
而養榮血於脉耳

增補十全大補湯

人參　黃芪　白朮　白芍藥　熟地黃
茯苓　當歸　川芎　甘草各等分桂心少許
肉極者肌肉消瘦皮膚枯槁此方主之○肉極由於陰火久灼者難治宜別主六味地黃丸若由飲食勞倦傷脾而致肉極者宜大補氣血以充之經曰氣主呴之血主濡之故用人參白朮黃芪茯苓甘草溫之品以補氣之盛則能充實於肌肉矣用當歸川芎芍藥地黃肉桂味厚之品以補血血生則能潤澤其枯矣

增補生脉散

人參　麥門冬去心　五味子制格

氣極者正氣少邪氣多喘此小便不通長君子道消之象也以少故少言邪氣多故多喘此方主之○肺主氣正氣少故少言此方主之○肺主氣正氣

參補肺氣麥冬清肺氣五味斂肺氣一補一清一斂養氣之道畢矣名曰生脉者以脉得氣則充失氣則弱故名之東垣云夏月服生脉散加黃芪甘草令人氣力湧出若東垣者可以醫氣極矣

附子理中增補湯

人參　甘草炙　附子製　乾姜炒　白朮各一錢

四曰形寒飲冷傷肺肺傷則短氣咳嗽脉來微遲者宜此方主之○形寒者形氣虛寒也飲冷者復飲冷物也熱則氣壯寒則氣怯今肺為寒冷所傷故令氣短水寒射肺肺不能容故令咳嗽脉來微者為虛遲者為寒損其肺者益其氣故用參朮甘草寒者溫之故用附子乾姜

增補白通加人尿豬膽汁湯　用附子乾姜

易曰四垂乾姜一兩附子一枚人參五合猪膽汁一合

五曰久坐濕地傷腎七傷則短氣腰痛厥逆下冷陰脉微者宜此方主之○腎者水藏濕其類也故感之易入而易傷尤

人呼吸之氣呼出心與肺吸入腎與肝腎傷則吸微故令短氣腰者腎之府腎傷而腰痛者其勢也濕為陰氣寒陰併

于下則陽格于上故厥逆而下冷尺為陰脉微者下部寒也

乾姜附子熱物也可以回陽燥濕師曰太陽中天則寒者温濕者燥故姜附可以治寒濕葱白辛温可使通腎氣人尿猪

膽性寒而質陰用之者一可以制姜附之熱而不使其燥烈一可以引姜附直達下焦

于上焦無病之分一可以同寒濕之性而引姜附直達下焦

受病之區此佐以姜附利和次所宜乃其變之向導也

增補升陽益胃湯

羌活 獨活 防風 柴胡 白朮 茯苓 黄耆

人參 半夏 甘草 炙 甘草 陳皮 黄連 澤瀉 白芍藥

七日大怒恐懼傷志志傷則恍惚不樂宜此方主之○怒則

氣上恐則氣下一怒一恐升降于亶中則志意不得伸暢故曰

傷志志者腎之所主而暢于亶中亶中者兩乳之間心君之

分也心者神明之所出故令恍惚亶中者喜樂之所出故令

不樂下者奉之藥者達之故用羌活獨活防風柴胡升舉之

品氣降于中脾胃受病故用參芪甘木橘半芍調胃之品

方内有澤瀉則陷下之邪可泄方内有黄連則亶中之逆判

補虎潜丸 一名補陰丸

黄柏蓋酒炒 知母炒 熟地酥炙 龜板酥炙 虎脛骨酥炙

當歸酒洗 各一兩 陳皮去白 白芍藥酒炒 牛膝各二兩

羊肉為丸

此治陰分精血虛損之方也○虎陰也潛藏也是方欲封閉精血故曰虎潛人之一身陽常有餘陰常不足黃柏知母所以滋陰地黃鹿膠所以養血牛膝能引諸藥下行鎖陽能使陰精不泄龜得天地之陰氣最厚故用以補陰虎得天地之陰氣最強故用以壯骨陳皮所以行滯而羊肉之用厥其補也互考見疏門

增補石膏散

石膏一味煅末如起每夕調淡水服方寸七取身無熱為度

熱勞附骨蒸熱四肢微瘦有汗脈長者此方主之○熱勞之証豈曰盡屬陰虛亦有陽邪外襲傳入于骨不能泄越內作骨蒸令人先寒後熱久久漸成羸瘦有汗者胃家實也脈長者陽邪在也○虛而脈長者亦有之處州吳醫用之甚驗後學也至矣或問東垣言血虛有熱證象白虎誤服白虎者必死非石膏之謂乎余曰若新産失血飲食勞倦之病合禁用之若內熱有汗脈長者則不在禁也

增補茸黎煎

勞瘵咳嗽渴日瘦者宜服之蓋天一生水所以養萬物者也若大盛而水涸人五液乾涸則茸黎煎可以急救之此物能惟可以救急曾有回生起死者師云生用之可以滋五藏熟用之可以補腎煎散

鱉甲醋炙柴胡　生地黃　大黃煨　當歸　當

赤茯苓　乾漆炒黒　石膏各一兩　白朮　芎藭各二兩　小麥五十粒

有汗加麻黄根一兩共為末每服三錢

一少男室女婦婦婦勞骨蒸內熱風血攻疰四肢者此方主之

○此攻勞之方也少男愚其女而不得則有留血婦婦有所思則氣結而有留瘀其理一而已謂之留者精血已離其位但留于經脉關要之區陣寒氣血流行之道也氣陽也陣而塞之則積陰為疰故令四肢攻疰曰風蒸骨熱血陰也陣而塞之則積陰為疰故令四肢攻疰曰風血攻疰四肢者風血內搏四肢無力而倦怠浮腫也鱉甲乾漆攻堅削積之品也所以治精血之留結柴胡石膏解肌清熱之蒸也所以去骨蒸之內鬱恩則火結于心包故用常山以開其結鬱則氣留于大腑故用大黄以推其陳留婦生地

生薪血也白朮芎藭致新氣也赤茯苓所以導丙丁之邪浮小麥所以止骨蒸之汗而麻黄根之加乃以其形中閉為止汗之最梗尔東坡云此黄州吳判官之方也療骨蒸肌熱盜汗極効吳君寶之不肯妄傳也雖然此攻擊之劑惟少男室女婦婦真氣完固始可用之若男婦交接氣弱者猶禁與也

增補桃仁丸

桃仁一百二十枚去皮尖双仁不用

只此一味杵丸平旦井花水下隔日一服百日不得食肉骨蒸日久者此方主之○骨蒸日久則終有留血不去其蒸諸藥不効外臺此方以桃仁獨味為丸所以消留瘀也超人亦是之見

增補大黄䗪蟲丸

大黄蒸十兩　黄芩炒二兩　乾地黄半兩　杏仁去皮尖

蟅蟓炒　蜚蠊去翅足炒各一升　甘草三兩　乾漆炒
桃仁去皮尖各一兩　芍藥四兩　水蛭百枚炙黃　虻蟲去翅足炒半升

右十二味為末蜜丸如小豆大日三服每服酒下五丸

仲景云五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷肌傷勞傷經絡營衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目暗黑緩中補虛大黃䗪蟲丸主之○大濁陰不降則清陽不升者一天地之道也小人不退則君子不進者家國之道也故蒸熬之又內有乾血乾血不去則新血不生者人身之道也是方也乾漆桃仁蜚蠊水蛭蟅蟓虻蟲去乾血之品也君以大黃是憑命于將軍矣佐以芍藥地黃生新血也佐以杏仁甘草致新氣也佐以黃芩驅遊熱而堅胃也仲景為百代數言宗良有識矣今世人一遇一五勞羸瘦困滋陰而不愈則坐以待

斃嗚呼術豈止於此哉

增補百勞丸

當歸炒　乳香　沒藥　人參各一錢　大黃四錢

水蛭炙黃　蜚蠊去翅足炒　虻蟲去翅足炒各十四枚

右為末煉蜜作丸如梧桐子大都作一服可百丸五更百勞水下取下惡物為度服白粥十日百遍即甘瀾水也

一切勞瘵積滯不經藥而成壞証者此方主之○此醫大夫傳張仲景之方也疾不經藥而成壞証則中氣尚未壞也有積滯者宗熟之後內有乾血也故乳香沒藥大黃蜚蠊水蛭消瘀逐敗之品用當歸所以生新血用人參所以固元氣耳此與䗪蟲丸若合一轍皆推陳致新之義也

失血

凡諸症見血皆見氣飢隨其上下以驗所出失血飢貴況細詵見洪大後必難治

吐血　衄血　咳血　嘔血　溺血　便血　腸風

一藏毒一

血證者人身之血血為榮氣為衛心主血肝藏血脾為總管血隨氣行氣通則血通臟得血而能津腑得血而能潤目得血而能視舌得血而能言手得血而能握足得血而能攝榮衛晝夜循環運行不息若是勞傷火動皆令失血一切血症皆屬於熱藥用清涼俱是陽盛陰虛大戴血上錯經妄行而為逆也用犀角地黃湯隨証加減鮮血者新血也用止之紫黑

咸塊者瘀血也宜去之已後俱用補榮湯加減調理失血飢沉細和緩不宜浮大實大血得熱則行得冷則凝赤屬火而黑屬水也見黑必止理之自然始或暴吐紫血多者無事是一平昔熱傷死血在胃口吐出為好若止早吐不盡後成血結塊痛難治用活血湯加減方見腹痛若先吐血後見痰者是陰虛火動用滋陰降火湯加減若先痰後見血者是積熱清肺湯加減治之

吐血者出於胃吐出全是血也

○犀角地黃湯　治一切吐血衄血咳血咯血嗽血皆治之

犀角鎉　牡丹皮半　生地黃三　赤芍藥一半

當歸一　黃連一　黃芩一錢

右剉一劑水煎熟入芽根汁磨京黑調服○吐血加天門冬

山梔子阿膠蛤粉炒○衄血加山梔阿膠○咯血加山梔麥門冬黃栢知母熟艹○嗽血加山梔麥門冬黃栢知母熟艹○凡吐紫黑血塊胸中氣塞加桃仁大黃

○治諸血上攻不問男女並治

皮硝二錢為末用童便一鍾好黃酒一盞頓熟化硝調勻服

○治吐血不止方將本人吐的血取來用砂鍋焙乾為細末每服一錢或一錢二分麥門冬去心煎湯調下

○七生湯 治血向口鼻中出如泉湧者諸藥止之不効

生地黃 生荷葉 生藕汁 生韭菜

生茅根各一兩 生姜五分

俱搗自然汁一碗磨京墨和汁同服

○管仲湯 治吐血成斗命在須臾

管仲二分 血餘五分燒灰

側栢葉搗汁一碗

先吐痰而後見血者是積熱也

○清肺湯

茯苓去皮 陳皮 當歸 生地黃 芍藥

天門冬去心 麥門冬去心 黃芩 山梔 紫菀

阿膠炒蛤粉炒 桑白皮各等分 甘草減半 烏梅一個

右剉一劑棗二枚水煎溫服○喘急加蘇子去天門冬

先吐血而後見痰者是陰虛也

○滋陰降火湯 治吐血後見痰乃是陰虛火動方見虛勞

○清火滋陰湯　治吐血咳血嗽血唾血嘔血、

天門冬去心麥門冬去心生地黃　牡丹皮　赤芍
梔子仁　黃連去毛　澤瀉　赤茯苓去皮茸草　山藥　山茱萸酒蒸去核

右剉水煎入童便同服、

若吐血衄血咳血唾血用六味丸加犀角阿膠炒各二兩方見一人氣上奔吐血心膈痛、

枳殼三錢青皮二錢桔梗　牡丹皮各一錢半　桃仁二十箇川芎　黃芩
黃連各一　茸草少　生乾姜分四劑水煎服、

一暴吐紫血一碗者無事、吐出好、此熟傷血宛肝中宜服四物解毒之類、

一吐血覺胸中氣塞、吐紫血桃仁承氣湯下之方見傷寒、

一男子吐血、遇勞即作、余以為氣傷、加麥門五味、山藥熟地桂枝神遠志服之而愈方見補益、

一男子咳嗽吐血熱渴瘀盛盜汗遺精、余以為腎水虧損用六味以壯水而愈後因勞怒忽紫血成塊上

○花乳名又名花葉石岩棗味九料加麥門五味、煎先用花蕊石火煅存性為末二錢童便黃酒溫熱調服以化之、又用獨參湯以補之仍用前藥調理逐愈後每勞則咳嗽有痰吐血、脾肺腎三虛皆洪數用補中益氣加貝母茯苓山藥山藥麥門五味與前藥同煎而愈方見補益、

○花乳名又名花葉石岩棗曰黃石中間有淡白點以此得花之名口經作花蕊石是取其近黃色

○黃芩之咳增厚用此黃芩積五仙膏

○清咯湯　當歸　芍藥　生芪　貝母　薄荷少許　甘草少

梔子 各一 黄連 七分 赤芍 桔梗 各五 生甘草

豉 一合 一碗 重湯煮 温服 隨服隨止 ○一方 用人乳一半 好酒童便

右剉一劑 水煎入童便共服 ○一方 治鼻衄久不止 驢

鞭葉七枚 綿裹 搥五

糞焙乾 爲末 血餘燒灰等分 每用少許吹入鼻中 立愈 ○一方 用

白龍骨末 吹入鼻中 立愈 ○一方 用燒紙七層 水濕於頂門

上 以熨斗熨之 即止 ○一方 用大蒜去皮搗如泥 左鼻出 右鼻

左脇心 右鼻出 右脚心 兩鼻出 左右俱驗

咳血者 出於肺 咳嗽 喉中常有血 ○清咳湯 八

當歸 白芍藥 桃仁去皮尖 貝母去心 一白朮去芦

牡丹皮 黄芩 梔子炒黑 各七分 青皮去穰 桔梗 各五分

咯血者 出於胃 咯出血盛也 ○清咯湯

陳皮 半夏 麦門冬 伏苓 去皮 知母

生甘草 各一 桔梗 一 梔子 炒黑 各七分

桑皮 一錢 甘草五分 柳枝二分

右剉一劑 生姜三片 水煎温服

唾血者 出於腎 鮮血隨唾而出也 ○清唾湯

知母去毛 貝母去心 桔梗 黄柏 各一 桑白皮 一錢半

遠志去心 天門冬去心 各一錢 麦門冬去心 一錢半 玄參 一錢半

乾姜 炮 一錢 墨 半

右劑前水煎温服
諸失血者止後宜調理之
○補榮湯 治吐血鮮血咯血嗽血唾血無用此調理
當歸 芍藥 生芐 人參 熟芐 麥門冬去心 陳皮各等分 甘草減半
芡苓去皮 梔子 麥門冬 各減半
烏梅一箇
右劑一劑水二鍾煎一鍾温服
渴血者小便出血心移熱於小腸也
○清腸湯
當歸 生芐 倍梔子 黄芩 黄柏
麥門冬去心 赤苓 木通 各等分 知母 甘草減半
右劑一劑燈心二團煮二鍾煎一鍾温服○溺血並中痛

加滑石枳殼去芍藥芡苓
便血者大便出血臟腑經積濕熱也
○清臟湯 治大便下血不問糞前糞後并腸風下血
當歸酒洗川芎五分生芐一錢白芍炒 黄連炒各六分
黄芩炒 梔子炒黑 黄柏炒各七分 地榆八分 槐角炒五分
右劑一劑水二鍾煎一鍾温服
○滋陰臟連丸 治大便下血去多心虚四肢無力面色萎黄
懷生芐 熟芐 山茱萸酒蒸 牡丹皮 各等分
右劑一劑水一鍾煎一鍾温服○腸風下血
白木香 烏梅肉 各等分
右劑一劑水煎空心服○腸風加荆芥五分○氣下墜加升麻五分
○心血不足加茯苓六分○虚寒加炒黑乾姜五分一方去
阿膠加若參七分

愈風一真人藏腸痔漏可互見
槐角子 槐夾

澤瀉　白茯苓去皮各二兩　山藥四兩
川黃連酒炒　槐花人乳拌蒸　川大黃酒蒸九次以上各三兩

右俱為細末、裝入雄猪大臟內、兩頭用線扎住、糯米三升、水浸透煮去水、將藥賜藏糯米飯內、蒸一炷香時為度、搗藥賜為丸如梧桐子大、每服八十丸、空心鹽湯送下、

一虛人大便下血、用補中益氣湯加炒阿膠酒炒椿根皮地榆槐花、方見補益、

腸風下血者、必在糞前、名近血也、

○栢葉湯

側栢葉　當歸　生艾葉　黃連　枳殼
槐花　地榆　荊芥各等分　甘草減半

右剉一劑、烏梅一箇生姜三片、水煎空心服、

○地榆散

烏梅燒存性去核五箇　枳殼麩炒一兩
黃連三錢炒　地榆二錢　荊芥穗三錢白並一錢

右為細末、每服三錢、空心酒調下、遠年者、服至斷根為度、

解毒湯　一名八寶湯治臟下血也、

黃連　黃芩　黃柏
槐花絡石各一錢　甘草各四分

右剉一劑、水煎空心服、

○槐花散　治囊後紅

當歸　地榆各一錢半　升麻各七分　枳殼　槐花

側柏葉各五
灸法一治下血無度
灸脊中對臍二七壯五七壯或百壯不再發
補遺方
○清榮槐花散一治便血不拘新久
當歸酒洗 川芎酒炒 槐花炒 白芍酒炒 生地黃酒炒 黃芩酒炒 黃連酒炒 各一錢 枳殼麩炒 蒼朮 各八分
槐角八分 防風六分 升麻四分 荊芥穗八分 生甘草四分
右剉劑水煎空心熱服渣再煎服
○地榆槐角丸一治腸風積熱下血痔漏疼痛久服除根
當歸酒洗 川芎酒炒 各一兩 白芍酒炒 生地黃 各二兩 黃連酒炒一兩
條芩一兩 黃柏酒炒 槐一兩 地榆二兩

槐角 防風 各一兩 荊芥五錢 枳殼去穰二兩 黃根五錢
側柏葉五錢 補五錢 甘草二錢
右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十丸空心漆白水送下或好細茶亦可

○寶腸化毒丸治腸風下血未白痢疾
黃連去鬚 猪大腸二條洗淨將黃連入內煮一日晒乾 芍藥 生甘草 各為細末猪大腸搗為丸如梧桐子大每服百丸空心漆水下

一婦者素羞歡不時便血或在產後食少體倦面色痿黃此脾氣虛而不能統血以補中益氣湯加吳茱萸黃連

三十餘劑而再不發方見補血證之方意

增補四物湯

當歸酒洗 熟地黃酒蒸 川芎酒洗 白芍藥酒炒 各二錢

血不足者此方調之○氣血以身之二儀也天地之道陽常有餘陰常不足人與天地相似故陰血難成而易虧是方也當歸芍藥地黃味厚為陰中之陰故能生血川芎味薄而氣清為陰中之陽故能行血中之氣然草木無情何以便能生血所以謂其生血者以當歸芍藥地黃能養五藏和而血自生耳若曰四物便能生血則未也師云血不足者以此方調之則可若上下失血太多氣息微微之際則四物禁勿與之所以然者四物皆陰閉者天地閉生基之全非所以生萬物者也故曰禁勿與之

增補當歸補血

當歸二錢 黃耆一兩

男婦肌熱目赤面紅煩渴引飲脈來洪大而虛重按全無者此方主之○血實則身涼血虛則熱或以肌困勞役虛其陰血則陽獨治故令肌熱目赤而紅煩渴引飲此証純象傷寒家白虎湯証但脈大而虛非大而長為可辨耳內經所謂脈虛血虛是也當歸味厚為陰中之陰故能養血而黃耆則味甘補氣者也今黃耆多於當歸數倍而曰補血湯者有形之血不能自生生於無形之氣故也內經曰陽生陰長是之謂耳東垣云此証誤服白虎者必死潔古識此勿令誤之

補陽益氣湯

人參去蘆二兩

凡上下失血潤肺微欬絕者急投此方主之○血者氣之

守氣者血之衛相偶而不相離者也一或失血過多則氣為孤陽亦將飛越矣故急脫全腹微欲絕斯時也看形之虛不能速生幾微之氣所宜急固微用甘溫之參以固元氣所以權輕重於幾急之際也故曰血脫益氣古聖人之法或者不達此理見其失血而主四物湯則川芎之香竄能散微之氣而當歸芍藥地黃皆滋膩之品不能生血于一時反以失救死之權而速人夭折矣尊云乎哉

增補四生丸

生荷葉　生艾葉　生地黃　生栢葉

四件爛搗丸如雞子大每服一丸

陽能於陰血熱妄行或吐或衄此方亦良○統而論之生之則無不生守能去火然而論之則荷葉輕香去火于氣芷

栢葉善凉血入于陰火去則血歸經而吐衄自愈矣

增補栢根散

茜根　阿膠　黃芩　側栢葉　生地黃酪　炙甘草紐

陰虛衄血者此方主之○茜根之在人平則治偏則病若腎陰一虛則陽勝矣故載血上行而令衄是方也阿膠能補虛黃芩能養陰甘草能緩急而根側栢生地黃則皆去血中之熱能生陰於火亢之時者也

增補苗芩湯

黃芩炒　白芍藥酒炒　牛蒡子炒　甘草各三錢

陰火載血上行衄而不止者此方亦主之○黃芩之苦能降火芍藥之酸能收陰甘草之甘能緩急增補上衄散

黃耆六錢未焦 白芍藥一當歸 生地黃
阿膠珠三

飢困勞役動其虛火致衄不止者此方主之○飢困勞役而動其火其人本虛可知火虛故用黃耆當歸阿膠耳温之品以補之然耆芪能實表能消水能瀉丙丁白芍藥能收陰氣生地黃能涼血熟地三物者去血中之熱自是冲和但久連苦寒之劑殊別耳火宜用連芩虛火則惟此類為宜也或問虛火何以辨之余曰声高氣壯為實火言而微終日後言為虛火

增補人參飲子

人參 黃耆各一錢 當歸五分
甘草 白芍藥各一錢五味子九粒
麥門冬 當歸

暑月衄血此方主之○內經曰必先咸氣無伐天和故時當暑月則肺經受邪令人之氣之時也理宜清金益氣清金故用麥冬五味益氣故用甘草參耆芍藥之酸所以收其陰當暑月衄血此方主之○內經曰必先咸氣無伐天和故時當暑月則肺經受邪令人之氣之時也理宜清金益氣清金故用麥冬五味益氣故用甘草參耆芍藥之酸所以收其陰當歸之辛所以歸其血此亦虛火可補之例也

增補榴花散

百葉榴花陰乾為末

衄不止者以此末吹入鼻中立止○榴花之紅可使入血榴花之澁可使止血一味當關此藥近之

增補丹溪咳血方

青黛飛過 瓜蔞仁去油 詞各等分

咳嗽咳血者此方蜜丸嚼化○肺者至清之藏纖芥不容有氣有火則咳有痰有血則嗽咳者有聲之名嗽者有物之義也青黛山藥所以降火瓜蔞海粉所以行痰詞子所以斂肺

然而無治血之藥者火去而血自止也

增補荷葉散

荷葉不拘多少焙乾為末

咯血此方亦良○氣分有火則令人咯父久咯之則動其血緒氏曰血雖陰類運之者其和陽乎荷葉有仰盂之形得震卦之象有輕香之氣得清和之体故能和陽定咯而運血

增補大補丸

黃柏一物炒褐色作丸

嘔血者此方主之○嘔與咯不同聲出于上焦為咯重而短也聲出于下焦為嘔濁而長也黃柏苦而潤苦故能瀉火潤故能就下也

增補側柏散

側柏葉一味為末飲調下三錢

此亦治嘔血之方也○側陰象也柏過寒而不凋得陰氣之最厚也故能入陰而瀉嘔逆之火然其性微香則其妙又能和陽而不偏於陰矣此其所以為良也

增補小薊飲子

小薊 生地黃 滑石 通草 蒲黃炒 藕節

淡竹葉 當歸 梔子炒 甘草各半兩

下焦結熱血淋者此方主之○下焦之病責於溫熱經曰病在下者引而竭之故用生地梔子涼而導之以竭其熱用滑石通草竹葉淡而滲之以竭其濕用小薊藕節蒲黃消而逐之以去其瘀血當歸養血於陰甘草調氣於陽合人治下焦瘀熱之病必用滲藥開其滿藪者圖師必段之義也

增補小劑琥珀散

小劑 琥珀等分爲末

此亦治血瀉之方也○劑雖能治下焦瀉血琥珀能治膀胱結

增補牛膝膏

牛膝三斤搗膏一斤空心鹽水化下四錢

此亦血瀉之方也○牛膝實潤而苦酸形實而脩長質潤故能活血苦寒故能勝熱形實故能疏下脩長故能導小腸而利膀胱

增補玄胡索散

玄胡索一兩 朴硝三分

此治陽邪酳入下焦令人尿血之方也○陽邪者熱病傷寒之毒也下焦者陰血所居陽邪入之故令尿血玄胡索味苦

而苦故能勝熱苦故能堅血下而已

增補胃風湯

人參去芦 白朮炒 當歸酒洗 白芍藥炒 桂妙各 川芎洗淨 茯苓去皮 桂妙各 甘草炙各等分

風邪入於腸胃泄下鮮血或腸胃溫毒下如豆汁瘀血者此方主之○風陽邪也血得之則善行故下鮮血溫陰邪也血得之則敗壞故如豆汁氣血虛而後邪湊之故用人參白朮茯苓以補氣用川芎當歸芍藥以養血肉桂之辛可以散風邪肉桂之熱可以燥濕毒無氣得之可以益氣又曰白朮茯苓能壯脾而療溫川芎肉桂能入血而

驅風

增補槐花散　校嚴麟炎手分

槐花炒黑　側柏葉炒　枳殼麸炒等分

共為末每服三錢空心下

腸風臟毒下血此方主之○槐花則柏能涼大腸之血刺芥枳殼能疏大腸之風風熱相搏有治之良

增補酒煮黃連丸

黃連十二兩　好酒五升煮乾為末作丸每服三錢

濕熱酒毒令人便血者此方主之○黃連苦寒枯燥之物也苦寒故能勝熱枯燥故能勝濕而必煮以酒者非酒不能引之入血也

增補柏灰散

側柏葉一味燒灰存性研細

腸毒下血不止者此方主之○臟毒之初宜涼血涼血皆苦寒之藥久久則氣寒而血益不固矣法曰瀉可以固脫故用柏灰之澁以止之四時采之必辯其方者取其得氣之厚也

他如乾柿餅燒灰亦良

增補人參攀皮散

人參去蘆　攀根白皮等分每末三錢

臟毒挾熱下血日久不止者此方主之○臟毒腸毒毋也挾熱者謂挾客熱與飲酒之類也日久不止則氣亦虛而不足以固血矣故用人參之甘以補氣攀根之澁以固血補以舉之澁以却之雜作之治也

惡疰

惡熱非熱明是虛証經曰陰虛則發熱陽在外為陰之衛陰在內為陽之守精神外馳淫慾無節陰氣耗散陽無所附遂致浮散於肌表之間而晉熱也當作陰虛火動治之

惡寒

惡寒非寒明是熱証亦有火服熱藥而得者何謂火極似水熱甚而反覺自冷實非寒也有用熱藥而少會卒能發散譬猶湯潑開耳又曰火熱內熾寒必盜外故惡寒而實非寒症凡皆惡寒其脈洪數小水赤黃茶次皮硝五錢溫水化服而愈陽虛也用參芪之類加附子少許

一婦人六月惡寒之極恰似風雖穿綿襖亦不覺熱此火極似水也六脈洪數小水赤黃茶次皮硝五錢溫水化服而愈

汗證

汗飜浮虛或濡或濇自汗在寸盜汗在尺自汗太陰生黃芪以盜汗者屬陰虛睡中而出醒則而止也

○當歸六黃湯　治盜汗之聖藥也

當歸　黃芩　黃連各七分　右剉一劑水煎漏口服

○當歸地黃湯　治盜汗屬氣血兩虛者

當歸　生地黃　熟地黃　白芍酒炒各一錢　人參五分　白朮去蘆炒　茯苓去皮各一錢　黃耆蜜炙　甘草三分　陳皮一錢　入棗一枚　水煎服

醫王發熱五具大全六補ノ六味加減ノ味ノ歸脾ノ

右剉一剂、棗一枚、浮小麥一撮、水煎温服、
自汗者、陽虛時常而出也、

○參芪湯　治自汗

人參去芦　黄芪蜜炒　白木去芦　茯苓去皮　當歸酒洗
熟半夏各一錢　甘草炙二分　加白芍酒炒酸棗仁炒　牡蠣煅各一錢
陳皮七分　烏梅一個

右剉一剂、棗二枚、浮小麥一撮、水煎温服、
盜汗自汗者、宜實腠理也、

○白龍湯　治男子失精、女人崩交、自汗盜汗等症、

桂枝　白芍酒炒　龍骨煅　牡蠣煅各三錢　甘草錢二

右剉一剂、棗二枚、水煎服、

○四製白木散

白木四兩　黄芪炒一兩半　防風炒一兩　石斛炒一兩　茯苓炒一兩　止用白术為末、每服三錢、粟米湯調服、

○文蛤散　治自汗盜汗、

五倍子為末、用津唾調填滿臍中、以絹帛繫縛一宿、即止、加枯礬末尤妙、

○又方、用何首烏末、津唾調填臍中、即止、

心汗者、心孔自汗、別處無也、名曰心汗、因憂思悲恐驚勞傷鬱結而成、

○茯苓補心湯　治心汗症、

茯苓　人參　白术　當歸　生地黄
酸棗仁　白芍　麥門冬　陳皮　黄連炒各
辰砂研末臨服　甘草三分

右剉一剂、棗二枚、烏梅一箇、浮小麥一撮、水煎食遠服、

頭汗者、邪搏諸陽之首也、其症渴飲漿水、小便不利、此濕熱也、必發黃、用茵陳湯、或五苓散二藥之分為有虛實故也、

大汗髮濕、喘而不止者、死也、

黃汗者、汗出染衣黃如栢汁是也、

問曰、黃汗之為病、身脉腫發熱、汗出而渴、狀如風水、汗染衣色正黃如栢汁、此何從得之、師曰、以汗出時入水中浴水從汗孔入得之、宜服

○三仙酒、

黃芪蜜炙 白芍酒炒 桂枝 三錢

右剉一劑、酒煎溫服、

原病式曰、心熱則汗出、亦有火氣上蒸胃中之濕、亦作汗、涼膈散主之、方見火

自汗不休、因內傷及一切虛損之症所得者、用補中益氣湯、

柴胡 升麻 俱用蜜水炒 少加製附子 麻黃根 浮小麥 方見補益

若陽盛陰虛、盜汗者、用當歸六黃湯、方見前、

若陽氣虛弱、汗出不止、肢體倦怠、急用參附湯、方見眩暈、

若上熱喘急、盜汗氣短、頭暈者、用參附湯、方見眩暈、

若腎氣虛弱、盜汗發熱者、用六味丸、方見補益、

若腎氣虛乏、盜汗而寒者、用八味丸、方見補益、

若氣血俱虛而盜汗者、用十全大補湯、方見補益、

○治脚汗方、

白礬 玉鐵 乾葛 五錢為末、水煎、逐日洗、連五日、自然無汗、

增補汗証門方自

增補大補黃耆湯

温故用猪苓湯傷寒論
紅花歸稍所以消瘀五味子麻黄泉收汗液而固表虚生芪
黄芩涼陰血而除湿熱
增補當歸六黄湯
當歸 生地黄 熟地黄 黄柏各等分 黄芩 黄連 黄耆 梔用
陰虚有火令人盜汗者此方主之○醒而出汗曰自汗睡去
出汗曰盜汗自汗陽虚也曰有火者謂其証有面
赤口乾唇燥便赤声重脉乘数也然陰虚所以盜汗者陰
虚之人睡去則衛外之陽乘虚陷入于陰中表液失其固衛
故令濈然而汗出人覺則陽用事衛氣復出于表表實而汗
即止矣當歸熟地養血之品也生芪黄芩黄連去火之品也生芪

黄耆 人參 肉桂 各等分 當歸 肉蓯蓉 山茱萸 去核 白朮 炒
防風 烏梅 一枚 甘草 半錢 熟地黄 三錢
氣血俱虚自汗者此方主之○人參黄耆白朮茯苓甘草防
風肉桂實表氣而止自汗當歸川芎熟地肉蓯蓉山茱萸五
味子生津液而收陰氣此氣血兩補之劑也
增補調衛湯
麻黄根 黄耆各一 麥門冬 去心 各等分 生地黄 各三分
羌活 七分 猪苓 蘇木 紅花 各二分
濕熱自汗一身盡痛脈濡者此方主之○濕無熱不作汗濕
得熱而蒸之則蔽令人自汗濕流百節故一身盡痛濕為陰
氣故脈濡風能勝濕故用羌活辛能燥濕故用半夏淡能滲

黃耆可以養陰亦可以去火而黃耆者所以補表氣於盜汗之餘也是盜汗也與傷寒盜汗不同傷寒盜汗是專表半裏之邪未盡雜證盜汗則陰虛而已彼以和表為主此以補陰為主明者辨之

增補黃耆六一湯

黃耆大斤炙　甘草一錢炙

虛脫已後盜汗者此方主之○虛處者陰虛而形氣將脫如大病之餘新產失血之後也斯時也更有盜汗寧不復傷其氣血乎故用黃耆七之六甘草七之一大補其氣而汗自止或問何以不用養血之藥余曰太極之妙陰生於陽故無形能化有形無形者氣有形者血耳若虛脫之際而責養陰之藥以固脫是以陰及陰二女同騙烏能衛外

增補正氣湯

黃柏炒　知母炒各一錢　甘草炙五分

此治陰虛有火令人盜汗之方也○陰虛則陽獨治故令有火火盛亢則陰益虛則睡去之時衛外之陽乘虛而入衛虛無以固表故令盜汗經曰壯水之主以制陽光故用黃柏知母一毋者寒實滿之品以主之者能瀉陽火寒能勝熱質潤能滋陰佐以甘草者以其陰陽耳

眩暈

風寒暑濕氣會生涎下虛上實胃脘風浮寒緊濕細者虛弦而滑滑亢而滿數大俱屬大火邪虛大又極先理氣療火隨症加

眩者言其黒運旋轉其狀目閉眼眩身轉耳聾如立舟車之上
起則昏倒豁屈極秉寒濕之甚不可一途而取軌也
大凡頭眩者痰也

○清暈化痰湯 治頭目眩暈

陳皮去白 半夏湯洗七次 茯苓去皮各 甘草炙 草三分 川芎八分
白芷 羌活各 細辛各 南星炮 一錢 防風 有熱加黄連 大分 黄芩酒炒 分 人參七分 白朮一錢
血虚加川芎當歸 肥人頭眩者屬氣虚温痰也
右剉一劑生姜三片水煎温服 以此作丸亦可

○四君子湯 治氣虚濕痰頭眩

人參去蘆 白朮去蘆 茯苓去皮 黄芪蜜炙 當歸
瘦人頭眩者屬血虚痰火也

○四物湯加減 治血虚痰火頭眩

當歸 川芎 白芍酒炒 熟地

片芩 山梔 茯苓去皮 天麻各等 甘草減半

右剉一劑生姜三片棗一枚水煎温服
忽時眩暈倒者是風痰虚浮滑也

○二陳湯加減

茯苓去皮 陳皮 羌活

防風 人參 當歸

白朮去蘆 枳實麩炒 南星姜製 川芎

桔梗去蘆 白芷各 甘草減半 人參減半 陳皮

瓜蔞仁 各等分 甘草少

右劑一劑水煎入竹瀝姜汁同服、

勞役之人飢寒眩暈者、乃虛弱也、

○補中益氣湯加減 方見內傷、

依本方加半夏熟地黃白芍天麻、

陰虛火動眩暈者、亦必數也、

○滋陰降火湯加減 方見虛勞、

依本方、加川芎天麻山梔竹瀝少許、

虛極欲倒、如坐舟車、手足冷者、亦沉細也、

○參附湯 治真陽不足、上氣喘急短氣自汗 眩暈、

人參五錢 大附子一枚 炮三

右劑一劑、生姜十片水煎熟服、

若泄瀉多而眩暈時時自冒者難治也、

頭旋眼黑、如在風雲中者、乃胃氣虛停痰而致也、

○半夏白朮天麻湯 方見頭痛、

頭目昏眩者、乃風熱上攻也、

○防風通聖散 治風熱上攻頭目昏眩悶痛、痰喘咳嗽、依本方去麻黃芒硝、加菊花人參砂仁寒水石、方見中風、

臨事不寧、眩暈錯雜者、此心脾虛怯也、

○滋陰健脾湯 此治氣血虛損有痰作眩暈之仙劑也、

當歸酒洗 一錢 川芎五分 白芍酒炒 八分 生地黃酒洗 八分 人參七分

白朮五分 白茯苓一錢 陳皮去心 各分 甘草炙 四分

麥門冬去心 遠志去心 七分

右劑一劑、姜棗水煎早晚服、

大學士中玄高公患頭目眩暈耳鳴眼黑如在風雲中目中溜火一醫以清火化痰一醫以滋補氣血俱罔效余診六飜洪數此火動生痰以酒蒸大黃末三錢茶下一服而愈蓋火降則痰自消矣

一熊槐二官年六十餘身躰胖大因診其飜下手即得五至一止予乃驚曰君休矣渠曰連日微覺頭暈別無恙也何故出此頗實教焉余曰越十日用藥相酬而退少頃間中痰求救於余見其必不可治令以香油灌之即醒踰十日果卒

麻木

飜血飜浮而濡腐氣血匿關前得之麻在上体關後得之麻在下也麻是渾身氣虛也

○加味益氣湯

黃芪蜜炙 人參 白朮去蘆 陳皮 當歸酒洗 升麻 柴胡 木香磨 各五分 川芎各三分入 桂枝少許甘草三分

右剉一劑姜棗煎服

○治十指盡麻并面目皆麻此亦氣虛也以補中益氣湯加木香藿門冬香附羌活防風烏藥立愈

○加味八仙湯 治手足麻木

當歸酒浸 川芎七分 白芍八分 熟苄酒浸七分 人參六分 白朮酒浸四分 半夏姜製 桂枝三分 柴胡四分 羌活五分 防風五分 秦艽六分 牛膝六分 甘草炙四分

右劑一劑姜棗煎食凌服
木是濕痺死血也、

○雙合湯

當歸　川芎　白芍　生地黃
半夏　升麻　桃仁去皮　陳皮
炙甘草各一錢　紅花三分

白芥子一錢　甘草三分

右劑一劑生姜三片水煎熟入竹瀝姜汁同服、
凡人遍身麻痺請之不仁、皆因氣虛受風濕所致也、

○祛風散

生川烏　白朮　白芷各錢三　甘草二錢

右為末調酒吞下五補丸、

○五補丸

黃芪炙　人參　白芍酒炒各
大附子一個麵包裹去皮臍　當歸三錢

右為末煉蜜為丸用祛風散送下、

婦人手足麻痺者七情六鬱滯經絡也、

○開結舒經湯

柴蘇　陳皮　香附　烏藥　川芎
蒼术米泔浸炒　羌活　南星
桂枝　甘草炙各四

右劑一劑生姜三片水煎臨服入竹瀝姜汁少許同服、

○麻骨方　白頭麻至心窩而死者或自足心麻至膝蓋而死者、用人糞燒灰用瓦盛調飲即止、

○又方　治症同前

用練子燒灰研細末每服三五錢黃酒調下即止

○加減天麻湯　治頭目四肢麻木飲食少用不時眼黑

半夏湯洗七次八分　白朮用麵炒色不油七分　天麻用煙實者用紙包煨濕透五分　神麯炒五分　茯苓五分　川芎二分　澤瀉五分　陳皮一錢　防風二分　甘草炙三分　白芷二分　黃芪三分　人參去芦二分　粳米泔製一撮

右剉一劑生薑三片黑棗二枚煎至八分食遠服

癲狂

癲癎之症陽浮陰沉數熱滑疾狂發於心驚風肝癎弦急可柔浮病腑淺沉病臟深癲屬陽大滑者生沉小緊急者不治○熱狂屬實大者生沉小者死癲屬陰虛可治實則死

狂者大開目與人語所未嘗見之事為狂也

譫語者合目自言日用嘗行之事為譫也○又蓄血症則重復語之

常

音

鄭聲者聲顫無力不相接續造字出於唇中為鄭聲也

陰附陽則狂陽附陰則癲脫陽者見鬼脫陰者目盲

癲者心血不足也又云癲者喜笑不常顛倒錯亂之謂也

○養血清心湯

人參去芦　白朮去芦　茯苓去心　遠志去心酸棗仁炒

川芎　生地黃　石菖蒲各當歸一半　甘草五分

右剉一劑水煎服

○遂心丹　治癲癎風痰婦人心風血邪

甘遂一錢半實者為末用豬心取管血三條和遂末將心刀

枇作兩遍以麥麩末入在內將線縛定外用綿紙裹濕慢火煨
熟不可焦了取末研細入辰砂末一錢和勻分作四九每服
一九將煨藉心煎湯化下大便下出惡物取効
狂者痰火實盛也又云狂者狂亂而無正定也
○防風通聖散　治一切大風癲狂之疾方見中風
依本方加牡丹皮生地黃桃仁
○清心九　治心受邪執精神恍惚狂言叫呼睡臥不寧
右為末湯泡蒸為丸梧桐子大每服三十丸人參湯下
喜笑不休者心火之盛也
以滄鹽二兩火燒令紅赤研細以河水一大碗煎至三五沸

待温分三次啜之以鈆探於喉中吐出熱痰次服
○黃連解毒湯方見傷寒　依本方加
許而笑即止
婦人癲疾歌唱無時踰墻上屋者乃營血迷於心包所致也
○加味逍遙散
當歸　白芍炒　白朮去芦　茯苓去皮　柴胡　生芔
遠志去心　桃仁去皮尖　蘇木
右剉劑煨姜一片水煎温服有熱者加入小柴胡湯生芔辰
砂用水煎服
○牛黃膏　治婦人熱入血室發狂不認人者
牛黃二錢　朱硃　麝金各三腦子　芔草各一
牡丹皮三錢

右為細末煉蜜為丸如皂子大每服一丸新水化下

○治失心風用紫河車煮爛雜於豬牛肚內吃神效

河車不必拘首生但無病婦人者佳

邪祟之症似癲而非癲有時明白但心者一身之主清淨之府外有包絡以羅之其中精華之聚萃者名之曰神通陰陽察纖毫無所紊亂稍有濁痰流入其中以主宰故昧其明言語交錯或精氣赤汁流通遂去濁物其言猶復儻也此名為痰迷心竅之患非邪祟也若以符水治邪祟用客其外不治此乃上膈之痰理宜先用吐法後當清痰順氣安神之藥調之病即安矣○痰多者口有聲有沫火者有熱色赤脈數是也癲乃痰疾病似馬羊鷄犬豬故有五癎應五臟不必多配大率主痰也重陰者狂罵言不避親疎重陰者癲言語交錯不嘉一病雖分陰陽多生於熱與痰耳

一婦人發狂棄衣而走踰屋上垣不識親疎狂言妄語人拿不住諸醫措手余令家人將涼水亂潑不記其數須臾倒仆形其飢六部俱弦數有力此乃熱極則生風也用防風通聖散加生地黃黃連桃仁紅花牡丹皮三劑而安後服祛風至寶丹全愈

癲癎狂門方首

增補大黃一物湯

大黃四兩 酒浸一宿 水三大盞煎之分三服不已再作

癲狂病者此方主之○凡怒為癲多喜為狂癲者精神不守言語錯亂妄見妄言登高而歌棄衣而走是也狂之始發少卧少飢自賢自貴妄笑妄動登高而歌棄衣而走是也癲病者責邪之

併于肝、狂病者責邪之併于心也、此皆實証宜瀉而不宜補
一故用大黃以瀉之、取其苦寒無物不降、可以瀉實、又必數月、後
方可與食、但得寧靜便為吉兆、不可見其瘦弱減食便以温
藥補之、及以飲食飽之、病必再作、戒之戒之、緩與之食方為
得體、故曰損其穀氣則病易愈、此所以然者、食入于陰長氣
于陽故也、

增補苦參丸

苦參一物為末蜜丸、先梧子大每服十五丸、薄荷湯下、

發狂無時、披頭大叫、欲殺人、不避水火者、此方主之、○上件
諸証皆神明內亂也、故古人病狂謂之失心、苦參主心腹結
氣、故足以治時熱狂言、

增補靈苑方硃砂酸棗仁乳香散

酸棗仁 硃砂 乳香 光緒己酉 半兩 一服

癲疾失心者、將此三物為末、都作一服、溫酒調下、善飲者以
醉為度、勿令吐服、療訖便安置床枕令臥、病淺者半日至一
日覺、病深者三二日覺、令人潛伺之、不可驚覺、使覺待其自
醒則神魂定矣、萬一驚覺、不可復治、○唐相國寺僧尼惠惠元
癲疾失心經半年、遍服名醫藥不効、僧俗兄潘氏家富、召孫
思邈療之、孫曰今夜睡着、明後日便愈也、潘曰但告投藥報
思不忘、孫曰有酸物但與師奭待渴却來、道夜分、僧果得渴
至遂來溫酒一角調藥一服與之、有頃再索酒與之半角、其
僧遂睡兩晝夜乃覺、人事如故、潘謝孫問其治法、孫曰衆人
能安神矣而不能使神昏得睡、此乃靈苑方中硃砂酸棗仁
乳香散也、人不能用耳、○正肅吳公少時心病服此一劑五

二日方寧遂癒（本事方）以此方加人參一兩名寧志膏煉蜜作丸如彈子大每服一丸薄荷湯化下楼師云族弟因失火失心劇此方與之服二十粒食頃覺多得去服之皆驗愚謂重可以去怯故珠砂能鎮心安神酸可使收引故棗仁能斂神歸心香可使利竅故乳香能豁達心志必酒調服醉者效盡其行乘力而成真大之功也許學士加人參者亦謂人參能寧心氣

增補白金丸

白礬三兩 鬱金七錢 滴乳香一錢

二味共為末糊丸梧桐子大每服五六十丸溫湯下

本事方云昔有一婦人癲狂失心數年未愈後過至人授此方初服覺心胸有物脫神氣未寧慈再服頓愈至人云此病因去

受醫得之痰涎包絡心竅此藥能去醫痰愚按白礬酸寒可以軟頑痰鬱金苦辛可以開結氣

增補鷄氣丸

附子 木香 白殭蠶 橘紅

天麻 麻黃略半 乾萬二兩 射香五分 腦子二分

硃砂一錢擱少 天南星浸汁一宿紫蘇葉各一兩

上件為末煉蜜丸如龍眼大每服一丸金銀薄荷湯下

本事方云戊寅年軍中一人犯法祧衣將受刑而得精神類失如痴呆與一丸服訖而寤及覺病已失矣提轄張載揚其妻因避寇失心已數年手授此方不終劑而愈又黃彥奇妻往慶者逾十年諸醫不驗手授此方去附子加鉄粉亦不終劑而愈嵓謂殭蠶風痰射香腦子

木香陳皮可以通藏氣附子所以正元陽硃砂所以安神志
一麻黃乾葛紫蘇所以驅表而泄其驚氣也以鉄粉而易附子
一者亦以金能平木而責厥為肝逆故耳

癇證

(風)癇虛弦為驚為風癇
癇病者卒時暈倒身軟咬牙吐涎沫不省人事隨後而醒者是
癇病也有羊癇猪癇牛癇馬癇犬癇皆驚風熱痰俱用二陳
湯加減安神丸又有癲病者狂痰治狂痰宜二陳湯加減
諸癇者痰涎俱然也
(二)陳湯 治一切癇病

茯苓去皮 半夏 橘紅 枳實 炒 甘草 各一錢 生薑三分
枯梗 搗泥子 黃芩各一錢 瓜蒌仁

右剉一劑姜二片水煎臨服入竹瀝姜汁磨木香調衣砂末
癇屬氣血虛而無痰火者宜攻補兼施也
(○)清心抑膽湯 平肝解鬱清火化痰除眩暈諸癇之疾

當歸酒洗白芍酒炒 白朮去炒 茯苓去皮陳皮
半夏姜汁炒 枳實麩炒 竹茹 石菖蒲 黃連姜汁炒
香附炒 酸棗仁炒 麥門冬去心 川芎 人參 遠志去心
甘草四分

右剉一劑生姜三片水煎温服

(○)安神丸 治癇病常服

當歸酒洗 人參去芦 茯苓去皮 酸棗仁炒 生地黃酒洗

黃連四錢炒　陳皮去白　南星姜製各一兩　半夏湯泡七次　枳實麩炒　茯苓各一兩　竹瀝半盞　薑汁半盞

珍珠二錢　琥珀二錢　硃砂五錢為衣

右為細末　煉蜜為丸　如梧桐子大　每服五十丸　清米湯下　忌豬肉牛羊大馬等肉　胡椒蔥蒜

癎屬風疾者　宜追風祛疾也

○追風祛疾丸　治諸風癎暗風世之患　此病者甚多　余用此得効者甚廣　幸試之

防風去芦　天麻　殭蠶洗去絲炒　白附子炮　烏蛇酒浸去骨炙　全蝎去毒炒　各一兩

本膽南星　五錢　牙皂炮　一兩　白礬枯　五錢　半夏湯泡七次　研為細末　二兩

分用皂角膏為丸　分用生薑汁作糊為丸　南星半夏各一兩　皂角一半白礬水浸皆浸一宿

右為細末　姜汁打稀糊為丸　梧桐子大　硃砂為衣　每服七八十丸　食遠臨臥用淡薑湯送下　忌發物

加人參當歸各一兩　加人參當歸各一兩　加人參當歸各一兩

癎屬痰火者　宜化痰清火也

○清心滾痰丸　治癲癎驚狂一切怪症神効

大黃酒蒸四兩　黃芩四兩　青礞石硝煅各五錢　沉香二錢半　犀角五錢

皂角五錢　麝香五分　硃砂五錢

右為細末　水丸如梧桐子大　硃砂為衣　每服七十九　溫水送下

○虎睛丸　治癎疾發作　涎潮搐搦　精神恍惚　將作讖語

犀角一兩　虎睛一對炒　大黃一兩　栀子五錢　遠志去芯　石菖蒲去節　各一兩

右為細末　煉蜜為丸　菉豆大　每服二十丸　食後溫酒送下

○祛風至寶丹　治癲癎

防風　薄荷　荊芥　卷活　獨活　連翹

黃芩各一兩　黃連　梔子　全蠍　天麻
細辛　枳實　桔梗　薑連　大黃　芒硝　生半
夏　石膏　甘草酌　滑石　赤芍　細茶各一兩半　麻黃二錢臨症詳審或用或不用
右藥俱用溫水洗尤煽乾為末煉蜜為丸彈子大硃砂為衣
每服三丸無時細嚼并臥時茶酒任下如血虛加芎歸各一
兩氣虛加參朮各一兩
一小兒周歲從臬上仆地良久復甦發搐吐痰沫服定驚化痰
一等藥過驚即復作畢姻後不時發而難愈形氣俱虛面色痿
黃服十全大補補中益氣二湯而愈方見調益
王大參嗣君年十八歲患癇每發則仆地吐涎不省人事少頃
復醒或一月一發或兩月發四五次者七年遍醫弗効余診
大脉滑數人迎緊盛此氣血虛而有風痰壅併也以追風祛
痰丸加人參當歸黃連各一兩
而痊後有數人俱與此治皆愈
一小兒十五歲御女後復勞役考試失意患癇症三年矣遇勞
則發用十全大補湯加味歸脾湯之類更以紫河車生研如
膏入蒸糕米飯為丸如梧子大每服百丸日三五服而痊後
患遺精盜汗發熱仍用前藥及六味丸而愈此方治癇不拘
男婦老幼皆効

增補癇門方上卷

增補續命湯加紫蘇陳皮方。
竹瀝二升　生姜汁五合　磨黃各四兩　生栗汁二升　龍齒末
防風　防己　附子

石膏　桂枝　各二兩　陳皮去白　紫蘇各半兩

瘛疭者發則仆地悶乱無知噤舌吐沫皆反張目上視手足搐擲或作六畜聲者是也宜此方主之瘛疭者風疾之故也風陽氣也內經曰陽之氣以天地之疾風名之故其發也暴然所以令人仆地者厥氣併于上上實下虛清濁倒置故令人仆悶乱無知昔潤舌吐沫者風邪實于陽明之經絡上下齒縫中故之苗而脾之經絡連于舌本陽明之經絡入于口風邪實于心脾則舌自揳一挺一揳故令噤舌吐沫者風熱盛于內也此風來潮湧之象脊反張目上視者風在太陽經也是太陽之經起于睛明挾脊而下風邪干之則實而致急故目上視而脊反張也手足搐擲者風屬肝木肝木主筋風熱盛于肝則其一身之筋牽掣故

令手足搐擲也搐者四肢屈曲之名擲者十指開握之義也或作六畜聲者風疾鼓其氣竅而聲自發也譬之弄笛焉六孔閉塞不同而宮商別異是也是方也有麻黃桂枝防風紫蘇則可以泄作經之邪有竹瀝姜汁陳皮則可以清心肺之熱有鹽豉則可以行痰涎之滯有芒汁石膏則可以通塞若夫沉痼之疾非附子不足以行其滯而其大熱之性又足以益火之源而消陰翳譬之太陽中天幽谷之霧障無不消盡此古人用附子之意也

增損利驚丸

青黛　輕粉各一錢　牛黃　五分　天竺黃二錢

上件為末蜜丸黍米大每服一錢得利止後服

驚癎氣實者此丸與之癎疾之原得之於驚或在男腹之

時魂在有生之後必以舊恐而致疾故曰驚癇蓋恐則氣下驚則氣亂恐氣歸腎驚氣歸心伴於心腎則肝脾獨虛肝虛則生風脾虛則生痰畜極而通其發也暴故令風痰上湧而癇作矣經曰實者瀉之故用竹瀝黃青黛以瀉肝牽牛輕粉以瀉脾湯肝所以驅風瀉脾所以驅涎

健忘

健忘者爲事有始無終言發不知首尾此是病也名之非比生成思慮過也精神短少者多主於疾有因心氣不足恍惚多忘事者有因思慮過度勞傷心脾忘事者用人蔘棗仁養血補心心竅忘事者用瓜蔞棗仁養血補心脾忘事者用四醒脾湯加減治之大見疾飲

健忘者思慮傷心脾也又云健忘者健於思而忘其事也

久增珍珠丸治虛證天王補心丹多食亦可

○歸脾湯　治脾經失血少寐養熟盜汗或思慮傷脾不能攝血以致妄行或健忘怔忡驚悸不寐或心脾傷痛眩少食或憂思傷脾血虛發熱或肢躰作痛大便不調或經候不准晡熱內熱或瘡瘍流注不能散潰飲

人參　白朮炒　黃芪炒　白茯苓去皮　龍眼肉
當歸　遠志甘草湯浸去心　酸棗仁炒　絡木香　甘草炙各五分

右剉一劑生薑三片棗一枚水煎服

本方加柴胡山梔名加味歸脾湯

增補云心藏神脾藏意思慮過度而傷心脾則神意有虧而健忘矣宜白朮茯苓甘草溫物也可以養心燥可以益脾龍眼肉酸棗仁遠志當歸濡潤物也可以調氣於心脾之間入心香可以醒脾則夫木香之香燥又可以醒脾則夫木香之香燥又可以調氣於心脾之

分矣心腎治宜後有健志者考、○九劑宜主虛損勞瘵門天
王補心丹
○狀元丸　專補心生血寧神定志清火化痰豁開勤政勞心
燈窓讀書辛苦并健忘怔忡不寐及不善記而多忘者服之
能日誦千言胸藏萬卷
人參二錢　白茯神去木　當歸酒洗酸棗仁炒各一錢　遠志去心
麥門冬去心　栢子仁去油　龍眼肉　生地黃酒洗各三錢
硃砂　石菖蒲去毛一寸九節
右為細末猪心血為丸如菉豆大金箔為衣每服二三十
丸糯米湯下
○天王補心丹　寧心保神益血固精壯力強志令人不忘除
怔忡定驚悸清三焦化痰涎去煩熱療咽乾養育心神

人參五錢　五味子　當歸酒洗天門冬去心麥門冬去心
栢子仁　酸棗仁炒　玄參　白茯神去木　丹參
桔梗去芦遠志去心各黃連去毛酒炒二兩　生地黃酒洗　石菖蒲兩
右為末煉蜜為丸如梧桐子大硃砂為衣每服三十丸臨臥
時服燈心竹葉煎湯送下
○一方有熟地黃百部牛膝杜仲茯神甘草各等分金箔為衣
煉蜜丸如彈子大臨臥服一丸細嚼燈心紅棗煎湯送下無
麥冬柏實連生地黃
○孔子大聖枕中方
龜甲酥炙　龍骨　遠志去心　石菖蒲去毛
右四味等分為末酒調方寸匕日三服令人聰明
一人若欲忘事遠志及菖蒲每日煎湯服心通万卷書

增補云凡人多識不忘者心血足而無所蔽也若心血不足一邪氣蔽之則傷其靈靈之体而學問易忘矣龜介虫之靈物也龍鱗兎之靈物也用龜田龍骨者假二物之靈以養此心之靈欤其同氣相求云耳遠志辛温味厚辛温可使入心味厚可使養陰菖蒲味辛氣清味辛則利竅氣清則通神以之而治易忘斯近理矣是方也出於孫真人之千金方其來必有所自但曰

孔子大聖之方則未敢是非也

如癲狂健忘怔忡失志及恍惚驚悸入心神不守舍多言不定一切真氣虛損用紫河車入補藥内服之大能安心養血寧神健忘驚悸怔忡不寐用六味丸加遠志肉石菖蒲人參白茯苓

怔忡

怔忡者心無血養如魚無水心中惕七然而跳動也如人將捕捉之貌

若思慮即心跳者是血虛也

○四物安神湯　治心中無血養故作怔忡兼服衣砂安神丸

當歸酒洗白芍酒炒生地黄酒洗熟地黄　人參去芦

白朮去芦茯神去木皮酸棗仁炒　黄連姜炒　梔子炒

麥門冬味竹茹　衣砂研末臨服調入　烏梅一个

右剉一劑棗二枚炒水一盞煎食遠服

心若時跳時止者是痰因火動作怔忡方見痰症

○二陳湯　治痰因火動作怔忡

當歸補血湯 木香流氣飲

砂烏梅 竹瀝姜 三片棗 一枚水 煎調辰砂末服

歸脾湯 健天王補

依本方、加枳實麥冬竹茹炒黃連炒山枝人參白朮當歸辰心慌神亂者、血虛火動也、

○硃砂安神丸 治血虛心煩懊憹驚悸怔忡胸中氣亂、

硃砂另研水飛 當歸酒洗淨生地黃酒洗一兩 甘草炙二兩 黃連酒洗炒六兩 白朮去蘆二兩 茯神去皮 一方加人參

右為末、煉蜜為丸、如桑米大、每服五十丸、食遠清心米湯送下、

○養血清火湯 治心慌神亂煩燥不寧、

當歸一錢 川芎七分 白芍酒炒 生地黃酒洗 黃連酒炒各一錢 片芩去朮 梔子炒八分 酸棗仁炒遠志去心各一錢 甘草三分

右剉一劑、生薑三片、水煎溫服、

驚悸

脈雪寸口脈動而弱動則為驚

脈緊而弱則為勞勞則為悸

脈緊跌湯脈浮胃氣則虛是虛火悸

崔氏脈訣曰心中驚悸脈浮代結飲食之等沈伏動滑之脈雪跌湯脈緊而弱跌湯脈浮則胃氣虛跌則不能食此恐悸之脈要迫所作也驚生病

驚悸者、忽然驚惕而不安也、驚悸屬血屬火動者、宜養心以清火也、

○養血安神湯

當歸身酒洗五分 川芎五分 白芍炒五分 生地黃酒洗 茯神一錢 酸棗仁七分炒 甘草三分 黃連酒炒五分 陳皮五分

右剉一劑、水煎服、

○安神鎮驚丸 治血虛心神不安驚悸怔忡不寐等症、

當歸酒洗一兩 白芍煨一兩 川芎七錢 生地黃酒洗一兩半

若其脈出而復來其人
目睛不了

白茯神去皮木貝各去心一兩 遠志去心各七分 酸棗仁炒五
麥門冬去心一兩 黃連姜汁炒 陳皮去白一兩 甘草二錢
硃砂一兩研末 水飛為衣
右為細末煉蜜丸如菉豆大每服五十丸食遠棗湯送下
驚悸高痰火以補虛也

暑一帰益元之
參三黃乀毒
犬增龍含
酸茴王
內補血ノ
咳吸去仙丹
すべ大補ノ
陰國公仙酒多
帰脾ノ
健ヶ王補心

○溫膽湯 治痰火而驚惕不眠
人參 白朮去蘆 茯神去皮 當帰酒洗 生地黃酒洗
酸棗仁炒 麥門冬去心辛夏製 枳實麩炒 黃連酒炒
竹茹 山梔炒各甘草三分 陳皮五分 加服
右剉一劑姜一片棗一枚烏梅一箇竹瀝調陳砂末服

○金箔鎮心丸 治一切驚悸
硃砂 琥珀 天竺黃各五錢 膽星一兩 牛黃

久增溫膽乀

雄黃 珍珠各二錢 心經有熱加炒黃連
當帰 生地黃各一兩 甘草五錢 去雄
黃膽星射香 人參一兩
右為細末煉蜜為丸如皂角子大金箔為衣每服一丸用薄
荷湯化下

驚悸屬心氣虛而有痰者宜安神補虛以化痰也

○茯神安神湯 治七情六淫相感而心虛夜多夢寐睡臥不
寧恍惚驚悸煩熱
當帰二錢 黃連八分 生地黃一錢 遠志去心各 茯神錢半 木一分
麥門冬去心酸棗仁炒 人參 黃芪蜜炙
膽星 淡竹葉各一小草大分
右剉一劑姜一片棗一枚煎服

○琥珀定志丸　專神心生血定驚戰虛弱氣多之疾並治

南星半斤先將地作一坑用炭火十八斤煅淨好酒十餘斤傾入在坑內燒紅去炭灰候冷取出為末

真琥珀一兩為細末　遠志水浸去心二兩　石菖蒲去毛一兩　人乳用姜汁製揀參三兩　白茯苓去皮木　白茯神去皮木三兩　石菖蒲二兩炒　右為極細末煉蜜為丸如梧桐子大每夜臥時鹽湯送下五七丸

○朱砂寧志丸　治勞神過度致傷心血驚悸怔忡憂煩不寐若有人來捕捉漸成心疾甚至癲狂者

朱砂二兩用無灰酒二升煮之酒將盡留二盞用之　遠志去心　石菖蒲去毛　當歸酒洗各一兩　人參五分

酸棗仁炒　乳香炙

白茯神去皮木　白茯苓去皮各七分

共為細末用豬心一箇研如泥入前藥末并煮朱砂酒搜勻九如梁豆大每服六七十丸臨臥以棗湯送下

增補驚悸怔忡門方首

增補養心湯

黃耆　白茯苓　茯神　半夏麴一　當歸

川芎酪半　栢子仁　酸棗仁炒人參　遠志去心　五味子　辣桂絡紅甘草炙四　每服五錢

心血虛少神氣不寧令人驚悸怔忡者此方主之○心主血

而藏神故方寸靈臺名曰神室神室血少而空虛則邪氣襲之令人如有驚悸而怔忡不自寧也內經曰陽氣者精則養神故用人參茯苓甘草以益氣又曰靜則氣藏燥則消亡故用當歸遠志栢子仁酸棗仁五味子以潤燥養氣所以養神潤燥所以潤血若川芎者所以調肝而益心之母半夏麴所以醒酒而益心之子辣桂辛熱從火化也易曰火就燥故能引諸藥直達心君而補之經謂之從治是也亦有加檳榔赤茯苓者因其停水為悸加之以導利水氣耳非停水者此方主之○因驚而得者各曰驚風怔忡內經曰驚則氣亂宜其怔忡如物之撲也是方也茯神之平可以寧心沉香之堅實可使下氣心下則怔忡瘳矣

增補朱雀丸

白茯神二兩　沉香五錢

驚氣怔忡者

驚氣入心喑不能語者此方主之○有人伐薪山間為狼所逐喑不能言一醫授以此方茶調服尋愈又一軍人採藤于谷為惡蛇所逢趣歸証狀亦同以此方與之亦愈蓋此物鎮重而燥重故可以劫其驚疾

增補金陀僧一物散　每服七許

虛煩

巢氏病原曰心煩不得眠者心熱也但虛煩不得眠者噫寒也虛煩者心胸煩擾而不寧也

○加味溫膽湯　治病後虛煩不得臥及心膽虛怯觸事易驚

短氣悸之、

半夏泡七次 枳實麩炒各一錢半 陳皮二錢
三錢半 竹茹 茯苓去皮 茸草各一錢 酸棗仁炒 遠志去心
五味子 人參 熟地黃各一

右剉一劑、姜棗煎服、

○竹葉石膏湯 治大病後表裏俱虛、內無津液、煩渴心燥及
諸虛煩熱、與傷寒相似、但不惡寒、身不疼痛、不可汗下、宜服
之、方見傷寒、

不寐

健忘驚悸、怔忡失志不寐、心風皆是痰涎沃心、以致心氣不足、
若用涼劑太過、則心失溫養、微痰涎盛而病益深、宜理痰氣、

加味溫膽湯 治心膽虛怯、晝夜不睡、

陳皮 半夏姜製 白茯苓去皮 枳實麩炒 竹茹
各一錢半 人參五錢 甘草一錢半

右剉一劑、水煎服、

○酸棗仁湯 治多睡及不睡、

酸棗仁微炒 人參去蘆各一錢半 白茯苓去皮各一錢半

右剉一劑、水煎服、如要睡卽熟服、如要睡卽冷服、

膽虛不眠、寒也、用酸棗仁炒為末、竹葉煎湯調服、

膽實多睡、熱也、用酸棗仁生為末、茶姜汁調服、

一小兒十五歲、因用心太過、少寐驚悸怔忡、惡寒先用補中益
氣湯、茯苓、酸棗仁遠志、漸止、又用加味歸脾湯、驚悸稍安、
又用養心湯而痊、見遺精門、

邪祟

○邪祟之為病也。其人或精神恍惚。或言語錯亂。或舉動狂妄。或哭笑無常。或多疑善怖。或晝見鬼神。或夜聞怪異。或飲食異常。或情意乖僻。或平素所無。或忽然而有。種種變態。不可名狀。

○凡此皆邪祟之為病也。然其人必先有正氣不足。而後邪祟乃得以乘之。故治邪祟之法。必以扶正為主。而祛邪為輔。

○邪祟之為病。其人必有可疑之端。或因驚恐。或因悲怒。或因憂思。或因疑懼。或因冤抑。或因愧恨。或因貪淫。或因酒色。或因財物。或因博奕。或因爭鬥。或因遊蕩。或因勞役。或因疾病。或因產育。或因喪葬。或因遠行。或因久住。或因遷移。或因改變。或因動作。或因靜處。或因山林。或因水石。或因古廟。或因荒墟。或因神廟。或因墳墓。或因井灶。或因門戶。或因橋路。或因舟車。或因城市。或因村落。或因田野。或因林木。或因花草。或因禽獸。或因蟲魚。或因器物。或因衣服。或因飲食。或因書畫。或因文字。或因音樂。或因戲玩。或因博戲。或因醫藥。或因卜筮。或因星相。或因風水。或因命理。或因相貌。或因形體。或因聲音。或因言語。或因動作。或因靜處。或因山林。或因水石。或因古廟。或因荒墟。或因神廟。或因墳墓。或因井灶。或因門戶。或因橋路。或因舟車。或因城市。或因村落。或因田野。或因林木。或因花草。或因禽獸。或因蟲魚。或因器物。或因衣服。或因飲食。或因書畫。或因文字。或因音樂。或因戲玩。或因博戲。或因醫藥。或因卜筮。或因星相。或因風水。或因命理。或因相貌。或因形體。或因聲音。或因言語。

○凡此皆邪祟之為病也。然其人必先有正氣不足。而後邪祟乃得以乘之。故治邪祟之法。必以扶正為主。而祛邪為輔。

○邪祟之為病。其人必有可疑之端。或因驚恐。或因悲怒。或因憂思。或因疑懼。或因冤抑。或因愧恨。或因貪淫。或因酒色。或因財物。或因博奕。或因爭鬥。或因遊蕩。或因勞役。或因疾病。或因產育。或因喪葬。或因遠行。或因久住。或因遷移。或因改變

脈陽厥脈滑而沉實陰厥脈細而沉伏

厥者其也短也逆者手足厥冷也今始撮其大概且如寒熱厥逆者而為陰陽二厥也陽厥者其症不一概之是熱深則厥深蓋陽極則發厥多今始撮之厥者始得之身冷脈沉四肢厥逆是陽厥也陰厥者渴小便色白此其候也治以四逆理中之類仍速灸關元百壯鼻尖有汗為度

凡初得病身熱頭痛大小便閉滿或畏熱或飲水或揚手擲足論者取用心法之論其有煩燥不得安臥譫語昏瞶而厥此陽厥也宜大柴胡大一服不同者傳寫之誤耳

氣湯治之渴者白虎湯主之

如得病後四肢厥冷脈沉而細足拿厥而腹寒引衣蓋覆不欲水或下利清穀而厥者陰厥也四逆湯厥逆脈不至者通脈四逆湯手足指頭微寒者謂之清理中湯無熱証而厥當與四逆湯加吳茱萸生姜湯喘促脈伏而厥五味子湯吐利手足厥冷煩燥欲死吳茱萸湯

○六一順氣湯　○大柴胡湯

○四逆湯　○理中湯已上二方俱見中寒

濁證

脈沉而尺脈洪數小便濁遺精○心脈短小因心虛所致必遺精濁者小便去濁也有赤濁有白濁其狀旋面如油光彩不定脚澄下凝如膏糊小便如米泔者如粉糊者如未瞧者皆是一温熱內傷又腎經虛損而成濁也瘦人是虛火肥人是溼痰一流下滲入膀胱猶如天氣寒則水澄清天氣熱則水混濁上

之為病溫熱之本明矣

赤濁者心虛有熱也

○清心蓮子飲　治心神煩燥思慮憂愁抑鬱小便赤濁或有
或酒色過度上盛下虛心
火上炎肺金受尅故口苦咽乾漸成消渴四肢倦怠男子五
淋婦人帶下赤白五心煩熱此藥溫平清心養神秘精大有
奇効

石蓮肉　人參各二錢半　黃芪蜜炙　赤茯苓各一錢　麥門冬去心
地骨皮　黃芩　車前子各一錢半　甘草炙一錢　○上盛下
盧加酒炒黃柏知母各一錢

又方治心經伏暑小便赤濁

人參去蘆　白木去蘆　赤茯苓去皮猪苓　澤瀉
香薷　石蓮肉　麥門冬去心各等分

右剉一劑水煎空心溫服

白濁者腎虛有寒也

○蓳薢飲

蓳薢　川萆薢　益智仁

一方加茯苓車前子

右剉一劑水煎入鹽一撮空心服

○滋腎散　治白濁初起或半月者極効

川萆薢　麥門冬去心　遠志去心　黃柏酒炒　兎絲子酒炒
五味子　龍骨各等分

右剉一劑竹葉三箇燈草一團水煎空心服

赤白濁者水火之不分也

○水火分清飲　治赤白濁

益智 薑辭 石菖蒲 赤茯苓 車前子
猪苓 澤瀉 白术去芦 陳皮 枳殼炒
麻黃各等 甘草減半 酒半水煎空心温服父病去麻黃易升麻

右剉一劑半酒半水煎空心温服父病去麻黃易升麻
瘦人赤白濁者是虛火也

○滋陰降火湯 治瘦人虛火患赤白濁方見虛勞
依本方加白术薑辭牛膝山栀扁蓄去芍藥

肥人赤白濁者是濕痰也

○二陳湯 治肥人濕痰赤白濁方見痰症
依本方加蒼术白术人參當歸生地麥冬山栀黃柏稻葉薑辭牛膝扁蓄

一白濁足三陰經主之屬厚味濕熱所致者用加味清心蓮子飲方見平齒

若肝腎虛熱者用六味丸為主方見補益佐以逍遙散方見婦人虛勞
若脾腎虛熱者用六味丸佐以六君子湯方見補益
肝脾鬱滯者六味丸佐以歸脾湯方見健忘
脾肺氣虛者六味丸佐以補中益氣湯方見補益
濕痰下注者補中益氣湯佐以六味丸方見補益
汗少牢頭暈白濁余用補中益氣加茯苓半夏愈而復患腰痛
用山藥山茱萸五味薑辭遠志愈又因勞心盜汗白濁以
歸脾湯加五味而愈後不時驯暈用八味丸全愈方見補益

增補濁門方左

增補九龍丹
枸杞子 金櫻子 山查肉 石蓮肉 蓮花鬚
熟地黃 芡實粉 白茯苓 川牛膝 歸等分

精濁者此方主之○精濁與便濁不同便濁是便濁不是便溺渾濁即
前之膏淋也乃是胃中濕熱滲入膀胱與腎絕無相干精濁
則華絲粘膩雖不便溺水是有之此是腎水不足淫火易動
精離其位故令漸漬而出耳治此者宜滋腎清心健脾固脫
是方也枸杞熟地當歸味厚者也可以滋陰滋陰則足以制
陽光金櫻蓮鬚芡實味澁者也可以固脫固脫則無遺失石
蓮肉苔寒可以清心心清則濁失不熾白茯苓甘平可以益
土益土則制腎邪而山藥肉者又所以消陰分之障礙也

增補珍珠粉丸

牡蠣粉取血色黃栢各一斤　珍珠三錢

濕熱在中下二焦令人便濁者此方主之○燥可以去濕故
用牡蠣粉若可以勝熱故用黃栢滑可以去著故用珍珠

經

增補水陸二仙丹

金櫻膏二斤　芡實粉一斤共為丸豆大空心服七十丸

此主精濁之方也○金櫻膏濡潤而味澁故能澁少陰而固
其滑泄芡實粉祐澁而味甘故能固精濁而防其滑泄金櫻
生于陸芡實生于水故曰水陸二仙

增補妙香散　兩

人參五分　山藥二錢　茯苓　遠志去心炒　茯神各一錢　木香二錢半　麝香一分研　甘草各二
辰砂二錢　共為細末每服二錢酒下

此安神正氣而精自固之方也○凡中遺失者宜主之○精氣
神人身之三寶也神役氣七役精三寶之用也是以神昏則
氣虛湯氣虛湯則精離神明則氣正氣正則精固是方也不用固

澁之劑以固精但用參疾神遠志辰砂以安神用射香木香薑黃蒼朮柏桂枳梗茸草山藥茯苓以正氣神清氣正則邪憂不作邪火不起精不以澁而自固矣內經曰主明則下安以此養生則壽汶世不易此之謂也

增補治濁固本丸

運花鬚　黃連姜製　豬苓二兩　白茯苓　砂仁
益智　半夏姜製　黃柏妙各一兩　炙草三兩

一胃中濕熱滲入膀胱濁下不禁者此方主之○凡濁下不禁牽絲者責之精濁賢家之病也不牽絲者責之便濁胃中之濕茯苓豬苓所以滲胃中熱也是方也半夏所以燥胃中之濕草砂仁益智香草益脾之品也益脾亦所以制濕而一黃連黃柏之苦所以治濕熱濁花鬚之澁所以止其滑泄耳

名之曰固本者胃氣為本之謂也

遺精

(紙)遺精白濁當驗於尺結花動緊二症之的微滴精傷洪數大過亦有心虛左寸短小紙遲可生急疾便失

邪客於陰神不守舍故心有所感愛而後泄也其候有三年少氣盛鰥瞷矜持強制情慾不自覺知此泄如瓶之滿溢者也人或有之是為無病勿藥可矣心家氣虛不能主宰或心受熱陽氣不收此泄如瓶之側而出者也人多有之其病尤輕合用和平之劑脈腑積滿真元久虧心不攝念腎不攝精此泄如瓶之罅而漏者也人少有之其病最重須當大作補湯或謂愛泄尤甚於房勞此世俗習聞其說也獨不觀候之有

輕重乎、外此又有一輩神氣消縻怪異橫生、風邪乘其虛邪氣于其正往往與鬼魅交通是又厄運之不可曉者也、法藥相助誠哉是言、

久無色慾而精滿出者不必慮也、心有所慕而夢遺者君火動相火隨也、夜夢與人交感而泄精者謂之夢遺俱用後方、

○清心湯

黃連　生地黃　當歸　人參去芦　遠志去芦甘草水泡去心　茯神去皮　酸棗仁炒　石蓮肉各等分　甘草減半

右剉一劑水煎服、

有不因夢而精自出者此精遺滑也、因心腎內虛不能固守、皆相火動

○養心湯

辰砂別研末調入服　遠志去心酸棗仁　蓮蕊　天門冬　柏梗去芦　茯神　石蓮肉　茯苓　甘草炙半　麥門冬去心　車前子　龍骨各半分

右剉一劑灯心二十寸水煎服、

有陰虛火動而遺精者宜滋陰降火也、

○保精湯　治陰虛火動夜夢遺精或虛勞發熱、

當歸酒洗川芎　白芍酒炒　知母蜜炒　黃連姜汁炒　梔子連炒便沙參　麥門冬去心　乾姜炒黑減半　牡蠣火煅　山茱萸酒蒸去核各等分

右剉一劑水煎空心温服、

有夢遺日久氣下陷者宜升提腎氣以歸原也、

○歸元散

人參去芦 白朮去芦 茯苓去皮 遠志去心 酸棗仁炒
麥門冬去心 黃柏童便炒 知母童便炒 鷄頭實 蓮花鬚
枸杞子 陳皮 川芎各半分 升麻 甘草二味減半

右剉一劑、蓮肉三箇、棗子一枚、水煎空心服

○固精丸

當歸酒洗熟地 山藥炒 茯苓去皮 鎖陽 牡蠣 人參去芦 白朮去芦
知母酒炒 杜仲酒和姜汁炒 蛤粉 黃柏酒炒 椿根皮 破故紙酒炒各一兩

右為細末、煉蜜為丸、如梧桐子大、每服五十丸、空心酒吞下、

治濕熱而遺精者、宜健脾除濕熱也、

○縮脾丸 治遺精夢泄、不思飲食、健脾助胃、又治肌瘦氣弱咳嗽、漸成勞嗽

白朮去芦炒五兩 苦參去蘆白者三兩 牡蠣左顧者煅另為末四兩

右為末、用獵豬肚一具、洗淨砂罐內煮、得極爛、石杵內搗半日、丸如小豆大、每服四十丸、米湯送下、日進三次或四次、久服自覺身肥體健、而夢遺自止、

虛弱人患夢遺精滑者、宜補心腎也、

○茯砂既濟丸 治元陽虛憊、精氣不固、夜夢遺精盜汗遺精不禁、此藥大補元氣、澁精固陽、神効、

當歸酒洗 山藥 枸杞子
鎖陽 敗龜板酥炙 牡蠣酒浸一宿 熟地酒洗
牛膝去芦酒炒各二兩 知母酒炒 茯苓酒炒
右為末、煉蜜為丸、如梧桐子大、每服五十丸、空心鹽湯下、

右為末用白木八兩水八碗煎至二碗成膏和丸如梧桐子大辰砂為衣空心淡鹽湯下或酒下七十丸乾物壓之

夢遺精溢屬肝腎虛熱者用四物湯加柴胡山梔山茱萸山藥丹皮薏苡仁治法見補益

脾胃氣虛者用補中益氣湯加山茱萸山藥丹皮薏苡仁治法見補益

心腎不交者用水火分清飲方見濁症

心氣虛熱者用清心蓮子飲方見濁症

氣血虛損者用十全大補湯加山茱萸山藥五味麥冬方見補虛門

補遺方

○止遺精盜汗法

用短床或蒲蘿內側身曲腰而臥不許伸脚病自安

○保生丹 治夜夢遺精旬日無盡久或經宿而再者

嫩烏藥 益智仁

乾山藥二兩

右各另為末將山藥打糊為丸如不成再加些酒糊丸如梧子大每服百丸空心淡鹽湯送下

○倒陽法

夜半子時分陽正興時即臥瞑目閉口舌頂上腭收腰拱起用左手中指頂住尾閭穴用右手大指頂住無名指根拳着又將兩腿俱伸兩脚十指俱撐提起一口氣心中存想脊背腦後上貫至頂門慢慢直下至丹田方將腰腹手脚從容放下如陽未衰再行照前而陽衰矣再行兩三遍如初行房陽

未與勉強即之方可行矣夫人之所有虛實者因年少慾心
太盛房事過多水火不能相濟以致此疾若能行此法不惟
速去泄精之病久而腎水上升心火下降則水火既濟永無
疾病矣

陳桂巖秀才患夜尿遺每月一二次或三五次遺後神思昏沉
身體困倦手膀六軟做滿無力此陰虛火動之症以長砂既
濟九加紫河車龍骨服之數月奏効本其教患於不能謹守
因口占俚語一章以戒之曰

姑卷精元貴節房　更祛塵慾最為良　食惟半飽宜清淡
酒止三分勿過傷　菜餌隨時應勉進　功名有分不須忙
幾行俚語君能味　便是長生不老方

朱工部勞則遺精齒牙俱痛用補中益氣加半夏茯苓芍藥并
六味地黃丸漸愈更以十全大補加麥門五味而痊方見補
一男子遺精白濁口乾作渴大便閉澁午後熱甚用補中益氣
加芍藥玄參并加減六味丸而愈方見補益

淋證

淋病之候細數何妨少陰微者氣閉膀胱女人見之陰中生
瘡大實易愈虛滿其七氣淋者小便澁常有餘瀝也沙淋者莖中痛弩力如沙石也
血淋者尿血結扰莖痛也膏淋者尿如膏脂也
勞淋者勞倦即發也
○五淋散　治肺氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或赤
如豆汁或如沙石或冷淋如膏或熱淋尿血皆效

赤茯苓六兩 赤芍十兩 山梔十兩 當歸去芦五錢 燈芯三錢

生甘草五兩

右剉一劑水煎空心服

一方有生地澤瀉木通滑石車前子

○八正散 治心經蘊熱臟腑閉結小便赤澁隆閉不通及熱淋血淋○如酒後忿怒而得者即小便將出而痛既出而澁以此藥主之

大黃 瞿麥 木通 滑石 葍蓄 梔子 車前子 甘草各等分

右剉劑燈心水煎空心服

五淋者因酒色勞力傷腎虛中有熱

○必効散 治一切淋症隨症加減

當歸 生地黃 赤茯苓去芦 滑石 葍蓄 牛膝去芦 山梔 麥門冬去心 枳殼麩炒 甘草減半

右剉一劑燈草一團水煎空心服○血淋加蒲黃茅根汁○膏淋加車前○氣淋加青皮○勞淋加人參○熱淋加黃連○肉淋加連翹○石淋加石葦○氷淋加車前○死血淋加桃仁牡丹皮玄胡索琥珀去黃栢知母○老人氣虛作淋加人參黃耆升麻少許去黃栢知母葍蓄滑石

○海金沙散 治五淋一服如神

當歸酒洗大黃酒浸川牛膝酒洗木香 雄黃

海金沙各等

右為細末每服一錢半臨卧好酒調服兩服全愈

酒毒渴傷而成淋者宜升補真氣也

○補中益氣湯　治五淋有效然淋症多是膀胱之氣虛損不能運用水道故滯不通而成諸淋也此方補元氣故有効焉方見內傷

○益元固真湯　治縱慾強留不泄濇精滲下而作淋者

人參　白茯苓　蓮蓋　巴戟　升麻
益智仁　黃柏酒炒各二錢　山藥　澤瀉各一錢半　甘草稍三錢

右劑一劑水煎空心服

補遺方

○治淋蕪紅淋、

當歸　生地　熟地　黃柏　知母　黃芩
黃連　木通　桑白皮

右劑水煎空心服

○治小便淋瀝不通用六味丸倍茯苓澤瀉方見補益

若小便澁滯或莖中作痛屬肝經濕熱用龍膽瀉肝湯方見下痢

李司馬莖中作痛小便如淋口乾嘔痰此思色精降而火敗用補中益氣湯六味地黃丸而愈方見補益

一男子莖中痛出白津小便閉時作癢用小柴胡方見傷寒加山梔澤瀉炒連木通膽草茯苓又蕪六味丸而痊方見補益

關格

關格病者膈中覺有所碍欲升不升欲降不降升降不通飲食不下此因氣之橫格也乃是痰格中焦用枳縮二陳湯加減治之痰出爲要此症多死寒在上而熱在下也又曰關者不得小便格者吐逆上下俱病者也

閘者甚熟之氣無出之由也熱在下焦填塞不便
格者甚寒之氣無入之理也寒在胸中遏絕不入
○枳縮二陳湯　治閘格上下不通
枳實麩炒一錢　砂仁七分　白茯苓去皮　貝母去心　陳皮
蘇子炒　瓜蔞仁　厚朴薑汁炒　香附童便炒各七分　撫芎八分
木香五分　沉香五分　甘草三分
右剉一劑生薑三片水煎入竹瀝磨沉木香服

遺溺

經云膀胱不約爲遺溺小便不禁常常出而不覺也
人之溲溺賴心腎二氣之所傳送蓋心與小腸爲表裏腎與膀
胱爲表裏若心腎氣虧傳送失度故有此症

小便自遺失禁者溺出而不知也遺溺失禁者屬氣虛用參芪
湯加減老人溺多者是虛寒用參附湯加減壯人溺多者是
虛熱用滋陰降火湯加減夏月因伏暑燕溺必遺也用人參
白虎湯加減中風症遺尿遺溺失禁者難治也
○參芪湯　治氣虛遺溺失禁
人參　黃芪蜜炙　白朮去蘆陳皮各一錢　甘草三分　水二盞煎八分
○滋陰降火湯　治氣虛遺溺失禁
白朮去蘆當歸酒洗熟地黃　肉桂各五分　益智仁八分　升麻
右剉一劑姜三片棗一枚水煎空心服○年老之人虛寒遺
溺者多加附子名參附湯
○治身体虛瘦夜啼遺溺失禁
人參八分　白朮炒　山藥炒　黃芪蜜炙水　白芍酒炒各

山茱萸酒蒸去核
右剉一劑水煎溫服
○治小水頻數此症皆下元氣虛所致
人參五錢 黃耆酒浸 益智仁 大棗草 一錢
右為細末煉蜜為丸梧桐子大五更臨臥每服五十丸滾水下酒亦可
○滋陰降火湯 治虛熱汗多方見虛勞
依本方加炒山梔子去
○人參白虎湯 治夏月因伏暑熱遺尿者方見暑症
依本方加黃柏知母去香薷
若小便頻數或勞而益甚屬脾氣虛弱用補中益氣湯加山
藥五味方見補益

若小便無度或淋瀝不禁乃陰挺痿痺也用六味丸去澤瀉
用益智仁方見補益

增補遺海門方
增補滿泉丸
烏藥 益智仁
右共為末山藥糊為丸梧子大每服七十丸空心鹽湯下
脬氣虛寒小便頻數遺尿不止者此方主之○脬氣者太陽
膀胱之氣實于沖和邪氣熱之則便溲邪氣實之則不出正
氣寒之則遺尿正氣虛之則不禁是方也烏藥辛溫而質重
重者墜下故能療腎間之冷氣益智仁辛熱而色白白者入
氣故能壯下焦之脬氣復其常矣
增補四君子湯 則禁固復其常矣

人參　白朮　茯苓　甘草　各三錢

諸急病遺尿不禁者此方主之○諸急病謂卒然暴作諸疾也遺尿不禁者形氣將脫無私之氣不足以固有形之溺也甘溫為陽可使充益氣故入參白朮茯苓甘草皆甘溫也可以用之或問茯苓令淡滲當遺尿不禁之病可以去否余曰苓有二品枯而不澤者宜去若堅實而潤者則亦不嫌其為苓也用之引入參以就下直補膀胱誰曰不可正考見氣門

小便閉

小便不通浮弦而澀者氣鬱則便紅數則黃赤便難為癃實見尺小便不通者多是熱結也

○猪苓湯　治熱結小便不通

猪苓　茯苓　澤瀉　滑石　阿膠　去根　各等分

右㕮咀作一劑水煎去滓入膠烊化分二服

○通關丸　治不渴而小便閉熱在下焦血分也無論淋癃神効

黃柏　酒洗焙乾　知母　酒洗焙乾　各二兩　肉桂一錢

右俱為細末熟水和丸梧桐子大每服百丸空心白滾湯下服後須臾兩足令藥勢下行也如小便已利藥中如刀刺痛當有惡物下為驗

若渴而小便閉者熱在上焦氣分也

○清肺飲子　治渴而小便不利者是熱在上焦肺之分故

滋腎丸　利氣、肺枯梗ノ頻ノ

木通　猪苓　澤瀉　滑石　枳殼　去棵　車前子　各等分　心煩赤

不利也、肺者金也、金合生水、若肺中有熱不能生水、是絶其水源、治宜淡滲之劑、以清肺之氣、泄其火邪、滋水之上源也

赤茯苓（去皮）一錢半　豬苓（去皮）一錢半　車前子（炒別研）一錢　琥珀（別研）五分　冬葵子（別研）七分　滑石（別研）一錢　澤瀉一錢　通草二錢　燈草一錢

右剉一劑、水煎空心稍熱服、

虛寒小便不通者、是寒結也、

○加味五苓散　治虛寒小便不通

豬苓（去皮）　澤瀉　白朮（去蘆）　赤茯苓（去皮）　肉桂

當歸　枳殼（麩炒）　牛膝（去蘆）　通草（各半）　茸草稍減半

右剉劑、燈心一團、水煎空心服、

虛熱小便不通者、是虛結也、

○參歸升麻湯　治虛人小便不通

人參（去蘆）　當歸　生地黃　澤瀉　山梔　枳殼（去穰）　牛膝（去蘆洗）　黃柏（酒炒各半分）　知母（酒炒各半分）　升麻（少許）　茸草減半

右剉劑、燈草一團、水煎空心服、

年老之人小便不通者、多是氣短血虛也、

○四物湯加黃蓍煎湯送下　通關丸　空心服

咳喘小便不通者、是痰氣塞也、

○二陳湯　治痰氣閉塞小便不通

陳皮　半夏（姜汁炒）　茯苓　豬苓（去皮）　木通　山梔

黃柏（酒炒各半分）　茸草減半

右剉一劑、燈心一團、水煎空心服、

能。

元氣虛而不能化者宜補中益氣湯方見補益門
陰虛而小便不通者是火盛也
○滋陰降火湯　治虛怯人陰虛火動小便不通方見虛勞門
味九丸効
依本方加獨參澤瀉木通牛膝大抵小便不通用利水藥不効者此積痰在胞肺為上焦膀胱為下焦上焦閉則下焦塞如滴水之嚏上竅通而下竅之水出焉
若瀉利小便不通者因後去多而前去少瀉止後而尿自長也
若嘔噦小便不通者難治也
若中滿鼓脹病小便不通者亦難治也
○治老人下元虛冷轉胞不得小便膨急切痛四五日困篤欲死者六味丸倍澤瀉効方見補益

即膏淋也濁症可互見

補遺秘方

○治小便不通
射香半夏末填臍中上用葱白螺螄二味搗成餅封臍上用布帛縛定下用皂角煙入陰中自通女人用皂角煎湯洗陰戶內
○導赤湯　治溺如米泔色不過二服即愈
木通　滑石　茸草稍　黃柏
生地黃　枳殼　白朮　梔子　水煎空心服
○治小便下墜
好麻三兩搥碎火焙用新盆一箇蓋在上杵作灰黃酒調下被蓋汗出愈
○治小便不通
用皮硝一合連鬚蔥一根搗為一處用青布攤在上似膏藥

祿用熱熨其處摩之即出

增補小便閉門方肯

增補倒換散

大黃一兩　荊芥二兩　每服末二錢

內熱小便不通者此方主之○內熱而小便不通者膀胱脫者州都之官津液藏焉氣化則能出矣然氣化之道莫妙于升降天地以升降而化生萬物奈何而昧于人乎故用荊芥之輕清者以升其陽用大黃之重濁者以降其陰清陽既出上竅則濁陰自歸下竅而小便隨泄矣方名倒換者小便不通倍用荊芥大便不通倍用大黃顛倒而用故曰倒換

增補八正散加木香湯

車錢子　蓮麥　萹蓄　小薊　滑石

茸草稍　木通　大黃　木香

濕熱下注小腹急小便不通者此方主之○濕熱下注令人小腹急則小便有可行之勢矣而卒不通者熱秘之也陶隱君曰通可以去滯滑可以去著故用木通瞿麥萹蓄通其滯用大黃山梔瀉其秘用車前滑石滑其著用茸草稍者取其堅實能瀉熱于下加木香者取其辛香能化氣于中

增補探吐法

鹽二兩　溫水二升服之探吐

經云升降出入無器不有故不升則不降而道器藏矣是以觀於注水之瓶上竅通則下竅自利此用吐之意也

大便閉

燥結之脈沉伏勿疑熱結沉數虛結沉遲若是風燥右尺
弦熱煩渴大便不通者是熱閉也
久病人虛大便不通者是虛閉也
因汗出多大便不通者津液枯竭而閉也
風證大便不通者是風閉也
老人大便不通者是氣血枯燥而閉也
虛弱併產婦及失血大便不通者血虛而閉也
多食辛熱之物大便不通者實熱也並宜
○潤腸湯　治大便閉結不通

當歸 熟羊 麻仁去殼 桃仁去皮

預搜風潤氣生津補血之劑雜交秦初分利氣

杏仁去皮尖 枳殼 厚朴去粗皮 黃芩

甘草

右㕮咀一劑水煎空心熱服大便通即止藥不得多服如修合
潤腸丸將藥加減各為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十
丸空心白湯吞下切忌辛熱之物○實熱燥閉依本方○發
熱加柴胡○腹痛加木香○血虛枯燥倍加當歸熟羊桃仁
紅花○風燥閉郁李仁皂莢羌活○氣虛而閉加人參郁李
仁○氣實而閉加檳榔木香○痰火而閉加瓜蔞竹瀝○因
汗多或小便去多津液枯竭而閉加人參麥門冬○老人氣
血枯燥而閉加人參麻仁麥門冬郁李仁倍加當歸熟羊生
羊少用桃仁○產婦去血多枯燥而閉加人參紅花倍用當
歸熟羊去黃芩桃仁○此方加檳榔即通幽湯

○蜜導法 用火煉蜜稠厚黃色傾入水中急捻如指大隨用皂角末射香共為衣將油塗抹大便潤澁放入谷道大便即通

○猪膽汁導法 治自汗小便利而大便燥硬不可攻以此法導之

猪膽一枚傾去一小半仍入醋在內用竹管相接套入谷道中以手指撚之令膽汁直射入內少時即通益酸苦益陰以潤燥也

○香油導法 治大便不通腹脹疼在須臾

用竹管簪葱汁深入大便內以香油一半溫水一半同入猪尿胞內撚入竹管將病人倒放腳向上半時即順直通

一大便閉結若大腸血虛火熾者用四物湯送下潤腸丸或以猪膽汁導之若腎虛火燥者用六味丸若腸胃氣虛用補中益氣湯二方俱見補益

一男子年六十七歲因氣腦左邊上中下有三塊時動而脹痛喜搽搽即散去心痞作噫食下胃口覺澁夜臥不寧小便澁大便八日不通一醫以大承氣湯一醫以化滯丸一用猪膽導法一用蜜導法俱不効予診六脈弦數有力此血不足氣有餘積熱壅實以大黃末三錢皮硝五錢熟燒酒調服打下黑糞甚硬如石數十條如前又一服又打下糞彈盆許遂安後以四物湯加桃仁紅花酒蒸大黃黃連梔子三稜莪朮枳殼青皮木通甘草十劑而愈

大小便閉

大小便俱不通者前後熱結也

○顛倒散 治臟腑實熱或小便不通或大便不通或大小便

俱不通、

大黃六錢　滑石三錢　皂角三錢

右為末黃酒送下、如大便不通依前方兩服、如小便不通大黃三錢滑石六錢皂角如前如大小便俱不通黃石均分皂角如前、

○蜣螂散　治大小便不通

六七月間尋牛糞中有大蜣螂不拘多少用線串起陰乾收貯用時取一箇要完全者放磚上四面以灰火烘乾以刀從腰切斷如大便閉用上半截如小便閉用下半截各為末新汲水調服二便俱閉則全用之、

○八正散　方見淋症、

○鐵脚丸　治大小便不通、

皂角去皮子炙不拘多少為末潤麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸酒下、

○蝸牛膏　治大小不通、

用蝸牛三枚連殼研為泥用加麝香少許貼臍中以手揾按之立通若用田螺搗爛填臍中亦妙、余用此方治大小便不通及熱閉者殊効、

○掩臍法　治大小便不通、

連鬚葱一根不洗帶土生姜一塊淡豆豉二十粒鹽一匙同研爛搥餅炕熱掩臍以帛扎定良久氣透自通不然再易、

○一方治大便小便不通、

用蚕一鍾入皮硝三錢滾白湯一鍾空心調下、

○大小便不通、

痔漏

腸澼為痔如大澤中有少山突出為痔凡人於九竅中但有小肉突起皆曰痔不特於肛門邊生者名之亦有鼻痔眼痔等其狀不一方分五種曰牡曰牝曰脈曰腸曰氣牝痔者肛門邊生瘡腫突出一日數枚膿潰即散牡痔者肛門邊發露肉珠狀如鼠奶時時滴清膿血脈痔者腸口顆顆發纏且

*本綱云凡只名丁香教人使勿用白蒂要綠色其蒂自然在蔓上來得繫屋東南風吹拏用宜爽口胡瓜蒂也

痛且痒血出淋腸痔者肛門內結核有盛寒熱往來發瘤脫肛氣痔者遇恐怒則發肛門腫痛氣散則愈又有酒痔每遇飲酒發動瘡即痛腫而流血血痔者則每遇大便則血出而不止宜解熱調血順氣為主若久而不愈必至穿血為漏矣

痔者成癰不破也

○當歸連翹湯 治痔漏

當歸　連翹　防風　黃芩　荊芥　白芷
芍藥　生芐　山梔　白朮　人參　阿膠
地榆各等分　甘草減半

右剉一劑烏梅一箇棗一枚同煎食前服

○黑白散

黑牽牛　白牽牛各一錢半

*丸仙傳藥酒方頗妙

*時珍曰類口骨俗名脾子

*又人名胜之數

*按千金治大小便不通如神

*槐角炒黃色

*吃十個失地榆槐角

右二味各取頭末各一錢半用猪腰子一箇竹刀破開去筋膜入藥末在內線扎紙裹水濕灰火內煨熱去紙空心嚼吃至巳時腹中打下先膿後血毒氣出盡永再不發必須忌半日飲食

○消毒百應丸　治痔漏瘡并臟毒神効大梁孫都督傳効

蒼朮　黃栢　槐花　金銀花　當歸　皂角各四兩

右六味切片分作四分每分用水七碗煎至四碗去渣留藥汁浸大黃片一斤浸一宿次日取出安篩內曬乾如此將四次水浸曬盡為度將大黃為細末麵糊為丸如梧桐子大每一服六十四丸空心熱白水送下忌厚味胡椒燒酒之類

○鈎腸丸　治新久諸痔肛邊腫痛或生瘡瘻時有膿血又治

瓜蒌二箇燒存性　刺蝟皮二箇燒存性　白鷄冠花五兩微炒　白礬枯

綠礬枯　胡桃仁十箇燒存性　白附子生去臍　天南星生

枳殼去瓤麩炒　大附子生去皮臍　半夏各二兩

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服二十丸空心臨臥溫酒下遠年不愈者十日見効久服永除根小可腸風等疾二三年者連服十餘帖永不再發

○臟連圓本丸　凡膏粱富貴之人患痔甚多必干於飲食色慾所致及有火酒犯房若要除根必須服此兼戒醇酒厚味寡慾方可全矣

懷生苄六兩乾山藥四兩茯苓三兩去皮牡丹皮三兩澤瀉二兩山茱萸去核黃連四兩黃栢三兩知母去毛三兩人參二兩

當歸二兩　皂角二兩

右爲末用豬大臟頭一段去油灌入藥末兩頭線扎住用糯米一升煮飯將半熟撈起入餓內將藥腸盤藏於飯中蒸飯之熟待冷些取出去兩頭無藥之腸將藥腸搗爛爲丸如梧桐子大每服百丸空心白湯送下

○洗痔漏神方

花椒　艾葉　葱白　五棓子　皮硝
馬齒莧　茄葉

右各等分剉碎水煎先熏後洗當時痛止指日可愈

○又方神効　用隨河柳根上鬚一把花椒芥菜子三味不拘多少煎水先熏後洗其蟲頭黑身白俱從漏瘡而出立愈

○敷洗藥

皮硝炒焰　五棓子炒　黃柏豬膽炒　黃連　滑石各二錢　沒藥　蜜陀僧　荊芥各一錢

血竭　乳香

右爲末用猪肝一片批開將藥末摻在內麻線紮定煮熟食之

○又方　五棓子　皮硝

右爲末用猪大腸一段將藥末裝入腸內兩頭紮緊煮熟食之

○又方　五棓子　皮硝　黃柏　黃連

右爲末用豬膽汁和丸如梧桐子大每服百丸空心白湯送下

○又方　五棓子　皮硝　黃柏　黃連　滑石各二錢　沒藥　蜜陀僧　荊芥各一錢

骨五分赤石脂五分二味用鷄胵胵皮包入猪蹄甲內火煅過去胵甲不用將二味為末入煎湯藥內每帖加二味藥一錢再服四帖除根忌酸辣鷄魚麵動發毒動風之物其餘不忌酒亦少用

○腐生蓮蓋蔽 紅赤珍曰緑褐色者名紫赤者名紅食雖蔬家用之煮去黑汁不堪用赤者俗名紅紫者俗名紅紫又名鳥冒盛浜蓮兒菜 蒲蓋一兩 錦紋大黄 黑牽牛取頭末各一兩二錢當歸 凌藥各一錢

右為細末欲服藥先一日勿吃晚飯次日空心用淡猪肉汁調服午後方神効不可輕忽切忌燒酒

○千金不易治漏仙方

芫花根 川烏 草烏 南星 半夏各三錢將上五味末用醋調麵作圈子大曬乾每服一錢五分此為驗矣如散藥難服用酒糊丸如菉豆大每服一錢五分此

味藥用水數碗煮至二碗下後

孩兒茶各三錢 片腦二厘 射香四厘 黄蜡一錢

一下黄絲線合過街蛛絲用綫作圈網之合絲搓成線入藥水煮為度用猪毬引線穿入漏內俟大便後帶出線來扎紫一日緊三遍待八九日線落而肉平矣如孔多者醫好一孔外用此方內服後平藏九除根

○平藏九 治漏瘡甘日見効

黄連酒炒 枳殼麸炒 地榆 槐角各一當歸酒洗 乳香 沒藥各二錢

蓮蓋各三錢 側柏葉一錢 京墨燒存性五錢 乳香 沒藥各二錢

右為末水丸每服百丸空心白湯送下漸減至六十丸止若

加黑丑頭末五錢共九充効

○白銀定子　治漏止有一孔者用此藥不過十日全愈又不作痛神効

白砒三兩　白礬一兩

右二味共研為細末鐵杓鎔成餅再入炭火煆令冷煙取出去火毒為末用麵糊和為定子成條揷入漏內直透裏痛處為止每一日上三次至七日為止至九日瘡結痂而愈如痛未痊用後生肌散

○生肌散

乳香　沒藥　輕粉　海螵蛸用三黃湯煮過　寒水石煆　龍骨煅各等分

右為細末摻患處貼用太平膏

○太平膏

防風　荊芥　梔子　連翹　黃芩　大黃

獨活　當歸　生芍　赤芍　甘草

羌活　金銀花　五梔子　兩頭尖　頭髮錢各二　白芨　白蘞

山慈孤各一兩　香油一斤

右剉細入油內浸一晝夜用文火熬焦去渣滓再熬滴水不散入上好黃丹水飛過炒黑用半斤入內再熬滴水成珠為度待温冷再入乳香沒藥輕粉血竭各二錢為末於內攪勻如藥色嫩再入官粉五錢亦佳務要看其火色不老不嫩得所為妙

○隔蒜灸法　治痔漏神効

皂角一斤用兎一斤兩頭泥作二塊再用香油煉上嗜乾再着皂角上煅焦為末

川山甲一錢入柴粉礬性取出為末　木鱉子去殼火煆二錢半淨為末

葱姑乃小蒜遲則黃腐尋之根苗與芹鴉蒜相類但芹鴉根三毛葱姑有毛殼包裹為異采用去之故

○薰洗方　前法灸畢以此方薰洗

皂礬製法如前為末四兩焙乾為末取一兩

葱七莖

右件先將葱用水煎三四沸傾入瓶內再入前藥令患者坐於上瓶口薰之待水温傾一半洗瘡留一半候再灸再薰洗以瘥為度

○攻毒丸　治痔漏

用有子蜂房焙乾存性為末麵糊為丸如豌豆大每服二十

丸空心黃酒送下

補遺秘方

○治痔漏秘方

當歸八分川芎五分芍藥八分生地黃一錢荊芥七分烏梅一箇防風　條芩　枳殼去穰五分　槐角　黃連　升麻各五分右剉一劑水煎空心温服

○治痔漏神方

用極大木耳温水洗去黃取出曬乾為細末初服一錢五分用蜜水調服一日加一分加至三錢每服到退一分服至一月運好要忌口若穿臀漏極痛者用魚鰾搗為泥貼之其痛即

極傳神應膏　治痔漏如神

片腦　熊膽　血竭　牛黃　乳香　沒藥

乳香

右藥和勻一處以冷水調量瘡大小作餅子貼瘡上將艾炷法灸如以瘥為止

沒藥各錢半為末臨灸時加入

灸三四壯灸畢就用薰洗藥先薰後洗日六度三五日如前

各五分

右為細末用蝸牛取肉搗成稀膏每夜洗淨拭乾將此膏搽上患處數遍即覺若蝸牛無鮮者用乾的放水碗內泡一宿去殼內自然成肉將前六味藥要極細末以蝸牛之時珍曰集古方屋上苔共搗不要乾了要稀稠得所用磁碓收貯封固勿使風塵在內則不効矣

○熏洗痔漏却毒湯

五梔子　花椒　防風　側柏葉　枳殼

蔥白　蒼术　各三錢　馬蘭覓　井草　各五錢

皮硝一兩　用水五碗煎至三碗先熏後洗日三次

○牛黃六金花散　敷痔漏良方

黃連　黃芩　黃柏　各細末　真牛黃一分

右共研細如痔瘡用蜜水調搽上不過四五次如是捻成錠

每屋上六月采黃時日乾時珍曰屋上苔乃屋瓦之苔也剝取用之時珍曰集古方屋上苔一名瓦松一名瓦花一名瓦草一名昨葉何草一名瓦松一名向天草一名鐵脚雀瓦一名天王蓋塔子草禾曰昨葉何草生何屋上黨屋上如瓷初生狀如松高尺餘遠望如松栽志曰屋上瓦松有之生于屋上瓦溝中背有白毛有大毒云

子晒乾量瘡腫大小內入不過二七即好

一男子患痔腫血淋漓口乾作渴晡熱便血白汗益汗余謂此腎肝陰虛也不信仍服四物湯柏知連之類食少瀉幅余先用補中益氣加茯苓半夏炮姜胖胃漸醒後用六味元朝夕服兩月餘諸症悉愈二方俱見補益

增補痔漏門方

增補四物湯加黃芩黃柏槐花方

當歸　苟藥　川芎　生地黃

酒黃柏　炒槐花　酒黃芩

內熟痔漏下血者此方主之○痔漏廣腸之毒內經曰因而飽食經脈橫解腸癖為痔是以痔漏之人而藥毒之腹未見其愈也一有病根則勞思便作飲酒

便作所以然者內熱而血妄行也是方也生地梔花黃芩黃
柏清其熱也當歸芍藥川芎調其血也

增補四君子湯

人參　白朮炒　茯苓　甘草炙

年高氣弱痔血不止者此方主之證服攻痔之藥致血大下
不止而虛脫者亦此方主之○血有形之陽也必賴無形之
氣以固之故年高而氣衰則血下是方也
人參白朮茯苓甘草皆甘溫益氣之品也大氣充盈自足以
固有形之血譬之乾元充溢于兩間自能率乎天地而無倾
陋之危者也

增補痔漏諸藥總考

愚按古方醫痔漏下血有用梔角灰者有用梔棗灰者有用
蝟皮灰者有用露蜂房灰者有用牛角腮灰者有用胡桃灰
者俱以方寸七酒調下此皆梔痔之法也湯液之中有用防
風者有用秦艽者有用皂角仁者有用荊芥白芷者此皆責之
之風熱入臟也有用芒硝大黃者有用枳殼枳實者皆責之
實熱可下也有用胡黃連者有用酒苓參者有用石通肉者
有用苗水鼈者此皆責之實熱可清也有用桃仁紅花者有
用蒲黃蘇木者此皆責之瘀血未消也有用杏仁麻仁者有
用地黃黃柏者此皆責之燥金無液也有用地榆薪艾者有
用枯龍骨鹿角霜者此皆止其血也有用象牙蜣螂者有
用人爪蟹爪者此欲放出其肛而外施藥以愈之也有用熏
法者有用洗法者有用藥坐者無非梔痔止血之品也有用
梔藥者有用掛線者無非燥肌去腐之輩也嗚呼任醫循任

將用藥猶用兵神于兵者豐石可以為營驅牛可以破敵神于藥者心解而机自靈見超而術自神有不拘七于香上之陳言矣

懸癰

懸癰者此瘡生於谷道外臀之間初發甚癢狀如松子四十日赤腫如桃連治則破而大小便皆從此出不可治矣宜

○國老湯

用獺紋大耳草一兩截長三寸許取出山澗東流水一碗不可用井水河水以耳草釅水文武火慢炙不可急性須用三時火水盡為度勞看草中潤透却以無灰酒二碗煮至一碗溫服半月消盡為度

將軍散

大黃煨 貝母去心 白芷 耳草節格等分

右為細末酒調二錢空心服虛弱加當歸一半

體氣

○秘傳奇方 治體氣

大田螺生者一個巴豆去殼膽巻大一豆麝香少許

右將螺用水養三日去泥土揭起螺蓋入巻豆麝在內以線拴住於磁器內次日化成水滴五更時將藥水抹在腋下不住手抹直候腋中覺響臟腑欲行任手抹直候空地內去大便思睡極臭是其驗也以厚土蓋之不可令人知之如不盡再次藥水抹之又去大便次日用後藥搽之永拔病根

枯礬一兩 蛤粉五錢 櫟腦一錢 為末每次少許擦之

○烏蠶丸 治腋氣

當歸酒洗 生地黃酪各一兩 蓮蓬殼五錢 丁香三錢 木香 京墨酪各五錢 米片半分 如婦人服加烏藥醋炒 香附童便炒 各三錢

右為末陳米飯荷葉包燒過搗爛入藥為丸如黃豆大麝香一分黃酒化為衣每服三四十丸臨卧半飽用砂仁炒入黃酒內送下

○收功後藥

人參 當歸 生芍 乳香 沒藥 官桂 木香 青皮 陳皮 白芷 良薑 麻黃 米殼 甘草各一錢

右剉一劑水煎服出汗外用川椒枯礬各一兩為末擦腋下終身忌鱖魚羊肉去大小便不可與女人同厠

○治腋臭

用自己小便洗一次米泔洗二次自然姜汁每日擦十次一月之後可以斷

○治腋氣

香白芷 枯礬 花椒減半 黃丹各半分

右共為末擦之不臭

○治腋氣五更時用精豬肉二大片以茸遂末一兩拌之挾腋下至天明以生茸草一兩煎湯飲之良久瀉出穢物須在流野之處則可恐穢氣傳人故也依法三五次即愈虛弱者間

日為之其他蜜陀僧胡粉之類皆害家以治其末耳

○治狐臭方

麝香　巴豆去殼木通去皮

右為末每服一錢重浮子酒熬膏為丸金箔為衣空心水酒調化一丸服之以淨桶盛腹內打下穢物急蓋拿開勿聞神効

一脫肛

脫肛者肺臟蘊熱肛門閉結肺臟虛寒肛門脫出用參芪湯加減凡瀉痢久虛或老人氣血虛憊或產婦用力過度俱有脫肛症也小兒亦有脫肛症者脫肛者肛門翻出虛寒脫出也

○參芪湯

人參　黃芪蜜炒　當歸　生地黃

芍藥炒　茯苓去皮各一錢　升麻　桔梗　陳皮各五分　白朮去芦

甘草炙三分　肺臟虛寒加乾薑炒五分

右剉一劑姜棗煎食前服

大凡肛門脫出不收用熱泉洗後用烘熱鞋底捺進恐遲則冷燥難進或用冰片點上亦收

○浮萍散

杉秋暮取霜露打過浮萍不拘多少以淨瓦攤開陰乾其瓦一日一易不可見日務要陰乾用紙包起凡有前疾者臨時研為細末先取井中新水洗淨脫出肛次以藥末摻上其肛徐徐即進一時即愈不拘男婦大人小兒並治

○脫肛方　五倍子炒黃為末放熱鞋底上托之即收

別今釐正之互見類下泻薬屬之地澤蒜中中是多季春始生苗之物九所九一黄細宿即生陰黄之下同

春元素有痔每勞役脫肛腫痛出水中氣下陷用補中益氣復而愈後復脫作痛誤服大黄湯加茯苓芍藥十餘劑中氣復而愈後去姜加熟地五味三十餘劑而愈（甘泻苦燥之陳泻之）

九腰鳴惡食戟危余用前湯加炮姜芍藥諸症漸愈後去姜（南儒昌根也二種皆面背緑益種而青者紫赤若血者謂之紫泽藥為良白紫乾也）

增補脫肛門方（甘泻苦燥之陳泻之）

增補丹溪脫肛方

人參　黄蓍　川芎　當歸　升麻

久泻脫肛者此方主之○泻久則傷氣下多則亡陰是氣血皆虚矣故令廣腸虚脫氣不足者補之以其温故用參蓍陰不足者養之以厚味故用芎歸下者舉之故用升麻

增補舉肛丸

半夏　天南星　枯白礬各五錢　枯紅礬

鷄冠花炒　白附子各五錢　訶子肉煅　黒附子生

枳殻略一蜠皮二枚灸　胡荽一枚燒存性　胡荽仁燒存性五枚

共為末醋糊作丸空心温酒下三十丸

泄泻虚寒脫肛者此方主之○泻盛則濡泻久泻則胃虚胃虚則藏寒藏寒則無陽以升舉故令肛腸脫而不上燥能去濕故用半夏南星枯能制濕故用紅白枯礬温能煖藏故用黒白附子乃若鷄冠花蜠刺皮枳殻所以驅風而訶子風蓍胡桃仁之厌取其澁以固脫也

增補收肛散

熊膽五分　孩兒茶三分　氷片一分

共為細末乳調塗肛上熱汁下而肛收矣

熱泻脫肛者此方塗之良○熱則肛門澁、則便不易出不

易出則令人努責努責之久則令脫肛此與寒脫不同者熱則肛門澁寒脫則洞泄而不澁也吾可以勝熱故用熊膽澁可以固脫故用皃茶辛可以拔邪故用米片

諸蟲

蛔 蛔沉實者生蟲盛大者死○尺蛔沉而滑者為寸白蟲○蜜蝕陰症蛔盛小者生勁急者死○外臺云蟲蛔當沉弱而弦今反洪大即知蛇蟲甚也

古云溫熱生蟲正如今人俗諺禾苗雨洒日照禾節生蟲此說明矣人患蟲積或饑餓調攝失宜或過鯉鱠白酒或灸食牛羊或啖鱉覺中腕氣虛溫熱少運故生寸白蛇蠏諸蟲形如蛔蚓相似圓魚曰血鱉小兒最多大人間有為患鎮雜腹痛嘔吐涎沫面色痿黃眼眶鼻下青黑以致飲食少進肌肉不生沉黑寒熱蟲不早治相生不已古云蟲長一尺則能害人蟲若貫心殺人甚急宜選方而用

諸蟲者腸胃中溫熱所生也

○追蟲丸

木香　檳榔　蕪荑　錫灰各一分　史君子肉二分

大黃三分　幸牛末一兩

先將皂角與練樹根皮二味煎濃二大碗煎熬成膏和前藥末為丸梧桐子大將沉香末為衣後又將雷丸末為衣每服五十丸空心砂糖湯下追取蟲積即愈

○追蟲取積散

檳榔末二分半　黑丑頭末二分　陳皮末八分　木香末五分

右為末共研勻每服五錢小者三錢砂糖湯調下五更服行三四次以米湯補之忌魚腥油膩之物三五日

○五仙丸　治諸蟲如神

大黃四兩　皂角　雷丸　苦練根各一木香一兩

右為末酒糊丸每服三四十丸茶清下

○治蛔蟲方

用若練根刮去外粗皮取內白皮二兩以水三碗煮取一碗半去渣用晚粳米三合煮粥空心先以炒肉一二片吃引蟲向上然後進藥粥一二口少頃又吃一二口漸七加一碗或二碗其蟲盡下而愈

○治腸中有寸白蟲　用

檳子一斤陸續去殼吃不拘男婦大人小兒如有此疾者用此果去殼陸續吃用盡一斤其蟲從大便中出用淨桶接着是雄者自一條是雌者大小不等或三五條或六七條不止只是還要吃一斤此蟲方絕出盡若蟲出後其人宜好飲食調理不半月精神顏色身胖如初也

治蟲方　史君子火煅七箇去皮熱水送下其蟲盡出