

遠

醫方名物考補遺

卷五

武
857
45-44

學大田稻早
館書圖
庫文田內者托寄
號七六一第書托寄
號 9 第
冊 41 第

武
號 857
卷 45-41



遠西醫方名物考補遺標目

卷五

刺答尼亞

地膽

地膽消毒飲

驅熱散
龍酸飲
香竄飲
鱖蓬丸
丁幾劑
收飲劑
潤涼飲
散劑
煎劑
收飲劑
收飲擦方

姜橙糕
龍腦飲
健胃飲
香竄丁
海葱飲
固腸飲
越幾斯
浸劑
丁幾劑
漱方

附收瀉藥說

單收瀉藥
苦味收瀉藥
揮發收瀉藥

名物考補遺

卷五

標目

風雲堂藏

大正五年九月
內田系子氏贈



收瀉藥性功總說

百屈林

傑臘弗魯伊

傑臘弗魯伊 驅蟲膏

傑臘弗魯伊 越幾斯劑

傑臘弗魯伊 丁幾劑

太那設黠謨

驅蟲膏

太那設黠謨油

伊里斯弗魯連底那

蘇格爾爾需謨

麻爾羅歇

麻爾羅歇 越幾斯劑



遠西醫方名物考補遺卷五

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

地膽

「ジチハンノウラ」俗「メロエ・プロ・スカラ」
「バーウス」羅「マイナルム」
「バイナルム」蘭

芫菁ノ一種ナリ翅ナク甲半被フ。二種アリ一種ハ

淡青蓮色。一種ハ背赤色。按ニ本草綱目啓蒙云。地膽

リ時々出行ク長サ一寸餘。潤リ三。此蟲人手ニ觸ル

四分。黑色碧光アリ飛フ。能ハス。脚節ヨリ臭氣アル黄色油樣ノ脂液出テ粘著ス

地膽ノ性効多ク此液ニ在リ故ニ是ヲ失サル爲ニ

箸ニテ夾捕紙ニ包ミ乾シ頭脚等ヲ去リ貯フ

試効此蟲大毒アリ性効芫菁ト同、微緩弱ナリ過服スレハ劇キ腹痛、胃腸燄衝吐血下血ヲ發シ特腎膀胱尿道ヲ刺戟ノ劇キ燄衝小便閉、尿血等ノ危症ヲ發シ或死ス○一男兒六歲此蟲一個ヲ燒酒ニテ吞下ス少間^{シハラク}ノ大腹痛煩躁、搐搦、衄血尿血下血、血汗ヲ發ノ斃ル○然^レ氏服量些少ニ用^レハ經久廢癰ノ病患、急劇危篤ノ諸症ニ奇効ヲ得ル^ト多シ○此藥溶解稀釋ノ峻効アル故ニ痛風、脚痛、腰髀痛、歷節遊走痛等、經久頑滯ノ症、結石、腎痛ニ偉効アリ○水腫小便閉ニ驅水ノ駛効アル^ト芫菁ノ如シ○此蟲ヲ

醋ニ投シ或蜜ニ浸メ殺シ乾^カシ頭甲脚ヲ去リ極細末トシ初半^ハ氏許ヲ取テ舍利別等ニ和シ每日前說ノ諸病ニ用ヒ漸次^{シタイ}ニ服量ヲ增加^シ小便燄痛頻數努責ノ稠濁ノ粘液ヲ雜ヘ通スルニ至テ休ム尚驗ナキ^ハ又前法ノ如ク用^テ治スルニ至^ル或云此末ヲ四^ハ氏マテ舍利別ニ和シ用^ラレハ右ノ諸症ヲ發ノ小便ニ夥ク粘液ヲ通スル^ト大抵七八時許病ノ輕重ニ隨ヒ右ノ如ク用^ル六次若ハ十二次ニノ全治スルニ至ル○狂犬咬傷ニ奇効アリ患人ノ年齡ニ隨ヒ此蟲一個ノ八分一ヨリ半分マテ一服トシ半

時毎ニ與テ尿血ヲ發スルニ至ル。其創ハ鉞針ニテ刻截ノ毎日水銀膏ヲ擦スヘシ鉞針ヲ恐ル者ハ頻ニ芫菁末ヲ摻ノ潰破セシムヘシ此ニ由テ危險ノ症ヲ救フ勝テ算ヘ難シ○或云此蟲ノ細末大人ハ一匁半ヨリ二匁マテ消石一倍若ハ三四倍ヲ加或小便焮痛不利ヲ發スルキハ亞刺比亞蘄謨ヲ加テ二時若ハ三時毎ニ用ヒ小便血縷ヲ見スニ至レハ消石ヲ去テ此末一味前法ノ如ク用フ其創ハ數芫菁末ヲ摻ノ潰爛セシメ三週許モ瘡スナキヲ肝要トス。是ニ由テ危險瀕死ノ症ヲ救活ス○或云此

蟲ヲ蜜ニ浸ノ殺シタルヲ一味用フヘシ他藥ヲ加ルヨリハ功驗著實ナリ○狂犬傷ニ因テ恐水搐掣ノ症ヲ發スル者ハ左ノ劑ヲ與テ汗ヲ發シ小便ヲ利シ其毒ヲ驅泄ノ治ス。又前說ノ痛風ニ殊効アリ

地膽消毒飲

地膽	八個	的里亞加	四錢
龍腦	一錢	民埤列利精	八分
鹿角揮發塩	名或硃砂華	二錢	

右調和シ二匙宛與ル一日兩次此服量ニテ小便焮痛ヲ發セス然レ既ニ恐水ノ症ヲ發シ患者總テ飲

液ヲ見テ驚怖シ毫モ飲ムヲ能ハサル者ハ劑中ノ
民埤列利精ヲ去テ接骨花傑列イ乙鏡四錢ヲ加テ煉
膏トシ分テ十六服トシ早朝ト夜分ト一服宛與フ
ヘシ○往年狂犬傷ヲ被ル者十五人其中十二人ハ
初ヨリ右ノ療法ヲ施ノ皆全愈ス二人ハ當時患症
ナキ故ニ自ラ怠忽ノ此藥ヲ用ヒス數週ノ後惡症
ヲ發シ死ス一人ハ數日ヲ經テ諸症萌發スル故ニ
大ニ危懼シ荐ニリニ此藥ヲ服ノ全愈ス○四男子一
婦人齊ヒトク狂犬傷ヲ被リ當時患症ナキヲ以テ治療
ヲ施サス然ニ二百二十日許ヲ經テ皆恐水ノ危症ヲ

發シ男子悶亂狂躁ノ死ス但婦人ハ此蟲ヲ蜜ニ研
和シ數服ノ回復セリ○二少年一婦人同時ニ狂犬
傷ヲ被ル此蟲ヲ取テ頭ヲ去リ各一個ヲ服ス共ニ
忽ヒ瞑眩ノ劇症ヲ發シ死ニ瀕シ然レ尿血ヲ發ノ諸
症醒解シ爾後狂犬毒再發セス○一小兒十歲狂犬
傷ヲ被ル此蟲ヲ蜜ニ研和シ與テ劇キ腰痛ヲ發シ
小便終日頻數淋痛ノ休マス且油脂ノ如キ粘物及
血交リ通ス然レ其症漸ク減シ爾後犬毒ノ患症再
發セス○此藥ヲ用ヒテ渴甚キ者ハ接骨花ノ泡劑ヲ
與ヘ臥床ニ溫覆ノ微汗ヲ發シ且繻絆臥被ヲ更換

スヘシ○狂犬傷ニ是ヲ用テ効ナク或死スル者ハ
服量些少ニノ功ヲ成スニ足サルカ或是ヲ用テ遲
クノ諸器血液既ニ烊崩シ挽回スルヲ能ハサルナ
リ○狂犬其他諸獸咬傷ニ因テ既ニ危劇ノ諸症ヲ
發スル者ハ此蟲ノミナラス芫菁水銀及麝香龍腦
等ノ鎮瘡藥亦良驗アルヲ諸名醫質驗ノ確說多シ
依叔 淑施

刺答尼亞羅ラタニイ蘭

形狀李露南亞墨加等ニ產スルカラメリアトリア

ンドラ或云「テタ」ト曰フ灌木様ノ草根ナリ和蘭千
年始テ諸厄利云此草多枝分數二三尺許按色ニノ葉
ナシ但細條ノ本ニ葉互生シ末尖リ鋸又ナシ葉及
細條白色ノ毛茸被ヒ天鷲絨ノ如シ。花四瓣蛾形。四
雄蕊。三雌蕊アリ第四綱 第三目萼ナク尖葉兩對ス。實大蛇
莓ノ如シ背ニ鬚様ノ尖刺アリ核小扁桃ニ似テ一
尖アリ○根數極ヲ分チ細枝多シ句屈蔓延二三寸
ヨリ二三尺ニ至ル太サ拇指許或云一外皮粗糙。坼裂
黯赭色。皮質厚ク疏脆赭赤或帶黑色。中心木様帶白
色。皮味苦微辛。香氣アリ煮ハ香多シ。細末ノ美嬌紅

ナルヲ上品トス。水沸湯。燒酒等ニ浸シ若ハ水煎ス
レハ赤色トナリ茜根ノ如シ剝篤亞斯ヲ加レハ殷
赤色トナル。綠礬名爾撒兒末ヲ加レハ黑色トナリ墨
汁ニ用フ。漆匠是ヲ赤色ノ染料トシ或赤葡萄酒ノ
色ヲ出シ氣味ヲ醇厚ニス。水煎シ若ハ浸劑トシ貯
レハ黑塗生ス。此塗亞爾箇兒及銳烈燒酒ニ浸ノ溶
化セス華爾斯質見ハレス武云銳烈燒酒ニ浸ノ丁幾
劑トシ水ヲ加フレハ濁テ
華爾斯單寧及沒食酸
共ニ出ヲ含ハ幾那ヨリ多シ。此
收瀋質香竄質ハ總テ保固強壯藥ノ基資トス

試効根ヲ藥用トス。收瀋苦味ノ保固強壯藥ニノ甚

夕幾那ニ近シ但幾那ニ比スレハ味佳ク胃ニ重滯
セス虛弱ノ諸症ニ長服ノ胃腸ノ消化力ヲ妨ケス
間歇熱諸脫泄失血等ニ用テ効力幾那ニ優リ且健
胃ノ効殊ニ多キ故ニ晚近是ヲ以テ幾那代用ス近
來幾那ハ上品少ク或偽品アレハナリ○凡強壯劑
ヲ用ヘキ諸病神經熱腐敗熱等ノ保固強壯藥ヲ與
フヘキ症ハ服法製劑幾那ノ如ク用テ煥衝ヲ増發
セス殊効ヲ奏ス但藥力峻ナル故ニ幾那ニ比スレ
ハ服量ヲ減スヘシ大抵此末十五匁ト上好ノ幾那
末二十匁ト對當ス。或云頑固ノ間歇熱ニ幾那末二

十氏宛用ル症ハ此末十五氏宛與テ驅熱ノ効。幾那ヨリ駄捷ナリ。○間歇熱。其他往來發歇アル熱病ノ多ク幾那ヲ與テ驗ナキ症ニ此藥ヲ用テ每常治驗ヲ誤ルナシ。○間歇熱。傳染往來熱ハ後方ヲ與テ多ク治ス。

刺答尼亞驅熱散

刺答尼亞根

細末 一弓

右分テ十六服トシ一時若ハ一時半毎ニ一服宛薄荷若ハ迷迭香ノ泡劑ニテ送下ス左ノ方亦良

刺答尼亞姜橙糕

刺答尼亞根

細末 一弓

乾姜 細末 一錢

橙皮舍利別

鏡 一弓

右煉和ノ糕トシ發熱ナキ時半時毎ニ一茶匙若ハ肉豆蔻大ヲ服ス。○腐敗熱寒壞疽等。後方治驗多シ

刺答尼亞龍酸飲

刺答尼亞越幾斯劑

一錢半

龍腦飲

補 七弓

稀硫酸

即綠礬精 名 二錢

右調和シ二時毎ニ三匙宛服ス。○神經感觸甚キ諸症。神經病ノ頭痛。依剝昆垵利亞癩症等ノ神經病ハ後方秀偉ノ効ヲ稱ス

名物考補遺 卷五 七 刺答尼亞龍腦飲

刺答尼亞越幾斯劑 一錢半

龍腦飲 補 七弓

揮發香竄精 名 二錢

右調和シ二三匙宛與ル一日三次○一婦人生平病弱一日モ全康ナシ此越幾斯劑一味長服ノ强健ニ復ス○稟賦脆弱纖維弛緩ノ諸病ハ左ノ劑良効アリ胃腸虛弱ノ症ハ孕礬酒石 名 第三錢ヲ加フ多汗ノ症ハ香竄精ヲ去テ綠礬精二錢ヲ加フ

刺答尼亞香竄飲

刺答尼亞越幾斯劑 三錢 蒸餾水 十二弓

刺答尼亞香竄丁幾劑 一弓 次ニ出

揮發香竄精 名 二錢

右越幾斯劑ヲ水ニ溶シ丁幾劑香竄精ヲ加ヘ一時半或二時毎ニ二匙或三匙宛服ス○飲食消化シ難ク風氣痞滯或婦人無孕白帶下淋疾粘液漏泄或經久潰瘍等ハ後方多ク驗アリ

刺答尼亞健胃飲

刺答尼亞越幾斯劑 一錢半 瀉利塩 名 二錢

刺答尼亞丁幾劑 四錢 蒸餾水 七弓

右調和シ二時毎ニ二三匙宛服ス下利スル者ハ瀉

利塩ヲ去ル。酸敗液。腺腫。痛風ヲ兼ル者ハ瀉利塩ヲ去テ蘇蓬塩二錢ヲ加フ。丸藥ヲ好ム者ハ後方良

刺答尼亞蘇蓬丸

刺答尼亞越幾斯劑 一錢半 蘇蓬塩 半錢

葛縷子油 或茴香油 十五滴

右調和シ舍利別ヲ加テ三十九トシ二丸宛服スル
一日三次或三丸宛兩次服ス○胃虚弱ニノ感觸甚
キ症ハ此根ヲ浸劑トシ服ノ尤良散劑越幾斯劑ニ
比スレハ消化シ易シ○體稟虚弱飲食消化シ難ク
痞氣苦滿胃痛胃瘕大便滑泄下利等胃腸感動シ易

キ症ハ左ノ二方苦味香竄收瀉ニノ効力諸健胃劑
ニ勝レリ

刺答尼亞香竄丁幾劑

刺答尼亞根 搗碎者 白桂 搗碎者

燒酒 二比

右硝子壘ニ内レ浸ス一十日濾テ滓ヲ去リ二三匙
宛水少許ニ加ヘ服スル一日三四次

刺答尼亞丁幾劑複方

刺答尼亞根 搗碎者 橙皮 黃搗碎者
攝爾扁答利亞 名 四錢

雜腹蘭

一錢

燒酒

再 二 比 者

右硝子壘ニ丹レ浸ス一十二日。濾シ貯フ。服法同前。此劑効力。峻ナル故ニ幾那丁幾劑復方〔鏡〕ニ比スレハ服量ヲ減スヘシ。○胸水。腹水。肢節水腫ニ左ノ方ヲ用テ衰弱ヲ強壯シ小便ヲ利シ總テ險重ノ水腫ニ治驗多シ

刺答尼亞海葱飲

刺答尼亞越幾斯劑

二錢

海葱丁幾劑

一錢

甘消石精

〔補〕

揮發香竄精

〔名〕 各二錢

蒸餾水

〔名〕 七

刺答尼亞香竄丁幾劑 前出 四錢
右調和シ三匙宛服スル一日三四次。○尿道粘液漏泄過多。淋瀝等ハ此越幾斯劑殊効アリ。○尿崩ハ後方屢良驗ヲ稱ス

刺答尼亞收斂飲

刺答尼亞越幾斯劑

一錢

消石精

三錢

刺答尼亞香竄丁幾劑

前出 四錢

蒸餾水

七

右調和シ二三匙宛服スル一日ニ數次。○經久下利滑泄等ハ左ノ劑ヲ用テ多ク治ス

刺答尼亞固腸飲

刺答尼亞越幾斯劑

一錢半

刺答尼亞香竄丁幾劑

六錢

蒸餾水

七勺

右調和シ二時毎ニ二三匙宛服ス○一僧尼久ク下利ヲ患ヒ諸藥驗ナク虛羸ノ甚タ危險ニ至ル此越幾斯劑ヲ服ノ下利漸ク止ミ回復ス○此藥血液ヲ收斂シ失血諸脫世ヲ治スルヲ篤爾面室刺名拳參根名ニ勝リ殊ニ越幾斯劑トシ用レハ効力諸植物ノ收斂藥ニ超絶ス○吐血ハ乳汁ヲ用テ血ノ酷厲

毒ヲ和解ノ血脉ヲ刺破セサラシメ且滋養ス但咽喉潰瘍或聲啞ヲ兼ル症ハ刺答尼亞ヲ用ヒ乳汁ヲ多服ノ尤効アリ此越幾斯劑ハ殊ニ斂血ノ峻効アリ左ニ一二ノ治驗ヲ舉ク○一少年十二歲夥ク口鼻ヨリ失血シ衆藥驗ナク連綿二晝夜精力極テ虚脱シ又劇ク嘔吐シ危篤ニノ死ニ瀕シ乃此越幾斯劑一錢ヲ取テ水ニ弓ニ溶シ蒸餾醋少許ヲ滴シ加與レハ其血頓ニ止ミ三日中ニ平復ス○一坊賈ノ婢月經延綿止マサル一既ニ二年發熱ノ虛憊シ肢體極テ羸瘦シ傍人ノ扶掖ニ非レハ舉動スルヲ能

ハス食進マス諸藥驗ナク衆醫不治トス乃此越幾斯劑一錢ヲ與テ經血稍減ス第三日又半錢ヲ與テ逾輕差シ稍食ス第六日又半錢ヲ與ヘ第九日杖ニ倚テ歩行シ以後右ノ如ク此劑ヲ與テ熱解シ食進ミ一月許ニテ回復ス○一婦人崩漏劇クノ止サルヲ八日大ニ虛憊ス阿芙蓉等歛血ノ諸劑微功ヲ得ス因テ此越幾斯劑前法ノ如ク一服與テ崩血止ミ翌日患婦能ク歩行シ第五日ニテ全治シ以後康健ナリ○產婦脫血赤白帶下嘔血創傷出血等治驗甚タ多シ失血疼痛ヲ兼ル者ハ其血止メハ疼亦治ス

屢試ルニ脫血ニ因テ攣急痛ヲ發スル者多シ○諸脫泄失血劇クノ渴アリ多ク飲液ヲ服スル症ハ後方良効アリ

刺答尼亞潤涼飲

刺答尼亞越幾斯劑 末

芒消 一錢 醋 一錢

右越幾斯劑ニ芒消ヲ和シ文火ニテ溶解シ醋ヲ加一服トス○此越幾斯劑ハ華爾斯質ニ非スノ苦味ヲ帶ヒ健胃ノ効幾那ノ如クノ收瀉スル故ニ血竭ヲ用ル諸症ニ内服外敷シ斯ノ如キ護謨華爾斯ノ

諸藥ニ勝リテ良効ヲ奏ス。又收瀉藥ノ害アル諸症
モ是ヲ用テ害ナシ凡、歛血藥中此劑ノ如キ過誤ナ
ク峻効アル者。植物中。比スヘキ者ナシ。從來醫家此
劑ヲ諸失血ニ質驗シ殊効ヲ得ル者既ニ八百餘人。
然、ハ是ヲ用テ驗ナキ者ハ恐クハ服量一錢ニ足ラ
サルナリ

越幾斯劑 **服量** 大抵半錢ヨリ二錢マテ香竄ノ露水
ニ溶シ用フ。○或云十二歳以上ノ者ハ一匁ヨリ二
匁ニ至ル。大人ハ半錢ヨリ一錢マテ水少許ニテ送
下ス。或、丸藥トシ五匁ヨリ十匁マテ日ニ兩次服ス。○

失血ハ水若、ハ玫瑰水鏡ニ溶シ每服越栗エ失爾ル、緒篤
立沃利名或、蒸餾醋十滴ヨリ二十滴マテ加用フ。○
失血諸脫泄ハ一錢ヲ一服トシ速ニ止ム。効ナキ者
ハ再服ス。三服用ル者稀ナリ。少許宛數用、ハ捷効
ナシ或、一服用ヒ治メ後再發ヲ防ク爲、ニ一服若、ハ
其餘モ用ルヲアリ吐血ノ効ヲ兼ル症ハ間再服ス
○或、失血止テ後。此劑毎朝一錢宛二日與ヘ翌朝ハ
半錢ヲ與ヘ其後ハ一錢ノ四分一宛與テ再發ヲ防
ク者アリ。此劑久服スレモ害ナシ。一男子外傷
ニ因テ吐血シ此劑ヲ與ヘ治メ後四個月服メ毫モ

妨害ナシ○脱血頑固ノ諸脱泄劇クノ止サル症ハ
此劑三錢ヲ一服トシ與ル_一アリ此類ノ劇症ハ煎
劑泡劑ニテ速効ナシ○此根ノ効力ハ專ラ其皮ニ
在リ中心木様ノ質ハ効ナシ故ニ全根二錢ヲ煎劑
泡劑散劑トスレハ皮一錢ノ効アリ皮一錢ヲ用_レ
ハ越幾斯劑半錢ノ効アリ然_レハ全根ノ煎劑泡劑散
劑ハ越幾斯劑四分一ノ効アリト知ルヘシ○嘔吐
アル症ハ越幾斯劑一錢ニ水ヲ濕ノ丸藥トシ一服
トス味ナクノ服シ易シ

越幾斯劑製法健質亞那越幾斯劑名ト同シ 潤

又法根ヲ採リ洗_レ判_ミ冷水ニ浸_ス一夜磁鍋ニ_一付_レ
火ニ上セ煮テ濃赤色トナルニ至リ濾テ液ヲ取リ
又其滓ニ水ヲ加ヘ煮テ赤色出ルニ至リ濾テ前液
ト合シ毛布ヲ重子テ濾シ火ニ上セ煎熬ノ稀蜜ノ
稠トシ是ヲ盤ニ寫シ太陽ニ暴シ乾固ノ破碎スヘ
キニ至_レハ上好ノ盧會ノ如ク明淨透亮ニ_一硝子
ノ如ク殷赤色上好ノ血竭ノ如シ故ニ間_ニ血竭ト紛
錯ス然_レ氏血竭ニ比スレハ疏脆ニ_一苦味ヲ帶ヒ甚
收斂ノ齒ニ粘著セス火ニ投スレハ熔ケスノ焚燒
シ華爾斯ノ臭ナキヲ以テ是ヲ辨スヘシ○生根ニ

テ製スレハ塩質速ニ水ニ融解シ。久ク火力ヲ假ラス
ノ藥氣出ツ。乾根ニ比スレハ効力峻ナリ。乾根ニテ
製スレハ時ヲ費シ精細ニ注意セサレハ透亮光潔
美赤色トナラス或久ク煎熬スレハ炭素焦質ヲ生
ノ透亮ナラス性効脫失ス或急煎スレハ亦焦質生
ノ赭黒トナリ或鍍器ヲ用レハ此根ノ没食酸、鍍氣
ト抱合ノ黑色トナル○此劑ヲ製スルニハ水六倍
宛加テ前法ノ如ク兩次煮ルヲ佳トス數回煎熬シ
或過半煮減スレハ塩質收瀼苦味多ク脫シ効力劣
弱ニノ多服セサレハ驗ナシ○此劑燒酒ニハ最多

ク溶化ス蒸餾水ハ是ニ次ク醋ハ又是ニ次ク但此
三種ノ液モ熱スレハ尤多ク溶化ス。沸湯ハ殊ニ多
ク溶化シ効力亦多シ○散劑、浸劑、煎劑、丁幾劑モ亦
用テ多ク良効ヲ稱ス

刺答尼亞散劑乾根ヲ破碎シ中心ノ木質ヲ去リ極
細末トシ三錢ヲ一服トス或十氏ヨリ一月若ハ半
錢マテ日ニ數次服ス

刺答尼亞浸劑乾根一弓沸湯一升。浸ス一十二時綴
布ニテ濾シ滓ヲ去リ一盞宛服ス○失血諸脫泄ノ
劇症ハ左ノ煎劑亦捷効アリ

刺答尼亞煎劑 此根四錢ヲ取り水二斗ヲ加ヘ煮減
ノ半比トシ濾テ滓ヲ去リ醋二錢ヲ加ヘ一服トス
緩症ハ分テ二三服トス。或沙糖四錢ヲ加甘味トシ
與フ

刺答尼亞丁幾劑

刺答尼亞根 搗碎者 燒酒 二斗

右硝子壘ニ内レ蓋封シ浸テ八日。濾テ滓ヲ去リ貯

刺答尼亞收斂丁幾劑 一名刺答尼亞精

刺答尼亞越幾斯劑 四錢 燒酒 四斗

蒸餾醋 八斗

右調和シ小頸硝子壘ニ内レ蓋封シ煖處ニ置キ浸
一三日。濾テ滓ヲ去リ固封シ貯フ。口中斷顎ノ潰
瘍腐爛ヲ治シ齒牙弛動ヲ強固スルニ此越幾斯劑
ヲ水ニ溶メ含漱シ或此根ノ細末ヲ摻メ速効アリ
此藥ハ諸器血脉ノ緩弛ヲ收固スレハナリ。○齒斷
腐爛ヲ治シ齒ヲ淨潔強固スルニ前説ノ丁幾劑ニ
方共ニ口中ニ含テ殊効アリ又左ノ漱劑ヲ用テ良
是ヲ以テ沒藥丁幾劑ニ代用ス

刺答尼亞漱方

刺答尼亞越幾斯劑 四錢 蒸餾水 十斗

醋 二弓

右越幾斯劑ヲ水ニ加ヘ火ニ上セ溶化ノ醋ヲ攪和
シ一匙宛口中ニ含ム一日數次○此根ノ細末收斂
ノ美赤色ナルヲ以テ揩齒藥トシ或乾根ヲ牙杖ト
シ齒ヲ揩テ強固淨潔ニス
外敷纖維弛弱經久潰瘍水棉樣腫失苟兒陪苦ノ斷
腐爛出血等ニ外敷メ治ス○產婦脫血月經崩漏痔
血過多ニ後方ヲ患處ニ擦メ速効アリ

刺答尼亞收斂擦方

刺答尼亞越幾斯劑 三弓

鉛粉 二弓

明礬 四錢

右極細末トシ研合ノ左ノ藥ヲ加フ

玫瑰油 一匙半 的列拉底那 二弓

蜜蠟 三弓

右文火ニ熔シ火ヲ下シ刺答尼亞鉛粉明礬ノ末ヲ
加ヘ手ヲ住メス攪和シ冷ルニ至ル○刺絡或水蛭
ヲ貼シ或齒ヲ拔テ出血止サル症ハ此越幾斯劑ニ
根ノ末ヲ研和シ其痕ニ貼シ暫ク壓定スレハ出血
即チ止ム

收瀉藥 按ニ刺答尼亞吉訶護謨等ハ收瀉藥ニ屬

ス此藥類ヲ統括ノ三種ニ分ツ左ノ如シ

單收瀉藥 此藥類ハ收瀉質尤居多シ植物ハ槲皮。沒

食子。阿煎藥。拳參共ニト篤爾面室刺名刺答尼亞共ニ吉訶護

謨共ニ山物ハ硫酸。消酸精消石鹽酸。蘇魯林。蘇魯林曹達

蘇魯林加爾幾。明礬。鉛糖。密陀僧。動物ハ磷酸共ニ等

揮發收瀉藥 收瀉質ニ苦味質。揮發油ヲ含メリ故ニ

稍脉管。神經ヲ衝動ノ收瀉スヘキ症ニ用フ即チ水

楊梅根。玫瑰花鏡撒爾非亞名等ノ如シ

苦味收瀉藥 保固強壯藥中ニ舉ル收瀉苦味藥ナリ

即チ楊皮。七葉樹皮。幾那共ニ烏霍烏爾失補等ナリ

收瀉藥性功總說 植物ノ收瀉質ハ沒食酸他總テ性

味收瀉ノ草木及單寧原名ロイヲ以テ基資トス此

類ニ含ム酸性性味ヲ成ス者ナ○收瀉藥ハ脉管

物ハ草木收瀉ノ性味ヲ詳説アリ

筋膜等總テ柔軟ノ纖維ヲ收固牽縮ノ強硬ナラシ

ム。是ニ因テ生力憤起ノ諸器ノ張力増發ス故ニ諸

管纖維弛緩虛弱ヨリ發スル諸病或精力脫缺諸器

虛損ノ發スル吐血。嘔吐。尿血。下血。婦人崩漏。白帶下。

遺精。尿崩。遷延下利等或神經熱。腐敗熱。胃腸熱等ノ

病毒汚物ヲ驅除ノ後尚飲食消化ノ機力アル症ヲ

治ス。又間歇熱ハ是ヲ以テ一奇藥トス。或諸筋及神

或云大ナル扁桃
ニ剖割スルカ如シ

微^ヤ皺アリ。赭色裏淡

豆蔻ヲ破碎スルカ

豆蔻ト薩サツ撒サ弗フ刺ラ斯ス

ハ油一弓半許出

刺^ラ斯^スノ如シ○偽品

外面皺アリ淡白色

東亞白西記共ニ南

新加坡 西貢 加洲

建胃力

夕侯冒ノ交ヲ科ス

10

ヲ治ス○遷延下利

殊効アリ。赤痢ハ胃

ス
○
疝
腹痛及_ヒ虛弱

散劑トシテ用テ經驗

者正二
的當久。散

或半錢

二五八 豆 金

用
元
死
二
交
乃
一
渾

「
デ
ッ
フ
ロ
イ
ア

イ
ゲ
ダ
フ
ロ
イ
バ

「タルム・バスト

形狀 南亞墨利加洲ノ須里那模 名地ニ産スル樹皮ナ

リ其葉長楕滑澤鋸齒ナク皂葉狀ニノ十五對許莖
枝ニ排列ス。葉本ニ曇黃色ノ蛾形花稠穂ヲ爲シ最
サ三四寸許。萼五出。短梗アリ。嫌フヘキ臭氣散漫ス。
十雄蕊分レテ一雌蕊ヲ抱ク 第十七綱 花後卵圓形
ノ核果 梅李類 ヲ結フ。黃綠色。扁桃ニ似テ毛茸アリ。肉
微黃色。軟ニメ微甘。嫌フヘキ臭アリ核扁圓。裏白仁
アリ味收澇○幹及大枝ノ皮ヲ取ル。濶大 或云長短
スニメ厚ク 或云厚薄一様ナラス 外面灰色ニメ薄キ苔被ヒ
其下ニ帶黑赭色ノ膚皮アリ。皮質ハ柔靱。纖維緻密

ニメ曇赭帶黑色。裏面鏽黃色。香氣微ナリ。新皮ハ嫌
ヘキ臭アリ味微苦ニメ發ヲ帶フ。久ク嚼ミ含メハ
苦味多シ久ク貯レハ氣味共ニ消散ス○一種牙埋
加 北亞墨利加洲ノ島名 ノ傑臘弗魯伊アリ。外面灰赭色ニメ
綠黃色ノ條理アリ。裏面黃色。味苦發ニメ甘ヲ帶ヒ
粘テ臭氣アリ是須里那模ノ樹ト種類異ナリ。殺蟲
ノ効アレ用ル稀ナリ○陳久ノ者ハ氣味脫メ
効ナシ或此皮ニ似タル葛斯加栗刺ノ種類ヲ以テ
偽リ販ク者アリ。是ヲ用レハ甚タ害アリ宜ク審ニ
新鮮ノ眞品ヲ擇ムヘシ

試効此皮殺蟲ノ奇効アリ殊ニ蛇蟲ヲ殺シ驅泄ス
蟻蟲條蟲モ亦効アリ○此藥峻下ノ効ナシ故ニ時
々下劑ヲ兼用スヘシ○此越幾斯劑ヲ丸藥トシ十
五氏マテ一服トシ或對症ノ劑ニ加用フ○蟲ヲ驅
泄スルニ左ノ如ク製シ用テ治驗多シ

傑臘弗驅蟲飲

傑臘弗魯伊

ニヲ

燒酒

四ヲ

水 二斤

右調和シ文火ニ煮テ殆半ヲ減シ滓ヲ去リ初日ハ
半時毎ニ二ヲ宛服スルヲ日ニ三次大抵大便三次通

ス翌日用ルヲ右ノ如クノ吐シ若ハ粘液ヲ下ス第
三日ハ半時毎ニ一茶碗宛服ス吐下ノ蟲及粘液ヲ
驅出ス第四日ニ藥刺巴ト如羅茂兒ヲ與レハ殘餘
ノ蟲ト粘液ヲ通泄ス是ニ由テ頑固ノ蟲症ヲ治ス
○此藥ニ他ノ殺蟲藥ヲ加テ丸劑トシ用テ驅蟲ノ
殊効アリ喻ハ後方ノ如シ

傑臘弗顯草丸

傑臘弗魯伊

顯草根

各三錢

乾白撒兒末爾扶斯

名

一錢

健質亞那越幾斯劑

名

二刀

右研和ノ三氏ヲ一九トシ甘草末ヲ衣トシ一時半
毎ニ四九尚其症ニ隨ヒ増加シ用フ

〔服量〕散劑トシ小兒ハ五氏ヨリ十氏マテ一服トシ
大人ハ一斗若ハ半錢宛用フ。此藥動スレハ惡心嘔
吐ヲ發スル故ニ初少許宛用ヒ漸々加ヘシ或云漸
惡心嘔噦發ス散劑ヲ用テ瀉下スル者アリ○煎劑
ハ此皮一弓。水八弓ニ煮テ用フ。浸劑亦効多シ○丁
幾劑ハ四十滴ヨリ八十滴ニ至ル。能蟲ヲ殺ス

傑臘弗魯伊越幾斯劑〔製法〕健質亞那越幾斯劑〔名〕ト

同シ〔注〕此皮八弓ヲ以テ越幾斯劑六錢餘出ツ。味苦

簽收瀆ス

傑臘弗魯伊丁幾劑〔注〕

〔製法〕傑臘弗魯伊〔搗碎者〕燒酒二十度者

右硝子壘ニ〔内〕固封シ爐邊ニ置テ六日、濾テ渣ヲ

去リ聽用ス〔注〕福〔華〕拔〔依〕〔衆〕

太那設黠謨

タルムコロイド〔レ〕イニ〔ハ〕ル〔子〕

〔形狀〕此草圓莖二三尺許。直生多枝硬固ニメ毛茸アリ。

葉大ニメ長ク。芹葉狀。互生シ深ク缺裂ス。邊鋸齒

アリ。黯綠或云黃滑澤。臭氣甚シ。味苦ク稍香竄樣。莖

枝頭ニ扁圓鱗狀ノ荅萼生シ筒様ノ小黄花或ハ稀ニ白花アリ

リ攢簇ノ複花ヲ爲シ辦端三又五雄蕊連匝ノ一雌

蕊ヲ圍ム第十九綱莖頭分テ繖ヲ爲ス佳好ノ苦味

アリ花後細長ノ子生シ微勾深窪白毛アリ此子多

ク揮發油ヲ含ミ香竄様ニメ不佳ノ氣アリ味辛苦

熟スレハ黑色トナル根木様多鬚歷年枯レス歐羅

巴洲諸國ニ生ス○蒸餾スレハ苦味精微ノ油出ヲ

此草一匕ヲ以テ越幾斯劑二三ヲ製ス

試効花穂子ヲ藥用トス性刺戟衝動ノ殺蟲ノ峻効

アリ子殊ニ虻蟲ヲ殺シ攝縣施那名ノ如シ○溫暖

開達健胃止痛防腐驅熱破氣ノ効アリ尿道ヲ淨刷

シ小便ヲ利シ汗ヲ發ス○水煎シ服メ水腫ヲ治シ

月經ヲ通ス○間歇往來熱粘液腫萎黃病處女病依

剝ボ昆コン垤ヂ兒ル黃疸傷冷毒痛ヲ治ス○子ヲ採リ細末或

浸劑煉膏トシ用ヒテ蟻蟲ヲ殺シ是ヨリ發スル搐掣

様ノ諸症ヲ治ス或吉利詞テール參兒トシ施メ良

服量花穂ヲ散劑トシ一月ヨリ二錢マテ一服トス

或二三氏ヨリ一錢ヲ一服トシ日ニ三服用フ或泡劑

若ハ煎劑トス○浸劑ハ四錢ヲ取り水六ヲ或ハヲ

ニ浸シ滓ヲ去リ服ス○太ク那ナ設セ黠チ謨ム油ハ内服外敷

共ニ蟲症ニ奇効アリ。二滴ヨリ五滴マテ飲液ニ點服ス。外敷ハ適宜ノ軟膏ニ研和ス。○左ノ軟膏ヲ腹部ニ擦テ驅蟲ノ峻効アリ

驅蟲軟膏

牛膽

石鹼

勿搗祭亞者
各一錢

太那設黠謨油

適宜

右研和ノ軟膏トス 昆

太那設黠謨油 製法薄荷油製法 名ト同シ

○此草ヲ燒酒ニテ蒸餾ノ精ヲ取り傷冷毒痛ニ外服外敷ノ偉効ヲ稱ス。○此葉ニ牛膽ヲ加テ研和シ

臍ニ貼メ蟲ヲ下ス。葉ノ煎劑一二匙宛兼用ノ尤良
○琶布トシ外敷メ寒腫ヲ消散シ肢節閃挫轉筋強硬及傷冷毒痛ヲ治ス 華涅拔叔叔窠依福僕

伊里斯弗魯連底那 羅イレヲスフロレンテインセリス蘭

形狀此草數葉叢生シ。長狹ニメ末尖綠色。葉間長莖ヲ抽キ。莖頭二花ヲ開キ六瓣白色或黃色。每瓣互ニ内外ニ勾屈ス。三雄蕊一雌蕊及黃色ノ鬚毛アリ 第三
網第花梗ナシ。○根塊節樣ニメ差扁ク拇指大ニメ固ク重シ黯黃色ノ粗皮及鬚根ヲ削リ去テ乾シ輪

ス。外面白色。裏淡黃。微辛苦香竄ニノ莖菜花ノ香氣アリ。多年枯レス。三年ヲ經テ根ヲ採ル生根ハ辛辣乾ケハ氣味減ス。○意太利亞等歐羅巴洲ノ南地殊ニ弗魯連底印地名ニ多ク培栽ス。○蒸餾ノ佳香ノ露水ヲ取ル。精微竄透ノ油少許浮ミ膜樣トナル

試効根ヲ用フ。生根ハ瀉下ス。乾根ハ鑽透稀釋疏解淨刷ノ効アリ。豁痰藥トス。殊ニ粘痰多キ嗽喘急等ノ肺病。經久ノ冒寒欬ニ用テ粘液ヲ稀釋シ吐痰ヲ進メ小便ヲ利ス。但嗽衝病ハ害アリ。○丹藏粘液過多ノ症。殊ニ小兒疫欬ニ此末四氏マテ一服トシ

用テ治ス。○小兒腹攣痛ニ制酸藥ヲ加ヘ煎劑トシ用テ良。○細末トシ沙糖ヲ和シ或亞刺比亞蘆謨漿ニ和シ或和胸劑ノ舍利別ニ加ヘ或硫黃華甘草末ヲ加ヘ或丸劑トシ用フ。○大人ハ一月ヨリ半錢ニ至ル。小兒ハ五六氏宛用フ。○汚穢ノ潰瘍。惡厲ノ疥癬ニ此末ヲ外敷ノ膿ヲ排ヒ淨刷ノ治ス。
（依）（叔）（淑）（華）（涅）（震）

蘇格爾需謨 「テウクリウム、スコルヂウム」
「ワートルローク」ガマンデル蘭

形狀此草。方莖叢生一二尺許。枝多シ下莖ハ地ニ塌ス。葉橢圓。皺糙毛茸多ク柔ニメ灰白色。鋸齒刻缺ア

リ梗ナク莖ニ對生ス。生葉葱蒜臭アリ味苦シ乾ケハ臭氣消散ス。莖枝ノ葉本ニ二個若ハ四五個ノ小唇花攢生シ上唇ナク下唇二又。中瓣長大。淡紅或淡紫青色。四雄蕊短シハ一雌蕊アリ第十四綱第一目 萼筒樣。短梗アリ花後四個ノ小裸子ヲ結フ。根鬚多シ經年枯レス原野濕地ニ生ス

試効 葉ヲ藥用トス揮發ノ油鹽ヲ含ミ鑽透稀釋。收瀋。防腐殺蟲。發汗。利尿。通經ノ効ヲ稱ス。○泡劑トシ服ノ病毒ヲ皮表ニ發越シ疫毒及痘瘡斑疹ヲ驅出ス。○粘液ヲ淨刷シ痰ヲ豁シ肺瘍欬嗽等胸肺ノ諸

症ヲ治ス。○下利ニ用テ腸ノ弛弱ヲ強壯ス効力撒爾ルヒ非亞アニ似テ收瀋ノ効微ナリ。○煎劑泡劑浸劑トシ或丁幾劑トシヒ

蘇格爾需謨丁幾劑

蘇格爾需謨越仙劑ト同シ

製法

蘇格爾需謨

乾葉適宜

燒酒

二十度者六倍

右硝子壘ニ内浸一六日。滓ヲ去リ固封シ貯フ。○外敷ノ疼痛及腐敗ヲ過ル一良藥トシ又毒螫刺咬ヲ治ス。蒸溺藥トシ汚穢潰瘍ヲ淨刷シパツ布トシ貼メ疫腫ヲ消シ腐敗ヲ過メ寒壞疽ニ効ヲ稱ス

治望依伍

「下ル」
ビ
ム・
ヒ
ル
ガレ
「マール」
ハ
ビ
ム
「ア
アル
ン
ド
ール
ニ
蘭

或云微麝
香氣アリ
原野路傍ニ生ス
經年枯レス

藥トシ腹藏ノ壅塞ヲ疏解ス○粘液ヲ稀釋シ汗ヲ

腫ヲ疏散ス

麻爾羅歇越幾斯劑莖葉ヲ以テ製ス製法健質亞那

越幾斯劑

名

ト同シ

依

涅

叔

家

遠西醫方名物考補遺卷五終

