

医事説約

香川修庵著

1682-1755

ヤ 9

1070



T79  
1070

方家堂本一

香川先生撰

鳴好文軒  
英萬笈堂  
升川泰山堂

醫事說約

賜谷良知先生閱

新刻醫事說約序

本邦正德年間、香川秀菴先生以醫名于京師、醫家至謂先生為太山北斗、先生信京醫之最高手也哉、其所著藥選行餘醫言行世、而藥論病因中天、但未見其集方、頗為遺憾矣、頃者書肆平吉刻禮菴所輯醫事說約成、請序于余、余取而讀之、即先生日用之方、始自湯液丸散、終于餌食酒醪、殆如一編食次、冊、六味八珍並陳于其中、則先生和劑之妙、所謂劑如羹之和者耶、後之染指于先生之鼎者、必嘗味而旨之、亦必帳祕是書、以臨病人、其應見症、可辛甘、可酸苦、不過為一披閱




91-1829

之勞而瞭然在目、此禮菴纂輯之功、誠不淺小矣、惟未梓行為小缺陷耳、今也平吉、得古寫本之正且善者、精校再三、梓而行于世、其功不在禮菴之下、四方醫家、必且嘉尚之、是為序、

文化五年戊辰七月

江戶 鈴木維正良知甫 序



德洲 武田信任書

醫事說約序

醫之為醫、古之與今、均之皆不學無術也哉、而本邦醫家愈益甚、斐所深惡也、是故耻為醫、雖然世醫也、至於斐之身而反之、不可思之、又思、卧不安席、食不可味、癸亥之歲、聞脩菴先生以一本之道、倡乎平安、興曰、盍歸乎來、千里負擔、列弟子藉、於是乎出於幽谷、遷于高木、人或有非先生稱儒醫者、斐曰、何其傷也、服堯之服、誦堯之言、行堯之行、是堯而已矣、先生之祖述語孟、憲章孔孟、而成一家言、而服儒服、是非儒醫何也、與夫不學無術之醫、黑白冰炭、豈可同日而論哉、斐雖不

敏親炙有日、僅得窺其一斑、今年孟夏閱禮  
菴先生醫事說約、轉寫日久、豕亥不少矣、斐  
乃與池子刪其不正以歸乎正、嗚呼、先生活  
人手段、盡於此書乎、何其盡也、孟子曰、梓匠  
輪輿能與人規矩、不能使人巧、惟先生亦然、  
著述是書、使門人小子知治體如此耳、巧則  
在其人矣、勿膠柱而鼓瑟也、先生之所命也、  
讀者鑒之、  
延享元年甲子仲冬朔豐州森都管斐希文  
拜書於一本堂

序  
大哉一本之道也、彼沉沉于五行配當之說  
者、誰能知之、其居常所施之術、救人於短期  
之間、盧扁之所不敢當也、而天下之士、懷疴  
來者、雲合霧集、魚鱗雜襲、飄至風起、大哉一  
本之道也、往昔禮菴先生撰醫事說約、而此  
書也、固無意於致之遠、備之一不朽之具、但  
欲使門人小子便治療之方也、惜哉、本書既  
埋滅、其誤落于坊間者、猥以吐五里霧、於是  
乎人各欲復其初者、無一盡力者、吁、其不盡  
力乎、又將力之不及乎、今茲甲子之夏、管池  
二子合力正之、遂以廓如也、當今有志于此





同音而易混，枳者枳實也，亦作實，亦作殼，姜者生姜也，亦混于姜，一本乾姜从干傍，姜作穰字，今从之，大者大黃也，亦作虎，亦作將，芒者芒硝也，亦作硝，陳者陳皮也，亦作橘，瓜者括樓人也，亦从木邊舌，作括字，而瓜子人亦曰瓜，易混而區別，諸如此類，不可勝舉，世之大方，幸正諸。

一斯書刻為巾箱小字本者，要其易提攜也，當今醫家藥篋中，必貯方彙，方選方極類，聚方等，未及是書，誠為闕典，斯書發兌之日，大方購焉，貯于篋中，以供異日疾疢之用，則必有大裨益矣。

醫事說約



家方四劑  
順氣劑

姜 三五或  
五多

壳 或代陳

厚 中

草 少

右以水二合，煮取一合，分溫二服，不堪多服者，三四服，以茯苓半夏湯為立方之主，吾門以順氣為治療第一義，順氣者承氣也，蓋取於仲景承氣湯意也，苟能識得此方，臨機應變，以活用之，則處劑治病，可運於掌上矣。

加減法風邪加圭芍升瘡加柴芩圭升痢  
 加芍將後或加賓連木隨症出入一切痞  
 不思湯藥者加我木稜咽痛加桔凡疫邪  
 不可欠升疝積痛加桂芍索烏附菜類泄  
 瀉去壳厚加水稜木滯食傷食加霍木益  
 吐瀉後厥冷加接附咳嗽加果稜芩味喘  
 加卜杏為主或茨稜我果瀝隨症進退一  
 應輕症宜用此方消息

解毒劑  
 茯苓 通 忍大 芎 大中 甘小  
 右水二合煮取一合分溫二服勝藥氣者  
 宜頓服加土茯苓五錢則水四合煮取二合

作癰

或用坭十錢則水八合煮取四合惡湯稠  
 者六合煮取三合一升煮取五合亦可也  
 若用大劑水率須準其方大小微瘡家一  
 切必用之要劑療微瘡便毒下疳結毒發  
 漏筋骨疼痛諸壞症及癰腫瘡諸惡瘡膿  
 淋加減法坭撲萃將膝升隨症出入弱人  
 或泄瀉家胃虛者方中將代枳胃實大便  
 秘結或骨痛甚者須用將咽喉痛癰加  
 桔膿淋或有水氣加芎有水銀輕粉毒坭  
 最可也藥選坭條下辨正可參考

排毒劑  
 茯苓 獨大 桔 芎 中 枳 柴 小或



甘小姜五分或

右水二合煮取一合分温二服勝藥氣者

互頓服治痛痺風毒瘰癧類一切眼疾咽

喉痛一切瘡腫疥癬加減法痛痺防通忍

桂附隨症出入足痛加膝骨節痛甚加將

咽喉痛枯為主眼疾血多加危藥菊類痛

甚加將羔風眼加倍升結毒眼加將

潤涼劑

茯苓 果大 苓 知 膠中 甘小

姜五分或

右水二合煮取一合分温二服或三服療

吐血下血咳血或勞瘵欲用湯藥為中灸助

則互用此方消息加減法吐血加艾無

芟代百下血加水接或歸芍芍桂隨症進

退勞效潮熱往來加柴嘔加半姜自汗盜

汗加牡瀉減苓知加水金瘡產後諸失血

非此方所主也

●傷風寒

挂枝加減方

風邪輕症脈浮數頭痛惡風發熱或鼻涕

出者

挂芍半升陳甘

家方順氣劑

夏月加藳

無一本

又方

兼溫疫或咽痛者  
桂芍半桔升甘

家方排毒劑

風濕兼中、通身重痛、或咽痛者、

桂枝湯

脈浮發熱、汗出、惡風、鼻鳴、乾嘔者、加半、

桂芍甘姜

葛根湯

項背強几几、無汗惡風、或自下利者、嘔加

半、

桂芍葛麻甘姜

麻黃湯

脈浮弦、頭痛發熱、身痛、腰痛、骨節疼痛、惡

風、無汗而喘者、

麻桂杏甘姜

大青龍湯

脈浮緊、發熱惡寒、身疼痛、汗不出而煩躁

者、取微似汗、汗出多者、溫粉撲之、

水並藜藿以上四味等分細末一兩、米粉、

三兩、不、入、藜藿亦可也、又友壯、蛎、一、味、撲、

麻桂甘杏薑棗

小青龍湯

表不解、心下水氣、乾嘔發熱、而咳、或利、

或噎或小便不利小腹滿或喘者

麻芍 味桂半辛甘 棧

加減法湯者去半加果微利者去麻加堯

噎者去麻加附小便不利小腹滿者去麻

加棧喘者去麻加杏

厚朴生姜甘草半夏人參湯

發汗後腹脹滿者

茯苓四逆湯

發汗若下之病仍不解煩躁者

茯苓 棧 附 甘

加減益氣劑

發汗後二三日脈芤面赤惡熱或下利二

三行舌上有苔或無苔而赤不欲飲食喜

熱飲食難進重者不寐間有譫語妄言眼

目赤如是者加附加倍棧腹滿者去棧

近年時疫多有此症麻黃桂枝發無効

此胡白虎亦不能解重者七八日斃症不

甚者在滿引日終至于死束手受敗播磨

同誌試用此劑得効云不顧他証只管與

數十貼稍知期十四五日予亦試用間得

効故記以備後考

著 棧 水 歸 橘

五苓湯

發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得

飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者

猪澤 茯苓 桂 朮

茯苓甘草湯

汗出渴者五苓湯主之，不渴者與此湯

茯苓 桂 甘 姜

猪苓湯

汗出多而渴者不可與脈浮發熱渴欲飲水小便不利者

猪茯苓 膠 滑 澤

梔子豉湯

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆

顛倒心中懊憹或煩熱胸中窒者

危 豉

小柴胡湯

傷寒中風五六日往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸或小便不利或不渴身有微熱或欬者此湯主之凡用柴胡湯但見一症便是不必悉具加減法若胸中煩而不嘔去半加果實渴者去半加倍葦加果腹中痛者去苓加芍脇下痞鞭去棗加蟬心下悸小便不利者去苓加葦不渴外有微熱者去葦加桂

效者去薄荷加味後  
柴 芍 蔓 半 甘 姜

大柴胡湯

十餘日反二三下之後四五日柴胡症仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急微煩者為未解也與大柴胡湯下之則愈  
此 芍 芍 半 枳 姜 一方加將

建中湯

脈弦弦法當腹中急痛者或心中悸而煩者嘔家難用以甜故也

桂 芍 甘 姜 飴

桃核承氣湯

熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先解外外解已但小腹痛急結者乃可攻之

桃 桂 將 芒 甘

抵當湯

傷寒六七日表症仍在脈微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血則愈所以然者瘀熱在裡故也喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑身黃脈沉結少腹鞭小便不利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦

大

陷胸湯

桃將

也。脈遲、胸內拒痛、胃中空虛、痞氣動、胸膈短、氣煩躁、心中懊懣、陽氣內陷、心下因鞅、則為結胸。傷寒六七日、結胸熱內實、脈沉而緊、心下痛、按之如石、鞅者、結胸無大熱者、此為水結在胸膈也。但頭微汗出者、重發汗而復下之、不大便五六日、舌上燥而渴、汗少、有潮熱、從心下至小腹、鞅滿而痛、不可近者、脈浮大者、不可下。將芒遂。

十棗湯

下利嘔逆、表解者、乃可攻之。其人發熱、汗出、發作有時、頭痛、心下痞鞅滿、引脇下痛、乾嘔短氣、汗出不惡寒者、此表解裏未和也。

小陷胸湯

結胸病正在心下、按之則痛、脈浮滑者、連半果。

半夏瀉心湯

心下鞅痛者、此為結胸也。大陷胸湯主之、但滿不痛、定此湯。心下鞅、下利不止、水。

漿不下其人心煩者

半 芩 稜 蔓 連 甘

大黃瀉心湯

心下痞按之濡脈浮者

大黃 黃連

生姜瀉心湯

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞅乾

噎食臭腸下有水氣腹中漚鳴下利者

姜 半 蔓 稜 連 甘 芩

附子瀉心湯

心下痞而復惡寒汗出者

將 連 芩 附

甘草瀉心湯

下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞

鞅而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂

病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以此

胃中空虛客氣上逆故使鞅也

芩 連 稜 半 甘

赤石脂禹餘糧湯

傷寒服湯藥下利不止心下痞鞅服瀉心

湯已復以他藥下之利不止醫以理中與

之利益甚理中者理中焦此利在下焦此

湯主之

赤 糧 若無則土器一末細末代禹餘糧湯

白虎湯

傷寒脈浮滑，衣裏有熱，或舌上乾燥，謔語，渴欲飲冷水者。

知 甘 米 姜

人參白虎湯

傷寒吐下後七八日不解，熱結在裏，表裏俱熱，時時惡風，大渴，舌上乾燥而煩，欲飲水數升，渴無表症者。

知 米 姜 葛 甘 姜

小承氣湯

多汗，以津液外出，胃中燥，大便必鞕，鞕則謔語，若服湯謔語止，更勿復服，謔語發潮

熱者，手足濇然，而汗出者，此大便必鞕也。傷寒若吐若下後不解，不大便五六日至

十餘日，日晡所發潮熱，不惡寒，獨語如見鬼狀，若劇者發則不識人，循衣摸床，惕而不安，微喘，直視，脈弦者生，瀉者死，微者但

發熱謔語者，與之若一服利止，後服心中懊憹，而煩，胃中有燥屎者，可攻，腹微滿，初

頭鞕後必澀者，不可攻之，不大便五六日，繞臍痛，躁煩發，作有時者，此有燥屎也。

調胃承氣湯

發汗後，胃中不和，謔語者，十餘日不解，大

將 朴 枳 芒



便穀者熱譫語者

將甘芒

蜜煎導

蜜一味入銅器中微火煎之稍凝似飴狀  
投水中以鞭為度攪之勿令焦著欲可丸  
併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當  
熱時急作冷則硬以內穀道中小便自利  
欲大便者雖鞭不可攻蜜煎導通之

麻仁丸

大便秘結與之  
摩芍杏將朴枳

茵陳湯

頭汗出無汗劑頭而還小便不利渴引  
水漿者此為瘧熱在裏身必發黃傷寒  
七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿

者茵陳將

梔子藥皮湯

傷寒身黃發熱者

附子湯

仲景所謂少陰病脈微細但欲寐者  
中和背惡寒者身體痛手足寒骨節痛

脈沉者

附 茯苓 葶 朮 芍

真武湯

仲景所謂少陰病二三日不已至四五日  
腹痛小便不利四肢沉痠疼痛自下利者  
此為有水氣其人或效或小便利或嘔者  
茯苓 芍 朮 附 姜  
加減法效者加味辛棧小便利者去茯苓下  
利去芍加棧嘔者去附加倍姜  
白通湯  
仲景所謂少陰病下利脈微者  
棧 附 葱

桔梗湯

仲景所謂少陰病二三日咽痛

桔 甘

半夏散

仲景所謂少陰病咽中痛者 搗篩白飲

和服方寸匕不能散服者水煎令少冷少

少燕之

半 桂 草

四逆湯

脈浮而遲表熱下利清穀者手足厥脈微  
欲絕身反不惡寒面赤色或腹痛或乾嘔  
或咽痛或利止脈不出者 加減法面赤



色者加葱腹中痛者加芍利止脈不出者加蔓自利不渴者傷寒論所謂太陰病也  
黃溫之互此湯一名通脈四逆湯

甘附棗

蔓姜湯

元氣頓虛脫者

蔓棗

理中湯

調胃虛理中焦下利清穀難止大病差後喜睡久不食者互理中丸或加附

蔓水棗甘

竹葉石膏湯

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者

竹葉半甘麥

瓜蒂散

病如挂枝證頭不痛項不强寸脈微浮胸中痞鞞氣上衝咽喉不得息者此為有邪

也當吐之

瓜棗或

○瘧瘧大頭瘧

家方排毒劑  
頭大腫如瓜瓠及面或腮頰云大頭瘧咽

喉腫痛生音頭筋張大者俗云蝦蟆溫遍  
身紅腫發塊如瘤者或頭上成疔塊者云  
疣瘡癰又所稱心癰胸脇高起者所稀有  
也以上症皆時行之氣使然有此症則舉  
家傳染故燭瘟疫以下四劑宜擇用之不  
可欠升何則以主疫也或加葠防柴桂  
湯

白虎湯

熱壯而渴者或咽喉腫痛飲食難下者加  
桔梗之

小柴胡湯

續命湯

麻 桂 歸 葠 羨 甘 芍

甘 桔 湯

咽喉腫痛者痛甚腫塞水漿不下者加  
鼠 霜 或 加 皂 莢 礬 石

○中寒

主方

葠 朮 桂 附 木 姜

附子理中湯

冬月中寒身疼痛洒洒惡寒翕翕發熱

額赤或右汗重則口禁失音四肢強直泄利或清穀者

四逆湯

衡突道途一時為寒氣所中者不知人口禁失音四肢強直厥冷者或自利不渴者

建中湯

四肢攣急腹痛者

葛根湯

元氣脫手足厥冷脈微者

灸

天樞 中脘 足三里 三陰交

○中暑

人參白虎湯

暈症身熱煩渴口燥舌上有苔者甚則昏不知人手足厥冷

五苓湯

小便不利者

一方

中熱輕症 茯苓 甘草 或加果知

又方

暈症手足熱身體倦怠頭重或小便赤而頻數

熨方 茯苓 半 薤 朴 橘 升 甘

急症卒倒以熱湯加鹽酒浸綿熨臍上急無湯則代以小便

○中濕

五苓湯

小便不利四肢浮腫而渴者

家法排毒劑

風濕蒸中發熱身體重痺攣掣痛者

一方

標兩所襲或濕之地漸造之宅或速行侵雨涉水或山澤蒸氣所中傷腰痛身重小便澀四肢倦怠不舉者  
茯苓 水 附 桂 芍 甘 或加升

家方 ○痛痺 風毒腫 鶴膝風 脚痺

或加肥半桂或加附將初發如風邪惡寒發熱頭痛遍身筋骨走注疼痛俗所謂痛風也又痛甚則歷節疼痛如虎咬狀故名白虎麻節風是也並治醫書所謂風毒

腫、鶴膝、脚氣、手氣

家方解毒劑

或加牽桂痛甚加將熱解後壓節疼痛

不止痛處為腫小便不利

小續命湯

初發痛甚宜與此湯發汗

麻桂歸芩姜杏甘

桂麻各半湯

治難發汗

桂芍麻杏甘姜

建中湯

神祐丸 或加薑治風毒腫

以水九但散尤有效痛甚與三十九丸或五

一方

通芍獨忍桂芩附將

牽牛丸 右治痛痺尤良

溫頭末一味糊丸

泉但馬城崎新湯

治痲疾手足拘牽及鶴膝風毒腫脚氣

手氣 硫黃湯 風毒腫痛痺須浴此湯

蒸方 槐花或酒糟或紅花熱湯蒸熱裹綿布溫痛處汗出為度日數通用此法以知為期

食療 乾過臘魚 雞 野雞 蜆 法 在膝風 風毒腫並宜之 蜆即

○瘧

桂枝加升麻湯

瘧疾初發惡寒發熱頭痛狀如傷風寒凝似難辨先與此湯

家方順氣劑

加桂枝芍藥 瘧疾不論虛實輕重有汗無汗脈自弦與此湯以下方隨症選用不可早用截藥期邪氣稍減可行灸或截藥也

藥也

小柴胡湯

柴胡桂枝合湯

桂芍 此 芍 芩 薑 甘 姜

薑姜湯

此方疑脫半夏



老以瘧疾元氣難勝縮癥發動口失五味  
飲食難下諸藥不效及虛脫者薑各一  
錢煎湯發前二時或發日五更連進二貼  
無力者以水代薑或送下黑丸子

白虎湯

夏月熱甚渴欲飲水者

藏瘧方

一味常山飲發日早天空腹頓服發稀粥  
少許取吐

一方

擲知常

又方

朴黃椒目

若無椒目則用朴亦可也

灸

五六發後可灸自九至十六及章門微腹  
瘧久不愈及有瘧癥者無如灸瘧後勞  
瘧脹滿多灸僅得萬一之幸

○痢

家方順氣劑

痢初發大便一二行瀉下後出腸垢臍下  
疼痛裡急後重身涼脈緩者加芍稍重症  
加將去茯苓有嘔加倍半姜暉家之聖藥

也三日五日後芍藟連木槧類隨症加減

大承氣湯

臍下痛旁及少腹者輕若中脘鳩尾痛者  
是劇症頻併窘困痛甚者二三日元氣  
未虛時急返大小承氣疏瀹四五日後加  
減治之小承氣湯

大柴胡湯

初發熱甚用大小柴胡瘦痢加升桂

小柴胡湯

加芍枳朴

黃連解毒湯

大黃黃連黃芩湯

將連芩甘

半夏瀉心湯

以上三方有熱似狹熱利者或有毒難疏  
滌者小兒最選

建中湯

主形氣衰弱腹痛一二日手足冷者老人  
難用劇劑者加附將

理中湯

或加桂去蕩亦可或加附肉豆或加茯苓  
主痢日久腹痛裡急後重微者

建理湯

或加茯苓或加水

此方有  
疑此甘可

醫事

桂 芍 芩 苓 薑 朮 姜

五苓湯

口乾咽燥少水難分利

菱姜湯

送下黑丸子或香連丸主急利煩虛禁口  
乾嘔者或用熊膽可也又主治產後日近  
有穢加下

一方

茯苓半 姜木 藿 或加桂

又方

茯苓半 姜木 蓮 姜

生鮫魚鱠 形氣并實能食者初發喫之為佳

黑九子 熊膽

香連圓

木中連大 右二味細末糊丸或加茱萸少

牛扁丸

一名鬪牛兒草連采莖葉燒存性細末糊

丸不初不分輕重當與數十丸下利穢物

治中散

或加木主久痢無勢貴腸滑或休息痢者

赤石脂禹餘糧湯

主腸滑肛脫者

灸

中脘 天樞 腰眼 自十一至十六

醫事

初發灸最可也、素有宿癥惡藥氣者莫如  
灸、努力甚、腰力罷者兼治疝痢不了者  
食療

痢後元氣難復、羸瘦或壞作鶴膝者及小  
兒疝利皆可用也、  
鰻鱺魚、雞卵

○食傷滯食

損湯方

傷食腹痛吞酸不吐不瀉、揮霍撩亂急以  
三味損湯取吐吐瀉後煎湯可也、  
益木、益木、益木

枇杷葉湯

木 雀

梔

挂

枳

莪

家方順氣劑

加益木宿雀枳麥之類、手足冷加棗附傷  
食吐後用此劑、滯食並治

大承氣湯

滯食痛在下部不瀉、逐用大小承氣吐後  
痛不止、胃中不和者、調胃承氣亦可也

小承氣湯

理中湯

滯食吐瀉後下不止者、

附子理中湯

吐瀉後手足厥冷瀉下不止者  
四逆湯 或加瀉  
瀉附湯

右四方脈狀四肢厥冷者吐瀉後元氣虛  
脫者不問四肢厥冷者用之

黑丸子

備救急

備急圓

絞痛窘迫瀉急用之取之

慰方

鹽酒熱湯慰臍腹

溫鹽湯

欲吐不吐欲瀉不瀉非隔升降不

通急用鹽湯取之

灸

吐後兼疝腹痛湯藥入口即吐者灸為最

腰背自十一至十四徹腹亦可也傷

食無吐下腹痛甚者灸灼數百壯以吐而

痛止為度

天樞 上皖 中皖

○骨蒸勞 內傷 盜汗 遺精 濁症

家方順氣劑

加水芍、棗、莖、或歸、柴、芩、知、貝、麥、果、味、膠、桑、

之類選用 骨蒸初發似風邪

家方潤涼劑

加麥、麥、味、歸、芪、半、之類有自汗盜汗者加

壯水者、瀉者、加水、痰、主勞熱吐白沫、有  
效、血者、酒客、或用心生理者、及內傷者、凡  
如此証、非灸無以開鬱、溫養氣血、若夫湯  
藥、則應接之具耳、

小柴胡湯

有寒、熱往來者、隨症加減、

生津丹

主效、莎、茯、棧、練、蜜、搗、和、

黑丸子

自九俞至腰部膏肓、或七九脊際、亦可也、  
如骨蒸勞效、灸至數百千萬、以愈為度、

類肝丸 金匱要畧云、治冷勞、謂熱少也、

加水壯龍、主自汗盜汗、

食療 鹿、龜、雞、牡蠣肉、鰻、鱺、魚、

建中湯

加、蜆、龍、或、連、水、主遺精、

家方順氣劑

癥、疝、動者、並兼用黑丸子、食療同、盜汗、

家方潤涼劑

濁症大抵治方與遺精同、或用此劑、

因胃事言為腸覃石瘕

家方順氣劑

○  
擇加稜木、我芍、腹沉、桂附、果之類、朴、果為  
主、肚腹脹起、中空似鼓、是也、已成、鼓勢  
者、難治、稍見其機、則速灸、以此方為應接  
有得間治、並主瘰癧、後大病後之脹

小承氣湯

急脹用此湯取下列脈湯失氣頻發者、可  
治、腹壯、膨脹、硬、大、見青筋、臍凸、四肢枯瘦  
有水氣、呼吸短促者、不可治

桃仁承氣湯

屬血症者、或腸覃石瘕日久、形體未衰者、

黑丸子  
蟾連丸

屬蟲者、小兒、脹最可也

○噎

家方順氣劑

擇用果、牡、膠、或、加、附、常、人、偶、噎、者、非、疾、  
五十以上、噎、固、死、症、無、術、之、可、施、但、方、將、  
崩之時、省、思、慮、廢、家、事、艾、灼、數、萬、肉、養、不  
意、而、以、此、劑、為、應、接、則、可、免、其、患、也

燒酒  
少間快胸膈沸鬱

食療

鰻魚

雞卵

○非 瘧疾健忘 卒倒蘇後

建中湯 或加附

家方順氣劑

加桂附 棗 芍 之類

桂 椒 酒

醇酒一升貯瓷器中投桂椒 蟻 此 密封三 十日而成 返節飲之

小續命湯

主瘧疾

和方

治諸脫血發瘧

過刺 葛 刺 過 葛 窠

桂枝湯 四逆湯 附子理中湯 建中湯

溫泉 硫黃湯 灸

反鼻交感丹 桂 三 芍 五 棗 各 六 艾 實 一 分

桃仁承氣湯 有舊疾兼血證互之

參附湯 卒倒互之

參附湯 卒倒互之



三生飲 或加木藟

醒烏附

人參半夏湯

兼滯食者互之

枳實厚朴湯

小承氣湯

加枳子

家方順氣劑

加水

熊膽

丹田氣海

建中湯

蘇後互之

桂枝湯

加半後附木或姜藟



痞病

家方順氣劑

擇加烏附木萊菔我桂芍之類

建中湯

黑丸子

惡苦味者以順氣丸代之婦人尤

可也

點方

藜藜煮温慰痛處

灸温泉

藥湯腰湯

通滯丸

疝積便秘

○ 家方順氣劑  
擇加木稜莪椒連之類

一方 乾漆 莖萸糊丸  
黑丸 子 蟾連丸

食療 鱧魚 山蛤 臭梧桐蟲

○ 眩暈

家方順氣劑  
加桂芍木稜莪之類  
黑丸 子  
灸 灼足部亦可也

○ 怔忡 驚悸 不寐  
白虎湯

酸棗湯 加苾芩 竹  
病後虛煩 不得眠 或加糕  
酸 甘 知 茯 芎

家方順氣劑

醫事  
黑九子  
蟾連丸  
奇應丸

○顛狂癩

白虎湯

加果芍芍柴

兼用滾痰丸主之

涼膈散

將危硝桔芍

小柴胡湯

去薄荷加芍知

小承氣湯

大承氣湯

右二方秘結者互之

家方順氣劑

加水莪芍或芍果羔之類

狂症兼癩者互之

黑九子

熊膽 灸 飛泉

沉香丸

即平心丸也

家方順氣劑

○翻胃 嘔吐 惡心 嘈雜

加接水倍半用生薑自然汁

反胃 嘔吐 惡心 吐酸 嘈雜 諸症 因積 癥

者互用此方加減兼灼艾三十左右反

胃有因結毒者當審察施治四五十以上  
僅有此症必是噎症

半夏生姜湯

牡蠣末

曹離用之妙

黑丸子

蟲症或積症者最可也

蟾連丸

因蟲者

奇應丸

灸

○哮喘喘

厚朴杏仁湯

或加半竹生薑自然汁

朴杏甘

家方順氣劑

加杏果紉姜莪之類或竹瀝姜汁

黑丸子

生蛞蝓

食療

大牢

寒中撰

鮮肉可食

理中湯 藜附湯

五苓湯

家方順氣劑

加木芍或穠水疝瀉加芍桂熱瀉加連尤

可也

一方

加レ雀或桂或半  
伏薯木水稜甘

瀉心湯 熱瀉主之

治中湯

久瀉胃虛者久服此散兼灸數萬壯得治者間有之

家方解毒劑

去將加枳或桂治結毒久瀉難止者理中湯五苓湯瀉心湯等劑無效者必有因結

毒者宜試用此方

土器一味丸 見于傷寒門禹餘糧丸下理中五苓瀉心

食療 下利不止者下焦瀉也宜與此丸  
水瀉不足

○水瀉

鯉魚湯

赤豆湯

陸桂 菴

五苓湯

或加沉或去桂沈附隨証可用有喘氣者

加朴杏竹半可也

茯苓半夏湯 或加稜或加桂

神祐丸散

赤齋內攻為實腫者或便秘腫大因窮者  
急與之取瀉下得暫快而後當處劑

十棗湯

實症者主之

風寒濕邪遍身骨節痛或作水腫者定之

獨活湯

歸芍茯苓半

家方排毒劑

因風濕者

家方解毒劑

因結毒者

家方順氣劑

加沉附或茅通桂



