

**Kodak**  
LICENSED PRODUCT

C Y M

KODAK Gray Scale

© The Tiffen Company, 2000



10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

一初日ニ二日三日是ラ序熱ト云俗ニゾヤミト云脇痛  
 一四日五日此時ラ見點ト云俗ニ物ノ花見元ト云四日目之朝大熱サナテ前症  
 一五日六日此之時ラ出腋月ト云俗ニ出揃ト云面部ヨリ出始リ后ニ至足脛背及フ足  
 裏ニ出終ラハ出齊ト知ルヘ三熱而出齊モ起脹モ灌膿モサ治モ白面部ヨリ始  
 一六日七日此時ラ起脹ト云俗ニ食ミ食ミ此時ラ起脹ト云俗ニ山アゲ也面  
 部半足トモニ地腫強ク常ノ顔ニ倍シ  
 一七日八日此時ラ行熱ト云俗ニ水モリト云  
 一九日十日此時ラ灌膿ト云俗ニ膿モリト云  
 一土日十一日此時ラ收脹ト云又結痂トモ云俗ニカセルト云  
 一二日十四日此時ラ洛ニ痂ト云俗ニフタ作化ト云  
 一十五日ニ而痘ノ事ハ終ル也格別輕キニ症、サリト風火入  
 一今俗ニゾヤミ云出瘀三日本膿三日本膿三日热而吉過ト引熱ト云セ  
 一



## 痘瘡水鏡錄

橘南谿先生著門人田景遠宏卿譯  
鱸安貞終吉

### 第一階

此日限ラ  
俗ニゾヤミ  
ト云  
 初日二日三日是ラ序熱ト云俗ニ云ホトホリ凡痘瘡ノ患ニ  
 カル小兒多クハ先腹痛アラマツキ驚搐吐乳乾嘔下利等種々ノ事  
 有リ初メハ風ラ引タルニ似熱強キハ甚傷寒ニ類シテ別レ難キモ  
 も是ラ知ルハ腹痛カ否ラ向ヘシ微腹痛有ルモノハ極メテ痘ノ  
 目當ナリ一二歳ノ小兒腹痛知リ難キモノハ寐入タル時息ザレ  
 アラク少レビクツキノ氣味有ルナリ耳ノ後ノ赤筋ナト古書



ニハ目當トスレモ有リ序熱ノ時小兒ハトカク  
目ヲ見ツメルモノナリ是ハ驚風ノ見ツメトハ違ヒ命ニ氣  
ツカヒ無キナリ序熱ノ間ニ見ツメ五度モ七度モ發シ或ハ  
夜ル疊見ツメ續クルモ有リ此時ニ熊膽或ハ參連湯ナト見  
合セニ用ヘシ見ツメ多キトテ痘瘡格別ニ重キニモアラス又  
軽キトモ定メ難シトカク見ツメハ其小兒ノ平常ノ腹ノ様  
子ニヨル也序熱三日過テ痘見點スレハ自ラ見ツメハ止モ  
ナリ序熱燃<sup>ヨウ</sup>ルカ如キハ毒ノ深キ也サレバトテ又餘リ熱スナ  
ケレハ發<sup>ハツ</sup>越<sup>ヨウ</sup>ノ氣<sup>トモ</sup>之シク宜シカラス腹痛ノ甚シキハ毒多キナ  
リ又自ラ下利甚シキモ毒深キナリ備序熱ノ時痘ト知

テ先金化粒ヲ以テ急ニ是ヲ下スヘシ快利三四行シテ後  
紅花葛根湯或ハ桂皮湯ヲ以テ是ヲ發越スヘシ或ハ桂皮加  
大黃湯用ルモ有レモ大黃ハ力緩<sup>ハラシ</sup>ク金化粒ノ手早キ六  
粉<sup>フウ</sup>レリ其上大黃ハ味苦ク小兒ニ多クハ用ヒ難シ殊ニ痘  
瘡五六日目ヨリ以上ハ甚下ルヲ忌モノナレハ序熱ノ間  
或ハ四五日目見點シカリタル時急ニ下剤ヲ用テ手早ク  
下剤ヲ止ヘシ此カケ引ヨクく心得ヘシ序熱ニ下剤ヲ少シ  
モ恐ルヘカラス金化粒ニテ急ニ下シテ急ニ茅ヲ引トキハ少  
シモ内ラ虛スル患ナシ至ツテ輕キ症ハ下スニモ不及ト云ヘモ痘  
三四分以上ハ必金化粒用ヘシ三四分以上ノ痘序熱ノ時ニ下

サザレハ痘毒脇裏ニ齧結シテ十二三日必惡症出ルト有リ  
痘重キモノ十二三日目惡症出タラハ縫ヒ扁鵲華陀再ヒ生  
レ返<sup>カ</sup>リ祕術ヲ尽<sup>ス</sup>トモ其時ニ至リテハ如何トモスヘカラス序  
熱ノ時ニ毒ヲ減<sup>ス</sup>レ置トキハ起<sup>ス</sup>張灌膿トモニ甚快ク結<sup>カ</sup>痂モ  
亦早シ下ス<sup>ト</sup>ハ譬<sup>タト</sup>ヘハ水入ノ器ニ穴ニツアケタルカ如シ發越  
格別快<sup>コロヨ</sup>レ若又下ス<sup>ト</sup>甚キ時ハ見點其色白キモノ有リ是  
モ害無シ桂或ハ韭白人參ノ類用ル時ハ紅活潤澤下サ<sup>ム</sup>  
ルモノヨリ遙<sup>ク</sup>ニ勝<sup>サ</sup>ル至テノ輕キ症ハ下スニモ及ト云ヘ<sup>ト</sup>イ交  
見點セサル前ハ其稀密<sup>ハナキヲオキ</sup>知ルヘカラス故ニ先ツ輕重ヲ論  
セス下崇ヲ用テ其毒ヲ減スヘシ後ニ痘出揃<sup>ソロ</sup>ヒテ輕キモノハ

益輕ク重キモノハ死<sup>ス</sup>ラ免ル儲<sup>サナ</sup>發表ニ升麻葛根湯用  
ルト世間通用ニテ強<sup>アホ</sup>チニ療治ノ誤<sup>ミ</sup>リトハ云レ子<sup>モ</sup>升麻  
モトヨリ味惡シク小兒ハ飲カルモノナリ其上<sup>カニ</sup>而煎業  
ヲ嫌フノ<sup>ク</sup>癖付テ後ノ大功ノ場所ニ至リテ甚難義ニ  
成ルト有リ必シモ升麻ヲ用ルニ不及葛根ハ解<sup>ク</sup>熱ノ功  
有リ其上ニ表發ヲ兼テ其性平和ニ痘瘡序熱ニハ  
至極ノ良藥也必是ヲ用ヘシ然レヒ發散第一ノ思ヒ入  
レ<sup>ト</sup>時ハ桂<sup>ヲ</sup>加ルニ非サレハ其力緩シテ獨リ仕スルニ足<sup>ス</sup>  
麻黃ハ古今トモニ大ニ恐レテ痘ニ用ヒ斯是實事ヲ試ミ  
スレテ聞ラヂト云モノナリ發越ノ勢イ無<sup>キ</sup>痘ニ必麻黃ヲ

用ニ汗出テ表和レ痘出ルト快シ痘出畢<sup>フワツ</sup>テ後ハ強ク  
發汗スルヲ忌ム若重<sup>ルサキ</sup>テ麻黃ヲ用テ發汗スル時ハ毛孔  
疎通<sup>スキヨウ</sup>レテ起脹<sup>キキヤウ</sup>快カラス麻黃ヲ恐ルトハ此事也只古今匠ニ  
痘ニ於テ大ニ汗下ヲ恐ル甚其理無シ是皆医術ニ精  
カラス琴柱<sup>コトヂ</sup>ニ膠<sup>ニカタ</sup>スル論ト云ヘレ共ニ語ルニ足ラス黃芪白  
木ト云ヘニ其時ニ非スレテ漫<sup>ミタ</sup>用ル時ハ巴豆麻黃ヲ  
用テ療治ヲ誤ルト其害何ソ異ナラシヤ譬<sup>ヘテ</sup>云ワク  
地<sup>コト</sup>爐<sup>ダツ</sup>或ハ綿入ノ類ハ温補ノ物ナレニ愚ナル親ノ其子ヲ  
愛<sup>アイ</sup>スルトテ夏日ニ綿入ヲ著セ地<sup>ダツ</sup>爐<sup>ダツ</sup>ニアテタラヘレカハ大  
ニ其子ニ害有ルヘシ暑<sup>アツ</sup>キ時ハ涼シクスルカ補<sup>ヒ</sup>ニ成リ寒<sup>ク</sup>

キ時ハ温ムルカ補ニ成ル茱モ亦カクノ如ク巴豆麻黃ノ益  
ニ成ルトモ有リ黃芪白木ノ害ニ成ル時モ有リ医タル者  
此處ヲ能々勘弁シテサレ引誤ラス療治セハ產ト痘ハ程  
知レタルモノナレバメツタニ死ニ至ルトハ有ルベジ余ツラく  
見ルニ世間ノ痘ハ療治ノ仕誤リニテ非命ニ死スルモノ數  
ヲ知ラス隨分心ヲ尽スヘキトナリ

儲<sup>サチ</sup>痘ノ神ヲ祭ルト云ト有リ是ハ國々ニテ色々々ノ俗習  
有リテ極ニリタルトニテハ無シ又處ニ依リテハ一向ニ祭ラ  
サル國モ有リ是其所々ノ風義ニ從ヒテ祭リ習イ名家  
ニハ隨分大セツニ祭ルモヨシ燈明ヲ點シ不淨ヲ遠サクル

「大ニ病人ニ益有ルトナリ然レ疋祭ルト敬イ過ル時ハ  
色々ノ不思議ナルトモ有ルモノソ或ハ病人様々ノ事ヲ  
口バシリ或ハ又葬禮ノ學ビヲ好ミ或ハ常ニ地獄極樂ノ  
沙汰ヲナレ白キヲ好ミ佛ヲ禮スルナト皆病家ノ大ニ忌  
嫌フコニシテ最早此躰ヲ見ハ死スルトニ極メ監病モ疎  
ニナル家モ有リ大ニ心得違ナリタトヘ何ヤウノ不思議ア  
リ疋苦シカラズ殊ニ医者タルモノ少シモ驚クヘカラス先ヨ  
クく家内ノ人ニ安心スルヤウニ理ヲ説聞セ心ヲ正クシテ病  
人ニ向フヘシ不思議ハ自ラ止也イカヤウニ忌々シキトヲ云ト  
モ是ニテ死スル前標セシヒヤツトハ定メ難シ少シモカラ落スヘカラス余

數十人カラクノ如キ者ヲ療治シ來リテ命全キモノ數多レ  
又難痘ニテ死シタル家ヨリ傳染來ルト有リ是モ少シモ  
害無キト也少シモ氣ニ掛ベカラス

序熱ノ間ニタトヘ呴吐エツキ有リ疋半夏ノ類必用ユヘカラス其  
外呕タマハシ止ル茱必用ルニ不及見點ミツスレハ自テ止ムナリ下利モ微  
利ハ必茱ニテ止ヘカラス是モ見點スレハ止ムナリ然レ疋若又甚  
シク下利レ或ハ五色カイノ大使ヲ下サハ是熱毒烈カタシキ也急ニ躁  
滌スヘシ其中黒便漆ノ如キモノ必死ナリ

序熱ノ脉ハ浮大数カタノ陽脉ヨシ發越ノ勢イ有ル故ナリ脉沉  
遲ニシテ陽氣下陷カクスルハ惡シ、

序熱ノ間ニ手足不遂<sup>カナロハ</sup>或ハ腰又ケテ自ラ起ソトアタ  
ワス或ハ痛ミ或ハ重キモノ皆難痘ノ候ナリ甚恐ルヘレ  
此時ニ急ニ金化粒ヲ用テ裏毒ヲ疎<sup>シ</sup>滌<sup>シ</sup>麻黃ノ類ヲ  
以テ急ニ發散スヘン心胸痛或ハ氣急或ハ眼赤ク或眼  
閑或ハ手足微冷等ノ症序熱ノ間ニ出ル六大凶ナリ  
三日目四日目ノ頃<sup>ロ</sup>睡<sup>リ</sup>好ム<sup>ト</sup>甚吉事ナリ其ニ心ヨ  
ク寐サスヘレ

## 第二階

四日五日此時ヲ見點<sup>タマ</sup>ト云俗ニモノハ十見ユルト云痘序熱  
三日スミテ四日ノ朝其大熱サメテ諸症コトノク去リ能

食シテ口角<sup>キノワキ</sup>天庭<sup>ヒタチ</sup>福堂<sup>ヒツバシ</sup>ノ邊ニ大小等シカラズ紅活珠顎<sup>ホウガクタケ</sup>ノ  
如ク五七粒或ハ二十粒三十粒見ヘテ數<sup>カツ</sup>ヘツヘキモノハ大々吉  
也四日目ハ猶葛根モヨシアリ久レク用ヒ過セハ表<sup>ヒダ</sup>ヲ開キ  
テ起<sup>キ</sup>脹<sup>ヒラシ</sup>ニ害アリ桔梗湯ニ轉<sup>シテ</sup>スヘシ

最早<sup>モハヤ</sup>三日目ノ夕方ヨリ四五粒見ヘテ熱モサメ呕モヤミ微  
腹痛モ去ルモノハ甚輕キ症ナリ至極輕キハ半日或一日程  
ツハ早<sup>ヒヤ</sup>ニリナ行モノナリ  
見點大ナルハ痘少<sup>タマ</sup>ナシ細ナルハ多キト知ルヘシ  
若<sup>モハ</sup>其熱イテ夕去ラス下利腹痛呕吐ナトノ症有リテ初日  
或ハ二日目ヨリ見ユルモノハ甚重シ

若又四日目五日目ニ至リテ熱益強ク嘔吐有リテ眼赤  
ク或ハ譫語レ煩渴レ面部隱々ト紫赤色ニシテ有ルカ如  
無キカ如ク其痘數へ難キモノハ大凶ナリ少レ日ハ後レタリ  
凡下茅ヲ用ヒ且ツ紅花葛根湯或ハ消毒湯用ヘシ

見點胸ニ多ク或ハ頸ニ多キハ重シト知ルヘシ

見點其色桃花ノ如ク光有リテ潤高ク上リテ手ニサワル  
モノハ大吉也若見點蚊ノロノ如ク赤ク小キ針ノ先ニテツ  
キタルカ如ク少レモ粒無ク平地ト等キハ大凶ナリ又タトヘ粒  
出ルト云ヘ凡其色赤ク光無ク焦レテ尖ラサルモノ皆熱毒  
深キナリ清鮮ノ茅ニ發表ヲ兼テ用ヘシ其色紫ナルモノ

青キモノ黒キモノ皆熱毒甚キナリ多クハ死症ナリ其中ニ  
白キモノハ虛寒ノ候ナリ急ニ温補スレハ色花ヤカニ出ルナ  
リ大抵序熱ヨリ見點ノ間ハ實症多ク灌膜落痂ノ時ニ  
ハ虛候多キモノナリ初メノ虚候ハ治セヤスク終リノ實症ハ  
療シ易シ

序熱久シク去ラス二日目三日目ニキラクト見ヘ暫日シテ  
又引入リ又一二日シテ見ヘ出沒側難ク十日或ハ廿日モ引  
シライテ痘ニ成ルモ有リ葛桂ノ類ニテ見合セ居ルヘシ  
格別ノ死症ニテモ無シ若此間ニ熱甚強ク絶食譫語煩  
悶人ルモノハ大事也急ニ將軍湯用ヘシ此時ニイカホト發散

ノ茱麻黃荊芥ノ類用ルトモ發達<sup>タダ</sup>ハセ又モノソノ將軍快<sup>コロヨ</sup>  
應シテ後發表スヘシ其内序然見點ノ間ニ惡症出ルハ甚  
稀ナルト也又タトヘ惡症出タリ凡カラ尽シテ療治セ六  
イカホトモ活路<sup>イギカルキチ</sup>有ルヘシ然レ痘ノ始終ノ死生ハ四日目  
五日目ノ間ニ明<sup>イ</sup>医ハ別<sup>名</sup>也心ヲ付テ見ルヘシ若四日目  
五日目ノ間ニ惡痘ト見付テ此通<sup>ト</sup>リニテハ十二三日目凌  
キ難シト知ラハトクト病家ニ云聞セ医者ノ詞ヲ用ルヤ否<sup>カ</sup>  
ヲ正<sup>タ</sup>シ置キ其後ニ心ヲ尽シテ療治ヲ施<sup>ホトヌ</sup>ヘシ見點ノ時ハ  
タトヘ惡痘ニテモ表<sup>ヨモテ</sup>ノ見ヘ格別惡<sup>カタチ</sup>シカラ子ハ素人<sup>ヒロウト</sup>ハ驚<sup>フロロ</sup>カ  
ズ多クハ医者ノ詞ヲ用ヒヌモノ也十二三日目ニ及テ俄ニア

ワテサワグ<sup>ヒロウト</sup>人ノ常ナリ此詞ヲ用ヒヌ病家ニハ療治ス  
ヘカラス

大抵見點シテ其痘粒<sup>ツブ</sup>離<sup>リ</sup>シテ色光<sup>ツヤ</sup>ヨク元氣サワヤカニ能  
食スルモノハタトヘ痘ハ多ク出ハ九分ニ及フトモ氣ツカイ  
有ルヘカラス只痘ニ順逆ヲ論シテ多少ヲ恐レス

第三階

五日六日此時ヲ出齊<sup>ヒラ</sup>ト云俗ニ出ソロイト云凡痘ハ先向  
部ヨリ出始リ後ニ手足腹背ニ及フ足ノ裏<sup>ウラ</sup>ニ出終<sup>ヒタハ</sup>出  
齊ト知ルヘシ惣<sup>ゾウ</sup>シテ出齊モ起<sup>ナツ</sup>脹<sup>ツバ</sup>モ灌膿<sup>ツバ</sup>モ落<sup>ハ</sup>痂<sup>カク</sup>モ皆面部  
ヨリ始リ手足ハ一日モ二日モ運<sup>ヨリ</sup>キモノナリ大抵善惡皆

面部ニテ知ルヘレ面部惡シカラスレテ手足惡シキモノハ  
是無レ

眼中トクト見ルヘレ神氣無ク黒眼ウルミ瞳子シテラサ  
ルモノハ毒氣内ニ逼ルナリ死症ナリ白眼赤キモノ熱毒  
盛ナルナリ清解スヘレ

出齊レ畢リテ面部或ハ右或ハ左一方起脹ノ時ニ至ル  
テモ痘一向不出然レモ他ノ惡症無キモノハ強ク驚  
クヘカラス妨ルコ有リテ氣血メクラサルナリ此時ニ六溪雲  
蒸ノ法行フヘ必ヨク出ル也

大抵出齊レテ神彩全キモノハ起脹疑ナレ初中後トモ死

生ハ全ク神彩ノ有無ニ有リ余諸病トモニ神彩ヲ論スルラ  
先勢トス外相神彩無キニ似タリト云ヘ脉ニ於テ神彩全  
キ者ハ死セス本ヲ貴シテ未ヲ後ニスル也又其彩既ニ去ルト  
云ヘ此神イニタ脱セサル者猶活路アリ脉ノ神彩相ノ神  
彩玉環方ニクレ初学ノ輩ハ甚得難キトナレ此其死ヲ  
攬操タルニ期シ其生ヲ己ニ絶スルニ定ム良医ノ眼コニ有  
リ儲痘ハ外ノ病ト違イ外相ヲ第一ニ目當ニスルモノ  
ナレハ神彩大ニ知リ易シ人々心ヲ付テ是ヲ見ルヘレ之ヲ  
思イ之ヲ学ヘハ終ニハ其妙ニ通スルモノソ其玄妙ハ中々  
今此筆紙六尺シ難シ先痘ニ於テ其アラニレラ云ハ

痘ノ形圓ニシテ中高ナルハ形ノ神有ルモノ也蚊ノ刺タル  
口ノ如ク蛇ノ腹ノ如ク雲ノ乱ル、カ如キモノハ形ノ神無キ  
モノナリ痘ノ色春花ノ露ヲ帶<sup>アブ</sup>カ如クニシテ秋草ノ  
霜ヲ經ルカ如クナラス紅白分明ニシテ光洁潤澤ナルハ  
色ノ彩有ルモノナリ枯骨<sup>ヤニ</sup>ノ如ク赤豆飯ノ如キモノハ色  
ノ彩無キモノナリ其外眼中ハ精神ノ舍ル处神彩最  
知<sup>ル</sup>易レ其精微ニ至ツテハ四體百骸起居<sup>キヨ</sup>動作音聲  
等ニ至ルニテ皆神彩ヲ具セスト云々無シ精ク学テ之ヲ知ルレ

#### 第四階

六日七日此時ヲ起脹ト云俗ニ云山アゲ也痘日々成長シテ

豌豆<sup>エンドウ</sup>ノ如ク面部手足トモニ地腫<sup>ヒヅ</sup>強ク常ノ額ニ一倍シ食<sup>シ</sup>  
スく進<sup>ス</sup>ミ微熱氣ヲ帶<sup>フ</sup>ヒテ六七分以上ハ眼腫<sup>マタニカ</sup>塞<sup>ミカ</sup>リ元氣サ  
ワヤカナル者ハ大吉也六七日目ヨリ黃苔<sup>イエ</sup>ニ轉ス  
ベレ

若起脹セス面部大サ常ノ如ク飲食スクナク大便微利スル  
者ハ凶也急ニ保元湯用ユヘ起脹ノ時ニ少シニテモ張リ甲  
斐十ヶ<sup>ハ</sup>漿行<sup>シハシ</sup>ラス毒氣内ニ攻テ種々ノ惡症ヲユル或ハ七  
孔ヨリ血出或ハ暴<sup>ハラハラ</sup>ニ大熱起リ或ハ声嗄<sup>ハラハラ</sup>レ或ハ不食或ハ渴  
シ或ハ頭搖<sup>ハラハラ</sup>キ手搖<sup>ハラハラ</sup>キ或ハ氣急其變症萬端是大事ノ時十  
リ起脹ユルクシハ力ヲ極メテ張リ出スヘレ

七孔ヨリ血出ルハ熱毒内ヲ傷リ溢レテ外ニ出ルナリ清解ニヨロシ燕脂青黛一角象牙等見合セニ用ヘシ就中眼ヨリ血出ル者耳ヨリ血出ル者最大事也

一角<sup>ウニカツ</sup>ラ世俗ヲレナヘテ寒熱ノ別キモ無ク痘ニハヨキ物ト心得テ用レモナルホド毒氣心下ニ迫<sup>セニ</sup>ル者ニハ甚ヨケレニ虛寒ノニ症

六甚害有リ多ク用レハ下利ス

一舶<sup>ヒツ</sup>ノ痘ハ未タ秀サル前ニ只一ツ格別ニ大キク蠶豆ノ如ク色光ヨク透<sup>スキ</sup>通リテ腫上ルラ賊痘ト云甚宜シカラス針ヲ以<sup>カシマ</sup>桃<sup>カミ</sup>ケ去リ茅ヲ付ヘシ

眼閉テ涙ウルラフハ吉也鼻ハ塞リテモ潤<sup>ウカハ</sup>有ルハ吉也眼鼻

乾キ焦<sup>カガ</sup>レタルハ凶也

七日目以上ハ殊ニ大事ナリ寒氣ノ時<sup>ヤツ</sup>敵<sup>ナラ</sup>ハ病人ヲ真深ク在ラレメ戸障子遙間無ク鎖<sup>トサ</sup>レ内ニ火鉢ニツモ三ツモ設ケ置<sup>フ</sup>昼夜火ヲ絶サテレメタトヘ天氣ニヨリ風雨寒暖ノ變アリ氏其座敷<sup>サ</sup>ハ火鉢ニテ加減ヲナレ寒暖ノ變ヲ病人ニ知ラシムルトナカレ是病家弟一人心得古人此事ヲ云ハスト云ヘ近痘瘡療治弟一人事ナリ若火鉢ノ加減無ク昨<sup>セレ</sup>日ハ暖<sup>アタカ</sup>ニ今日ハ寒<sup>サク</sup>ケハ発達ノ氣萎<sup>レボ</sup>ミ灌膿<sup>クダク</sup>ノ時極メテ内攻ニ变ス惣<sup>ソブ</sup>レテ痘ハ内ヨリ外へ発達スルモノナレハ甚風寒ヲ忌<sup>イム</sup>タトヘ諸草木ノ天氣暖<sup>アヒ</sup>ナレハ成長シヤスキ方如レ然

レハトテメツタニ火氣ヲ病人ニ見セ炎熱汗ノ出ルカ如キ  
時ハ氣血ムセテ大ニ害有リ大抵寒中ナレハ其座鋪ハ外ヨ  
リモ衣一ツ程違フ暖サ宜シ儲其座鋪ハ不淨ヲ遠サケ惡  
臭ヲ去リ詞アラニ物ヲ云フ或ハ恐ロレキ物語又ハ忌ワシキ  
コラ禁ス燈ヲ點シ輕ク香ヲタクヘレ病人杳氣ヲ聞久氣  
血順クワシテ痘ノ色紅活ニ成リ大ニヨレ餘リ氣強キ伽  
羅ハ逆上ノ患アリ枣松粉ナト八九日目ヨリハ輕ク常々燒  
ヘシ香ヲタクノ大妙法ナリ發達ノ氣ヲ助ケ内攻ノ難ヲ  
ノガル惡臭ヲ聞時ハ氣血凝滯シテ痘色大ニ損ス其母脣  
真有ラハ茱ヲ付テ當分是ヲ治シ監病スヘシ其外口中臭

キ人ナト甚アレ、又煙草多ク呑ヘカラス烟大ニ害有リ  
此時分咳嗽有ノ苦花シカラス喉痛ムノモ少シハ害無シ又氣  
急ノ氣味ノマウナルモ少シハ害無シ

第五階

七日八日此時ヲ行漿ト云俗ニ水モリト云痘起脹サヘ十  
分ナレハ漿ノ行ルモノ手間イラヌモノナリ其後黃芪湯用  
ヒ居ルヘシ  
此時ニ色枯テ光無キモノ熱毒内ニ強キナリ危シ急ニ張ハ  
ヲ兼テ清解スヘシ初メヨリ毛角潤ヒノ去ラヌノ願ワ  
レキ也

此時ニ面部ニ黒ク陷リタルヲ見ハ只一粒ト云ヘ凡甚大  
事ナリ十一二日目極メテ大變起ルト知ルヘレ急ニ骨  
餘粉ノ類用ユヘシ或ハ針ヲ以テ桃去リ藥ヲ付ルモ  
ヨレ

大抵痘ノ頭高ク皮厚ク先白ク根ニ紅ノ輪圍ミ地合ノ色  
清キ者ハ順也頭少シ中クホナルモノ外ニ惡症無ケハ隨分張  
ハ中高ニナルモノナリモノナリ或ハ釀膿粉十ト宜シ紅ノ輪  
散乱レ地合ノ色ワカレサル者ハ大凶ナリ又痘ノ皮甚薄ク光  
リテ透<sup>スキ</sup>トラル如キハ惡シ、

第六階

九日十日此時ヲ灌膿ト云俗ニ膿モリト云痘ニ行リタル將水  
漸々ニ色変<sup>カタ</sup>リ始メハ白ノ後ニ青黃色ニ成リ頭圓<sup>ヒコロ</sup>ク根紅  
ニ食益進<sup>ス</sup>ミ声清ク大便祕<sup>シ</sup>眼開<sup>ヒラフ</sup>カサル者大吉也黃芪湯  
ニテ内ヲ張リ居ルトヨレ漫<sup>ヒ</sup>リニユルムヘカラス大切<sup>セイ</sup>ノ場ナリ  
大抵<sup>テ</sup>大便ハ起<sup>キ</sup>脹<sup>カツラ</sup>ヨリ後ハ祕スルトヨレ下利ス<sup>シ</sup>ハ氣泄<sup>モヒ</sup>テ張<sup>ハシマ</sup>  
甲斐無クナル也十二三日目ニテモ祕<sup>シ</sup>テ置タキ者ナリ然  
レ庄熱毒烈<sup>ハリ</sup>キハ此ノ限リニハ非ス  
九日十日ニ至リテ膿成<sup>ラサル</sup>者ハ大ニ危<sup>シ</sup>急ニ保元湯<sup>ヒヤウ</sup>釀<sup>カツラ</sup>  
膿粉ノ類症ニ從テ用ヘ

水泡<sup>スイボウ</sup>トテ皮甚薄<sup>ク</sup>光<sup>ヒカ</sup>リ格別ニテ水<sup>アブ</sup>クレニ成リ形<sup>カタ</sup>湯<sup>マ</sup>

火傷ノ如クキヨト觸レハ直ニ潰レ者山ナリ多クハ内  
寒ノ症ナリ又犹ニテモカクノ如キト有リ症ヲ祥  
ニシテ茱ヲ用ユヘシ

瘡ミ出ルハ虛候ナリ少シハ苦レカラ子氏甚キハ必外剥レ  
テ内攻ノ變有リ當歸湯用ユヘシ痘ハ兔角痛ム者實  
ニシテ大吉也何程強ク痛トモ喜ヘレ

若瘡ミ甚シテ忍ヒ難ク大ニ悶乱ニテ段々ニ面ノ脹引ハ死ス  
ルフ近キニ有リ此時ニ至テハ再華浴ノ法行フヘシ熟膚ノ  
後忽十更ニ起脹シ絶食ノ者モ極メテ一碗斗リハ食シ瘡  
ミモトンント止ム也アトヲ隨分内ヨリ張リ再ヒ引入テケルヤウ

ニスヘシ変再ヒ起ラハ又治ルノ路無シ此法至テノ妙法死ヲ起  
スノ祕術也ト云ヘ凡世俗是ニテ仕習ハストナレハ甚恐レテタ  
クハ行ニ難シ

声嗄喉痛ム者少レハ害無シ此症初メニ出ルハ大凶ナリ灌膿  
ノ時モトンント声出ザルハ毒氣内ニ攻ルナリ危シサレ凡眼ヒラ  
カズ大便祕シ能食スルモノハ療治ニカルナリ

灌膿ノ時食少ケレハ膿ノカリ甲斐ナク変起ル也

又大渴スル者ハ内熱甚キナリ舌ヲ見テ熱ナラハ清解ヲ兼  
テ用ヘシ初中後トモ舌ヲ以テ寒、熱ヲ辨スヘシ其妙筆紙ニ  
尽シ難シ先其アラベレラ云ハ、舌厚キハ熱ナリ薄キハ寒

ナリ黒キハ大カタ熱ニ属ス黃苔タケ白苔タケモ亦熱ニ属ス赤  
キハ寒ナリ

璧カクヘ膿少レカルト云ヘ凡キヨト觸サワフレハ潰ル者ハ甚惡シ、隨  
分監病ノ人心得テ痘ノ破ヤレヌヤウニスヘ痘ハ内ヨリ外へ  
発達スル者ニテ璧カクヘハ紙袋ニ風ヲ含タルカ如レ小キ穴ニ  
テモ明時ハ風氣ソレヨリ洩モレテ其袋萎ヒドキカ如レ

倒陷トウカクトテ十日目程ニ暴ニ痘ニ頭クボミテ勢イ減スル者有

喘急腹脹等キツ

ノ一無ナシハ治路有リ急ニ張ルヘ

忽一齊ニ紫黑色ニ成ル是大惡症ナリ結カ痂セリト思フヘカラ  
ハ實コトノ結ケト痂カハ面部或ハ口角或ハ天庭福堂ノ邊ヨリ段々ニ

カセ来リ一齊ニハカセ又ナリトクト見ワケテ症ニ從テ治  
スヘレ

灌膿ノ時ヨリ結痂ノ時ニ至リテハ火鉢ハヂノレツラヒ最大切カツ  
リ心フ付ヘレ快ヨク十分ニ膿ニ成リ痘色蒼蠟ソウロ色ニサヘナレハ  
大事定サタル安心スヘ手足八日數後カズルモノナリ苦シカラス  
面部サヘ吉ナレハ餘ハ皆コレニ役フ也

膿サヘヨクカレハ其アトニテ大ガイノ惡症出ルトモ命ハタス  
カルモノソ内ノ毒大ガイ外ヘ出タレハ内攻ユルキカ故也膿  
カ、リテ後ノ惡症ハ皆虛ニ属ス急ニ温補スヘ膿ノカリ  
少クレテ惡症起ルハ毒イ一タ内ニ有ルナレハ一向ニ温補ハ

十ラス解セントスハ元氣脱ス如何トモ十ラスモノナリト力  
ク少ニテモ膿濃ク多キヲ顛フヘ

八九日以上ハキビレク食忌スヘシ餅類菓類菌類豆腐コン  
ニヤク油アゲ類スヘテノ煮焼セサルモノヲ禁ス魚類モ輕キ醤  
油煮テ食スヘシ鹽ノ辛魚或ハ乾魚ノ堅キ皆宜シカラス  
蛤ハ惡シ、與フヘカラス酒ハ血ヲ散スルノ害アリ初中後トモ  
ニ與フヘカス然レ由又症ニ依リテ血ヲメクラシ温ント思フ時  
ハ酒ヲ用ルトモ有リ是ハ變ニ非サレハ堅ク禁スヘシ餅モ五  
六七八日目十トハ與ルモ害無シ殊ニ膿カイ無キハ餅ヲアタ  
ヘ或ハ煎湯糯米ヲ入ル、ト有リ膿ヲ備シテ大ニヨレ團子

ハ化レニクレ與フヘカラス不食ノ時ハ寒晒ノ團子ト云ヘ化  
レニクレ必與フヘカラス八九日目後ハ只菜ノ物ハ大根ニシ  
シ干瓢薯蕷ノ類ヨレ或ハ鮭節王餘魚コチノ類與ヘ置  
ヘシ

灌膿ノ時毒氣ノ有無虛實ノ辨ヨク心ヲ付テ見ルヘ  
レ虛候見ヘハ急ニ補張スヘシ毒氣内ニ蒸ルヤシニ見ヘハ  
急ニ清解スヘシ然レ此所甚萎ムトヲ忌ナレハメツタニ  
清解ハカラスソ病人ノ性命医者ノ方寸ニカル大功ナルト  
云ヘカラス毒氣内ニ實レ熱内ニ蒸セル時ハ表ニ達スルノ暇  
無ク先内ヲ傷ル外モ亦從テ焦枯ス又元氣足ラス外ヘ

吉吉昌  
今佐引熱

張ルト緩キ時ハ外毒漸々ニ内ヘ引入リ終ニ臓腑毒氣ノ  
タメニ實ス十二三日目ノ死症此時ニ判ル必某ヲ誤ルヘカラス  
此時ノ地合ノ某ハ黃色ナリ然レ氏熱毒甚キヤウニ見ヘハ  
角類或ハ阿蘭陀ノ上々品ノテリア、カナト見合セ用ヘテ  
リア、カモ今世ノ下品ハ一向ニキカヌナリ毒氣甚盛ナル  
時ハ寒涼ノ劑モ施スヘシ症ヲ詳シ方ヲ按シテユコ行フヘ

第七階

十一日十二日此時ヲ收醫ト云又結痂トモ云俗ニカセルト云  
痘ニ皺ヨリ見ヘキタナクナリ膿先ツカ、リタル所ヨリ追  
ニ結痂ニヲモムク者順也

此ノ時死生ノ關危キノ至リナリ是ニテハタトヘ種ノノ惡症  
出ルト有レ氏メツタニ死ニセスナリ初メヨリノ療治ノ仕誤  
リモ或ハ是ニテノ惡症モ皆此ノ收醫ノ時ニ追寄セ来リモ  
ダエ死ニスルハ此時ナリ大抵ノ痘ハ十二三日目ニ死スル者十  
ニ八九ナリ序熱ヨリ灌膜ニテノ内又十五日過テ死スルハ  
十ノ内ニ僅ニ二ナリ然レ氏此ノ收醫ノ時ニ俄ニ死スルニテ  
無レ大カタハ是ニテ不順ナル故ニ此時ニ至リ外剥内攻シテ  
性命保ツアタワサルナリ

外剥トテ先ツ両方ノ頬先或ハ額ノ邊ヨリ赤ムケニ成リ痘  
一ツニゼニ成リテ分ツカラス血滲リ出テ地脹引モノ外剥

ト云其死且タニ有リ自然ニ痘ノ上皮和ラカニ成リテ赤ム  
ケニ成ルモ有レ凡多クハ癢ミ堪難ク監病ノ人色ニ防ク  
ト云ヘ凡枕或ハ夜具ノ襟ニテ搘破リ目モ當ラレヌヤウニナル  
モノナリ是ヲ監病人ノ過キノヤウニ云ヘ凡左ニハ非入是變ノ  
起リタルナリタクハ内ヨリ外ヘ張リ出ス元氣甲斐無クナ  
リテカクノ如ク成ルナリ若少シ破レカレハ痘毒皆ニ内攻レ  
テ寒戰交牙或ハ絶食大渴下利声啞種々ノ惡症競ニ起  
眼俄ニ開キ煩躁罔亂シテ死ニ至ル此ニ至ツテハ治術窮ル  
扁鵲今ノ世ニ在リ凡如何トモレ難シ此症輕キ者ハ方ヲ按  
シテ之ヲ治ス

寒戰交牙モ多キ出物ニハ少シハ有ルモノ也声モ出力スルナリ  
眼開テカス食モ大ガイニ進ニハ死ヲ免ルヘシ爪ニテ搘破リタ  
ルモ渴無ク食進ニハ治ル也

大抵十二日ニテハ黃芪ヨロシ癢ミ有ルハ當帰湯虛寒ノ  
者ハ保元湯用ユヘシ然レ朝鮮人參ハ熱物ニヘ六七日目以後  
ハ甚惡レ必漫リニ用ヘカラス痘ハ毒氣熱氣烈シキモノナム  
附子人參ノ類ハメツタニ入ラヌモノソ然レハトテ石膏黃芩  
ノ類ノ寒性ノ物ヲ用ヒハ内ヘ萎ムノ恐レ有リ是又漫リニ  
用ヘカラストカラク内ニ積蓄タル毒ヲ残リ無ク表ヘ送リ出  
シテサハクノ弟一也傷寒ナトノ療治トハ其アンバイ大ニ

違イ寒熱ニ偏リタル某ハ已<sup>エ</sup>ト得サルニ非サレハ慎<sup>ハシ</sup>テ行フ  
ヘカラス

### 第八階

十三日十四日此時ヲ落痂ト云俗ニフタ作ルト云痘ノ皮  
黒赤ク赤<sup>アツ</sup>小豆ノ如クニシテ擊<sup>カツ</sup>ク厚<sup>アツ</sup>ク成リ段々ニ落半眼  
始テ開キ烈氣トント去リ尽シ大小便常ノ如ク食益進ム  
モノ大吉ナリ此時ハ連癰<sup>モモ</sup>湯主之十二四日以後ハ專<sup>モ</sup>清涼  
ノ茶ヨシ追々石膏モ用ヘシ

備十三日ニ至リテモ落痂ニモムカス烈強ク面部手足  
トモニ潰<sup>ハ</sup>爛<sup>ハ</sup>シテ衣ノ裏ニヘタクト付上リ寒戰交牙大<sup>モ</sup>カ

絶食下利呕逆等ノ症有ラハ十三日十四日ト云ヘトモ命數<sup>スラ</sup>コニ  
尽<sup>ハ</sup>ク如何トモスヘカラス

別ニ一種有リ潰<sup>ハ</sup>爛<sup>ハ</sup>シテ一向アタリヘモ近付難キ程ナルニ其  
臭<sup>ハ</sup>キ<sup>ハ</sup>又其家ヘモ入り難キ者ハ却<sup>ハツ</sup>而治ル<sup>ハ</sup>モ有リ是ハ内ノ  
毒氣外へ泄レ出ルタルカ故ニ内攻急十<sup>ハ</sup>ス死中ニ生テ得  
ルナリ清解或ハ連癰<sup>モモ</sup>或ハ排毒ノ類見合セニ用ユシ  
痘ハ臭<sup>ハ</sup>カ<sup>ハ</sup>スレテ口氣甚臭キハ凶也急<sup>ハ</sup>寒涼ノ茶用ヘシ  
大便甚臭キモ亦凶ナリ

一種アリ痘堅クカセテ皆一ツニ成リ其高キ<sup>ハ</sup>鐵<sup>ハ</sup>脣<sup>ハ</sup>ノ如  
クレテ一向落千ス身ニ烈有リ唇<sup>ハ</sup>上ノ方ヘ及上リ齒<sup>ハ</sup>露<sup>ハ</sup>

出タルハ凶也極メテ麥起ルフ有リ油断スヘカラス  
痂ノ落タルアトハ桃色ニ少シ黒ニテ帶タルヨシ  
十二三日ヲ過テハ毒氣表ヘ出尽シテ外モ亦毒化レ單リ  
別ニ萎シ入ヘキ毒無ケハ序熱ヨリコノ方ノ臟腑ノ墓ニタル  
餘熱ヲ清鮮スヘシ連壳易ハ常也甚キハ石膏用ヘシ少シモ  
恐ルヘカラス十四五日過テハ石膏モ甚ヨキモノ也然レ虛候  
有テハ此ノ例ニ非ス

タトヘ落伽レテ不時ニ俄ニ痘ノアト水フクニ成リ又起ルト有  
リ皮膚ノ餘毒也驚ヘカラス静ニ清鮮スヘシ  
痂落テ後猶去サル者ハ餘毒ノ寄リ出ル標シ也或ハ頭

或ハ手足寄リノ出ル所定メ難シ膿夥シク出ルモノソ其臭キ  
ノ近ツクヘカラス日數ハ久シクカレ凡命ニハ氣ツカイ無キナ  
リ然シ喉管ト胸トハ死症也

十四五日目ニ前ノ如ク必死ノ症寒戰交牙大渴絕食小水  
不利呕逆等ノト出テ如何トモスヘカラスニハ將軍湯或ハ  
赤豆湯或ハ金化粒ノ類ニテ急ニ下スヘシ毒氣下リ尽シテ元  
氣保ツ者ハ死中ニ生ラ得亦妙方也然レ凡十二日以前ハ此  
法行ヒ難シ如何トトハ表ニ未毒化セス充滿シテ有レハ下  
劑ヲ行フニ付テ表ノ毒漸ニ内ニ入り元氣極メテ續キ難  
キナリ十三日以後ハ外面潰瘍シテアリト云ヘ凡日數立タ

ル故追アラシニ内へ引入ル毒氣少キ也故ニ幸ニ内ノ毒ヲ下  
レ尽セハ萬死ノ中ニ一生ヲ得ルナリ是必死ノ症又他術無  
ト思ハ断然トレテ此法ヲ行ヘレ恐レテ疑擬スカラスキ又  
ルキ時ハ死迫セキテ其甲斐無

落痂後腹痛有者、是餘毒ナリ急ニ將軍湯行フヘシ少シ  
ハ便血有ルモ若シカラス

落痂レテ後端急腹滿不食大渴等ノト何事ニヨラス餘症  
有ル甚危シ油断スカラス然レ氏十四五日後ノ變症ハイ方  
程モ療治ノ仕方有ルヘシ心ヲ尽シテ見レヘシ此時ニ声ノ嗄  
ル、トモ亦甚惡レ、少シハ變無キニモ声ノカワリタルヤウノト

モ有ルモノナリ是ハ害無シ十四五日ノ處ヲ乘リ越ヘタルハ又一  
安堵ナリ

十三日目ノ初湯ト云ト有リ又サマ湯トモ云世俗ノ習ニ  
テ是ヲ痘瘡仕アケタル祝イアラシノヤウニ心得来ルナリ米ノ  
白水ニ酒少シ加ヘ和アラシラカル手拭ニ右ノ湯ヲ浸シ緩ク絞リ  
テ面部手足ニツレバカリ當ル也是早ク落痂セシムルノ法ナリ  
隨分宜キトナリ然レトモ重キ痘ハ中々十三日目ニハ此事ナ  
テス祝アラシ義ト云ハ、其字ビハカリラシテ置ヘン

### 第九階

十五日ニテ痘ノトハ終ルナリ格別輕キ症ハザツト風爐入

ルヘシ大ニ元氣ヨクナルモノノソレシ重キハ十八日目天氣晴朗ナルヲ見テ風燼ニ入ルヘシ俗後甚風寒ヲ恐ル慎ムヘレ表裏トモイマタ實セサル時ナレハ大ニ風ヒキ易レ

十七八日ニ及テモ猶手足弱ク歩行ナラス自由叶サル者ハ日數立ハ自ラ治スル也恙活湯主之

十五日過テ眼闊カサル者ハ痘毒眼ニ入ル也洗ヒ茶スヘシ閑テ後眼ノ玉赤キト朱ノ如ク白翳カリ或ハ星出タル者急ニ是ヲ去ルヘシ日久シケレハ明ラ裹フ

十五日後齒グキ俄ニ紫黒色ニナリ或ハ痛ミ或ハ血大ニ出ル者走馬牙痕ト云一日カ半日ノ間ニ齒コトクク落歯クキ

モ腐リ尽テ死ス急ニ是ヲ救フヘシ甚キハ舌モ皆腐ルナリ其中ニモ血初メヨリ多ク出ルハ治レヤスレ血多ク出レハ大便小便トモニ血ニ成ルトモ有リ毒洩モ及而生ラ得ルナリ

○痘瘡主劑七方

中分ノ痘大カタハ此七方ニテ事濟ナリ格別輕キ症ハ重キ茶ハ及而邪魔ニ成ル事モ有リ黃芪ナトモ強ク用ルニモ及ハサルナリ隨分茶モ輕ク處スヘシ若又變症ニ過ワ、下ニ著アヌ三十二方症ニ應シテ用ヘシ其外千變萬化ニ至リテハ三十二方ニ限ラス此書ニハ其方

角ヲ指而已

紅花葛根湯方

序猶二三日ノ間ノ主方也。發熱頭痛、呴吐、微利、微腹痛等ノ症必先此方ヲ用ヘシ。見點レテモ暫ノ間ハ猶此方ニ宜シ。若又面赤キニ過ル者ハ紅花ヲ倍シテ用。

葛根 大 茄菜 中 紅花 小

右三味水二合ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用ヘシ。其艸大棗生姜等ハ病人ノ口腹ニ稱<sup>カヨウ</sup>フヤウニサシ引ス。レ此三品ハ元来病ニキカサントテ入レタルモノニテハ無シ。茱汁ヲ和ラカニスル為ト又飲マスキ為ニ入レタルモノナリ。癸<sup>クニ</sup>辨ハ玉環方ニ有此下ノ茱方皆是ニ。

ナラヘ然レ生姜ハ熱物十レハ序熱ノ間ハ用ヘシ。其以後ハ虛寒ノ症ニ非サハ漫リニ用ヘカラス。

桂皮湯方

序熱惡寒多者或痘出カヌル者主之

桂皮 茄菜 等分

右二味水二合ヲ以テ煮テ一合半ヲ取り用ユ

金化粒方

序熱ノ間先ツ此粒ヲ用テ預<sup>アラカル</sup>其毒ヲ減ス

巴豆 一粒及<sup>シ</sup>半 杏仁 貳粒

百草霜 五分

右三味為細末糊丸如白芥子大每服十粒或二十粒

一日ニ三度慎テ毒ヲ侵スノナカレ

桔梗湯方

快コロヨク見點シテ後ハ此方主ミ之ヨク毒ヲ送テ表ニ達シ

痘ヲ発セシメ毒ヲ消解シ食ヲ進ム

桔梗

絲瓜 各等分 山楂子中

黃芪湯方

起脹ヨリ後此方主ミ之ヨク膿ヲ排シ表ヲ固メ裏ヲ健ス

ニス外ヘ張リ出スノ主ホナリ

黃芪

桔梗 各等分 山茱中

右三味水二合ヲ以テ煮テ一合ヲ取リ用ユ

棗松粉方

コレヲ燒テ穢氣ヲ去リ神ヲ清クレ血ヲメクラシ痘ヲ

テ光潤ナラシム

甘松大 大棗小

右二味細末レテコレヲ燒ク

小連翹湯方

收醫レウヨシ以後此方主ミ之餘熱ヲ去リ毒ヲ解シ臟腑ヲ健ス

レ食ヲ進ム

連翹 大腹皮 茯苓 各等分

右三味水二合ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用ユ

○變ニ應スル主劑三十二方

麻黃湯方

序熱表尙シテ痘不出者或ハ十二三日目潰爛シテ毒

表ニ在ル者此方ヲ與ヘテ臭汗ヲ取ル

麻黃 桂皮 荆芥 各等分

右三味水二合ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用ユ

參連湯方

序熱ノ時直視スル者主之

芳野人參 黃連 等分

消毒飲方

右二味熱湯ヲ以テフリ出レ用ユ

四五日ニシテ痘出ルノ快カラス呕逆煩渴赤眼面部紫  
赤班ナル者主之或ハ八九日ニシテ声啞入ル者ニモ用ユ  
荆芥 大 牛蒡子 中 防風 中

右三味水一合半ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用ユ

陵鯉湯方

表尙シテ痘出ルノアタワサル者或ハ六七日エシテ紫黒  
ニ成リ陷ヘル者主之

穿山甲 大 細末 荆芥 大 膜麝香 小

右三味水一合ヲ以テ先荆芥ヲ煮テ一合ヲ取り濁クス  
去穿山甲ヲ入レ更ニ煮テ一沸ヒヤクヒヤウレ火ヲ下レ服スルニ臨

テ麝香ノホヲ加フ

### 黄芩湯方

見點焦枯者主之ヨク熱毒ヲ解ス

### 黃芩

紫艸草

連翹

各等分

### 大報紅飲方

右水一合半ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用ユ

虛寒ニシテ見點淡白者主之ヨク内アシナ温メ元氣カツクヲ助ク  
朝鮮人參 桂皮 桔梗 各等分

### 小報紅飲方

山茱萸右三味水二合ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用  
桂皮桔梗各等分

### 症前ニ同レキ者

### 芷白

桂皮

桔梗

各等分

右三味水一合半ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用  
桔梗甚シク表達下泄トモニ無キ者主之

### 大黃

紅花

中

### 大黃

紅花

小

右三味熱湯ヲ以テアリ出レ用

### 導赤湯方

小便赤滲難通者主之

滑石

大

車前子

大

紫艸草

中

右三味水一合半ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用

溪雲蒸方

右二味水二合酒一合共ニ煎シ茶ヲ浸シ木綿ノ和ラ

カルニ包ミ痘ノ出サル处ヲ蒸スヘシ數遍蒸シテアト

小片ヲヨクく覆イ置ヘシ半日ニシテ快ク出ツ

山茱湯方

酒ノカス ウトン粉

起脹ノ時呕逆シテ水茱口入ルヲ得サ化者主之

山茱

大

絲瓜

中

右二味水一合半ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用

調紅水方

七孔ヨリ血出テ眼赤ク痘焦枯スレ者主之或血症無キ  
者モ痘焦枯スル者ハ宜之

燕脂

右一钱或五七分絲瓜水ヲ以テ調へ服セレム

流春水方

症前ニ同キ者主之毒心下ニ逼者亦妙

象牙

中  
細末

青黛

大

右二味絲瓜水ヲ以テ送リ下スモレ絲瓜水無キ時ハ  
新汲水或ハ微温湯亦可ナリ

骨餘粉方

痘黑陷者或ハ將ニ内攻セントスル者主之

骨餘ヨコヅカ燒末一錢

犀角シカツ五分

右二味粉ト成レ毎服五分或三分

保元湯方

痘虛候ヲ見者主之

黃芪

大

朝鮮人參

中

右二味水二合ヲ以煮テ一合ヲ取り用

醜膿粉方

膿足ヲサル者之ヲ服シテ妙ニ膿ヲ得

清色大豆

大

百草霜

小

右大豆微シ熬リテ粉ト成レ百草霜ヲ和シ茱汁ヲ  
以テ送リ下ス

再華浴法

七八日ノ間痘將ニ内攻セントシテ癢ミ忍フヘカテス煩躁  
悶乱シテ死セントスル者此法ニ宜シ

密室ノ内ニテ風寒ヲ遠サケ大ナルタライニ熟湯ヲ取リ

米ノ糠ヲ袋ニ入テ絞リ出レ白水ト成レ<sup>コテ</sup>テ手ヲ浸ス  
位ニアツクレテ病人ヲ浴セシム手拭ニテ惣身ヘ湯ヲカケ  
癢キ所隨分ニ浸<sup>ミ</sup>スヘレ甚<sup>ニコロ</sup>快キナリ暫<sup>ハシタ</sup>シテ湯ヨリ上ケ急  
ニ和テカナル手拭<sup>ハサマ</sup>ニテ水氣ヲ拭イ去リ手早ノ包ムヘレ  
夜著蒲團常ヨリハ三倍ハカリキセテ息ノ出ルヤウニレテ  
頭面モ厚ク覆イ置ヘシ癢ニ忽<sup>ハタ</sup>千ヤミ煩乱<sup>ハシタ</sup>静リ熟睡ス  
ル一二時ハカリ或ハ半日ニシテ初メテ覺メテ何ヤウニ絶  
食ノ者ニテモ一碗ヲ進ムヘレ快ク食スル也痘再ニ起リ色  
ウルワシク死中ニ生ヲ得ヘシ跡ヘ直ニ保元湯用テ内ヨリ  
モ強ク張ルヘレ

當歸湯方

痘癢キ者主之

當歸

大

黃芪

大

白強蚕

中

右三味水二合ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用

丁香湯方

下利甚シク便色変セス臭氣無ク虛寒ニ属スル者

主之

丁香

中

瞿栗穀

大

芍藥

中

右三味水一合半ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用

小清解湯方

諸熱症主之

紅花

山梔子

絲瓜各等分

右三味水一合半ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用

大清鮮湯方

症前ニ同シテ更ニ甚キ者主之

紫艸草大

黃芩中

象牙小細末

右三味水一合半ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用

大連翹湯方

小連翹湯ノ症ニシニ熱深キ者主之

連翹大

石膏中

山楂子中

排毒煎方

右三味水二合ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用

排毒煎方

毒氣皮膚ニ在リ或ハ筋骨ニ在ル者主之

桔梗

唐恙活各等分

右二味水一合半ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用

赤豆湯方

落痂ノ期ニ至テ残毒心下ニ迫ル者主之

赤小豆

商陸

野薑薇子

右三味水四合ヲ以テ先ツ赤小豆ヲ煮テ二合半ヲ取り

諸味ヲ入レ再煮テ一合半ヲ取り用大便下利シ小便

亦從テ通利ス

地黃湯方

落痂後便血有ル者主之

當歸

地黃

芍藥

各等分

右三味水一合半ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用

羌活湯方

羌活

防風

芎藭

各等分

落痂後手足不遂者主之

羌活

防風

芎藭

各等分

右三味水一合半ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用

蒙花煎方

落痂後餘毒眼ニ入者主之

密蒙花大

菊花中

車前子中

右三味水二合ヲ以テ煮テ一合ヲ取り用

黃柏湯方

十五日ニシテ眼猶闇カサル者是ヲ以テ洗ヘシ

黃柏大

黃連中

枯礬小

右三味煎シタル茶ヲ以テフリ出シ繩ニ浸シテ眼ヲ洗フ

數回

桃紅脂方

餘毒眼ニ入ル者主之

己豆 五分

乾姜 三分

光明丹 三分

右三味細末レテ煉リ合セ  
蟻豆ノ大サニレテ百會ニ  
貯ス其處水フクレニ成リ或ハ粟粒ノ如キ瘡出テ眼愈  
告明紅方本原ノタガヤハメテノルニシテ眼ヒギ

餘毒眼ニ入り明ヲ喪ントスル者主之

雀頭血

生ナカラ雀ヲ取り針ヲ以テ頭ヲ刺血ヲ滴テ眼ニ入  
ル其雀ハ放キ去テシムヘシ

綠仙黑方

走馬牙癥齒銀膿爛シテ死セントスル者主之

小青蝦カニ一牧

一名兩墓

磐石 二钱

大枣 二钱

右三味同シク黒燒ト成シ齒銀ニ付ヘシ

雄黃粉方

症前ニ同キ者主之

雞冠雄黃

右一味細末シテ齒クキニ付ヘシ

痘瘡水鏡錄跋

友人橘惠風歎曰。古今於醫事獨無其書矣。而有其書亦不足取耳。嘗撰玉環方。其立方也。簡。其論症也密。切脉察相。鑿術斯備矣。實古今未見其比焉。頃日田鱸諸子譯其痘之部而上木。雖國字似淺露。而亦足窺惠風之一班矣。余不勝喜。書以為跋于時安永戊戌春。

讚岐

島飛太冲父

天明元年辛丑夏刻

西村正齋圖書

王氏



王氏  
山中

