



0 1 2 2 1 m 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1
JAPAN

79
1140

小叙

達生一書固胎產之橐鑰常與武林秘篇並為金針度世 防禦使吳公素苦研副難成近得是書因以從事預懷千時周詳於倉猝順造化之自然日誕生 慶於毫切欲付諸剞劂以廣其傳令天下永無難產之



91-1979

患其於造物之意，生之助也。爰弁數言，
於簡以由。

乾隆己巳季秋望後和守居士謹識

達生編小引

胎產非患也。而難產則爲人患。人患不殆。則歸之于天。天何尤乎。亦唯求之人事而已。此編專爲難產。而設。蓋區々一得之愚。亦即區々一點真誠。一念。倘能熟看謹行。皆可。于是人患弭而天德叶矣。然知之而言非也。謂之而不傳亦非也。好生者見之。宜爲廣布。督力著重刻。通行。

無力者。手銘數用。由數人隨分所至。未必非一而同。包同與一事。吾人利濟爲懷。原古以來。積善餘慶。必有攸歸。達天德也。但此揣摩印證。委係無疑。凡重刻手鈔時。不必改動。尤不必增入方藥。以相矛盾耳。康熙乙未。天中節。亟齋居士記于南昌郡署之西堂。

西冷陳錫貴 蕪人張懷德助梓

達生編大意

胎產一事。自產寶諸書以後。代有發明。其保胎臨產及產後調理之法。率皆至精至密。似無遺義。又何俟今之多言。但或專精方藥。而未及其所以然。或略不及之。而未竟其全。倘冀完心。有素之人。末易明而用之。也。倉卒之際。殊難得力。茲特倡明。天德自然之說。不厭煩繆。重複以期於暢。使平

日可以預防臨時可以應急從此天下後世。辛一女嬰兒同登壽域豈不快哉然亦特曲遵古人之意而條達之非割爲異說也。此編只是反覆以言其理至于方藥殊未之及偶載一二皆取先賢古方極平極穩者蓋極平常之事須用極平常之藥一切矜竒炫異之方槩置不錄且保護得法雖平常之藥亦無所用之矣倘必欲用則他

刻自有原不相妨。

一凡胎前臨產產後調護之法。丁一備載不厭煩複蓋原係家居日用閨房瑣屑之事。一有不到皆足致病與其服藥于病後曷若致謹于平時。

一此編言語俚俗未免見笑大方但原爲婦人而教識字者固不必言不識字者令人誦之皆可通曉然須平時講令心中明白。

臨時自有主張。不但產母宜知。應老幼
男婦皆當知之。與其看戲文聽說書。不如
此等有益也。

一此編雖其所當知。而富貴之家尤宜熟講。
蓋閨人平時嬌養。口厭肥甘。身安逸樂。體
氣脆薄。且性情驕傲。不聽人言。到此時纔
一知覺。即不能耐點燈。着火。上呼下應。房
中擠簇多人。內外嚷成一片。穩婆絡繹各

脉離經
不上指
頭未轉

要爭功。脉未離經。胎未轉下。即便坐草。及
至不順。奇方珍藥。紛々亂投。以致母子兩
悞者多矣。豈不惜哉。但能留意此編。自可
平安清吉。

一胎產之書。可以汗牛。今此卷。特爲難產。
而設其胎前產後。特略載一二。以存其槩。
而已。若曰。此編足以盡之。則重予過矣。
一開卷。即載臨產者。何益。臨時倉卒。不及翻

檢。因以切要者載之首篇。且令開門見山。人人熟習專意。行持自可無悞。若平時講說。原不妨從保胎順序看之也。

一試編一篇。尤爲緊要。蓋知試痛之悞。方知正生之易。正與臨產一篇。互相表裏。最宜細看。仍采先賢格言之足。相發明者數條。載之。聊以徵引。言之不謬。然嘗得一巒。亦足以知其槩矣。

一語云。勿以善小而不爲。此篇固小之小者。然誠有見于胎產爲生人之始。隨時隨地體驗而成。且身經目擊。口授耳聞。于試不爽。忘其猥陋。出以語人。漏萬之譏。固所不免。

世之君子。原其心焉可矣。

西冷拙園何鍾台叅訂



何云至理
名言小經
人道

達生編上

原生

天地之大德曰生。生之德無往不在。要之莫大于生人。夫胎產固生人之始也。是以名之曰生。生也者天地自然之理。如目視而耳聽。手持而足行。至平至易。不待勉強。而無難者也。然今之世。往々以難產聞者。得無以人事之失。而損其天耶。夫天豈以生道殺人哉。必不然矣。因思太

爲至靈。何有于物。物之生也。莫或難之。故草木之甲。以時鳬穀之出。以日。豈復有導之者哉。自然而然。不待勉強。于人何獨不然。有童子骨鰻于喉。千方百不出。舉室徯徨。一嫗視之。曰無異也。令靜卧。飼以漿糜。三日自出。而無所苦。可以知其理矣。骨鰻者人事也。尚可以天勝之。而况天道之常。與自然之極者乎。事本易也。而自難之事。本常也。而或異之。無惑乎其然矣。繼持此理。

消息行之。百試之下。無一失者。而多不用藥。由此敝唇焦舌。以告同人。頗家相信。數年以來。十色之間。產難者。蓋寡矣。獨惜一隅不能遍及。茲漫述成帙。剖劂布之。夫豈能有補于生之外哉。惟願順承天休。而毋以人事撓之。以各遂其生而已。

○臨產

六字真言

一曰睡。

二曰忍痛。

三曰慢臨。

盆。

初覺腹疼。先自家拿穩主意。要曉得此是人生必然之理。極容易之事。不必驚慌。但看疼痛不了。又疼一連五七陣。漸疼漸緊。此是要陣方可。與人說知以便伺候。若疼得慢。則是生方可。與人說知以便伺候。若疼得慢。則是試疼。只管安眠穩食。不可亂動。此處極要着意。留心。乃是第十關頭。不可忽略。若認作正產。湖亂臨盆。則錯到底矣。

此時第一要忍。疼爲主。不問是試疼。是生產。忍住。疼照常吃飯睡覺。疼得極熟。自然易生。且試疼與正生亦要疼久。看其緊慢。方辨得清楚。千萬不可輕易臨盆。坐草。擦腰。擦肚。至囑。勿再站。時宜穩坐。坐時宜正坐。不可將身左右擺動。須知此處要自家作主。他人替不得。與自家性命相關。與別人毫無干涉。到此時必要養神。惜力爲主。能上床。安睡。閉目。

養神最好。若不能睡，暫時起來，或扶人緩行，或扶桌站立，片時疼若稍緩，又上床睡，總以睡為第一妙法。但宜仰睡，使腹中寬舒。小兒易于轉動，且大人睡下，小兒亦是睡下，轉身更不費力。蓋大人宜惜力，小兒亦宜惜力，以待臨時用之。切記。

無論遲早，切不可輕易臨盆。用力切不可，聽穩婆說，孩兒頭已在此，以致臨盆早了，悞盡大事。

事此乃天地自然之理。若當其時，小兒自會鑽出，何須着急？因恐小兒力薄，其轉身時用力已盡，及到產門，不能得出，或亦有之，宜稍稍用一陣助之，則脫然而下。蓋此時瓜熟蒂落，氣血兩分，渾身骨節一時俱開，水到渠成，不假勉強，及至生下，即產母亦不知其所以然矣。

或曰：大便時亦須用力，如何生產不用力，不知

解何云神

達生編

大便。呆物。必須人力。小兒自會轉動。必要待其自轉。不但不必用力。正切忌用力。蓋小兒端坐腹中。及至生時。垂頭轉身。向下。腹中窄狹。他人有力難助。要聽其自家慢轉。身到產門。頭向下。脚向上。倒懸而出。若小兒未曾轉身。用力一逼。則脚先出。以爲詭異。且贈之美名。曰脚踏蓮花生。或轉身未定時。用力一下。逼則橫卧。腹中一手先出。又名之曰討鹽生。

卽或轉身向下。略不條直。用力。略早。亦或左或右偏頑。腿骨而不得出。不知此等弊病。皆是時侯未到。妄自用力之故。奉勸世人。萬不可用力。然亦非全不用力。但當用力。只有。一盞茶時耳。其餘皆不可亂動者也。即如大便未到。其時縱用力。亦不能出。而况于人乎。或問何以知此。一盞茶時。而用力乎。曰。此時自是不同。若小兒果然逼到產門。則渾身骨骼。

疎鮮胸前陷下。腰腹重墜異常。大小便一齊俱急。目中金光爆濺。真其時矣。當于此時臨盆。用力一下。陣母子分張。何難之有。

或曰。小兒會鑽出之說到底。未敢全信。不知古人曾言及否。曰。古人立言不過撮其大要。安能事而悉言之。只要後人能體會耳。覩苗助長。蒂落四字。即知小兒自會鑽出。觀揠苗助長四字。即知將試痛認作正生之弊矣。夫哺雞

何云。胎物
之理。智焉
不察。化生
點出。齧腐
神奇。

日足。自能啄殼而出。豈有催生之神藥。穩婆之妙手乎。古人謂有。遲至三四年而後生者。此是不肯鑽出耳。既自不肯鑽出。誰能強之。自要鑽出。誰能禦之。

或曰。早一時斷乎不可動矣。不知遲了一時可不妨否。曰。不妨。若果當其時。必無不出之理。然或偶有不出者。則是小兒力盡不能得出。宜令上床安睡。使小兒在腹中亦安睡。歇力。

何云神解

何云見得
明辨得透
直是無堅
不破

少刻自然生矣

或曰倘或兒到產門而大人睡下豈不有礙曰
更好蓋小兒向下時而大人坐立則小兒倒
懸矣豈能久待今大人睡下兒亦睡下有何
妨碍又曰倘或悶壞奈何曰最妙從不聞婦人
私產而難產者或謂有神護佑非也總因胎
起于私怕人知覺只得極力忍疼疼到沒奈

何時自脫然而出其理甚明有何疑處
或曰不宜用力已聞教矣不知先慎用力已致
橫生倒產有法治之否曰急令安睡用大劑
加味芎歸湯服之將手足緩慢托入再睡一
夜自然生矣又曰托之不入奈何曰若肯睡
再無托不入之理若到此時仍不許他睡又
或動手動腳亂吃方藥吾未如之何矣
或問盤腸生是何緣故曰是用力之過蓋因產

母平日氣虛及到臨時。用力擎胎。渾身氣血
下注。以致腸隨兒下。下次如此。下次路熟。又
復如此。若能等待瓜熟蒂落之時。何得有此怪異。
或問有一痛便生。令人措手不及者。此又何也。
曰。此乃正理。何足爲異。蓋胎氣已足。母子兩
分。兒自要出。雖欲留之。而不可得。人人皆各
有此。一時只要忍耐得住。等待此一時耳。
或曰。穩婆不必用乎。曰。既有此輩。亦不能不用。

但要我用他。不可。他用我。全憑自家作主。不
可聽命于彼耳。大約此等人多愚蠢。不明道
理。一進門來。不問遲早。不問生熟。便令坐草
用力。一定說孩兒頭已在此。或令揀腰。揀肚。
或手入產門。探摸多致損傷。總以見他功勞
利祿。不忍言矣。按吳越之間謂之穩婆。江淮
間謂之收生婆。徽寧間謂之接生婆。按收接

二字之義。因其年老慣熟。令之接兒落地。疾兒上床耳。原非必要。他動手動脚也。每見富貴之家。預將穩婆留在家中。及到臨時。稍不快利。前門後戶。接到無數。紛々攘々。炒成一片。所謂天下本無事。庸人自擾之。

或問臨時有經驗之藥亦可用否。曰不用。從前奇方莫過萬腎兔腦丸。今時盛行。莫過回生丹。非謂其不效。而不用也。總用不着耳。既不

用力。又不動手。又有睡法。佐之。他自會生。何消用藥。縱有不順。睡爲上策。

或問服藥有益無損否。曰安得無損。單兜二丸。大耗氣而兼損血。回生丹大破血。而兼損氣。蓋單兜例用香竈之藥。產時百脉解散。氣血虧虛。眼此散氣藥。兒已出。而香未消。其損多矣。且令毛竅開張。招風入內。禍不可言。回生丹以大黃紅花爲君。其餘亦多消導之品。血

已耗而又大破之。多致產後發熱等病。遺患無窮。都只謂產後失調。誰復歸咎于藥。按此數方古今稱爲神靈奇寶者。尚然如此。其他可知。送藥者本是善念。但知其利。不知其害耳。

或問總無可用之藥乎。曰有。只須加味芎歸湯。佛手散二方用之。不盡矣。蓋胎時全要血足。血一足。如舟之得水。何患不行。惟恐產母血

少。又或胞漿早破以致乾澀耳。今二方皆大用芎歸。使宿血頓去。新血驟生。藥味易得。隨地皆有。且使身體壯健。產後無病。真正有益無損。此皆先賢洞明陰陽之理。製此神丹。以利濟天下後世。奈世人貴耳。賤目以為平常。而不用。必求奇怪之藥。而後用之。只要奇怪。不論損益。豈不可歎。

或問。依此言。世間總

產者耶。曰偶亦有之。

或因母太虛胎養不足。血氣不完。或母病傷寒之後。熱毒傷胎。又或夫婦同房太多。以致欲火傷胎。平日過食椒薑煎炒熟物。火毒傷胎。以及跌撲損傷。皆致難產。多令胎死腹中。除此之外。無難產者矣。

又有嚴寒天氣滴水成冰之時。貧家房中火氣微薄。以致血寒而凍。亦令不出。然此亦因臨盆早先去衣久坐之故耳。若令擁被安固。

待時而產。豈有此患。

凡生產艱難。或天寒孩兒生下不哭。或已死者。急用衣物包裹。再用香油紙撚。將臍帶慢火燒斷。緩氣入腹。漸生作聲而活。倘或先剪斷臍帶。則死矣。

或問臨產時飲食如何。曰此時心內憂疑。腹中疼痛。甚至精神疲倦。口中失味。全要好飲食。調理。但不宜過于肥膩。耳倘不能食。只將鷄

鴨湯肉湯之類吹去油澄清頻レタ飲之亦能壯助精神人以食爲命豈可一日闕乎

宜忌

臨產時宜老成安靜二三人伺候不必多一切親族婦女俱婉言謝却勿令入房夏月更不宜多人在房熱氣擁盛能令產母煩躁發暈其害非小

房中宜輕行輕語不宜多詰令其得睡爲妙

第一要勸其放心安靜忍痛歇息切忌在房中大驚小怪交頭接耳咨嗟歎息皆能令其憂疑擾亂以致悞事

房中宜安靜如常不得當面求神許願呴天呴地

穩婆只宜一人入房且令在傍靜坐勿得混鬧飲食宜頻少與或雞鴨肚肺等清湯更妙房中冬設火盆夏月多貯井水以收熱氣仍頻

換之。ウ

試痛

或問試痛何故曰兒到七八箇月手足五官全備已能動彈或母腹中有火或起居不時令人頭不寧以此大動而痛此等十胎而五不足爲竒只宜照常穩食安眠一二日自然安靜或痛之不止用安胎藥一二服自止此後近數日遠則月餘甚至再過三四月纔產人多

何云觀此
令人悚然
踏此繫著
方自知之

不知軒易臨盆終日坐立不令睡倒或抱腰擦肚或用手拖或用藥打生々將兒取出母則九死一生兒則十胎九殊慘不可言世間難產皆此故也蓋胎養不足氣血不全如剖卽出籬裂繭出蛹寧可活乎只說小兒難養誰復根究到此又有受寒及傷食腹痛不可不知或問何以知其試痛曰只看痛法一陣緊一陣者正生也一陣慢一陣或乍緊乍慢皆試痛也

或問傷食受寒。何以辨之。曰傷食者當臍而痛。
手按之更痛。或臍傍有一硬。寒痛多在臍下。
綿之而痛不增。不減。得熱物而稍緩是也。
或曰試痛亦有。或未必多。曰甚多。曰何以見之。
曰以今之難產者多也。

或問將試痛認作正生。其害如此。倘將正生認
作試痛。以致過時。不亦有害乎。曰無害。果當。
其時小兒自會鑽出。縱或過時。不過落在褲。

中生。在。床上而已。有何大害。而如此諄々乎。

驗案

前太僕卿霍山張公。三君葆華繼夫人。年輕體
壯。孕必八箇月而產。產必數日百苦。而下生。
女必遭殃。再孕再產。再殃。皆同予謂後當生。
宜相聞。明年又八箇月坐草。三日不下。忽憶
予言。飛輿相呴。中途逢驅車者。云迎其父母。
作永訣計。比至已夜分矣。診之脉未離經。人

餘殘喘。穩婆在傍。問之。曰兒頭已抵產門。而不得出耳。予急令安臥。且戒勿擾。與安胎藥。明晨主人出。笑而不言。問之。曰好了。予曰。昨言兒頭已抵產門。今若何。曰不見了。大笑而別。後此百二十日。計十二足月。生男。謂余爲父。今八歲矣。始知前此皆生女。取出以體壯。年輕。俾保母命耳。

在張宅。日邑庠程以學。邀至其家。有寵人坐草

二十日而不生。亦與安胎藥。越十六日。生女。大學戴謙。時濟與予比隣。契好。先是。今弟媳一產。二男。因子俱墮。一猶在腹。今又婢孕。其腹脛脝頗患之。比產。先令安臥。與加味芎歸湯。每隔半日而產。積日半。三子俱生。康熙四十八年。安撫葉公具。

題。陳氏妻。生九日。夜不下。一息尚存。余有兒腦丸。踵門求藥。余問之。亦曰。頭逼產門。不

得出。諭令安卧。再來取藥。強而後去。繼與加味芎歸湯。明日生下。母子兩全。按此皆產母用力。逼令橫在腹中耳。豈有人倒懸十日而尚得生者乎。

昔一婦產兒。手出不得入。穩婆礪刃以須。予見而惻然急令安臥。與大劑芎歸湯徐々托之。手入。明早生下。母子皆安。右臂紫黑。數日而後消。

達生編 下

保胎

保胎以絕慾爲第一義。其次亦宜節慾。蓋慾寡則心清。胎氣寧謐。不特胎安且易生。易育少病而多壽。

保胎又宜小勞爲妙。試看鄉間農婦。僕婢下人。墮胎甚少。以勞故也。蓋勞則氣血流通。筋骨堅固。胎在腹中。習以爲常。以後雖有些微悶

挫。不至壞事。倘安逸不動。則筋骨柔脆。氣血不行。略有閃挫。隨墮落。然非胎後方勞。正謂平日不宜安逸耳。若平日安逸。及孕後方勞。遠足損胎。何筋骨堅強之有耶。夫敬姜百乘之家也。老而猶績。尋常富貴。半少力強。正宜勤事。豈可暇逸以自病乎。

孕已知覺。即宜用布一幅。六七寸闊。長視人肥瘦。約纏兩道。橫束腰間。直至臨盆之時。纔解。

去。若是試疼。仍不宜解。此有二妙。胎未長成。得此。則腰脊有力。些須閃挫。不致動胎。其一。常令腹中窄狹。及到解開。則腹中乍寬。轉身容易。此法吾鄉頗有知者。特爲廣之。

有孕後。睡時須要兩邊換睡。不可儘在一邊。要使小兒左右便利。手足慣熟。則產時中道而出。不難矣。

飲食

保胎藥餌。諸書皆載。不祕再陳。但飲食一道。殊未之及。茲略言之。飲食且淡泊。不宜肥濃。宜輕清。不宜重濁。宜甘平。不宜辛熱。青蔬白飯。亦能養人。即在貧家。頗為不乏。但富貴之人。平日肥甘厭足。抑令崇儉。勢所不堪。酌乎其中。臚列如左。

宜食諸物。 猪肚多用 肺 雞 鵝 鯽魚
淡鱉 海參 白菜 菠菜
海帶 鮑魚 麻油

薑皮二味多用 蓮子 紫草
諸味總宜潔治。多用清湯。吹去浮油。飲之最佳。俱宜白煮。忌用油煎。此多爲膏梁之人言之。耳。若藜藿之腹。正宜得此。甘而潤之。何淡泊之有。組六七箇。月後。膏皮麻油二物。最宜多用。不妨。日日食之。麻油解毒。腐皮滑胎。且清且補。貧富皆宜。凡爲上品。積食一二百張。則首生如達矣。或以麻

油拌食更妙。

但麻油不宜煥熟。

忌食諸物

椒

薑

燕臘

野味

異味

豬肝

犬

驢

驃

馬

自死肉

豬血

蠍

腳魚

蝦蟆

鱠魚

勿多飲酒

勿亂服藥

又孕姪禁忌

一切宰殺凶惡之事不宜看

修造興工動土不可看

龜

兜俱不可見

○小產

小產者謂胎已墮下之後一切調理並如產後法

便產須知云小產不可輕視其將養須過于正產十倍可也

薛立齋先生云小產重于大產蓋大產如栗熟自脫小產如生採破其皮殼斷其根蒂也但人往往輕忽死者多矣

小產後數日忽然渾身大熱面紅眼赤口大渴

飲飲涼水晝夜不息此血虛之症宜用當歸
補血湯以補其血若認作傷寒而用石膏芩
連等寒涼之藥則必死矣方見後

○產後

產後調理諸書論之詳矣茲不復贅但取十二
吃緊及所未言者存之以備採擇。
產後上床宜高枕靠墊勿令睡下膝宜陞起勿
伸直隨飲熟童便一盞只宜閉目靜養勿令

熟睡恐倦極熟睡血氣上壅因而眩暉然不宜高聲急叫以致驚恐

四壁宜遮風不問有痛無痛俱用熟童便和熟
酒各半每次一杯一日三五次三日而止酒亦
不宜多若無大病只是如此不必服藥
產後宜用鉄秤錘或溪中白石子燒紅入醋令
醋氣入鼻以免血暉且收斂神氣又能解穢
每日三四次亦三日止

或有惡血衝心。血暈昏悶。不省人事者。用韭菜
一把。切碎。放有嘴壺瓶內。以熱醋一大碗灌
入。密札口。扶起病人。以壺嘴向鼻遠。熏之。
生男。生女。夫命所招。蓋百世禋祀。以夫家爲主。
與婦人何干。倘或連胎生女。此亦人事之常。
不可在傍咨嗟歎息。令其氣苦。曾見不明公
姑。愚蠢夫婿。將婦報怨。每以致病傷生。可笑
可恨。凡此只宜寬慰爲主。又有將女溺死者。

忍心害理。後嗣不昌。
產後各處風俗不同。或用紅砂糖。或用山楂。或
用吳茱萸。或用胡椒煎水飲之。總莫妙于熟
酒對童便。或腹痛之甚。用生化湯一服。無不
愈者。

產後飲食。各處不同。徽俗纔上床。即與肥雞乾
飯。吳俗率與羹粥。甚至有彌月而後茹葷者。
皆不通。可笑。蓋徽俗終年食粥。產後胃弱。驟

與雞飯殊不相宜。然其患猶小。吳中終年食飯。至產後。腸胃空虛。正宜滋味調養。以生氣血。轉令食蠶食粥。習俗移人牢不可破。說亦不信。予意必有以此傷生者。習焉而不察耳。及至虛弱。發熱咳嗽。此太虛也。血脫益氣。宜大劑參芪驟補。猶可挽回。却又謂之產勞。且與滋陰降火。以至于死而不悟。良可歎也。或問必如何調理。而後可。曰。粥時吃粥。飯時吃飯。三日內只用雞湯吹油。澄清飲之。未可食雞。十日內不可食猪肉。一月內不可食猪油。以其壅塞經絡。令血氣不通耳。其餘有何忌乎。

雞子有去瘀生新之能。食之甚宜。但要煮極透。不妨從朝至暮食之。有益。若糖心雞蛋。乃是生物。凝滯損人。斷不可吃。鴨子不可食。或問食物必要去油。取其清耶。白然。不但要清。

且更要淡。蓋清淡之味。本乎天。能生精神。濁則否矣。

或曰。何以驗之。曰。產婦宜飲淡酒。宜食淡味。若飲醇酒。食醤味。皆令燒乾無乳。此清濁之驗也。但不得如吳俗。令食虀粥。矯枉過直耳。

○胎死腹中

死胎只宜佛手散。服之自下。或不下。再用平胃散一服。加朴硝二三錢。能令化下極易耳。古

人立法各有精義。且經屢驗。不吾欺也。勿用奇方怪藥。以傷母命。

或問何以知其胎死。曰。面赤舌青。母活子死。面青舌赤。子活母亡。面舌俱青。子母俱死。况死胎墜脹。疼痛亦與常產不同。

○胞衣不下

或問胞衣不下。何故。曰。總是臨盆早。之故。當產之時。骨節開張。壯者數日。而令怯者彌月方

合今不待其開而強出之。故胎出而骨眼隨閉以致胞出不及耳。

又曰聞此乃極惡之症。可以損命有諸。曰不妨。不必服藥亦不必驚慌。若胞衣不出。急用粗麻線將臍帶繫住。又將臍帶雙折。再繫一道以微物墜住。再將臍帶剪斷過三五日。自痿縮乾小。而下累用有驗。只要與產母說知。放心不必驚恐。不可聽穎婆妄用手取。多有因

此而傷生者。慎之。

○乳少

乳少者。血虛之故。如產母去血過多。又或產前有病。以及貧儉之家。僕婢下人。產後失于調養。血脉枯槁。或年至四十。血氣漸衰。皆能無乳。但服通脈湯。自有乳。若亂用川山甲。王不留行等物。往往不效。即或勉強打通。乳汁清薄。令兒不壽。且損傷氣血。產後多病。不久便

乾反爲不善。

○格言

太全方曰。婦人懷孕有七八箇月生者。有一年二年乃至四年而後生者。不可不知。楊子建十產論。可謂詳悉之極。予之所論多本于此。但惜稍冗忽卒視之。安能得其要乎。謹錄傷胎一篇。亦足以盡之矣。

今有未產一月以前。忽然臍腹疼痛。有如欲

產。仍却無事。是名試月。非正產也。但未有正產之候。切不可令人抱腰。產母亦不可妄亂用力。蓋兒身未順。收生之婦。却教產母虛亂用力。兒身纏方轉動。却被產母用力一逼。使兒錯路。或橫或倒。不能正生。皆緣產母用力未當之所致。凡產母用力須待兒子順身臨逼。門戶方始用力。一送令兒下生。此方是產母之用力當也。若未有正產之候。而用力傷。

早并妄服藥餌令兒下生譬如揠苗助長無益而有害矣此名傷產

薛院使云欲產之時覺腹內轉動即當正身仰睡待兒轉身向下時々作痛試捏產母手中指節或本節跳動方與臨盆即產矣

太旨云大凡生產自有時候未見時候切不可

強服催生藥

又云切不可坐早及令穩婆亂動手

朱丹溪先生云催生只用佛手散最穩當又效捷又云產後以大補氣血爲主雖有他症以末治之

○方藥

加味芎歸湯

百試百驗萬叫萬靈真方也

當歸一川芎七錢龜板斟大研末婦人頭髮繩
蛋大瓦上水二碗煎一碗服如人行五里即
生死胎亦下

薛云。交骨不開者。轉氣讎也。用此方。如神。
又云上舍某之妻。產門不開。兩日未生。服
此方一劑。即時而產。上舍傳此方。用之者
無不驗。

佛手散 治六七箇月後。因事跌磕傷胎。或子
死腹中。疼痛不已。口噤。昏悶。或心腹飽滿。血
上衝心者。服之。生胎即安。死胎即下。又治橫
倒產。及產後腹疼。發熱頭疼。逐敗血。生新血。

能除諸疾

當歸錢

五

川芎錢

水七分酒三分同煎七

分

如橫生倒產。子死腹中者。加黑馬料豆一合。
炒焦熟。乘熱淬入水中。加童便一多半。煎服。少
刻再服。

平胃散

蒼朮

甘草

厚朴

陳皮

甘草

各

右水煎成湯去滓內苦硝桂錢更上微火同沸頓服日下
生化湯 治產後尾枕痛及惡露不行。腹疼等
症。

當歸錢 川芎四錢 乾薑分炒五桃仁五分不
甘艸五分 水一鍾童便一鍾煎服。焰已惡
行腹痛已止。咸去桃仁再多
服數服可不

安胎方

黃芪蜜杜仲姜汁炒芍藥各一黃芩一錢白朮生用
五分

阿膠珠一錢 甘艸三錢續斷八胸中脹滿加紫蘇
陳皮各八分紅加艾葉地榆錢一阿膠加
引用糯米百粒酒二杯水二杯煎 腹痛用
急火煎

安胎銀苧酒 治孕姪胎動欲墮。腹痛不可忍。
及胎漏下血。

苧根二錢銀釗酒一碗 根無醇加水煎服
紫酒 治孕娠腰痛如折

黑料豆

二合炒
焦熟

白酒

半碗

煎至七分空心服

當歸補血湯

大補陰血退

血虛發熱

如神

黃芪

一兩
蜜
當歸
錢小

一碗煎

一碗

一眼立愈

酚

加減

華陀愈風散

治婦人產後中風

口噤手足抽

掣及角弓反張或產後血暈不省人事四肢

強直或心頭倒築吐瀉欲死

荆芥穗

除梗
嫩
乾

研末

每服三錢

童便調服

口噤

則挑牙灌之斷喙則不研未只將荆芥以童便煎放微溫灌入鼻中其效如神

通脈湯

治乳少或無乳

黃芪

一兩
當歸
鉢

白芷

七孔

豬蹄

一對煮湯

吹去浮油

煎藥

一太碗

服之

覆面睡

即有乳

或未效再

一服

無不通矣

新產無乳者不用猪蹄只用水十半酒一
半煎服體壯者加好紅花三五分以消惡

遠生

露

浪速

訂

安永三年甲午仲夏穀旦

心齊橋筋南久太郎町

浪華書肆 柳原喜兵衛藏版



