

KODAK Color Control Patches © The Tiffen Company, 2000

KODAK LICENSED PRODUCT

Black

3/Color

White

Magenta

Red

Yellow

Green

Cyan

Blue

A

1

2

3

4

5

6

M

8

9

10

11

12

B

13

14

15

17

18

19

仙治見全集

洋学文庫
文庫 8
B 25
4



嘔吐篇十八

咳嗽篇十九

哮喘篇二十

黃疸篇廿一

間歇熱篇廿二

小兒嘔吐篇第十八

○嘔吐輕クシテ茶劑ヲ用ルニ及ハザル
モノアリ或ハ嘔吐シテ却テ利益アル者アリ
斯ノ如キハ既ニ嘔吐スレハ其腹痛忽チ
止ムナリ

○嘔吐久ク止ス且ツ頻リニレバク来リ
或ハコレガ列クシテ速ニ茶劑ヲ用イザルハ
治スヘカニ顯然タル疾病トスル者アリ

○食物或ハ乳汁ヲ嘔吐スルニ因テ発スル諸
症并ニ其嘔吐ニ由テ日常新乳糜



ヨリ発ス

ヲ以テ血ヲ滋潤栄養スルヲ能ハスレテ
血ガ大ニ酷厲ニナル。諸症モ亦此ノ篇
ニ説ク。一無し。○血ノ酷厲ヨリ発スル諸
症ハ小兒ノ病患心ヨリ生ズルハナシ。此
ハ譬言ハ痘瘡麻疹ノ初日、昼夜嘔吐止ス
レバク、衄血吐血ヲ発スルヲアルカ如シ。
○予斯ニ唯小兒ノ患心ル嘔吐ヲ統會シ其
病毒ノ所在ト病因トヲ人カチ又其種類
ヲ詳ニ弁哲ス

○第一種

此症ハ虚弱小兒乳養度ニ過キ乳汁
田日中ニ滯積スルヨリ生ス

註 此病因ニテ発スル嘔吐ヨリ常ニ多年ハナシ

其罪多クハ乳母ニ在リ其故ハ大氏フタ日常
小兒啼叫スル毎ゴト乳頭ヲ含ニシム此ニ
由テ
小兒止マラ得ス其小
ナル田日ニ充満シ其刺余ノ乳汁ヲ吐スル
ナリ或ハ小兒乳汁ヲ過飲シテ後衣服衾
蓐ヲ以テキヒシ緊ク縛結シ或ハ懷抱シテ亦
敲振揺スルニ由テ亦此症ヲ発スル故ニ

強テ

テ身体
ヲ壓迫
シ

此種類ノ症ニ於テハ如此諸件ニ意ヲ用
テ其病因ヲ除去ルハ速ニ快復スル
ナリ

其症小児啼叫シ煩悶シテ安靜ナラス
安眠スルヲ能ハス○其乳汁ヲ多少吐スル
ハ自ラ眠リテ穏靜ナリ

○年長セル小児ハ急ニ食シ或ハ多ク飲
ムハ胃痛ヲ発シ此ニ就テ嘔吐シテ自ラ
治スルモ亦此種類ニ屬ス

○右ノ兩件ノ症ニ於テハ嘔吐ヲ以テ病ト

シ又治法トスルナリ

○右ノ症十分嘔吐ヲ発セサル者ハ鳥羽ヲ
油ニ浸シテ咽喉ヲ探リ十分吐セシムル

○第二種

此症ハ冷氣ヲ受ルニ因ル凡ソ薄弱ノ小児
衣服襁褓ヲ更ルニ由リ其他冷氣ニ感
スルノ甚ニ由テ胃冷レハ忽チ嘔逆ヲ發
ス此ニ於テ乳母嘔逆ヲ止ニガ爲ニ小児ニ乳
ヲ與レハ速ニ吐スルナリ○此症ハ温煖ナル
襁褓ヲ厚シハ治スルナリ

○、第三種

此病ハ炭火ノ氣ニ中リテ發スコレハ火爐ノ類ニ倚テ炭火ノ蒸氣ニ中レハ薰蒸シテ血氣衝逆レ吐ヲ發スルナリ此病ハ速ニ其炭火ヲ去リ其室中ニ醋少許ヲ火ニ滴レテ蒸散スレハ治スルナリ○如此古又ハ細密ニ乳母ニ息ヲ用イサレハ動スレハ小兒ノ命ヲ失フナリ

○、第四種

此病ハ半生未熟ノ惡液胃中ニ在ルヨリ

發スコレハ

見日常過食シ或ハ硬靱ニシテ消化シ難

キ食物ヲ用テ己ガ胃中ニ消化スルヲ能

ハサレハ不熟ノ惡液漸ク胃中ニ聚

リコレガ損害ヲ為シ終ニ吐ヲ發スルナリ

(註) メダキユス名ノ書ニ曰ク消化シ難キ

物ハ小兒ノ搐搦ヲ發スル魁首ナル病因

ナリ但シ此ニ因テ搐搦ヲ發スルナリ勿

論ナレト小兒ハ大人ニ比スレハ何

ヲ以テカ搐搦ヲ發スルヤ

答テ

○過多ナルニ
因リ或ハ酷
厲ナリ因テ

オリ起ル

曰小兒ハ大人ニ比スレハ神經脆弱ニシテ感
 微觸動スルト甚レケレハナリ譬言ハ乳母
 念怒スルハ小兒ニ乳ヲ与レハ小兒ハ念
 ナチ搐搦ヲ発スレト乳母ハ却テ搐搦
 ヲ発セザルガト如シ又小兒酸敗液
 アレハコレニ因テ搐搦ヲ発ス然レト大人
 ニ酸敗液アレハ唯胃痛ヲ発スルノミ
 ニテ搐搦ヲ發セザルカ如シ
 ○予小兒欬嗽篇ニ於テ詳ニ此症ヲ論
 スコレ胃ヨ。嘔吐ト欬嗽ハ各々一其症候

アルヲ以テ知ルベク治法モ亦此ニ從蹟テ治
 スベキカ故ナリ則チ欬嗽篇ニ於テ其症
 候ヲ述フ宜ク此ヲ參考シテ未熟ノ西液
 胃中ニ在ルヨリ發スル嘔吐タルカヲヨク察
 スヘシ肝要ナリ
 ○粒食セス唯乳養ノミ小兒ハ通例
 酸敗液ヨリ嘔吐ヲ發スルナリ或ハ牛乳ヲ
 調製セル食物ヲ用^或新製ノ麦酒并ニ
 時々酒ヲ飲ミ或ハ果瓜ノ類、覆盆子類
 櫻實其他如此類ヲ食ヒ或ハ醋、佛手柑

ヲ食物ニ和シ食フ小兒モ亦同ク酸敗液ヲ生ス

○酸敗液アル候ハ其呼吸酸臭アリ或ハ酸臭アルモノヲ吐シ或ハ大便酸臭アリテ黯澹色ヲ見ハシ此ガ虚弱ノ見ハ綠色トナリ或ハ凝結セル乳汁ヲ交テ通ス

○虚弱ノ小兒ハ右ノ症ニ蠣殼ノ散劑ヲ用イ或ハ予ガ小兒散ヲ用テ治スコノ方ハアツセスルダレリウス人ノ局方ニ記ス其方左

ノ如シ

マダ子シアアルバ 見于腹痛 四朶

コメイ子 代苗香 三朶

泥菖根 リスウルト 二朶

洎夫藍 半朶

右^各研磨シテ細末ト為シ調合ス

右ノ散劑ヲ小刀尖ニ一抄ツ苗香水ニテ毎日五六度ツ酸敗液消シ病治スルマデ用ユヘシ

○年長セル見モ右ノ散劑ヲ用ユ然モ大

見

黄ア、カ、キ、セ浸割ノ冰糖ヲ加ハガル者ヲ兼用シ或
ハ大黃ノ浸湯割ヲ兼用スハ其方左ノ
如シ

大黃 細割 半匙

コソセニール 搗碎或云 蘇木代用 二碎

右磁器ニ内レ沸湯三小碗 二小碗大ヲ注キ 約五勺

热灰上ニ置ク一夜ニシテ瀝過シ此ニ桂

皮水一匙 四ヲ加ハ此ヲ初ニ二小碗用イ

半時過テ其余ヲ服セシム

○小兒或ハ大人ノ酸敗液ヲ消除スルニハ

酒石塩ヨリ良驗アルハ無シ此ハ酒石塩

四匙ヲ涌泉九十六匙ニ溶化シ服セシム

其服量ハ譬バ二歳ノ兒ハ每服一茶

匙 一日ニ二回或ハ三回用ユ大人ハ一食匙

四ヲ△日ニ二三回用ユ

○小兒ノ胃虚弱ナルニ食物飲液ヲ受

容レ消化シ難キヨリ生スル所ノ酷厲

液ニ亦腐敗ノ性ナル者アリ此ハ小兒ノ常

厚脂肉類ヲ多ク食フモノニ在リ其候

ハ小兒口中ニ雜卵ノ腐敗セル如キ臭アリ其

○ヲ一酒盃
ノ水ニテ
△ニ麦酒盃
ノ水ニテ

Limonade.

吐スル物モ亦然リ此酸腐毒ヲ消除スル
ニ枸橼漿(名) 糖 少許ヲ与ヘ或ハ
酒石ト佛柑錠新局 散劑良効アリ
其方左ノ如シ

純糖酒石 六碎
佛柑柑錠 二十碎

右為細末

右散劑小兒ハ毎日二三回ヨリ四回マテ少
許ノ水ニテ其呼吸ノ惡臭去ルマテ用エ

○未熟ノ惡液前説 洗敗スルヲ常ニ多クシ此モ

ranb.
○レテ洗茶
ノ液ヲ吐

○ヲ加(用)

○結膠

○物ヲ与ルハ

亦粘脂多キ食物或ハ如此ク炙餅烘糕ノ
類、麦餅ニ牛酪ヲ加、或ハ牛乳肉類ヲ
多ク食フ者ニ在リ如此者ハ甘酪母ニ匙
ニ砂糖少許。或ハ前説ノ淨酒石塩ト佛
楸錠ノ散劑ヲ用ヰシ而後ニ
大黃膏ヲ用エシ然ラサレバ爾後膽液
質ノ下利腐敗ノ膽液 ヲ免スレハナリ
○未熟ノ惡液唯粘稠液田中ニ取リ
粘膠ノ液ヲ吐ス症リ此ハ小兒殊ニ稀キ乳將水或ハ
穀粉糊或ハ廉惡ナル 麦餅ニテ製スル食

ヲ製
与

胃硬滿痞脹ニテ此症ヲ發ス。吐劑ヲ用

イテ吐セシメ而後大黃瀉劑ヲ用ルヘシム

○食物消化セス其後吐スル症アリ此ハ小兒

食物ヲ嚼スニ嚥下シ或ハ食物甚ク硬ク

或ハ胃甚ク弱キニ因テ然ルナリ此症ハ既ニ

吐シテ後健胃ノ劑ヲ用ユヘシ此ハ予ガ

アリキシルヒスセラレノ名劑ヲ毎日十五滴ヨリ二

十滴マテ稀薄ナル桂皮水ニテ用ユヘシ

(註) エリキシルヒスセラレノ方

橙皮黃 四錢

大黃 十六錢

テルラホリアタラルタリ新局 八錢

拂郎私白蒲桃酒 五十六錢

右調和シ微火或ハ大陽氣ヲ以テ徐

々ニヨク浸出シ濾過シテ後系ヲ加

ハ溶解ス

新劑 四錢

菊蒿花露滴油

甘老日草露滴油 各十滴

右調勻ス

○全身

○右説ク所ノ未熟ノ悪液ヨリ生スル諸種
ハ嘔吐スルヲ良トス必スコレヲ障止スルヲナク
却テ温湯ヲ与ヘ或ハ甚キモノハ吐劑ヲ
与ヘテコレヲ進メ起スヘシコレ其田日ヲヨク
清除センガ為ナリ然ラサレハ其毒自ラ
血中ニ泛濫シテ一箇ノ熱ヲ發シ或ハ此
ガ腸中ニ留結スレハ一箇ノ困難ナル下
痢ヲ發ス。吐劑ニテ救ハザレハ多クハ
止ムトナキナリ

註

此症ニ輕キ下劑并ニ浣腸法ヲ施シ

○故ニ此ヲ

テ汚物悪液ヲ導キ泄スレハ此ヲ
自ラ治スルト毎^{ツ子}常^ニ女^ニナカラ
ス其汚物ヲ導キ泄シテ後ハ強壯ニスル
劑ヲ用イテ田日及ヒ腸ノ精カヲ故ニ
復スヘシ然レモ強壯劑ヲ用ル際モ大
便ヨク通スルヤウニ意ヲ用ルト特ニ
肝要ナリ

○又強壯ニスル藥劑ヲ外用シテ極メテ良
効アリ此ハ玫瑰花、桂皮、丁香其他
如此類ヲ酒ニ浸シテヨクサネ氣ヲ出

It bekende middel van riperis.

レコレヲ綿布ニ浸シテ胃ノ部或ハ心
窩ニ貼スル^{ナリ}甚々良効アリ○或ハ
餅ヲヨク焙リテ峻烈ナル酒ヲ湿シ此
ニ香料ノ茶末^{桂丁子}ヲ^カ擦^カ胃ノ部
ニ貼シテ亦良○小兒ハ大人ニ比スレハ總
身皮膚層ノ汗孔^{常ニ}大ニ用クナリ則チ外用
劑ノ尤モ効アルヲ以テコレヲ知ルヘシ
○諸茶劑ヲ用イテ汚物ヲ泄除シ而
後強壯劑ヲ用イテ胃ト腸ノ精力ヲ挽
回ス而後ニ嘔吐尚休^ヤサルモ^モ本末ノ

止吐ノ効アル劑ヲ用イテ其吐ヲ休ムヘシ
此ハ薄荷水ニ薄荷精少許ヲ加用
ユヘシ或ハ世ニ稱用スルリヘリウス^人ノ劑モ
良効アリ^運
○右ノ茶劑ヲ用テ其吐尚休サル者ハ
諸症ヲヨク察シ審ニ戒慎ヲ加テ麻
茶ヲ用ユヘシ此ハ小兒年行ノ多ク少クテ
量^{ハカリ}テ鎮痛^酸^{ラウタヌム}^{リグイキユム}^{ベインス}^{ケル}^{レシ}テ
^{アフテ}^{レキ}^{セル}也^也見^エ
數滴ヲ用ユヘシ其故ハモシク休サレハ
其見大ニ虚脱シテ搐搦ヲ發スルヲ恐

レテハナリ

○、第五種

小兒ノ食物

錫ヲ塗テ又銅

鑑ニテ烹煮シ冷テ後用ルハ其銅青

漆浸スルヲ以テ吐ヲ殺ス○或ハ乳將水

或ハ麦酒清下利篇第五種ノ註出ヲ小兒ニ夜中子ニ

ト欲シテ銅或ハ假鍮ノ鑑ニ貯ヘ置トキ

其銅氣漆浸シテ酸味トナル小兒如此食

物ヲ食ハ忽チ病ヲ殺ス予如此小兒ヲ

見ル忽チ煩悶ヲ發シ初メニ診スルハ

コレアリ
其志

全ク救フベカラズト思ヘリ此ニ於テ予速ニ指

ヲ小兒ノ咽喉ニ入レテ探リ吐セシメ而後甘

乳汁ト油ヲ嚙シメ遂ニ救フヲ得タリ

○予又右類ノ吐ヲ見タリ此ハ炙リ炙肉

類ヲ暫ク銀ノ鉢ニ置キ此ヲ食フテ其

毒ニ中リ吐ヲ殺セリ譬言ハ炙鶏肉等ヲ

温メテ銀ノ鉢ニ置ク其鉢ニ觸ル自ラ

綠色ヲ見ハスコレ其銀ニ含ム所ノ銅氣

炙肉ノ塩氣浸透シテ出ナリコレ銅

毒ト全ク同シ然レハ銀モ亦毒アル

コレ、處

○ニ塗リ名
牛酪ノ

知ルヘシ ○或ハス。ピーゲル。エイエレン

雞卵製ノ料理食物ノ名

ヲ錫鉢ニ一夜置テ食スルハ亦吐ヲ発ス
此ハ雞子白ガ錫ニ浸染スルハ黑色ノ点ヲ
生スルニテ知ルヘシ

○右ノ夏件ニテ小兒速ニ嘔吐ヲ発スレバ
尤モ幸トス然レモ吐セザル者ハ手指
或ハ鳥羽ヲ油ニ浸シ咽ヲ探リテ速ニ吐
セシムヘシ或ハ稠キ扁桃乳ニ油ヲ多ク
加ヘ或ハ雞子黃或ハアラビヤゴムヲ水ニ溶
シタル粘汁ヲ速ニ用ユヘシ或ハ温湯ニ牛

酪ヲ加ヘ或ハ甘酪母或ハ甘牛乳ト油

ヲ加ヘ或ハ粘滑丸羹汁ノ類ヲ速カニ

勉強シテ小兒ノ口ニ注入スヘシ ○右ノ劑

ニ依テ其毒ノ侵刺衝動シテ損害ヲ

發スル銳鋒ヲ鈍挫シ弛弱セルムナリ

○此症ハ總テ嘔吐ヲ遏止スル劑ハ必ス

害アリ絶テ用ユヘカラス

○第六種

此症ハ痘瘡麻疹ノ初日ニ起スル嘔吐
リ此ハ痘瘡篇第一限治法中嘔吐ノ

喜早ニ既ニ詳説ス此ニ從テ治スヘシ

○千七百六十年 ストツクホルム 地ニテ麻疹
流行ノ時 嘔吐ヲ以テ最モ險重ノ一症トス
此時予亦一貴權ノ小兒ノ麻疹ヲ療ス此
患兒 嘔吐甚タ烈クシテ 遂ニ咽喉ヨリ血
ヲ吐スルニ至ル此ニ於テ

燕麦ノ粗碎ヲ煮テ温ナルヲ捏コトテ
一枚ノ薄片トシ一枚ニ薄荷ヲ敷排シキナラハ一
枚ヲ其上ニ蓋カホヒ綿布ニ包ミ温ニシテ患
兒ノ胃ノ部ニ布貼シテ此症速ニ治ス

○第七種

此症ハ疥癬瘡瘍ヲ愈シ内伏セシムル
ヨリ發ス故ニ其瘡ヲ復タ發セシムレハ
治ス此症ヲ搗搦并ニ欬嗽篇詳記ス併考
スヘシ

○第八種

此症ハ虫以ヨリ發スコレ小兒ニ多クアル症ナリ
コレハ虫以病篇ニ詳説ス

○第九種

此症ハ小兒ノ哮喘、田日欬ヨリ發ス此ハ

口治法ハ

吐スルヲ良トス此亦詳ニ欬嗽篇哮喘
篇ニ見一タリ

○第十種

此症ハ最モ危篤ニシテ患苦ノ甚キ嘔吐
ナリ此ハ小兒緊急タル地腫アリ或ハ種々
ノ起因ニ由テ腸閉塞シ或ハ侵刺スル起
因アリテ腸ノ各所牽縮シ腸ノ通孔十
キニ因テ発ス此ニ由テ腸ノ蠕動機轉
平常ノ如ク下行セズシテ上部へ轉輸シ
總テ腸胃ニ有ル物ヲ吐泄ス故ニ飲食モ

○并ニ

甘菜創モ容レ持ツテ能ハサルナリ此ヨリ
一箇ノ堪忍スベカラザル疼痛ヲ兼ルカ故
ニ又速ニ発熱熾衝ヲ発シ己カ速ニ
寒壞疽トナリ終ニ死ス

○右所説ノ症ナルユエニ速ニ救治スルヲ
肝要トス若シ遲怠シテ熾衝ヲ兼発
スルニ至レハ殆ント治スヘカラズ○病患心自ラ
增長シ患者甘菜創ヲモ容ルテ能ハサレハ
イヨク治シ難シトス

○此病弛腫ヨリ発スル者ハ最モ速ニ治療

ヲ施スヘシ 弛腫ニモ種類多クシト雖モ
何レモ皆其突出セルヲ内部へ收メ容ル
ヘシ此ハ或ハ腸或ハ網膜或ハ腸ト網膜ト
一齊ニ突出スル者アリ

註 初生ノ見胤籠弛腫ヲ患ヒ其起
因ヲ詳ニ説ク一カムベル人并ニヒユシテル
人ノ書ニ見一齊又自然究理医術ノ
ビブリヲテキ 繕卷之二第ニ篇二百八十二
葉ニ出ツ此症ハ小兒常ニ甚ク啼呼シ
特ニ彌縋ヲ施シテ腹部ヲ壓迫シ

此ニ由テ腹起張スル一能ハス 啼呼ハ腹起張スルヲ常トス

其腸止フヲ得ス 鞘膜ノ孔ヨリ壓出

セラレテ 弛腫トナルコノ鞘膜ノ孔ハ小兒ハ

甚ク弛弱ナルコトニ腸ヨリ突出シ

易ケレハナリ

○小兒ノ弛腫ヲ診察スルガ爲ニ招カル

トハ先ツ其見ノ両陰囊ニ臍丸ア

ルヤ無キヤヲヨク按シテ探リ知ルヘシ其故

ハ幾多ノ小兒動モスレハ生レテ時日ヲ経

テ後臍丸腹内ヨリ胤籠ニ入リテ一箇ノ

○出ル者アリ此時ニシカ

○其畢丸ヲ

崩籠腫ヲ発スル者アレバナリコレ亦一箇ノ
 池腫ナリ此ニ由テ如此腫ヲ発スル者ハ指
 頭ヲ以テ按テ腹筋ノ輪孔ヨリ放脱
 シ陰囊内ニ復宍スヘシ此ハ小兒ヲ啼
 叫セシムレハ特ニ此手術ヲ為シ易ク
 其故ハ啼呼スレハ腹筋自ラ牽縮ス
 此ニ於テ畢丸ヲ押テナク唯兩指ヲ以
 テ徐々ニ下ヘ牽引シテ陰囊復シ
 宍レナリ○右ノ法ニ依テフレット名
 此症ヲ治セリ○尚又歴驗スルニ偶

○スレハ

畢丸ニツアル者アリコレツト名曰ク
 崩籠腫アル方ハ其ノ在リ所ノ畢丸
 一方ノ畢丸比。特ニ小ナル者ハコレ必ス
 其小ナル方ノ畢丸ニツアリテ一ツハ崩籠
 腫トナルナリ○右説ク所ノ諸件ニ由テ此
 崩籠腫ニハトテ方ハ其ノ在リ所ノ畢丸
 ルヲ領會セハ尚又此ヲ經驗シテ其
 他ノ諸徴候ヲ發明
 一 習熟シテコレヲ弁別スヘシ
 ○此突出セル池腫ヲ收メ宍ルニコレヲ一

Extractum thabacum

脊ニ尽ク容ル^ド勿レ唯徐々ニ少シク按
 容且ツ先ツ本ノ處ヨリ容テ後ニ末ノ所
 ヲ容ヘシ又其突腫ヲ按セハ收メ容リ
 易キヤウニ患^ド者ノ身体ヲ處置スヘシ
 ○然^ド凡右ノ術ヲ施ス前ニ先ツ刺絡ヲ施シ
 或ハ適宜ノ浣腸法ヲ施ス^ト尤モ肝
 要タリ其劑ハ大麦煎汁ニ少許ノ油醋
 蜜醬^新焰硝ヲ加^ハ或ハ酒^花蜜^新ヲ加
 一施スヘシ○其他腫ニハ適宜ク温煖ナル糊
 劑ヲ貼シテ軟和スヘシ其劑ハ乳汁ニ白

罌^罌粟球^罌蜀^蜀葵葉^蜀亞麻仁粉ヲ加ヘ者^テ
 糊劑トシ此ニ^糖ハ油ヲ加フ
 ○然^ド凡^ド吐頻リニ^癸シテ此術ヲ施スノ間
 暇十キ者ハ阿片浸膏ヲ十六分碎^ニ或ハ
 八分碎^ニ或ハ四分碎^ニヲ用イテ^少間^少吐
 ヲ鎮メ而後ニ手術ヲ施シヨク弛腫ヲ收メ
 容テ又適宜ク造リタル^弛腫^帶ヲ施スヘ
 シ^ル後^再ヒ^コノ危篤ナル突腫ヲ^癸セシメ
 ガルガ^為ナリ

註 阿片浸膏方 エキスタラクト テバイキユム バル
ロンド

風雲堂

上好ノ阿片剉ニ九十六钱 沸湯九十
钱ニ投シ楸葉ヲ溢沸セヌヤウニ意
ヲ用イヨク溶化セル片ニ綿布ニ浮シテ
強ク絞リ汁ヲ取り滓ヲ去リ是ヲ隔湯
煎下シ或ハ慢火ニテ温メ蒸散シテ故ノ
如キ稠固ノ乾膏ト為ス

○此劑或ハ他ノ奇効ヲ稱贊スル名譽
ノ劑ニテ右ニ説ク所ノ弛腫ヨリ末ル嘔吐
ハ絶テ治スルヲ能ハス唯腸ノ弛腫ヲ收
メ容テ本位ニ復セシムレハ全ク治スヘシ若

シ此術ヲ施サレハ諸方法モ曾テ寸効
ナシ但シヨク練熟セル外科ニ托シテ細
慎ニ意ヲ用イテ施ス一肝要ナリ

○手術ヲ施シ縛締^フ後ハコレヲ通
例乳母或ハ侍婢ニ任セテ朝夕縛結
セシム然レ其法ヲヨク練熟セル外科
ニ習熟セシメテ施サシムヘシ然ラサレハ
縛締^フ適宜^ク纏固セサレハナリ

○嘔吐ノ病因右ニ説ク所ノ弛腫ニ非スレ
テ唯患者烈ク腹痛ヲ發シ凡氣腸中

ニテ騷鳴シ種々ノ浣腸法ヲ施用スレモ
凡氣并ニ大便モ通利セズ嘔吐依然ト
トレテ休サルモ人是レ腸ノ一所閉塞ト
スルカ或ハ腸ニ一箇ノ侵刺衝戟スル病
毒アリテ腸ガ牽縮スルナリコノ酷烈ニシ
テ患心苦ノ甚シキ病ヲ和蘭ニコロンケルト名ケ
又羅甸ニミセレト名ク

註

醫學室函ニ曰ク此ハ一箇ノ腸ノ病ニシ

テ特ニ迴腸ニ在リ

迴腸ヲコロンケルタルト名ク此病コレニ在ルユエニ此病ヲコロンケル

ト名其症甚ク大便牙結シ或ハ絶テ通セス

大ニ煩悶シ腸烈ク疼シ惡心噫氣嘔
吐呃逆ヲ發シ其甚キニ至テハ大便
ヲ吐スルニ至ル故ニ甚ク恐ルヘク且ツ動モ
スレハ死スヘキ病トス此首因ハ大便燥結
シテ腸ノ弛腫ヲ發シ或ハ嫩衝ヲ發シ
テ甚ク危篤ナリコレ動モスレハ速ニ腸
ノ熱壞疽寒壞疽ヲ發スレハナリ
此病ノ治法左ノ如シ
第一多血或發熱ノ候アル者ハ速ニ刺
絡ヲ施スヘシ

第二 數々 勉々テ浣腸法ヲ施スヘシ此ハ
膽入油一味ニテ施スヲ良トス

第三 小兒ハ阿片浸膏少許ヲ与スヘシコレ
暫時嘔吐ヲ止テ病苦ヲ緩和セシカ為

ナリ

第四 旋那葉一毛或ハ其余モ浸湯劑

トシ此ニ佛手椀汁少許ヲ滴シ飲レム

ヘシ但シ少許ヲ頻々与スシ又冰糖

漬佛手椀皮ヲ少許ヲミバク与ヘ或ハ

其他小兒ノ好ム甘美ノ物ヲ口中ニ含ミレ

クヘシ

半身以下ヲ

第五 患者半浴法ヲ施スヘシ但シヨク

覆閉シ蒸氣上升セザルヤウニ為スヘシ

是レ顔面ニ蒸氣薰セザルガ為ナリ

又勉強レテ久ク其浴湯中在ルヘシト

小兒ニヨク喻シ尉心メ且ツ浴中ニ前ニ云フ

湯劑ヲ飲レムヘシ若シ其際嘔吐ヲ

發セハ前ニ記ス阿片浸膏一碎或ハ三

碎ヲ用ユヘシ○小兒其ト湯中ニ長ク浴

スルヲ能ハサル者ハコレヲ抱テヨク拭ヒ乾

直チキニ裊蓐ニ卧シメ前ニ記ス糊劑ヲ
 適宜ク温メテ腹部ニ周アキク布貼レ
 或ハコレヲ施シ雞キ片ハ二襲アキ或ハ四襲
 ノ毛布ヲ蜀錦葵草ノ煎湯ト乳汁ト
 合シタルモノニ浸シコレヲ絞リ温ナルヲ腹
 部ニ置テ蒸湯スヘシ如此スル〇復々為ス
 一ヲ得バ速ニ前ノ如ク半浴湯ヲ施ス
 へシ右ノ如ク時宜ニ役テ半浴湯ト糊劑
 或ハ蒸湯劑ト更代カ施シテ遂ニ身体
 良能ノ扶助ニ依テ快復スルマテト忘ル

一勿レ

於テ

(註) 腸ニ右ニ説ク所ノコシケルヲ登スル
 病因ヲ察スルニ腸ノ一所稍牽縮スル
 片ハコレガ其所ノ上部或ハ下部ノ腸内
 へ層入シテ其所閉塞ス但シ上部ガ
 下部ノ腸内へ層入スルモノハ甚々治シ
 難シ下部ガ上部ノ腸内へ層入スルハ
 方法ニ由テ治スル一アリ〇此ヲ治スルニ
 刺絡浣腸法、半浴法、糊劑ヲ腹ニ
 貼スル等皆此ヲ治スヘキ疑ヒナキ方法

ナリ然凡此ニ由テ効ナキ一多シ故ニ
峻効ノ劑ヲ用ル_テアリ○一箇ノ重量_{モキ}
ノ物ヲ用_テ其腸ノ縮結ヲ放_テ解シ治スル
_テアリ此ハ通例水銀ヲ用_テ或ハ黃金
ノ球丸ヲ用_テ但シコレモ必ス治スヘシト確
證スル劑ノ中ニ算入シ難シ○煙草ノ
煙ヲ浣腸法ノ器ニテ腸中へ薰入シ
テ大効アリ殊ニ_{カクシキ}痙攣ヲ減スル劑ヲ
内服兼用シテ最モ効アリ此ハ阿片一
銖或ニ銖ニ龜腦一二銖ヲ加ヘ用テ

殊ニ峻効アリ○腹部ニ盲角或ハ
芫菁膏ヲ貼シテ効ヲ得ルモノアリ
○或ハ諸法ヲ悉ク試シテ効ナキガ爲ニ
腹ヲ截リ尻キ腸ヲ出シ其患所ヲ故
ニ復シ治スル者アリ但シ此術ハ施シ易クシ
トイヘ凡亦輕卒ニ爲スヘキトニ非ス
此法ホドグケル_テヲブセル_テメダカシル_ルニ
ヲブス三_ツニ_ツテサウル_ルケツセル_ルトホル_ル三第
八十七葉ニ見ユ

○往年一權貴ノ小兒右ノ病ヲ患ヒ此

ヲスキユルス人ト予ニ托セラル其父母甚々
哀感敬馬動スルヲ以テ予ガ危懼困勞
ヲ一顯ハニ言フ一能ハス故ニ大ニ苦
刻勞心スル一此時ヨリ甚キハナク此ヲ人
敢テ忘ル一ナレ然凡此ニサ条劑ヲ施シ天
ノ竈庇ニ依テ九死ニシテ一生ノサ蘇活ヲ
得タリ此ハ大便通セサルニ由テ旋那葉
十二支ヲ用イ且ツ阿片浸膏ヲ用エ但
レ如此閉澁サ条ト下劑ト一存ニ用テ人
皆心クハ誹議スヘシ然凡阿片ヲ用イサレ

ハ嘔吐ノ烈キニ由テ旋那葉ノ浸湯劑モ
咽ニ下ル一能ハス又其痙攣手抽制手モ除
ク一能ハス又半浴法、腹部ノ蒸サ条モ
施ス一能ハス旋那湯モ大便ヲ通泄
スル一能ハス○凡ソ諸サ条劑ハ皆其病
因ヲ除クヲ標的トシ用ユルナリ然ルニ右ニ
説ク劑ハ權法ニシテ此更ニ相反セリ
(註) 諸サ条劑ヲ此病ニ用テ効ナクハ予
亞麻仁油ヲ用エ此ハ諸医家ノ説ニ據リ
殊ニズウノテン名ノ書ニ載セル後亦

ガルスケイ名人コレヲ稱用セリ○予一婦
人此病ヲ患心者此油ヲ用テ治スモシ亞
麻油十キ片ハ膽入油ヲ用ユ此ハ半時毎
ニ膽入油ニ麦ヲ燕麦煎湯ニテ送下
スルニ嘔吐并ニ疼痛モ速ニ止ニ亦從テ
大便通泄ス此患者予カ療スル以前
ニ既ニ刺絡并ニ種々ノ浣腸法ヲ施セ
氏寸効ナク諸般ノ糊劑モ腹部ニ
貼シテ治スルヲナキ者ナリ

○ブリュック子ル名ノ説ニ、此患者ノ腹痛

○最モ烈キ所ニ廿九葉膏ヲ貼シテ峻
効アリ自ラ實驗スル所ナリト云一リ又
ハエシ名ノ書ニモ良効アルヲ稱譽セリ

○第十一種

此病ハ精神ノ感動ヨリ發ス特ニ恐怖
ト驚駭ヨリ起ル○此恐怖スレハ血ヲ身体
ノ外表諸部へ運輸充實スル所ノ心藏
ノ精力減耗シ諸筋并ニ韌帶モ弛弱
ス此ニ依テ面色黧澹煩悶安カラス
表發ノ蒸気壅閉シ吸收管皮膚層ニ在ル者自

ラ湿润ノ液并ニ傳染毒ヲ吸收シ振顫
シ喜ンテ嘔吐シ或ハ下利ス

○驚駭スレハ全身ノ神經、端頃ヲ失ヒ

痙攣、搐搦、痲病ヲ発ス又血ヲ身

体ノ外部ニ速ニ駆逐ス故ニ悸動、煩悶

ヲ発シ面色黧澹一或ハ諸通泄スキ

モノ閉塞シ或ハコレガ却テ俄カニ通泄ス

ル者アリ大小便等シ云○故ニ小兒ハ總テ日常驚

怖セシムルト甚々害アリト知ルベシ

○父母并ニ教育ノ師タル者ハ小兒ニ常

○ノ夏件

ニ善クテ用イテ親ク相交ル朋友ノ善者

ヲ擇ヒ其見ノ好ニ欲スル所ニ適カフヤウニ

シ小兒ニ相應セザル諸般ノ過誤ヲ為

サヌヤウニシ年月ヲ經ルニ從テ善行ニ

進ミ過失ヲ除クヤウニ為スヘシ○或ハ

夏ニ臨テ甚々啼叫スルニ依テ異形ノ

衣服ヲ被リ怪シキ状ヲ見ハシ凡テ如此

ト夏ニテ其見ヲ驚怖ハ甚々害アリテ

最モ危殆ヤウキノ一ナリ唯馬、狗其他畜獸

等ヲ見セテ其意ヲ轉ゼシムヘシ○銃煩

金鼓等ノ大ナル郷音ヲ聴セ或ハ小兒ノ
驚愕恠スベキ圖画ノ類ヲ見セシムルヲ勿
如此モノハ驚愕痾ヲ発セシム此等ノ説
ブルバハ名^人 別^人ハル名^人 スウ^人テン名^人 アンド^人レ^人
レケンキ名^人 其他ノ書籍ニ見ヘキ

二三滴

bellumia vitae

○此怖ヨリ嘔吐ヲ発スル者ハ酒火許ヲ与
へ或ハ鹿^新瓊^局將^方水^{三百七葉} 或ハバルサムヒタ^五の
或ハ桂^或水ニ加へ或ハ薄荷荷水ニ加へ或酒
ニ加へ用ユヘシ

○預メ

○驚駭^其ヨリ発スル嘔吐ハ^其サ柔劑
ヲ用テ嘔吐ヲ治スル^其ナラズ亦此後惡症
ヲ發スルヲ防ク^其此ニハ底野加ヲ軟革
ニ塗リ田日ノ部ニ貼シ此上ニ手巾ヲ温メテ
布貼スヘシ甚タ良効アリ○内服スルニハ
其兒年齡ノ多少ニ從テ阿片浸膏^{此篇第十種}
^{治法ノ}十六分^出碎或ハ八分碎或ハ四分碎ヲ
芸香水ニ加へ用ユヘシ然^此疝^此下^此ス^此ハ^此サル
ホドニ衰弱スルモノハ綿布ヲ温メタル列^此應
施酒ニ浸シヨク絞リテ其兒^此疝^此下^此ス

トヲ得ルマテ腹部ニ貼スヘシ而後庶瑠
漿新局方
三百七葉ニ酒少許ヲ加用ヒ夜中ニ前
説ノ阿片浸膏少許ヲ与フヘシ

(註)庶瑠漿ハ大麦煎舍利別以テ
送下スレハ最モ服シ易シ

此ニ就テ又其室中ニテ為スヘキ小兒
欣慰○歡娛スヘキ古又并ニ年齡ニ相應シ
テ少シモ危テフカラガル古又ヲ以テ欣怡セシ
ムルヲ肝要ナリ

○其見未タ幼稚ニシテ欣怡セシムル古又

○意ニ屬フ

○格別ニ

○以前ニ

件ヲ并知スベカラサル者ハ其見ノ日常悦
フ古又ヲ以テシ并ニ其耳目ニ觸テ感覺
スベク且ツカ較著ダテ受愛好スヘキ古又ヲ視
聽セシムルニ依テ欣慰歡娛セシムヘシ
此ニ由テ以前ニ恐怖セシトテ速ニ七心ル
ベシ又。恐怖セル時ノトテ復々
思ヒ出スベキ古又件ヲ尔後久ク視セシメ
且ツ聽シムルヲ勿レ○一貴官ノ御者
一歳半ノ小兒ヲ抱テ都下ニ遊觀シ一
駒ノ傍ニ側テ小兒ニコレヲ觀セシム此駒

人母馬其傍ニ在リテ一其駒ニ異常
 人側ヲ見テ恠シシ其後脚ヲ以テ御
 者ヲ蹴タレバ其見ヲ抱ケル御者ノ腕
 ニ當田リ御者地ニ仆ル此ニ由テ其見大ニ
 驚駭シ其見ノ母直チニ来リ見ルニ其ツ
 見死セリト思ヘリ其故ハ其見宛モ屍ノ
 如ク肢体厥冷シ眼口共ニ閉チ身体
 軟痿シ脉モ殆ント絶スレハナリ此ニ由テ
 速カ其見ヲ家ニ携乃ヘ帰リテ卧床ニ卧
 サシメ
 列應施酒名ノ温メ

テコレニ綿布ヲ浸シ絞リテ其見ノ全身
 ヲ卷纏ス暫時ニシテ漸ク蘇活シ大
 ニ啼叫ス此ニ於テ鹿瓊漿新局方少許
 ヲ列應施酒ニテ嚙シム此ニ由テ三時許リ
 眠リ且ツ大ニ発汗ス其後一兩日経テ頗
 ル平日ノ如シ然レ一兩日過テ下利ヲ発シ
 コレガ久ク止ス諸ヲ余劑ヲ用レ凡効ナシ故
 ニ予桂朮水少許ニ鋼酒下利篇方ヲ加ヘ
 服セシメテ全治セリ此見甚タ幼稚ニ凡
 二三週ヲ経ル中ハ都下ノ街門ニ入レハ必ス

恐怖シテ振慄ス其地夫ノ御者ノ顛仆
セル所ニ近^チケレバナリ

○小兒胃ニ病アリ或ハ嘔吐スレハ吾國
ノ婦人忽チ七首角ヲ一^ニ心窩ニ施シ
此ヲ以テ胸骨下端ノ劍狀軟骨ノ陷
入セルヲ表部へ牽引セントスルナリ大人ノ
既ニコレガ剛骨トナリタルモノ陷入セルニ^{此術}ハ効
アルヘシ然レ小兒ハ此軟骨甚ク薄弱ニ
レテ鳥羽ノ如クナル工工^既暫ク陷入セルモ
ノハコレヲ浮揚ストイヘ^{モトノ}復ク忽チ^{モト}故^ル

ニ陷没スルナリ

小兒嘔吐篇第十八終

小兒欬嗽篇第十九

○凡^〇氣管ノ神經ヲ侵刺スル物アレハ必
 ス欬ヲ發ス然レモコレニ二様アリト
 一ハ其病毒母一氣管中或ハ胸肺ニ在テ直
 午ニ其神經ヲ侵刺ルナリ一ハ病毒母他ノ部
 ニ在テ氣管ノ神經ト相連交スルユエニ他ノ
 部ノ侵刺自ラ^〇及死スルナリ如此標本ノ同シカ
 ラサルユエニ欬嗽ニハ必ス効アレモコレヲ他
 ノ欬嗽ニ用レハ寸効ナク却テ害ヲ為ス
 知ルヘシ

〇其部神
經ト

〇其葺劑
モ

○ノ病因ハ

註 ハルレル各人ノ書ニ曰ク總テ咳嗽。胸中ニ在リコレ猶嘔ハ鼻ニ在ルカ如シ

○予先ツ小兒ノ多ク患ル故嗽即チ気管ヲ衝動スル病因胃中ニ在テ胃欬ト名ル症ヲ次ニ説ク

○毎日ノ

○凡ソ小兒父食物多ク少ノ度ノ精ク知リ難シ概シテコレヲ言ハハ人ノ諺ニ言ル如ク朝ヨリ晩マテ唯食物ヲ求メ食フノ故ニ自ラ過食ノ又人食物多クハ酸敗スベキ物ハ砂糖并ニ牛乳ニテ製スル物

○スルヲ固ヨリ論ナシ

○依然シテ

穀粉ニテ造リ粘稠ナル物譬ハ穀粉糊糕餅ノ類多シ故ニ如此モノヲ過食シテ胃中ニ消化セズ適宜ク良乳糜ニ變化セガルナリ○是故ニ右ノ消化セサル未熟ノ悪心液自ラ胃中ニ聚リ胃痞脹硬満シ眠ルテ多ク顛顛鼓動シ頭痛喘息食ヲ欲セス嘔吐ヲ發ス○其未熟ノ悪心液スク胃中ニ在ルテ能ハスレテ變シテ酷厲液トナルコト日ノ神經ヲ衝動ス此ニ由テ其衝動ヲ胸ニ移シテ所謂胃欬

ヲ發スルナリ○第八對神經ハ胸肺ヲ絡フテ胃ニ終ル其親ク連交スル知レシ

○右ノ起因ニテ胸肺ノ衝動セラレテ欬ヲ發スルヲ宛モ結石ニ因テユルヲ發スレハ胃ニ連及レテ嘔吐ヲ發スルカ如シ

○右所説ノ胃ヨリ發スル欬ノ種類ハ或ハ其兒ノ元息惡臭アリ舌苔アリ胃痞脹シ總テ食ヲ欲セス或ハ欬嗽殊ニ食後ニ甚シク或ハ欬ヲ發スルニ則ニ田口口侵刺疼痛ヲ覺ヘ或ハ時々欬ノ終リニ嘔吐シ吐スレハ暫ク欬靜止スル等ノ

症アルヲ以テ他因ノ欬ト弁別スルニ或ハ欬嗽中ニ時々其兒ノ呼吸ヲ一瞬間停止シレムレハ停止ルヲ得ルモノハ田口欬ナリコレガ衝動シテ少シモ忍ブテ能ハス欬スルモノハ其病因ノ所在胸肺ニ在リ○此欬ト變欬トノ區別ハ變欬ハ隔日毎ニ劇發シ且ツ欬嗽中ニ呼吸スルヲ能ハス吐スルヲハ其欬一連綿シテ止ムヲナレ又流行シ且ツ傳染スル病トス如此諸症候ハ田口欬ニ當リテアルヲ無クシ

口確證テ

○是故ニ曾效ハ舍利別削并ニ通例ノ
和胸削ヲ用レハ効ナキノミナラス却テ害
多シ其故ハ總テ甘和軟柔ニスル削ハ曾
ヲ弱クシ未熟ノ汚液ヲ益シ却テ效ヲ
增長セシムレハナリ是ニ反シテ輕キ吐削
ヲ用レハ容易ク速カニ治スルナリコレ幼見
ト雖モ吐削ヲ与フヘシ予既ニ麻疹等
ニ説カ如シ

註 右ニ説ク所ノ輕キ吐削ハイペカコア十根
三餅沙糖十八餅合シ用エヘシ○或ハ此

Kermes mineralis

症ニケルメスミ子ヲレ散削名新
局方ニ出ツ半餅ヨリ一
餅或ハ二餅マテレ見年齢ノ多少ニ從テ
用エヘシ是亦食効アルノ一方ナリ
吐削ヲ用イ吐シテ後暫クシテト吐スル
物全ク無キニ至ラハ又浣腸法ヲ施スヘシ
其削ハ牛乳油沙糖ヲ合シ製スコレヲ數
日續テ施スヘシ此ニ依テ欬嗽必ス治スルナ
リ○但シ其後ハ見ニ食ヲ多ク与ルヲナク
此ニ就テ健胃ノ或ハ散削ヲ用エヘ
シ其方薄荷葉細末トシ竹節過シコレニ沙

imp. rústingii. stomachicum. De Libano.

糖ヲ等分ニ加、此ヲ每服一小刀夫ニ抄
ツ、毎日二回或ハ三回用ユヘシ

〔註〕強壯ニスル膏月サ条ヲ胃ニ貼シテ甚ク
大効アル者アリ其膏月サ条ハエムプラスト

リュスチンギユム^{以上硬} エムプラスト ストマンキユム^{以上硬} エムプラスト

デラブダノ^{膏名} 右ノ膏月サ条ニ肉^府聖^府膜

搾油薄荷油ヲ塗テ胃ノ部ニ貼スヘシ
此病ニ總テ良効アリ

○小兒寒氣ニ冒觸シテ発スル一種ノ欬嗽
アリ^ハ 秋末或ハ隆冬ノ見ヲ推乃テ旅

一行走シ

行シ或ハ寒風氷霜ヲ侵シ^ニ雪ヲ積テ

轉擲シ或ハ温煖ノ室ニ在テ俄ニ冷

氣ノ所ニ出ルヲアリ^ハ小兒ノ卧床火爐

ノ邊ニ在テ暖室ニ慣ルモノ^ス火間トイヘ

窓前ニ置ク等ニテ冷氣ニ感スル中ハ忽

チ噴嚏シ欬嗽ヲ発ス○或ハ其母若クハ

乳母寒氣ヲ受テ小兒ニ乳ヲ与レハ亦

其兒コレニ感シテ欬ヲ患フ夏月ハ終日

熱スルユエニ夜ニ至レハ涼氣ヲ納^シガ為ニ

園庭池泉波頭ニ遊歩シテ冷氣ヲ

受ル一婦人乳母亦ヨク為ス所ナリ

○蓋シ冷氣ヲ^{カラム}目リテ欬嗽ヲ患ル起因

ヲ研究スルニ気管ニ并ニ肺中ニ^{カキリナキ}無紀

幾^{ホクク}多クノ細管アリテ恒ニ^{ツチ}精微ノ蒸気

ヲ発出スコレヲ徴スルニ明鏡ニ向テ一呼

スレハ其蒸気^ハ數ク鏡面ニ聚リテ湛露

蒸溜自ラ^ナ消滴ヲ為カ如シコノ蒸気

無病壯健ノ人ニ於テハ最モ^モ多クシ^レ譬言ハ

全身皮表ヨリ^ニ発スル蒸気九十^ニ兆ア

レハ^ニ気管ヨリ^ニ発スル蒸気ハ百八十^ニ兆

アルナリ○右ノ如クナル工^ニ胸肺ノ病患^ニア

ル人^ニ寒^ニ凡^ニ冷氣ノ中ヲ行ク^ニ巾^ニ衣服ヲ

重^カ襲^サ子^ニ厚^ニ帽ヲ被リテヨク^ニ温^ニ煖^ニニスル

巾ハ此ヲ以テ能ク十分ニ^ニ寒^ニ冷氣ヲ御^シキ得

タリト思ヘルハ幾^{イカ}許^{ホト}カ大ニ^ニ誤^ア或^チ心^ト謂^フス^ニシ

夫レ^ニ身体ハ^ニ厚^ニ子^ニ被^レテヨク^ニ防^クテ^テ得^ヘシ

肺藏ハ^ニ厚^ニ子^ニ被^レテ^テ寒^ニ冷氣ヲ防^ク

一能ハス○前ニ云サ^ニ蒸^ニ気ヲ^ニ発^ス出^スル^ニ細

管^ノ他^ニ又^ニ気^ニ管^中ニ^ニ小^ニ腺^ノ數^クアリテ^テ其

細孔ヨリ^ニ精^ニ微^{ナル}滑^ニ液ヲ^ニ滲^ス出^シレ^テ此ヲ以テ

○ノ如ク気化
シテ蒸散ス
ルヲ能ハス自
ラ

気管中ヲ滑利シ且ツ滋润シテ伸縮ニ
柔撓ナラシメ又気管ノ裏面ノ被膜ヲ保
護シテ其蒸気并ニ其他ノ液汁等ニテ
・ 侵刺衝動スルヲ十カラシム ○然ルニ
肺ト気管ノ蒸気管ノ孔并ニ小腺ノ
細孔寒気ニ因テ閉塞スル中ハ幾多ノ
蒸気律液平常ニ其中ニ聚滿停蓄シ
テ気管ヲ衝動シ又氣管ノ裏面ノ被膜
モ其伸縮柔撓ノ常機ヲ失フ彼強拘ナリ蒸
トナリテ飛出スル物并ニ気管ニ滲出スル滑

液。酷厲ニナリテ宛モ日寒病ノ涕汁ヲ

以テ鼻中ノ膜ヲ侵刺シ鼻下ノ皮モ

己ガ為ニ赤爛スルカ如シ凡寒ニ感冒スルハ涕汁皆

痛シ鼻下モ赤爛ス ○右ノ如キ起因ニ由テ気管

ヲ侵刺衝動シ以テ此種類ノ欬嗽ヲ発

ス此ハ嚏ヲ發シ或ハ咽喉蒼痛シ或ハ

夕夜ニ病増劇スル等ニ由テ日寒

ヨリ来ル欬タルヲ并スヘシ

○此症初發ハ其痰稀シ久ク枕言雷シ

テ休サレハ此ニ從テ痰モ亦多ク咯クナリ然

レ其痰稠クシテ黄色ニナリ且ツ咯キ易キヤウニナルハ此病速ニ治スルナ候ナリ

○凡ソ日寒ヨリ発スル欬ハ危^{アヤ}ブムベキ病ニ非ス然レモ治療ヲ怠リ且ツ久ク休サレハ気管ニ聚ル汚液酷厲ニナリ咽喉ヲ侵刺シテ甚痛シ或ハ終ニ肺ノ

勞瘵^{ツラ}トナルナリ

(註) プリンゲル^人ノ説ニ日寒ヨリ発スル欬ハ肺^ハ嫩衝ノ一等輕淺ナル者ト思フヘシ治療ヲ怠リテ久キヲ經タル欬ハ

勞瘵ノ初発ト思フヘシト曰^イリ

通例

○右ノ欬嗽甚ク劇^シシキモノハ此ニ発スル患心症ハ勿論又吐血ヲ発スルナリコレハ刺絡シテ防止スヘシ然レモ小兒ハ刺絡スベキナ^レナリ其故ハ気管ノ血管未ダ甚ク柔^ク撓ナレハ容易ク破裂セサレハナリ

○日寒ノ欬嗽初發ノモノハ小兒ヲ温暖ニ保サ護レヨク卧床ヲ温メ且ツ冰糖ヲ以テ其^ニ煙シ而シテ茶湯ニ茴香ヲ加

○大氏此ニ
由テ治ス
ルナリ

ハ浸シテ乳母ニ飲シムヘシ○既ニ乳ヲ離
レタル小兒ハ右ノ茶湯ヲ用イテ或ハ温ナル
麦酒清下利篇第五種ノ註出ヲ用イテ表癸ノ蒸
氣ヲ癸スヘシ

○右ノ欬嗽既ニ數日止サルモノモ亦前
法ヲ用イテ適當トス然レモ左ノ療法
ヲ施シテ良トス

○第一 毎朝或ハ隔日ノ朝小兒年齡
ノ少長并ニ精カノ多ク少ク量リテ輕キ
下劑ヲ用エヘシ此ニハ刺蜜滿那一棧半或

ハ二棧或ハ三棧或ハ四棧ヲ麦酒清

下利篇第五種注 少許ニ溶シ用テ良ナリ○或ハ

正レキチユアリユムレニチヒユム製劑名ニ痘瘡篇第四限治法ノ註出

一棧或ハ二棧或ハ三棧或ハ四棧ヲ麦酒

清前ニ註スニ烱化シ小兒ニ用エヘシ○右ノ

劑ノ服量ニテ較著ノ通利ナキ片ハ

其服量ヲ増加スヘシ

○第二 午後ニハ稀クシテヨク瀉シタル偏

脚木乳或ハ麦酒清或ハ大麦者汁

或ハ蔓菁煮汁或ハ茶湯ニ牛乳ヲ加

〇辟言ハ

へ用ユヘシ

〇第三 其痰稠クナリヨク熟スルマデハ

毎夜輕キ催眠劑ヲ用イテ安眠セ

シムヘシ此ハ向片浸膏吐篇第 十種ノ註出一碎

イハカコア十根二碎冰糖十七碎右精

ク煮クヲ用イテ研磨調合シ此ヲ分テ四

服トシム毎夜一服ヲ用ユ若シ一服ノ量ニ

テ夜中欵止ムニ足ラサルモノハ次ノ夜ハ服

量ヲ差増スヘシ〇夜中欵總カニ

シテ睡リヲ妨ケサルモノハ右ノ催眠劑ヲ

用ルニ及ハス然レモ其他ノ劑ハ台心ヲス

用ユヘシ其故ハ不^ス断欵ヲ免スルニ因テ

血中ノ稀^ル淡ナル水液ガ気管ト肺ノ

蒸気管ノ細孔並ニ小腺ノ細孔ヨリ

滲出スレハナリ又一ニハ右ノ細孔ヲ弛柔

ニシ粘痰ヲ稀解シ總テ滲出スル所

ノ液ヲ化熟シテコレガ気管ニ未レハ

隨意ニ欵シテ咯^キ出シ易カラシムル

ガ為ナリ

〇小兒ヲ家内ニ居テ保護シ殊ニ

〇ノ硬強+

卧床ヲ温暖ニスヘシ又足蹠ニ野羊
脂ヲ塗土ルヘシ又勉メテ飲液ヲ多ク与
ヘ食物ハ稀軟ニシテ水気多キモノヲ
与フヘシ然レ酸味、鹹味ノ物ハ禁ス
ヘシ此ニ由テ此欬嗽速ニ治スルナリ

○日寒ノ欬ヨリ声嘶^カ嗽^カヲ発スルナリ
此ハ气管ノ上部乾燥スルニ因ル其乾
燥スル所以ハ前ニ云フ所ノ气管ノ小腺ヨリ
滲出スル精微ノ滑液并ニ細管ヨリ発ス
ル蒸気通泄セシテ气管中ヲ滑利

○ツナラズ

滋潤セズ且ツ伸縮弛張ニ柔撓便利
ナラサルヲ以テナリ○如此ナル起因○或ハ
温暖ノ室ニ在リシ者俄カニ寒冷ノ所
ニ出テ寒ノ氣ヲ被フルキハ气管ノ蒸気
孔并ニ其腺ノ細孔閉塞ス或ハ痘瘡麻
疹、我鳥口瘡ノ气管ニ生スルニ因テ亦其
細孔閉塞ス或ハ熱性ノ飲液、酸烈ノ
物ヲ用ルニ由テ夫ノ滑液凝固シ或ハ其
他ノ病ニ由テ其滑液凝結トスルヲ多シ
○是故ニ平常飲液ヲ多ク好ム人ハ声

口種々ノ

Phlegm (tussis trillatoria tussis acuta)

嘔ヲ患ル^ル多キヲ以テ知ル^ルニ
飲液ヲ多ク好ム乾燥スル故ナリ

○夫ノ^カ気管ヲ滋润スル滑液ハ新陳

相代リ^テ日夜ニ連綿トシテ生シテ休^ムスト

雖モコレが大ニ剥脱刷除セラレテ其缺

損ヲ補ヒ給スルノ間^トナキホドニ欬嗽連

綿トシテ頻リニ発スルハ声嘔ヲ為スナリ

是故ニ^ニ勞欬ヲ患ル人ハ大抵終ニ声嘔

スルナリ

○癢^キ欬^ト名ル^ル症アリ此ハ喉中^ニ痒^ムスル

如ク^ク覺^スヘテ欬ヲ発シ或ハ^ハ吐ス此モ亦

Effect of Scammas

其所在^ニ気管ノ上部ニ^ニアリ此治法ハ或ハ

前^ニ云所ノ法ニ由リ或ハ^ハ淨蜜四^ニ匙乾

姜ノ末一^ニ匙ヲ合シコレヲ一^ニ匙用ユ

(註) 軟和劑^ヲ用テ効アリ此ハ^ハ搥^テ棗核

ノ粘汁、甘^キ杏仁油、白^キ罌^殻粟^子舍利^別

其他如此類ナリ或ハ^ハ温湯ノ蒸^スル^ル氣ヲ

口ニ受テコレヲ以テ^テ喉中ヲ^ニ薰^スル^ル症

ニ^ニ大効^{アリ}

此^ハ症^ニ煙草^ノ浸^スル^ル一^ニ二^ニ碎^リ用^イテ^テ即効

アリ予コレヲ^ヲ經驗セリ

○小兒ニ患ル一種ノ欬嗽アリ此ハ疥癬ノ類ヲ内伏抑愈シテ發スルナリ此症ハ甚々危険ナリ其故ハ皮膚層ニ發スル如クニ胸肺ニ疥癬ヲ生スルナリ故ニ速ニ救ハザレハ方瘵トナリ死ス

○此種類ノ欬嗽ハ通例欬嗽ヲ治スル藥劑ニテ治スルナシ唯百計勉勵シテ其内伏セル疥癬ヲ皮表へ既發スルヲ一大要法トス

○此症ノ治法ハ先ツ前ニ記ス諸般ノ

seitenband

下劑ノ適宜キ一方ヲ擇ミ用イテ腸胃ヲ清除シ而後小兒ヲ温煖ナル卧床ニ卧サシメ硫黃升花小刀尖ニ抄ヲ火ニ温メタル乳汁ニテ用ユヘシ暫クシテゲイテハルト花發汗解毒ノ効アル草ノ名ノ浸湯ニ乳汁ヲ加ヘ或ハ乳汁ヲ加ヘスレテ發汗スルマテ飲シムヘシ但シ此浸湯劑ハ其後モ一二時ノ間レバク用ユヘシ

○右ノ法ヲ數日用イテ疥癬十分ニ發出スレハ則チ治効ヲ完成スルナリ然レバ

○内服

コレガ発見セサルモノハ以前疥癬ハ最モ
夥ク発出シタル處ニ蒸餅^{シロ}母^ハ或ハ芫菁
膏ヲ貼スヘシ（芫菁膏ハロンドンセ^地名^ハ芫菁
局ノ方最モ良ナリ

〔註〕疥癬類ノ内伏スルヨリ発スル欬嗽
ハ芫菁膏ヲ用イテ^{コレヲ}皮膚表ニ発見スルヲ俟
ズ速ニ芫菁膏ヲ両肩ノ^{アヒタ}中間ニ貼
シテ胸肺ノ^ハ毒液ヲ導^ハ泄スヘシ
○ロンドンセ^ハ芫菁膏ノ方

エムプラスト アツトラヘシナス 次ニ註ス 硬膏ノ名 百九十五

芫菁 九十六匁

醋 四十八匁

右先ツエムプラスト アツトラヘシスヲ^{押し}壓^キ搥
テ軟カニシテ芫菁ノ極細末ヲ^{カケ}掺^カカケ
ヨク煉和シ而後醋ヲ徐々ニ和シ混
合ス

○エムプラスト アツトラヘシスノ方

松香 黄蠟 各二百八十八匁

淨羊脂 九十六匁 豕脂ニ代用ス

右合シ火上ニ安シ其塊皆烱化ス

〇 應過
シテ

〇 辟言ハ

Valerian mosch. pharm. Lond.

スルニ至テヨク攪合シ。硬膏ト為ス

サ元苦膏ヲ貼シテ微痛ヲ催フシ火シ

癸泡シ始ルハ速ニロンドンセ名ノ射麝香

清涼飲一茶匙一匙ヲ用イテ癸汗セシム

ヘシ或ハ丸サ条ヲ製シ与フヘシ其方左記シ

丸劑ノ方

射麝香 三碎 竜腦 一碎

西復盆子舍利別火許

右合為丸サ条

右ノ劑ヲ与ヘテ火間シテ前説ノ泡浸劑

ヲ飲シムヘシ

(註) 射麝香清涼飲ノ方 ロンドンセサ条局方

薔薇花水 白花ニシテ
モスクアールセシ
香列ナルヲ 四十八匙

射麝香 十二碎

淨白沙糖 一匙

右先ツ射麝香ヲ白糖ニ加ヘテヨク搗

和シ而後徐々ニ薔薇花水ヲ加ヘ攪

合ス

〇 右ノ劑ヲ用テ頭著ノ効驗ナキモノハ

アエチヲアス アシチモノアリス 製劑名 一日ニ

風 寒 症

二回或ハ三四、五餅或ハ六餅ツ、米糊ニ
和シ或ハ舍利別ニ和シテ与ヘ而後速ニ
前説ノ^也湯劑ヲ用ユヘシ

○欬嗽甚タ烈キ者ハ日寒欬中第
三治法ノ劑ヲ用イテ緩和スヘシ此ヲ用ユ
ト雖モ^{下ヤ}曾テ危^{下ヤ}フムベキヲナシ其故ハ此病
毒ハ痰唾トナリテ欬ヨリ咯キ除クベキ性
ノモノニ非ス必ス皮表へ駈^カ弁^カシ除クベキ
レハナリ

○凡テ小兒ニ前説ノ諸劑ヲ用ルニハ沙

○後テ

糖或ハ糖糕、蒸餅ノ類ニ和シ或ハ
裹ミ与レハ其甘美ナルカユエニ用イヤ
ス^レヌ^レヲ小兒ノ側ラニ置ク中ハ自ラ乞
求ル^テアリ或ハ早朝^メ興^メ寤^メヨリコレヲ与ヘ
終日時々与レハコレガ常^ク習^セニナリテ乞ヒ
求ルナリ總テ如此急^クヲ用ル^テ肝要ナリ
○小兒患ル所ノ欬嗽ニ於テ生^ル虫患^ル症
鴛口瘡、痘瘡、麻疹、虫^ノ病ニ兼ル欬
嗽ハ各^ク其病ノ本條ニ記スガ故ニ此ニ畧ス
小兒欬嗽篇第十九終

Blank page with vertical lines for text.

小兒咳嗽欬篇第二十 俗稱百日欬

○初メテ

○染ス

○夫レ痘瘡、麻疹、徵毒ハ其初
歐羅巴洲言生スル病ニ非ス是レ皆以前ヨ
リ其病毒ノ種子アル國地ヨリ来リ賈
物器械、人類、禽獸等ノ吾洲ニ来ル由テ
傳襲スルナリ咳嗽モ亦其如ク元来歐
羅巴洲ニ生スル病ニ非ス先輩ノ説ニ亞
弗利加洲、或ハ東方諸國ヨリ歐羅巴洲
ニ新ク来ル病ナリト云リ○此病始メテ
ズウエーデン國ニ傳ル時ハ予未ク其病性

ヲ并知セス一然レ凡千四百十四年ニ始
テ拂即私國ニ傳後レ世ニ顯然ト患ル
者アル一ヲ知レリ

○是故ニ此病ハ稟賦ノ體質ニ具アル
病ニ非ス又頭ヨリ胸肺ニ来ル酷厲液ニ
非ス或ハ胸肺中ノ膠粘液ヨリ来ル病
ニ非ス又胃中ノ粘液ヨリ来ル非ル一
明カナリ諸先哲ノ明説トモ亦斯
ノ如シ

○此致ヲ患ル少兒ト每常大ニ夥ク粘

○病ニ

痰ヲ吐出スオレ凡此粘液ガ此病ノ起
因ニ非ス唯其粘液ヲ分泌シ出ス腺ノ
所為ヲ以テ其病因トスルナリ乃チコノ
腺一箇ノ傳染ノ毒氣ニ侵襲刺戟セ
ラルニ由テ平常ヨリハ過多ナル粘液ヲ
分泌搾出ス是レ宛モ膀胱ニコレト同種
ノ腺アリテコレヲ淋石ニテ侵刺スルハ
幾多ノ粘液ヲ分泌スルト同レ則チ
其粘液ヲ以テ淋石ノ侵刺ニ因テ膀胱頸
ニ疼痛スル病ト起トスルハ甚々多ク

翻スルニアラスヤ然レハ嘔欬ニ於テ吐出
セル一粘液ハ一真病因ニ非ル下

論十キノミ

○往年

○特ニ此病ハ毎時流行スル病ナリ予
シバク徴試スルニ此病ヨク傳染スレ氏從耜
未タ此病ヲ患ヘザル者ノミニ傳染シ其
他ハ必ス患ルナシ然レハ其傳染ノ方
ニ於テハ宛モ痘瘡麻疹ト同シ尚且或
ハ此患者ニ勤仕セル家僕トイヘ氏此病
ヲ他ニ傳染スルナリ。一患者ニ勤仕セ

ル一家僕他ノ小兒二人ヲ他ニ一誘行
シ此ニ由テ^其兩兒ニ此病ヲ傳染セルナリ予
親ク知ル所ナリ其他一患者自覚
ヘスレテ他家ニ傳染スルナリ甚々多シ

○凡ソ痘瘡麻疹ハ再ヒ患ル人ト云フ
心レナキガ如ク一回此欬ヲ患ル人ハ
必ス再ヒコレヲ患ルナリ予三十八年
ノ間此患者ヲ見ルニ勝テ數フヘカラストイヘ
氏再ヒ一患ル人絶テ無シ

ヒルテレイ名モ此支ヲ其ト書ニ論シ又

キルクパトリク 人所著ノアトレイシ^書 第二篇、
六十四葉ニモ記セリ

〇再ヒ

註 ヒルトレイ^人ノ説ニ予并ニ幾^イ医家ニ
於テモ此病ヲ患ル者アルヲ^聞又此病ヲ
患ヒシ數多ノ老人ニ質正ニ^イ比
再ヒ患ルヲナシト云^リヲ記セリ

〇ビスセツト^名人曰ク一此病ト痘瘡麻疹
ト比併セテ再ヒ患ヒサル病タルヲ明
證センガ為ニ大ニ苦刻研究セリト
〇間歇熱ノ認治并ニ^レ也調護ノ

悪心^イ中ハ大氏、快復スレ^レ復タ再發ス
ルカ如ク此欵一旦治シテ復タ發スル
者アリ、モルリス^名人ノ書曰ク一也見秋此
欵ヲ患ヒテ治ス翌年ノ春再發ス
然ル所以ヲ考ルニ此見秋患ヒシ時
其病毒母ヲ十分ニ駆除セスレ^レ春
ニ至テ其毒復タ發見スルナリ
〇千七百六十九年國中諸所ニテ哮喘
欵流行シ予從^レ未タ曾テ見ガ
ホドニ其症皆劇盛ナリ此時四歲

一 小兒此病ニ四維リ數日患テ後不圖
 日^{ヒグルイノヨリ}發熱ヲ發シ初^ヒテ惡心^寒シ後發熱
 シ終リニ發汗レテ解ス如此毎夜一發
 スル^テ數日休ス然レ^レ此熱ヲ發スル日ヨ
 リ其效全ク止^ヤテ少レモ發スル^テナレ其後
 日發熱自ラ休^ヤ。其日ヨリ^後以前ノ如ク
 效^ノ劇ク^ナレ^バ發シ且ツレバク^ク多ク
 血^ハ血ヲ發ス此效一二週モ休ス患ル^ノ
 後^ニ鼠籠ニ惡性ノ瘡ヲ發見シ此ヨリ
 酷厲ナル稀汁^ハ數ク流^レ世ス然レ^レト

一 其效毫^モ減スル^テナレ其後效
 漸ク治スレ^レ其瘡尚愈^ス又會陰
 ニ腫瘍ヲ發シコレガヨク膿^ハ熟シ潰
 破シコレヲ通例潰瘍ノ治法ニテ全ク
 治ス^ル鼠籠ノ瘡モ會陰ノ腫瘍ヲ
 發スル後漸ク愈^スリ〇一 小兒此效
 フ患ル^ノ間^ツ自ラ手爪ヲ以テ右眼ト鼻
 トノ間ノ所ヲ搔^キテ休ス遂ニ潰瘍ト
 ナル然レ^レ其效曾^テ止^マナレ
 〇 小兒麻疹ヲ患^ヒトシテ未^タ發出セ

○其欬

ナル前ニ劇キ欬ヲ発シ其欬声宛モ
哮欬ノ如ク且ツ欬スル毎ニ嘔吐シテ体
ムモノ多ク然レモ隔日毎ニ劇盛ナラス
哮欬ハ隔日毎ニ劇ク発スコレヲ哮
欬ノ確然タル症候トス但シ麻疹ノ欬ハ
麻疹十分ニ発出スレハ勿ク休ム
○哮欬ハ一箇ノ顯著ナル熱ヲ兼ル
者アリ或ハコレナキモノアリ又的當田セガル
其条割ヲ用ルニ因リ或ハ種々ノ損害ア
ル古又件ニ因テ病性ノ順序ヲ擾乱ス

○欬

ルニ非レハ其欬必ス隔日毎ニ劇發ス
○此欬漸ク增長シ初メ乾欬ニシテ痰
ヲ吐スルナシ然レモ十日或ハ十二日猶自雷
スレハ痰アリテ稠厚トナル然レモ仍イヨ
ク增長シテ休ス或ハ稍間靜ノ時ア
レモ依舊復タ発シ或ハ一旦劇ク発スレハ
其後暫ク休ムレバアリ如此進退増
減一定ナラスレテ此欬久ク治セス其兒
面色青黧、眼突腫シ淚ヲ流シ或ハ
時々衄血ヲ発シ其兒呼吸モ窒塞ス

○直々ニ

ルヤウニ見エ其故ハ烈キ欬嗽連綿
トシテ休サル中ニ極メテ苦悶シテ氣息
モ空塞セントスル鳴響ヲ為シテ絶ニ
一ニノ氣ヲ吸引スレハナリ○此欬烈シ
クシテ少間連發スルハ幾多ノ粘痰ヲ吐
出セサ非レハ休サルヲ多クシ又吐スルヲ十
クシテ欬休メハ速カニ復々發シテ吐スル
ニ非レハ一休サルナリ○或ハ食後○此
欬ヲ發スレハ手指ヲ咽喉ニ内テ探リ
吐スルニ非レハ其欬劇ク面色青黯ハ呼

○毎イッモ次

caquelinde

吸殆ント空塞ス○如此ナルニ此欬
劇發スレハ自テ休ムマテ依然舍措
ナラス其兒ノ傍ヲニ練熟テ心剛ノ人
ヲ具フヘシコレ動モスレハ患心者昏憤シ
テ顛仆シテ損傷スルヲアレハナリ
是故ニ欬發起スル中ハ每次物ニ任
固持スヘシ壁言ハ卓椅子等ニ倚
ルカ如シテ固持スヘシ
○拂即私綱ニテハ此病ヲコギエ止ルセト名
少是レ頭ヨリ胸ニ下ル悪液ヨリ生スト

風痰

云ノ義ナリ故ニ頭ニ厚帽ヲ被フテ温煖ニシコレヲ治スルナリ

○古ノギリケン綱ロメイ子ニ綱ニテ別ニ病ノ名ナシコレハ此病ヲ未タ頭知セサレハナリ

○凡ソ此欵ノ真ノ病因ハ一箇ノ強烈ナル異ノ毒ノ毒種子ニシテ死モ痘毒ノ如ク未タ此病ヲ患ヒザル小兒ニ傳染滋蔓又ス○此毒種子ハ細虫タルヤ否ヤ予未タ確定シテ言フヲ能ハス然レモ

○此ニ由テ其欵モ發止アルナリ

此毒母ハ傳染ニ由テ人身ニ侵襲スル人皆明白ニ知ル所ナリ則チ此毒一ニハ吸気ヨリシテ胸肺ニ著キ又々令ハ津唾ニ混シテ田日ニ著クナリ故ニ肺ト胃ノ神経ヲ侵襲スレモ特ニ多ク胃ノ神経ヲ侵刺衝動ス但シコレカ衝動スル時アリ或ハ休ム時アリ或ハ半日モ入至ク休ムアリ○故ニ肺神經ヲ衝動固ヨリ論ナシ胃ノ神經ト肺ノ神經ト連スルヲ以テ胃神經ノ

○スルニ由テ
總ニカニ

○頑滯牢
着スルエ
且ニコレガ

衝動自ラ肺神經ニ連及シ以テ摑掣
様ノ欬嗽ヲ發シ且ツ吐。其毒種子減
スレハ少間——其欬休ム但シ——如此數
吐シ除ケル其毒種子目ヲ經テ漸ク減
耗シ遂ニ米心ク消滅シ或ハ身體ヲ出
去ルニ非レハ此病治セサルナリ
○右ノ病因ニ——從蹟考究スルニ其治
法一ニハ其毒種子ヲ殺シ且ツ消除ス
ル藥劑ヲ用イ一ニハ体中ノ徑路ヨリ
コレヲ馳出スル劑ヲ用ユルナリ

○此病ハ特ニ——勉メテ——西早田心考
究シテ速ニ恢復セシムルヲ求ムヘシ
其症甚タ困難ニシテ且ツ久ク退カサ
レハナリ○此病治法ヲ施サス自然ニ季セ
置ク中ハ七八十日或ハ半歳モ治セザル
者多クシ——其最モ險惡ナル者ハ甚タ危
篤ニシテ動モスレハ死ス或ハ呼吸空塞
シテ悶乱スル者アリ或ハ吐血衄血ヲ發ス
者アリ或ハ羸瘦骨立スル者アリ或ハ腫
病ヲ發シテ死スル者アリ然ラサレ各種ノ

○死スル見

弛腫或ハ尙傳病ヲ飛スル者多クシ

(註) 官府ノ簿帳ヲ閱ルニ千七百四十

九年ヨリ千七百六十四年マテ十六年

間トズトテ^國於テ此數ニ百四万三千

三百九十三人アリコレヲ十一年ニ配當ス

レ六千七百十二人ナリ^ト其^中男

兒三万五千五百四十三人ニシテ女兒三万

千八百五十人ナリ然レハ此病ニテ死スル者

男兒ヨリハ女兒多クシ○千七百五十五

年ハ^一一年申ニ五千八百三十二

人死ス其他通例ノ年ト○千七百合

リ二千八人マデハ死スルナリ

雖モ

○此病流行スル中ハ其地ヲ離レテ流

行セサル所ニ行テコレヲ避ケ或ハ流行

ノ地ニアレモ種々^百計ニテ効メ

テ其傳染ヲ防キ避ル中ハ必ス此病ヲ

免ル^一其故ハ諸方ノ旅客コレヲ傳染

シ来リ或ハ衣服或ハ賣物等ニ此毒

浸染シテ國中彼此各所ニ年中多

ク流行スル^ト幾^ト痘瘡ノ如クナレバナリ

○布帛
○未

- Cedum palustre. L.)
Wilden rosemary (rosmarinus sylvestris,
Linn. etc.)

○其毒種子ヲ殺シ或ハ其執力ヲ衰
弱セシムルサ条劑ヲ用レハ此病容易ク
治スヘシ此ハウルトンロセニイン
分量適宜ニ取リテサ条湯ノ如ク沸湯ニ浸
出シ勉メテシバク飲シムヘシ

○リツテルハシリ子ノ説ニ左ストゴツトランド
國ノ旅行中ニヨ守常ノ民家凡テ右ノサ条
ヲ此病ニ用テ良効ヲ得ト云ヘリ

註 ハールトマン人并ニウリハリン人此病ニ
吐劑ヲ用イ能ニ右ノサ条葉ノ浸湯ニ乳

○ヲ或ハ濃クシ或ハ淡クシテ此ニ

汁或ハ牛酪清ヲ加ヘテ兼用ス又此
劑ヲ痘瘡流行ノ時此效ヲ發スル者
ニ用ユ○カルマル地ノ民家ニテウアルボム人
此病ニ吐劑ヲ与ヘ且右ノサ条葉ヲ用テ
治セリブロム人ハ吐劑ト右ノサ条葉ト
合シ用イテ良効ヲ得ト云ヘリ
○右ノサ条葉ハ卑湿泥沼ノ地ニ生ス此
ヲホツアノ蔓草ニ代用シテ麦酒ヲ醸ス
然レモ此麦酒ハ重キ頭痛ヲ發スル
故ニ用ユヘカラス

○ノ茶局

○此病ニ射廉香ヲ用テ良効アルヲ云フカ
ラスエングルス^{名國}ノ人トヤリ此病ニ^{大ニ}称譽セ
リ又ヒユルレル^{名國}ノ書ニ射廉香清涼飲ヲ
ロンデン^{名國}ニテ製成ス如クシ^{此方効篇中疥癬}
四十八葉マテヲ取テ一飲ノ休止セル時ニ通
例ノ食匙^{匙四}ニ一抄ヲ用ユ^{但シ}其休
止セル間ノ長短ニ從テ此劑ヲ多ク少ク
用ナルナリ予今マテ此劑ヲ用ユルノ
時宜^イナクシテ未タ試ミズト雖モ大氏此
病ト同様ナル諸症ニ用イテ良効ヲ得

○此病ニ

ルニ由テ考ルニ此劑ハ少シモ危^アブムベキナ
リ^ナ多ク利益アルト明白ナリ
○諸一医家^一コノ病毒多ク種子ノ細
虫^虫ヲ殺ス所ノ種々ノ茶劑ヲ試ミ用ヒ
此^ニ由テ熱病ニ瘡^瘡疹^疹ヲ兼ル^ル一症ニ効ア
ル^ル茶劑此病ニ亦効アルヲ經驗セリ
○註 ハールト^名ノ説ニ此病ニ吐劑ヲ用イ
テ後消熱皮ニ射廉香ヲ加テ用ユルニ前

Lecithinum (phoca vitulina)

説ノウルトンローセマイン 鱈葉ヨリハ大ニ
速効アリト云リ

○近年ゼーホンデン 海獸ノ名ノ脂ヲ用テ効

アルヲ知レリ此脂四匁ヲ牛乳九十六匁ニ

加テ煮ル一八分時ニシテ其乳汁ヲ大食

半歳ヨリ一歳マテノ小兒ハ毎朝毎夜一

食匙 四ツ 用エコレヨリ年長セル兒ハ其

服量ヲ増シ加ルナリ此ニ由 既ニ 經久ノ飲ト

雖モ大氏ハ日許モ用レハ治スルナリ

○ 毒瘡 敷滴ニ雞子黃一箇ヲ和シ用

テ遂ニ此病ヲ治スル一ブスジノ人ノ經驗

説ニ見ユ一此病ノ初發ヨリ此ヲ用テ治

スル一アルヲ明證セリ

○モルリス名ノ説ニ 効 消熱皮ヲ

加用イテ此病九日或ハ十日ノ中ニ治スト

云一リ予予按スルニユレ一尤モ速効アルベキ

劑ナレハヨク經驗シテ実効ヲ見ハスヘシ

○ ヒラスレア 毒瘡 煎膏ヲ丸ヲ糸トシ凡

テ瘡 瘡 瘡ノ效嗽ニ用イテシバく良効

ヲ奏セリ 瘡 瘡ニハ効アルヤ予未タ試

Extract nicotiana

poly aqua pulegium.

Syr. corall. spiri. nitri dulc.

此劑 毎朝 毎夜 二匙 ツ 用エヘレ 予他
ノ劑 ヲ 用イテ 効ナキモノニ 此劑
ヲ 用イテ 良効ヲ 得ル
○ミルレル 名ノ 書ニ 阿魏ヲ 此病ニ 用イ
テ 良効アルヲ 記セリ 此ハ 阿魏一
匙 半 或ハ 二匙 ヲ 沸水 中 四十八 匙
或ハ 二十四 匙ニ 溶化シ 其症ノ 輕重ニ
從テ 服量ヲ 多クシ 一日ノ 中ニ 用ル

右調勻ス

甘硝 甘糖 八 方

naphtha nitri, en, spiritus aethereus froben,
iii.

Stoop van tabak.

用イース

註 重キ 欬嗽ニ 喘息ヲ 兼ル 症ニ 煙草

舍利別ヲ 用イテ 大効アルヲ 云フセルハト

キリニシ 書ニ 明證セリ

○ナプタ ニツトリ 劑 并ニ スピリタス マエテ レウス

フロベニイ 縮ノ 兩劑 此病ニ 大ニ 稱賛セリ

註 次ニ 記ス 劑ヲ 右ノ 劑ニ 代用シテ

効同シ 空ル、ホフ 名ノ 此病ニ 用イテ 大ニ 稱

賛シ 四週ノ 中ニ 全治スト云ハリ

赤珊瑚 舍利別 六十四 匙

○其勢ヲ
避テ

○予ガ所
謂ル

○書ニ著
ハレテ

但シ此病劇盛ニ至リ其欬頻リニ
奈スル者ハ此劑ヲ休メ或ハ此ニ他ノ劑ヲ
加ヘ用ユルコトアリ

○右説ク所ノ外ニ此病ヲ除治スル法ハ
輕キ吐劑ヲ用イテ真ノ起因タル病毒
ヲ驅泄シ除クナリ此法ハアスセツソル
ストラドベルク人ノ書ニ證説シ又
ベルグストラル人ノ書ニ稱賛シ又
フランス國ノ医バセヒルレ
ハ此病ニ輕キ吐劑ヨリ外ニ用ルコトナク
此治法ヲ千七百五十二年ニ
パレイス國ニテ

刊行セリ

○不學子粗具ル庸医ハ此病ノ小兒ニ
浸リニ多ク吐劑ヲ用ユ然レモト大人
ヨリハト吐劑ニ能ク堪ルト見エ然レモ小兒ノ
神經ハ大人ヨリハ感動觸徹シ易キユ且
ニ人カ量少許ニシテ用ユヘシ○凡ソ小兒ノ
凝體諸物ハ軟弱ニ柔撓ニシテ拘強
ナラス亦身体ニ諸液過多ナリ此ニ由テ
却テ吐シテ危懼スルコトナシ
○イペカコアチ草根ハ吐劑ノ危懼ナキモノ

ovinum emeticum.
 essentia antimoni van huet ham,
 ferus mineralis, tartarus emeticus,
 "pitacionis. regulis antimoni.
 sulphur antimoni auratum tertiae praei

アウラチウム テルチアエ プラエニピタチオニス 製
註ケルメス ミ子ラレ 新局 タルタリエス エメチクス
新局 エッセンチア アンチモニ 製局 ヒキスハム 製局 ヒキスハム
 エメチクス 製局 等ヲ撰用シテ良効アリ但シ
 服量ハレキエリユス アンチモニ 製局 ノ服量ニ從テ
 多クスヘシ 室函曰ク一餅 ヨリ三餅ニ至ル 聲言ハタルタリエス エメチクス
 一餅 磨白糖三十一餅ヲ加、極細末トシ此
 ヲ分テ八服トシ 患兒ノ欬間靜ナル
 時ニ右ノ一服ヲ取り水ニ乳汁ヲ加、タル液
 ニ和シ一日ニ一服ヲ与フ如此製スル中ハ其乳

ナリ故ニ一餅ヨリ六餅マテ用イ且ツ年齢
 ノ少長、体力ノ強弱ニ從テ尚其余モ用
 エヘシ但シ欬ノ間靜日劇シカレサル時ニ
 用エヘシ (麻疹篇ト参考スヘシ) 一回或ハ
 二回用イテ十分ニ吐スル者ハ三回用ル
 勿レ或ハ十分ニ吐スル者アリ
 或容易ク吐セザルニ由テ數回用ル者アリ
 如此數ク用セテ過シキカユエニ其ツ
 症ニ從テ多少ニ用イテ全功ヲ收ムヘシ
 ○イペカコナ 端ノ代リニソルアルアンチモニクス

○其説曰ク

○即チ

汁ノ色亦変セス——甘味アルニ由テ小見コ
レヲサ条汁ト思ハス服スルナリ但シ右ノ合
量ニテ吐セサル者ハ八分時過テ又一服ヲ
与フヘシコレイベカコアナヲ用ル法ト同シ

註 コロツス名此欵ニソルプルアウラチユム

アンチモニウム テルチアエ プラエシピタチヲニス
ヲ用イテ良驗アルヲ甚タ稱譽セリ。
此病ニ他ノ諸サ条亦効ナキ者ニ甚タ
治驗アリ。次ニ記ス散劑ヲ一時半毎
ニ用エヘシ

其方

白沙糖 十二片

アラビアゴム 八片

アンチモニウム ゲアポレチカノン アブリユチ

焔 五片

淨焔硝 三片

ソルプリス アンチモニ アウラト テルチユム

プラエシピタチヲニス 製劑名 帝田書局 創
録又續 半片

右各細末トシ調合ス

右散劑分テ十六服トシ用イテコノ頑固

○血液中心
○運動星
○蒸氣ヲ
○肥瘠ト
且ツ

ノ致嗽ヲ治スル一勝テ數フヘカラス此
 劑吐下スル一ナク唯ヨク表茂ノ蒸氣
 ヲ發ス蓋シ表茂ノ蒸氣壅遏シテ
 体中ニ伏留シ或ハ瘡疹ノ類ヲ抑遏
 内伏セシムル中ハ酷厲毒ヲ生スコノ毒母胸肺
 侵刺スルニ因テ胸肺ニ牽掣ヲ抽掣
 シ一此致嗽ヲ發ス此劑則チ酷厲
 毒ヨリ生スル所ノ牽掣ヲ抽掣ヲ鎮
 止スルユエニ此病自ラ治スル
 所以ナリト一彼以爲ク此病ハ酷厲

○飲

毒ヨリ生スト又以爲ク
 一熱病ニ瘡疹ヲ兼ル症流行スル時
 ニ一殊ニ此病流行ス故ニ此病ト瘡疹
 火斑瘡ト甚ク相近シト一又一
 家ノ小兒痘瘡或ハ赤斑瘡ヲ患レハ
 他家ニハ同時ニ此致ク一患ル者
 多ク又此病ヲ久ク患ル小兒ハ痘瘡
 或ハ赤斑瘡ヲ免ル者甚ク多クト
 ○吐劑ヲ用イテ吐シ始メル中ハ小兒ノ口ニ
 適スル液ヲ多ク飲シムヘシ

風雲堂

欵治スルマテ勉メ用エシ但シ吐劑ハ
 病勢ノ德靜ナル日并ニ欵ノ暫ク休ム
 時ニ用エシ又其吐ノ多クハ勸ヘ量
 リテ其服量ヲ増減スヘシ○然レモ此
 欵既ニ発止前章ニ此病隔日ニ劇ヲ失ヒ間ニ
 日ナク毎日較著ノ寛暇ヲ覺ヘサル
 者ハ欵嗽頻リニ劇ク一発作ニテ後稍
 靜止ノ時ニ速ニ吐劑ヲ用エシ
 註吐法ハ此病ニ必ス良効アリ予
 シバク經驗セリ但シ輕キ吐劑ヲ用テ

後輕キ下劑又譬ハ大黃劑ヲ用イテ
 毎イモ次良効アリ但シ此下劑ニケルニケルスミテ
 方局一碎許ヲ加テ尤モ良

○患心兒甚タ多血ナルカ或ハ欵發作ノ時
 衄血ヲ發スル者ハ刺絡スヘシ

註總テ此病刺絡シテ良ナリ此ニ由テ
 此病ニ發スル種々ノ險症ヲ防止スルナリ
 ○大便秘塞スル者ハ浣腸法ヲ施スヘシ
 ○小兒久ク此病ヲ患ヒトトキ既ニ甚タ
 虚脱シ尚且吐劑ヲ用ル者ハアツセストル

○此時

ストランドベルグ名ノ説ニ從テ宛モ間歇熱ニ
用ル如ク消熱皮ヲ用ユヘシ

(註) 千七百七十二年ノ夏ゴツチンゲン^國
テ此病流行ノ時ニハ吐劑ヲ用イサレハ
治スル^ト能ハス^予多クコレヲ療スルニ小
兒年齡ノ度ヨリハ吐劑ノ服量多ク
用ユレ^氏最幼ハ吐スル^トナシ故ニ皆先ッ
凝結ヲ^疏解スル^サ茶劑ヲ用イテ其膠
固ノ粘液ヲ^稀解シ^シ神經ヲ^纏縛^ヲ
解脱シ而後ニ吐劑ヲ用レハヨク吐スルナリ

○粘結セリ

ag. pileusim

○一小兒生レテ三月ニシテ此病ニ罹ル其
年齡ニ應シテ吐劑ヲ子フルニ吐セス此ニ由
テ其兒見五歳ナル者此病ヲ患ル時ヨク
吐セン所ノ服量ヲ以テ此兒ニ用ルニ吐セス^{且ツ}
其粘痰稠固ニシテ^毎次^イ
手指ニテ喉ヨリ引出スニ宛モ絲ヲ引
カ加○此ニ由テ左ニ記ス^解凝^劑ヲ用
テ後吐劑ノ^効ヲ得タリ

ボレイ水^草

オキセイメルスギユイルリ^新

アシワヒユル
キユム
風

リギユラルテルテホリアタカクナリ
製衣新名新
局名出

舍利別

右四品分量適宜調勻ス

○吐劑ハシキセイメルスキユイルラ局新ニ

イペカコアチ草ヲ加此ニ適宜ノ露水ヲ加

一テ溶解シ用ルヲ良トス又其症ノ輕

重ニ從テ毎日或ハ隔日ノ午前ニ吐

劑ヲ用エヘシ膏ニ初發ノミナラ既ニタス日ヲ

經具他ノ諸藥ヲ用ル者モ皆良効

アリ此ヲ用テ吐スル日ノ夜ハ欵大ニ靜

止ルナリ但シ隔日ノ夜ニ發作スレ氏輕

クシテ且速ニ休ムナリ

○予此病ニ解凝劑吐劑下劑ヲ与ヘ

スレテ消熱皮〇用ルニ吐スル十クシテ

其欵自テ治セリ此ハ消熱皮ノ煎湯

ニリキユラルテルテホリアタタルナリ局新ヲ加

テコレ初メニ用イ其後ハ消熱皮ノ用イ

或ハ此ニ海狸香ヲ加用エ但シ此欵治

スト雖モ其後暫ク此劑ヲ用エ然

ラサレハ復々再發スルナリ

○ウエイット名ノ説ニ此病未タ吐劑ヲ用
イステ肺壅塞セルモノニ初メニ消熱
皮ヲ用イテ良効アリト云リ○ビスセツト
名ノ説ニ消熱皮ニ和胸劑ヲ加用テ
良ナリト云リ但シ其效日ニ增長スル
片ハコレヲ靜止センガ爲ニ殊ニ服量
多ク用テ其粘痰ヲ稠厚ニシ且ツ
欬嗽モ増劇ス然レモ特ニ
——此病——久ヲ経ルモノハ確證
テ此劑ヲ用イ專ラ患者ノ精カヲ保

持シ病ノ内攻ヲ防キ或ハ鷄腫狗傳
病、勞瘵ノ如キ諸病トナルヲ防止ス
此故ニ患者ノ精カヲ十分ニ復センカ
爲ニ病治シテ後マデモ持長シテ此
劑ヲ用ユ但シ此ヲ病ノ間日ノニ用ルナリ
○此患者衰弱スル者ハ牝驢馬ノ
乳汁極メテ良ナリ此ニ由テ身体ヲ
滋養シ漸次ニ精カヲ補益ス
○此病治スルノ候ハ第一ニ其熱減シ或
ハ全ク解ス第二ニ呼吸ヲ爲シ易シ

第三ニ間靜ノ時漸ク長クナルナリ
○若シ此病ニ由テ弛腫ヲ発スルモノハ速
ニコレヲ收メ容レ此ニ押綿布ヲ置テ適
宜キ 襪 縛帶ヲ施スヘシ

小兒哮喘篇第二十終

小兒黃疸篇第二十一

○黃疸ハ年齢ヲ論セス木ノ患ル病ト
雖モ小兒モ亦レバク発スルユエ小兒病ニ
算入セリ コレヲ

(註) 此病ヲ患ヒテ生ル小兒予未名

見ス然レモセイルヒウス 名人テヲドル 名人

名其他先哲ノ書ニ多ク記セリ

○ウリスベルク 名人ノ書ニ曰ク婦人妊身中黃
疸ヲ患心〇其見一ハ黃疸ヲ患心テ生ル
者リ如此小兒ハ多クハ死胎トナリ或ハ月

〇ルニ因テ

満スレテ生レ、或ハ生ル、トイヘ氏無幾死ス。○予亦右ノ如キ患兒二人ヲ見タリ

○婦人妊身中黄痘并ニ如此種類ノ病ナクシテ其兒黄痘ヲ患テ生ル者

セイルヒウス名人ニバク見タリト云ヘリ然レ予按スルニ初生兒ノ皮膚層大色赤色

ヲ常トス但レコレニ多少微甚アリ亦一様ナラス皮上ノ表被細屑ノ如ク脱

サ落スルニ由テ黄赤色トナルヲアリ彼説心クハ此ヲ見テ黄痘トスルカ疑フヘシ

○十二指

○此病ハ膽液ヲ肝ヨリ腸ヘ輸ル管ニ

○或ハコレガ

肝管或ハ膽液ヲ肝ト膽ヨリ十二指腸ヘ輸ル管ト名ク。○十二指腸ニ注入スル管口

是レ總管ノ孔ナリ。○十二指腸ニ由テ膽液ガ十二指腸ニ注泄スルヲ能ハサルヨリ起

ルナリ。 (註) 膽管ニ膽液ヲ輸ル管ナリ。并ニ膽中ニ

結石アリト雖モ黄痘ヲ発スルヲナシ特ニ總管或ハ其十二指腸ニ注ク所

ノ管孔ニ結石空塞スル片ハ黄痘ヲ

八十二指腸ノ膜間ヲ斜メニ通行シテ其腸ノ裏面ニ細孔ヲ用クガユエニ壅塞シ易キ所以ナリ

○乳養食ノ小兒ハ其腸胃ニ酸敗

液アリテ其飲ム所ノ乳汁ヲ泌別スルハ

乳汁ニ酸液ヲ加レハ清濁相泌別シ其濁ハ凝固シ其清ハ稀液ニ凝結セル酥ノ如キ乳塊ニ壅塞スルナリ或ハ穀粉ニテ造ル稀キ糊漿ヲ以テ小兒ヲ養フ者モ亦コレガ凝結シテ夫ノ管孔ニ壅塞ス

○或ハ小兒酸敗液アリテ此ガ

侵刺シテ腹痛ヲ發スルハ十二指腸ノ

嚙ム小兒ハ面部黄色トナル予多ク

○既ニ乳ヲ離レテ他ノ食物ヲ食フ小兒

ハ自家ニ於テ過食ヲ禁ストイヘ凡動モス

レハ自ラ他ニ行テ貪食飽食シ且ツ細

カニ咀嚼セズ或ハ未熟ノ果瓜或ハ性良

○既ニ乳ヲ離レテ他ノ食物ヲ食フ小兒

ハ自家ニ於テ過食ヲ禁ストイヘ凡動モス

レハ自ラ他ニ行テ貪食飽食シ且ツ細

カニ咀嚼セズ或ハ未熟ノ果瓜或ハ性良

○既ニ乳ヲ離レテ他ノ食物ヲ食フ小兒

ハ自家ニ於テ過食ヲ禁ストイヘ凡動モス

レハ自ラ他ニ行テ貪食飽食シ且ツ細

カニ咀嚼セズ或ハ未熟ノ果瓜或ハ性良

ナラガル堅硬ノ物ヲ食シ此ガ田胃ニ任ス
且ツ消化スルヲ能ハサレハ其食物過
多ナルニ因リ或ハ堅硬ナルニ因テ腸ヲ壓
搾シ或ハ侵刺ニテ牽急牽縮シ夫カ管
孔モ共ニ閉塞ス○右説ク所ノ乳養食小
兒ト離乳小兒トノ諸因ハ皆一膽液
正ニ十二指腸へ注泄スル自然ノ常道ヲ
阻遏スルニ足レリ

○或ハ小兒吐利ヲ用ユキ一二ノ所由アリ
テ大ニ吐セシメ或ハ急暴ノ庸医ニ托シテ

○牽急
絞

峻攻ノ下利ヲ用イテ烈ク泻下シ或ハ蛔
虫ノ侵刺スニ因テ腹痛ヲ發スル等ノ
苦件アル片ハ其○痛自ラ腸胃ニ彌
蔓シテ夫ノ管孔モ牽縮閉塞シ黃
疸ヲ發スルヲ屢多シ

○小兒久ク間歇熱ヲ患ヒ或ハ發作次序
ナキ片ハ終ニ惡性ノ黃疸

トナル者多シ又如此間歇熱治シテ復
タレバク再發シ或ハコレニ嘔吐ヲ兼ル
者ハ特ニ黃疸ヲ發シ易シ或ハ病症

○于内藏

ノ劇成盛ナルト久ク犹旨雷スルトニ由テ内
部甚ク衰弱シ血液腐敗シ此ニ由テ壅
塞或ハ硬結腫ヲ生スル者亦黃疸ヲ
發ス以上ノ諸症皆膽液ノ十二指腸
ニ注泄スル管道ヲ牽縮スレバナリ
○右説ク所ノ諸因ニ由テ膽液ノ注
泄ヲ壅遏スル中ハ膽液聚ク其管ニ
聚滿シ膽藏ニ逆流シテ膽貯聚滿膨
脹シ此ニ後テ其管モ膨脹廣闊ニ
ナリ其膽液ガ膽ト其管トノ神經ヲ

侵刺衝動シテ一箇ノ括ヲ發スルナリ
○胃ノ神經ト肝ノ神經ト近ク相交ル
ニ由テ田日モ其患心苦ヲ共ニシテ一食ヲ
好ムノ機ヲ廢シ胃痛ヲ患ヒ惡心并
ニ嘔吐ヲ發シ呼吸重難——或ハ
——安眠セス——啼叫シテ乳
ヲ嚙ムコトヲ欲セス亡胤瘦ス
○前説ノ如ク膽液通過泄ノ常道ヲ失
フテ膽ト其管トニ充滿スル中ハ止ムコトヲ
得ス水脈中ニ逆流シテ靜脈ニ入り血

中ニ混濁ス(此説ベイウル名ノ書ニ詳ナリ)乃チ血中ニ混濁スレテ速ニ入身ニ彌蔓シテ皮中ノ微細ノ血絡并ニ纖毫ノ水管マテ普ク布满ス

○此ニ因テ物惣身黄色ヲ散シ特ニ眼ノ水液、頭顱、爪甲ニ甚ク顯著ナリ或ハ其小便ニ綿布或ハ白紙ヲ浸セハ黄色ニ染ミ縹緞并ニ裯蓐モ其汗ニ染リテ黄色トナリ唾涎并ニ舌下ノ血脉モ黄色ニ見ヘ身体ノ脂垢モ亦黄色トシ其ハ

○ヲ患ヒテ

血中ヨリ分泌スレバナリ○又脳髓、胸腹内ノ諸藏、諸筋、諸膜、諸骨、軟骨モ黄色トナリ又血マデモ黄色ニ見ユト一貴婦黄疽。脇肋痛ヲ兼又予コレヲ數回刺絡スルニ其血黄色トナリ

註此病ノ一其黄色ヲ見ルニハ晝日ニ見ルニ燈火ニテハ見ヘ難シト一或ハ頭髮及マテモ黄色トナル者アリトシケンキ名ノ書并ニワイドリシ名

ノ書ニ見ヘタリ

○膽液ハ味ヒ苦シ故ニ患者ノ食ナリ
物皆一苦シ或ハ幾多ノ医家ノ実
驗税ニ一患者ノ一見ル所ノ物皆黄
色ニ見ユル者アリト云ヘリ

○膽液ハ酷厲ナリ故ニ皮膚層甚タ痒
シ大人ニ此病ヲ患ヒ且ツ長ク稽留スル
症ハ殊ニ夜中甚タ搔痒ヲ癢シテ堪
忍ビ難シ

○膽液ハ精微ナル石鹼質ナリ故ニ甚

○ルナリ

夕凝結ヲ溶解ス此ニ由テ此病ニ於テ
ハ血ガ血脉中ニ保容維持スルヲ能ハ
サルホドニ溶解稀渾ス故ニ經久ノ黄
疸ニ於テハ心ルヘキ失血或ハ水腫ヲ
癢スルヲアリ

○腸中ニ

○膽液既ニ十二指腸ニ注泄セサルニ由テ
酸敗液増生シ患者腹痛ヲ癢ス
又此ニ由テ食物モ適宜ク消化スルヲ能
ハス從テ乳糜モヨク製造セズ腹硬
満痞脹シ凡氣鬱塞蓄ス又膽液

○此ニ因テ

注入セサルニ由テ大便ノ常色ヲ失ヒ白
色トス但シ初生児ノ胎屎尚存スル
者ハ黒色ナリ

〇右説ク所ノ諸見症ニ由テ此病タル
明白ニ知リ易シ則チ眼ノ白膜、顛顛
額ノ物惣身ノ黄色ヲ以テ知リ或ハ小便
大色稠濃ニシテ澄滓アルヲ宛モ赤石
ノ粉ノ如ク或ハ小便ニ綿布白紙ヲ浸セハ
黄色ニ染ミ或ハ大便白色トナリ且ツ
大氏秘結スス或ハ物ス心ステス食物

ヲ嫌ヒ腹中雷鳴シ心窩ツツ觸徹スル
甚シク又右腋下ヨリ最下ノ肋骨ニ連子
テ痛ヲ覺ヘ乍痒痞痞ス

〇黄疸西心性ナル者ハ涎唾黄
色ニシテ粘稠又舌黄、食物皆苦ク
黄汗ヲ発シ其身ニ飾ル銀具モ亦黄
色トナル〇夜分ハ皮膚層甚ク痒久眼
昏ク或ハ物心テ視ル物皆黄色ナル者
アリ

〇小便ニ光澤ノ物見ユルハ黄疽頑固

ニレテ退キ難キノ候ナリ

○幼見ニ此病ヲ発スルハ治シ易シ

年長シタル見ハ其病因ノ一チラサルニ由テ

或ハ治シ易ク或ハ治シ難シ

然^正一^早ク医療ヲ加^ス適^宜ク保

護ヲ為^サレ^分烈^キ腹痛、痾^瘕ヲ発シ

死スヘシ

○黄疸ニ熱ナキ者ハ熱ヲ兼ル者ニ比ス

レハ治シ易シ○此患者物惣身周ク温

煖ナル善汗ヲ発シ小便^黄色ニレテ泡

コレニテ
從来

夕^夕ノ黯^黄色^黄黒^黄色ナルモノ漸次ニ平常

ノ色ニナリ始メ大便自然ニ通利シ且

黄色トナルモノハ速ニ回復スル候ナリ

○微汗ヲ発スルニ由テ搔痒消散スル

者ハ其黄色モ速ニ消散スルナリ

○此病ノ治法ハ病因ニ蹤^跡シテ施スヘシ

初生児ハ腸中ニ^糞蓄^カル胎糞ハ

粘稠^汚物ヲ輕キ下劑ニテ驅除スレハ

容易ニ治スルナリ此ハ刺蜜ニ大黃ノ細

末一二^分加^ハ用イテ良トスコレヲ一時半

Diapylis cichorei cum rheo.

或ハ二時毎ニ茶匙ニ一杓ツ、匙子フヘシ但
シ一患者腹鳴リ大便通利スルマテ
用ユヘシ此ニ由テ黒糞其ニ粘稠汚液
適宜ク通泄シ大便一黄、色ニナル共
黄疸モ一治スルナリ

(註)此症ニ一他ノ下劑モ用テ良効アリ
予既ニ大便閉篇ニ註セリ宜ク撰用
スヘシ○小兒ハ嚙ム所ノ乳汁酸敗液
ニテ泌別セラレテ凝結シ自ラ十二指腸
ニ停着シ膽液ヲ注泄スル管口ヲ

阻遏シテ黄疸ヲ發スル者甚々多シ

此症并ニ前後ノ症モセイリユアスニコレイ

キユレヲ花甘葛根加大黄
舍利別ナリ局方出ニスパーンセ石鱈

少許ヲ加ヘ用テ大効アリコレヲ飲劑

ニ和シ匙ニテ用ユヘシヨク其凝結ノ乳汁

ヲ稀解シ腸ヲ清除シ粘稠汚

毒ヲ配泄スルナリ

○初生兒ヨク乳ヲ嚙ム中ハ其母ノ初乳

ニテ大便浮利スルユエニ他ノ甘菜劑

ヲ用ルニ及ハスナリ○然レ腹中ノ瘴毒

絞急スルヨリ黄疸ヲ癸スル者ハ其劑ヲ
 用ユヘシ如此症ハ先ツ酸敗液アルヤ否ヤ
 ヲ診察スヘシ酸敗液ノ候ハ腹痛篇
 并ニ嘔吐篇ニ詳説ス此ニ據テ容易ク
 弁スヘク又其一酸敗液ヲ驅除スル論
 中ニ於テ適當ノ薬剤ヲ撰用シ而後刺
 蜜ノコンセルヲ大便秘ヲ用テ大便ヲ通泄シ
 又其母并ニ乳母ノ食物養生ヲ慎ニ
 乳母篇ニ説ク如ク慎ニ守ルヘシ
 〇年長セル小兒粘稠ノ食物穀粉ニテ

造ル糊漿其他如此類ヲ食シ或ハ常
 ニ過食シ特ニ性良ナラサル物或硬軟
 ニシテ消化シ難キ物ヲ食ヒ
 或ハ食ヲヨク咀嚼セシテ嚥下スルハ
 腹痛脹硬満ス〇右ノ諸件アリテ黄
 疸ヲ癸スル者ハ温湯或ハ大麦酒
 清下利ニ淨蜜去火許ヲ加ヘ一勉テ類
 リニ多ク飲シムヘシ此ニ由テ膠粘ノ液ヲ稀
 渙シ且ツ溶解シ而後ニ吐劑ヲ用イテ容
 易ク吐セシメンカ為ナリ吐劑ハ麻疹篇ノ

Vinum albiticum alcalinum, Pharm. Lond.

右七日或其余モ浸出シ紙ニテ濾シ貯フ

白蒲桃酒 百九十二匁

硝砂 六匁

波サ条 各八匁

洎夫藍

上好蘆薈

鹽蓬塩 六十四匁

註 ヒヌムアロエチクムアリカリヌム方 ハル・ロンド

テ用テ良好効アリ但シサ条局ニテ水ヲ加テ制衣ス酒ヲ加ヘス制衣スルヲ良トス

elixir proprietatis boerhaavii sine acido

○如此症ハ

第一限治法中ノ散劑ヲ用イ適宜トヨ其病毒ヲ除クヘシ○然レ患心者自然ニ嘔吐ヲ発スルヲ多シコレニハ吐劑ヲ用ルニ及ハス○吐シテ後ハ輕キ下劑ヲ用ユヘシ常ニ必ス良効アリ○貧家ノ兒ハ予エリキル
プロフリータチスブルハーヒシ子アレド名劑ヲ毎日六滴八滴或十滴ヲ薄荷浸劑ニ蜜アツテシキセヲ加甘クシタル液ニ滴シ用テ良好効ヲ得○此症ニロンドンセサ条局ノヒヌムアロエチクムアルカリヌム註ヲ每服十五滴ヨリ二十滴マ

arcanium tartari
elixir hepatium.

(Tinctura rhei amara wimburgensis cum vino)

bitter extract van rhubarben met wijn

○ 4 ンク 4 ヌラ レイ アマラ エ 4 ンヒ ヌグセ キユム

ヒ川 劑名 下利篇 第二種 治法 註 ヲ一日ニ糊漿匙ニ一抄或ハ

ニ抄ヲ用イ或ハ予ガ所謂ルエリキシルヘハキユム

次ニヲ用エシ此劑ハ一如此種類ノ黃疸

ニ用イテ良効アラザルハナシ其方左ノ如シ

○ エリキシルヘハキユムノ方

上好大黃 剉 六十四枚

アルカヌムタルタリ 酒石製劑 名後 二十四枚

桂水 酒ヲ加ルナク 露水ヲ滴スル者 七百二十枚

右微温ノ處ニ置キ其器ヲ封固シ四

週ノ間浸シ置キ其間ニバク攪動

シレ而後次ノ材料ヲ加フ

橙皮黃 剉 十六枚

益智仁 剉

茴香子 各四枚

右浸ス一八日其間ニバク攪動シ其

滓底ニ沈テ後ヨク搾絞シ此ニ次ノ液

ヲ注キ加フ

花蔘根 剉 綿布ヲ以テヨク絞リ 過スルモノ四十八枚

白沙糖 百九十二枚

右每服糊漿匙二三枚ヲ用ユ

右ノ劑ヲ用イテ大便軟通シ右腋下ノ患

症退ク者ハ患者ヲシテ冷氣ニ觸レシムル

ナク効メテ温煖ニ保護シ毎日接骨

木花ノ湯劑ヲ數回用ユシ此ニ由テ

不斷表茂ノ蒸氣ヲ進起シテ皮膚層

ノ黄色ヲ速ニ發散シ除クナリ

○嘔吐スルニ因テ黃疸ヲ發スル者ハ第十

七篇ニ説ク如クスレバ嘔吐ニ靜止

スルナリ而後前説ノ接骨木花湯

劑ヲ類リニ用イテ其黃疸ヲ治スヘシ

○峻攻ノ劑ヲ過用スルニ由テ黃疸ヲ發

スル者^効患^者者ヲシテ速ニ吐セシムヘシ此ハ

微温湯ニ無塩ノ乳酪或ハ油ヲ加、飲シ

メ而メ鳥羽ニ油ヲ浸シテ咽喉ヲ探摩

スレハ速ニ吐スルナリ此ニ由テ其下劑多ク

胃中ニ遺ルモノヲ除クナリ又脂厚子ハ

薑薑汁或ハ温ナル乳汁ニ甘酪母ヲ加、テ

服セシメ或ハ乳汁ニ油ヲ加、テ浣腸法

ヲ施スヘシ此ニ由テ腸中ニ殘ル所ノ下劑

○速ニ

ノ毒ヲ甘和シ絞痛ヲ緩解シ且ツ
腸中ニ滋養液ヲ填充スルナリ○此
ニ由テ腹中ノ拘攣絞痛緩解スルハ
其黃疸速ニ治スルナリ○然レ此ニ由テ
胃衰備ニスルエ工ニ黃疸治シテ後一二
週ノ間ハ午ニキ午ニテレイヤマラエヂンビユケ
ン下利篇ノ註ヲ三十滴或ハ四五十滴マデ
毎日用工ヘシ

○虫以ヨリ黃疸ヲ発スル者ハ虫以篇ノ
二十三ニ説ク所ノ症候ニ由テコレヲ診察

シ其方法ヲ以テ治スヘシ

○間歇熱ヲ久ク患ハル後動モスレハ腹
硬脹スルナリ此ハ肝藏或ハ其近傍ノ
部ニ一箇ノ壅塞或ハ硬結腫ヲ生スル
ノ顯候ニシテ此ヨリ膽液ヲ通泄スル管
ヲ壓縮シテ頑固ナル黃疸ヲ発シ此ヲ
速ニ治セガレハ終ニ水腫トナルナリ○如此
種類ノ頑硬結腫ヲ疏解スルニハ久ク
時日ヲ俟ツニ非レハ功績ヲ收メガタシ
故ニ其頑痼ナル者ハ十廿条劑ニ久シク

Extract. rad. taraxacum.

堪^五テ用イ遂ルニ非レハ治スヘカラス○此症
貧家ハ第一ニ次ニ記ス丸ヲ糸ヲ毎日十
粒十五粒或ハ二十粒モ用エヘシ

○丸制方

子午ア石鹽 十六朶

製法

蒲公英根

淨之制

八朶

新局方

上好蜜 適宜

右調勻三碎ヲ一丸トス

○第二ニ下利篇第十二中ノ下利ノ第十二
種ノ下利ノ條下ニ記ス乳酪清ノ飲制ヲ每

○用エキ

服四十八朶或ハ九十二朶与フヘシ此乳酪清ハ
春月ニ絞リタルヲ下利篇ニ記セリ故ニ
他ノ時候ニ右ノ飲制ノ代リニ次ニ記ス飲制
ヲ用エヘシ

蘆根 二朶

蒲公英根 一朶

rad. taraxacum

右洗ヒ剉ミ清水百九十二朶ニ内レ者
テ沸騰スル一ニ回ニシテ慮過シ滓ヲ
去リ蜜少許加ヘテ甘美ト為シ用エ
但シ此飲制ハ毎日制衣スヘシ

○新々

○第三 肉羹汁ニ蒲公英葉、ケルヘル、
菠薐菜、蒿苣、其他如此類ノ蔬菜ヲ
加へ煮テ与フヘシ

○第四、毎朝毎夜毛布ヲ以テ八分時ノ
間、田ノ部^上ヲ摩擦シ而メ毎^イ次毛布
ヲ温醋ト油ニ浸シ絞リテ其部ニ貼スヘシ
又ドルレケルヘル羅回^シ草ノ名三握ヲ取り綿布
ノ裏ニ内レ沸湯ニ投シテヨク煎シ其裏ヲ
絞リテ適宜ク温煖タルヲ毎朝毎夜摩
擦シタル後ニ腹部ニ貼シ熨劑トス冷レハ

取出シ

Resvel

レバク換テ熨スヘシ

○第五、其見日^ハ常親ク交ル兒輩ト
遊戯シ舞蹈踊跳スルヲ奨メ殊ニ
天气晴和ノ中ニコレヲ為シテ又
年稍長シタル兒ハ馬ニ乗シメテ身体
ヲ運動スヘシ此志ニ甚タ良ナリ

○其他ノ治法ニ於テハ勉メテ飲食起居
ニ怠^レ意ヲ用エヘシコレ尙傳病^ハ篇ニ詳説セ
リ併セ考フヘシ

○富家ノ兒モ右ノ如ク治療ヲ施

extract. marrub. alb.

スヘシ然^ニ凡^ノ前^ノ説^ノ第一^ノ條^ニ稱^ス用^スル^ニ丸^系
ノ代^リニ^ストル^ク名^ノシキ^ウ夕^ノ毒^草ノ^凝膏^ノ製^成
新^局方^邊ヲ^用イ^ル或^ハ左^ニ記^ス丸^系ヲ^用
ユヘシ

○丸^劑ノ^方

石^鹼 十^支

大^黃

蘭^菊 濃^膏

タル^夕リ^{タル}夕^リサ^夕 各^十支^新局^方

淨^蜜 適^宜

右^調勻^三碎^ヲ一^丸ト^シ銀^箔ヲ^衣ト^ス
右^丸系^ハ凝^結ヲ^溶解^スル^ニ良^効アリ^毎
朝^毎夜^五丸^ヲ服^スヘシ^飲劑^ハ春^月ハ
前^説ノ^乳酪^清ヲ^用イ^ル他^ノ時^候ハ^前説^ノ
ノ^第二^條ニ^記ス^飲劑^ヲ用^ユヘシ

(註) 橙^皮 舍^利 別^或ハ^其他^甘美^ノ物

ニ^丸系^ヲ裹^ミテ^与レ^ハ小^兒服^シ易^シ
然^凡スト^ルク^名ノ^シキ^ウ夕^ノ丸^系ノ^如キ^ハ

小^兒絶^テ吞^下ス^テ能^ハス^如此^十支^片ハ

シ^キウ^夕ノ^製成^前ニ^一支^ヲ接^骨木^花

厚^雪堂

風^雲堂

moetel wine

水四十八匁ニ溶化シ此ニ覆盆子舍利別
新局舍利ヲ加ヘテ甘美ト為シ糊漿匙
別ノ条ニ出
ニ一抄之ニ毎日二回或ハ三四回用ユヘシ或ハ
シキウタヲ~~浸湯~~湯劑トシ用ユヘシ

○又前説ノエリキシルヘパチキユム或ハ左ニ
記ス所ノ凝結ヲ溶解スル飲劑ヲ毎服
茶匙ニ一抄之ニ且ツ下利セス唯大便^ナ適
宜ク通スルホドニ用ユヘシ

橙皮黄ハ 二十匁
クーセル^地酒 八十匁

arcanium tartari

右ヨク浸出し橙皮ノ味其酒ニ出ルニ至
テ後柔ヲ加フ

アルカヌム タルタリ 二十匁
右攪動シ溶解シテ後柔ヲ加フ

白沙糖 四十八匁

右攪動シヨク溶化シテ後濾過シ貯フ

○黄疽ノ患者總管^{十二指腸ニ膽液ニ肉塊}
腫ヲ兼ル者アリメーケレン^名ボ子ツト^名ノ書ニ
見ヘタリ或ハ右ノ管乾燥シ皺縮シテ管
孔ナキガ如キ者アリ或ハ其管^管瘻合閉着

スル者アリ共ニボ子ツトノ書ニ出タリ或ハ其
竹管石ノ如ク硬結スルアリコレ口ホゲイノ書
ニ見タリ或ハ其管ノ上部ハ廣シト雖モ
其管口總ツカニ一毛髮ヲ刺スヘキホドニ窄
クナル者アリボ子ツトノ書ニ出タリ右皆剖屍
シテ觀ル所ナリ○如此症ニ至テハ絶テ治ス
ルナク亦其如キ病因ヲ頭知シ雖シ此
ニ由テ諸般ノ黃疸ヲ尽ク治スヘキサ茶劑
アルベキニ非スト知ルヘシ然レ共世ニ黃疸ノ
良サ茶ト稱スル諸品所謂ル雌雞ノ嘔イフク

ノ黃皮或ハ雁屎ノ白色或ハベルケンボム赤楊ノ

ノ新芽ヲ濃キ麥酒ニ煮テ用イ或ハ泊夫

藍或ハ極時金或ハ黃龜膽或ハ乙切州其他

如此類多クシテ輕卒ニ信スル輩苟且

ニ試用スレ厄ヤ容易ク治スヘキニ非サルナ

勿論ナリ

○予既ニ下利篇ノ終リニ記ス患心者肝

ニ潰瘍ヲ生シ此ニ由テ膽液ノ道路ヲ

壓塞シ黃疸ヲ發ス其潰瘍遂ニ膽

ニ透蝕シ其膿自ラ膽ニ漏出し其後

或

○大ニ

コレガ膽管膽ヨリ總管ニ連ル管ナリニ通泄ス總管ハ壓塞スルナシ患者此症ニ偶前夜ノ雌雞啼ノ黄皮ニ准尿白ヲ加ヘテ細末トシ服シテ治セリ

○老年ノ婦人一年中ニ數回黄疽ヲ發ス其症毎イッモ次卒然トシテ胃部心苦悶シ惡心煩悶嘔吐發熱右肋下疼ミ而後一黄疽ヲ發シ終ニ下利ヲ發ス其後熱稍退ク患婦毎イッモ次或者ノ教ニ由テベルケンホム前ニ註スノ嫩芽ヲ濃麦酒

○然レモ

○ニ由テ

○此通テ

○數多ク

ニ者テ服シテ由テ其黄疽并ニ諸症モ皆愈エ故ニ患者此ヲ黄疽ノ神劑ナリト思ヘリ一二月ノ後復々發ス此ノ如クシバオ癩シテ全治セス患者仍右ノ劑ヲ稀用ス然レモ又或者ノ勸テ其發スル毎ニ刺絡ヲ施シ軟和スル浣腸法ヲ施シ諸症解ス其後胃部部并ニ右腋下ニ醋ト油トノ厨火劑ヲシバク施シ并ニ油多キ獨糖油乳ヲ數ク服スルニ由テ結石ト膽藏ヨリ出テ大便ニ通泄ス一是レ其軟和ノ諸法方ニ示ス

○結

由テ其石、膽管ヨリ總管ニ轉輸シ腸
 ニ下ルカ或ハ十二指腸ニ在ル所ノ總管ノ孔口
 ニ幾多石空塞セルモノ開通シ下ルカ
 何レ此兩件ニ非ルハ無し如此結石其管ヲ
 塞ヒテ黃疸ヲ發スルヲ故ニ其石大便ニ通
 泄スレハ其熱并ニ疼痛速ニ休ム然レハ夫
 ノ麥酒ノ功ニ由テ通泄スルニ非ス又其
 侵刺衝動セル結石并ニ膽液ノ數ク其
 管ニ聚滿セル膽液今開通シテ腸ニ
 溢流スル中ハコレニ因テ下利ヲ發シ其石

○スレト

モ通泄スル所以ナリ患者尔後右諸
 症ヲ屢發○發スル毎ニ幾多ノ石ヲ
 大便ニ通利ス此ニ由テ漸次ニ諸症減シ
 後テ黃疸モ全治セリ

小兒黃疸篇第二十一終

風雲堂

小兒間歇熱篇第二十二

○小兒幼メテ間歇熱ニ罹ルハ大人ノ

幼メテ此病ヲ患ルカ如ク甚ク久ク治セズ

或ハ保護ヲ怠リ療サテ其宜ニ適セザ

レハ發作次序ナキ熱病トナル如此ナルハ

ハズ左ニテ^國ニテコレヲアエルタシト名ク

ル^カク名クレ凡別病ニ非ス唯コノ發作次

序ナキ間歇熱ナリ

○此熱病ハ時日ヲ定メテ發起スコレヲ

發作ト名ク其發スル毎ニ^{コト}初メニ多ク惡

○三日ト
 寒シ而ノ発熱シ而メ発汗シ患症解ス
 其後復々発作スルマテハ諸症間歇ス
 ルナリ○其熱毎日一発スルヲ日発熱ト
 名ク隔日ニ発スルヲ間日熱ト名ク三日ニ
 一発スルヲ三日熱ト名ク○或ハ一種ノ日
 数熱アリ譬ハ朔日ノ発作ハ其時刻并
 諸症ノ輕重モ同様ニ發作シ二日ノ數
 作ハ其時刻并ニ諸症ノ輕重モ四日ト
 同様ニ數スルヲ重複ノ間日熱ト名ク
 ○二日同ク發作シ第三日ニ間歇スルヲ

○名ク
 重複ノ三日熱ト名ク○三日熱ヲ患ル者
 毎日一發作スルヲ三日熱ト變シテ日發
 熱トナルナリ此ヲ三重復ノ三日熱ト名ク其
 故ハ譬言ハ朔日ノ發作ハ其時刻モ輕重
 モ四日ト同様ニ發シ二日ト一ノ發作ハ其
 時刻モ輕重モ五日ト一ト同様ニ數ス
 三日ノ發作ハ六日ト同様ニ發スルナリ
 ○發作スル毎ニヨク慎ミ意ヲ用テ看護
 スヘシ然ラサレハ發作ノ次序ヲ失ナリ
 ○發作ノ時患者ヨク堪忍シテ汗ヲ發

○時日定
 リタル

○復々
○右ノ

○發スレシ其熱劇ク發汗セントスルキニ冷飲
ヲ用ヒ或衣蓐ヲ脱シ衣服ヲ更ハ或
ハ起立シテ其發汗ヲ妨遏スレハ此時又
新々ニ寒熱ヲ發シ或ハ熱ノミ發シ
此カ復々發汗スルマテハ解セサルナリ○如此
ノ過誤ヲ致シ再ヒ寒熱ヲ發スルモノハ
○發汗セサレハ解セサルユエニ發汗ヒテ自然ニ
解スルヲ俟ヘシ發汗ヒテ後身體ヲ拭ヒ
乾シ新々ニ清潔ナル襦衣ヲ更換ヘシ
○小兒ハ過誤ニ由テ小兒ハ本キト同歇熱

○愈發
作ラレテ
増劇セ
シム

ノ時日ノ正整ナル發作ノ次序ヲ錯乱ス○
凡ソ幼兒ハ發熱發汗中ノ患心苦ヲ啼叫
シテ知ラレムルヨリ外ニ方ナキユエニ其劇
ク啼叫スルヲ靜止センガ為ニ臥床ヨリ抱
キ取テ諸所ニ提推乃シ凡涼ヲ目ヨリ冷
気ヲ受テ發汗ヲ遏止ス此ニ由テ○然レハ
毎次適宜ク發汗セシメ其ハ一發作ヲ全
ク済ルマテハ患心者ヲ靜カニ保護スルヲ
肝要ナリ
○間歇熱ノ真ノ病因ハ余ト予漫リニ

臆察ヲ以テ示サス且ツ此病ヲ生スル所
以テ言フナシ

(註) 此病ノ初ニ発悪寒ヲ發スレモ仍無
病ノ人ノ身体ノ温煖ト同シ或ハ吾地
ノ候寒煖管ニテ計ルニ平入全ノ人ヨリハ
五度或ハ六度モ温煖多クシ

○此病ハ如何様ニシテ治スル。又幾許止
テ得サルナリトモコレヲ治スルニ就テハ徒ニ
時日ヲ俟^{イカセ}并ニ病性ノ自然ニ委任^{イカセ}テ利
益ヲ得ルナリ無レトス其故ハ他方ニテハ如

○ナリ

○ノ經ル

此ニシテ幸アルナリモ吾國ニテハ必スコ
レヲ信スベカラサルナリ固^{モト}ヨリ論ナシ○此病
火^カ間ノ發作ニ寒熱^{コモ}交^ク起リ精力虚脱
身体乏弱稀液自ラ汗トナリテ漏泄スル
ホドニ血液甚ク溶解稀渾シ、物心身ノ
脂胞減耗シテ瘦削シ面部色澤ヲ
失ヒ、萎黃色トナリ、内藏硬結シ、胃
痞脹シ水腫、并ニ如此類ノ病ヲ發シ^{ソノ}後
治スヘカラサル者アリ

○若シ小兒甚ク虚弱ナル者間歇熱ヲ秋

ニ於テ患レハ勉メテ速ニ治療ヲ施シ久ク
淹留セシメサルヲ肝要ナリ然ラサレハ此病
後尙樓トナル者多クシ

(註) 秋熱病ト名ルハ八月立秋六日前ヨリ

二月立春四日前ヨリマテノ間ニ患ルヲ云フ其

後ニ患ルヲ春熱病ト云フ○春熱病ハ
自然ニ治スルヲ多シ秋熱病ハ自然ニ
治スルヲナレ○秋熱病早ク流行スルホ
トイヨク此ヲ患ルモノ多クシ

○大人久ク間歇熱ヲ患レハ却テ利益

アルノ説アリ、高明ノヒリ名人重キ心悸動ヲ
苦シム其後三日熱ヲ患ルニ由テ心悸動
治シ壽齡ヲ保ツト云アリ○或ハ右胛疼
痛烈ク且ツ久ク治セサル者間歇熱ヲ患ル
ニ由テ治スト云アリ○一貴人多年左胛痛
ヲ苦シム千七百六十六年秋三日熱ヲ患ヒ
二三発ノ後其痛全ク解ス其後確砂
并ニ消熱皮ヲ用テ其熱病全治スレ復
夕其胛痛再発ス此痛消散スレハ其
毒痛ヲ發ス此由テ山峯ナル發泡膏ヲ左ノ

山峯

凡

腕臂ニ貼シテ治ス其後ハ身体惣テ疼
痛ヲ発スルナシ

○小児ニ於テハ右ノ如ク此病ニ由テ他ノ病ヲ
治スルナシ小児ノ諸病ト多クハ酸敗液
ヨリ生ス然レ間歇執ヲ患フト雖モコレガ少
シモ減スルナク却テ增長ス○然レ此
病ヲ患ル小児ヲ細察スル言早ク長育ス
コレ小益ト謂ツヘシスキユルツ人ノ説ニ一小児
間歇執ヲ患ルナク六十日許其間長育
スル一尺余ナル者ヲ見ルト云ナリ

○身体

○小児幼テ此病ヲ患ヒ甘茶制ヲ用ヒスレ
テ自然ニ治スル者ナシト言フベカラズ殊ニ春
執ヲ患ル者ニ在リ秋執ニ於テハ二月或ハ
三月ヲ經サレハ治セヌ尚其後モ久ク治セ
サルモノアリ然レ患者左肋下ニ硬腫ヲ
発シ或ハ其他此熱病ヲ散散スヘキ病ヲ
発スレハ早ク治スルナリ

○註 此左肋下ノ硬腫ハ病毒此部ニ聚
結由テ此病治スレバ其毒未タ尽ク体
中ヲ去ラサルナリ此ハヒツポクテス人ノ所謂

○スルニ

ル脾藏壅塞ナル者ト同レコレ執國ニ
 テハ殊ニ多シ○小兒ハ此硬腫大人ニ比
 スレハ害ナレセイデンハム名ローセン名ノ説ニ
 小兒ノ秋熱病ニ此腫ヲ發スレハコレヨリ
 速ニ治スト云ヘリ○プリンゲル名モンロ名モニ
 ゴツケレスベ名此硬腫惡性ニシテ水腫ヲ
 兼子且ツ終ニ水腫トナルヲ見タリト則チ
 プリンゲル名此ヲ陰金察シモ名ト名ト名ト
 ベ名ト其屍ヲ剖觀スルニ其脾藏壅
 塞シ且ツ膨脹スル内ニ硬腫アリ其量

五百弔アリト云ヘリ

○一小兒間歇熱ヲ患ルト三月偶痘瘡ニ
傳染レ此ヨリ其熱病治セリ

○一小兒間日熱ヲ患フ其間日ニ種痘ス
此日ヨリ痘瘡終ルマテ間日熱ヲ發セス尚
其後モ再發セスレテ全治セリ

○或ハ他病ニ間歇熱隱伏スルトアリ此症
ハ甚タ弁別シ難シ○一少兒ノ上ノ隔
日ニ烈キ鼻衄ヲ發ス既ニ數ク失血スル
ユエニ予速ニ消熱皮ヲ用テ治ス然ラサレ

ハ此ニ由テ死スヘキヲ疑ヒナシ○一貴婦隔日ニ時ヲ定メテ眼烈ク疼ミ且ツ赤色ヲ發ス是亦消熱皮ヲ用ヒテ治セリ

○一貴人隔日ニ右腋疼痛シ石淋ノ症ヲ兼ヌ予同ク消熱皮ヲ以テ治ス

○一男子隔日ニ烈ク乾欬ヲ發シ次テ深ク睡リ且ツ發汗ス是亦消熱皮ヲ用テ全治セリ

○如此他病ニ潜伏セル熱病ノ者法ハ其症時日ヲ定メテ發歇シ、初ニ欠呵シ終ニ發

○ヲ施シ
治スヤ

汗シ發作ノ時、通スル小便ニ穢墜アリテ溷器ノ底ニ溜リ宛モ石ノ碎粉ノ如シ○右ノ如キ間歇執ハ速ニ治療。肝要ナリ

○間歇執ハ發作ニ就テ他ノ諸症ヲ兼ルハ最モ險惡ナリ辟言ハ嘔吐、或ハ下利、或ハ大便血ヲ交テ通シ、或ハ胃ノ上口疼痛シ

或ハ烈ク發汗シテ其熱解セス、或ハ冷汗ヲ發シ、或ハ明白ナル起因モナクシテ眩暈并ニ

煩悶ヲ兼發スル者、或ハ惡寒、休サルニ發熱シ發汗ス、或ハ昏睡シテ宛モ卒厥ノ如ク

○此病

優^{クサシ}多^クニ
用^ヒ且^ツ

或ハ此病自ラ寢レテ悪^ク性ナル^ニ猶^モ雷^ノ雷^ノ熱ト
ナル等ナリ○如此諸症ヲ兼ル者ハ皆死ス
ヘキ危篤ノ間歇執^フニシテ速ニ消^ス熱皮ヲ
十分^ク的^ニ當^ルスヘキホドノ服量用テ救^フ活^スヘキ
症ナリ然ラサレハ三四^回發^ス或ハ五^回發^スノ中ニ患
者死^スレハナリ○如此種類ノ熱病ハ我
國ニモ間^断患^ル者アリ然^レモイタリ^テ名^ニ國^ニエシテ
ンド^ト同^シミ^レア^リ島^ノ、^バン^ノ、^イ、^シ、^ト、^ニ於^テ甚^ク多^ク
シ○通^ル例^ハ皆^ク人^ノ以^テ為^スク^ハ間^断歇^執ニ^テ死^スル
者ハ必^ズス^ル惡^ク寒^ク時^ニ死^スト、然^レモ予^ノミ^レア^リ

保護^ノ

島ノ患者ヲ見^ルニ多^ククハ發^ス熱^ノ時^ニ死^ス
リンド^ト人^ノモ亦^チ此^ヲ證^ト説^セリ
○予^ノが經驗^スル所^ヲ以^テ更^ニ右^ノ諸^件ヲ
記^ス所^以ハ世^ニ間^断歇^執ノ疾^病ニ非^ズト
認^ルルハ虚^偽タルヘキ^ヲ明^ニ證^シ此^ニ由^テ
勉^メテ戒^慎ニ^シテ良^法ヲ守^リ或^ハ惡^ク
症^ヲ發^見ス^ルトアラハ速^ニ救^療スヘキ^ヲ
教^示セ^ンカ^ヲ為^スナリ
○小^兒間^断歇^執ヲ患^ルル^ル中^ハ臥^床ヲ温^煖
ニシ^テ若^シ為^スト^ク得^バ宏^潤ニ^シテ極^時閉

○酸敗気ヲ

○患心者ニ

セザル室ニ居テハシ其故ハ此執病ヲ患ル
人ノ寢室ハ必ス一箇ノ酸臭アリハナリ
コノ酸臭ハ患者ノ蒸気ナリ故ニ
狭小ノ室ニテハ患者復々其
吸收浸染シテ其執イヨク淹留持長
スレハナリ故ニ此意ヲ以テ其室ヲ灑掃
淨潔ニシ又松樅ノ新枝ヲ床邊ニ置ク
ヘシ又季候并ニ天氣佳ク其他諸症ニ
妨碍ナキヲ察セハ執ノ癸作セサル時ニ扉
戸窓牖ヲ開クヘシ然レモ冷風寒氣ノ侵

スナキヤウニ慎ムヘシ○患者ヲ樓上ニ
居クハ最モ佳ナリ然ラサル中ハ爐ニカイ或ハ竈
ニ不断ニヘス薪ヲ焚モヤスヘシ己室中燃焼敗
気ヲ日常驅逐シ清潔ニスル為ナリ
○悪寒ニスル中ハ飲液ヲ与ルニ勿レモレヲ
多ク用レハ癸作ノ患苦ヲ増シ醒解スル
遅カラシム

註 右ノ説ハブールバーハハ并ニ其他名匠
ノ説ト入玉ク相反セリ大氏初癸悪寒ノ
時ヨリ粘稠ヲ稀ウスキ解シ且ツ開

風雲堂

○運行血
が

radices graminis in tartari

通スル飲液ヲ過服スル^{大ニ}稱贅セリ
其故ハ西心寒ノ時ニ總身動脈ノ端
末ニ障^{ツカ}支レテ進輸スル^カ能ハス^{オカ}自ラ
其血心ノ右室ト肺ニ滯止ス此故ニ稀
渙溶解スル飲液ヲ用レハ其血疏解
レテ動脈ノ端末ニ透達シ易ク其西心
寒モ早ク解シ此ニ次テ癸癸スル壯熱ニ
因テ凝留滯止スル血液ヲ衝癸進輸
シ溶釋渙流レテ癸癸汗スレハナリ
故ニ其熱退テ後甘蘆根ト蒲公英根ノ

offtreksel van Huxbloem.

煎劑ニ舍利別ヲ加テ甘美ト為レ癸作ノ少
シ前ニ饒^{タカサ}多ニ飲シメ或ハ千ツツト^{タカ}名ノ説
ニ接骨木花ノ煎劑ニ蜜ヲ加テ子ルヲ良トス
○然凡患者吐ヲ癸癸セハ微温湯ヲ子テ
吐セシムヘシ
○癸癸熱中ニハ温ナル浸湯劑ニ^{下利ニ}温湯
一二滴加テ飲シメ或ハ麦酒清^{下利ニ}温湯
ヲ加^{用ユ}ヘシ此ニ由テ亦煩渴モヨク靜止ス
レハナリ或ハ温湯ニ炙麦餅ヲ浸シ此ニ佛^佛
糖汁、冰糖、并ニ^佛酒少許ヲ加ヘ甘美ト為

waardetien.
wolken betien (bacca rubi chamsemori.)

ingemaakte aalbessen, in roode frammen.
Sacca rub. arct. 此

レ或ハ茶湯ニ佛手柑清ヲ加ヘ或ハ麦酒ト
 水ト等分ニ合シ佛手柑汁少許ト砂糖ヲ
 和シ予ヘ或ハ大麦煎ニ廉角膠ゲル少許
 ヲ溶シ予ヘ或ハ醃糖ノアールベリン木実イロトセ
 プラメシ覆盆子タルケンベリン上アールドベリン草
 櫻実、ヘインベリン木実等ノ類ニ沸湯ヲ注キ
 火温ニナリタル中ニ其液ニ火シレインセ酒ヲ加ヘ予
 フレ或ハ右ノ草木ノ子実ヲ糖膠新創局
 ニ製シコレヲ湯ニ溶シ用ユヘシ

註 ウタルケンベリンハズ左トテン國并ニ北地

○其液ノ

norland.

ニ多ク生る味酸ヲ帯テ清涼ノ効アリ
 冬月ニ蔬菜トシ或ハ菜創ニ用テ多シ
 ノルランド名地ヨリ持来レリ

○ヘインベリンハ如此子実ノ類ニ比スレ酸
 味尤多シト雖モリュツセン名國ニテハ生ニテ
 多ク食スコレパーテルスベルグ名地ニテ氷ラセ
 冬月ニ貯フコレニ湯ヲ注キ燐トシ用ユ此ニ由
 テボウルゴフ子酒名酒ノ色トナリ善キ飲料
 トス

○患者卒ニ飲液ヲ嫌フ片ハ種々數多

風雲堂

○鎮止

○患者ハ

固ヨリ

○猶

ノ飲液ヲ製シテ彼此互ニ与ルヲ肝要トス
 此ニ由テ患者ノ意ヲ轉シテ用ルニ便ナリ凡
 ソ煩渴ヲ○酸味ノ飲液ヨリ外ニ用ル
 ナキハ歎スヘキトニ非スヤ其故ハ間歇性
 酸敗液アリ殊ニ小兒ニ於テ甚シ然レハ
 清潔ナル温湯或ハ稀キ雞^肉煮汁ヲ用テ
 モ宜キホドイナレバナリ○其熱最モ盛
 ナル頃ニ至ラサレハ飲液ヲ用ルナキヲ良トス
 ○発作ノ時頭痛ヲ發スルハ患者ノ面部
 ニ薄キ綿布ヲ被^カフキハ容易ニ消散ス

其故ハ表皮ノ蒸気^ニ對^シ過^ニ内伏スルニ
 由テ面部ノ蒸気^ニ對^シ弛緩^ニ速ニ
 蒸気^ヲ散泄スレバ治スレハナリ
 ○冷水ヲ布ニ浸シテ面部ニ貼スルハ甚ク
 害アリ○患者ヲレテヨク其熱ニ堪ヌ心バ
 レメテ汗發スルヲ俟ツヘシ
 ○発汗ノ時ハ少許^ヲ數^ク患者ノ意
 ニ隨テ飲液ヲ温服セシムヘシ○両手ヲ
 衾褥ノ内ニ入ル^ルキヲ必要トスルニ及ハス
 唯手巾ニテ蓋^カフテ可ナリ俾出スレハ汗

早ク止ムカユナリ

○汗既ニ止ム中ハ清潔ニヨク乾シ温メ且ツ
乳香ヲ以テ薰煙タル襦衣ヲ服セシム
ヘシ若シヨク乾カズ且ツ温メサレハ其汗孔ニ
留ル所ノ汚穢ノ湿液ヲ其衣服ニ吸引
シ取ルテ能ハサレハナリ又乳香ヲ薰スル
モノハ蒸気管ノ弛緩スルヲ強固スルカ爲
ナリ

○癸作退キ諸症解スル中ハ其兎ヲ
卧床ヨリ抱キ取テ爐邊ニ居ルヘシ此ニ由

テ其余残ノ蒸気ヲヨク癸散セシメテ
皮膚汗孔ニ残リ留ルナシ其後復々
卧床ニ入ルテアテハ被褥ヲ更メ或ハ以
前ノ被褥ヲ用ル中ハ火斗ニテ乾スヘシ
○癸作中ハ食物ヲ子ルテ勿レ又癸作ノ
後モ直ニ子ルテ勿レ唯癸作ノ二時或ハ
二時半前ニ子ルヘシ此ニ由テ癸作マテニ消
化スルナリ

○間歇熱ハ通例ノ乳汁、魚、塩藏肉、
炙肉、煮サル蔬菜、固ク煮タル雞卵惣

hier Spepen.

テ粘脂多キ物ヲ禁スヘシ唯蒸タル肉、米
羹、美汁、ビール麦酒、美汁ニ雞卵ヲ加ヘ或ハ麦酒
ニ麦餅ヲ煮テ用ユヘシ○食物ハ總テ
過食スルコト勿レ唯身体ノ精カヲ養ハ
ホドニ用ユヘシ

○大ニ餓ルニ由テ間歇熱ヲ治スルコトアリ
然レコレ常法ト為シ難シ_{キユルヒウス名}如
此ニシテ治スルノ説アリ

○此病幼メ一發スルハ其間日或ハ發作
セサル時ニ速ニ吐劑或ハ下劑ヲ用ユヘシ

○未タ

○以前

此兩件凡ニ患者ノ精カヲ少ク損スルコト
ニ此病甚ク増長セス患者ノ精カモ減
衰セサル中ニ右兩件ノ一ヲ撰テ速ニ用ル
ト尤モ肝要ナリ

○小兒食物ヲ好ミ多ク食シ殊ニ硬固
ノ食物ヲ能ク食フコトヲ得而メ此病ニ罹
リテ口舌汚サガアリ_或口中味ヒ惡ク氣息
惡臭アリ_或發作ノ時頭旋暈轉シ_或下
唇開動シ_或惡心ヲ發シ_或ハ吐スル者ハ皆
吐劑ヲ必要トス此ハイペカコアナ_{草ノ吐劑}

即チ予哮喘欬篇ニ記ス法ノ如ク用ユヘシ但
 シ大氏、癸作ノ一時半前ニ用ユヘシコレ畢竟
 癸作ノ前ニ吐劑ノ効ヲ痛^ナズランカ^ハ欬^ナ
 吐劑ヲ用ル^ルヲ称^ス贊セリ○ト^ムソ^シ人
 曰ク間歇熱ノ^ハ惡寒ノ初メ或ハ
 火^ノ間^ク惡寒^{スル}中或ハ發熱ノ初メ吐
 セシメテ二十年來曾テ誤リナク良効
 ヲ得タリトガライ^ンゲル^ル人亦此說ニ同シ○
 コロム^ビル^ル人ハ本書ノ時刻ヲ良トス

○癸後

○癸作後速ニ吐劑ヲ用テ吐セシメ大効アル
 一ヲ予明カニ領會セリ故ニ一ニ患者精
 カ未タ衰ヘス此劑ニ堪^ヘキ時速ニ用ユ
 ヘキ一ヲ^コ希^チナリ其故ハ小兒ハシバク
 癸作スレハ其執長ク執留スレナリ又
 毎^ニ癸^ノ終^リニ癸汗^シ此ニ由テ執毒ノ一分
 片^ハ散^シ泄^ス癸作後速ニ吐セシムルモ亦
 其如ク^ハ内部ヨリ一分^ハ執毒ヲ
 吐泄シ除クガ工^ニ是^レ即チ内部ノ
 癸汗ナリ如此吐泄シ除クヘキ所ノ熱病ノ

○外部

○此時ニ
於テ

毒母ハ田日ト腸トニ留着シ或ハ肝藏ニ
巢結シテ膽液ニ交リ腸中ニ轉輸ス
然レ此毒母腸胃中ノ吸收管ト乳糜脉
ヨリ血中ニ泛流セサル前ニ早ク腸胃ヨリ
駆除スレハ必ス善功ヲ得ヘキヲヨク考
フヘシ故ニ此病ヲ吐劑ニテ治スル
多クシ○前説ノ吐劑ヲ用フヘキ症候ヲ
ヨク察シテ一回ニ限ラス猶其後モ用ユ
ヘキ候アラハ其次ノ發作ノ時ニ前法ノ如
ク用ユヘシ

○根

○右ノ症ニ及シテ田日堅硬及ヒ痞脹シ
且ツ凡氣腹中ニ滾鳴シ腰痛ヲ苦ム
者ハ下劑ヲ必要トス如此症ニハ每次左ノ
散劑ヲ用ユ

糖刺把 十碎

海芋カルフスアト半復代用

茵陳塩 各四碎

名タリヒツトリヲリ 新局 二碎

右散劑トス 稀淡ノ

右散劑此病ノ間日ニ雞肉煮汁ニテ

用イ且ツ癸作ノ一時前マテニ其効ヲ
見ハスホドニ早ク用ユヘシ○下劑ヲ用ユヘ
キ症候アル中ハ右ノ散劑ヲ病ノ間日ニ
用ユヘシ此劑ノニ申テ此病治ス者予ハ
く經驗セリ

○重複ノ間日熱ハ其癸作隔日毎ニ劇
盛ナリ其劇キ癸作一後ノ午前ニ其
病患必ス輕快ナルユエニ此時ニ下劑ヲ
与フヘシ

○癸作既ニ三回ヲ經ルキハ病患ノ間靜

ナル時ニ左ニ記ス劑ヲ一時或ハ一時半每
ニ食匙ニ抄ツ用テ此熱病ヲ除クヘシ

茵陳塩 一匙

清水 四十八匙

右溶化シ又。後甘草ヲ加フ

佛^栴柑汁 十六匙或徐々ニ注キ

加^カ沸^カ滓^カセサルホトノ分量ヲ度トス

右ノ劑ヲ甘美ニセント欲セハ橙皮舍利

別^新別^局篇^舎ヲ適宜ニ加フヘシ○若シ佛

柑汁無キハ好醋ヲ代用スヘシ

○徐々ニ

此劑癸作ノ前ニ火温ニシテ服スヘシ○此病

未夕治セス仍癸作スル者ハ前説

ノ吐劑或ハ下劑ヲ与フヘキ諸徴候ヲ細密

ニ檢査シ尙其候アル中ハ其西劑中ノ一ヲ

擇テ用ユヘシ而後右ノ飲劑ヲ用ヒ此病全

ク治スルマテ長服スヘシ

○右ノ如ク療法ヲ施シテ此病治スヘキ候

左ノ如シ

○第一 其癸作初日ヨリ第五日頃ニ癸

スルニ其熱長カラス諸症劇シカラス

○第二 癸作ノ後小便濁リ并ニ尿器ノ

底ニ淡白ナル渣滓アリ

○第三 癸作スル毎ニ諸症減ス

○第四 精力甚タ虚脱セス

○第五 鼻或ハ唇ニ瘡疹ヲ癸ス但シ

此が早ク癸スルハ頑固ナル間歇熱ノ候

ナリ殊ニ初癸ニ生スルモノ然リ予シバク

コレヲ見タリ

○右ノ諸候ヲ見ハストナク此病依然トシテ

退カサル者ハ猶前説ノ飲劑ヲイヨク

用ヒ且ツ癸作ノ初メト申シテハ心寒戰
 慄スル代リニ既ニ一執ヲ癸シ且ツ癸汗
 スルヤウニ勉メテ療法ヲ施スヘシ又以前此
 癸作ノ時刻幾許イカホト早キカレハ或ハ遅キカ
 レハ或ハ火シモ變及移セス同時刻ニ癸スル
 カ如此ハサ任其トシテ長ク退カサルノ候トス
 ヲ考ルテ肝要ナリ然ラサレハ癸汗セシムヘ
 キ時刻ヲ知ルナシ以下ニ癸汗セシムル法方アリ故ニ云爾
 ○右ノ症ハ予療法ヲ施スヲ左ノ如シ
 ○第一 癸作ノ四半時或ハ半時前ニ

(Hungarise)

Hongarisch Lomiginnu Water (sqq: regia-
Comin.

卧褥ヲ温暖ニシテ患者ヲ臥シメ温ナル
 茶湯或ハ温ナル麦酒ニ麦餅トコメイシ苗香
 用代ヲ加ヘテ飲シメ又無塩乳酪ト醋ト等
 分ニ合セ火ニカケテ溶シ攪和シコレニ石子キ
 毛布ヲ浸シ此ヲ絞リテ薄キ綿布ニ巻
 キ患者ノ堪ヘキホトニ温ニシテ胃ノ部ニ
 貼スヘシ
 ○第二 或ハ毛布ニハンガールセコリーニギン子
 名トシ割火許酒ヲ浸シ或ハ此劑十キ件ハ
 燒酒ヲ浸シ前法ノ如ク用ユヘシ

Hand.
as flakte der
theur.
echel-kroon (altgras, paninculus flammula)

○癸作
前二手
掌

echel-kroon (altgras, paninculus flammula)

○斯ニ間歇熱ヲ治ス古法アリ此ハ昔
某日膏一ヲ項窩、或ハ兩腕ノ内側ニ貼シ
癸作ノ水レ前ニ癸泡スルヤウニ施スヘシ此ニ
由テ惡寒ヲ癸スレ代リニ自ラ執及ヒ汗
ヲ癸見スルナリ○或ハエデルコレシ
以テニ貼シテ癸泡スレハ大ニ癸執フシテ惡
寒ニスルナレ○或ハ
胃ノ部ニ塗レハ癸泡ス○或ハ烏龜尾、
生姜、食塩等分ニ合シ雞子黃ヲ加
テ膏ニ茶ノ如クシ前
手掌ニ貼ス右

○自ラ

camphor brand wine (see: Vini camphoratis)

○第三 或ハ裸麦ノ麦餅ヲ焙リ執シ兩
断リ此ヲ薄キ綿布ニ卷キ
ニ浸シ患者ノ堪ユヘキホドニ温執フシテ胃ノ
部ニ貼スヘシ
○癸作中ハ温ナル茶湯、麦酒清靚或ハ
其他甘美ニシテ小兒ノ飲ミ易キ飲液ヲ
用レテ癸汗スルナリ○癸作ニ近キ頃ニ
右ノ諸法方ヲ施セハ此病甚々惡心ノ
種類ニ非レハ大氏此病治スルナリ

○此ヲ

terpentin-olie.

六時毎ニ新ニ更換テ効ヲ見ハスマテ
貼スルナリ○又方、烏龜尾、礪石、蜘蛛
絲、胡椒、底野加、或ハテレンティン油新局ニ
加テ前説ノ部ニ貼ス此創醜厲ノ品ア
ルニ由テ侵刺シテ癩泡シ惡臭ノ時ニ執
ヲ癩起センガ為ナリ

○右ノ如キ一方ヲ左ニ記ス此予カ親友ノ
傳ル所ニシテ年齢ノ老少ニ拘ラス癩作ノ
次序ナキ間歇執、或ハ三日執ニ至ルマテ
十二時ノ間ニ全治スルヲ明證セリ其方

○到

○煙草ヲ一煙管頭ニ填流シ此ヲ出シ
此ニ一倍ノ酸麩餅屑一匙ニ醋少
許ヲ加ヘ搗テ泥ト為シ此ヲ二ツニ分ケ
此病癩作ノ初ニ速ニ兩腕ノ寸口上ニ貼シ
此ニ縛綿ヲ施シ剥脱セサラシム此ニ由
テ痒熱ヲ癩ス然レ其日終ルマテハコレヲ
取去ルナク且ツ癩泡スレバ刺用スルナ
勿レ但シ此創ハ癩作ノ先ニ製スヘシ
然ラサレハ癩氣脱スナリ千七百五十三年
ノ復予此ヲ幾多人ニ試ルニ効ヲ

風雲堂

得ルモアリ或ハ効ナキ者モアリ
 ○或者左ノ方良効アルヲ稱賛ス
 其方、底野加ニ棧、テレンテイシ一棧、
 硫黄升花、白礬、胡椒、各二十碎、芸
 香露滴油十滴、竜腦十碎、右混和
 レ貼膏トシニツニ分テ手掌ニ貼ス
 ○又一竜腦ヲ預ニ掛テ自ラ発汗
 スル者アリ故ニ此病ニ稱賛セリ○又
 大人ハ大蒜ヲ預ニ掛テ発汗シ治スル
 者アリ○プロスルアルピヌスノ説ニ

oleum chamomilla.
oleum zippelii.

マヨラナ草煎九十六棧老制油二十四棧
 ヲ合シ院腸法トシ施シテ自ラ此病ヲ
 治シ又他人ヲモ治スト云アリ
 ○或説ニ執ツ性ノ油類ヲ脊椎ニ塗
 テ此病ヲ治スヲアリトホレス云ス名人ノ
 説ニ近近日三日執ヲ患ル人ニコレユム今ズルカ
 新制新局局トト油油煎煎ヲ合シテ脊椎ニ
 塗テ此病治スト云アリ
 ○ハエンノ書ニ曰ク一婦人三日執ヲ患
 ル一五週偶執ノ発作ノ時ニ硫黄ヲ用

ヒ大ニ発汗ス其後発作セズ治セリ但
シ其後下劑ヲ用テ下利セリ

○悪性ノ間歇熱ハ右ノ如キ法方ニテ
治スヘキニ非ス○重複ノ間日熱ニ於テ
隔日同ク悪寒ヲ發スルハ大氏皆悪
性ナリ○間日熱ノ第三発ニ於テ悪性
タルヤ否ヤヲ知ズレ○予既ニ前ニ説
ク所ノ一二ノ悪候第四発ニ於テ尤モ烈
ク發見スル者速ニ消熱皮ヲ用テ又第
五日ニ於テ其發作以前ニ比スレハ長ク發
○大氏
○一ヲ得

留シ諸症劇盛ナル中ハ予速ニ消熱皮
ヲ以テ救フナリ又患兒虚弱ニシテ睡眠
スレハ直ニ烈ク發汗スル者モ消熱皮ヲ
与ルナリ此劑ノ害ナキヲ予并ニ諸先哲
モコレヲ多ク實驗シテ確證セリ

○消熱皮ハヨク其真品ヲ擇ミ又其病
毒ニ十分適當スルホドノ服量ニシ且ツ此ニ
由テ其熱毒ヲ全ク消除スルマテ長ク用ル
ニ非レハ治スヘカラサルヲヨク領會スヘシ若
シ此病毒身体中ニ残り留レハ即チ是レ病

○サ条ノ

毒ノ一種子ニシテ此ヨリ自ラ滋長増息シ
復タ此病ヲ再發スコレ死モ疥癬ニ硫
黄并花ヲ十分ニ長ク用ヒス且ツ病毒ニ適
當スルホドニ施サレハ一旦治スレバ復タ再
発スルカ如シ故ニ消熱皮ヲ用ル_ル法ノ如クナ
ラスレテ熱病再発スルハ此ノ罪ニ非ス唯此
ヲ用ル_ルノ足ス且ツ久シカラサルノ罪ナリ○
往時ハ消熱皮ヲ禁スル諸病近世ニ比
スレハ甚タ數ク(往時ハ消熱皮。政羅巴洲
ニ於テ未タ頭知セサレハナリ)且ツ間歇熱

○ノ効能

○此ヲ用テ

ヲ誤治スル_ル多クシ○此系始テ千六百
四十九年頃ニ歐羅巴洲ニ来ル然レ千六
百七十九年以前ハ專ラ切實ニ用ル_ルナシ
○千六百九十年ノ後ズ空_トデン_國ニテ始テ
此系ヲ經驗シ良効アリ_テ知ル○但シ小
兒ノ服スル_ルホドニ味ヲ甘美ニ_シ為
スハ甚タ維_キナリ_リ故ニ予コレヲ左ニ記
ス如ク製_シ用_ユエ

消熱皮細末三匁水百四十四匁ヲ以テ煮
テ二十四匁ト爲シ_シ濃過シ此ニ橙皮水

○減シ

Harst.
chocolaad.

モ間日ト異ナルトナキマテム息ラス用ユヘシ
而後此ヲ用ル法間日執ハ七日
ト三日執ハ十三日此劑ヲ休メ其翌日ヨリ
毎日本劑ツ復タ七日用ヒ而後又初メノ日
數ノ如ク此劑ヲ休メ其翌日ヨリ又毎日本劑
ツ七日用ユヘシ如此用ルト三四回或ハ四回ニ
至ルヘシ若シ三日執ヲ患ヒシ者ハ必ス再発
セシメサルヲ明證スル爲ニ毎本劑用ルナリ
○此劑ヲ服シテ悪心嘔気ヲ発スル者ハ消
熱皮ヲ左ニ記ス如ク製シ用ユヘシ

以糖漬ノ佛神椹皮、橙皮細ニ剉ニ各
十二匁右石臼ニ内レ櫻実水四十八匁橙皮
水二十四匁ヲ徐々ニ注シツ加テ搗キ此ニ消
熱皮ノ細末三匁、稀キ桂水二匁橙皮
舍利別十二匁ヲ和ス○此劑毎服一匙四
ツ用テ毎本劑發作ノ前マデニ一劑ヲ尽
スヘシ

○或ハ消熱皮ノ末ヲ扁桃乳匣ニ和シ用ヒ
或ハコレトド菓子ニ和シ用テ良ナリ

註 予痘瘡篇ニ記ス如ク消熱皮ノ軟脂

モ亦小兒ニ用ヒ易ク此ヲ舍利別ニ製シ
テ良ナリトル方ヲ左ニ記ス

消熱皮 極細末 八匁

右火酒ヲ掺濕シヨク濕ルニ至テ白蒲桃酒
百四十四匁ヲ注キ火温ナル隔湯浸トシ
二日或ハ三日置キ其間シバク攪動シ而後
綴布ニテ濾過シ一壓搾シ其汁ヲ尽
ク取リ白沙糖清淨ナル者六十四匁ヲ加ヘ
磁鍋ニテ徐々ニ煮テ舍利別ノ稠トラス
○一虫貝官ノ田力兒平日酒ヲ好クニ由テ前説

ノ消熱皮劑ヲ服スルノ能ハス故ニ予左ニ
記ス酒劑ヲ製シ其病ヲ治セリ

消熱皮細末 四十八匁

右井水五百七十六匁ヲ以テ煮テ百九十二
匁ト為シ濾過シ其滓ニ上好ノ白蒲桃
酒ト百九十二匁ヲ浸ス一日ニシテ搾絞シ
其滓ニ又甘蒲桃酒九十二匁ヲ浸ス一日
ニシテ濾過シヨク滓ヲ絞リ尽ク其汁ヲ取
リ右ノ煎汁ト酒ト混合シ微火上ニ置キ
此ニ白沙糖百二十匁新橙皮黃二箇ヲ

codrinella

加へ煮て一沸騰せしめ又此ニコツ子ルラ子樹
名細末一匙ヲ加へ此ヲ消熱皮酒ト為ス
○此美酒ヲ半時毎ニ食匙ニ二枚ヲ
用ヒ或ハ一時毎ニコレヲ用ユ但シ熱ノ發作
セサル時ニ用ユヘシ

○小兒消熱皮ヲ服スルヲ能ハサル者ハ消熱
皮ノ煎汁ヲ以テ浣腸法ヲ施スヘシ但シ尋
常ノ浣腸法ヲ初メニ施シ大便通利シテ
後消熱皮煎汁十枚或ハ二十四枚ヲ注
射スヘシ此ニ由テ腸中ノ吸收管ニ乳糜

脉ヨリ運輸シテ血中ニ入ルナリ但シコレヲ
注入シ後多少肛門ヨリ浮出セハ復タ速ニ
水鏡ニテ注入スヘシ

○此病治スレハ下劑ヲ用テ腹中ヲ清除スル
ト好々者アリ然レ此ハ良効寡方シトス
其故ハ大ニ消熱皮ヲ用ルニ由テ自然ニ大
便通利スルナリ若シ通セサル者ハ下劑ヲ用
ヘキナリ又消熱皮ハ多少体中ニ留ルト
食物ノ如シ

○乳養ノ見此熱病ヲ由ル者ハ左ニ記ス

風雲堂

療法ヨリ善^{ヨキ}ハナシ○其法第一千^キキ^キヲ
 レイ^{下利篇 痘瘡 篇序 熱治法 出}ヲ用テ腸胃ヲ清除ス
 へシ第二乳母ニ消熱皮ヲ与ル^ト宛モ其
 身ニ熱病アル如クスへシ此ハ細末ヲ餅類ニ
 和シ用ユへシ此ニ由テ悪心ヲ生スル^トナシ
 ○千七百五十年予一種ノ熱病ヲ患フ^ト医
 家コレヲセミ^ミテル^ルナ^リト名ク其症一日ハ^ハ癉
 シ^シ第二日ハ二回^ニ癉作ス^ル毎日如此^ク癉作シテ
 休^ムナ^リナシ^テ予其^ノ少^シシ^テ以前^ノ腹中壅塞ス
 ル^ニ由^テ惡性ノ熱病ヲ患^スル^ニ由^テ此病モ亦

小見

癉スル^トナリ^テ予消熱皮モ服スル^ニ堪^ハサル^{ホド}ニ
 甚^シク精力虚脱セリ此ニ由^テ消熱皮ノ
 細末四十八^ト匙ヲ水煎シ^テ幾^ト下糊劑ノ如ク
 煎^ス熟^シシ^テ綿布ニ裹^キ適^宜ク温^メ煖^ニシ
 テ腹部ニ貼セリ此劑冷^レハ^シハ^ク温^メテ
 頻^リニ貼ス^{コト}初^ニ皮ヨリ第三日ニ當^テ施
 セリ此ニ由^テ其熱全^ク休^ム然^レモ此糊劑ヲ
 施ス^ト七日ニシテ精力故ニ復^シ全^ク健
 康ヲ得^タ此法ロ^ンテ^ン地^ノ医家^ナ甘^ク
 ペイ^工名^ノ著書ニ據^ル所^ナリ此書百^ニ〇

間歇熱或ハ替雷熱或ハ時々発作ス
ル熱病モ消熱皮ヲ外用シテ全治スル
幾多ノ治驗ヲ講明セリ

註 消熱皮ヲ間歇熱ニ外用スルニ
来イヨク多ク発明セリ此ヲ浣腸法ト
シ或ハ極細末ヲ糊劑トシ或ハ浴湯トシ
施セリ○(ルヘクウス)人コレヲ用ヒ又トル
各ノ説ニ此法良効アリテ諸医家多ク
治驗アリ○トル各人ハ此糊劑ヲ効ナシトス
然レコレハ手ノ寸口動脈ノニ貼スルカ故

○ト云ニリ

ナリ○ハン子スルハ此書ノ正文ニ記ス如ク小
兒ニ施シテ良効ヲ得ル説アリ但シ消
熱皮ヲ酒ニ煮テ施スナリ○ペイ工各人
緻密ノ綿布ニテ襦衣ヲ造リ其間ニ
極細末ノ消熱皮ヲ散布ス四五歳ノ兒
ハ消熱皮ノ末三十二匙ヨリ四十匙マテ此
ニ用ユ此ニ由テ治効ヲ得ル者十二人ア
リト云ヘリ○アレキサンドル各人ハ此ヲ脚浴
湯トシ熱病ヲ治スルノ説アリ此ハ消熱皮
九十六匙ヲ水煎シ先ツ脚ヲヨク摩擦

レ其煎けヲ狹キ桶ニ内レ癸作後ニ脚
ヲ浸スナリ

○アレキサンドルムハ消熱皮ヲ蒸サ茶トシ
間歇熱ヲ治セリ

○幼見ニ消熱皮ヲ用ントスル片甚夕服シ
難キ者ハ外用ノ諸法必要ニシテ最モ

關カハカラサル所ナリ

註 ヲレユムアニレダツベリユ
製劑名ハレバク
新局方

大人ニハ用レ凡予未夕小見ニ用ルナレ又
三日熱ニ用ルナリ此ハ以前ニ大便ヲヨク

Acum animale Dissellii

口從来

通利シ少許ノ麦酒ト麦餅ニ此劑三十
滴ヲ加ヘ癸作ノ四分時前ニ午ハ室中ニ
靜卧セシム此ニ由テ患者眠リテ癸
汗ス但レ此時ニ興寤スレハ此劑効ナシ

○礶砂公スク間歇熱ニ用ユ
小兒ハ服シ難キモノ多ク又大人ノ如ク
十分ノ分量ヲ用ルナレ能ハス一貴人大
麦水ニテ一日ニ二匙ヲ用ユ此ニ由テ間日
熱全治セリ然レ其後一二週ヲ経テ
再癸セリ此ニ由テ消熱皮ヲ多ク服シ

ス〇通例ノ人ハ確破ノ味佳ナラサルニ由
テ^{コレヲ}多服スルヲ能ハス然凡死モ消^レ熱皮ヲ
用ル如クニレバク長服スヘシ然ラサレハ其
熱再發スル者予^{多ク}見ル所ナリ

小兒間歇熱篇第二十二終

