



蟲篇廿三
頭水篇廿五

佝僂病篇廿四

小兒虫以篇第二十三

○虫以ハ病ニ非ス然凡此因^テ幾多ノ疾
病ヲ起^ルス○此ニ因テ病虫心ヲ起^ルスル
中ハ速ニ治療ヲ施シテ除治スヘシ久
シク体中ニ在テ養食ヲ与ルホドイマ
増息シ且ツ長育スルナリ○久ク体中ニ
在レハ其健康ニ害アルト^テ辟言ハ他國ニ行
テ異常ノ食物ヲ食シ或ハ種々ノ甘味
ノ物ヲ食シ或ハ其他種々ノ起因ニ由テ
其虫以^テ蠢動シ蠕行シ吸咬シ或ハ



29-8068

衝穴竅行スル片ハ忽然トシテ諸患症ヲ
發ス

○小兒少年ハ腸胃ノ觸知最モ甚キニ
由テ虫ノ害ヲ受ル_ト甚ク大人ハ此ニ反
シテ_ト腸ノ觸知敏銳ナラス、壯實ノ人ハ
腸ノ裏面ニ稠固ノ粘液被布スルニ由テ
虫ノ運動ヲ觸知シ易カラス然レモ物
テ此病ハ腸中ニテ乳糜ヲ虫ニ分配セ
テ吸收セラレ又虫ヨリ泄除スル汚物糞
并ニ虫ヨリ蒸發スル液自ラ乳糜ニ混

○ヲ運當ス

和ス此ニ因テ身体ノ養液寡ク或ハ廉
悪ノ養液トナリ或ハ日常餓テ食ヲ欲
スル症ヲ發ス

註ニツテルト_ト叙ノ書曰ク一婦人不断餓
テ食ヲ欲シ昼夜食スル_ト算ナシ遂
ニ寸白虫十八條ヲ通利シテ治セリ

○一虫多ク生シ且ツ長大ニナルホドイヨク
其患症甚クシ○虫アル人ハ熱病并
ニ痘瘡ニ於テハ殊ニ甚ク其害ヲ受ク故
ニ小兒虫アル_トヲ知ル片ハ容易ニ種痘ヲ

施シ雞シ

○魚ハ種子ヨリ生スル^{モロク}他ノ凡百ノ生族^{イキモ}
ノ如シ譬言ハ蠅ノ卵ハ蠅トナリ雞ノ卵ハ雞
雛トナリ^テ必ス地トナリ^{ナシ}雁ノ卵ハ雁トナル
必スコレガ^テ魚トナル^{ナシ}故ニ魚ノ卵モ魚
ヨリ外ニ生スル^{ナシ}此種子ハ飲食ニ由テ
体中ニ入り^{コト}特ニ飲液ニ用ル所ノ水ニ在リ
是故ニ^ク厨房ノ水桶ハ清潔ニスヘキ所ナリ
○凡庸ノ人ハ多ク水ヲ飲ミ殊ニ夏月ニ於
テ甚タシ又レバ^ク汚濁ノ水ヲ用ル^{ナリ}アリ或

獸

ハ炙リ^テ肉類ヲ食フ等ニ由テ千百
卵子ヲ嚙下シ腸胃ニ魚ヲ^カ孵生スルナリ
或ハ汚水ニハ其卵ノミナラス^ヤ動モスレハ細魚
アリテ吞ム^{ナリ}アリ故ニ^ニ卑賤ノ徒^ハ恐ク
ハ此ニ由テ魚ノ病ヲ起原ヲ為ス^{ナリ}アルヘシ
○是故ニ故ノ法官ノ医カルセニウス^ノ扶助
ニ由テ貧民ノ疾病アル者ヲス^アトラブ^ン泉
ノ傍ニ病院ヲ設テ者^ハ護養^{スル}ヲ見ルニ
患心者四分ノ三ハ必ス魚ヲ起原^トシテ^テ殺スル
病ヲ患心ルナリ

註

人身ノ虫ノ起原古来ヨリ彰較ニ

説者ナシ近來ノ撰述家水ヨリ生スト

シ又條虫寸白モ水ニ在リトス人パルラス名ノ

説ハ古説ノ如ク虫ノ種子ハ大気中ニ浮

漾シコレカ食物ニ混シテ体中ニ入ルトス或

ハズウーテン名ニ於テハリシナエウ名ガツド名

ドイツランド名ニ於テハユンセル名或ハゾーヘレン

人名或ハチツツト名ノ朋友ノ徒等條虫ハ

水ニ生ストス此説ヲ人皆許容トイヘ氏

他ノ諸生族ニ虫ヲ生スルヲ見レハ水

中自然ニ生スル虫ノ説ヲ主張シ難カル

ヘシ其故ハ水ヨリシテ身体ニ虫ヲ生ス

ヘキ中ハ虫ノ數ク水中ニ有ルヘク又其卵

モアルヘシ然ルニ水中ニ虫アルト甚ク罕

ニシテ唯僅カニ究理術ニテ一二ノ虫ヲ見

ルノミ然ル魚類鳥類或ハ水陸ニ住ム

生類獸類ニ虫甚ク多シ又水中

ニ住ム生族モ其虫皆体中ニ在リ未タ

体外ニ在ラ見ル人ナシ体外トハ水中ヲ云又獸類

ノ條虫モ水ニ因テ生スト云中ハ魚類ハ

其虫數クアルヘシ然ルニ魚類〇却テ
其他ノ生族イキモノニシバク多クア
ルヲ見ルナリ

〇魚類譬言ハ鰻鱺、鮎、棘鬚、其他如此

類ニ虫アリ殊ニ條虫多シ故ニ魚類多

キ地ハ虫以病多シ〇ストックホルム地ハユアサ

名地ヨリハ虫以病多シヒンランド國リユスランド國

ニテハ甚タ多シ〇條虫和蘭ニテハ十分

二、スウイツセルランド國ニテハ十分ニ虫ルナリ

註 條虫多シトイハ氏作者ノ説ク如キホ

ドニ甚区シカラス

〇譬言ハ鮎ニ白色扁平ニシテ節十キ虫

アルヲ罕ナラス或ハコレニ節ヲ具ルモアリ

註 條虫ハスアラリシテ人

七百四十七年ノ著書ニリユイセン人ノ説ヲ取

テ竹間約ニ記載ス又モンテン人ノ七百五十三

年ノ著書ニ尤モ細詳ニ記シ且ツ甚タ

顯著ノ実験説ヲ舉テ此ハ一婦人

子虫以條虫、圓張虫、長キカワイルス酥虫カワイルスヲ下

并ニ其條虫ヲ數度下スカワイルスヲ載セ又一婦

aars maaden (ascaris lumbricoides)
Karverwormen

○モ亦

人^{ブライツセム}鮓ヲ食フニ就テ其口ニ生活セル條魚ニ
アルヲ見ルノ説アリ蓋シ本書ノ作者此
等ノ書ヲ證シテ述ルナリ

○然モリン子名メンナシテル名ユニセル名ノ説ニ
人身ニ生スル種類ノ魚水中ニアルヲ実験
セルトアリ然レハ其魚凡テ魚類ニ生セスレ
テ水中ニアルト疑ヒナシ

(註) ^{ズ左ドセ}地名ノ医家ノ新説ニ魚類多
ク并ニ海ニ近キ國ノ人ハ條魚甚ク數
シト云リリヲル子ボルク^{地名}ノ人ハ十分ノ四ハ

○者名

此病ヲ患フト云一リ○ハキセ名ノ説ニ此魚
種々ノ魚類ニアルヲ見テ又云殊ニ九
月十月ニ魚病ヲ患ル人多ク此時候
ハ魚漁ヲ盛ニ為セハナリト

○右ノ説ノ如ク魚水中ニアルトリユイヌ名ノ
解剖術ノ実験説ヲ見テ知ルヘシ○魚類
ヲ煮レハ其魚并ニ其卵子モ執拂スルニ由テ
死ス然モコレが毎^{イツモ}次必ス比自死スルニ非ス
予レバク試ルトアリ或時鉢ニ魚ヲ盛リ
卓上ニ供スルニ一^ナ條^ナ動レ

○其死
スルマデニ

生活セリ我國ニテハヨク孰者スルトナク多クハ半孰ニシテ食フカユヘナリ凡ソ魚以テ者テ其死スルマデハ幾許ノ沸扱ニ堪ルカ
モンチン名千七百六十二年ノ著書ニ試ル説アリ

(註) モンチン名條魚ヲ試ルアリ此ハ魚ヨリ取タル魚ヲ堅炭ノ熾火上ニ置クニ魚ノ粘液ニ由テ二回或ハ三回モ其熾炭入全ク消テナリ又熾炭ノ烈火上ニ置クニ二碎時ヨリモ長ク死セスレテヨク堪

タリ○コウレット名ハ鰻子魚ヲ試ニ或ハハ蘇魚ヲ試ルニ皆前説ノ如ク甚タ頑強ナリ此ハ肉美汁ニ投レテ煮ルニ六時ノ間死セスヨク活動セリ

○ハキセ名曰クズウエーデン國ニテハ條魚ヲ患ル者甚タ多ク此ハ皆人食スル魚ヲヨク煮孰セサルニ因ル故ニ魚ハ湯火ニテ徐々ニ久ク煮目レニ塩ヲ加ルハ其速ニ死スルナリ故ニ水ニ塩ヲ多ク加レハ其速ニ死ス

○日常魚ノ種子ヲ吞ミ且ツ一盞
 ノ水ニモ百千ノ種子ヲ吞ムニ多思ヲ用
 ル人鮮シ然ルニ每人魚ノ病ヲ患ヒガ
 ルハ何ソヤ曰ク凡ソ魚ノ種子ヲ吞テ腸
 胃ニ虫シヲ孵生スル所以ハ皆其人ノ虚
 弱ナルニ因ル其故ハ第一ニ腸胃中魚ヲ
 生育スベキホドノ適宜キ温暖アリ第二
 ニ腸胃ノ裏面ニ被布スル自然ノ粘稠
 液中ニ其卵ノ子固着巢居シ或ハ腸中
 障膜ノ罅隙間ニ懸留シ或ハ胃ト腸ニ

於テ日常鼓動スル動脈ノ動ヲ以テコレ
 ヲ妨得スルヲナキ等ニ因テ其卵ノ子靜居
 潛蟄スルヲ得 第三ニ胃ト腸ニ於テ
 日常休サル蠕動機轉ヲ以テ其卵ノ子ヲ
 速ニ駆逐スルヲ能ハス 第四ニ胃ト腸ノ蒸
 氣管ヨリ日常發スル蒸氣ニ由テ其卵
 子ヲ溶解推盪シテ消除スルヲ能ハサルニ
 因ルコレヲ譬言ルニ田畝ニ穀類ノ種子ヲ下ス
 ノ後連日大ニ雨レハサ苗芽ヲ生セシテ
 其種子ヲ漂出シテ消滅スルカ如シ或ハ魚

魚子ヲ下スモ流水ニ盪滌^レ生セ不必ス
止水ニ非^レハ生セザル如シ然レハ人身ノ虫
ヲ孳生スルモ其如ク必ス虚弱ノ人ニ
腸胃ノ健運充^レ張セサルノ饑^セ粿^ニ棄^レテ
此^ヲ蓄^ルヲ釀^スルナリ○此ニ反^レテ強実ノ人
ハ腸胃健運シ動脈^遍ク健動鼓搏シテ
靜止阻滯ノ地ナク腸胃中ノ蒸氣盛^ニ
奔出^シテ温熱甚^シクハ^レレンヘト
地ノ候氣
名
管ニテ測ルニ水銀升ル^テ九十四度ニ至ル
然ルニ衰弱ノ人ハ必ス如此升ル^テナシ○人体

○世寒^ニ尾

強弱ノ別アリ然^レ正^ニ飲食^ニ様ニシテ同
ク虫ノ種子ヲ吞下ス故ニ虚人ハ虫ヲ生
シ易ク強人ハ汚穢ノ水ヲ用ヒ或ハ其他ノ
食物ニテ腸胃ニ被布スル粘液ニ膠着
シ或ハ腸ノ障膜ノ襞^間ニ懸^レ雷^スルホド
ニ其種子夥ク体中ニ入ルニ非^レハ虫ヲ生ス
ル^テナシコレ卑賤ノ人飲食ノ不良ニ由^テ
虫以病ヲ成ス所以ナリ
○右ノ起因ヨリ小兒ハ此病ニ罹^ルル^テ大人ヨ
リ多ク又婦人ハ男子ヨリ多ク又靜坐

逸居スル人ハ日常労働努力カスル人ヨリ
ハ多シ是レ親ク試験スル所ナリ

○人身中微細ノ罅隙モ虫以テ生スヘキ
ノ地ナレト雖モ特ニ腸胃ハコレヲ醸生ス

ルナ多シ
○人身ニ患ル虫以テ類特ニ五種アリ

○註五種ノ外、腸ニ生スル虫以テ類多シ則チ
ハウイルレーノ名ガルノ名パールノ名ノ書ニ詳

載ス
○第一種 此ハ乾酥ニ生スル虫以テ全ク同ク故

○孺動ス
○殊ニ

ニ此ヲ肛酥虫ト名ク其色白ク甚タ細小ニシ
テ一端ハ尖リ一端ハ細シ直腸ニ在リ此虫
甚タ敏捷ニシテ疾ク這出或ハ疾ク這入ル
此レ母見ニ多シ尿道甚タ攣執シ或ハ白
帯下ラシ兼又此虫一箇生スルナシ甚タ夥
ク孳族生ス

○註パールニユクノ書ニ此虫以テ精詳ニ記
載セリ其説ニ曰ク此虫ノ体幾多クノ輪状
ノ膜アリコレ甚タ微細ニシテ甚タ良キ顯
微鏡ニ非レハ見一雜シ其最モ濁ク著キ

○膏

所一レイシ七厘強ノ四分一アリ此ヲ以テ其長キ
 頭ト体トノ區別ヲ為ス其頭ニ口ト見ユル
 細孔アリ後部ハ其輪状ノ糜疎ホシホシテ
 深シ○リンナノウス名曰ク此虫ハ草木ノ
 根ニ在リ又馬ノ腸ニアルヲ見タリト○バルラス
 名曰ク此虫ハ蝦蟇ノ腸花ニ水蛭蟻ノ肺
 ニ在リ見ルト○ハキセ名ノ説ニ種々ノ虫ニ
 此虫以多クアルヲ見タリ故ニ幾許カノ人身
 ニ入ルヘキヲ知ルヘシ

○飲食
ヨリシテ

○此虫酥虫モ卵生ナリ必ス体生ニ非ス

○其体ニ

メーセ名ノ書ニ詳記セリ○或云此虫ハ
 女ノ婚嫁スハキ年ニハ患ルヲナシト然凡
 或説ハ入至ク此ニ反セリ
 ○レイグ名ノ説ニ肚酥虫ハ胃中マテ上行
 スル者アリ予コレヲ経験セリト
 ○第一種 此ハ圓長虫ト名ク蚯蚓ノ如ク
 ニシテ帯白色ナリ。顯著ナル輪状ノ條理ヲ
 リコレヲペルシユス名ボス名詳説セリ大氏此
 ハ百許キト或ハ其余ノ輪條アリト云一リミニシク名
 人ノ説ニ一虫ニ百四十ノ輪條アリト云一リ○

此虫ノ輪條ノ大ナル者ノ外ニ又微細ノ尖起ノ並列スル條紋ノ重複ナル者四條アリ
コノ條紋ニツ重ル者コノ條紋一輪條毎ニ四條アリ四條アルナリ
ルニ由テニツ重ル故ニ四條紋ハ八條紋ナリ故ニ百輪條ニ八百條紋アリ此條紋ノ尖起ハ虫ノ体ノ中分ニ於テハ直立ス兩端ニ在テハ各々其端末ニ向テ俯伏ス

註 此條紋ノ研究說ハミユルライノ書ニ出ル所ナリ予コレヲ究理匠術ビブリアキ書ノ書ニ收載ス○究理術ニテハ此尖

○此虫

起ヲ蚯蚓ニアリトシ人身ノ圓長虫ニハコレヲ無シトシ又蚯蚓トハ別種トス然レコノ說ハ人身ノ虫ヲ研究スル中ニ右ノ尖起隱伏シテ見ヘサルナルヘシスコノホリノノ說モ予カ説ト同シ○此尖起ノ數リンナリウズノノ說ニ據テ輪條ヲ百アリトスレハ尖起八百アリテライノノ說ニ據テ輪條ヲ百四十トスレハ尖起ノ條紋千百ニナリコレ大ナル輪條ヲ除テ數算方ク數ルナリ又ローセンノノ輪條九十アリトス

○條紋

モウヘト名ハ輪條ヲ百七十八アリトス然レハ
其魚ニ由テ多ク少アレハコレヲ明カニ定
ル一甚ク難カルヘシ

○輪條并ニ

夫起ノモノハ此ヲ以テ容易ク
一所ヨリ他所ニ轉行シ或ハ固ク吸貼シ
或ハ腸ヲ刺衝シ疼痛并ニ其他ノ諸症ヲ
発シ又魚ノ端ニ口アリコレニ小ナル突起ノ
モノ三箇アリ此ニ由テ亦侵刺疼痛等ヲ
発セシム○蚯蚓ハ縮シ短促シ或ハ

○セシム

盈張ス人身ノ圓長魚ハ生活スレモ如此ノ
形状ナシ○蚯蚓ハ死生ニ軟柔ナリ圓長
魚ハ大氏、硬固ナリ○然レモ宛モ伸延
セル輪條ヲ見出スナリ○此魚ハ唯
一條ノ生スルナリ大氏、數條生ス又
大氏、細小ナルモノ多シ然レモ偶大ナルモノ
ヲ通スルナリ或ハ小ナル者ヲ數ク通スルナ
リ或ハ唯一條ヲ通スルナリ

(註)

魚ノ夥ク生スルハ其卵多ク腸中ニア
レナリ○此魚ヲ器ニ内レ振蕩スレハ魚

ノ皮透亮ニナルコレヲ見ルニ虫以ノ体ヨ
リハ其皮尤モ長シ

○貧家ノ一女児ハ歳虫以ヲ患ヒ八分時
或ハ半時ノ間頻リニ搗搦ヲ奏シ且ツ知
覺ヲ失フ予後ニ記ス九ノ糸ノ一種ヲ用
テ九日ノ間ニ九十條余ノ圓長虫ヲ下ス

○此虫ノ種類ハ雌雄アリ蚯蚓ハ雌雄
分チ雄イカホトノ幾許ニ外形相似タル内景
ハ甚ク差別アリタリス名蚯蚓ヲ解剖
シレレレギ名ハリス子リ名テイソン名ケレイ名人名身

此虫ト
蚯蚓ト

ノ圓長虫ヲ解剖スル詳説ヲ参考シテ
明カナリ

○吾國ニテ此病ヲ患レハ此虫動モスレハ
腸ノ膜ヲ天蚕蝕シテ攢透シ腸外ニ巢居
スル者甚ク多クコレストルク名ノ書ニ詳説
スルカ如シ又此虫ノ種類ハ常ニ腸胃ノ
ミナラス間腎ニ生スルアリリユイツ名ノ花
ニバルラス名ノ書モ記セリ○ドヘル子名ノ説
ニ此虫ノ種類頸中ニアリ或ハ腦ノ實質中
ノ空窟ニ生スル者アリ五歳ノ女児鼻ノ上部

Luizentkuid (Staphisagria)

勿心々死スルヲヲ試ミナリ
 ○此魚水銀ヲ嫌ヒ惡ム或云酒并ニ火酒
 ニ堪ルヲ能ハスト然凡一小兒毎朝一魚以テ下
 ス此ヲ硝子鏝ニ内レ火酒ニ浸スト一凡夜
 ニ至ルマテ死スルヲナシ予親ク見ル所ナリ
 又ロイセンコイ 罈実ヲ搗シ或ハ其魚汁ニ浸
 セ凡死セサルホドニ頑強ナリ 此草實ヨク風籠
ヲ殺シ能アタリ
 パルラス名此実ヲ狗ニ与ヘテ殺シ其後此
 ヲ用割スルニ圓長魚以并ニ小ナル條魚以ア
 リテヨク生活セリ

重キ疼痛ヲ患フ死後解剖スルニ腦實
 ニ圓長魚アリ○犢牛、豚、魚類、其他此
 魚アル者多クシ狗ノ腎ニ此魚アル者多クシ
 此ニ由テ狗ノ諸患症ヲ發ス○パルラス名
 レーギ名ラグリヒニス名アンドレイ名リケレルク名
 テンソヌス名トルチ名其他高峯ノ先哲曰
 此魚ノ生活セルヲ取り種々ノ茶汁ニ浸シ
 速ニ死スルノ効ヲ試ムルヲアリ然凡其茶
 劑ヲ此病ニ用ルニ効アルモアリ効ナキモアリ
 テ一定シ難シボス名此魚ヲ冷水ニ浸セハ

威靈堂
 本草綱目

kwarts worm (urmes cucurbitini)

○第三種 此ヲ條虫ト名ク是レ條ノ如クナレナリ此虫扁平白色、關節アリテ甚々長シ○或云此虫漸次ニ關節ヲ新生シテ長ク育スト○此虫ハ一人ニ一條アル者アリ或ハ二三條生スル者アリ

註 或云此虫ハ一條ヨリ多ク生スル者ナシ故ニ此ヲ一單虫ト名クテ然レ我國ニテ此ヲ歴試スルニ營ニ一條ノミナラスゾーレン人、テルドーセイ人ノ説ニ一虫ニ此虫ハ三條通世スルヲ實驗シ又

此虫ト他ノ種類ノ虫ト各ク通スル者モ見ルナリ

○此虫一端ハ闊クシテ關節長シ一端漸次ニ狭ク關節モ亦短促シ其端末ニ至テハ其節微細シテ顕微鏡ト雖モ見一維ク其末端ニ細小塊球トナル此ヲ人皆虫頭ト名ク此尖端ヨク伸縮ヲ為ス○一端ノ闊キ所ノ關節ハ自ラ互ニ相牽引ス此關節ノ一片ヲ蠶子虫ト名ク此關節片々離断スト雖モ各ク生活スルニ由テ

別ニ一名ヲ命ケ一箇ノ魚ニト見ルナリ

註 或ハ此關節自ラ相離レテ生活シ下

ルナリアリカヲニクノ名ノ説ニ春秋ニヨク下ルナリ

アリト此ガ數片通泄トス雖モ其全体

ノ部ハ猶腸中ニ在ルナリ

○此魚唯三四尺通泄スレハ其關節長短

ナク且ツ廣狹ナキヤウニ見エ然レニ文ナ

ク且ツ其潤キ端ニ比スレハ關節短促ス○

其關節ニ各ク皆峯起セルモノアリテ此ガ

峯起セルモノアリテ此ガ

○其横徑モ

○一方ハ

宛モ圓キ孔口ノ如シ○關節ノ短促セル部
ハ其孔口縁ニツリ關節ノ疎濶ナル部ハ其

孔口其扁面ニニツアリ 皆關節ニアルナリ

註 パルテスノ名ノ書ニ條魚六種ヲ載ス

此中四種ハ人身ニアリリンナエウスノ名ハ條魚

ノ孔口ノ數ト所在トニ由テ區別セリ○通

例 此魚ニ二種ニ分ツ一ハ關節長ク一ハ

短クナリ○ボン子ツトノ關節短促ニシ

テ狹穿ナル端ニ細小ノ突起四ツアリ其

中分ニアルモノハ孔口突弁シ彼此相通スル

○ノ説ニ

モノヲ見ルト云ヘリ○ロイセンハ并ニブテレル
ハ條虫ノ關節長キモノヲ見タリト
○諸條虫ハ皆其狭窄ノ端ニ四ノ細
塊アルニ非ス又ヘールハ人ノ書ニコレカ三ツアル
ヲ見タリトゾーレンハコノ細塊アルヲ見
ルヲ無シト○パルラスハ右ノ四ノ塊起ノ
モノアルヲ以テ條虫ノ徴候トス

○此虫ノ生活セルモノハ此孔口或ハ伸起シ或ハ
收縮ス此口ニ由テ蠕行シ且ツ田日并ニ腸ヲ
吸吮シ患者ノ諸症ヲ發セシム○此虫ハ
ヲ微温ノ乳汁ニ浸セハ幾許カ太ク起脹
シ關節區別分明ニナル

註 クリーニガ人 生活ノ條虫ヲ掌上ニ置キ

乳汁ヲ滴スレハ乳汁ノ流ルニ從テ其虫ハ
邊側ニ這倚リ其孔口突起シ乳頭ノ
如ク漸ク膨脹ス顕微鏡ニテコレヲ見レバ
其孔口宛モ味^{クダシ}レノ如ク乳汁ヲ吸吮ス
○此虫ハ人身ニ在テ甚タ長ク連續スルヲ
幾^{イカ}ント信スヘカラサルカ如シ予此虫ハ十丈ニ足
一^{イカ}吞ニ下ルモノヲ見タリ或ハ三丈ニ連續トシ

尺尋
Orie powder ellen.
tastia ellen.

テ下ルヲ見ル^トアリ○ヅ^イヘ^シ名ノ説ニ農
 民吐劑ヲ用テ一箇ノ虫ヲ吐ス其長和
 蘭ノ尺ニテ五丈一尺アリ^ナ此虫^ハ仍^タ其餘^カ幾
 許モ長ク吐スヘキ所ナリ^レニ患者自ラ誤
 テ諸腸悉ク吐出シ去ルナリト思ヒ恐怖
 シテ中道^{ナカ}ニ^カテ^ゴ啗^ロ切リタリ此ノ如ク甚ク長
 キヲ以テ考レハ大小腸并ニ田日マテモ此虫以テ
 ルヘキナリ此虫^ハシバク狗ニアルヲ見ル^トアリ
 ラウリン^名曰ク一人屍ヲ解剖スルニ條虫一
 丈六尺アルヲ見タリト

○片切
 テ

793 3/4 allen

註 ストランドベルグ^名ノ書ニ曰ク一處女千
 七百五十九年ノ六月ヨリ千七百五十四
 年ノ九月マテ條虫^ヲシバク通泄スルヲ
 惣計スルニ百中^一丈二尺二寸余^ニリ
 ○條虫^ハ幼メテ^コ通泄スル^キハ其後^ニ通泄
 スル^キニ比スレハ長ク且ツ闊ク見ユ又生活
 ナル者ハ闊窄縮張シテ蠕行シ縁邊
 勾屈シテ蠢動ス又通泄スル^キ生活ス
 レ^ル死セル^カ如ク見ユ^ルアリ或ハ十二時モ

風雲堂

窓心前ニ置テアレ氏猶死セサル者アリ或
ハ盤ニ内レ微温湯ヲ注ケル忽チ蠕動
ス然レ此ニ冷水ヲ注ケル^{物チ}死スルカ如ク静止ス
予如此ニレテレバク殺シ且ツ活ス^{アリ}則
チ如此レバク久ク冷水ト温湯ヲ互ニ更
ク注ケル魚ノ惣身ニ被テ所ノ甚ク薄
キ膜自テ剥脱セリ又此魚^{ヨク}觸知ス
其故ハ生活スル^片ニ鋭刀ノ尖ニテ衝ク^片ハ
忽チ蠕行スレハナリ○此魚^レバク下ルユエ
ニ精ク息ヲ用テ引出セハ^{幾許}長ク^凡

〇肛門ニ

尺^シ引出レ除クベシト人皆^{カモ}息ヘリ然レ
一頃ニ全ク引出ス^ト能ハス其故ハ^{幾許}
細慎注意シテ引出ストモ患者勿心^チ此時
ニ於テ^モ調動搖制スルカ如キ搔痒ヲ覺ル
ニ由テ引出ス中ニ自ラ其^魚ヲ断絶スレハ
ナリ如此キ^片ニ^二繭絲ヲ以テ^魚ヲ纏結
レ其下ヨリ截ル^片ハ其絲^魚ト^凡ニ腸内
ニ窟入スル^ト六七尺許ナル^トアリ然レ此ニ
由テ終ニ自ラ^復タ垂下シ日ヲ経ス^通世
スルナリ

○前説
如ク
○并ニ

○一ニハ此虫ノ容易ニ引出シ難ク又通
利シ難キ所以公此虫ノ關節ニ在ル所ノ
孔口ヨク腸ニ吸貼固着ス又人ニ於テモ魚
類ノ狗ニ於ルカ如ク此虫ノ狭窄ナル方ノ端ニ尖
ニアル通例ノ口（通例ノ口ト言フハ狭キ方ノ端ノ頭ニ
アル口ナリ）關節尽クアル孔口ト分別
シテ見ルニヨリテ容易ニ離スル能ハザルホドニ
腸ニ吸貼固着ス（左ツプル名ノ書ニ曰ク此虫
自ラ腸ニ吸着スルヲ宛モ水蛭ノ吸着スル如
ト）○テイツソン名曰ク狗ヲ解剖スルニ生活セル

風雲堂

條虫アリ其洞キ方ノ端ハ直腸ニ懸垂ス狭
キ方ノ端所謂ル
虫頭ナリハ釘ヲ以テ剔起スレモ容易ニ
離レ難キホドニ甚シク十二指腸ニ吸入固着
セリト此ヲ以テ考レハ此虫ノ狭端ニ毀損セス全
ク離レ下ルニ非レハ幾許イカホド長ク通泄ストモ此虫
尺ク通泄シ終レリト證シ難キヲ知ルヘシ又
其狭端ノ部多少腸中ニ遺留スレハ此ヨリ
復タ速ニ長育レ且ツ唯一節遺ルトイヘモ
忽チ連次シテ增長レ甚クシキ長虫トナル
ナリ

風雲堂

〇ニ由テ

註 此魚ノ狹端ノ頭、腸ノ膜間ニ撥入
シ吸貼スルモノヲレバく見ルテアリ如此
ナルモノ魚類ニ見ルテ亦多シ

〇此魚大ニ長育滋自心スル〇腸中ニ任
留スルノ間處十キニ至リ止テヲ得ス其刺
端一肛腸ニ低垂スルテ明白ナリ〇或ハ
此魚ノ一片ヲ毒枯シ或ハ死敗シテ大便ニ
交リ通泄シ或ハ此カヲ糸割ニ由テ駆出ス
ルテアリ此ハ此魚ノ關節即多クノ部分毀
傷シ或ハ腐敗シテ中間漸次ニ瘦ク下リ

〇レテ断絶

シ遂ニ断絶シ通泄スルナリ予如此腐敗
スル所以ヲ按スルニ二様アリ一ハ其扁幅ノ
両側ヨリ腐敗シ始メテ兩傍半月ノ如ク十
レハ其上下ノ腐敗セサル稜岸上下ヨリ相撞
摩手シテ断絶ス一ニハ其扁幅ノ中央ヨリ
腐敗シ始メ兩側縁ノ如ク十レハ上下ヨリ自
然ニ相牽引スルノ力ニテ断絶スルナリ此二
件ニ由テ患者ヲ糸割ヲ用ルテナレト雖モ
自ラ片々數尺断絶シテ下ルナリ
〇此魚人身ノミナラス或ハ水中或ハ魚類ニ

アル予既ニ先哲ノ明説ニ據テ千七百四十七年、王爵ノ究理ノ学校ニ於テ著ラス書曰ニ明證セリ

○此虫ハ亦狗、猫、羊、雞、雁、鳩等ノ腸ニアルヲ見タリ、或ハ初生ノ狗子ノ腸ニアルヲ見

○條虫ハ身ノ稟賦ニ得テ父子兄弟相傳ル者アリ、某家ノ姉妹ニ此虫アリ、其母并ニ其祖母モ同ク患ル者アルヲ見タリ、又

ヅーヘン名ノ書ニ實驗説ヲ纂集シ、又リルレ名ノ説ニ生レテ七十七日ヲ経ル女見其

母ノ乳汁ヨリ外ニ食物ヲ用ヒズト雖モ此條

虫ヲ通泄セリト此ニ由テ稟賦又ニコレヲ得

ルヲ明證スヘシ又ブレンドン名ノ説ニ胎兒ノ

小腸ニ小ナル蛇虫ハ數クアルヲ見ルト云ハリ

○第四種 此虫ハリン子名アスカリスリニシテ

ト名ク其形肛酥虫前ト同ク且ツ兩端尖

レリ然レモ其長三寸許或ハ其余モ長キ

者アリ大氏曰肛酥虫ナリト思フアリ

註 リンノウス名ノ書ニ曰ク此虫ハ通例ノ

圓長虫ト異ナリ圓長虫ハ大ナル輪條

誤テ

ascaris lumbrici

Fasciola intestinalis

アリ此虫ハハコレナシ又此虫スノ一端ニ微細ノ乳頭状ノ突起ノモノ三ツアリコレハリスニシテ名〇既ニ記載シ且ツ圖ニ出セリコレヲ并別スルノ明徴ト言フヘシ此徴鉅形ニハ幾許細密ニ探索スル所コレアルナシ又小ナル肛腺虫ニモ此徴ナシ又ヒヨルナ名ハキセ名亦此虫ト魚類ニアルヲ見タリト

〇第五種 此虫ヲハスレヲラインテスナリトト名クモンナン名此虫婦人ニ下スヲ見テ千七百六十二年ニ學校ニ於テコレヲ書ニ著ハシ

詳説セリ〇此虫ハ太ク両側ニ長ク凹陥タル條紋アリ此條紋ハ凹陥テ皺皺セル小点ヲ以テ成スモノナリ其一端ハ太クシテ其末鈍ナリ一方ハ端末ニ至ルマテ漸次ニ細ク去此端魚類ノ腸ニ甚ク固ク吸着ス此ニ由テ魚ヲ甚ク寒冷ナル水ニ浸スニ非レハ毎次虫ヲ引キ後テ魚腸モ共ニ連リ出テ引破ラサレハ離レガナリ〇此虫ノ縁ニ微細ニシテ差尖レル歯アリ此ヲ摩手スレハ差尖利ヲ覺ユ此虫ハ硬固ナル所ハコレガ殊ニ

○患者

甚レ此尖利ノ侵刺スルニ由テ腹痛ヲ発
スルヲ朋アキラカナリ○モンチン名此魚ヲ堅木ノ
燬炭上ニ置ニ魚ノ粘液ニテ其炭二面
或ハ三四モ撲滅セリ又燬炭上ニ置ニ碎
時半時ヲ字ニヨリ多ク生活セリ又曰ク一婦
人ブライツセム名ノ肉ヲ嚼ニ口中異味ア
ルヲ覺ヘ速ニ咯出セハ此魚ノ一片其肉
ニアリト

○第六種 此魚ゴルゲウス名人檢出シハルチン

名コレヲ精ク研究シテ千七百七十一年ノ書

○一端比
スレハ

ニ記載セリ其体セイリンデル圖ク長状ノ如
ク両端尖リ但シ一端ハ殊ニ尖レリ此ニ冷
水ヲ注ケハ其尖最突出シテ筋條ノ如シ其色
白シ但シ其尖ハ淡白色ナリ其非皮ノ如クナ
内藏ハ最モ黝澹色ナリ此ヲ火酒ニ浸セハ
其形ヲ截リタル線ノ如シ此魚ニ種々ニ屈
曲シ其窄ク尖リタル端ヲ以テ蠕行スト見
テ此端即チ魚ノ口タルヲ疑ヒナレ○
此魚ニ魚ノ氣囊ニ在○コレヲ住
處トシ長育スト見エ○此魚大ナル者ハ一冊

○ルヲ
見ル
Cylinder

指長^ク徑^{アリ}年長セル者ハ未^ク年長セザル
 者ニ比スレハ甚^ク頑強ニシテ死シ難シ此魚
 魚ノ氣囊ヲ穿蝕攢送シ腸肝其他
 内藏ニ侵入ス又種々ノ魚類ノ脾或ハ腸
 ニ在テ旋卷渦結セル絲ノ如キヲ見ル^ルアリ
 ○(ル)シグホ^ス名曰ク鰓^ニ此魚^ニハク多ク
 アルヲ見^ル故ニ此魚ノ背ヲ截^リ用^キ氣囊
 ヲ取去サレハ食^フ勿^レ
 ○ニル^クシ^ク魚^ノ病^ヲ患^ヒ其^ノ諸^ノ症^候
 ヲ左ニ記ス○鼻孔痒ク殊ニ夜分甚^ク

○腹中

不^レ意^ニ津唾甚^ク流^レ世^ニ卒^ニ吐^シ
 夜中大ニ発汗シ睡中安カラス肝脾疼痛
 拘攣^シ此ニ由^テ痞氣奔脹シ頰額赤色
 ヲ発シ時々左頰殊ニ赤色甚^クタシ或ハ
 煩悶ヲ発シ心胸困迫シ驚^ル馬^ノ心^ノ悒^ル念^ノ
 怒^ル生^シ或ハ肢体勞倦懈惰手^ノ臂^ノ
 ヲ使用セント欲^シテ舉^ル懶^シ或ハ胃痞
 脹シ大便通スレ^テ消スル^ルナク肋下疼痛
 シ粘液ヲ吐出シ殊ニ大便通スル後ニ甚^ク
 タシ然^レ凡^ソ間大便スル前ニ吐出スル^ルアリ○

○其痞脹

ニルナン名曰ク右諸症ノ中、鼻痒ク粘液ヲ吐スルハ虫ノ確徴ナリト

○前説ノ諸種ノ虫ヲ一齊ニ一人ニ患ル一罕ナリ○貧家ノ一少兒四歳甚タ虚羸疲弱スルニ因テ其母コレヲ強壯ニセン為ニ火酒少許ツ、飲シム其後數日ヲ経テ驚怖ス（キホトニ夥ク）一肛酥虫ヲ下シ此ニ條虫ノ細ナル者五尺余ニ在ニ圓長虫以下第四種ノ虫ト十條ヲ一齊ニ大便ニ通利シ其後其兒肥盈シ精力故ニ復セリ

○ヲ交ハ
○三種合テ

○例年ヨリハ殊ニ一虫ヲ患ル人多キ年アリ又他ノ一病流行スル中ハ其患者皆同ク流行ノ幼メヨリ夥ク虫ヲ吐シ或ハ下スヲアリ此症千七百四十三年ノ戦鬪ノ時、騎士并ニ歩卒ニ多クアリテ陣營ヨリ病テ帰ル者多シ此ヲ按スルニ汚穢ノ水ヲ飲ニ因テコレヲ患ルカ或ハ其以前時候ノ温和ナルニ由テ多ク一卵子ヲ生ゼルカ或ハ此時ハ一種々ノ起因ニテ殊ニヨク虫ヲ生スル時候タルカ精察研究

スルニ非レハ知リ易カラズ又如此流行病ハ
先ツ勉メテ其患ヲ治スレハ其病モ亦治ス
ヘシ其故ハ患ヲ以テ一箇ノ熱ヲ散レ或
ハ熱病ニ患ヲ兼レハ其熱増長シ并ニ
發作ノ次序ヲ失ヒ或ハ其諸症増劇シ
并ニ腹痛、腹脹、譫妄、搐搦其他如此
種類ノ諸症ヲ發スレハナリ

強壯ノ

○ゾーヘンノ説ニ千七百五十二年ノ秋一
徭卒間歇熱ヲ患フ其發作ノ時劇ク
振顫シ殊ニ手ニ甚タレ又奇怪ノ笑ヲ

發シ脉數小ニシテ振蕩シ時ニ間歇ス

此ニ吐利ヲ子ルニ多クノ粘液ニ大ナル條虫
ヲ吐シ其後諸症退キ熱モ亦日ヲ經ス
シテ治セリ

○患ニ因テ散スル諸症一ツナラス大抵此ヲ
左ニ記ス

○第一 患ノ多ク少大小ニ就テ論スレハ其
患大ニシテ數多ナルホド其食物ヲ吸引ス
ルトイヨク多シ此ニ由テ患者大ニ食ヲ欲シ
殊ニ條虫アル者甚タレ又間歇ニ餓テ

〇就テ又

速ニ食ヲ与ヘサレハ昏眩ヲ発スルアリ
此〇午膳ハヨク食シ朝ハ食ヲ欲セサルアリ
或ハ之ニ反シテ朝暮ハヨク食シ午食ヲ嫌
フアリ〇此故ニ條虫ナル産婦ハヨク常
ノ産婦ニ比スレハ多ク食スルヲ肝要トスコレ
ニ由テ其虫餓テ患心者ニ害ヲ為サルガ又
メナリ

〇糾纏

〇第二 虫塊結シ幾多ノ粘液コレヲ圍
繞膠着スル者アリ此ヲ通例虫巢ト名
ク腸中ニコレヲ生スレハ腸ノ一所起脹或ハ

〇諸

空塞シ此ヨリ凡気痞滯、腹痛、嘔吐、并ニ
驚悸ス（ま）症ノ起原トナル此病ヲミセレト名
ケ和蘭ニコロンケルト名ク一名タルコロンケル、腸劇痛
嘔吐シ甚キハ糞ヲ吐ス故ニ又
吐糞病
ト名ク

miserere

〇第三 虫ノ体ヨリ発泄スル蒸気気液ニ
同シ
并ニ虫ノ通泄スル汚物糞ヲ以テ幾多ノ
患心症ヲ発スコレ腸中ノ運化ニ從ハサル異
常ノ汚物ナレハ容易ク腐敗シテ下利或ハ
赤痢或ハ二箇ノ悪性熱ヲ醸生ス其故ハ
コノ腐敗ノ液必ス乳糜ニ混和シ腸中ノ吸

風 卷六 三

收管并ニ乳糜脉ニ由テ血中ニ運輸ス
レハナシ或ハ腸中ニ於テ死セズ其ヲ速ニ驅
除セサレハ其病并任再トシテ淹滞持久ス
ルナリ 患

○此ニ由テ

○第四 虫腸ニ在テ腸ヲ穿蝕串透シ
此ガ腹腔ニサ落テ諸症ヲ発スルヲアリイカハト許
害ヲ為ス凡外候ニテ此ヲ的知雖然凡
高明ノ医家シバク此症ヲ記ストアリ是レ
ハレロ名ノ書ニ称説セリ

註 一婦人六十歳幼年ノ時田圃ニ刺痛

一 焮執ヲ患ヒコレカ発止軽重アレ凡
全ク治スルヲナク日常此症ヲ困メリ千七
百四十四年ニ其一 疼痛烈ク増劇シメレモ
退カサルヲ八日此ニ就テ又右肋下腫瘍ヲ
発シ大サ拳ノ如ク遂ニ潰破シ黯赤色十
リ然凡田圃疼痛退カス潰瘍ノ口收ラズ此
ニ於テ患婦止トヲ得ス行程五里ノ道
ヲ經テ一医家ニ治ヲ請フ此ニ至テ新麦酒
ヲ服シ一兩日ヲ經テ其潰口ヨリ條虫ニ連
綿トシテ出ツ此ヲ箸ニ卷テ取ルニ長

尺八寸余ニシテ中途ニ断絶シ其餘緒ハ復々体中ニ縮收シ入テ出ルナシ初復ヨリ秋末マテ其潰瘍ヨリ黄黑色汚汁ヲ流シ潰口極メテ汚穢ナリ終ニ其口全ク癒合ス然レ田中ノ疼ハ依然トシテ休ナシ其後大便ニシハく條虫以テ下ス然レ其肋下潰瘍ノ部死モ虫ノ復々出ントスルカ如キ觸知一ヲ覚ユ又ヘロデスアグリツバ名此症ヲ經驗シ其書ニ記載セリ

○甚々

註ヘイステル名ノ説ニ七歳ノ小兒劇キ腹痛ヲ患ルテ數日ヨク食スト雖モ大ニ羸瘦消削シテ死ス其屍ヲ解剖スルニ腸外腹腔ニ黄色ノ液十六匁許アリ水棉ニテコレヲ清除スレハ數キ圓長虫アリテ其中唯一條生活セリ其兒死スル日ニ解剖ストイハレ然リ又小腸遍ク小孔アリコレ虫ノ穿透シテ腸外ニ出ル孔ナリ其腸内ニモ尚數キ虫アリテ皆死セリ又小腸ノ一所ニ於テ硬クシテ赤色

○皆死シ

ナル腫瘍アリ此ニ一孔アリ此亦虫ノ腹
腔ニ穿牙行セル孔ト見ユ

○一婦人腹痛、嘔吐、大便秘結ヲ患フ
種々ノ甘菜劑ヲ用レ凡才効ナシ此ニ由テ
レバク浣腸法ヲ施シテ大便ヲ利シ因
テ腹痛較輕寛セリ然凡嘔吐ハ烈
クシテ止ス、第八日ニ於テ一拇指長ノ圓
長虫一條ヲ吐シ此ニ由テ胃ヲ疏寛シ嘔
吐休ミ腹痛尚休ストイハ凡列シカラス
又一。胤籠ニ腫瘍ヲ生シ大サ雞卵ノ

○年半以
前ヨリ

○劑ヲ施シ
テ潰破
ス

如レ手ヲ以テコレヲ移動スレ凡疼ヲ覺
ルトナシドウガラ人名ヲモヘテ喜ハテ心クコレ也腫ナリト故
ニ手術法ヲ施シテ此ヲ療ス四日ヲ経テ後
其疼大ニ増劇シ且ツコレニ榮動ヲ発シ
甚タ闊キ嫩衝腫トナリ此ニ軟化ノ糊。然
凡胤籠内ノ腺ハ腫起スルヲナシ其瘡口ヨリ
膿汁三十二毛許流世シ疼痛輕緩
ス其後一兩日経テ其瘡口ヨリ虫二條
出テ十四日ヲ経テ潰口收ル然凡數日ノ後
瘡痂ニ一小孔生シ此ヨリ大便ノ稀キモノ

○堪(易)
クレテ

出ツ然氏如此僅ノ患症ユエ^{ソノ}尔^ノ後患者
療法ヲ加ル^{トナレ}○メヂカル^{エツ}サイス^{書ニ}
右ノ如キ病ヲ記シ又ヅ^ヘレン^名人^ノ經驗ノ説
アリ曰クニ歳ノ小兒死シテ^{柩ニ}藏^{ントス}
其屍ヲ見ルニ腹部甚ク膨脹セリ因テ
コレヲ剖觀スルニ腸外ノ腹腔ニ液十^ニ三^ニ寸
許アリ此ハ米異交リテ腸中ヨリ出ル液ト
見ユ又陰處ノ上部ニ當テ腹腔内ニ圓
長虫二條アリテコレカ廻腸ノ孔ヨリ
懸心垂ス然氏一條ハ大^ニ其孔ヲ出テ腹

内ニアリ甚ク細ク五柵指^{四ニ}許^ニアリ一條ハ
八柵指^{六分}アリテ通例ノ煙管ホドノ太サナリ
其三分ノ一ハ腸内ニ在リ其余ハ腹腔ニ在リ
其腸ノ虫孔ハ大ニシテ^{タヤス}容易ク小指ヲ
挿入スヘシ又其腸中ニ一虫^ニアリ其三柵
指^五ホドハ一孔ヨリ腸外ニ出テ腹内ニ懸
垂ス但シ其孔ハ前説ノ孔ヨリ低クシテ
其腸ノ下部ニ在リ又其孔ト二柵指ホド
隔テ一孔アリ 右ノ虫^ニノ一端此
孔ヲ串テ腹内ニ出ツ又空腸ノ下端

風雲

所ニ一孔アリ其大サ前説三孔ノ如シ又
空腸ニ一圓長虫アリテ係蹄ノ如ク轉
廻セリ其腸ノ上部牽縮捩結シテ窒
塞シ且ツ嫩衝ス田中ノ左側并ニ下部
腸ノ數所亦嫩衝ス

○小兒二人皆播擲ニテ死スコレヲ解剖
スルニ腸ノ裏面ノ膜侵蝕破爛シ
腸ニ數多ノ穿孔アリ腹腔ニ數條ノ虫
アリコレガ名其腸ノ穿孔ニ挿入スルモノ
アリ○ベルリン名曰ク貧院ニテ一婦人ノ前

○メ

籠ニ潰瘍ヲ癸シ瘡口ヨリ虫出ル者ヲ
見タリ

○第五 虫ノ蠢動、蠕行、吸吮、スレハ
種々々症ヲ癸ス或ハ虫ノ饑へ或ハ其嫌

フ所ノ食物ニ由テ驚馬駭シ并ニ虫ノ
堪ルヲ能ハサル薬劑ヲ用レハ虫ノ擾動シ
或ハ潜匿シ或ハ腸ニ固着ス○虫ハ通
例硬軟ノ食物、塩製ノ食物、塩漬ノ
魚、或ハ酸味ノ酒、或ハ苳心、茴香、甘草、
沙糖、蜜水等ニ堪ルヲ能ハス然レモ虫ハ

○患

○ヲ加ル食
物

○加

ヨク乳汁ヲ喜フ間此ニ由テ諸症鎮止ス
 ルナリ然レ或ハ此ニ由テ諸症増劇スルナ
 罕ナラス又ハ深ク腸中ニ潛藏セル虫此
 ニ由テ卒ニ跳動シテ胃ニ上衝シ来ルナリ
 リ○田日并ニ腸ハ感觸知覚甚シ故ニ
 虫ノ蠕動及ヒ吸吮スル中ハ搐搦、惡心、
 飲食ノ味ヒ惡ク舌白苔ヲ生シ心胸苦
 悶、煩躁、嘔吐、腸滾鳴、腹起脹、腹
 痛、劇ク下利シ或ハ大便秘閉、急心、飢等
 其他如此類ノ諸症ヲ發ス○腸胃ト自余

或ハ

in sen herand

○虫病
ニ發ス

ノ總身諸部トハ共ニ一團軀内ニ在テ一
 系聯絡、萬維貫通スルヲ以テ腸胃日ニ與
 侵刺スレハ總身ノ常機ヲ失ヒ之症、
 手モ總身ニ蔓延ス故ニ皮膚層、
 六西心寒、戰慄ヲ發シ、腎、
 小便黦澹色、或ハ全ク閉塞ス咽喉
 牽縮スレハ、
 自余ノ諸症ヲ發スコレヲ例スルニ或ハ脉
 弱、時ニ間歇シ、心悸動、眩暈、頭旋
 回、言語寔澁、不語、眼亡目、耳聾鳴

恐怖怯懼、精神悒鬱不樂、或ハ惛然恍惚痴呆ノ如ク、或ハ謔言狂惑、或ハ腫中惕然トシテ跳起シ、多ク夢魘、擾安眠セズ、神思沈重、愁心憂及シ、或ハ大ニ煩悶苦惱シ、身肢困倦、安カラズ、呃逆、搐搦、癲癇、卒厥等ヲ發ス

註 兄弟二人ノ者共ニ劇キ搐搦ヲ物心身ニ發シコレガ頻々ニシテ僅カニ四半時半時ヲ六十分或ハ五半時半時ヲ五分間休毎時トス止スルノミ然ルニイッモ毎次此症イカホト幾許劇盛

○人皆

ナル中モ患者ノ面部ヲ吹ク中ハ勿心々休止セリウアルボム人ノ説ニ此症患病タルト疑ヒナシトセリト

○或者卒然トシテ全ク癡狂セリ然ルニ魚ヲ通泄スレハ患者勿心々痲ヲ癡スル如ク痿弱ニシテ癡狂鎮止セリ

○或ハ魚ニ由テ婦人經閉スル者多ク又乳母魚アレハ多クハ乳汁早ク消云或ハ乳頭破裂シテ辰晷輝裂スルカ如ク且ツ乳頭ニ黧澹色ノ輪ヲ匝圍ス

○スピゲリウス名人曰ク一貴官ノ處女食物ヲ嫌ヒ且ツ其嗜好乃孕婦ノ惡阻ノ如シ又体軀浮腫月信全ク絶ス其又母コレヲ患心テ細査直紮索スルニ就テ遂ニ妊身トス此ニ於テ諸サ茶劑ヲ休ム其後患心婦勞瘵トナリ如此拙考方急慢ナル保護ニ由テ死ス其屍ヲ解剖スルニ子宮ニ胎ナク腸中ニ粘液汚水夥シ其中ニ條虫アリ其長腸ト等シ○是故ニ医家若シ困篤ニシテ非常希異ノ病ニ會ハコレ虫ニ

○總

病タルカト一考索スヘシ又非常ニシテ通例ノ法則ニ越タル病患アリテ細診詳察スレモ明白ナル起原ヲ認得サレハ毎イ次患心者ニ就テ虫ノ徵候十キカト云フヲ考索スヘシ○虫ノ病ノ徵候ハ初メニ通例諸虫候ヲ挙ク次ニ各種ノ虫候ヲ弁別ス
○諸虫ノ總候ハ面色或ハ黯澹或ハ赤色ニシテ瘵及スルノ多シ眼胞青色ニ匝圍シモンロ名曰ク虫ノ病ノ患心者ノ腫子平

口速

常ニ比スレハ尤モ冗クナリト
食後頭痛ヲ発シ、毎朝興寤レハ口中
津液満チ、夜中枕ニ涎ヲ流シ、或ハ腫中
安カラズ且ツ跳起スルヲアリ、或ハ腹ヲ禱
ニ着テ伏卧スルヲ好ミ、腫中咬牙シ、或
ハ啜リ紙ルカ如ク且ツ卧床ニ起坐シ、或ハ叫
呼シ、或ハ言語スレモ亦忽チ腫リ、或ハ毎朝
甚タ渴シ速ニ与ヘザレハ昏暈ヲ発ス、或ハ
時々頭旋運回シ、耳聾鳴シ、時々惡
心シ、或ハ食ヲ嫌フ然レモ其好惡心定

口腫

口患症

ラズ或ハ大ニ饑テ食ヲ欲スルヲアリ、或ハ
気息惡心臭アリ、或ハ毒斷消削シ、或ハ
嘔吐ス、或ハ胸膈逼迫苦悶、腹痛、絞急
シ、臍圍殊ニ甚タシ、或ハ腹卒ニ脹リ
疼痛スルヲアリ、或ハ腹中爪氣雷鳴ス、或
ハ腸中ニテ虫吸吮シ、并ニ蠕動運轉スル
如キヲ覺ユ、或ハ時ニ劇ク下利スルヲアリ
然レモ此ニ反シテ秘結スルヲアリ、又其大
便甚タ惡臭アリ、此病大抵、多ク食ス然
モ羸瘦ス、此病大抵、朝ハ惡症殊ニ夜

風雲

飧ノ前、朝食ノ前宜シカラス又此病、
月ノ虧ル頃ヨリハ新月頃諸患心症増
劇ス

○或ハ直腸搔痒ヲ覺ヘ時々眩暈スル
ホドニ甚シキコトアリ又シバク大便絞搾ス
或ハ心思快々トシテ樂マス煩苦安カラ
ス平日ノ作業勤務ヲ為スニ懶ク或ハ
平居無事ノ時モシバク勞倦疲困シ何
ヲ以テ疲倦スト云フヲ顯ニ言フコト能ハス
或ハ患者言フコト能ハス或ハ癡狂シ或ハ狂

ノ如ク見^實ニ放肆躁^怒心スルアリ

○或ハ顯著ナル起^因モナクシテ搐搦ヲ
發シ其輕淺ナルハ口中ニ涎沫ヲ流スコト
劇キモノハ口中涎沫アリ○或ハ全身強
拘不遂シ^昏目ス然レモ劇キ搐搦ヲ
發シテ醒復シ此ニ次テ譫妄ヲ發シ
其後昏睡シ少間ニシテ醒覺シ精神
状爽ニナル者アリ爾後唯身肢疲勞
スルノミ^一○或ハ渴レテシバク飲液ヲ欲ス
ル者アリ或ハ乾欬ヲ發シテ宛モ哮喘欬

ノ如クコレヲ一他ノ病ヲ患ルノ後ニハ
發熱ヲ疲倦者アリ此ハ心榮動ヲ苦シム
ナリ○アレキサンテムモンロ曰ク腫子較
著ニ散大スルモノハ虫ノ確徵ノ一トス○
スウーテン名ノコムメント書ノ書ニ曰ク卒ニ昏
暈ヲ發スル片ニ甚タ寒冷ナル水一盞ヲ
服シテ勿心ヲ治スルモノハ虫ノ確徵ナリト
然ル所以ハ予圓長虫、條虫ノ條ニ於テ
冷水ノ性功ヲ説示スカ如シ然レモ虫ヲ
多少吐レ或ハ下ス片ハ此ヲ最モ確徵トス

ルナリ

註 虫ヲ吐レ或ハ下スヲ以テ虫ノ病ノ專
徵トシ難シ其故ハ他ノ諸病ニ虫ヲ
兼ル一甚タ多キカ故ニ此ヲ專ニ虫ノ病
トシ

○右所説ノ諸症候皆一患者ニ非
尺ク發スヘキニ非ス唯其症多ク發ス
ルヲ以テ此病タルヲ知ルニ○十歳ノ一
女兒ヨク食スト雖モ羸瘦シ面部黯
澹、眼胞青色、膝并ニ脚疼痛シ毎

次^モ月^ル虧^ル頃^ニ床^ニ就^ク予^レ此^レ諸^レ症^{アル}ヲ
以^テ適^ニ虫^ノ病^名ヲ^決シ^テ殺^ス虫^ノ散^ヲ
削^ヲ子^ヘテ^治セリ^其散^削ノ^効功^予後^後
條^ニ并^セリ^〇一^小兒^何ノ^起因^モ十^ク高^腫
瘦^シ何^ノ苦^ム所^モ十^ク伏^枕ス^然凡^モ每^朝
寤^レ六^腹ヲ^下ニ^シテ^伏卧^ス此^於テ^下削^ニ
カ^ロメル^{十二}回^升娘^ヲ加^テ丸^削ヲ^用テ^細薄^{ナル}
十^ル條^虫ヲ^下セリ^〇ゾ^ーレン^ハ曰^ク十二^歳
歳^ノ無^病ナル^小兒^不圖^眩暈^搖擗^瘰
癭^癭并^ニ癩^病ノ^輕等^ヲ獲^レ其^後

日^癸執^トナル^此ニ^由テ^水銀^ヲ煮^タル^水ヲ^服
服^セル^ム此^ニ由^テ速^ニ大^{ナル}圓^長虫^ノ
二^條下^シ其^諸症^悉ク^休ム^〇リ^ンデ^スト^ルテ^ハ
幼^官家^ノ十^歳ノ^女兒^ヲ療^ス其^症特^ニ
左^腋疼^痛ヲ^苦シ^ミ乾^欬、^稍癸^執シ^テ
脉^數、^大渴[、]口^中乾^燥、^又時^々胃^絞
痛^シ、^或ハ^時ニ^不語^トナリ^且ツ^搖擗^ヲ癩^シ
ス^此ニ^由テ^意ヲ^是レ^虫ノ^所為^ト乃^チ
殺^ス虫^ノ散^削ヲ^用ユ^コレ^ヲ二^削用^ヒ弟^一
二^日ノ^日中^比ニ^烈キ^搖擗^ヲ癩^シ脚^ヲ

○空管
状ノ

背ニ牽引ス少間ニテ靜止シ夜ニ至
ルマテ熟睡ス其母其児ヲ卧床ヨリ抱
キ奉ルニ生活セル圓長虫以其長六寸
許ナルモノ襁褓ヨリ落テ地ノ如ク蟠屈
スコレ其烈キ搖搦中ニ唯コノ虫ノ通
泄セルモノナリ其後一二ノ虫皮并ニ虫
脱皮宛モ葱心葉ノ如キヲ通利シ快復
セリ
大起卧安カラス

○若シ腹中滾鳴シコレガ殊ニ一偏側
ニ於テシ且ツ瓜氣蓄滯シテ起脹シ胸

下_心困迫シ頻_同苦悩ヲ兼子而シテ
譬_ハ齒_ノノ_エキ_{スク}ラ_ト締_ヲ分量適宜
ニ服スル後毎_イ次_モ其困迫在ニ腹中蠕動
ス此カ如キ運轉ノ消散スルハコレ虫ノ病ノ確
徴ナリ

○テリウス名ノ書ニ曰ク一少年右腕并ニ
腰深ク疼ミ此ニ由テ右脚ヲ内_ハ勾_ケ
跛行ス其父母意_ヲク腰_ノ髓_ヲ潤_サ推_シ
テ然リト然_レ氏_ノ医_家以_カ爲_スク腹硬脹シ
レバ_ク胃_ノ痰_ヲ苦_シミ口_中時々津液満

千鼻異痒ク小便牛酪清ノ如ク見ユルヲ
以テコレ虫ノ所為ナリト故ニ殺虫以劑ヲ
用テ虫ヲ下シ治セリ

○右説所ノ證候ヲ以テ虫病タルヲ知
ルヘシ又各種ノ虫候ヲ左ニ列ス併セ考

スヘシ

患者

○條虫ハ腸中ニテ虫ノ吸吮ニ生
テ蠕動ノ機轉アルヲ覺ル者○或ハ腹
ノ一傍側ニ於テ一球塊アルガ如ク重キヲ
覺ユ○大便ニ時々此虫ヲ下シ殊ニ下劑ヲ

Helkenboom

服シ或ハ胡蘿蔔ヲ多ク食シ或ハ木楊

汁ヲ服シ或ハ松木ノ汁ヲ多ク用レハ

胡瓜仁ノ状ノ如キ虫ヲ下スヲアリコレ條虫

ノ種類ノ断片ナリ此縁ニ細ロアリ○リン

ナアウス名曰ク此虫ハ薊ノ仁ノ如シト又曰ク

一種大麦粒ノ如ク見ユルモノアリト○今エボイ

名ノ條虫ハ書ニ并ニリンナアイ名ノアムニト

ノ書ヲ見ルヘシ

○圓長虫ハ一箇ノ徵ハ腹寧手絞疼痛

シ殊ニ脘圍ニ甚タシ又時ニ腹中跳動

風雲堂

樺

風雲堂

スルカ如キヲ覚ユルアリ

○レバク

○肛酥魚ハ直腸ニアルユニ肛肉痒ク大便スルニ絞搾シ心志樂マス倦惰鬱重ス

○レバク

或ハ甚タ下利スルモノアリ肛門搔痒甚

由テ其部^痔張レテ小便通シ難ク

或ハ淋歴ス或ハ痔血ヲ^癩スルモノアリ○

○虫^ハアル人ハ其患^ハ症^ハ日常^ハ不断^ハ癩^{スル}

カレテ

ニ非スの時々^ハ癩^ス大^氏諸^虫特^ニ條^虫

ハ^ハ滿^月ノ終^リノ^後并^ニ月^出ノ初^メニ^ニ癩^ス

註 月ノ盈虚ノ所為ニ由テ患^ハ志^ハ癩^ノ癩

スル^ト予^未夕^領解^セス然^ル氏^予唯^此ヲ^ヲ經驗ニ由テ^一知^ルコ^レ唯^某ノ時

ニ癩^動スル^ト肛^酥魚^ノ特^リ夜^ニ於^テ癩^動スルカ如シ

○シムメルマン^名ハ月ノ盈虚ニ拘^ラスト雖モ亦此^支ヲ其^書ニ記^セリ曰^ク一^婦人

三三年以前ヨリ月虧レハイッモ毎次條虫ヲ下ス一ニ三尺或ハ八九尺許ナリト

○ビスセツト名ノ書ニ曰ク薄弱ナル一婦人肛酥虫ヲ患ヒイッモ毎次満月ト虚月ト

ノ時ニハ特ニ必ス甚シク発動シテ困苦セリト○ベルレヌス名ノ書ニ新月ノ時ニ必ス虫以症発動スル者ヲ記セリ

○虫以病ニ於テ其虫一旦ニ配除スルヲ能ハサル者ハ先ツ唯其ス発動ノ患症ヲ

緩解スヘシ其法一ナラス

○第一 患症者ニ九十六莪或ハ百九十二莪ノ乳汁ヲ牛ヨリ絞リ取リタル者ノ温煖

ニシテ飲シムヘシ其故ハ者タル乳汁ハ其志ヲ鎮止シ易カラザレハナリ

○第二 患症者ニ輕キ吐割ヲ与フヘシ其法嘔欬嘔欬嘔ヲ用ル如クスヘシ其法

ノ如ク小兒虫以症発動ノ時ニ用レハ諸惡症速ニ解スヘシ○千七百五十二年四歳

ノ一女見一朝大ナル圓長虫一條ヲ下ス此ヨリ毎夜六ツ半時酉半刻ヨリ烈シク

○甚ク

啼叫レテ四ツ半時^{半刻}マテ休マサル^二十一日ナリコレヲヨク^キ尋索スルニ唯腹痛スルニ由テ然リ其啼叫ノ初^ナヨリ医家此見ニ良効アル虫^ハ刺ヲ用レ氏寸効ナレ此ニ於テ予ニ治ヲ請フ予其啼叫^レ始ムレハ速ニイペカコアナノ散^ハ刺ヲ与ヘテ吐スル^一二回此ニ於テ腹痛休ミ啼叫スル^一ナレ翌日圓長虫ノ膜ヲ數ク大便ニ通セリ其後種々ノ虫^ハ刺ヲ用ヒ殊ニ此見ニ種痘ヲ施ス前ニ專ラ用ヒテ恙心

風雲堂

〇後ニ曰ク

ナク輕痘ヲ癸セリ此ヨリ其見虫ヲ患心ル^一ナク又虫^ハ症ノ諸候ヲ癸スル^一ナレ
註吐^ハ刺ヲ諸虫ニ用ヒ且ツ肛^ハ酥虫ニ用ヒテ^一大効アル^一ロホン^ハ名^ハ千七百六十五年ノ著書ニ称説レ且ツ其經驗ノ医^ハ按ヲ記セリ其吐^ハ刺ニ由テ胃ト腸トニ強烈ノ運動ヲ起シ此ニ由テ腸胃ニ留結スル所ノ虫^ハ并ニ粘結セル汚液ヲ疏解シ而シ其^ハ泄除スヘキ便捷ノ道路ニ從テ或ハ吐シ或ハ下スナリ故ニ先ツ

風雲堂

吐劑

Dr. Dietz

初メニ^和塩ヲ用テ腸胃ノ粘液ヲ疏解
稀釋シ而後吐劑ヲ用ルラ尤良トス
一又一一虫ノ患者三人ニ用ルニ皆大
効ヲ得又一人此ヲ用テ良効アルヲ
詳ニ其書ニ記セリ

○第三 大人ハ虫ノ症發動ノ時ニデ
イリツ
註名ヲ三十滴或ハ四十滴、少許ノ酒或ハ
酒ニテ用ユヘシ殊ニ圓長虫ノ症各
昏暈、輕キ搖擲アルニ良トス

註 デイイリツノ方

阿魏 二匁 阿片 半匁

鹿角塩 半匁

エッセンチアカストレウム 二十四匁 新局方

右浸出シ濾過シ貯フ

○第四 條虫ニ於テ神思沈重、
心下痞悶、^{ドレンキン}腹脹ヲ患ルヲ診知セハ

エキスタラクト アブレンチ ^{新局方} 食匙ニ一杓或
ハ二杓 ^{一杓 四匁} ヲ酒ニテ用ユヘシ此ニ由テ腹ノ壓
迫、腹脹速ニ消シ且ツ偏腹、^{ドレンキン}蠕動運
轉必ス除クナリ

風雲堂

○此ニ由テ

○レバク

○右ノ諸法方ニテ其症一旦ハヨク輕緩
 スレモ其虫ハ依然トシテ去ラサルモノハ
 吐劑ヲ与ヘテ腸胃ヲ振蕩シテ虫ノ此ニ
 固着セルヲ離シ驅泄スヘシ吐劑ヲ以テ
 虫ヲ驅逐スルトブロウセツト名既ニ謹明
 セリ

○予虫ヲ殺シ且ツ驅泄スルト左ニ記ス
 如シ

○肛酥虫ハ或ハ胡蘿蔔根ヲ生ニテ食
 シ或ハ蘇木ノ汁或ハ松木汁ヲ虫ノ下

泄スルマテ飲ムヘシ能ク此虫ヲ通泄スルト
 多シ○或ハ新鮮ナル豚豚ノ肪ノ一片ヲ絲ニ
 テ絞キ肛門へ刺シレバ間クシテ拔出スキハ
 必ス此虫數ク其豚肪ニ着テ出ルナリ然
 レモ此虫ヲ尽ク除ント欲セハ其豚肪ヲ
 幾回モレバク肛門ニ刺シ且ツ其刺カス毎ニ
 新ナルヲ更カ用エヘシ○或ハ自然ノ温煖ホド
 ニ温メタル乳汁ト塩少許ト合シ或ハ菜
 泉ニ塩少許加ヘテ浣腸法トシ或ハ極細
 末ノ冰糖一匙ハ糞糞一匙ヨク研合シ此ニ

ロツテウテル

者ル^テナク火温ニシタル乳汁ヲ加^ハ浣腸法
 トシ五六日モ施スヘシ右諸浣腸法各^ク
 皆此虫ヲ殺シ且驅除スルニ良効アリ
 (註)ヘーベルテン^ノ書ニ曰ク一患者^者肛酥臭
 ヲ患ヒ火温ナル乳汁ヲ直腸ニ注入シ此
 ニ由テ其患症靜止セリ又^ハ乳汁
 汁ト油ト合シ肛門ニ注入シテ其^ノ酸^ク搾
 并^ニ粘液。除治セリ又大黄半^ト朱沙半
 棧合シテ服セシム此ニ由テ^ハ宛^モ糞^ヲ糞^ヲ糞^ヲ糞^ヲ
 白ノ如キ粘液ヲ^ハ斷^ス下^レ此ニ幾^ク多^ク

○大便ノ
 様々大便
 ヲ

肛酥臭^ヲ交^ユ大黄一味ヲ与^レハコレヲ多
 ク下ス^ルナシ或^ハ此虫^ハ甚^ク驅除シ難
 キ^トアリヘーベルテン^ノ人又一患者^者ヲ診ス其
 症田日甚^ク疼^ム西心^ハ嘔吐^ス大便秘結シ
 不寐^ス并^ニ食ヲ欲セス身体甚^ク羸瘦
 シ起立歩行ス^ル能ハス腹堅^ク變^テ縮
 シ小便牛酪清ノ如ク見^ヘ稀^キ乳^ノ白色^ノ塗^{アリ}
 アリ大便硬^クシテ免^テ糞^ノ如^シコレヲ引
 出サ^レハ通ス^ルナシ諸^サ茶^ノ条^ヲ削^リ用^レル
 寸効ナシ或^ハ者^ハ此ニ食塩百九十二^ト棧^ヲ

○用ル

水三百八十四匁ニ解シ四半時ノ中ニ飲
 シム患心者勿心ナ悪心ヲ癸シ田日ニ痞
 ヲ覺ヘ嘔吐ス此ヲ〇第四回ニ於テ幾多
 虫ヲ下セリ〇或ハ馬ノ腸ニ在ル如キ
 大サ麦粒ホトテ肛酥虫ヲ下ス者アリ此
 症ハ十四日モ大便通セスレテ其後悪心臭
 ニレテ血ヲ交ヘタル大便六七枚通シ夥ク
 虫アリレバク如此通泄レ第三日ニ於テ
 前説ノ塩水ヲ前法ノ如ク用ユ此ニ由テ
 又其虫死シテ通泄セバ其後患心者

Scordium
 Worm Kuid.

健康ニ復ス然レ尚イヨク根治センガタ
 メニ一月出ノ前二三日ノ間塩四十八匁
 水九十六匁合シ解シテ飲シ如此服量
 少キユエニ瞑眩スルヲナク遂ニ全治セリ
 ○煙州ノ煙ヲ水鏡ニテ薰入シテ肛酥
 虫ヲ駆泄スルニ甚タ効アリ
 ○乳汁ニウルクコイド 罽葱 蘇合 蘇合
 其他如此類ヲ加ヘ者テ浣腸法トシ施
 シテ良効アリ
 ○此虫直腸ニ在ヲ以テ總テ内服劑

ハ効實方ク浣腸法ハ甚々効多キヲ
示スヘシ

○葶藶薈并ニ葶藶薈合製ノ劑ハ惣
テ此虫ニ良効アリ

○煙州ヲ水ニ浸シ或ハ其他如此製ノ劑
ルニ害アルヲヘルデシ人ノ書ニ記セリ

○水銀八匁ヲ水九十六匁ニ和シ陶壺ニ内
レ固封シ徐々ニ煮テ此ニ蜜少許加ヘ浣

腸法トシ施シテ良効アリ數回コレヲ施セ
ハ此虫ヲ消除スヘキヲ必ス明證スヘシ

○惣テ

○圓長虫ハ驅除ニ易スカラス此ヲ治セン
ト欲セハ左ノ法方ヲ施スヘシ

○第一 虛月ノ時ニ殊ニ療法ヲ施スヘシ

○第二 空心ノ時ニ葶藶劑ヲ用ユヘシ此時ニハ
其虫ノ食ヲ欲スルユエニ殺虫ノ葶藶ヲ虫
ニ吸引セシメンガ為ナリ

○第三 自然乳汁ホドノ温煖ノ乳汁或ハ

稀キニ蜜水和シ温ル或ハ水銀水水銀ヲ浸ス等
ニ葶藶劑ヲ和シ用ヒ而メ大便ヲ通患ルル少シ

前ニ自然ノ温煖ホドノ乳汁四十八匁或ハ

○毎イッ次モ

九十六棧ヲ以テ浣腸法ヲ施スヘシ此ニ由テ
其虫ノ好ム所ニ從テ下ヘ引テ虫ヲ下泄ス
ルナリ

○、第四 其服用スル甘条劑ヲ患者自ラ
製スルナ勿レ又其甘条氣ヲ嗅フ勿レ虫
其甘条氣ヲ知ルハ深ク竈匿スレナリ

○、第五 内服甘条ニテ虫ヲ駆除スルハ
其火レ以前ヨリ外傳甘条ヲ施スナ勿レ然
ラサレハ虫竈匿潜伏スレナリ○患者
虫劑ヲ内服シキ火間シテ後腹部ノ一所

剝痛シ并ニ搖擗ヲ發スル者ハ是レ其部

ト虫其部ニ於テ腸ヲ穿蝕シテ腸外

ニ鑽透セント欲スルハ微ナリ如此者ハ速ニ

其虫ヲ駆逐スヘシ此ハ其部ニ石朧油ヲ

塗リ或ハ薊穗、大蒜、保麥粉、新

タナル牛膽ヲ適宜ク調合シ捏テ餅ト

作シ適宜ク温煖ニシテ薄キ綿布ヲ開

ニ夾ミ貼スヘシ

○、第六 駆虫劑ヲ用ル一兩日以前ヨリ

乳汁ヲ調和セル食物ヲ止テ但廉ク硬

〇ニ毎ツ子常ニ

Semen Santonici

キ食物、塩藏ノ物、薑汁ニ蒸心、アザ菜
其他蔬菜ヲ調和シ用ヒ、鱈魚鱈魚ニ片ノ
ハリンゲニ充ツヲ用ヒ酒ヲ飲フナシ初メニ
如此為スニ由テ虫以疲劣シ自ラ下部ニ
降リテ駆出シ易クナリ而後驅出ス
ノサ条劑ヲ喜ンテ分量多ク服スヘシ此
ハ予此虫ノ種類ヲ駆出スルノ經驗セル故
劑ナリ左ニ記ス宜ク用ユヘシ

サルニルチスロンデシセ 新 四碎

ウラルムサード サ条仲名羅甸 十碎

サ約刺巴

味系茉莉根 此一味先ツ冰糖ヲ加テ細カニ研ル

上好蜜 各一筋

右為極細末

右劑ノ分量ハ大人ニ用ル一服ナリ予ニ前ニ
説ク如ク毎朝用ユヘシノ患者ハ条劑ヲ
容易ク服スルヲ得ル者ハ右ノ散劑一服
毎ニウラルムコイド 罇ノ露滴油一滴ツ加ヘ
服セシムヘシノ患者ハ壯実ナルモノハ右劑中
ノ条劑根ヲ五碎或ハ六碎マテ増スヘシ
然レモ甚ク速カニ瞑眩スルモノハ其量ヲ減

Wormkulis (Tanacetum)

風 寒 症

一茶匙ハ
一匙ナリ

Soep.

スレシ○小兒ハ初日ハ一匙茶匙ヲ用ユ此ニ
由テ較著ノ下利ナキ者ハ翌日ハ其見年
齡ノ多少ニ從テ半茶匙或ハ一茶匙ヲ用
ユレシ○此散劑下泄ノ効ヲ見ハサバ其下利
ノ前後ニ美汁ヲ飲ヘシ凡ソ此劑ハ月ノ
終リ三日ト月ノ始ニ三日ト用ユレシ故ニ常ニ
此劑ヲ六服製レ備ヘラクヘシ又此劑ヲ用
ル中ハ水銀水百匙或ハ其奈モ服スヘシ
此ニ由テ魚駝除シ易シ此水ハ前説ノ如
ク製表シ或ハ左ニ記ス如ク製表スヘシ

風雲堂

hydrop.
rad. gram.

藕根 二匙
橙皮黃 半匙
松浦肉桂 六片
涌泉 七百六十八匙
右者テ四分ノ一ヲ減レ慮過シ此ニ水銀
十六匙ヲ投シ磁壺ニ内レ固封シ適宜
ク温煖ニシテ一宿置キ翌朝其水ヲ
他ノ器ニ写シコレニ患者ノ甘味ヲ好ク多
クシ後淨空蜜ヲ加フ
○(イソツア) 草ノ湯浸近末虫病ニ

風雲堂

Sedus-Zaad (confectio semen Santonici)

右調合シニ碎ヲ一丸トシ金竹油ヲ以テ
 衣トス
 大人ハ右ノ一劑ヲ一服トス小兒ハ年齢ノ
 少長ニ從テ三丸四丸ヨリ五丸マテ用ユシ
 ○患者散劑并ニ丸ヲ糸モヨク服スル
 ヲ得ル者ハ丸ヲ糸ヲ夜用ヒ散劑ヲ朝
 用ルヲ良トス然レモ此症ニ於テ糖劑
 糖劑ヲ去ル其丸ヲ糸ヲ八箇ト為ス
 ○小兒丸ヲ糸并ニ散劑モ服シ難キモノハ
 セーヘルサド草子ノ名製劑ヲ勉メテ用ユヘシ或ハ

*Semin Santonici (WormZaad)
 Extract Taxacet.*

甚ク稱賛セリ一母致ヲ治スル此ヲ
 用ユ其見毎朝コレヲ一二匙ツ服シ此ニ
 由テ數ク患ヲ下シ良効ヲ得タリ
 ○患者散劑ヲ服スルヲ得サルモノハ予
 毎常次ニ記ス丸ヲ糸ヲ用ユ
 正キヌタラクト夕十セキユム製劑名
 セミナサントニシ草子ノ名判各六碎
 サルマルチスロンド新局四碎
 糖劑糖劑根脂加福糖糖研磨者六碎
 夕十セキユム露路滴油一滴

風雲堂

lixer-vitriool.

elixir rhabarbari.

セーヘルサードセメンサントニシノミナリ

又此ニ就テ時々ツク二日續テ早朝空心ニツキキレ

ラバルバル下利篇第二種ヲ糊漿匙ニ一抄ツ用ユ

ヘシ〇右ノ劑絶テ飲服スルヲ能ハサル者ハ

患者ノ腹部ニ前説ノ餅劑第六ニ云ヲ縛シ

貼シ乳汁ノ浣腸法ヲ施シテ大便ヲ導

泄スヘシ

〇虫ノ諸症尔後月ノ變化ニ就テ發起

レ且ツ小兒其他ノ苦藥劑ヲ服スルヲ得ル

者ハ鉄性石膽三碎或ハ四碎ヲ水ニ食

風 卷 六

semen abrotani campestris.

semen fantonici.

semen L. doaria.

ボートルハム麦餅ニ牛酪或ハ麦餅ニ蜜ヲ塗リ

タルモノ等ニ右ノ劑ヲ掺ケ用ヒ而ソ前説

ノ水銀水ヲ飲シムヘシ

註 ズドセ國ノサ条局ニテウラムサード本文ニ云

セーヘルサードセメンセドアリト名ク一ハ

セメンサントニシト名ク此草子ハ甚タ細小ナリ

然レ此ニ細小ナル莖并ニ葉ノ一片雜ルニ

由テ此子ノ分量甚タ少ナシ故ニリンナウス

人此子ノ代リニセメンアプロタニカムベストリス草

子ノ類青蒿ヲ用ユ吾國ノサ条局ニテハ唯

風 卷 六

elixir proprium tatis cum aceto van beverhaave.

匙ニ溶化シニ食匙水蜜少許ヲ混和シ此

ヲ毎朝空心ニ小児ニ与ヘ而シ月ノ終リニ

日ニ毎朝朝アリキシルヲバルバル見或ハアリキシル

プロプリータキスキユムアセトブルハーへ初名新

葉十五三十滴ヲ蜜水或ハ水ニ蜜ヲ加ヘタル

飲液ニテ送下スヘシ此ヲ服シテ大便黒色

ナルヲアリ凡怪クテ勿レコレ其鉄アルヲ以テ

ナリ○又小丸子ヲ作テ与フヘシ其方阿魏

鉄性丹卷、蜜少許ヲ加ヘ丸ト為シ銀箔

ヲ衣トシ毎日一回或ハ二回、二丸或ハ三丸ヲ

用ユヘシ○月ノ終リノ日ニ前説ノアリキシル

劑ヲ用ヒテ大便ヲ下利スヘシ○右ノ丸

劑ノ烈臭患心者ノ腸ニ滋滿スルニ由テ

虫ニ自ラ腸中ニ住留シ難シ又此丸劑

ハアツアルニス糖菓或ハ如此類ニ和スレ

ハル見ヨク服スヘシコレズウイーン人名コメント

書ノ四篇第七百三十三葉ニ見ヘタリ○或ハ

右ノ滴劑アリキシルノ代リニ下利セシムル散劑ヲ

用ユヘシ此ハ葛粉根細末十二碎、十五碎

或ハ二十碎ニ等分ノ以糖、桂油一滴ヲ加ヘテ

Stinkende mees wortel (Helleborus foetidus)
fidus LINNÆI, Helleboraster maximus
 GESNERI.

細カニ研磨シ分テ二服トシ用ユヘシ此ニ由テ
 速ニ下利シ且ツ良効アルナリ

○ビツセツト名殊ニ此圓長魚ノ種類ニ
 奇効ヲ称譽スル術アリ此ハスチンケンテ

ニースウタルトル (ヘルボリユスフーチギユスリチーイ
 又ヘルボラステル) キレミユスゲス子リ (四維) ト名

クル草ノ葉ナリ此ヲ乾シ細末トシ大人ハ十五
 碎ヲ用ユ或ハ此汁ニ冰糖ヲ加テ舍利別ト
 為シ一匙或ハ其余モ用ユ

(註) (ルトクドムケレーヘランド) 名國ニ於テ殊ニ此葉

ヲ称譽ス又スウツセルランド名國ドイツラント名國

ノ諸所、エングランド名國フランカレイキ名國ニ於テ

ハ此草原野ニ生ス○ケレーヘランド名地ニ於テ

人皆此葉ノ新鮮ナルヲ水ニ煮テ小兒五

歳ヨリ七歳マテハ一匙マテヲ用ユ乾葉ハ

十五碎マテ用ユ但シ二日或ハ三日モ毎朝

用ユヘシ此服量ニテ多クハ嘔吐ヲ発シ又

輕キ下利ヲ発ス此ニ就テ大ニ苦悶スレハ

嘔吐シ終レハ速ニ休ム○此草ト毒アル

氏ビスセツト名此葉ニ揚醋少許ヲ混

風雲堂

Spigelia anthelmia.

註 リンナウス名ノ精詳ナル著書曰此ニ
 圖説ニ此草ヲスピゲリアアンテルミアト
 名ク(アムニトアカド) 書五篇百五十五葉
 ニ見タリ 南亞墨利加ノ原野ニ生ス又
 北亞墨利加ノ内殊ニヤマイカ地ニ於テ園
 圃ニ植ユ○パトリキブウ子名始テ此草
 ヲ其著書ニ載セ由テ駈ルノ一葉劑ト
 シテ千七百四十八年アメリカニ任スル
 名國ノ人衆ニ此ヲ用テ効アルヲ記セリ此
 草ノ根ノ細末ハ十二碎マテ用ヒ或ハ水ニテ

Spigelia.

unctura chabacum vino

レ加テ其峻烈ノ性ヲ緩和シ其汁ニ沙
 糖ヲ加テ舍利別ニ製シ夜方一茶匙ヲ
 用ヒ毎朝一茶匙或ハ二茶匙十茶匙ヲ
 用ヒ如此二日或ハ三日モ續用スヘシ此服量
 ハ二歳ヨリ六歳マテノ小兒ニ用ルナリ而後
 大便ヲ下利スル為ニ右ノ舍利別ニ千ニキテ
 ラバルビヒノス精ヲ等分ニ加用ユ
 ○ブロウ子名既ニ千七百五十七年ノ書ニ曰ク
 リンナウス名スピゲリアト名ル草アリコレ
 虫ニ必効ノ系ナリト稱答言セリ

○并ニ此ニ属ス
ル諸件ヲ

○試ルニ

浸出シ二十片マテ用テ小三歳ノ小兒朝
ト夜ト數日連服セシム○ゴロウ子名ノ
説ニ此根ノミナラス全草ヲ新鮮或ハ
乾腊シ用ユ○其後又歐羅巴ニ於テ用ヒ
殊ニエングランド國ニ於テ經驗セリ○
ゴツクレスベイ名此草ト根一朶マテヲ沸
湯三十二朶ニ浸出シ十日或ハ十四日ノ中ニ
三服ヲ用ヒテ良効アルヲ記セリ○又
ヒンケレイ名此草ニ朶ヲ水四十八朶ニ浸出
シ用ユ又ウヘイト名此ヲ用テ良効ヲ得

風雲堂

ルノ説アリ然凡此草 エングランド國ニ生スル
者ハソイドカオリナ_{地名}ニ生スル者ヨリハ其功弱
キヲ記セリ○スウーテン_{人名}コムメント_書四篇
七百三十七葉ニ曰ク此草甚タ疑フヘシ或
人此ヲ列ク吐利スルヲ以テナリ○リンニグ
名_人ゴツクスベイ名_人曰ク此草分量多ク服スレ
ハ宛モ阿片ノ如ク頭眩暈シ運動常度
ヲ失ヒ、沉睡シ其他如此種類ノ症ヲ蔑ス
○予此草ヲ精クナクエール_{人名}エングチース_{人名}キニシテ
ビブリヲテキー_書卷ノ二、六百四葉ニ記セリ

○如此ニシテ

○モホ

其説ニ曰ク此草二握ヲ水百九十二莖ニ投シ
 煮テ半ヲ減シ濾過シ此（拍）汁（水）許
 冰糖ヲ加テ甘美ニシ十六莖或ハ二十四莖ヨリ
 三十二莖マデヲ三時或ハ六時毎ニ用ヒ三日
 用エヘシ而後下劑ヲ用テ出スヲ下スヘシ又曰
 ク此飲劑睡ヲ催ス（何片ノ如シ然レハ患心
 者寤レハ平日ニ異ナラス神思爽快ニシテ
 眼目明了ナリ○魯西亞（國）ニ於テ医家
 此茶ヲ用テ良効ヲ得ルナリ○ベルギウス（人）
 此茶ヲ稱譽セリ

○ヨリ他ナシ

註 ベルギウス（人）ノ書ニテリアメヂカエレグノ
 ヘゲタヒリ卷ノ一九十五葉ニ曰ク一女児十歳
 スピゲリアノ今量過服スルニ由テ深睡ス
 ルアリ此ハ此草十六莖ヲ水百九十二莖ニ
 煮テ半ヲ減シ此ヲ初（次）十六莖飲シメ
 第二（次）ハ三時毎ニ八莖ツ子ヲ如此用
 イテ十八時ノ後患者昏睡シ眼瞼弛
 延シテ低垂シ指ヲ以テコレヲシバク葉半
 掲スル。腫子甚ク散大ス然レ睡眠漸
 ク減スルニ從テ右ノ症消散ス又曰一小兒

列キ搗搦ニ此ヲ用ルニ虫下ルナシ
ト維モ搗搦全^治セリ又此ヲ用ヒテ
下利^効ナシト^心女ヨク良効ヲ得ル
アリト云ヘリ

○ダハルベルグ人予ニ贈ル書牘ニ此サ条ヲ
大ニ称誉セリ曰ク一婦人虫病ヲ患ヒテ
苦悶甚タシスビゲリア并ニ下劑ヲ用ルニ
由テ圓長虫十三條ヲ下セリ其方此草
ヲ細末トシ二十碎ヲ此草^浸劑一^匙二^匙
或ハ三^匙ニテ一日ニ二回或ハ三回用ユ如此ニ

シテ十四日連服セシメ其間三日或ハ四日毎
ニ下劑ヲ与フ此分量ヲ用レハ睡眠ヲ生セ
ス又他ノ惡症ヲ必ス發スルナシト

○ウタルムサード^{草實}搗テ八^匙ヲ蒸露滴
ノ火酒九十六^匙ニ浸シ^分キ^名ル^{製法}ト為

シ小兒ノ虫病ニ用ヒテ予^數大効ヲ得タ
リ但シ此劑二三日モ浸シ^茶氣ヲ出シ瀝

過シ醇粹ナル所ヲ^分取^リ用ユニ予此ニ^清
潔ナルサルマルチス^新少許ヲ加ヘ月ノ虧ル

間^望後ヨリ^晦マテ^毎朝一糊漿匙ヲ用ヒ月ノ終

○空心ニ
petel van boten.

Extractum hellebori nigri.

夕ラクトヘルレボリニゲリ
 一筋 ヒットリヨリユム マルチス 局 新 半筋 アクワ
 カルドベ子ダクト 八匙 右溶解シ 譬ハ 薑菜
 舍利別 局 新 或ハ 蜜一匙ヲ加テ 甘美トシ 小兒
 ハ一茶匙 匙一ヲ空心ニ用ユ 虫ニ甚ク 称セリ
 ○大蒜根 常ニ 習レ 食スルニ 非ル者ハ 虫ニ
 治スルノ 一良 茶条ナリ 此根ニ 三片切テ 空心ニ
 食シ 或ハ 此ヲ ポートルハム 麦 餅ニ 加テ 食シ
 或ハ 此根ヲ 細ニ 剉シ 乳汁ニ 用ユヘシ ○ 或
 ハ ポートルハンポートルニ 見ユクヲ 食匙ニ 二枚 或ハ

リニ日ハ前 後ノ 紫葉 刺劑ノ 下劑ヲ 用
 ヲヘシ

○ヒツセル 名ノ 胡桃ノ 未熟ナルヲ 水ニテ
 正キス 夕ラクトノ 製法ニ 製シ 虫ニ 病ニ 大ニ 称 誉
 ス 此劑ヲ 通例ノ 蚯蚓ニ 塗シ 八三時ノ 中ニ
 死ス 此ヲ 用ルノ 法 此劑ニ 匙ヲ 桂水 四匙
 ニ 解化シ 二歳ヨリ 三歳マデノ 小兒ハ 五十
 滴ヲ 用ユ 六日 或ハ 八日ヲ 経テ 下劑ニ 水
 銀ヲ 加ヘ 用ユ
 ○リルレ 名ノ 書ノ 心 悸動ノ 條ニ 曰ク 正キス

Strop van citraen (jiz: acetogitatis citri).

Edenburgde bittere attekfel van rhabarber (tinctura rhei amara).

四枚或ハ六枚ヲ用ヒテ幾多ノ小児能ク虫ヲ下スナリ數日此ヲ用レハ烈ク下利シテ虫ヲ下スナリ

○生鮮ナル胡蘿蔔モ亦ヨク虫ヲ驅逐ス小児コレヲ以テ虫ヲ下スマテ毎日食フヘシ

○右述ル所ノ中一サ条ヲ用ヒテ虫ヲ驅逐セハイヨク其後數ク用ヒ殊ニ月麿始ル時ニ用ヒテ其虫或ハ其卵ノ残リ留ルヲナキマテ連服セシムヘシ

○虫ニ尽ク驅除シテ後ハ其腸胃ノ衰弱セルヲ勉メテ回復スヘシ此標的ニハ小児數

週ノ間チンクチュラレイアマラ下利篇第二種治法ノ註出ニ

酒ヲ加ヘ製スル制ヲ三四十滴ヨリ六十滴マデ

与フヘシ但シ此制ニテ十分ノ効ナキモノハ

予數週ノ間ロシテンセ地ノ鋼酒下利篇第三種出

ヲ前劑ノ服量ホド用ユ

○虫ヲ兼テ執病ヲ患ル者ハ水銀水前ヲ用ユヘシ但シ此ニ蜜ヲ加ル代リニ佛糖佛糖相舍利別ヲ其味加甘美ト為リ且ツ渴ヲ清

Tinctura Violaceum (Attreksel van Vioolen)

爽ホドスルホドニ適ヨク加フシ或ハ予テ茶湯
ニ佛佛柑柑汁汁ヲ加ハ或ハ佛佛柑柑ノマルララテ
製製糖糖ヲ加ハ飲シム或ハ又又糖糖ハ油油ニニ麦麦佛佛
手柑汁一一匙以糖一一匙ヲ攪合シ此レヲ每日
四回或ハ五回匙ニテ用ユ或ハ平日服スル
飲液ニチンキチラヒヲフリユム
莖葉ノ類例アリ也
新局
ヲ其液差酸味アルホドニ少許占滴シ用
ヒ而メ前説ノ茵陳牛膽等ノ餅劑ヲ腹
部ニ貼セシム又魚ハ竜腦ニ堪ルル能ハヌ
又醋ハ熱病ニ良効アリ故ニ如此魚熱病ハ

此ヲ以テ製スル飲劑甚々良効アリ其方竜
腦一一匙ヲ取リ石臼ニ内レ火酒十五滴ヲ湿
シ研テ細末トシ此ニ極細末ノ砂糖十六
匙ヲ和シ此ヲ上好ノ醋八十十匙ヲ注テ溶
解シ患者ニ食匙ニ一抄ツ半時或ハ一
時毎ニ用ユ

○條魚ヲ全ク駆除シ尽ステ甚々難シ
其故ハ一ニハ此魚甚々長ク又諸腸ノ幾
多ノ屈曲廻折ニ在ルニ因リ一ニハ魚ニ生活
スル中ハ其狭窄ナル方ノ端末ノ尖リト其

○者此ヲ

關節毎ニ有ル小口ヲ以テ腸ニ固着吸貼
 スルカラアレハナリ是レ則チ此虫以病甚々頑
 固ニ患患。驅除スルニ毎ツチ次ニ久ク勉強スル
 所以ナリ○此虫以病ヲ治スルニハ田日ト腸ヲ
 損害スルヲナクシテ虫以ヲ殺スヲ一大上策
 ナリ明白ナリ其故ハ虫以死スレハ其端尖
 并ニ關節ノ小口ヲ以テ腸ニ吸着スルヲ能
 ハシテ自ラ其毒放シ大便ニ下レハナリ然レ
 如此系劑未タ得ズ

○生活ノ

○予前ニモ祝ク如名條虫以ヲ取テハチ血ニ

内レ温湯ヲ注ケハヨク活動ス然レコレニ冷
 水ヲ注ケハ勿心チ底ニ沉ミ死セルガ如シ此ニ
 由テ予考究シテコレヲ驅除スルヲアリ予
 患者ニ下劑ヲ与ヘ下利シ始ルル片ハ速ニ多
 ク冷水ヲ服セシム此ニ由テ虫以冷水ニ觸レ
 ハ其狭端ノ尖ヲ動カシ關節ノ小口ヲ挺
 出スルノ勢カヒ全ク奪去シテ腸ニ吸着ス
 ルノ力ヲ失フナリ此ニ於テ共ニ其下劑ニ由
 テ驅泄スルナリ予此考按ヲ以テアセスル
 ダレリウス人名ニエフサ地ノ内科学学校ニ於テ

het algemeen buik openend of het sul van d. rothen.
(fructura catholica purgans).

Semin chartam.

其下割ハ

cut

示シ故ノビスコップ名官デカルセニウス名人ノ扶
助ニ由テ人負民ヲスマトラ名地ゾロン名地ニ於テ
養ヒ此病ヲ治スルヲ人企設シ此ニ由テ
右ノ方ヨク良効アリテ予ガ考按ニ違ハズ
的中スヘキカ經驗センテ予ガ彼ニ希希子カハリ
其後二週ヲ経テ予カ示ス如クシテ一貧
家ノ女兒下ス所ノ首尾全キ條虫ニ丈
一尺六寸余アルヲ予ニ贈レリ其狭
キ方ノ端モ猶毀傷セス完クシテ其端ニ
小ナル突起アリ其側面ニ四ノ細口アリコレ

キニツテ人ノ頭微鏡ニテ明白ニ見ヘ又頭微
鏡ナシトイヘ尺尚ヨク見ユ又彼他患鐵集者
ニ右ノ法ヲ施シテ條虫ヲ駆泄セリ彼唯
紫茉莉ノ細末ヲ朝ニ用イテ午ニ用イテカト
リカピユルガンスローテン註名ヨ
午後ニ用ルノミニナリ

註

今ニクテテカトリカピユルガンスローテン

ノ方左ノ如シ

紫茉莉根

三十二支

紅藍子

十六支

セムカルタミユス

風

スカムモニユム

四支

サ藤黄

二支

○栲楲楲皮

或ハ如此香

気ノ物ヲ

加テ引名

精烈ノ

右粗末トシ燒酒百二十八支或ハ百九十

二支ヲ注キ浸出シ其燒酒赤色ニナリ

タラバ燒酒ヲ他ノ器ニ写シ其滓ニ又燒

酒六十四支或ハ其余モ注キ浸出ス而

此兩燒酒ノ浸劑ヲ合シ此ヲ再ヒ蒸露

罐ニ内レテ燒酒三分ノ一ヲ引取ルナリ

ルルセケ名ノ書ニ此今ニキケル此火酒ノ浸劑ヲ云

アリキレルピユルガンスミカエリスト名ケ且ツ稍

製法ヲ異ニス、此劑中ニ藤黄アルニ由テ

新夕ニ此劑ヲ試ミテ其効驗ヲ擴充シ

膏ニ一箇ノ下劑ノ効ノミニ非ストスルナリ

左ルルホツア名藤黄ハ條虫ニ良効アリ

リトス又カルトスミイド名ノ書ニ此効ヲ説

キ又ビツセツト名藤黄ノ効ヲ詳カニ

記載セリ其説ニ曰ク航船ノカビタン長

名ニ藤黄ヲ初メ言名菴且ノエキス夕ヲト

局ヲ以テ三丸ト為シ二丸ハ夜用ヒ一丸ハ

朝用イ又此ヲ一日二日或ハ其余數日用ル

○甚夕

○一

○十五碎マテ

中ニ二十碎マテヲ一日ニ用エルニ條虫ノ大
片條并ニ幾多ノカサ子虫ヲ大便ニ通
利セリ又此ヲ用レハ患者下利スルマテハ卧床
ニ静卧セシム然ラステ起立レ或ハ坐居
スレハ動モスレハ嘔吐ヲ発スレハナリ又此藥ヲ
大人ノ圓長虫ニ良効アリテ甚々貴称
セリ○ヘルレンスワンド名ノ方ニ亦藤黄アリ
後ニ説ク所ノ如シ
涌泉ニ在レトキ

○リンドヒルト名人亦此法ヲ以テ幾多ノ虫者
ヲ治レ又レドレン名人モ此治法ヲ多ク施セ

リ○冷水ヲ服スレハ四半時或ハ半時モ冷
テアルヘシ然レハ下劑一カヨリ
腸ニ下リテ其功ヲ見ハス前ニ吞ク冷水ヲ
飲ヤウニ其時ヲ計ルヘシ如此スレハ此劑必
ス其効ヲ誤ルナシ然レハ此4湊合ト為ス
可能ハサルユエニ此治法ヲ數回シバク行ヒ
且ツ又此法ヲシバク施シ常シテ功ナキト
ノ無キヤウニヨク預メ適宜ク計ルヘシ
註此法又條虫ノミナラズ他ノ虫ニ施シ
予レバク奇効ヲ得タリ○バンデンホス名ノ書

○イッモ每次

○又

ニ曰ク下劑ヲ服シテ後冷水ヲ多ク飲キ
ハ虫ヲ下ス_一ヲ明證セリ

○涌泉アル地ニ行カハ左ニ説ク如ク施スレ
其法條虫アル患者涌泉ノ地ニ行カハ其
旅行ノ勞ヲ一日休メ適宜キ下劑ヲ用イ而

メ其鑛泉金石氣ヲ帶ル泉ヲ云_クヲ每朝服スル_一七日

或ハ八日許如此ニレテ數日冷水ニ慣テ堪ル

一ヲ得ハ每朝早晨ニ下劑ヲ用ユ_一レ此ハ

摩訶_一羯_一刺_一把_一根半_一棧_一或ハ二_一分_一ヲ用ヒ或

ハザル_一デセイ_一グ_一子_一ツ_一テ鹽劑ハ_一棧_一ヨリ_一十二_一棧_一マ_一テ_一用

Sal de Seignette

○其翌日

○ノ間モ連

ユ。下劑効ヲ奏シテ下利シ始ル_一キハ鑛水一

蓋ツ_一服_一レ_一コレガ_一毎_一次_一三_一碎_一時_一四_一碎_一時_一或ハ

五_一碎_一時_一一碎時ハ半時ヲ服_一レ其水量ハ一_一カ_一シ

カシハ量名
六百四十棧也或ハ一_一半_一カ_一シ_一或ハ二_一カ_一シ_一等_一其_一多

少_一ヲ較_一ル_一一_一十_一ク_一服_一ス_一レ_一其_一故_一ハ_一如此_一過_一服_一ス

レ_一凡_一其_一水_一速_一ニ_一下_一利_一ス_一ル_一ニ_一由_一テ_一多_一ク_一腹_一中_一留

瀦_一セ_一サ_一レ_一バ_一ナ_一リ_一然_一凡_一其_一水_一ヲ_一急_一ニ_一飲_一テ_一勿_一レ

其_一水_一爾_一ク_一速_一ニ_一胃_一ヨ_一リ_一腸_一へ_一下_一ル_一一_一無_一レ_一ナ_一リ

此_一法_一ニ_一由_一テ_一其_一虫_一全_一ク_一大_一便_一ニ_一下_一リ_一テ_一爾_一後

絶_一テ_一虫_一ノ_一微_一ヲ_一見_一ハ_一ス_一一_一ナ_一キ_一中_一ハ_一此_一病_一全_一ク

Stroop van rhijn bekien (Syrupus e spina
cervina.)

治スルナリ ○然レ凡如此ニシテ虫以絶テ下ラ

ス或ハ下レ凡多ク片隻ヲ通シテ全虫以

下テ一サルモノハ其翌日モ亦前法ノ如ク服

シ而メ午後ニチンクエテカトリカピルガンスロ

前條ニ見ユ六十滴ヨリ百滴マテニセイリユピユスエスナ

セルヒナ峻下効アル草実一匙ヲ加ヘ用ユヘシ ○右

ノ如クシテ虫以仍下ラサル者ハ患心者ヲ二日

休自心セシメ其間ハ右ノ茶劑ヲ歇テ唯

毎朝其水ヲ例ノ分量ホド飲シメ其三日メ

ヨリ復々前ノ茶劑ヲ毎朝早且空心ニ与

ル一ニ日此法ニ從テ此虫以下リ病治スルマ

テ服水法ヲ施セハ其効ヲ認ル一ニ年ナリ

○一官家ノ室女條虫以ヲ患ヒ予ニ其治法

ヲ商議ス予コレニ請テ從来ノ患心症并ニ

治法ヲ詳ニ書記セシム是レ一ニハ予カ茶泉

ノ療法ト照合シテ其治驗ヲ證シ一ニハ此ニ

就テ種々利益アル考按ヲ知シカ為ナリ

予次ニ患婦ノ自テ説ク所ヲ述フ

其言ニ曰ク父母嘗テ我ニ告テ云ク汝幼

年ノ時虫以病ヲ患フト然レ凡我二十歳

Water Kers (beccabunga).

千七百四十九年マテハ病身ナルヲ覚ルナレ○
郷ノ知ル如ク其頃ハ苦味ノ水菜ヲ用ル
テ世ノ凡習タリ我亦何ノ為ナルヲ知
ラス又肝病ノ為ニモ非スレテ此水菜ヲ
服セリ其後三四週ヲ経テ熱病ヲ免レ
烈キ搐搦ヲ兼又其熱醒解スレト時々
搐搦癸シテ休サルト一年許此ニ於テ我
以^{ヲモ}為^ラクコレ條魚ノ所為ナリト○我記臆シ
テ護レサルハ千七百四十一年ノ春一サ菜削ヲ
用ユコレハ牛酪清ニウルトケルス
ベツカビユニガ

茶^サ名^ナノ絞汁及ヒ焯茶汁ヲ加テ服スル
五六週コレヨリ大ニ輕快ヲ覺ヘ尚又一兩
年ヲ経テ全治セリ○千七百四十七年ノ
夏花園中ノサ菜泉ヲ飲服セリコレ病
患アルカ^ク為^ニ用ルニ非ス又サ菜泉ノ服法
及ヒ其養生法ヲ守ルニ非ス○其後四
週ヲ経テ或時クセル酒一盞ヲ喫スルニ
差^サ徴^チ氣^キアリテ味佳ナラス此ニ由テ勿^レ心^シテ
不^レ快ヲ覺ヘ半時過テ眩暈ヲ免ス其
翌日ノ夜^ノ脛^ノ周圍^ノ疼痛^シ又胃ノ下

口ノ下ニ上部烈ク疼痛ス此痛休ムト
雖モ尔後五日ノ中ニバクノ発止スリテ
全ク休ス此ニ於テ我レ其條虫ノ発
動タルヲ察シテ下劑ヲ服セントス便チ
疼痛ノ最モ烈ク発作スル時ニチンチユラ
カトリカピユルガンス 前ニ出ツニ舍
下劑ノ名 ハンデロツトヘン
利別ヲ加テ一日ニ二劑ヲ用ユ此ヨリ半時
過テ烈ク下利シ然リニ條虫六尺四
寸ヲ初メテ通泄ス此ヨリ其疼痛止テ
ヨク安眠スルヲ得タリ然レモ唯甚々疲

弱勞倦ヲ覺ルルニ○千七百四十八年ニ
ルニマルマス 某泉 ヲ飲ムヲ十週其
中毎朝前説ノチンチユラノ下劑ヲ一劑
ツ用ヒ條虫ノ片切ヲシバク通泄セリ
但シ此時ニハ初回ノ如クニ幾多ノ患症
ヲ発セス己其冷水ヲ服スルニ由テ虫
頗ル疲弱スルカユエナリ○右ノ下劑或ハ
其他ノ下劑ヲ用レハ効メテ嘔吐セサルヤウ
急ニ用ユモシ嘔気アレハ物惣テ寒冷ナ
ル食物飲液ヲ用ヒテコレヲ防止セリ

Hum animale Simpliciter

〇茶泉ヲ服シテ下利スル日ハ早朝ヨ
 リ午時マデノ間并ニ下利スル中ハ其泉
 定例ノ服量ノ外ニ余分ニ多ク服シテ
 良効ヲ得タリ〇夏ニ至テ條虫ニ患
 五尺五寸ヲ下ス〇右ノ下劑ハ虫ニ病ヲ患
 ル中ハ絶ス續用セリ然レ終リニピユルヒス
 コルナレヌス下利散劑
ノ名新局方ヲ用テ効ヲ得タリ〇
 又夜分ニコレウムアニシレダツベリイ新十滴
 ヨリ十二滴ヲ用ヒ翌朝下劑ヲ服ス我此
 方ヲ守リニハク用ルテ二年許此ニ由テ時々

Zucker Zaad (Semen cina)

條虫ヲ下セリ但シ右ノ油劑ヲ忌ルハ
 必ス其虫ヲ下スヲナレ然レモ我終ニ此油
 劑ヲ厭フテ久ク服スルヲ能ハス〇千七百
 五十三年 虫ヲ治スルニ實驗アルカ為ニ
 ノル・マルムス・ゴロン茶泉
ノ名ヲ服ス〇我セーレ
 サード草子
ノ名ニ硫黃花少許ヲ加テ八日ノ中
 毎夜用ユ其後ハコレヲ用ヒス然ル所以ハ
 此ヲ用レハ毎夜發熱シ苦煩シテ安カラズ
 レハナリ則チ此虫ニ良驗アルヲ知ルト雖モ
 我其煩苦ニ堪ガレハナリ〇三日毎ニ母

Sal de Seignette

朝下劑ヲ用ユ此ハ或ハピヒスコルナシヌ
或ハサルセイグ子ツテ下劑ヲ用ユ但シサルセイ
グ子ツテ尤モ良効アリ○我レ前年ヨリ
シバク歴驗シテ適當ノ服量ヲ考定
スルヲアリ其故ハ連服量甚タ過多
ルカ或ハ甚タ數回頻リニ服スレハ其虫
却テ駆泄スルヲナシ故ニ其虫ヲ疲弱セ
シメ或ハ深ク腸中ニ巢居スルヲ下部ニ
滌除スルカ為ニ毎常サ茶泉ヲ二日連
服シ第三日ノ朝ニ至テ前ニ脱ク如ク下劑

○ヲ用ル
○都合

ヲ用ヒ暫時過テ寒泉一貫百五十二
ヨリ一貫三百四十四丈マテヲ服ス此ニ由テ
此虫ヲ駆泄スルノ効ヲ嘗テ誤ルヲナシ
○下劑ヲ服セサル日ハ茶泉唯五百六十四
丈ヲ飲ムノミ○右ノ如ク療法。五週ニシ
テ其間ニ條虫十丈ニ尺ヲ下セリ其中最
モ長キハ二丈五尺五寸ヲ一回ニ下セリ或ハ虫
ノ一方宛モ粘液ノ如クナルモノアリ或ハ虫ノ
縁明白ニ見ユルモノアリ○此服泉ノ療法
我ニ觸徹スルヲ甚シク瞑眩スルヲ云フ我毎日四回

風雲堂

食スレモ猶甚ク羸瘦シ又此法ヲ久クシ
 バク用ルヲ能ハサルホドニ精力虚耗セリ○
 千七百五十四年ニ再々其泉并ニ前説ノ下
 劑ヲ用ニ然レモ此回ハ七日ニ一回ツ下劑ヲ
 服スルニ此ニ由テ其回解ニ三四尺ツノ條與
 ヲ馳泄セリ但シ其寸尺ハ我レ遺亡心セリ
 ○尔後我レ兩三年無病ニシテ患心症ナシ
 然レモ医家我レニ示シテ曰ク條與ノ狭窄
 ナル端ヲ下サルウチハ此病全治スト思フ
 下勿レト故ニ我レ又千七百五十八年ニ其泉

Zeehen Zaad.
 bitter water.

ヲ用ントス此ニ由テ陸地ヲ旅行シ前説ノ
 ノル、マルム、ゴロン、線ノ鑛泉ニ甚ク似タル湧
 泉ノ冷水ヲ服セリコレ世ニ試用シテ効驗
 アルヲ知ル所ナリ此ヲ服シテ後大便秘閉
 スルニ由テビツテル、ウトル水サ茶ノ名時々二三盞ヲ服
 シ又前説ノ下劑ヲ二回用ニ然レモ此時ニ
 患ヲ下スヲナレシヲ考ルニ其泉性ノ悪劣
 カ或ハ我レ其泉ヲ一十分寒ク冷ニ
 シテ服セサルカ或ハ毎夜セリヘルサド草子ノ名ヲ
 服セズレテ患ヲ馳逐セザルカ我レ未ク其故

○幾^{ホト}ント

○コレガ

ヲ知ル^{ナシ}然^レ凡^レ其秋ニ於^テ久ク執^ル伏
 潜藏セル虫^ハ發動シ始^メ幾^多患^ル症ヲ
 萌起^ス毎^日或^ハ輕^ク或^ハ劇^ク困^苦セ
 リ大^氏其^症午^前ニ胃^口下^苦悶^シ胃^日
 ノ上^部絞^迫顔^面冷^汗ヲ流^スホドニ
 増^劇シ昏^暈ヲ發^セントス然^レ凡^レ昏^倒
 セス如此^症久^ク猶^舊留^セスト雖^モレバ^ク
 速^ニ發^ス秋^ニ至^テ十四^日余^モ續^ヒテ休^ム
 此^ニ由^テ每^夜眠^ルヲ能^ハス此^ニ於^テ適^宜
 キ時^節ヲ考^ヘテ以^前ノ午^七百^五十^三年

○甚^ク慎^メリ

ニ用^ル甘^茶劑^ヲ以^テ虫^ハヲ尽^ク剿^絶セント
 欲^ス○我^レ每^朝温^煖ナル卧^床ヲ離^レ
 レテ起^ルキハ精^ク急^ク用^ヒテ背^ノ冷^ル
 一^ノ十^キヤウニ○然^ラスレテ冷^レハ忽^チ脊^ヲ
 ヲ繞^テ疼^痛シ正^ク起^坐スルヲ能^ハスレ
 テ身^体ヲ類^リニ勾^屈俯^伏シ且^ツ背^ヲ洒^ス
 然^トシテ西^心寒^セリ如此^{ナル}一^ノ半^時或^ハ其
 余^モ休^ムスレテ終^ニ下^利シ諸^症每^常止^ム
 然^レ凡^レ動^モスレバ一^日ニ數^回同^様ニ起^ル一
 アリ或^ハ數^日ヲ中^同様^ニ更^ク發^止スル

トアリ此ハ我レ毎イッ次此症ノ初ハト發ニ適ヨ宜キ
時ヲ考ヘ速カニ復カニ夕卧床ニ入テ靜卧温覆
ス此ニ由テ速カニ大氏下利スルヲナクシテ
其疼痛消散ス如此半時或ハ一時モ温
煖ニナルマテ卧褥ニ靜卧スルニ由テ毎イッ次
必ス其日ハ全ク此症ヲ免ルコトヲ知レリ
又此ニ就テ乳汁或ハ其他ノ甘味ノ物ヲ食
ス○午前ハ大氏虫ノ患症ヲ苦シム
多シ若シ午前ニ発セサレハ終日発セス
○我時々食ヲ断ツニ由テ虫如此イッ發動

○サントスル

ストレバク思フコトアリ然レモ必スコレニ由ルニ非
ス○虫ノ發動シテ患症ヲ起○中ハ食物
ヲ用ヒス

○覺ユ

多クハ漸食セス然ラサレハ虫ノ吸吮スルニ由テ
患症ヲ発スレハナリ○舊月ノ終リ并ニ
新月ノ始ノハ多クハ虫ノ患症ヲ発ス此ニ由テ
甘条割モ此兩個ノ時ニ用レハ同シク効アリ
○肉類ノ食物ハ食シテ良ヨキヲ得殊ニ夜ニ
宜シ又夕夜ニ肉ヲ用ヒス他ノ軟カナル食物
ヲ用レハ中夜ニ虫以甚シク胸内ニテ吸吮ス

風雲

ルニ由テ我レレバク昏暈セントシ并ニ絶テ
食セサリシガ如クニ饑ユ然レ氏此時ニ火
レモ食セス但新麦酒一盞ヲ飲ニ由テ
此症止ム○我レ乳汁ヲ禁レテ甚タ宜キ
ヲ覺ユ故ニコレヲ禁スルテ六年ナリ偶々コレ
ヲ用レハ悪心ヲ生ス○其後患全ク除キ
患心症モ発セスト患ヘル時ニ我レ復タ乳
汁ノ食物ヲ食シ試ルニ患心症ヲ発スル
ナシ故ニ
千七百五十九年マテ
コレヲ用ユ此年ヨリ復タ此ヲ用レハ快カラ

ナルヲ覺ユ故ニ此ヨリ乳汁ノ食料ヲ禁ホス
○我レ患ノ日新ニ長育シテ其勢力ノ
滋益センテヲ恐ル○乾腊ノ魚類殊ニ
コレヲ灰汁ニ浸セルモノハ食シテ甚タ快
カラス動モスレハ諸症ヲ發動ス或ハ灰汁ノ
臭モ亦悪心ヲ生セリ○諸ノ執力強
キ食物ハ害アリ又砂糖製ノ食物甘
味ノ物モ亦然リ甘蒲桃酒甘味ノ餅
モ悪心ヲ生ス○サ余コッヒ塩藏ノ食
物炙炮ノ食物并ニ希ニテ珍シク見ユ

ルモノハ食レテ悪^イカラス尚又葱ヲ調和
セル食物、麦餅ヲ羹汁或ハ茶ニ浸ス
モノ或ハ麦酒ト酒ニ砂糖、香料ノ末、麦餅
ヲ和レテ冷服スルモノヲコウデシカルト云
如此ハ皆用ヒテ害アリ故ニ常ニ堯固ノ
食ヲ用ユ○ビツテルウトル苦味ノハ午七而
五十年ニ服量多ク服スレハ魚^イヲ堅泄
スルヲナレ○此魚ノ一種胡瓜仁ニ似タルモノハ
我レ曾テ通セス但細小ニシテ頭ノ赤色ナ
ルハ一年ノ中ニ大ニ通スルヲアリ此種類ハ

下劑ニテ滌除セス浣腸法ニテ通泄ス
○胃起脹セス亦收縮セス但魚^イ上行
スル片ハ胃堅硬ニナル又午前ニ動^カモスレハ
其諸症発作ス則チ発作スレハ衣帯并
ニ胸襟ヲ寛放シ頰ノ飾具ヲ去ル○
諸般ノ下劑ハ物惣テヨク効アリテ腹甚
シク疼ミ、牽張スコレ魚^イノ所為ナリトス
○毎^子常^ニシハク悪心呃気ヲ発ス然レ
吐スルヲ罕ナリ若シ吐スルヲアレハ下劑ハ効
ヲ見ハスニ隨テ速ニ止ムコノ悪心呃気

〇ツ幾許カ
Worm Land

アルハ虫以上行シ来ルナリト時々思ヘリ然
氏新汲水ヲ服スレハ毎イツモ次下行ス〇
〇タタルムサード見テハ害ナシ我レ此ニ由テ
患症静止セリ此レヲ用ルニ由テ虫竄
逃シテ自ラ下行スルナルヘシ然レ氏下劑ヲ
兼用セサレハ虫通泄セスヲ草子ヲ用テ
或ハ虫以上行シテ胃口ニ在リ或ハ胃ニ近キ
所ニ在テ苦悶スト雖モ其後驅逐セラ
レテ下部ニ歸行シ且下部ニ低行スル從
テ腹痛并ニ背惡寒モ下部ニ降リテ

〇断絶セリ
此ハ通例

甚シクナルナリ此ヲ考ルニ其虫以勢力カク
逞フシテ薬剤ヲ抗拒シ下降退除スル
ヲ欲セスカタ牢ク吸着任留レ以テ諸症
ヲ發スルナリ其後下行シ通泄セントスル
片ハ諸症緩解シ且ツ直腸中寒冷ナ
ルヲ覺ユ〇初ニ通泄スル虫ノ一片ハ滑
澤ナラス侵蝕セルカ如ク且ツ終リニ出ルカ
如クニ完ツクカラス而後腸節ノ處ヨリ斷
絶スナリ又初メ通泄セバコレヲナルタケ意
ヲ用ヒ切レサルヤウニ徐々ニ引出スヲ肝

絶

要トス然ラスレテ断絶スレハ其日ハ再ヒ
通セサレハナリ又虫ノ出ルヲ速ニ撮ンテ
引出サス且ツ甚ク喜ヲ用ヒテ徐々ニ引
カサレハ初メ出レモ復タ肛門内へ牽縮
シ引入ルヲアリ又長ク引出ス不能スレテ断
スレハ我レ背拘攣シ運動スルヲ覺
ユルナリ

○我レ記臆セルハ通泄スル條虫ノ側面ニ
細ロアリ但シコレカ最モ幅廣キ處ニアル
ヲ見タリ

勉メテ

○條虫ヲ下スル長クシテ且ツ大ナルホド其
後虫ノ患症ヲ発スルヲイヨク少ナシ故ニ
一頃ニ若干尺モ通スレハ一年許モ患症
ヲ発セサルヲ多シ

○前説ノ芥子ヲ用ユキ間暇ナキ片
ハ一ニハ虫ヲ腸中ノ下部ニ在ラシメ一ニハ
虫ヲ勉メテ疲散スルヤウニ所置スヘシ
其故ハ虫ノ腸中ノ下部ニ在トキハ虫ヲ驅泄
シ下スノ道路短クナレハナリ又虫ノ疲散スル
中ハ虫ノ腸中ニ牢着スル勢力ヲ減火ス

レハナリ其法左ノ如シ條虫ハ

○予自ラ經驗スルニ物ニテ塩藏ノ肉類炙

肉類ハ公豚脚炙炙肉ニユルコイル種茹ノ一

或ハ葱或ハ沙羅葡萄ヲ加タル食物ニテ

ククノ食物或ハニユルコイル名酒ニ堪ルヲ能

ハス○又葱阿魏セーヘルサード硫黃花

或ハ鉄ノ製劑エキスタラクトアブレンチ製

劑ノ名皆此虫ヲ制シ且ツ此ニ由テ虫自

ラ腸中ノ下部ニ降ルナリ○右ノ種類ノ

飲食ヲ數日食シ且ツ飲服流ヨリ他ナキ

Zoete Koek. Zeker Laad.
Zuur Koek. Zuurer Wijn.

中ハ虫饑ルニ由テ必ス疲散スルナリ此ニ

於テ脊ヒトシク右ノ虫ノ堪ルヲ能ハサルナキ

劑ヲ服シ而テ下劑ヲ用レハ此ニ由テ虫或

ハ烈キ運動ヲ起シ或ハ止ムヲ得ス其

力ヲ竭ジテ腸ニ吸着ス乃チ虫必ス

疲困スルナリ○但シ何ヲ以テカ此時ニ下劑

ヲ二日連服スレハ虫必ス下ルヤ答テ曰ク

下劑ヲ用ユト雖モ初日ニハ仍カテテ穴メ

テ吸着ス然レモ二日連服スレハ虫ノ營メ

自ラ減散スルニ由テ遂ニ下泄スルナリ○但

○虫

Semen Santonici.
Extract Tanacet.

レ患者勉強シテ下劑ヲ毎朝用ヒ他ノ
劑ハ日中ニ用レハ尤モ良ナリ此ニ由テ魚
滋長スルノ間暇ナキナリ

○左ニ記ス法ニ從テコレヲ治スヘシ

○第一 月ノ虚虧スル時ニ療スヘシ

○第二 二日續ケテ前説ノ品ヨリ外

ニ食ハス又飲ムナ勿レ

○第三 右ノ日ニ於テ左ノ丸系十粒

ツ、一時或ハ一時半毎ニ用ユヘシ

丸系方

エキスタラクト 父ナセケユム 新局エキスタラクト
ノ条ニ從テ製スヘシ

阿魏

セメンサントニシ 草子 各六分

ヒツトリヲル マルケス 齋 二分

上好蜜 適宜

右合シ一餅ヲ一丸トシ銀箔ヲ衣

トス

右丸系ヲ胸下寛解シ此ニ反レテ腹痛シ
背微惡寒スルマテ服スヘシ其故ハコレ其患
自ラ腸ノ下部ニ降ルノ徴ナレハナリ乃チ此徴

gratiola (gods genade).
Vaaren Kruid (filix).

〇頭

4 vanden van Geertenschwand.

アラハ速ニ左ノ方ヲ用ユヘシ

〇第四 速ニ其患ヲ下スヘシ此ハ^也藥

刺根ヲ用ユヘシ八九歳ノ見ハ十二片十五

片ヨリ二十片マテヲ患見ノ強弱ニ從

テ一回用ユ但シコレニ冰糖ヲ加ハ研合セ

テ与フヘシ〇其羽^也日亦同量ヲ用ユヘシ

若シ効弱キ中ハ其量ヲ増スヘシ〇下

利ノ間時^也毎^也冷水一盞ツ服スヘシ〇

大人ハ右ノ劑一倍ノ量ヲ用テヨク堪ユ

ヘシ

〇ヘルニスウ^ト名^人散劑ハ條^也以テ治スル

確効ノ劑トシ多^年貴稱セリ此ヲ用テ

良効ヲ認ル^トナシ此方世^也知セサリシニ今

既ニ明白ニシテ又其志ニ從テ此劑ヲ強クシ

或ハ弱クシ適宜ニ製スル^トヲ得^ル其方

綿馬^根根^也十五片二十片ヨリ三十片ニ至ル

甘藤^黃黃^也一片ヨリ五片ニ至ル

ガラ^チチ^チガラ^也五片ヨリ十二片ニ至ル

右調勻レテ散劑トス

右散劑ヲ服スル前日ニ先ツ左ノ劑ヲ用ユヘシ

甘永丹

甘永丹 各十片

此劑ヲ用テ翌日^前劑ヲ朝一劑用エ此ニ由テ大氏^吐吐^ヲ起シ又共ニ下利ス又一時過テ又一劑ヲ服ス此ニ由テ烈ク下利シ此ニ從テ大氏^此此^以盡ク皆下ルナリ○然レハ其^下下^ラサルニ時過テ又一劑ヲ用エ^レ或ハ其^始始^メテ翌日^下下^ルナリ○下利^間間^時時^毎毎^ニ稀^キ者^煮汁^ヲ飲^シム^レ

註

ヘルレンスウアンドノ散劑ハアンドレア^名人^チス^セ

recrystallized Kout van alsem.

Diarrhoeum ul. Diarrhoeum Lic. samurai pulch.

ゲルタニア^アゴロニ^ガ書^十四^エール^エン^ゲチ^ス

キユン^テビ^スリ^ヲテ^キ書^卷六^第五^百五^十

四^葉ヨリ引用スルナリ○ヘルレンスウアンド

名^人ゴ^ツチ^ンゲン^地ニ旅行セル時ニ内科医

ニ^言テ曰ク^其其^医今^死セリ^此散劑ハ藤

黄^十片ヨリ十五片^煎煎^塩十五片ヨリ

二十片^右調和ス此ヲ大人ニ一服トシ用エ

此^ニ由^テ大^氏吐^シ且^ツ下^スナリ^此ヲ一時

毎^ニ一服用ヒテ^虫以^下ルマテ^子ルナリ^ホド^ル

名^ノ書^ニ曰ク^右ノ劑^ニ尚^木炭^ヲ加^フト

風雲堂

風雲堂

○ヲ審
florum persicorum
Species Secunda plateri

右ノ制ヲ用レハ第一種ノ條虫連続セハ必ス
 尽ク下スナリ、第二種ノ虫ル長虫ハ必ス
 プラテリハ片碎シテ下スナリ○ハルレンスワンド
 人予ニ書ヲ贈リ示シテ曰ク此虫尚体中ニ
 アルヤ否ヤ。檢査セサレハ此散制ヲ用ル
 ナレ虫體カニ体中ニアレハ用ルヲ云先ツコノ有無ヲ知ルノ法ハ
 セイロアスフロリユムベルシコリユム墨記草花ヲ四支
 或ハ其糸モ用レハ若シ虫アレハ大便ニ細小ナ
 ル白色ノ粒ヲ交ヘ下スナリ如此モノハ此散制
 ヲ用ユヘシ○ハルレンコロイド前ノ散制中ニ列スル根

○速ニ

ハ毎子常條虫ニ称用セリ虫死スレハ甘藤黄
 并ニガラチヲ皆散制中ヲ以テコレヲ下スニ適
 當ナリ此二品ハ速ニ列シク下利スレハナリ○
 夫ノ前日ニ用ル制ヲ法ノ如ク用ヒ而メ其翌日
 日右ノ散制ヲ法ノ如ク敷ク用レハ虫必ス
 疲散ス乃チコレヲ再三用レハ虫自ラ腸
 中ニ固着スルヲ能ハサルナリ○右ノ制ヲ
 考レハ下制ヲ兼用スルト全ク同フレテヨク
 下利スルナリ
 ○子ツテルト名曰ク一婦人ニ一葉制ヲ用

ヲ用ヒテ條虫十八條ヲ下セリ其方左ノ如シ

シカクモニユク

十二片

猪刺把粉脂

六片

千ユルベクユク ミ子ヲレ 二片

右調勻シテ五丸トス

右丸茶三丸ヲ九月十日ノ朝用ユ其余二丸ハ半時過テ用ユ其日ニ生活セル條虫七條ヲ下ス其翌日又九條ヲ下シ其夜死セル條虫一條ヲ下ス其後此婦人尚全ク

復セサルニ由テ十月四日ニ右ノ丸茶ヲ用ユ但シ其方中ノ千ユルベクユク ミ子ヲレ半片ヲ増ス此ニ由テ同ク六日ニ又一條ヲ下セリ○其後此婦人尚全快セサルニ由テ又右ノ丸茶ヲ數回用ユ此ニ由テ死セル蝨子虫ハ其ニ生活セル圓長虫ヲ多ク下シ遂ニ全治セリ○右ノ丸茶ト同種ノ丸茶アリ以前スル一テン名コレヲ一少年ニ用ユ然レ氏全ク虫ハノ標的ニ非スレテ癩毒ノ爲ニ用ヒシナリ然ルニ此患者全備セル條虫一條ヲ下セリ

其後此劑ヲレバク用ヒテ効アリ然レモ
其力峻烈ニシテ患者瞑眩スルニ一月
ニ二回用ルルニコレヲ三回用ルニ由テ虫以物
テ泄除スルナリ

○ハツセルキユイスト名曰クヘイリケラシド國ニ
旅行スル時アエゲイプテン國ニテハ條虫以テ
患ル者甚ク居タシ又カイロ地ノ土人四分
一ハ條虫以テ患フ殊ニヨルテン地ニテハ卑
賤凡庸ノ人ハ皆コレヲ患フ○此虫以テ肥
スル良サ茶ニ石腦油ヲ算入ス此ヲ二十滴或

口復々
口再々

ハ三十滴マテヲ一回ニ水ニテ虚月ノ時三日
續ヒテ飲服ス四日メニ下劑ヲ用ユ此ニ由
テ虫以テ下ルヘシ若シ下ラサルハ翌月ハ麿ル
時ニ前法ノ如ク用ユヘシト此劑ハ心クハ其
國ノ医家ノ授ル所ニシテ彼レ甚ク貴重
スル所ナリ○又云ク一男子條虫以テ患ヒ十
四週ノ間諸サ茶ヲ用ルニ唯此虫ノ片切ヲ
下スノミニテ全虫以テ下サス此ニ由テ終ニ石
腦油トレビンテイン油各半錢合レテコレヲ
三服トシ用ユ此ニ由テ虫以テ全ク下

○重クシテ
縊ケルニ

セリ○又云ク其後一婦人條虫以テ患
テ右ノ創ヲ早朝三十五滴ヲ用ルニ虫以
下ルナシ此ニ由テ午時ニ四十滴ヲ服スルニ
死セル條虫以テ一丈一尺四寸五分ヲ下セリ
○條虫以テ多少肛門ヨリ垂下ラハ精ク意
ヲ用ヒテ徐々ニ引テ支障スルマデハ引出ス
ヘシ如此シテ患者狹小ノ卧床ニ卧シ其懸
垂スル虫以テ重錘ニテ巻クヘシ但シコレガ其
虫ノ引切レルナク差引出スヘキホドノ適
宜キ重錘ニ巻クヘシ而シテ其虫以テ床外ニ懸

垂セシメ患者ヲ右脇ニ側卧セシムヘシ此ニ
由テ其虫以テ出ル時間ノ久キニ堪ヘテコレガ
全完クシテ下ルカ或ハ多分ニ下ルヲ得
ベシ殊ニ小ナル管ヲ作り其孔ニ其虫以テ
穿テ通シ此管ニ預メ油ヲ塗リ其一端ヲ
肛門ニ挿刺スヘシ其故ハ肛門中ノ關括
筋緊縮シテ虫以テ指搾シ通シ下ルヲ
得サルナアルニ由テ此管中ヲ通スルハ如此ノ
障礙ナケレバナリ

○予往年條虫以テ患ル一男子ヲ見タリ

其症レバク煩躁苦悶シコレカ癸作スル
中ハ其患苦ニ堪スレテ患者自ラ死セ
ンテ好ム然レテ傍人コレヲ戒喻シテ保
養セシム此ニ散劑三服ヲ用ヒ此ニ由
テ諸症全愈セリ予少シノ謝金ヲ贈
リテ其方ヲ傳授セシム此ヲ左ニ記シテ
同好ノ徒ニ傳フ

石炭 搗羅ウ

鏡茶 極細末然レテ 各一匁半

胡椒 細末 七粒

○虫以症癸
起セル時
節ニ

右調勻シ分テ三服トシ一服ヲ燒酒少
許ニテ早朝ニ服ス如此毎朝服シテ三
日ニ三服ヲ尺ニス但シコレヲ服シテ後毎
次直チニ燒酒一食匙或ハ二食匙ヲ飲
ミ而メ他ノ飲液ヲ用ヒテ勿レ○此散劑
ヲ服シテ腹中異常ノ運動ヲ起ス
十キ中ハ第二日ノ服量ヲ増スヘシ此ニ由テ
虫以仍下ラサルハ第四日第五日ノ朝ニ於
テ此藥劑根ノ細末四十筭ヲ水ニテ服ス
ヘシ

thee in milk.

註

ビヨル子ボルグ^地ノ土人ハテレビンティン油

ヲ多量ニ服シテ條虫ヲ駆除ス^ト

ボタニン^{地ニテハ}乳汁等分ニ合

シ此ヲ一食匙^ツ毎朝七日服ス此ヲ

服スレハ患者幼メハ烈ク^眩且ツ

搖掣^手スル^テ孿^ナラス然レモ^下レハ

諸症速ニ解スルナリ

○予又一方ヲ記ス此ハ一貴官曾テ一條

虫ヲ^駆除セリコレ其傍側ニ細口アル種

類ナリ其治方○第一ニ大蒜ノ片切二個

hiarmische testament.

或ハ三個ヲ茶湯或ハ冷水ニテ空心ニ吞
ム^テ七日中ニ二三回^ト或ハ四回^ト○第二ニ七日
ノ中ニ馬ニ乗ル^テ二回^ト此ニ由テ身体ヲ強ク
運動ス或ハ長途ノ旅行ヲ為ス○第三
所謂ルヒアルニセテスタメント^葉毎服
一匙^ニ此ト等分ノ拂郎察酒ヲ加^テ數
回^ト用ユ

註

ヒアルニセテスタメントノ方

蘆薈^{上好者} 八朶

泊夫藍 半朶

大黃

へ子々ア 底野加 各二匁

落葉松耳

セドアル 山奈 各一匁

鼈膽根

没廿条 各四匁

右調合シ拂郎私火酒無再引者二百八十六匁

ヲ注キ數日泡浸

シ而シ瀝過ス是即チエリキシルアリユム

ヒアル子リナリ

Zebar. gent. rubr.

○ノ著書

gent. rubr.

○其他此類方一ナラス或ハ三味四味或

六味ノ方多シ然レモ皆効アリ其諸方

何レモ皆甘蘆甘膏ノ分量多シ

○ミユルライ名ノ右方書ヲ譯載セリ其

説左ノ如シ

父レリウス名ノ左ノ方ヲ記セリソツケンポテキ

三十四葉ニ出ツ

鼈膽根

阿魏或ハ没廿条

畜腦

橙皮 乾者

海裡香 カステレウム

正キス夕ライト アロエス 聖

各一匁

泊夫藍

一匁

右粗末ト為シ連ニ燒酒九十六匁ニ浸
ス一六七日ヨク沸醸シ濾過シ用ユ

右ノ劑ヲ用ユル患者自ラ書記セル手簡
ヲ千七百六十年ニ於テ王爵ノ馬子校ノ
撰書ニ載タリ左ニコレヲ記ス

患者ノ手書ニ云ク千七百四十七年ハ予

四十四歳ナリ此秋腹内苦煩安カラズ且
ツ雷鳴シ殊ニ左腹ニ於テ甚タレ又

腹脹スルニ胸中壓迫ヲ覺(精

神懨懨シテ樂ニス此ニ於テ予胃ノ官能

罷敵テ健運セサルヨリ憂セリト思ヒ

幼茂ニエキスマライトアブリンチ新ヲ一ハ酒ヲ

以テ製レシ酒ニテ製シ甚タ茶氣ヲ

峻烈ニシ此ヲ用ユル良効。胸中壓迫腹

痞脹 消散シ并ニ左腹ノ雷鳴モ

治スコレハ予幼メニ凡氣ノ所為ナリト思ヒ

○アリテ

此時ニ於テ宛モ胡瓜仁ノ如キ小ナル白色ノ
物大便ニ通セリ然レモ何ヲ以テ如此ナル物
通スルヲ知ルヲナシ午七百四十八年ニ列シ
キ下利ヲ發ス此モ亦何ニ由テ然ルヤ其起
因ヲ知ルヲナシ此時ニ於テ始メテ條虫
ヲ下セリ予誤テ以テ^{カモヘラ}腸ノ片截下
レリト故ニ大ニ驚怪セリ然レモ予精ク
意ヲ用ヒテ徐々ニコレヲ引出シ且ツコレ
ヲ引出スト雖モ痛ナク却テ輕快ヲ覺
ユルユエニ虫ヲ引ケモ出スレテ截断スルマテ

○長キ

徐々ニ引出スニ虫ニ尺五寸五分ヲ下セリ
予コレヲ審ニ檢索スレハ尚生活シテ運動
セリ此ヨリ諸症緩解シ常ニ食進ニ此ニ
由テ虫ヲ全ク体中ニ無シト思ヘリ然レモ或
ル時暫ク馬ニ乘リ劇ク馳驅スルノ後再
ヒ條虫ヲ下セリコレモ亦断絶スルマテ徐
々ニ引出セリ予コレヲ温湯ニ浸セハ生活
シテ種々ニ運動セリ○予最幼ニ於テハ
何ノ方法ヲ以テカ此困難ナル虫ヲ病ヲ免
ヘキト思量セリコレ患症日^{カク}常連綿ト

レテ休_フナク或ハ其輕緩ナルモ一月ノ
中數日困苦ニ堪サレハナリ○予唯_レキ
スタラクトアブレン_ク 斲_クヲ用ヒ而_テ乳汁
并ニ惣テ甘味ノ物ヲ禁絶セリ如此食物
ハ患_レ症ヲ發動セシ_テヲ心_レ且ツ左腹ニ
多ク_ク運動_クヲ起サシ_テヲ思_ハナリ此年_ノ午
七百四十八年一友予ニ教示シテ每朝空
心ニ大蒜ヲ用ユ_ヘキ_ヲヲ勸ム此ニ由テ予
速ニ其夏ノ初メニ大蒜ヲ每服_ニ一_ニ
片或ハ三片ヲ細カニ到_テ七日ノ中ニ二三回

○其秋

或ハ四回茶湯或ハ冷水ヲ以テ吞飲ス
又大便秘泄セン為_ニヒアルニセ_テスタメント
前註ニ見ユ 半盞_ヲ拂_即私白酒ヲ以テ數回
服ス此ニ由_テ二三回大便通利セリ予九
月官務ニテイアムテラント_地ニ旅行セリ
其途中大蒜ヲ用ヒ時々右ノヒアルニセ_ノ
劑ヲ用ユ此ニ由_テ大便ニ條_無断絶セズ
レテ全ク通泄セリ予コレヲ細密ニ監査察
スルニ生活セズ_ニ微_シモ運動スル_ヲナシ此ヨリ
イアムテラント_地在留中并ニ帰路又ストツク

〇ニ於テ一日

ホルム^地ニ歸ル後一十月ノ初メマテ患^ニ患心症ナク健康ナリ十一月ニ至テ予再ヒ官務ニテ止^テヲ得スゴツテ^地ニ^旅行セリ其途中朝飯モヨク食^ニ行^ニ程モ多ク進^ム中ニ予腹甚シク壓迫^シ烈シク下利^シ此ニ就テ條^ニ患^ノ大^ニ片塊ヲ下セリ予コレヲ精密ニ種々検査^シ試ル^ニ毫モ運動^シ生活スル徵ヲ見ル^トナレ此ヨリレテ後條^ニ患^ノ候^ニ并ニ其患心症ナレ但^シ患^ニアリ^レ時ハ予瘦ル^トナク又^モ常^ニ

〇ノ條^ニ患^ニ

大ニ食ヲ欲ス若シ^レ莫^クアリテ其餓^ル時ヲ過^レハ田^中ニテ甚^シク^レ吸^ヒ且ツ左腹ニテ蠕動ス
〇右ノ説ハ千七百四十七年ニ記ス所ナリ
此ヨリ右ノヒアルニセ^テス^メメント^ヲア^ボ地^ハ
一^ニ少^ク年^ヲ用^ヒテ^モ奇^ニ効^ヲ奏^スセリ
(註)此書ノ撰述家右ノ説ヲ利益アリトシ此書ニ附録セルカ如ク亦ス^テアリ^ニグ^ノ人ノ説モ無^ク益^ナラザル^ニ工^ニ工^ニ左^ニニ其^ノ医^ノ案ヲ述^スル

風雲堂

○利地ノ商家ニ學生ノ少年アリ
 リ面色甚々澹白ニ見ヘ物惣テ動作營
 為甚々懶惰遲鈍ナリ故ニレバク管
 杖ヲ被ル此學生偶間歇執ヲ癸セリ
 故ニ其主人ノ家方常用ノ劑ヲ
 与ヘ且ツヒアルニセテスタメント
 過半注キコレニ又精烈ノ燒酒一前從等分
 ノ量ヲ注テ滿盞ニ至リコレヲ患心者ニ飲
 シメ且ツ卧床ニ入テ卧シメ終ニ癸汗セシ
 ム此ニ由テ其癸作ノ熱消散ス○此少

年右ノ治法ヲ用ヒ又ヨク汗ヲ癸スル
 ニ好キ革ヲ身体ニ被ハシム而メ半時
 過テカヤ一カヤ行クニ甚々大ナク條虫ヲ下
 セリ此ニ由テ其主人大ニ窟リスプロリンダ
 人ノ家ニ到リ治療ヲ請フ是レ此少年
 ノ腸截裂シ出ルカト恐訝スレハナリ其
 医コノ少年ノ家ニ来リ見レハ豚在ニ狗
 ガ條虫ヲ多ク分嘔テ糜爛セリ然レモ
 其余殘ノ虫尚多クシテ管立ノ凹ニ余
 レリ其虫尚穢蠕動シ其色宛モ清

ク洗ヒタル腸ノ如ク又幾多ノ關節アリ
其邊縁黯色ナリ其最モ^洞キ處ハ宛
モ指ノ徑ノ如シ但シ^{端末}ニ至リテハ漸ク
狭小ナリ其端ハ尖ラズ宛モ切斷セルカ
如シコレ悲心クハ夫ノ豕狗ノ噉^カニ截ルナル
ヘシ患者終日烈ク下利ス因テコレニ
燕麦煎汁ニ甘乳汁ヲ加ル飲料ヨリ外
ニ用ル^{ナシ}其翌朝患者自ラ快復
ス唯火シク勞倦スル^ニ然レモ此日ヨリ
患者者面色故ニ復シテ平全トナリ心

思欣爽ヨク笑語シ起居運営物心
テ前日ニ比スレハ輕便敏捷ナリ

○大蒜ハ條虫ヲ治スル最勝ノ薬トス
コレヲ斷ス用レハ虫終ニ死ス予ノ經驗
ヲ王ノ究理學校ノ撰書ニ載セ千七百
六十年ニ著述セリ左ニ記ス如シ

○一婦人二十歳即千七百五十五年ニ於
テ^{イナチン}周歲^{ベヒ}苦悶シテ安カラス神志心染ハス
日常憂^{ベヒ}悲啼泣シテ止る^{ベヒ}攝^{ベヒ}掣^{ベヒ}引
シ眩暈ス然レモ^地ホウホン^名ノ^地茶^名泉^名ス

○レバク
○或ハ

泉ヲ服スル後諸症終ニ緩解シ漸ク大底ニ状復セリ然レ氏瘦削シテ色澤甚夕黧白ナリ其後毎年此芍薬泉ヲ服シテ効アリ○千七百五十九年ニ其患症再發ス此ニ由テ種々芍薬劑ヲ用ヒテ條虫ニ片ヲ下シ諸症輕快ヲ得タリ其虫ノ細口其扁面ニアルノ種類ナリ但シ其症仍時々發起セリ○千七百六十年ノ初メニ其患婦予ニ治ヲ請フ予患者ニ示シテ云フ大蒜二片或ハ三片ヲ毎朝食ヒ其夏ニ至ツテ

復タ前ノ芍薬泉ヲ服スヘシト此ニ由テ患者毎朝大蒜ヲ食ヒ夫ノ芍薬泉ヲ用ル頃夏七月マテコレヲ連用ス○右ノ如ク大蒜ヲ用ルノ十日ニシテ患者行程十五里ノ地ニ旅行シ其翌日一日休息シ其後毎朝芍薬泉ヲ服ス又毎夜アルドベリン地ヲ食シ其翌日ハ必ス大便下利スハ第三日朝其泉ヲ服シ始ルニ烈シキ搖擗ヲ發シコレニ腹痛并ニ烈シキ頭痛ヲ兼ヌ又其泉ヲ未タ尽ク服シ終ラサルニ條虫自ラ塊ヲ為シテ

其狹キ端ヲ具シ全備セルヲ通泄セリ此
患ニ予前ニ説ク所ノ如キ尖レルモノアリ然
レ前ニ記ス如キ四ノ小孔ヲ見ル能ハス予
此時頭微鏡ヲ推乃ハサレバナリ又患ノ關節
甚々短促ナリ○^{其後}患婦服泉法ヲ成
シ遂ルニ患症ヲ弁スルナク困苦セスレテ
其水ヲ服セリ又從耒食進ニガリレニ其
患全ク泄除シテヨリ漸次ニ復シ十
四日ヲ経テ候間スルニ顔色平全ニ復シ又
身体頗ル肥盈セルヤウニ見ヘタリ故ニ予

○僅
○尚

此患者自後絶テ虫以テ生セス相續テ
健康無病ナラニテヲ希望ス○右ノ通泄
セル虫ヲ速ニ温湯ニ浸スニ其端ノ狹キ處
并ニ中間ノ處ハ一寸七八分許ノ際蠕動
スルノミコト予又コレヲ差温ナル湯中ニ投スレ
ハ右ニ云部ハヨク蠕行ス其餘ノ部ハ物心
テ死セリ此ニ於テ予又コレヲ冷水ニ投ス
ルニ右ノ蠕動セル部モ全ク蠕動セス然
ルニ復々温湯ニ浸セハ再ヒ活動セリ○予
右ノ斃盡セル諸件ニ由テ虫ニ多分死セル

○コレヲ

コレニテ
從來未タ
下ラサル者
モ

一ヲ知リ此ヲ以テ大蒜ノ此虫ヲ殺ス
理會セリコレヲ斷ニス久ク用レハ虫ヲ尽
ク殺ス予確證スル所ナリ右ノ患婦
大蒜ヲ斷ス用ル一六箇月ニシテ條虫以
ニ丈四寸ヲ殺セリ乃チ患者ノ下ス虫以ニ丈
四寸アレバナリ此ヲ以テ按スルニ其虫尚其
余長クアリテハ虫ノ狭キ端ノ方ハ其余ノ
部ニ比スレハ尤モ強クシテ容易ニ死シ雖シト
雖氏集尚
ヲ六箇月連服スル後ハコレヲ殺ス一ヲ得

○甘草泉ヲ服
スル日數ノ
中

夫ノ婦人旅行中ニ動搖スルニ由テ虫以必ス
聚結シテ塊ヲ為シ平旦諸腸ニ長ク蔓
延セズシテ腸中ノ各部狭小ノ所ニ塊結シ
ニ由テ大便ニ駛泄シ易ク又多分ハ此ヲ用
テ死セルニ由テ下リ易キナリ○アールドヘリン
地ヲ毎夜食前ニ食スレハ翌日午前下
利スルナリ或ハ此ニ由テ下利烈ク且ツ腹痛
甚クシテ肉桂ノ火酒ヲ用ヒサレハ止サル
アリ○大蒜ヲ用テ後下劑ヲ用ユ此ニ由テ

Extract. Tanacetum. (Wormfluid)

Hydromel

其
 虫尚生活セル部アルモノヲ下劑ヲ用簡
 冷水ヲ服シテ。活潑ノ勢カヒ花ニ固ク腸ニ
 吸着スルカヲ奪フテ下スナリ。○其下
 劑ハ大黃ノ瀉劑ヲ予シバク稱用スル
 アスセツソルダレリウス名ノ局方三百三三葉
 ニ出ス劑ヲ用ニ出ツニ然レモ虫病ニ用ル下
 劑ハ左ニ記ス劑ヲ稱用ス
 大黃 二十四枚
 乾蒲桃 八枚
 橙皮黃 四枚

甘草 二枚
 益智 四枚
 蜜水 百九十二枚
 右剉ミ搗碎キ調合シ四日浸シテ
 菜氣ヲ出シ搾テ濾過シ後菜
 ヲ加フ
 正キスタラクト 々々々々々々 四枚
 白沙糖 二十四枚
 大黃 十六枚

註

アスセツソルダレリウス下劑ノ方

新局 正キスタラクトノ製法

乾蒲桃 八匁

佛手柑皮

甘草 各四匁

益智 二匁

ポルトガル酒 百九十二匁

右合シ二日浸シテ汁を氣ヲ出シ搾リテ
漉過シ後汁ヲ加フ

エキステラクト エニユル 木香 エキステラクト也
新高島製薬所にて準

四匁

白沙糖 二十四匁

extract encl.

右調勻ス

○予譯者が譯セル此書ノ初卷ニ附録ノ篇
アリ此ニ就テ以オモヘテ爲ク此ノ篇ニ於テモ無ニ
絲用スルサ茶削ヲ説明スルノ利益十
キニ非ス且亦此書作者ノ未タ稱奉
セサル所ノ削ナリ今此作者此後卷ニ
於テ大氏種々ノ削ヲ博ク集載スレモ
尚又予ノ間効ニ此ノ篇ニ附録シ彼此
各所ニ増補スルノ少益十キニ非スト
思ヘリ

〇虫以ヲ治ス夕標的ハ先ツ虫ノ巢ヲ
 毀敗スルニ在リ此ハ腸ヲ強壯ニシ虫ヲ
 維持包摂スル所ノ粘膠液ヲ疏解シ
 テ泄除スルサ茶劑ヲ用ルナリ此ニ屬スル茶
 劑ハ苦味石鹼質ハ侵刺衝動ハ疏釋
 溶解ハ強壯健運ニ兼テ大便溼下ス
 ル等ノ茶劑并ニ輕キ水銀劑ナリ此ノ
 如キ劑ハブールハへ名人ノ著書「テリイメチカ
 書ニ記載セリ此等ノ劑ヲ擇テ甚々
 戒慎シテ用ヒ且ツ患者ノ年齢并ニ

arthamitae.
 ungi. agrippe.

精力ノ強弱ニ從テ酌量シ用ユヘシ〇
 小兒ハ總テ如此内飲劑ヲ用ルテ欲セ
 ス此故ニ右ノ茶劑ト同種類ノ外用茶
 劑用ユヘシ此ハユンギエエンチム膏名アルツ膏名
 ユンギエエンチムアルツニ外新良効アリ此兩
 種ノ軟膏ヲ等分ニ合シ腹部ニ塗ル
 ヘシ甚々幼小ノ兒ハ此ヲ塗ルニ由テ劇ク
 下利ス故ニ分量甚々少許ツ塗リ
 又火シ腹痛シ始ルハ速ニ拭ヒ去ルヘシ
 又烈ク下利セハヨク戒慎シテ石鹼汁ヲ

原書堂

以テ脘部并ニ脘ノ傍邊ヲ清ク洗淨スヘシ

○治法ノ第一ノ標的ハ田在ニ腸ヲ損害セサル系劑ニ由テ虫ヲ殺スナリ先ツ此ニ稱養ニスル甘菜ハ六畜ヲ多量服スル虫ヲ害スルナリ然レニ此ハ効ナキ者多シ○或ハ油ヲ多量服シ且ツ長ク連用シテ幾多ノ虫ヲ駆除スト云リ但シ此系ハ腸ヲ緩和シ峻烈ノ系ヲ用テ損害ヲ受ルナキホドニ腸ヲ

○ナリ此

○此ニ由テ

和スル^カ多ク用ルナリ

○塩ハ殊ニコレヲ多量用レハ虫ヲ害ス然レニ少量ニ非レハ用○サルユ工ニ腸ニ害ヲ生スルナシ但シ虫病ニハ効驗アリト信スルナ能ハス然レニ此ニ下利ノ功アルモノハ効アリ即チサルセドリセンシス^研カレエブスハメンシス^補其他如此類皆効アリ○又虫ヲ駆除シ且ツ虫ヲ害スル甘菜ハ三種ニ分ツ第一種ハ酷厲峻烈ノ品ナリ

○ルナ能ハ

○幾多ハ

レケルアリニヤ

confert van abem (cons: abinthi martini)

右ニ味等々極細末トシ此末一匙ヲ煎
 蘘ノコシセルヲ コシセルハアブレンチヌム一リチニ
新局、海邊蘘ニ和シテ煉サ茶トシ一日ニ二
 回用エ○アルストン名人 錫ヲ分量多ク用
 ルアリ此ハ患心者ニ下劑ヲ用ヒ其翌朝
 空工心ニ錫ヲ細末トシ精緻ノ篩ニテ濾シ
 此末十六匙ヲ通例ノ黒舍利別二十四匙
 ニ和シ用エ其翌朝錫ノ末八匙ヲ舍
 利別三十二匙ニ和シ用ヒ又第三日ニ錫ノ
 末四匙ヲ舍利別十六匙ニ和シ用エ第

〇ニ属スル

此ヲ用ヒテ腸ノ蠕動機轉ヲ壓搾シ此ニ
 由テ虫ヲ損壞シ或ハ甚々疲敝シテ
 死シ通泄セシムルナリ、第二種ハ甚々滲
 透シテ悪臭ナル劑ナリ此ヲ用ヒテ其
 侵透ノ悪臭腸中ニ彌蔓又セシムルナリ
 第三種ハ右ノ兩種ノ功ナシト雖モ總
 テ經驗ニ由テ虫ヲ駆除スル劑ナリ
 ○所謂ル第一種ノ劑ハ名譽アルメアド
 名ノ方ナリ其方左ノ如シ
 錫屑 赤珊瑚屑

研テ

毎服

風雲堂

四日ニ於テ下劑ヲ用ユ此ハ旋那葉ト刺
蜜ヲ合シ製スヘシ但シ此下劑ヲ最幼
錫ヲ用ルル前日ニモ亦用ルナリ此ニ
由テ毎イツモ次大効アリ但シ右ノ服量ハ大
人ニ用ル所ナリ小兒ハ其年ノ多少ニ從
テ服量ヲ斟酌スヘシ○ブロックレスベイ人
ノ方ニ錫ノ新タニ鑢タル末小兒ハ四錢ヲ
用ユ但シ一日ニ四錢ツ用テ三日連用ス
大人ハ錫八錢ヲ用ユ第四日ニ峻九下
劑ヲ用ユ此ハ此劑新根ト甘汞丹ヲ

調合シ製セリ此ニ次テ復タ錫屑ヲ用
ヒ而後又下劑ヲ用ユ彼レ云ク錫ノ細
末ヨリハ鑢屑ヲ尤モ効アリト右ノ劑ヲ
八日或ハ十日用レハ幾多ノ虫或ハ死シ
或ハ生活ニシテ大便ニ通泄スト云ヘリ○
ロセン人此劑ヲ用ハク用ヒテ良効ヲ得
ルナリ然レコレヲ用ヒテ効ナキモアリ
ト其著書ニ記セリ 條魚スアル
○メアド人ノ説ニ從テ予ニ婦人ニ錫
ノ細末ヲ甚タ久ク用ユ但シ第四日ニ

於テ下劑ヲ用エ此ハ紫葉菊根 甘汞
 丹ヲ合製ス然ルニ最初ハ錫ヲ用ルニ
 寸効ナシ其下劑モ浮利ノ効ナシ然レモ
 仍^{ナホ}此錫劑ヲ止ムナク毎日三匙マテテ
 用ヒ而シテ右ノ下劑ヲ止メテコレニ代ルニタマリンド
 木實^{木實}刺^刺蜜^蜜旋^旋那^那葉^葉其^其他^他如^如此^此輕^輕キ下
 利ノ効アル品ヲ侵劑トシ用エ然ル所以ハ
 患者ノ腸胃強實ナル者ハ峻烈ノ下劑
 ヨリハ輕緩ノ下劑却テヨク浮利ヲ功ヲ
 奏スルナリ峻攻ノ下劑ハ其甘柔性ノ烈

患婦

ク侵劑スルニ由テ腸ヲ大ニ牽縮セシメ
 此ガ爲ニ其通利スヘキ汚物腸中ニ懸心
 留シテ快利セサルナク多クハナリ右ノ法
 ノ如ク用ルニ由テ初メニ條虫數片ヲ下
 セリ但シ其後ハ右ノ劑ヲ用テ大便ヨク
 通スレモ虫ヲ下スナク此ニ由テ予其
 虫ヲ驅除セン爲ニ第四日ニ於テ紫葉
 菊根一二片ヨリ十五片マテ一回ニ用エ
 レモ下利スルナク却テ患婦腹内甚
 シク攪動致急シ時々眩暈ヲ發ス

患婦

風雲堂

然レモコレモ亦暫クシテ止ム此ニ由テ前
説ノ浸削ヲ用ルニ怪シム（キホドニ殺シキ
死セル條虫ハ片切ヲ下セリ如此尚其
削ヲ用ルニ由テ其後ニバク幾多ノ虫
片ヲ下シ遂ニ患婦全治セリ然レモ
其虫尚盡ク全備シテ下ルナシ
○鑛鉄ノ鑿屑（リマケテマルケス）モ亦
條虫ニ称用シ且ツ効ヲ得ルナリ然レ
モ或ハ効ナキモアリ大抵其効錫ト同
シ

〇ニ屬スル

○所謂ル、第一種ノ削ハ惡臭アルニ由テ
虫ニ害ヲ被ラレム第一ハ大蒜ナリ
（アルリユム）其侵透セル烈臭ハ衆人ノ
顯知スル所ニシテ惡臭堪ヘカクシ此物
ハ密ニ惡臭ニ由テ虫ヲ害スルニ十
ラス又此ヲ以テ腸ノ蠕動機轉ヲ増
益シテ虫カ腸ニ固ク吸着スルヲ
得サラシメ此ニ由テ大便ニ通泄シ易
カラレム又殊ニ大蒜ヲ平常嗜日ニ
慣レサル人ハ其効尤モ多シコレヲ

風雲堂

一二片ツ、毎日一回食フヘシ。○ローセン名
大蒜ノ効ヲ称説シテヨリ殊ニ世ニ願
然タリ

○阿魏モ亦此病ニ称誉セリ此物
最モ烈キ悪臭アリテ新タニ亞細亞
ヨリ来ルモノ最モ其臭ニ堪ヘカクシ故ニ
此病ニ効アリテ衆人皆用ル所ナリ。○又
此類ニ收入スルモノ、鹿角精ヲ取ルニ就テ
烈火ニ由テ其諸透竄ノ質ハ露滴シ
去リ其罐底ニ残留セル物ナリコレヲドレン

コツプト名ク此モ亦悪臭ニ由テ効ヲ為ス
ナリ。○硫黄花ニ沙糖ヲ加ヘ研磨シ用
ヒテ此病ニ効アルヲゾーレン名
或ハゲメー子ハレリアナ根
ハレリアナセイルヘストリス
知名カノコソクハ癩病ニ称用スルモノナリコレヲ
ストヨルケ名下劑或ハ其他適宜ノ劑ニ加ヘ
用ヒテ此虫ヲ駆泄スルニ良驗ヲ称セリ
○所謂ル芽三種ニ属スル劑ハ前説ノ如キ
茶性ノ標的ナシトイヘ凡ヨク虫ヲ害ス
此ハ桃ノ花或ハ嫩葉ノ浸劑ナリコレヲ

綿馬

ホウルギユク名称誉シテ小児ノ虫ヲ駆除
スル良薬ノ一ニ收入セリ

○蕨根ハ諸種ノ虫ヲ駆除スル確効
ノ薬トスアンドレイ名虫ヲ治スルノ秘薬
トセリ此根大人ハ一匁或ハ其余モ蜜或
ハ酒ニ和シテ用ヒ其翌日下割ヲ用ユ○
或ハ桑木ノ根ハ蕨根ト同効トス此ヲ二
匁或ハ四匁ヲ水煎シコレヲニツニ分チ
毎朝毎夜兩回ニ服ス

○名トルロクスコルゲユム臭香ノ細末ヲ

コレヲ

Japan (Silicis)

バルレーレ名虫ニ用ヒテ極メテ良効アリト
称悦セリ

○虫以病ニ
甚々称
賛セル

○苦味并ニ香竄質ノ系劑ハヨク内
藏ヲ強壯ニシ身体ノ悪液質ヲ復ナ故
ス然レ凡如此薬品必ス虫ヲ害傷スヘ
キヲヲ確證シ難シ又甚々苦烈ナル浸
液ニ虫ヲ漬シ試ルニ曾テ死スルヲナシ
○消熱皮ハ虫ヲ治スルニ顯著ノ効アリ
リテコレヲ試用シテシバク良驗アリ
○生水銀ハ虫ヲ殺スニ称誉アリ小児

○右ノ如クニ

○大氏

ニ水銀一二碎テ用ヒテ甚ク良驗アル
 ヲ確證セリ然レモ分量甚ク少キニ
 ニ魚ヲ殺スト能ハズト見ユ又小兒ニ確證
 レテレバク用ルニ能ハス又水銀ハ魚ニテ
 害スヘキヲ證シカクシ○スコポリ人曰ク
 水銀坑水銀ヲ出ス坑ヨリ魚多キハナシ又此
 地ニ住ル人魚病ヲ免ルモノ殆ントナシ
 且ツ其地ハ人ノ氣中ニ水銀ヲ含孕
 シコレガ火氣ニ由テ凡化散満ス故ニ其地
 ニ住ル人ハ水銀ヲ含孕セル氣中ニ生流ス

故ニ水銀自テ身中ニ入ルナリ然レモ其水
 銀復々甚ク速クニ体中ヲ出去ルナリ
 ○或ハ意テ水銀ヲ煮タル水ハ魚ニ
 奇効アリテヨクコレヲ殺スト此ニ由テ
 ローセン人魚病ニ水銀ヲ煮タル水ヲ用ヒ
 世ニ多ク此ヲ称譽シ此ヲ用ヒテ奇効
 アルヲ記載セリ
 ○水銀ノ諸製劑甚ク多シ皆魚ニ
 ヲ馳泄センガ厚ニ用テ良効アリ殊ニ
 コレニ下劑ヲ兼用スレハ尤モ効アリ

○峻酸ノ諸品ハ虫ヲ害スルヲ明カナリ
醋ハ虫ヲ害スルモノト見ユ又此ヲ以テ腸
ヲ疏解シ虫ヲ駆泄スルナリ○ブールハ
名ノ説ニ蘆薈膏泊夫藍没茶ヲ峻烈
ニ引タル醋二十倍ノ量ニ投シコレヲ大ナル
硝子鐺ニ内レコレヲ六時煮テ其醋ヲ
他ノ器ニ写シ取ル此ニ由テ此醋ニ右サ茶品
ノ功カヲ含ナリ又其残リタル硝子鐺ノ
滓へ又醋前ノ分量ノ半ヲ注キ内レ
前ノ如ク煮テ其醋ヲ取リ前ノ醋ト合

muc (Hydromel)

シ者テ三分一マデニ減シ稠厚ノ液ト
為セハ甚夕峻烈ナル醋トナル此ヲ用ヒテ
前説ノ効アリテ虫ヲ治スルニ稱賛ス
此液一匙ヨリ三匙マテ蜜水ミツヅク或ハ甘酒
ニテ送下ス
○ヒトリヲリユムマルチス 齋ハ胃中ニ在ル
虫ヲ速ニ殺シ且ツ其後速ニ必ズ吐セム
ゾーレシハ良効アルヲ経験セリ大人
ハ此液一匙ヲ水九十六匙ニ溶化シ空心
ニ服セシム而メ患者ヲ火ヒシク步行セシム

litium martis ad albedinem calcinatum.

小児ハ年齢ノ少長ニ從テ斟酌シ又其
味ノ佳カラサルニ由テ適宜ノ舍利別ニ
和シ美味トシ与フヘシブルハハコノ
ヒツトリヲリユムマルチス
者ニ用ヒテ條虫以三十八丈二尺五寸ヲ
下セリ

○剛鉄殊ニ剛鉄泉或ハヒツトリヲリユム

マルチスアドアルベチ子ムカルレナチ云製剤名

ニ紫茉莉根ヲ加ヘ用ヒテ此病ニ稱用ス

○銅或ハ銅製劑ハ此病ニ稱譽スレ

是レ切実無懼ノ甘条ニ非ス必ス戒慎シ

テ用ユベク又圓熟ノ匠家細慎ヲ加ヘテ

用ユレハ効ヲ得ルヲアレ凡如此危懼アル

甘条ナレバ絶テ用ヒサルヲ良トス庸人ハ

蜜水ヲ銅銭ニ注キ漬シコノ液ヲ用レ

凡甚タ危懼スヘキ甘条トス或ハ此ニ由テ

危症ヲ発スルヲアリ

○ヅーヘレン名魚ヲ殺スニ杜松子酒奇

効ヲ見ルヲアリト云ヘリ然レ凡ズウーレン

名ノ説ニ曰ク杜松子ハ殺虫ニ関ラズ

ト見ユ其故ハトルナノ説ニ此虫以テ
 醇烈ナル燂酒ニ浸セハ甚ク速ニ死ス
 ト云ヘリ此ヲ以テ見レハ酒或ハ凡テ精
 烈ナル液ハ虫ニ害アルト必セリ然レハ
 小兒ハ少量ノ酒ニ非レハ飲テ能ハス又
 火酒ハ服スルニ堪ヘス故ニ此劑モ唯大人
 ニ用ヒテ時々効ヲ得ルトアリローセン人
 試説ニ虫ヲ燂酒ニ浸ス一日ニシテ仍生
 活セリト云ヘリ然レハ大効ヲ得ヘキ非ス
 ○氷或ハ冰冷ノ水ニ虫ヲ浸セハ速ニ死

スルト試ミテ皆人知ル所ナリ故ニ医家
 モ此虫病ノ患者ニ冷水ヲ服セシム然
 ルニ——此法ハ危懼スル者多シ然レハ
 此書ノ撰者ヨク經驗シテ確當ノ効
 ヲ證説セリ○凡ソ此冷水并其他ノ諸
 劑殺虫ニ称用スレハ古ヨリ今ニ至ル
 マテ百發百中ノ効アリ——此藥創世ニ
 出ルトナレシ此ヲ按スルニ畢竟此藥ハ
 此患者ニ的効アレハ彼患者ニ驗ナク
 彼劑ハ彼患者ニ効アレハ此患者ニ効

argemone hydropogonum bryley vel angelic salae

ナキ一必セリ

○峻攻ノ下劑モヨク効ヲ奏スル一アリ

故ニ虫ヲ治スル劑中ノ初等ニ列セリ

此ハ蘆薈、ヒユルヒス、コルシマス、新蜀藤

黃其他如此類ナリ就中紫葳、方紫葳根

ハ此病ニ稱賛セリ○スウーテン名人曰ク

一少年梅毒淋疾ヲ患ヘ其尿管ニ

甚タ幾多ノ疣生ス此ニ由テ峻烈ノ

下劑ヲ用エ此ハチユルベクミ子ヲレ室

レカムモニユク此葉新根調合セ

リ此ヲ用ルニ由テ患者烈ク下利シ其ハ

淋疾快復シ此ニ就テ首尾全キ條虫ハ

一條ヲ下セリ患者曰ク從來條虫ハ

駆除センカ為ニ諸般ノ甘柔劑ヲ用エレ

曾テ才効ナレトスウーテン名人條虫ヲ

治スルカ為ニ其後右ノ劑ヲレバク用ヒ

良効ヲ得タリ但シ峻攻ノ劑ユエニ一月

ニ兩回用ルニ三回用テ竿ナリ此ニ由

テ尺ミク虫ヲ下泄セリ

○ブールハ名人ノ説ニアルヤニユクイドラゴキユク

風雲堂

ハルアデリサテエ製創名二碎ヲ取り此ニ沙

糖六碎ヲ加ヘ硝子白ニテ研磨シ麦餅心

十碎ヲ加ヘテ丸サ糸トスコレヲ大人ハ空心ニ

服シ其上ニ水ニ蜜ヲ加ヘタル液三十二錢或

ハ四十八錢ヲ服ス此創深下シ諸種ノ虫

ヲ殺スナリ但シ頻數服シ或ハ分量過

多ナルヲ戒ムヘシ此レ侵蝕有毒ノ創ナリ

胃ヲ甚ク衰弱セシムルナリ若シ胃

衰弱スルモノハ杜松子ノゲレイ新局ゲレイノ
法ニ從テ製ス

ヲ用テ治スヘシ

○右ノ創并ニ如此種類ノ創ハ每次大ニ戒

慎ヲ加ヘテ用ユヘク又小兒ニ用ルナリ勿レ○

輕ク下利シテヨク効力アルニ糸ハ葉

菊根ナリ此根ノ細末ハ每次其脂ニ比ス

レハ危懼ナシ又此ニ冰糖ヲ加ヘ久ク磨

ルヲ良トスコレ此物ノ軟膏質ノ粘膠

ヲ破碎センカ好ナリ○或ハ虫以ニ害アル

葉品ノ臭ヲ腸ニ充ニテ甚ク良効

ヲ得ナリアリ阿魏ノ如シ此ヲ服シ

テ下劑ヲ用ルナリ

○^カ纒草

○或ハ吐削ヲ用ヒテ捷効ヲ奏スルニア
リ予既ニ前ニ説カ如シ
○殺虫削ニ下削ヲ合シテ効ヲ得ル
トアリリルルノ説ニエキスタラントヘルホリ
ニグリ新ニヒトリヨリ云マルナス局新ヲ加ヘテ
良効ヲ得ナリ○ストルクノ左ノ削ヲ用
ヒテ良驗ヲ得ナリ大人ハ四朶ヲ日ニ
四回ニ用ユ少兒ハ一朶或ハ其余モ日ニ
四回ニ用ユ
カ山ホレイケレスト局新

紫茉莉根 細末

紫茉莉根 細末 各一朶

オキシメルスシルリト局新 三十二朶

右調勻ス

○^カ纒草

○予右ノ種類ノ削ヲ少兒ニ用ヒテ良効
ヲ得ルトアリ此ハ總テ紫茉莉根ノ細
末ヲ敗醬根細末各一朶ヲ清淨ノ
白蜜二十四朶ニ和シ半時或ハ一時毎
ニ一卵匙 常匙ヲ用ユ此ニ由テ甚々幾
多ノ虫ヲ駆出ス○八歳ノ女兒腹甚

manlyk Vaaren Kruis.

夕硬脹シ臍凸起シ腫子甚夕散大ニ
ナリ甚夕饑食シ形容甚夕病リ此ニ
由テ右ノ劑ヲ用ルニ半時ノ中ニ圓長與
三十六條ヲ下セリ

○吾國ノ茶局ニテ鯨魚錠ヲ紫葉
薊根ト須草根ニテ製シ年餘ノ
多クニ從テ半匁ヨリ一二匁ヲ用ヒ六
効ヲ得ル

○ノウツヘルハスウツセルス綱ノ匠ナリ
多年經驗得効ノ條由テ治スル一方

アリ其死後其寡婦ノ手ニ其方ヲ傳ヘ
拂郎察王コレヲ買ヒ且ツ其命令ニ由テ
檢査シ遂ニ世ニ顯然ナリ其方ニシテキ

ハイレシコロイド 綿馬一名羊齒 根ナリ 初先

ツ美汁ノ類ヲ服シ或ハ浣腸法ヲ施
シテ腸ヲ滑利ナラシメ而シテ其根ヲ用
ヒコレニ次テ下劑ヲ用ユ其方數回升化
シタル甘汞丹シカムモニユム 藤黃ヲ合
シ製ス

○又外用ノ諸劑ヲ稱譽セリコレ既ニ

古（ヨリ）悦（ク）テ（アリ）○苦烈ノ品ヲ以テ
坐（サ）茶（トシ）或（ハ）其他種々ノ品ニテ坐（サ）茶
トシ（テ）施（シ）テ大効ヲ稱（ス）ル（アリ）殊（ニ）肛酥
虫（ニ）効（アリ）然（レ）凡（此）虫（ハ）如此（ノ）劑（ヲ）施
セ（ハ）肛腸（ヨリ）逃（上）リ（テ）高（ク）腸（中）へ（這）
入（ル）ト（アリ）ト（人）皆（思）（ハ）リ○浣腸法ハ殊
ニ効（アリ）小兒（ハ）他（ノ）劑（ヨリ）ハ施（シ）易（シ）
ト（ス）コレ（ヲ）施（ス）ニ内服（サ）茶（ノ）服量（ノ）三
倍（ヲ）用（レ）ハ（ヨ）ク（的）効（ヲ）得（ル）ナリ又（コレ）ニ
由（テ）虫（ハ）其（居）處（ヲ）變（移）シ（以）テ（驅）泄

シ（易）カ（ラ）シ（ム）己（ガ）為（ニ）ハ（患）者（ニ）苦（味）
ノ（サ）茶（ヲ）内服（セ）シ（メ）而（メ）乳（汁）ヲ（腸）中（ニ）
灌（入）ス（ル）ナリ

○虫（死）シ（テ）尽（ク）通（泄）セ（ハ）虫（ハ）因（テ）
起（ル）所（ノ）諸（症）并（ニ）其（後）長（ク）バ（ク）
発（ス）ヘ（キ）患（症）ヲ（適）宜（良）効（ノ）サ（茶）劑
ニ（テ）治（ス）ヘ（シ）或（ハ）虫（ハ）因（テ）搗（搗）并（ニ）痼
病（ヲ）發（シ）シ（コ）カ（長）ク（シ）バ（ク）發（ス）ル（モ）ハ
此（ヲ）全（治）ス（ル）ト（甚）タ（難）キ（ト）アリ（凡）ソ
強（壯）ニ（ス）ル（サ）茶（劑）殊（ニ）消（熱）皮（ヲ）用（レ）ハ

間的効ヲ得ルヲアリ○又虫ニ因テ
癩スル病治シテ後ハ宜ク細慎ヲ加ヘテ
患者ニ漸日久治虫以劑ニ強壯劑下劑
等ヲ加ヘテ用エヘシ是レ畢竟死セル
虫或ハ生活セル虫以尚腸中ニ残留ス
ベキヲ駆泄センガ為ナリ

小兒諸虫以篇第二十三終

○諸

小兒佝僂病篇第二十四

○小兒頭大キク顔面黧澹膨盈シテ
頸々靜脈太ク露ルニ身体小瘦削シ
皮膚弛軟ニシテ收固ナク胃腸脹シ
殊ニ右方甚シク又諸骨ノ關節巨シ
右ノ諸症癩見スレハ既ニ此病甚シク癩
起スト稱スルナリ○右諸症ノ中唯一二ノ
症癩スルモノ譬言ハ諸骨ノ關節一二塊
腫スルヲ此病ノ初癩ト稱スナリ然レモ
コレニ肌肉弛軟ニシテ歩ムヲ能ハサルヲ

風雲堂

兼レハ此病九深クシテ正ク尙傳病ト名ル
ナリ

○此病ハ古ヨリアルニ非ス
エングルス國侯
ノドルセツト侯及ヒソムメルセツト上ノ時代午
六百十二年ト千六百二十年ノ間ニ始テ
エングルス國ニ発見レ千六百五十年ニ
エングルス國ノ医ゲリツツ國始メテコレヲ
記載セリ○エングルス國ノ死者ノ記録
簿帳ヲ閱スルニ千六百三十四年以前
ニハ此病ヲ載ルナレ○エングラント國ヨ

○此病

リフランカレイキ國ニ傳ハリ其後此病時
ヲ經テ和蘭ニ傳フ

註レウス子ウス名人千五百八十二年ニバセル

地ニテ書ヲ著ハシ小兒ノ勞瘵ヲ記セル
中ニ小兒甚ク餓テ食スレ氏諸骨ヲ
以テ身体ヲ維持起立シ難キホドニ
高脚瘦骨立シ此ニ腹壅塞シ肢節
尙屈スル症ヲ兼ル病此時ニ於テスツ
セルラント地ホルラント上ニ多ク患ルヲ載
タリ此ヲ以テ觀レハ本書ニ挙ルエングルス

名國ノゲリツツシ名ノ此病ヲ記載セル以前
既ニ久ク世ニ患ルルノ明白ナリ

○其國ノ

○此病始テズロ^{名國}ニ傳ルルハ病性
明白ナラス又病名ナシ唯或ル所ニテコレ
ヲリセツトト名ル^{名國}或ハ小兒ノ常瘵ト
稱シテ通用セリ○エ^{名國}ニテハ此病
ヲテリリケツト名ク拂郎察^{名國}ニテハコレ
ヲノウエルレト名ケ又此病見ヲエ^{名國}ニテハ
ト名クドイツ^{名國}和蘭ニテハエ^{名國}ニテハ
病ト名ク

○此病

○今時ハ大抵歐羅巴洲^{名國}此病ナ
キ所ナク又多クハ卑濕汚泥ノ地ニ流
行ス此ニ由テエ^{名國}ニテハ此病多クシ然レモ殊ニ
^上スタラート^{名國}ビュルグ^{名國}上ニ此病多クシ然レモ殊ニ
スタラート^{名國}ビュルグ^{名國}近邊ノ^{名國}ニテハ甚ク
敷シ此地ハ其都府ニ比スハ最モ^{名國}濕泥十
レバナリ乃チビュク^{名國}子ル^{名國}此地ニテ^{名國}驚愕セル
ハ此屋多クシト雖モ一家ニ男女兄弟
十一人多ク皆此病ニ罹ルモノアリト
○小兒此病アリテ生ル者アリ予貧民

ノ小兒此病アリテ生ル・モノヲ見テ〇然
レ氏小兒齒牙見ハレル中ハ此病
死スト云リ此レ実験セルヲニシテ信ス
(註) 山ゲケイシ人一小兒此病アリテ生
モノヲ見ルト云一リ

○小兒肢體始メテ瘦削シ皮弛緩シ
腹脹リ殊ニ右方甚シク又頭大キク面
部盈實シ一澹白色ニシテ腫脹
之頸ニ大ナル靜脈浮起シ諸骨關節
腫起スル等ノ症発見スレハ是レ既ニ

此病一ニ大ニ基趾ヲ成スナリ此時ニ於
テ熟考精察シ種々查ラ用ヒテ速
ニ挽回セサレハ諸症日ニ增長スルナリ
○額骨突起シ始メ頭ノ諸骨縫自ラ
離解シ皮厚ク且ツ皺多ク殊ニ手掌
甚クシ齒牙黃色黒色ニナリ片碎シ
テ脱落ス而シテ速ニ治セバ齒牙生
緩或ハ漸ク久フレテ更生スレ氏復々
前ノ如ク脱落ス胸ガ狭窄ニ胸骨自
ラ前部へ突出シ或コレガ左側若ハ右側

一偏倚シ肋廣クナリ且ツ堆起シ殊ニ
其胸骨ニ連ル軟骨ノ處ニ於テ甚ク
鎖骨甚ク勾屈シ^又特ニ脊椎骨
前ヘ勾屈シ或ハ後ヘ反勾シ或ハ左側
或ハ右側ヘ多少偏倚ス或ハ諸骨^{モ亦}偏
倚シ勾曲ス即チ股骨脛骨腓骨或ハ
上脛骨下脛骨如シ^{瀧孟}ヲ構成ス
ル諸骨凹入シ且ツ偏歪ス此ニ由テ體孟
自ラ狹窄ス或ハ諸骨平常適宜ノ大
トナラサル處アリ或ハ^{以前}ハ剛骨

ナレトモ再ヒ軟柔ニナリ挽屈スヘクナル者
亦コレアリ是故ニ小兒^{以前}ヨリハ短矮
ニナルナリ或ハ諸骨^{瀧孟}ニナリ僅カク
運動ニテ碎折スル者アリ或ハ其骨一
所ニ於テハ柔軟一所ニ於テハ^{瀧孟}虚脆ナル
モノアリコノ症甚ク罕ナリト雖モ^{瀧孟}医家
歴觀セリ或ハ患者起ツテ能ハス歩ム
一能ハサルホドニ諸筋漸次ニ弛緩軟
弱トナリ或ハ箇ノ輕キ消耗熱ヲ生シ
コレガ夜分殊ニ多ク且ツ皮膚層ニ^{瀧孟}脂火

○通不三

夕終ニ尽ク消耗ス或ハ胸喉喘鳴シ
耳聾欬ヲ発ス然レ其ノ痰ヲ咯キ
去ラズレテ吞下シ或ハ
病ノ初發ニ乾欬ヲ発スル者アリ或ハ喘
息病ヲ兼發シ終ニコレガ增長シテ呼
吸窒塞トスルヲ恐ルホドニ甚シ
キ者アリ或ハ甚ク速ニ腫脹シ宛モ脂
肪ト皮トノ間ニ凡氣アリテ膨脹スルカ如
キ者アリ或ハ小便漸ク淋瀝シ或ハ眼淚
ヲ流シ視神衰弱シ終ニ搖擗ヲ発

○小兒年
齡ニ比スレ

シ死ス
○此患者ノ死体ハ速ニ冷ル且ツ硬強ト
ナラスコレ毎ニ實驗セリ○其血甚ク粘
液多ク且ツ冰液多ク且ツ酷厲ナリ
○但シ其酷厲ナル一種ヲ適知スルヲ能
ハサレ凡其起因并ニ諸症ノ所為ヲ以
テコレヲ知ルニ足レリ○諸藏皆大ナレ凡
肝ト膀胱ト殊ニ甚ク大ナリ又腸間膜
ノ腺モ大ニシテ硬シ又膽ニ膽液ナシ
唯粘液多キノミ

○右ノ

○此病ヲ患ル小兒其年齡比スレハ聰
慧ニシテ知日慮早ク孰成スル者アリ或ハ此ニ
反レテ甚ク痴鈍ナルモアリビユク子ル人
曰ク此患兒慧敏ナルヨリハ愚心鈍ナルヲ
見ル一多クシト○愚心鈍兒ハ一峻攻
ノ柔劑ニヨク堪ルナリ聰敏ノ兒ハコレニ
堪ル一能ハス○此患兒ノ腦固^{カク}キモノアリ
或ハ軟ニシテ水気多キモノアリ○此患ハ
大氏甚ク眠ル一多シ又一ロニテ呼吸
ヲ為スナリ○^{食進}多ク^食食ス一○失

○ハ大人トナ
ルマデ成長
スル者少
ナシ

血、搐搦、癇病ヲ發スル一多シ○ビユク子ル
人曰ク此患者真痘ヲ二回^ト患フト然レハ
予コレヲ經驗スル一ナシ又二回^トハ真ツ
痘ニテアリシヤ疑フベシ○此病ヲ患ル小兒
然^レハ^予ヨホド成長シテ北月勾屈セサル者二
人ヲ知レリ○此兒ハ諸甘味ノ物、即チ沙
糖、乾蒲桃、甘味ノ果類、梨子等ハ大
氏好マズ○惡心寒、發熱、一^トスル一アリ
或ハレバく嘔吐スル一アリ或ハ三四日續
ヒテ嘔吐休サル一アリ○此患兒多クハ

虫以ヲ患心フ故ニ甘物ヲ食フ事ハ虫以發動
レ其諸症ヲ發ス○此病ヲ男兒或ハ女兒
何レカ多ク患心フベキヤ知ルヲナシ○大
人ニハ此病一罕ナリ然レモ子
名ビユクダラフ名此ヲ記セリ○此
病傳染セサルハ實ニ天幸ナリ又今ニ至ル
マテ父母ヨリ其兒ニ遺傳スルヲ見ス○
女子ハ婚スル以前ニ此病ナキカ或ハ既ニ此
ヲ患ヒテ治スルコトアルカヨク商議スヘシ
○此病ヲ患心ヒタル婦人ハ體孟狹窄ナ

ナルユエニ姪身スレハ分婉甚タ困難或ハ
一多ク其兒死レテ生レ或ハ産褥中ニ
死ス

○諸患兒皆右ニ奉ル如キ險重ノ諸
症ヲ患ルニ非ス輕重每人異ナリ或ハ唯
初起ノ輕症ヲ患ルモアリ或ハ劇
症ヲ患ルモノアリ○但シ患者食物
攝養ヲ善クシ或居處ヲ変レシ或ハ
適當ノ藥劑ヲ用レハ險重ニ進スス
輕寛ヲ得ル或ハ健康ニ復スルモノ

○既ニ此病ヲ
發スト雖モ

アリ
○小見此病ノ一ノ起原ハ物心テ身体凝
体諸部甚々弛緩シテ軟柔ニナル
ヨリ起ルト知ルヘシ是ヲ考究スルニ
第一、父母虚弱ニシテ多病ノ一、或ハ父
母懶惰ニシテ身体ヲ運動セズ并ニ放肆
遊蕩ニシテ攝養ヲ慎マズ或ハ茶湯沙
糖或ハ脂厚粘稠ノ食物ヲ過用シ或
ハ癩毒アリテ根治セズ或ハ梅毒ヲ吐涎
法ニテ驅逐シ羸瘦スル等ハ

其母受胎スルニ

レバク墮胎シ或ハ死胎ニテ生レ或ハ多
ク尙傳病ヲ發シテ生レ或ハ生レテ後コレ
ヲ發スルナリ○第二甚々貧窮ナルハ父
母ハ兼劣菲薄ノ食物ヲ用ルユ且ニ其
見此病ヲ發ス又富饒ニシテ膏粱ニ過ル
家ノ見モ此病ヲ發ス是故ニ富貴ト
貧窮ノ家ニ此患見アリ中等ノ家ニ
ハ此病希ナリ○第三老年ノ父母ノ見
ニ此病アリ○第四卑湿汚泥ノ地ニ養

長スル兒ハ此病ニ罹ル○第五 生母或ハ
 乳母ノ乳齡甚々老レ或ハ乳汁甚々
 過多或ハ甚々稠厚ナル
 中ハ小兒ノ身体良血ヲ醸成スル
 一能ハス或ハ乳汁甚々寡少或ハ薄
 弱ニシテ小兒ヲ養フニ足ラス或ハ小兒ニ
 早ク硬固ノ食物ヲ与ヘテ胃中ニ消化
 スル一能ハス或ハ生母乳母熱病ヲ患ヒ
 或ハ劇キ間歇熱ヲ患ヒテ衰弱スル如此
 起因ニ由テ小兒衰弱シテ酸敗液ヲ生

レ此ニ次テ佝僂病ヲ扱スルナリ○第六
 乳母梅毒アリ或ハコレヲ根治セス或ハ乳母
 ニ癰疾アリ或ハ瘰癧質ノ腫瘍アル等
 ノ乳汁ニテ小兒ヲ養ヒ或ハ乳母大ニ苦
 心困厄ノ事アリ或ハ妊身レ或ハ諸飲ヲ
 常ニ過服スル者ノ乳汁ニテ養ヒ或ハ
 プールハハ人ノ説ニ
 健康ノ小兒ハ
 人ヲ一生母ニテ乳養ス第九ノ見ハ乳母
 ニ托レテ佝僂病ヲ扱セリ○第七ノ見ハ
 居室ニテ汚穢ノ襪襦ヲ洗ヒ是ニコレ

ヲ乾ス等ノ湿気アル室ニ居キ或ハ
大小便ノ湿リタル衣蓐ニ連ニ
清除セス或ハ日常稀薄ノ食物甘
味ノ物穢キ乳汁ノ糊漿果瓜ヲ多
ク与或夜中麦酒ヲ飲シ火爐ノ邊
ニ居テ温暖ナラシムルハ其飲食比白
酸敗ス凡テ如此事件ハ皆身体ノ必要
タル表發ノ蒸気ヲ壅遏シ此由テ皮膚
ノ吸收管乳ヨリ吸収スル液増益シテ津
液過多ニナリ此ニ又酸敗液ヲ兼テ

身体軟弱トナルナリ○第八若シ小兒
ノ疥癬ヲ塗サ菜ニテ内逐潛伏セシメ或
ハ久ク哮喘ヲ患ヘ或ハコレニ間歇熱
ヲ兼テト連ニ治療ヲ加ヘテ治セザ
ル等亦此病ヲ發ス
○右説ク所ノ諸因ヲ兼夾スルト
多キホドイヨク此病ヲ發スルト甚クシ
又此起因ノ諸件久ク持留セルホト
イヨク此病ヲ除治スルト難シ
○凡ソ小兒此病ヲ患フトキトヲ心ニ

○其父母ニ

○的當セサ
ル

○其見ヲ

○諸件ヲ

一 痘件アルカ或ハ如此痘トキカ且ツ徒来
 此病ヲ防止スル飲食調護ヲ慎ミ守
 ル一アルカヨク預メヨ守子問スレト壁言ハ其
 父久ク梅毒ヲ患ヒ或ハコレヲ治スル為ニ
 ヨ守常皆人ノ為ス如ク飲食ヲ慎ニス調
 護ヲ守テス且ツ〇種々ノ藥劑ヲ用ヒ終
 ニ吐涎法ヲ二三回モ行ヒ一或ハ其
 母多病ナルヲ以テ乳母ニ托シ乳母瘵疾
 ヲ患ヒヒレテアリ或ハ其乳齡老タル等ノ
 知ル片ハ其見死スルカ或ハ尙傳病ヲ患

フヘキ一ヲ預メ知ルナリ如此ナル者ハ効方
 レテ良乳母ヲ擇ミ尚又然スレモ一此
 病ヲ扶ケ増スヘキ諸ト起因ヲ除キ
 去リ并ニ此病ヲ防止スヘキ通効ノ諸藥
 劑ヲ用ユレ〇エンゲルセ一國人ハ小兒ノ歩
 ムヨリハ言モフ一ノ早キヲ患ルコレ此病ヲ免
 スルヲ患ルナリ然レ小兒ト言モヒ慰ヤ撫スコト
 多キホト一イヨク早ク言モヒ一
 習フ一ヘク又一小兒ヲ抱クトキ
 一席ニ居ラレメ一爾ルホトイ

〇多少

ヨク早ク歩ミ一習白ス一ハキフヲ知
ルヘシ又小兒齒ヲ生スル一遅キホドイ
ヨク尙傳病ヲ発セシ一恐ル又一小兒
歩行スト雖モ其皮甚タ軟弱ニシテ腹
脹リ胸差突出スルモノハ齒牙生トキス
ル時ニ搖擲ヲ発スルノ恐レナキニ非ス故
ニ小兒生レテ九箇月ノ齡ヨリ二歳ヲ過
ルマテハ殊ニ如此諸候ヲヨク診察スヘシ
〇小兒身体ノ變更一トスル所ヲ考ルニ

〇部

大率^{オホシ}齒牙生スレハ一疾病發見ス又歩
行スル以前ハ脊椎、勾屈スル一無レ〇身
体諸部ノ度ニ比較スレハ頭^{オホ}ナリ是レ
頭ノ骨縫弛緩レテ放解スレハナリ〇
頭^{オホ}重ク諸筋^弛弱ス故ニ小兒其頭ヲ
正ク維持スル一能ハス〇身体ノ皮皺
多クシテ脂肪消去レ肉軟弱ナレバナリ
〇肌肉黧澹色ニシテ健康ノ人ノ如ク
ニ赤色ナラスコレ其血稀薄ニシテ水ノ如
クナレバナリ〇腹大ニシテ高ク起脹ス是レ

○横膈

○ヨリ起ル
○未ニ於テ

身体諸部ノ度ニ比スレハ諸藏甚々巨
 大ニシテ且ツ腸胃ニ凡気充張スレハナリ
 ○或ハ一喘息ヲ獲スコレ肺藏ノ居處
 狹窄ナルハナリ其狹窄ナル所以ハ一ニ肋
 肋凹陷スルニ因リ一ニハ腹内ノ諸藏巨大
 ナルニ由テ呼吸ニ後テ一適宜ク
 一低垂スルノ常機ヲ妨クレハナリ
 然レモ一特ニ一肋ヲ舉揚ス
 ル筋肋筋ノ弛緩軟弱ナルヨリ又一ニ
 病ノ胸腔或ハ心囊中ニ水液聚満シ

○血循環
シテ頭面
ヨリ下行
スルヲ

一喘息ヲ生スルナリ一譬ハ此水胸
 ノ右腔ニ溜レハ患見左腔ヲ下ニシテ卧
 一能ハス心囊ニ溜レハ患見常ニ前ニ
 俯伏スルナリ
 ○又此病ニ
 兼ル所ノ呼吸ノ不利喘促ニ由テ右障
 阻ス此ニ由テ頸ノ靜脈太ク起張シ面
 部亦乃盈脹ス○胃中ニ酸敗液アリ此
 ニ由テ饑テ食ヲ欲ス酸敗液ニテ胃中
ノ神經ヲ衝動スナリ又
 コノ酸敗液ハ膽液ノ不足ニ由テ生スルナリ

○シバク
Stempel

膽液ノ不足ハト殊ニ網膜ニ脂肪十
 キニ因ル○今現ニ酸敗液アリテ患
 者ノ呼吸酸臭或ハ酸臭ノ噫気事
 吞酸アリ此以テ其酸敗液アリテ膽
 液ノ缺乏スルヲ知ルヘシ○酸敗液ハ諸骨
 ヲ軟弱ニスルノ起因タルヲ疑ヒナシ其故ハ
 諸礦類ノ酸液ノミナラス
 醋或ハストレムセル乳汁ヲ凝固シ其清ヲ分必
 ヲ造ル為ニ加ル酸性ノ物ナリ
 加ニ製スル乳酪清ニ骨ヲ漬スニ骨軟弱
 ニナリテ溶解スルヲ以テ知ルヘシ○駝背

○所以ハ

尙博トナル所以ハ持トテ脊骨勾屈
 突出スルニ由テ頸短其頭ト両肩
 ノ間ニ在ルヤウニ見ユレハナリ○脊椎
 勾屈スレハ体軀短縮此ニ由テ手足
 長ク見エト又脊椎左側或
 ハ右側ニ枉ムトキハ身体斜チガムナリ○腰
 并ニ脚ハ手ヨリハ勾屈スコレ腰脚ハ身
 体ノ重量ヲ支持スレハナリ○此病
 高瀧瘦スル○脊髓ヨリ出ル神経壓
 迫セラレテ通利セザレハナリコレハルハ

人ハルレル名^人ブリニ子^名ノ説ノ如シ○諸筋ノ軟弱ナルハ此患見日常坐レ且ツ卧ス^フヲ好ムヨリ殊ニ起ルナリ^一即チ坐レ或ハ卧ス中^ハ

腹筋^急急セス

膨脹レ呼。故ニ患者脚ヲ屈シテ

卧ス^フヲ好ムナリ

○此病初發ニ於テ治療ヲ施セハ快復スヘシ然レ^凡患見ヲ^カ非常ニ^ベ細察

吸レ易ケレハナリ

○精ク意ヲ用ヒテ

精慎シ極メテ危懼勉勞シテ者ヲ護スル^ニ非レハ功績ナシ又此病ヲ增長スヘキ諸件ヲ除クヘシ其父母如此古又ヲ急^ニ勿心シ速ニ調護ニ意ヲ加ヘス具^ハ小兒ヲ省^テ護スル人温和柔順ナラス練達圓熟セス細慎精思セス又居室不潔ニシテ清除セス時候兩湿多ク高燥ノ居室ニ養^フヲ能ハサレハ^ハ此病ヲ回復スル^ト甚^ク夕^ニ難シ

○此病既ニ增長シ患見起立^ツヲ能

ハス或ハ步行スルヲ能ハサル者ハ復治ス
 ルヲ罕ナリ○此病中痲痺ヲ發スレバ
 コレヲ平金比スルハ治シ易シ○此病
 ヲ發スル患者自ラ撞傷、跌撲、墜上
 落シ或ハ脚ヲ損傷スル等ノ古又アレハ
 此ヨリ此病大ニ増長シ
 或ハ速ニ危篤ニ至ルナリ○七歳ト十五
 歳トハ此病ニ肝要ノ年ナリ其故ハ此年
 ニ治スルカ或ハ險重ニ進メハナリ
 ○夏月ハ患心者ニ甚タ希望スヘキ時

節トス。暑者気甚ク早乾燥スレハ尤モ
 良ナリコレニ反シテ秋冬ハ甚タ害アリ
 春月卧床ニ温覆スル患者夏ニ迄ツ
 ケハ漸ク卧床ヲ這ヒ出且ツ步行スル
 ナリ又極老ノ人或ハ痲病ノ人モ然リ
 ○衄血ヲ發スルハ他ノ失血ト同ク利益少ナシ也
 血或ハ欬血ハ一ニノ血絡破裂シテ出ルニ
 非スコレ弛弱セル血氣管ヨリ血滲漏
 シテ出或ハ他ノ患症ニ由テ其部ニ驅逐
 セラレテ出ルナリ

○甚々

○或ハ身体速ニ腫起スルヲアリ此レ病性ノ變化スノ候ニ非ス其故ハ嘔吐シテ後其腫二日ノ中ニ消散スルヲ多シ但レコレガ消散セス
 甚々久ク^レ留^レシ或ハ左方ヨリ右方ニ移リ或ハ右方ヨリ左方ニ移リ譬言ハ左手左足ヨリ右手右足ニ行キ或ハ一腫起スル方ノ眼ヨリ淚^ヲ流レ且ツ多少ノ熱ヲ兼^テ發シ又面^ニ凹没^シ敏^ク生^シ大便^ニ絞急^ト榨迫^シ或ハ瘰^癧瘰^癧様ノ諸症增長スル者ハ尔後此ヨリ

○部

○一アリ

快復ニ進^ミ右ノ諸症ヲ發スルニ就テ死ヲ免^ルシ
 ○其病性甚々變^テスル。譬言ハ以前大便利スルモノ今秘閉シ或ハ小便ヨク利スルモノ今不利スルモノハ死ヲ俟^ツノミ又面^部甚^ク推^テ弊^スルモノハ十四日ヲ出ス死ス眼昏暗、足脚ノ觸知ヲ失フ者ハ三四日ノ中ニ死ス或ハ氣息甚々^ニ西^ニ冥^クヲ發スルモ亦然リ

○吾國ニテ小兒此病ヲ患ルモノ多ク

然レ^レ凡^ソ驛路街道ニ近^キ所

或ハ都_レ會_レ集_レ地_レノ_レ梅毒_多キ
 所_ノミ_ニ発_{スル}カコレヲ_レ檢_査シ_レ定_メカ_タシ
 ○此病時日ヲ_レ積_テ治_法ヲ_レ施_サレ_ルハ
 治_セス_ト一_年ノ_レ久_キヲ_レ俟_ツテ
 アリ其故此病漸次ニ_レ久_キヲ_レ經_テ腹_痛等
 飲食調_サ護_ト茶_劑ト_レ相_須テ_レ施_スニ
 非_レハ治_セサ_レハ_ナリ○強_實ナルモノヲ_レ虚
 弱ニ_{スル}ハ甚_タ易_シ然_レ凡_ル虚_弱多_ク病
 ナルモノ_ノ精_力ヲ_レ滋_益ス_ルハ甚_タ難_ク
 且_ツ日月ヲ_レ俟_ツニ_レ非_レハ復_シ難_シ

○身体

○九十六義

○療治ノ為_ニ多_ク費_金ヲ_レ用_ルテ_レ能
 ハサル者ハ二般ノ_レ茶_劑ヲ_レ施_シテ_レ足_レリ
 所謂_ル一_第ハ酸_敗液ヲ_レ配_除ス_ルリ
 コレハ上好ノ_レポ_{ット}ア_ス四_錢ヲ_レ清_潔ナル_レ湯
 泉_ニ溶_解シ_テ一_硝子_鐺ニ_レ野_ヲコレヲ
 小兒_年齡_ノ多_少ニ_レ從_テ每_朝二十_滴
 ヨリ八十_滴或_ハ百_滴マ_テ一_盞ノ_レ水_ニ和
 シ_テ之_ヲ一_日然_レ凡_ル此_劑ハ_レ久_ク連_綿ニ_レ用
 ル_ニ非_ス唯_三日_或ハ_四日_{ホド}連_用シ_テ而_テ
 三日_或ハ_四日_{ホド}コレヲ_レ休_メ而_テ復_タ前_ノ

如ク始メシバク如此シテ用テナリ○其
他又酸敗液ヲ消スル劑アリ此ハ特ニ
飲食消化ヲ進メ乳糜ヲ製造ヲ
扶ケ此ヲ以テ良血ヲ生シ腸中ノ吸收
管并ニ乳糜脈ヲ開達シ粘汁液ヲ
剷除シ膠稠ノ液ヲ稀解シ腸間膜
ノ壅塞ヲ開キ且ツ輕ク衝動スルニ由
テ腸ノ蠕動機轉ヲ熨メ且ツヨク大
便ヲ通利ス其劑左如シ

（子チア）石鹼

十碎

○其業

煮牛膽

一碎

カルフス フリート根 (アリユム) 五碎

右合シテ一丸剷トシ毎丸一碎ト為シ銀箔

ヲ衣トシ或ハ極細末ノ桂皮ヲ掺ケ

衣トスルヲ尤良トス

右ノ丸系午膳ノ頃ニ四丸ヲ服シ又夕膳

ノ頃ニ四丸ヲ服ス○此劑ハト自然ノ膽

液ノ性功ヲ体中ニ為スヲ標的トス

○エングルス國ニテハ此患見ヲ冷水ニ浴セ

シメ或ハ扁斗ニ由テ高所ヨリ冷水ヲ注

冷水

Group 10 (1000)

流スー 此兩件ノ法我國ニモ用ユ
 レ氏罕ナリ一婦人此種類ノ冷水
 浴法ヲ三隻ノ中三月施行也同ク施シテ
 此病全治セリ○我國ノ礦性ノ湧泉
 ヲ右ノ如ク浴法ニ用セ又千七百二十年
 〇カ名地ニ於テ一小兒此病ヲ患フヒ起ツ
 能ハス歩行スルヲ能ハサル者痛流ノ
 浴法ヲ勉メテ施スニ由テ十四日ノ中ニ
 其精力倍增シテヨク踊リヨク跳ビ
 走ルホドニ回復セリ○〇カ名地ノ近邊ノ

泥地ノ寒氣ハ此病ヲ治スルニ利益
 アルヘシ○弛弱セル諸筋ノ精力ヲ
 復スルハ冷水ヨリ速カナルハナシコレハ
 尋常ノ如ク冷水ニ浴或滴流ノ浴
 法上ヨリ患者ニ用ユ○若シ冷水ヲ
 浴法ニ堪ヘサルモノハ毎夜臥床ニ就ク
 前ニ水棉ヲ冷水ニ浸シコレニテ身体ヲ
 洗フヘシ
 ○貧家ノ小兒ハ飲食起居ニ精ク意ヲ
 用ルヲ能ハス然レ氏其父母勉メテ

Wortel van de mee-krap (rubia tinctorum)

居室ヲ清潔淨除シヨク温暖ニシ又
杜松木ノ脂ヲシバク火ニ燻焼シ又兩ル
日ハ室中ニ保護シテ衣服ノ湿ラズ乾
燥スルヤウニ志スヲ用ユヘシ又酸味ノ麦酒
或ハ酸味ノ乳汁ヲ与ルヘ勿レ又
毛布ヲ杜松木ノ脂ニテ燻煙シテ
患ノ見ノ堪ユヘキホドニカヲ用テ強ク身
体ヲ摩擦スヘシ此ヲ毎日數回怠ラス
施スヘシ

○フレンス國ノ一医此病ニ茜草根ヲ甚ク

○ヲ取リ此ニ

稱譽ス其方茜草根ニ朶の乾橙皮十
碎茴香搗十五碎ヲ加ヘ細カニ剉ニ磁罐
ニ内レ新汲水五百七十六朶ヲ加ヘ煮テ
百九十二朶ニ減シ冷定シ滓ハ底ニ沈
テ上清澄ニ至テ上清ヲ泌ニ取テ硝
子鑊ニ貯ヘ此ヲ一日ノ服量トシテ毎
日用エ右ノ医家此劑ヲ數多ク經驗シ
テ良効ヲ得ルユエニブイハメル名君ノ説
ヲ引證スルニ及バス

註 茜草根ヲ此病ニ稱用セル医家ハ

此根ヲ用

風雲堂

Verba Britannica (rūmex aquaticus)

ローテ空イキヨハン子スバプチスタコスニール
ナリ尚又千七百五十八年ニパレイス綱ニテ
此系ノ効アルヲ記載シテ著述セリ
○レフレット名千七百二十六年ノ著書ニ
此草根ヲ此病ニ称用シ十二年ヨリ十
五年ノ実験ヲ称挙ス患兒ノ諸骨
始メテ柔軟ニナリ而メ他ノ諸症未ダ
発セサルモハ乳母或ハ小兒ニ此煎劑
ニ蜜ヲ加ヘ飲シ又既ニ他ノ諸症モ
発起スル者即チ大便秘結或ハ下利

或ハ腹膨脹スルモハ他ノ適宜ヲ藥劑
ヲ此ニ加ルナリ凡ソ此治法ハ數月施サ
レハ効ナシ大ナル諸骨既ニ勾屈スルモ
ノモ此ニ由テ正直ニナリ回復スルナリ
○ブリツタニカ根 名アト山ハチタト云フ水地ニ生ス
ニ葉山土大黃ニ丸ツ羊蹄ノ大者 此
病ニ甚タ良効アリ其服法前ノ茜根
ト同シ
(註) ズ左ノゲシ綱ニテ此草 (リユメキスア各々ス
ヲ甚タ貴重シ瘰癧病西性ノ潰瘍ニ
内服外用ス又細末トシ用ヒテ歯牙ヲ

風雲

固^メ且^ツ清潔ニス

○富家ノ兒ハ左ニ奉ル法方ヲ施シテ
此病速ニ治スル^ト希^ク也^トスヘシ

○第一酸敗液ヲ駆除スルニ滴劑ヲ製
シ用ユ○其方酒石塩四^ツ匙ヲ良^キ湯

泉^ノ新汲水九十六^ツ匙ニ溶解シ硝子鐺
ニ貯^ル小兒年^ノ齡^ノ多^ク火^ニ從^テ二十滴ヨ

リ百滴マテ一盃ノ水ニ滴シ毎朝ト毎午
後ト兩回^ツ三日或ハ四日連服シ而後三

四日^コレヲ休^ムテ復^タ前^ノ如^ク服スヘシ如此ニ

○其用ヒシ
日數ホド

シテ酸敗液ノ候^ハ呼吸^ノ酸臭^汗
ノ酸臭等全クナキマテ久ク用ユルナリ

註 酸敗液ヲ制^ス挫^スル^ニ藥劑^{此病ニ}

一^ハ大^ニ醫^ニ緊^要ナル^ト勿^レ論^{ナリ}ハ^レ也^シ人^ノ

曰ク^ハ蠟^ノ殼^ノ細^末ヲ此^患見^ニ二十^碎ツ

一日ニ二回或ハ三回用ヒ而^{シテ}氣^ノ清^潔
ナル國地ニ住シ毎日シバク小車ニ乘セ

居室^ニ并^ニ卧^床モヨク乾燥シ飲食ノ
害^{ナク}良^性ノモノヲ用レ^ル甚^ク速^ニ治^ス
功^ヲ全^成スト○前^ノ後^ノ如^ク諸^法方^ヲ

口施ス

unct. van Rhubarber (Amira rhei)

イ能ハサル小児ハ唯囑散ノ末ト身
体ノ運動ノミニテ治スヘシ然レモ時日
ノ久ヲ經サレバ功ヲ收ムヘカラス

○第一 右ノ滴劑ニテ大便通利セサル者

ハコレ其ローグソウト酒石塩ガ自ラ酸敗液

ト混合シテ然ルナリ如此モハ午ンキケルシ

ラバルベル大黃浸劑ナリ此ヲ某局ニテアニハ

ト名ク新局方ニ出ツ一患兒ノ年齢并ニ強弱ニ從テ

糊漿匙ニ錢ニ二抄或ハ三抄ツ用ユヘシ

○第三 午食ノ終リ并ニ夜食ノ終リニ左

用ユ

下利あり中
クハルモシタ
硝子糖ヲ飲
燒酒ニ和ス
録也ス是ナリ

Ha. helmontiana

ノ丸劑ヲ用ユヘシ

ツツハヘルモンチアナ

縛厚子ニ製スル者九碎
下利篇第十二種治法ニ出

牛膽 乾者 一碎

カルプス フリート根 嵩山海芋ニ丸込
一碎 細末

右捏テ泥ト爲シ一丸ニ碎ト爲シ銀箔

ヲ以テ衣トシ硝子鏝ニ内レ固封シ野

コレヲ每服五丸或ハ六丸ヲ用ヒ大抵一月

或ハ二月モ連用スヘシ

註 カルプス フリート根ハ此劑ヲ製スル以前

ニ細末トスヘシ 細末トシ時日ヲ

風雲堂

經レハ茶効脱トスレハナリ

右ノ丸系ノ一劑中ヲハハルモンチア十八宛
モ其性功人ノ膽液ト同シコレ精微ノ
油ト揮發塩トヲ以テ成レハナリ

○身四 若シ第一條ニ奉ル所ノ滴劑シカル
レバク用エルニ及ハサルモノハ患見ニ毎日
消執皮ヲ用ユレシ此ハ小兒ノ好々物ヲ
消執皮ニ和シ毎日二十碎三十碎或ハ四
十碎マテヲ用ユ或ハ此細末ヲ水ニテ湿シ
泥ト為シ小兒ノ用ヒ易キホドノ方量ニヲ

acidel

ヲウエル前餅ニ卷キ用ユ或ハ其以前二

三日モ沙糖少許ヲウエルニ卷クラ

小兒ニ見セテ食セシムレハ其

後消執皮ノ類ノ服シ維キ物モ

トウエルニ卷ケハ容易ニ服スヘキナリ

○サルエツセニチアレ消執皮ノ塩ナリハンテキナ製法新局ニ出

右ノ消執皮ヲ用ル所ニ良効アリ予

ヨホド甚シク此病ニ羅ル小兒ニ此ヲ丸系

トシ毎日十碎ツ九箇月用ヒ其中毎

朝毎夜毛布ヲ乳香ニテ燻煙シ此ヲ

ontbinding van zter vitriool.

以テ身体諸部ヲ強ク摩手擦シ又小
 ナル車ヲ作テ毎日患心見ヲ乗セ室中ヲ
 轉行ス——如此諸法方ノ功ニ由テ小兒
 步行スルヲ得テ尔後全治シ再發ス
 ル一十ナシ拒ミテ
 ○消熱皮ヲ用ヒ雞キ者ハポウホシ葛石泉
 名ニ出ルスバ名トシ線ヲシバク飲シムヘシ然レ
 此泉得難キ中ハ此泉ヲ假造シテ用ユヘシ
 其法モシロ名君ノ法ニ從テ製スヘシ
 (註)此患見消熱皮ヲ服シ雞キモノハ

ウエイツト名 赤酒少許ツ、毎日一四或ハ
 二回空心ニ用ヒテ、尤モ強壯ニスル事ト
 セリ

○モシロ君此ヲ系泉ヲ製スル法、鉄性膽
 礬ノ溶液ヲヨ等常ノ水ニ和スルナリ
 其分量ハ其水ニ鉄ヲ含ク一真ノ
 葉泉ホド多クニスルナリ其多クヲ試ルノ
 法、鉄気ヲ含メルト葉泉即チスパウトル
 線ヲ多少適意ニ取りコレニ浸食子ノ
 浸劑アクリルナリヲ徐々ニ滴シ其水色ヤカ差カ変ハル

風雲堂

globuli martiales.

トマテ滴入ス 差変リ始ケルハ直ニ止ルヲ云 而ノ別ニヨ守常

ノ水ヲ夫カノ茶泉ノ分量ホド取りコレニ

夫カノ茶泉ニ滴シタルホドノ分量ノ没食

子ノ浸劑ヲ滴シ而後鉄性膽礬石溶

液ヲ真ノ茶泉ノ色ト同一般ナルマテ滴

和スルナリ 試法ノ中ハ没食子浸劑ヲ滴ス既ニ試テ其水ニ鉄氣ヲ含ム分量ヲ

定メ知レハコレヲ患者ニ用ルニハ没食子浸劑ヲ和サナリ 如此シテ既ニ其水ニ

鉄氣ヲ孕メル分量ヲ知レハ爾後ハ大

概其量ヲ定メ易キナリ

○或ハゴロビユリマルチアレス 縮ヲ用エ 註ニ出ツ

毎日

コレヲ麻布唐袋ニ内レ毎朝湯泉四十八

枚ノ内ニ懸ニテ懸垂シ好茶湯ノ色ノ

如クナルマテ浸出ス此ヲ患者ニ午前毎

飲シメ而メ其劑ヲ内レタル麻布袋ハ翌

日復タ浸スマテ窓心ニ掛ケ置クナリ

註 ゴロビユリマルチアレス方 ハルマコベキツレビユガ

リニチユラマルチス 極細末 四十八枚

白酒石 力細末 九十六枚

右合メ硝子鐳或ハ硝子器ニ内レ此ニ

大酒四十八枚或ハ二十四枚ヲ注キ微

火或ハ隔湯煎トシヨク化熟セシメ徐々
 乾之而后復夕碎キ此ニ火酒通宜ニ
 注キ又前ノ如ク浸シ乾シ搗碎キ樹
 脂ヲ加テ鳩卵大ト為ス

*spiritus vini eandem quantitatem
 affunde;
 Digere per tea 3 officina, laborem totius
 repete, donec massa quaei resingna
 appareat. et quia globulos offorant,
 ad olei columbini magnitudinem.*

一

(註)又右ノ劑ト同効ナル水ト茶ヲ製シ
 用エ此ハ鉄ヲ熾紅ナルマテ燒テ水ニ投
 シ冷水ヲ用ルナリ○其茶局於テハ銅ヲ以
 テ製スル種々ノチニキキニル綴アリ皆
 用テ良効ヲ得ルナリ

○第五 毎夜——前ニ示ス一法ノ如ク
 冷水ヲ外^{小兒}用スヘシ通例此病ヲ治スルニ
 最モ効力アル法ナリ

○此ニ就テ飲食調攝ヲ節慎シテ急
 ルヲ勿レ則チ左ニ示ス古又件ニ急息ヲ用エ

へし

三

○第一 小兒ヲナリメケ卑濕汚泥ノ地ヨリ高燥ニシテ水邊ニ遠キ一處ニ移居スヘシ故ニ又卑キ室ニ居ラナク樓上ニ住セシムヘシ○尚又室ニ在テモ雨濕多キ日ハ乳香、杜松木脂其他如此類ヲ焼テ薰ニスヘシ

○居室ハ清潔ニ掃除シ適宜キ温暖ニスヘシ但シ夏月ト雖モ少シ火爐ヲ役クシ己其室中ノ氣ヲ乾燥シ清浄ニシ且ツ

三

其室ニ在ル人ノ表背ノ氣充滿セシメサルカ為ナリ○其室ヲ掃清洗拭スル時ニハ小兒ヲ他室ニ移シヨク乾淨ニテ後復シ居ラシムヘシ

○第二 小兒ヲシバク小車ニ乘セ其内ニ顛覆セサルヤウニ固リト坐セシメ室中或ハ快晴ノ日ハ凡ク扉達ノ地ヲ挽クヘシ○又毛布ニ乳香ヲ薰煙テ此ヲ以テ毎日數回患兒ノ總身ヲ摩擦スヘシ但シ摩擦スル毎ニ

其毛布ニ薰煙スヘシ

(註) 或ハ安息香、琥珀、オリハヌム、香松

ノ類、松香、其他如此類ヲ――薰

煙シテ此皆良驗アリ

○、第三、小兒眠ルト多キモノハ

過々多ク眠ラサル

ヤウニシテ由テ其室ヲ――明朗

ニシ其兒ノ傍ニ人多クアリテ言語、音動

ニテ省寤セシムヘシ○睡ル片ハ硬キ卧

床ニ卧シムヘシ蒿席ヲ佳トス、鳥羽

蓐ハ用ルコト勿レ

(註) 我國ニ於テハ總テワラビ蓐セシヤヲ以テ小

兒ノ卧床ヲ造ル、然レ此病アル兒ハ種

々ノ草葉、草花ニ花ヲ用テ造ルコトアリ

即チマヨラシ、メリツセ、薄荷、草蓐

蒺藜花、チリホリユクヲドラテ台草接骨

木花、薔薇花等適意ニ撰ミ、花名干

乾シ末トシ此ト等分ノ大麥皮カヲ

加ヘ交ヘテ小ナル卧床ニ填ルス

○ブルバイノ名ノ説ニ綿馬ワニワラビ種ニ百

ハレンニシヨク種ニ百

Tritorium odoratum

○此篇
示^示調
謹^謹食^食ヲ
慎^慎守^守レハ

八十八 麦マヨラナ草メリツサ薄荷各
二握 草薺 菱花 千^千ホリユムトドラユム
花 接骨木花 薔薇花 各十六 麦ヲ
取テ小兒臥床ヲ造ル^ル○右ノ類ノ
臥床ヲ造リテ小兒幼生ノ時ヨリ常
ニ用レハ大ニ利益アリ此就^就言^言總テ尙
儻病ヲ防止スルナリ
○第四 小兒ノ衣服殊ニ縹緋ヲシハ
更^更ヘ用ヒ且ツ麻手擦ス^スヘシコレヨクナ乾
淨ナラシムルカ為ナリ○衣服ノ色赤

三

色或ハ白色ニスヘシ○ビユク子^子山^山經^經曰ク
一女兒物惣テ赤色ノ物ヲ見ル毎ニ癩
ヲ癩セリト然^然レモコレ甚ク^甚クナリ
○第五 此兒ハナリメケ乾固ノ食物ヲ
與フヘシ又小兒ノ嗜日好スルホドニ多ク與
ル^ル勿^勿レ又茶湯 温湯 香湯 乳製
ノ食物 穀^穀碎^碎或温煖ナル蒸餅軟丸
麦餅等ヲ用ル^ル勿^勿レ又總テ脂臘類
酸味物或速^速カニ酸味トナリ易キ物ハ
害アリ故ニ厚脂ノ肉類 羹汁 酥酪

林示スヘシ又食物ニ油類、甘味ノ物ヲ加ル
勿レ又果瓜類、乳汁、乳酪清、ヲ林示ス
シ○魚、其他肉類ヲ煮タルモノ勿レ
○第六 飲液ハ水ニ酸味ヲラザル酒少
許ヲ加子ハ或ハ上好ノ稀ウスキ麦酒ノホツ
ノ気多キモノヲ与ス

(註) 上好ノフランス赤酒、ヒツホクス名酒或ハ

ブリュニス名酒左イセモム細アニゲルセアレ名酒十二

ギユルデン名酒ノホルランドノ麦酒、等ブルル名酒ハ

名稱譽セリ夏月ハ右飲料ニ湧泉ヲ

Table

以寺分ニ加、用ユヘシ○蒲桃酒ハ三ハマ
テヲ日ニ三四回用ユヘシヒツホクス名酒ハ
一回ニ四匙ヲ用ユヘシ

其他ノ肉羹汁ハ脂油ヲ抄ス去リテ用ヒ或

ハ雞卵ヲ其内、攪合シテ与ハ或ハ麦酒

ニ雞卵ヲ加、或ハ麦餅ヲ加、或ハ稀名

煮タル雞卵、炙リタル鳥肉、炙リタル幼

羊肉、犢牛肉、炙魚肉、バクエリ、犢牛脚、

ゲレイ、魚、犢牛、雞、鳩、雁、其他養

ヒ肥ス所ノ鳥類、炙リタル肝、等ナリ○

風雲堂

風雲堂

食物ニ於テハ常ニ香料ノ品
桂、肉豆蔻、肉豆蔻膜府利等ヲ適意
ニ撰テ掺シ用ユヘシ

(註) ブールハ一畝 麦餅ニ洎夫蘭、肉
豆蔻、益智、桂、等其他如此、芳香
ニシ強壯ニスル品ヲ少許加ヘ用ユ、或ハ鳩
雞、兎、羊、野羊、犢牛等ノ肉ヲ少
炙リ細カニ剉ミ、麦餅、塩、花ニ少許ノ
芥、テイム名、肉豆蔻、等ノ類ヲ加ヘ
用テ称譽言セリ ○米、梁、大麦ニ乾

蒲桃ヲ加水ニ煮テ蒲桃酒少許花ニ
一二ノ香料ヲ加ヘ用ヒテ良効ヲ得ホト
○魚類、犢牛等ノ炙リタル肝
ハローセ名用エトイヘ氏利益獸名ト見ユ

佝僂篇第二十四終

Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '小兒' and '頭'.

小兒頭水篇 第二十五

此病小兒其身體之比スレハ頭大キク
且ツ時日ヲ経ルニ從テ漸ク頭大キク
ナリ身體ハ長育セス却テ瘦消ス
此ヲ頭水ト名ク

アリ

○小兒此症ヲ発シテ生ル者其起因
ヲ考ルニ母体ニアル時母ノ腹部ヲ撲
撞搶壓傷等ノ外傷
コレヲ胎見ノ頭ニ被リ或ハ母ノ腹部ヲ
甚シク緊縛シ且ツ懶惰ニシテ常ニ靜

○三母体在
テ右如胎
見ヲ壓迫ス
ルニ因テ常
例

生シ或ハムク大便通セサル等ニ因テ
胎見ヲ壓迫シ或ハ其父母ニ深ク根結
隠伏セル疾病アルニ因ル其故也如ク適
宜キ長月ヲ障碍シ一ニハ妊身中毫
モ外傷感傳靜坐便秘等ノ過誤十
シト雖モ此症アリテ生ルハ中コレ其父母
ニ隠伏セル病毒母アルヨリ来ルヲ疑ヒナシ
註 妊身中母腹ノ外傷ノミナラス又
頭水ノ一書ニ曰ク一初生児一胎見一厚
脳膜ト頭蓋骨膜トノ間ニ水聚リテ

○此病

一頭頂ノ諸骨分解スルヲ宛モ水ニ
浮漾スル如キモノアリトコレ分娩ノ八日
以前ニ交接過甚キニ由テ然リト云
一リキリニコス名ノ書ニ見ヘタリ
○右ノ如キ症ハ既ニ母体中ヨリ大ニ險重
ニ進ムヲ以テ産出スルニ甚ク難ナリ
ヤコブヒテエン 卷ノ七百六十五年ニ如此顯
著ノ症ヲ記載セリ
註 ヤコブヒテエンノ説ニ曰ク一産婦
一産ニ臨ンテ分娩セサルヲ既ニ一日コレ

ヲ診スルニ陣疼止ニ陰器腫起シ脈
 細數ニシテ弱、患婦精力虚脱セリ
 其児ヲ探ルニ仰居シ頭甚々大ニシテ
 低垂シ横骨ト薦骨トノ間ニ固ク
 夾ミレテコレヲ押^{カセ}凡退カス此ニ由テスルイ
 経ノ剪刀ヲ以テ頭ノ矢縫ヲ適宜ク截
 ルニ出血ナク水穀ク流出シ此ニ由テ其頭
 收缩シ容易ニ分娩セリ其児生レテ
 三日ニシテ搖擗ヲ發シ翌日死セリ其
 母ハ劇キ執ヲ發セリ然^レ凡三七日ノ中ニ

全快セリ

○此症速ニ發スルモノ其後速ニ死ス
 ○此症大凡生レテ二三週或ハ二三月ヨリ
 早ク死見スル者希^シ○此病因ハ物惣テ母
 体^ノ受^テ孕セル胚胎^ノ時^ニ既ニ釀成スル
 ナリ○或ハ分娩ノ時小兒ノ頭狭窄ナル
 産門^ニ懸心^留レテ列^レク壓^作セララル、
 ヨリ此病ヲ發スル者アリ但シ如此古又アレ
 ヲク此^ニ堪^テ害ナキモノアリ或ハ然ラサル
 者アリコレ其臨産ノ胎居ニ因リ或ハ其

見ノ体質ノ強弱ニ因テ一ナラス○其他
此病ノ起因トナル諸件多々并枚舉スヘ
カラス此病一ト一發見スルニ就テ始メテ
其起因タリシ言フ知ルコト多クシ○小兒
ノ頸部ニ冷氣ヲ感シ或ハ疥癬諸瘡
ヲ内逐潜伏セシメテ此病ヲ發スルコトアリ
但シ疥癬ヲ内逐スルモノヲシバク見ルニ
必ス此病ヲ發スルニ非ス
○或ハ年長シタル兒墜上落赤撲等ノ
外傷ニテ此病ヲ發スルモノアリ或ハ劇キ

執一病ヲ患テ後發スルモノアリ如此者ハ
大氏速ニ死ス然レ或ハ痴呆或ハ
精神沈重ヲ兼テ三四年或ハ十年十五
年モ在苒トシテ死セス或ハ二十一歳
ナルモノヲ見ルコトアリユフサテ地ニ接スル
一邑ニテ一婦人此病ヲ患ヒ四十五歳
ニテ一兩年前ニ死セリ此婦人生レテ
六箇月ニシテ此病ヲ發シ此ヨリ其ノ頭
發馬怪スヘキホドニ巨大ニナリ并ニ此
兼ル諸病ヲ患ヒテ常中ニ在

リコレエクマン人詳ニ記載セリ

(註) ビニツ子ル人亦一婦人頭水腫

ヒ三十一歳ニテ死スルヲヲ記載セリ

○頭部異常ニ大キク增長スルハ

ハ頭蓋骨自ラ廣ガリ手指^{ニテ}押ハ

退カスヨク皮下ニ觸知リ易シ又頭蓋

骨ノ全徑起脹ス殊ニ前部ト上部ハ

外面ニ障碍ナキユニ多ク起脹ス故ニ額

廣ク高クナリテ眼^鼻ニ其他顔面ノ諸部

ニ越テ突出ス此ニ由テ面部^{自ラ}窄ク短ク

○其諸骨

○此病變スレ

見エ○幼見頭蓋ノ諸骨未タ接合

セス所謂骨縫ヲ造サレハ其諸

骨分離シ自ラ罅隙ヲ為シコレカ廣カ

ルニ從テ宛モ顛^{ヒヨメキ}門ノ如ク切按シテ知リ易

シ○如此小兒尚數年生活スルハ其

分離セル諸骨端自ラ延展^{ヒカ}滋長シ

然ニ其罅隙接合シ或ハ其骨縫ニ小骨

ヲ生シ骨間附著シ遂ニ罅孔填充

シテ見故ニ如此ナルマテ生活スル患者ハ其

以後頭部甚ク增長セサルナリ

○ハ維キニ至

是故ニ此病ニ於テ頭蓋諸骨ノ分離ニ
鑿隙ヲ為スハ特リ幼年ノミニ在リト知
ルヘシ然レハ右ノ如クキ
分離スレバ接合スヘキ年齡ニ始テ此病
ヲ發スル者ハ尚頗ル復治スヘキ理アル
ヲ思量スヘシ○頭蓋骨甚ク延展
弛張シテ其骨薄クナル日暉ニ
向ヒ或ハ氣ニ對シテ腦質自ラ骨上ヨ
リ透見スルモノ多クシ

註 究理医術ビブリアテキ書ノ中ニ

此志ヲ與年々リ

○小兒此病始テ發スル時ニハ直立正坐ス
ル能ハス然ラサレハ勿心々此堪ヘス欬嗽
嘔吐ヲ發シ煩悶苦悩ス但レ臥スル
ハ其諸症安靜ナリ○其以前〇一二時
輿寤セルモノ今此病ヲ發スレバト日常
眠ルト多クシ○右ノ諸症ハ頗ル年長
セル小兒ニ於テモ尚精ク意ヲ用ヒテ考
フヘシ○薄弱ノ見ハ右ノ諸症始テ發
見セハ精密ニ意ヲ加ヘテ速ニ頭蓋骨

○平全

風雲堂

特ニ顛門

カカリ且ツ長クナルカヲ診察スヘシ○此病

増長スレハ前説如ク身体長ク育スル

甚ク遅ク肢節短ク脆弱ニシテ瘦削

又頭ヲ正ク持立スルヲ能ハ

ス且ツ總身モ直立スルヲ能ハス又運轉

全ク不遂トナル是レ即常身體ヲ運

動セス靜卧スルニ由テイヨク一廢疾ト

○自テ

○此患見一死セスレテ長ク保續ストイハ
通例如ク言語ヲ能ハス又知日慧心熟
セス痴呆トナル

(註) モニコ名ノ書ニ曰ク八歳小兒頭水
ヲ患ヒ其頸ノ周圍二尺四寸アリ然レモ
知日慧心他ノ見ト異ナラスヨク記憶シレ又
ヨク歩行セリ

或ハ耳目口鼻ノ中疾患ヲ生シ或ハ常
ニ喜ンテ嘔吐シ或ハ重キ搐搦ヲ荒及此
唯慘酷可憐ノ状ニシテ生活スルノ

○或ハ前説ノ一二ノ患症時ニ由テ輕寛
レ或ハ一暫ク休止スルヲアリト雖モ物
テ此病ヲ堪ヘ易キホトニ輕寛スルヲ能
スト知レ○其頭ヲ運動スルヲ能ハサル
者ハ最モ險重ナリ

○其水液
此ヲ以テ

○此病ニテ速ニ死レ或ハ年ヲ経テ死スル
者ノ屍ヲ解剖レテ考ルニ頭蓋骨内ニ
於テ幼年ヨリ漸次ニ多ク聚リ其諸骨
ノ強固ナルヲ弛弱スルホドニ久シク充張
スルヲ明ラカナリ故ニ此病ヲ内部ノ頭水

ト名ク○其水通例脳實質ニ留滞ス此
レ脳髓上下左右ニ入カル會通ノ所ナリ

(註) ホテルキルレ名ウツツシ名ノ書ニ此種

類ノ水腫ノ發法ヲ詳ニ記載セリ其
説ニ此水腫ハ血ニ因テ発スル水腫ト

其症状同レト云リ○ホテルキルレ上曰ク

此症三歳以前ノ兒ハ稀ニシテ多クハ五
歳ヨリ十歳マテノ兒或ハ一人十七歳ヨリ十
九歳ノ間ニ発スルヲ見テ其水二十四
或ハ三十二吋許脳ノ腫脹質ノ下ニ在リト

○種々

○物テ壯健ニ見ユル小兒此病ヲ發シ
 十四日ノ中ニ死スル者アリ彼此各部
 疼痛シ連綿ト断（サル）重キ頭痛
 ヲ發シ（胃ノ）諸症アル此病ヲ發スル
 前兆ナリ○ヒユク（人）ウツツシク此病ニ
 標ナラスレテ大人ニ發スル者ヲ歴驗セ
 リト云ヘリ○又此病外傷ニ由テ發スル
 ノ、ニナラス内因ニテ發スルモノ多クト
 ○或ハ其水腦中ニ在テ一別ニ一囊中
 ニモナリ或ハ其水腦（上頂）ニ在ルモノアリ或

○包蓄スル

○其幼メハ

ハコレガ腦ト薄腦膜トノ間ニ在ルモノアリ或
 ハ薄腦膜ト厚腦膜トノ間ニアルモノアリ但
 シト如此甚ク罕ナリ然レ共ニ其水腦
 竇實ニ潴留シ此ヨリ其出路ヲ諸所ニ
 求ルナリ○其水多クハ清澄ナリ或ハ此ニ
 血ヲ交ヘ或ハ其底ニ膿ヲ交ヘ或ハ惡臭
 アリ○其水九十六度ヨリ七百六十八度マテ
 ノ者ヲ見タリ又一幼兒ニ於テ二母貝三百
 度ノ水アルヲ見タリ大氏小兒ハ年長。比
 スレハ水液尤モ過多ナリ○設令其水

○量モ其志ニ由テナク

○セル患
者ニ

〇ハク

〇ノ厚サ

幾許イカサト 寛者少ナリ凡此ヲ以テ強ク脳ヲ侵襲スイカサト 〇并ニ脳ノ下面ヨリ起テ諸部ヲ繞ル所ノ神經ヲ頭蓋骨ニ向テ壓迫スイカサト 一キ一ト明ラカナリ 〇脳体ノ上部ホトシタゲ 只通例ニ指横徑或ハ三指横徑アリ然ルニ今其壓迫セラレニ由テ僅カニ小刀脊ホドニ薄クナリ甚レキニ至テハヨ等常ノ紙ホドニナリテ腸状ノ一曲折モナキニ至ルモノアリ 〇或ハ其水脳ノ上頂ニ在ル片ハ脳カ甚ク狭窄ナル間ニ竹拍イカサト 迫セラレテ壓縮シ并ニ硬クナルナリ 〇或ハ脳甚ク柔軟ニナリ或ハ脊髓ノ上部マテ消化スル者アリ 〇或ハ小兒ニ歳或ハ三歳ヲ過サレ水頭イカサト 中ニ聚ラサル者アリ此症ハ如此年齡マテ漸次ニ增長シ而後乃盈滿シテ瀦留スルナリ 〇或ハ頭部ヨ等常ニ比スレハ稍廣カル者アリ或ハ此病ノ諸症ヲ速カニ發セシテ頭部イカサト 洞大ニナル者アリ如此小兒ハ佝僂病アルナリコレ多クハ痴呆ニナリ身体盈脹シ水腫杯ナリ此ニ兼ル

〇其水

〇其水

クナルナリ 〇或ハ脳甚ク柔軟ニナリ或ハ脊髓ノ上部マテ消化スル者アリ 〇或ハ小兒ニ歳或ハ三歳ヲ過サレ水頭イカサト 中ニ聚ラサル者アリ此症ハ如此年齡マテ漸次ニ增長シ而後乃盈滿シテ瀦留スルナリ 〇或ハ頭部ヨ等常ニ比スレハ稍廣カル者アリ或ハ此病ノ諸症ヲ速カニ發セシテ頭部イカサト 洞大ニナル者アリ如此小兒ハ佝僂病アルナリコレ多クハ痴呆ニナリ身体盈脹シ水腫杯ナリ此ニ兼ル

フシケセツト

風雲堂

○諸部

諸症頭水ノ病ノ如シ或ハ遂ニ頭水ヲ
発スル者アリ○或ハ如此病アル小兒ニ
於テ殊ニ諸骨ヲ養フテ過多ニシテ
此ニ由テ頭ノ大ナルモノアリ此ニ總テ肢體
骨様共ニ皆盈脹スルナリ
○大人ニ於テ水多ク腦中ニ壞ルモノアリ
然レ此ニ由テ頭蓋廣闊ナルナレコレ
其骨強固ナルニ由テコレヲ防クニナリ
故ニ其水モ亦夥ク留滯スルナレ然
凡此病ハ危險ニ至ルナリ是レ其水ヲ

以テ入玉腦并ニ神經ヲ壓迫シテ壅塞
シ患者眠ルト多ク精神冒昧麻痺
不遂卒厥ヲ發シテク急卒ニ死スル
アレハナリ

(註) シムメルマン曰ク一田カ子ノ学業ニ

沈思シ精神恍惚痴疾ノ病ヲ發ス
コレ腦ト腦膜ノ間ニ百支許ノ水聚
満ス一医術ヲ以テ其水ヲ泻スル
兩回精神故ニ復セリ。尔後其藥劑
効ナクシテ死セリ

此凡

○初生児
ニ於テ

○又水液腦ニ聚リ此ニ險重ナル異常
ノ症ヲ兼ル者^{ニ種}アリ其一ハ一箇ノ軟柔ナ
ル突腫ヲ^ハ頭ノ一側面ト^ハ項窩
ニ生ス其大小一ナラス或ハ卵ノ如ク或ハ兒頭
大ノ如ク且ツ此ヨリモ大ナリ此腫内ニ皆腦
ノ片塊充テ其片塊大小種々相
交リ充テ其腫状宛モ囊袋ノ如ク其
内自ラ脳竇實ト相通ス^コ己其脆弱
ナル頭蓋骨ニ大小ノ孔^ハ開テ^ハ但
此腫瘍ヲ截リ開ケ却テ其死ヲ促ス

○腫瘍ノ
在所ノ

○ヲ以テ

ヘレ^レ右ノ諸症ヲ以テ考レハ其初メ水液
脳竇ニ聚リ此^ノ後頭蓋骨^トナルハ
キ脆弱ナル膜ノ最モ薄キ所ヨリ腦
ノ片塊ヲ外部ニ搾出スル^ト明白ナリ
此症ハ多クハ速ニ死スルナリ然レ其腫甚
名增長セサル者ハ名^ニ蒼言^ノフランス^ノ國^ノ外
科^ニシテ^ハ人ノ經驗術^ニ由テ全治ス^ル
故ニ内部ノ頭水病ト^ハ一^ニ其頭ノ
全圍遍ク同様ニ腫脹シ殊ニ
イニ夕初共及ナル者ハ人皆コレヲ復治ス

○巨大ニ

○ヲ兩回施ス

○内寄

○世人

此ノ良術ヲ^{コトナカ}冀フナリ○其奈其症^{コト}前
 説ノ病性ト異ナラス唯其所在ヲ^{コト}異ニス
 ルノミ此ハ脊椎ノ數所殊ニ^{コト}腰椎或ハ
 肛門ニ近キ^{コト}處ニ^{コト}腫瘍ヲ生ス其他皆
 部ニ^{コト}面日テ生スルナシ其腫按セハ柔
 ニシテ陷退ス故ニ其内水液アルナリ知ル
 又其腫ヨリ以下ノ部ハ皆麻痺ヲ^{コト}兼又且
 ツ此症多ク脚勾屈シ或ハ^{コト}異常ニ長
 育ス又此病ハ頭部ノ大ナル^{コト}畸^{コト}形ヲ^{コト}兼
 又但シ其脊椎ノ腫瘍潰破スルハ其

中脊髓
 周圍

頭勿心チ縮小ス然凡其潰破ノ口ヲ閉
 塞スルハ其頭復々巨大ニ^{コト}ナルナリ○此
 脊椎ノ腫瘍ヲ^{コト}開破スルハ卒ニ死スルナ
 リ○解剖術ニ由テ此症ヲ考^{コト}究スルハ
 甚々明白ナリ其故ハ最幼^{コト}腦ノ上部
 ノ^{コト}竇或ハ兩側ノ^{コト}竇ニ水液^{コト}聚滿シ此
 ガ通例^{コト}開達セル道路ニ^{コト}循^{コト}ツテ脊椎
 ニ^{コト}壓行^{コト}滲入シ而メ其腫瘍ヲ^{コト}度^{コト}不^{コト}部
 ニ^{コト}於テ脊椎ヲ^{コト}包^{コト}容^{コト}ス^{コト}厚膜ガ外部ニ
 張出スルナリ此時ニ^{コト}於テ其腫瘍ニ^{コト}近

○此ニ加ルニ素
ヨリ

接スル椎骨カ其刺状ノ尖起ノ處ヨリ
破裂スコノ尖起ナルモノハ 椎骨皆 大人ニ
於テ 皆 備セリ胎見或ハ初生兒ハ
軟骨或ハ未多形ニ成サス故ニ水液ノ
カヲノミニテ如此破裂シ或ハ脊骨ニ患
害アルニ因ル此故ニ 其 骸液 正 長育スルヲイ
ヨク 障碍スルナリト 是以テ此病
ヲ脊椎破裂病ト名ク如此病性ナルコト
ニ此症発見スルヲ輕淺ニシテ其所在モ
肛門ニ近中所ニ生スルハコレ眞ノ脊椎

○其初メ

ニ非ルコトニ 則チ尾髓骨 前説ノ症ノ如クニ
ヨク 恢復スルコトアルヘシ然レコレカ腰推
ニ生スルモノハ 恢復シ易カラズ是レ唯
水液ノミヨ 壓迫ニテ此症ヲ脊骨ニ
発スヘカラサレハナリ又コレハ水液カ腰推
骨ニ覆リ而後頭部ニ上行スルモノナ
ルヘシ

○右説ク所ノ諸症ハ其起因ニ其
所在皆頭蓋骨内ニアルノ病ナリ然
レ又外部ノ頭水ト名ル症アリ此ハ水液

〇其水

〇其他頭

〇頭部

頭蓋骨ト皮トノ間ニ裹ルナリコシ多ク
 〇頭部ノ敷所ニ轉後シト一裹ルナリ
 〇此水腫ハ大人ニ於テ總身ノ皮下
 下ニ一液流シ面部モ亦腫起ス〇
 頭部ニコロス丹毒ヲ兼スルハ此種類ノ
 水腫ヲ兼ス反ス痘瘡或ハ歯痛〇冒
 寒傷冷毒モ亦同ク此水腫ヲ兼ス然
 氏如此諸症ハ多クハ頭面ノ皮或ハ頭
 髪友アル所々々腫テ此病ノ如キ甚シカラ
 ナルナリ此病水液留滞シテ一腫脹

〇外部

スルニハ此ヲ外部ノ頭水ト名ク〇水液ガ
 頭蓋ノ膜質ノ膜ト頭蓋骨トノ間
 ニ留滞スルアリ或ハ頭蓋骨ト頭蓋骨
 膜トノ間ニ留滞スルアリ如此志ハ其腫必
 ス沈ンテ底ニアリ且ツコレヲ按シテ増減ス
 ルト火ナシ〇高明圓孰ノ先哲并ニ老
 練セル諸医家モ此頭水ノ種類ヲ見
 ル者ナシ故ニ此志甚ク罕ナルヲ知ルニ
 〇或ハ此頭水ニ内部ノ頭水ヲ兼ル者
 アリコレ内部ノ頭水ヨリ起ス反ス一明ナリ

クパイ
○機開モ

○諸

○最モ

○其空間ニ

○外部ノ頭水ハ罕ナリトイハレ猶老人ハ
コレヲ患ヒ易キト小兒ノ如シ

○頭部ニ如此水液聚ルル猶身體各

部ニ聚ルト同レ其故ハ腦ノ空ニ間實

モ亦他ノ諸腔間ノ如ク身體中ノ凝体

ノ間所ニシテ其大小一ナラス皆其相附

着シ生合スルヲナク且ツ常ニ其乾燥ヲ

防クカ為ニ精微ニシテ水気又含ル蒸

気ヲ日常血管ヨリノ蒸ス発ス

ヲ以テ其部然レハ此蒸気幾許精

微ナリ凡テ日夜一須臾モ止ス蒸ハ

発スルユエニ自ラ其所ニ溜リテ

コレカ數日或ハ數月ノ中ニ大ニ聚ク

留瀦シ終ニ其空間ニ充滿スヘキナ

リ故ニ如此患心害ヲ防クカト

為ニ造物者ノ奇巧ニ由テ其部ニ所

謂ル吸收管ナル者數ク具エテ其

蒸溜ヲ吸收シテ靜脈ノ血中ニ

運輸スルナリ解瀉靜脈ニテ吸收但シ其

吸收セル餘殘ノ津液ハ其多

○部誌

風雲堂

風雲堂

○輸

少ニ一適シテ常ニ其部ノ滋润滑利
 ニ用ユルナリ又体中諸般ノ剩餘
 一老敗ノ液ハ各々コレニ具ル道路
 ヨリ體外ニ排出ス○則チ如此諸蒸
 気ホトヨク吸收シテ運○セサルナハ勿心チ
 蒸溜シテ水液トナリ其部ニ滞留スコレ
 通例水腫ノ起原ニシテ各々其所在ニ
 從テ水腫ヲ發スルナリ○故ニ水腫ノ現
 因ハル今現在水腫ヲ生ス蒸気管ト蒸気
 ノ多少ト并ニ蒸気ノ性ト吸收管トニ

○ナルモ

ニ係ルナリ然レハ
 ト管ト兩ツナカラ患害アルナハ其病
 最モ險悪ナリ——水腫ノ久ク治セ
 サルモノ通例皆是レナリ○若其内部
 ノ蒸気管平常ノ度ヨリハ蒸気ヲ
 多ク漏泄スルホドニ軟弱弛開スルナ
 蒸気更ニ過多ナリ殊ニ血ノ稀薄○
 ノ甚タシコレ表發ノ蒸気久ク壅遏スルニ
 因リ或ハ氣中ニ濕気多クシテ皮表ノ吸
 收管ヨリ吸收スニ由リ或ハ水液多ク存良

物飲液過多ナルニ因リ或ハコノ兩件ヲ兼
ルニ由テ血ノ稀薄ヲ為スナリ○胎児ニ於
テハ其起因他ナシ唯血脉壓迫セラレテ
血が血脉ヲ運行スルニ甚ク遅緩ニナリ
尚甚キニ至テ血力滯止スルニ幾シ此
ニ由テ血脉末梢ノ蒸気孔弛開スルニ
ナラス全身ノ血宛モ刺絡セル血ヲ盆ニ
靜定シテ変シテ水トナルモノ、如クナル
ナリ○其蒸気モ亦粘稠ニシテ吸收管
ノ微細ノ孔ロニ——通シ難シ又此管

或ハ其蒸気ニ

○弛解膨腫
セル
○セサル

モ吸收スルノ精力脱耗ニ壓搾セラレ
或ハ自ラ破裂ス然レ此破裂シメス
亦罕ナリ其故ハ前説ノ病ハ其腫脹セル
部ノ精力脱缺スルノ多キホドイヨク多ク
——增長シ且ツ久ク執留ス然レ皮膚
并ニ内部ノ諸器モ稍平等ニ收固合着
際ハ吸收管孔開ク或ハ其蒸気
ヲ吸收スルノ機能ナク其蒸気モ皮膚
所ニ留滞スルナリ故ニ如此トハ諸般
ノ水腫ニ就テ意ヲ注クニキナリ

○効ナキ

○所謂

○水腫ヲ治スルニ通例肝要九八第一
 其瀦留スル水液ヲ早ク通泄シ一第
 二ニ水気ノ新タニ増スヘキ諸因ヲ除ク
 ナリ○其第一ニ示ス所ハ通例大小便ヲ
 増進スル甘菜劑ニ由テ其過多ノ水液
 ヲ通泄スナリ但シ其症ニ由テ芫菁日或ハ
 適當ナル刺截法或ハ其他速ニ其部ヨ
 リ水液ヲ通泄スル穿孔孔法ニ由テ治ス○
 所謂第二ニ示ス所ハ精ク意思ヲ用ヒ殊ニ
 其甚シク腫脹セル所ヲ收縮シ或ハ強壯

○飲食起居

○キナリ

スル法方ヲ施スナリ

○右ノ通例ノ治法ハ前ニ記ス如ク頭水

ノ初發ニ勉メテ施スヘ○其劑ハアレクキアリ

劑ニシテ^{第三篇ニ出ツ}ニ大黃或ハ~~紫葳~~葶藶ヲ加ヘ

或ハアレクキアリユムレニキヒユム^{痘房四限ニセイリユ}

ピユム^{コサリユムソシキヒユム}方ヲ加ヘ舍利ノ稠ト

為シ用ユ○又其母或ハ乳母ニ下劑ヲ用ヒ

テ其見ヲ下利セシムヘシ○其見^{年長}

セルモノハ右ノ劑中ニ數碎ノゼーアイウイン

ヲ加用○他^{チホ}ニ勝リテ速ニ小便或ハ大

○ユレハ

便ヲ通利シ或^{其水液ヲ}高便ヨリ共ニ通他ス然
氏セーアイウインハ嘔吐ヲ度シ易キユニ此
ヲ発スルナキヤウニ意ヲ用ユニ此嘔吐ハ
他病ニ於テハ甚ク治功アリ此病ニ於テモ
少許^ハ度スルハ悪シカラズ然氏大ニ嘔吐シ
且ツ長ク連綿トシテ止サルハ種々ノ患
害ヲ発スコレ既ニ其腦壓^作セラレガエ
エニ其劇シク且ツ連綿タル嘔吐ニ由テ
イヨク其壓^作ヲ增長スレハナリ
○其水液頭蓋骨外ニ^ニ留スル^ニ甚

夕^罕ナリト雖モ若シ此ヲ発セハ項窩ノ
下ヲ^ハ堅ニ^ニ截テ速ニ^ハ適^宜ク其水ヲ^ハ泄ス
一ニ其創口ハ棉撒絲ニ^ニ膿ヲ成ス軟膏
ヲ塗リ貼シテ適宜キ時マテ瘡スナク
潰破シ置ク^ハ如此為ス中ニ石灰水ニ酒
火酒或ハ竜腦^精酒等少許加ヘテ勉メテ
其頭ヲ浸洗ス^ハ又芫菁膏ヲ貼シ
テ此^ハ^ハ良効アリ
○其水頭蓋骨内ニ^ニ聚滿ス^ル^ハ其水
ノ留^ル所ヲ^ハ截^ス或^ハ其他穿孔法

○部ヨリ
○總

ヲ施セバ徒ニ死ヲ促スノミ故ニ此ヲ禁ホス
ヘシ世元著ハ此志ニ称用セリ殊ニズウイテシ
經驗セリ物惣テ内部ノ頭水ト同一種ナル
諸志ニ施レテ治功ヲ得ト云リ其方
エムプラストメリロート硬膏月名新局方九支、廿元著月
一支右合シ小児ノ頭髮ヲ剃リテ貼ス但
毎日二回或ハ三四回モ其膏ヲ剥テ頭ヲ摩
擦スヘシ此ノ其蒸氣ヲ散スル為ナリ此ニ
由テ凡テ内部ニ潜伏内流スル毒母アリテ
眼目、胸中、并ニ神經質ニ侵入セルモノヲ

膏

○預メ

速ニヨク外部へ散出スルナリ

○又頭部ハ其水液減スト雖モ他ノ

軟柔ナル諸部ノ如クニ其水減スルニ

從テ自ラ收固縮小シ難キト云々曰クヲ用

エヘシ他ノ軟柔ナル諸部ハ水氣ニテ

腫脹ストイヘ凡其自己ノ收縮ノ精力速

カニ脱失セサル。比スレハ此腫ハ甚々治

シ難キト明白ナリ。此腫ハ頭蓋ノ諸

骨張出シテ漸ク硬クナルエ正ニ其骨

狭窄ニテ收縮スルヲ能ハサルナリ故ニ

○間膜ノ初メニ
弛延セルモノカ
短縮スルホト
ヨリ外ニ

○其故ハ

○故ニ此ニ

頭蓋ノ諸骨離解スル時一維

一腦ヲ容ルノ度ヨリハ大ニ廣潤ナルホ

ドニ甚レク張出スルニ至リテハ諸般

ノ療法治術モ益ナク又常ニ水滯留

スル空間ノ處アルニ

其水増益セスト雖モ猶腦ヲ壓定シ具

損害スヘキニ足ル〇故言如此増長スルニ至

リテハ頭蓋骨ノ常ニ

空間ニ充実スルホドニ腦力大

キク盈長シテ其自己ノ性力ニテ蓄留セ

ル水液ヲ排泄スルホドニハ内系ニテ十分

ニ其水液ヲ驅除スルヲ能ハスト知ルヘシ

〇唯此病ノ初發ニ於テハ外部ノ頭水ノ

輕淺ナルモノヲ治スルノ系創ヲ用テ治ス

ルヲアリ此ハ思且複ノ壓布ヲ火酒或ハ

火酒ト石炭水ヲ合スルモノ或ハ如此類ニ

浸シ其腫ニ貼シ通例ノ頭帽ヲ以テ

此ヲ持適宜ク壓搾スルナリ

此法ホリケルハ經驗セリ其夜ニ

云ク此症ニ於テ十二時モ昏睡スルモノハ

〇此病

〇其

〇驅逐

〇且ツ此
ヲ以テ

〇患者

ニ非レハ治スルヲ能ハス然レハ如此

此ニ由テ

コレヲ驚動セシムルニナク唯一時半毎ニ
侵刺衝動スルヲ以テ小兒ヲ有覺
セシム其睡眠ノ中ニ乳ヲ飲シメ又浣
腸法ヲ施シテ常ニヨク大便ヲ通セシム
此ニ由テ此見ヲ全治セリトコレ脊椎ニ
水腫アリテ生レ己が大ナラス且ツ肛門ニ
近キ所ニ生スル志ノナラス又頭蓋
尺ク張腫シテ所謂内部ノ頭水ナル者
モ良効アリト見ユト然レコレ唯此病
ノ初發ニ治スヘキナリ故ニ預メ初發

コレ見ル

ノ候ニ急ク用ルル肝要ナリ則チ小兒直
立スル中ハ煩苦シテ安カラス又平常ニ異
リテ睡ルル多ク頭蓋ノ骨縫弛死
スル等ナリ然レハ此病速ニ死セシテ甚
シク增長スルニ至ル者希ナラサルヲ以テ
早クコレヲ治スヘキトニ思ヒシヲ致スヘシ

小兒頭水篇、第二十五終

