



人

題言一章

頭腫并頭壓迹二

頭骨縫地閉頭水腦破腫弟三

脊椎破裂弟四

外部神具病并唇合着弟五

免唇弟六

免唇治法弟七

舌并咽喉病八

胸病九

臍病弟十

臍諸病腫癆少腹腫瘍弟十一

鼠鼯陰囊破腫弟十二

陰囊尿管陰莖病患弟十三

女兒陰門生合肛門合着弟十四

肢節并皮膚病弟十五止

小兒初生患并外療法篇弟世

7

人

1、

子

小兒幼生患症并外療法篇

カールヨセフウーハニ著

千七百七十三年イフシフ地發行

○題言 第一章

幼生兒險重ノ諸患忘レテ多シ  
氏トシテ其危篤ヲ免レテ幸ニ成長  
シ天年ヲ終ル者亦多シ

○小兒母体ニアル時害ヲ受ル  
小兒病ニ就テ大關係ノ厄ニシテ種  
々多端勝下敷一カメシ

○尤モ



39-8070

〇母体ニ在テ子宮ノ形質ニ由リ或ハ胞衣ノ固着其他種々ノ古又件<sup>事</sup>見ニ患志ヲ發シ又母体<sup>中</sup>ノ種々外傷ノ起因ヨリ生兒育セス或ハ墮胎スルヲアリ或ハ胎帯<sup>系</sup>ニ胞衣ノ患志ヨリ胎兒ニ種々ノ害ヲ成シ危篤ヲ生スルヲアリビニルタリ<sup>人</sup>ノ書ニ著スルカ如シ〇尚又臨産ノ時分娩<sup>ニ</sup>難ク常例ニ反ス古又件ニ由テ一少兒危篤ニ至ルヲアリ

〇小兒右ノ危篤ナル諸因ヲ免レテ分娩後生育スレ<sup>母</sup>ノ病<sup>ノ</sup>稟テ患志ヲ發スル者アリ此ヲ遺傳病<sup>ト</sup>名ク則チ梅毒<sup>毒</sup>痛風<sup>等</sup>如シ〇又子宮ニ在ル時ニ小兒ノ受ル<sup>ル</sup>病ヲ胎病ト名ク〇右ノ起因ヨリ甚病毒小兒ノ内藏中或ハ諸血液ニ潜伏シテ生レテ後コレカ<sup>胎</sup>皮<sup>ノ</sup>見スルヲアリ即チ<sup>胎</sup>毒ヨリ生ル患志或ハ黃疸<sup>或ハ</sup>粘痰<sup>アル</sup>喘息<sup>等</sup>初生兒ニ著スルカ

如し但し如此常々身体各部ノ形質  
悪ク或ハ通例常度ノ形ニ異ナル所  
アルト多ク

註 黃疸初生児ニ發ス者ハ粘液

胆液ヲ十二指腸ニ通泄スル所ノ

總管ノ孔ニ塞塞シテ發スル病

ニ則チハエツテリ名ハソコウテン同

ブルルノ名ノ書ニ詳説セリ又名

モルガグニ名ノ書ニ曰ク黃疸初生児

ニ發スルハ其臍帶ヲ結フニ由テ血ノ

○運行

運行循迴渝變シ臍帶中ニ血

留滞シ此臍肝肝ニテ障止スルニ因

ルトレフレット名亦此後奉後レテ白ク

臍帶ヲ結フニ就テハ臍帶靜脈ノ

血ヲ外泄スル此ハ臍帶ヲ徐々

押シテ血ヲ其截口ノ方ニ輸リ出

シ結フヘシト

○頭腫并頭ノ壓迫、第二書

此病ノ第一種ハ頭ノ軟ナル部即チ頭蓋

外ノ皮肉ニ在リ第一種ハ頭蓋

○大吟

○障遮セ  
ラレテ

○血

ト名ク○此腫<sup>ハ</sup>額<sup>ノ</sup>或後頭ニ<sup>モ</sup>散<sup>ル</sup>面  
 部ニ生<sup>ル</sup>者<sup>ハ</sup>罕<sup>ナ</sup>リ此ハ小兒ノ頭<sup>ノ</sup>久<sup>ク</sup>  
 體<sup>ノ</sup>孟<sup>ノ</sup>孔中ニ懸<sup>テ</sup>留<sup>ル</sup>スルユ工ニ頭蓋外  
 ニ循行<sup>ス</sup>ル靜脈ノ血其骨ニ壓<sup>テ</sup>迫<sup>ル</sup>○復  
 行<sup>ス</sup>テ<sup>ハ</sup>融<sup>ス</sup>分<sup>シ</sup>自<sup>ラ</sup>其部ニ留<sup>ル</sup>積<sup>シ</sup>其裏  
 滿<sup>ル</sup>ノ血或ハ皮下ノ腺ニ溢<sup>シ</sup>出<sup>ル</sup>或ハ其  
 部ノ細<sup>ク</sup>絡<sup>ニ</sup>多<sup>ク</sup>量<sup>ノ</sup>血留<sup>ル</sup>積<sup>シ</sup>較<sup>シ</sup>著<sup>ク</sup>  
 ナル腫瘍ヲ<sup>モ</sup>發<sup>シ</sup>レ<sup>ル</sup>膨<sup>張</sup>スルナリ  
 コレ方<sup>ハ</sup>婉<sup>ク</sup>時<sup>ハ</sup>小兒ノ頭<sup>ノ</sup>體<sup>ノ</sup>孟<sup>ノ</sup>孔ニア  
 レトモ<sup>ハ</sup>既<sup>ニ</sup>陰<sup>ノ</sup>門ヨリ<sup>ハ</sup>腫<sup>ノ</sup>見<sup>ル</sup>モナリ

腫瘍

○レフ<sup>レ</sup>ツト名<sup>ハ</sup>此腫瘍小兒ノ後頭ニ<sup>モ</sup>散<sup>ル</sup>  
 スルハ死<sup>ニ</sup>志<sup>ト</sup>スレ<sup>ル</sup>凡<sup>ハ</sup>予<sup>ハ</sup>  
 必<sup>ズ</sup>ス危<sup>キ</sup>ナ<sup>リ</sup>十<sup>ニ</sup>レフ<sup>レ</sup>ツト名<sup>ハ</sup>心  
 クハ此腫ト頭水病即チ腦ノ破<sup>レ</sup>腫  
 ト混<sup>雜</sup>シテ死<sup>ニ</sup>志<sup>ト</sup>ス<sup>ル</sup>ナ<sup>ル</sup>ヘシ又此  
 腫瘍甚<sup>ク</sup>大<sup>ナ</sup>ラサルモノハ系<sup>ノ</sup>刺<sup>シ</sup>法<sup>ヲ</sup>方  
 シ用<sup>ル</sup>ルニ及<sup>ハ</sup>ズコレ一箇ノ<sup>ハ</sup>隔<sup>ノ</sup>皮<sup>ノ</sup>傷<sup>ノ</sup>種  
 類ニ<sup>シ</sup>テ小兒ニ於<sup>テ</sup>ハ甚<sup>ク</sup>消<sup>ス</sup>散<sup>シ</sup>易<sup>ク</sup>  
 通<sup>ル</sup>例<sup>ハ</sup>自<sup>ラ</sup>然<sup>ニ</sup>ニ<sup>シ</sup>治<sup>ス</sup>レ<sup>ル</sup>ハナリ○凡<sup>ハ</sup>其  
 腫甚<sup>ク</sup>大<sup>ナ</sup>ル者ハ疏<sup>ク</sup>解<sup>シ</sup>テ<sup>ハ</sup>輕<sup>ク</sup>強<sup>ク</sup>健<sup>ニ</sup>

風寒

スル本草草ヲ稀淡丸醋味ヲ多ク  
ル酒ニ煮テ茶葉系トシ此ヲ外用シテ  
速カニ扶ケ治ス

註

峻烈丸酒ハ小兒ノ体ニ施シテ

宜シカラズ稀淡丸ヲ佳トス

但シ右ノ茶葉系ハ冷ナルハ惡シ温ナキ

良トス小兒ノ脆弱丸体ハ此ニ由テ幾

多クノ害ヲ為レ大ニ危篤ヲ惹スルヲア

レハナリ○フランシ國ニテハ此症ニ苦薔薇

油ニ酒ヲ加テ外用ス又清水ニ海塩ヲ

加テ外用シテ近來ノ医家稱譽セリ

○我國ニテハ海塩或ハ硝石ヲ淡キ

酒或ハ稀キ麦酒ニ溶化シ外用ス

或ハ愈創木ヲ單用シ或ハ石鹽ヲ此

ニ加テ○然レ予按スルニ此腫輕淺

ナルハ右ノ劑ニテ治スルヲ得ヘシ(註一)

○若シ此腫瘍甚ク大ナル者アリ此

罕ナリト雖モ其血脉破裂裂レテ其血

滯留シ膨脹スルナリ此症ハ截破ニテ

其滯留ノ血ヲ外泄シ治ス

良  
口潰瘍

○スメルリイ名ハ此腫瘍ノ種類ヲ  
膿腫ノ中ニ算入セリコレ大ニ誤レリト  
言フヘシ其故ハ此腫瘍ヨリ膿ヲ成ス  
トナケレハナリ然レ此ヨリ汚穢トナリ  
并ニ腐肉滑瘡トナレ此心レナキニ形ス  
故ニ此腫ヲ早ク是破セサレハ小兒此  
ニ由テ死スルノ理ナシト云フヘカラズ即チ  
スメルリイ名ハ此ノ如キ此ツ言フナリ  
註ノ一 セニ子ルナス名ノ書ニ曰ク一 薔  
薇水ニ薔子白ヲ加シ施シ或ハ洗滌

性ノ葉草ニ蜜ヲ加シ糊劑トシ施セ  
リ此氏大氏此腫ヲ消散スルニハ薔  
子白ニテ足レリ

註 此腫ヨリ膿腫トナルト一ウリセアウ  
名ノ書ニ出ツ

○但シ此腫瘍ヲ截断クニ就テハ先ツ  
ヨク此腫瘍ノ性タルヲ明白ニ知テ其  
術ヲ施スヘシ其故ハ頭水或ハ腦ノ  
破腫ヲ認リ認メテ此腫ナリトシ輕卒  
ニ截破ルナキヤウニ精密ニ急ニ用



ルカ為ナリ若シ誤テ此ヲ截破ス死ス  
則チススルイ人ノ書ニ「右ノ腮破腫  
ヲ截破リ夥ク出血シテ死スル由者ヲ  
記セリ」

○此腫瘍ヲ指ニテ按シ驗ルニ其腫  
殊ニ其周邊ニ於テ血ノ流動スルヲ覺

ニ母貝透セルヤウニ解知ルナリ然レモ  
其母貝透ニ據テセル

ニ於テ後ツ所ト参考シテ并別スヘシ

○自ラ

○セル腮破腫  
ハ此次ニ

○面部ニ

○幼生児ノ面部キヤウケニキニ見ユルモノ  
アリコレフレット名ノ所謂ルル崑崙ハハ奴ノ  
如ク見ユル小児ナリ如此ハ淡泊ノ蒲桃  
酒ニ漬漬ノ効ニサ本草ヲ投シ者ニテ  
此ヲ綿布ヲ浸シコレヲ  
口ト白異ヲ露ハスノミニシテ掩ヒ貼ス

○面部ノ中  
殊ニ眼胞  
弛軟ニシテ浮腫スルモノハ血カ此内ニ留  
滞スルニ由テ如此ナルト多ク此ニ由テ

○ローンホイセン

名ノ

○ニ解レテ

Tang.  
hex boom.

人  
ハ  
從  
女  
ク  
膿  
腫  
ヲ  
生  
ス  
ル  
ナ  
リ

○產科ニ通例用ル器械  
ボームノ道具并ニタング  
レハ此ヲ用ルニ由テ小兒  
少シク溢出シ青色ノ斑ヲ  
此ハ自然ニ消散ス如此  
ノ產科ヨク使フハ少シモ  
ナシ是レ未タ分娩セサル  
ハ柔撓ナレハ此為ニテ換  
令此為ヲ用ヒ并ニ難產等  
ニテ小兒

○中ニ其四  
骨之レク留  
腐蝕ス

ヲ箱作シ骨陷凹ストイ  
カニ故ニ復スルナリ  
云ク右ノ如キ者又ニテ  
壓土作シ如キ者後頭蓋骨ノ孔  
ス膿腫トナリ一外科此ヲ  
其骨ノ一片外出セリ

○分娩ニ就テ小兒ノ頭蓋  
尖形ニナルホドニ壓土作  
ナリ此ニ由テ分娩モ亦為  
難產ニ於テハコレカ殊ニ甚  
タシクニテ

○頭ヲ圍繞  
ヲコレヲ壓  
スユエナリト

頭ノ形醜キ者アリ但シ如此者モ日ヲ  
經テ大氏自然ニヨリ常ノ形トナルナリ  
然レレシツト人ノ欲<sup>ヨク</sup>常ノ形ニ復セサルモノ  
ハ大氣ガ○然氏生活体ノ見ニ含タル流<sup>流</sup>張  
ノ精力ニ由リ腦ノ動脈<sup>搏動</sup>ニ強<sup>強</sup>腦膜ノ  
執力ニ由リテ<sup>其</sup>壓窄ノ部ヲ再セ起張シ  
其頭ヲシテ常ノ形ニ復セシムルナリ  
○<sup>往</sup>但シ右ノ志生涯常ノ形ニ復セガ  
ル者アリ

○小兒右ノ志アル中ハ腦<sup>腦</sup>壓定ニ由テ

レバク嘔吐ヲ禁ムシ又頭蓋骨張出シ  
易シコレ血力大ヒニ憤激シテ頭部へ  
壓逐スレハナリ

○右ノ志ヲ治スルハ手ヲ以テ其頭ヲ徐々ニ  
按摩シ或ハ繃帶ヲ施スヘシコノ繃帶ハ  
三稜<sup>三稜</sup>様ノ頭被<sup>コウフレセア</sup>ト名ク然氏此  
縛<sup>縛</sup>帯ニテ甚シク緊<sup>緊</sup>札<sup>札</sup>シテ一<sup>一</sup>壓<sup>壓</sup>土<sup>土</sup>擦<sup>擦</sup>スル  
トナキヤウニ惣テ戒<sup>戒</sup>慎<sup>慎</sup>スヘシ○凡ソ產婦  
ハ物テ細<sup>細</sup>慎<sup>慎</sup>ヲ加ヘス小兒ノ頭ヲ常ノ形ニ  
復センカ<sup>カ</sup>敷<sup>敷</sup>ノ縛<sup>縛</sup>帯<sup>帯</sup>ノ卷<sup>卷</sup>尾<sup>尾</sup>キヤウ<sup>キヤウ</sup>西<sup>西</sup>心<sup>心</sup>クシテ

頭蓋ヲ不平ニ壓搾シテ平等ニシマラ  
ス此ヨリ其兒搐搦ヲ發シ或ハ他ノ病ヲ  
發スルアリ

(注) アエギ子タ名人曰ク不練ノ産婦初  
生兒ノ頭ヲ縛シ壓搾スニ由テ頭  
水ヲ發スル者アリト

○名譽アルレシ名人ロンドン國ノ死者ノ記  
録ヲ見ルニ小兒頭壓搾セルヲ速カニ常  
形ニ復スルノ療法ヲ施サルニ由テ其兒  
搐搦ヲ發シ死スル者アルヲ記セリト○然

○其術

レ氏  
其人カ晩ニ就テ其頭  
ヲ壓搾セルモノハ初生兒ニ於テハ搐搦  
ヲ發スル一妙ナク又癩スト雖モ甚ク  
危篤ナラス或ル正直ニシテ虚偽ナキ人引  
ニ語テ曰ク一産科。甚ク精巧練熟シ  
雖産アリ見ヲ善心ナク人カ晩スル  
三百人アリ然凡其頭ノ壓搾ニ由テ搐  
搦ヲ發シ死スル者曾テ無レト云リ○  
小兒ノ頭甚シク壓搾スト雖モ比皆必ス  
レモ搐搦ヲ發スルニ非ス其故ハ雖産

○此ニ由テ

○如此

ニ就テタシグ<sup>抜</sup>ヲ以テ其頭ヲ夾ミ壓  
 迫シ出ス者モ搗搦ヲ獲ル者殆ント無  
 ケレハナリ然レハ搗搦ヲ登<sup>死</sup>ルハ他ノ病因  
 ニ由リ或ハ産後ノ誤術ニ由テ發スル  
 明白ナリ夫ノロンドン<sup>國</sup>ノ記録ニ載ル  
 一モ細密ニ患者ニ急ヲ用ヒスレテ告ル  
 一ヲ記録セルナリ

註 スメルイイ名ノ書ニ曰クハ此病アリテ  
 搗搦ヲ獲レシ此ニ刺絡ヲ施シ項窩ニ  
 芫菁膏ヲ貼レ獲泡スルニ由テコレヲ救ヘリ

○此病ヲ

○大氏

Innkel'sche Mittheilung.

然レ此病ハ切斷シタル筋帶ヨリ生  
 流泄スルニ由テ防止スルヲ尤モ良トス  
 ト云ナリ

○通例ノ産ニテ小兒ノ鼻ヲ壓ス  
 アレ居白鼻骨ニ損害ナレコレ小兒ノ鼻  
 ハ平カニシテ又多クハ軟骨ナレハナリ然  
 レモレ壓傷スルヲアラハ効カテ甚<sup>キ</sup>キヤ  
 用ユレ

○難産ニ就テ產後ノ拙<sup>或</sup>其他<sup>或</sup>又  
 テ令晩ノ時下顎ノ脱臼或ハ塊<sup>塊</sup>ノ

血ヲ

○後連三  
系ヲ施ス  
一

尖起 骨上致 脱臼スルアリ如此脱臼

遲滯スルナク先ツ一其骨

ヲ甘シ容ル。然ラサレハ小児ハ乳ヲ吮テ

又下頸ノ痙状ノ幸急ニテ口ヲ緊系牙シ

慘酷ナル容子ニテ死スレハナリ

○未タ死セサル見ニ鉤刀ヲ用ヒテ重キ

創傷ヲ受レ又頭ヲ毀傷スルアリ此外

科ニ就テ治療ヲ施ス

○頭骨縫弛用頭水 腦破腫第三章

初生児、頭蓋骨縫弛解スル一

或ハ  
乳

テス此病ハアルシ名必死ノ症トス然レ予

按スルニ或ハ其見月満タス早ク生レ先

ヨリ此病ヲ發スルモノアリ此ハ頭ノ小ナルニ

因テ知レシ或ハ頭水ヨリ發スルアリ此ハ

此ハ頭ノ甚ク大ナルヲ以テ知レシ故ニ

頭蓋骨弛解スト一尺比ガ必ス死症ト

云ハカラザル一明白ナリ此症一小児十分

ニ養ノ足ラサルヨリ危篤ニ至リ發スルモノ

アリ然レハ起因ニ從テ輕重同シカニナリ

ナリ如此症ハ顛門ノ孔甚ク大ナルモノナリ

風雲堂

廣野堂

〇ニテ洗ヒ

椰子油

〇ノ如キモノニ

palma oil

〇エニゲルス<sup>名</sup>國ノ婦人其見ノ額ニ此病アリ  
 レハ生ル時速カニ火酒或ハ此鷄子白  
 或ハ薑揚油ヲ加ヘテ洗フト云リ但シ  
 此水ヲ多ク加ヘテ洗クスレハ精烈ノ劑  
 ト雖モ此病ニ一多ク施シテ完カシカ  
 ルヘシ然レ此劑ニ由テ治スヤ否ヤ疑フヘシ  
 其故ハ小兒ノ身体自然ニ如此弛開ノ  
 孔ヲ閉ツヘキ所ノ大ナル精カヲ具有スレ  
 ハナリ〇然レ輕ク壓窄スル法ヲ以テ夫  
 ノ自然ノ精カヲ扶助スルヲ尤モ利益アリ

リトス故ニ頭骨縫廣ク弛開スル中ハ  
 唯窄小ナル帽ヲ小兒ニ被ラレタル片ハ治  
 スルヲ得ヘシ又顛門ヨリ常ヨリハ多ク  
 開クモノハ此ニ縛テ布ニ壓土布ヲ施シ  
 テ此所ヲ外ヨリ壓フナキヤニ防衛ス  
 ルヲ良トス

〇右ノ諸病ハ月足ラス生ル見ニ多ク方  
 患フ其額モ亦甚々大ナラサルナリ但シ  
 月滿テ生ル見ノ右ノ病ナラスレテ必ス  
 頭水病ナリ

〇患レ

○其水

○頭水病ハ此ヲ内外ニ分ツ内部ノ頭水ハ肥諸腔ホトリフケ或ハ肥ト強肥膜トノ間水アルナリ

○受胎ノ初ヨリ其見ニ内部ノ頭水アル片ハ肥其水ニ浸透真ツ水水ニテ甚シク壓窄セラレ其見ノ頭半方ホドニ窄小ナリ此ノ如キ見ハ生ルイニ死半日或ハ一日ニシテ死ス○臨月ニ如此頭水ヲ排反スルモノハ其見ノ頭骨縫弛罷レ頭尤モ大ニシテ透徹ニ見ユ

○内部ノ頭水ハ外科術ニテモ治スルノ能ハス此ヲ截リテ水ヲ出セハ死ヲ促スノニ其故ハ其水卒カニ泄出スルニ由テ其諸脉一頓ニ收縮スルニ由リ或ハ壞薬壞之トナリ鼻肥ガ大氣ヲ受ルニ由テ腐壞スレハナリ○肥既ニ水ヲ含ムト多キ片ハ水ヲ耗泄スレテ絶テ功ナレ故ニ如此小兒ハ甚タ峻烈ナル下劑セーアイウエシ草ノ劑ヲ内用シ頭部ニ消散ノ外傳劑并ニ縛帶ヲ兼用スルニ由テ

風雲堂



少レバカリノ時日生活スルノミ此ノ如キ況ハ  
諸家言ス唯ブルハ一人名ノ書ゲルル名  
ノ書ニ況クノミ

○外部ノ頭水ハ危フカラス其腫軟カ  
ニレテ指ニテ押ハ其水退クナリ○此症  
ハ消散ノ効アル茶草ノ乾ケルモノヲ囊  
ニ充テ頭ニ貼レ或ハ頭皮ノ敷所ヲ水  
許リテ刺破リテ水ヲ泄ス中ハ治ス其間  
ニ下劑并ニ輕キ利水劑ヲ用ルテ急  
ルテ勿レ

○註 廿元葉月膏ヲ此症ニ貼スモノアリ  
然レハ心クハ此ニ由テ壞疽ヲ發スルテ  
アルヘシ

○内部ノ頭水ノ如クニレテ一箇ノ異ナル  
脳病アリ頭蓋骨内ニ透通セル一腫瘍  
ナリ此ヲ腦ノ破腫ト名クコト亦頭ノ一  
腫瘍ナレ其腫内ニ腦ノ一片端ヲ藏  
ス其腦強脳膜ヲ破リテ頭蓋骨ノ各  
所ノ孔ヨリ頭蓋骨外ニ壓出シテ此  
腫ヲ發スルナリ但シ此症ハ頭蓋骨ノ

創傷ニテ腦ノ張出スル症ト異ナリ此  
創傷ノ症ハ強肥膜ヲ損破スルニ由テ  
肥ニ此膜ヲ被ハスニテ其傷處ニ裸  
出スルヲ外ヨリ純ク見ユルナリ

○レイセリウス名曰ク小兒ノ後頭ニ一腫ヲ  
發ス此ヲ截レハ甚ク清澄ナル鹹液流  
出ス此見死後解剖スルニ後頭骨ニ  
一箇ノ孔アリコレガ後頭骨ノ大孔トツ  
ニナリコレヨリ後腦壓出シ前肥モ此ニ  
連交セリト○レメラン名ヨク此症ヲ精

密ニ記載シ此ヲ肥破腫ト名ケ又此

腫ヲ一頭頂骨ニ發スルヲ見テ云リ

○テレウ名如此腫ヲ頭頂骨ニ二ツ發

スルヲ見テ○コレヒメス名此ガ後頭骨

スルヲ見テ○モルガグニ名此後ニ此腫

内ニ腦ト共ニ水アルモノアリコノ合併セル

症ヲヒツトエセバロセト名ク○デスラデス

名曰ク如此腫ニ唯水ノミアルモノヲ見テ

コレ後頭骨ノ孔ヨリ發見ス

○腦ノ諸破腫ハ其病性ノ同シカラナ

原

ルニ從テ種々ニ腫脹ス然氏皆腫  
内流動ノ候アリテ疼ミナク又此壞  
疽ヲ發スニ非レハ其皮色變スルナシ  
○此腫アリテ生ル見コトヒ又人名記セリ  
又此破腫固ヨリ頸蓋骨ニ發セントスルモ  
小兒啼ニ由テ發スルナク多シ○此腫  
破腫ヲ發スル頸骨ヲ見ルニ  
其  
穴孔セル所ハ  
軟骨填充シ重復ノ骨膜アリ又其  
腫ノ周圍ハ  
圓キ剛骨様

縁アルヲ按循シテ知ルヘシ

○ヘルランド名レフツト名ハ其ニ高明ノ良

エナリ曰ク腦破腫ト頭蓋骨外ノ膿

腫或ハ留滞セル脉外溢泄ノ血ニテ腫

起セルモノト混シ見ルト勿レト予ハ斯

如ク腦ノ破腫ヲ陸産察スルト困難ナ

ラストヨク弁別シ易シトス其故ハ腦ノ

破腫ハ慢緩トシテ漸ク發シ又炊衝

ナキノミナラス又小兒ノ啼叫スルニ由テ

其腫大キクナリ膿腫ハ右ノ諸候

風雲堂

腫瘍  
癰疽  
疔瘡  
癰疽  
癰疽

○破腫ホ  
ドニ

○ノ部

十ク其皮モ色変ヌ但シ頭蓋骨ニ  
膿瘍侵蝕シテ孔ヲ成スアレモ破腫  
ノ孔ト混スルナク自ラ分明ナリ其故ハ  
腐骨瘡ニ於テハ其孔圓形ナルヲ見  
ヌ又疼痛ナシニ発スヲ見ヌ此ニ反シテ  
腦破腫ハ其骨ニ疼ナク又其腫瘍  
ノ骨ニ圓形ノ孔ヲ為スナリ

○腦破腫ト脈外溢出血留滯シテ生  
スル一箇ノ腫瘍ト区別シ易シ其故ニ  
此腫ヲ生スル以前ニ此ヲ生スル外因アルヘシ

○血液

○此腫ハ

○初生児ノ

辟言ハお摺隔皮傷等アルヲ察スヘシ又  
其腫ノ周縁ニ留滯スルニ由テ動  
モスルハ頭蓋骨ニ一孔アルカ如ク思フナリ  
然モ指ニテ按スニ此腫ノ中心軟ナルハ孔  
ニ非ステ心ヲ用ヒテ按スル骨上ニ堆起  
シ其血液皮肉ニ留結スルト瞭然トシ  
テ疑ヒナシ其故ハ此腫ノ邊縁ト頭骨  
トノ間ニ空間アリテ其中ニ血液流動スル  
ヲ按シテ知ルナリ

○頭蓋ノ扁平ナ骨ハ初ノ骨纖維ヲ

風  
雲  
堂

○ニ由テ

○ガ

○孔ヨリ

以テ形成スルニ皆中央突ヨリ周邊へ  
 蔓延ス今一二ノ病因其骨トナル運營  
 ヲ妨碍セラル時ハ其中ノ骨トナル能ハ  
 ナル所<sup>自ラ</sup>孔ヲ成シ其下ニ當ル所ノ強肥  
 膜<sup>花</sup>ニ腦小兒生レテ後甚シク啼叫スル  
 其<sup>ハ</sup>其<sup>ハ</sup>速カニ突出スルナリコレ産出時  
 子<sup>ノ</sup>穿<sup>ノ</sup>壓<sup>ヲ</sup>搾<sup>ニ</sup>テ此<sup>ハ</sup>志<sup>ノ</sup>一<sup>ニ</sup>起<sup>ル</sup>原  
 ナ<sup>カ</sup>ス<sup>ト</sup>明<sup>ラ</sup>カ<sup>ナ</sup>リ

○其孔ノ縁ノ骨ハ他所ヨリハ厚キモノ  
 間<sup>多シ</sup>コ<sup>ル</sup>ヒ<sup>ヌ</sup>ス<sup>名</sup>人<sup>此</sup>ヲ貯<sup>ヘ</sup>テ予<sup>ニ</sup>見<sup>セ</sup>シ

○モノニシテ

○頭蓋外  
○一種ノ

トアリ○ヘルランド<sup>名</sup>人<sup>ガ</sup>コ<sup>ル</sup>ヒ<sup>ヌ</sup>ス<sup>名</sup>人<sup>ノ</sup>事<sup>者</sup>ヲ  
 抄出セル説ニ曰ク此病ハ一ノ頭水ノ未  
 孰<sup>ナル</sup>強<sup>ク</sup>腦<sup>膜</sup>力<sup>漸</sup>次<sup>ニ</sup>水<sup>ノ</sup>執<sup>力</sup>力<sup>ニ</sup>由  
 テ外部<sup>ニ</sup>壓<sup>出</sup>セラ<sup>ル</sup>ナリト<sup>予</sup>按<sup>ス</sup>ルニ  
 此病皆<sup>凡</sup>ク如此水アルニ非ス唯其<sup>中</sup>ニ  
 於テ腦破腫ニ就テ水ヲ兼ル<sup>病</sup>アルニ  
 其故ハ幾多ノ腦破腫ヲ見ルニ全ク水  
 無<sup>シ</sup>又水ヲ兼ルモノ<sup>ハ</sup>治<sup>ス</sup>ル<sup>ト</sup>能<sup>ハ</sup>ス

○此病ハ腦ガ小ナル孔ヨリ<sup>ニ</sup>搾<sup>出</sup>スルユ<sup>ニ</sup>  
 異常<sup>ナ</sup>腫<sup>ヲ</sup>發<sup>見</sup>ス<sup>故</sup>ニ<sup>頭</sup>蓋<sup>骨</sup>

〇ハキモノニ

〇膜尤モ強  
軟ナルノ

縫ノ弛展セル隙間ヨリ塵土出ス〇此  
スト知ルヘシ其故脳ハ鎌状管ノ間隔  
スルカラニ由リ後腦上ノ左右管名扶ケニ  
申リ強脳膜ノ重複ナルニ由テ常度  
ニ越テ突出スルノ變ヲ防衛スルナリ  
〇腦破腫ハ非常ニ大ナラス又水ヲ多ク  
蓄チ起脹スル症ニ非レハ甚ク危篤ナ  
ルナリ

註此病凡幾多ノ小兒ヲ歴觀スルニ  
此破腫頭頂骨ニ生スルハ治ス但ニ後

頭ニ在ルハ死ス

故ニ此ヲ截展クテ禁シ此ニ及ニテ輕ク壓  
收スルノ法ニ由テ收入スレハ自然ノ良能ニ  
テ初メハ其孔ニ軟骨ヲ生シ後ハ通例  
ノ剛骨ヲ生シテ愈合スルナリ〇此  
ノ書ニ「此破腫甚ク小ナラザル者右ノ如  
キ治法ヲ施シテ其腫ハ一月ニ治レ且ツ  
骨ノ孔ハ十箇月ニシテ閉合セルヲ記セリ  
〇但ニ腦破腫ノ治療ヲ急リ強レハ壞  
疽ヲ生シ易シ〇或者此腫ヲ截展キ

○ツニテ替目

○固ク

悪念ヲ度シテ死セリ故ニ此腫ハ頭水ニ  
説ク如ク截法ハ害アリ此ニ及シテ輕ク壓  
收スルノ法ヲ用ヒテ治スルヲ効勵スレコレ  
ダラン名<sup>人</sup>テレウ<sup>上</sup>カム<sup>上</sup>比皆此法ニテ治  
功ヲ得タリ

○此腫壓收スル法ダラン名<sup>人</sup>綿布ノ壓  
布ヲ火酒ニ浸シ此ヲ十二時貼スレコレガ  
乾キ硬クナルニ由テ其腫ヲ壓止レ又骨ノ  
生スルヲ扶クレハナリ○或ハ骨牌<sup>カ</sup>或ハ  
薄キ鉛板ヲ用ユル者アリ予ハ軟タル壓止

布ヲ愈創水ニ浸シ貼スルナリ

○脊椎披裂表<sup>カ</sup>第四<sup>ラ</sup>号<sup>ト</sup>早<sup>カ</sup>

此病ハ前説ノ病ト其患部ハ<sup>カ</sup>異ナレ  
病<sup>カ</sup>因ハ甚ク通ク交通スコレ物<sup>カ</sup>頭ノ  
病<sup>カ</sup>因ヲ以テ病<sup>カ</sup>因トスレハナリ此病ヲ物<sup>カ</sup>  
テ脊椎披裂表ト名ケサウハゲス名<sup>カ</sup>コレヲ  
ヘイドロラシタスト名ク

○此腫瘍ハ常ニ胎兒ノ時ヨリアルナリ然  
レ或云ル腦ノ諸<sup>カ</sup>質ニ水充満シ合<sup>カ</sup>婉

○コノ

○小兒ノ

○如此ノ

○脊骨ノ  
○此ヨリ

時其頭ヲ強ク壓搾スルニ由テ脊椎  
ニ腫ヲ發スルナリト然レ予ハ此説ヲ證ス  
ル一能ハス其故ハ脊椎骨多ク分缺損  
セルホドノ病アリテ——半産ニ由  
テ生ル胎児アレハ分娩時ニ非レテ  
○此腫ハ或ハ透亮ナル者アリ或ハ腰  
椎ノ終リ——薦骨ノ上部ニ生レ指  
ニテ按循スルニ其刺狀ノ夫起披裂セル  
如ク觸知ルナリ是レ脊椎披裂ト名  
ル所以ナリ○然レ此腫ヲ生スル所高

キモノモアリ

○リツイス名ノ書ニ曰ク此腫項ノ末  
椎ニ生スルモノアリト

○リツイス名曰ク此腫ハ頭中或ハ脊椎  
ニ水取ルヨリ起癭セリト

○脊髓ハ強脳膜延展セルモノヲ以テ  
被フ然レコレガ甚ク固着セズ縦寬ニ  
被包スルヲ以テ脊髓ト此膜トノ間ニ  
差空隙ヲ生ス○腦中ノ諸腔モ亦  
身体ノ諸腔間ノ如ク壯健ノ人ニ於テハ



津液ヲ蒸出ス此液常度ニ反シテ肥  
腔ニ聚満シ而シテ頭蓋ノ諸骨入至ク  
膨脹セシテコレカ脊椎ノ骨管中ニ流  
下シ夫ノ脊髓ヲ包ム強肥膜ノ延展  
セルモノ、端末下底ノ所ニ其液留瀦  
スニ膜ハ葎骨ノ末マテ至ルニハ腰  
椎ノ終リヲ下端トスルニ其留瀦セル液  
此ニ於テ起脹スルナリ○故ニ其刺状ノ  
尖起披裂セル如クナレ然ラス古ニモ言  
ル如ク脊椎骨惣テ皆披裂セルナリ

註或ハ此腫ニ頭水ヲ兼ルモノアリ

○此腫瘍ハ前部腹裏

リハ後部ニ起脹スルニ多シ其故ハ後

部背後ハ前部ニ比スレハ脊骨ノ支障

ナケレハナリ脊ノ後部ニ脊髓アリ又如此暴

強ナル起脹ノ勢力ナレハ脆弱ナル脊

筋ノ力ニテ防止スルニ能ハス又如此脊

椎ノ披裂スルニナレハ必スコレ其剛ヨリ

完固ノ脊椎ナラサルニ明白ナリ

○脊ノ皮上ニ堆起セル腫瘍ヲ瘰癧所

如此

以ハ強腦膜ヨリ成ル所ノ脊髄ヲ包  
ム膜腰椎ノ下端ニ在テハ底ヲ為シ  
一宛モ囊ノ如クナルニ此内ニ水溜リ  
テ膨脹スレハナリ○但レコレガ堆起膨  
脹セサル迄ハ脊髄ノ破腫ナリ其故  
ハ前部ト相反シテ其腫ガ前部（多  
ク起脹スレハナリ

○古ノ医家此病ヲ從クテ明カナラズ獨  
リケルヲ始テ明カニ記載レコレヲ脊  
推ノ披裂ト名ク其後レケンキ名殊ニ

リユイス名コレヲ詳ニ記シ又スワアゲルシ名  
此腫ノ内形ヲ精密ニ圖ニ著ハレ世ニ  
公行セリ

○如此少兒ハ脊髄尾ニ其下部ニ  
起ル所ノ神經ヲ壓迫

レ此ニ由テ半身麻痺不遂或ハ上部下  
部ノ支節幾ント全ク知覚舉動ヲ失ヒ  
或ハ冬腫ニ壞疽ヲ生シテ死ス然レニ  
三歳或ハ十四歳或ハ二十歳マテ死セザ  
ル者アリ

○或下部

(任) リスイス各人曰ク如此小兒ハ一年ヨリ長ク生活スルヲナシトテシウ各人曰ク一女兒此病アリテ十四歳マテ生活セリト

○治法ハ内外菜創ヲ施スナリホレスケズ人ヘイステル各人等ハ此腫ヲ結ヒ截リテ治スヘシト云ヘリ然氏此ニ由テ死ス

(任) スワケル各人ノ書ニ云ク此腫ヲ結ヒ切レハ速カニ虚脱シテ羽立日死セリト

○或ハ截リ弔テ治スヲ稱スルモノアリ然氏脊髓ニ接ス腫ナシニ由テ此法ヲ施セハ必ス

小兒

死スナユル各人モ亦此ヲ施サス神經ヲ毀傷スレハナリ又切斷スハ其内ノ神經花ニ脊髓ニ大氣侵入レコレガ甚キモノハ頭マテモ衝騰シテ尽ク腐肉壞セシメ死シ促スレハナリ

○或云クル小兒此腫ヲ截弔テ水ヲ出シ治スル者アリト云ヘリ然氏此ハ唯其部皮肉ノ間ニ水ヲ蓄ムルノ腫起ナルカ或ハ強肥膜ニ損害——ナク此膜外ニ生スル腫ニシテ脊椎披裂衣ノ種類ニ非スコ

脂肪膜腫ノ種類ニ属スルモノナリ

○予カ此腫ノ治法ハ軟ナル壓布ノ諸法ヲ施スナリ此ヲ試ルニ面日テ危篤ヲ為スナシ若シ此腫自燃ニ潰破セハ其水甚々速カニ出ル中ハ其下ノ部分ニ大ニ害アリ故ニ百計シテ其水ヲ止ムヘシ

(注) エルホールン名ノ書ニ云ク鉛ニテ少ナル管ヲ造リ其腫ニ貼ス然レ此ニ由テ其腫ヲ摩擦毀傷スヘキヲ戒ルナリ

○外部神具病并唇合着第五等年頭部ニ属スル諸瘻ニ患志アルハ頭中其起因アルカ或ハ頭ノ天質西キ所アルヲ察スヘシ

○諸瘻ノ生合シ或ハ常形ニ異変アル者一ナラス幼生児眼瞼合着スルモノアリ此ハ眼瞼ガ全着スルアリ又其着所多少母貫透スルモノナリ或ハ眼瞼ノ弓状軟骨連着シ或ハ眼瞼ガ角膜ニ生合スル症アリ

其膜以テ  
Zamenpigeaide lappen  
andem alle den niet opendige kintuigen

風雲堂

風雲堂

口其術ヲ  
口実

○初ニ奉ル症ハ治シ易シ此ハ總テ  
幼生児ニアル所ノ眼胞腫起ノ消散  
スル後速ニ外科術ニテ治療スヘシ

○第二ノ症ハ<sup>或ハ軟骨</sup>合着<sup>合着</sup>症ニテ治療スヘシ  
五ニ生シテ五月或ハ六月モ延引スヘシ齡  
長スハ毛眼強クナリコノ弓状軟骨

合着スル者ハ眼胞自ラ内ニ轉回スル  
甚々多シ

○第三ノ症ハ  
療術ニテ全ク  
治スルナシ

○眼瞼ガ膜ニテ合着スル者療術ヲ行  
ハント欲セハ先ツ縛縊ヲ以テ甚々ヨク小  
児ヲ固定スヘシ小児支節ヲ動搖スレ  
ハ外科ノ療術ヲ妨ケ或ハ眼ヲ毀傷ス  
ルナラハナリ又左ニ述ル諸件ヲ一施ス  
スヘシ

○眼瞼ヲ被包スル膜ニ生合スル症多ク  
合孔貫透スルモノハ凹窪ノ消息子ヲ眼中  
ニ容レ弓状軟骨ヲ毀傷セサルヤリニ截  
リ透スヘシ○此ガ全ク牙着シテ貫透ス

口隙

厚雲堂

○正直ニ

○ノ巨細ハ

○此ニ由テ

○ハサレハ

ル處ナキモノハ眼瞼ヲ指ニテ撮ミ、擧ケ横ニ截リ透シ其孔隙ニ端末ノ鈍圓丸消息子凶窪ナルモノヲ容レ截ルニシ但レ消息子ノ眼ニ相應セルヲ用ユニシ○末ニ珠アル鉄刀ニテ截ル者アリ○右ノ療術ヲ施ス後ハ復タ合着スルヲ防ク爲ニ一片ノ黄金ノ赤展タル箔ヲ眼瞼ノ間ニ置クニシ○コレウレイエ各意ヲク物心テ何ニテモ眼瞼ノ間ニ置クト勿ク眼ヲ運動スルヲ能眼瞼ノ復タ合着スレハナリト此ハ療術

○其合着スル

ヲ施シテ後ハ程々適意ニ○ヲ防止ニシテ大氏、再ヒ合着スルヲナシ又乳汁或ハ一ニノ露若水ノ類、麝香ハ苗香水、薔薇水等ニ搗碎核ノ粘汁ヲ加テ眼瞼ヲニシシ洗フニシ

○眼瞼ノ弓状軟骨ノ生着スル處、其軟骨ノ直ニ生着スルアリ、或ハ膜ニ由テ着クモノアリ○此皆其生着スルハ前記ノ法ニ由テ治スニシ但レ内此目并ニ淚点ヲ害セサルヤウニ手ニテ支ヘ截ルニシ

○輕ク

○右ノ術ヲ未タ施サル際ハ指ニテ眼ヲ  
シバクモ摩擦スヘシコレ眼瞼ガ眼球ニ生  
着セサルガ爲ナリ○術ヲ施スウチハ殊  
ニ上瞼ヲ損傷セサルヤウニ意ヲ用エシ  
眼ヲ開盪シ流ヲ導泄スルニ下瞼ヨリハ  
尤モ際要ニ具ナリ故ニ術ヲ施スニ上  
瞼ノミニ意ヲ用ヒ防サ護レテ下瞼ニ意ヲ  
置ス截完クテ良トス此術ハ殊ニテウイ五  
人記載スルノ明詳ナリ

口指ニテ

(註) 上瞼ノ上部ヲ如シ名提擧シ小刀ノ

尖ヲ以テ上下瞼ノ間ヲ截リ離ス片ハ  
上瞼ハ自ラ上部へ牽擧シ下瞼ハ下  
部へ下リテテウイ骨令ルナリテウイ骨  
人ノ書ニ見ヘキ

○眼瞼ガ角膜膜ニ固ク生着スル症ハ  
療術ニテ復シ難シ然レ眼瞼カ眼球  
ノ外面ニテ多少運動スルヤ否ヤヲ試クヘ  
シ如此ハ先ツ眼瞼ノ合着セルヲ切離シ  
而後其眼瞼ノ眼球ニ固着セルヲ離  
スヘシ但シ其小刀ハ角膜膜ヨリハ眼瞼ノ

風雲堂

一方ニ多ク倚テ截ルニ

○術  
○眼見  
能ハス余ク

○截離ニテ後ハ眼球ト瞼ト間ニ鉛ノ薄片ヲ置キ而シテ此條ヲ施セトモ其功ナキモノ右ノ如ク鉛片ヲ夾ミ翳ハシメテ後ニ假造眼ヲ製衣シテ此處ニ夾ミ其畸形ヲ減スニ

○眼障アリテ生ルモノハ初生児ハ治シ難シコト生立月レ時日ヲ經テ後條術ヲ施スニ

○適宜液  
ヲ具シ

○耳病ハ初生児ニ少ナカラス耳孔ニ聾聾或ハ其他ノ汚物空塞スルモノハ初生児ハ聾聾流動スルモノ多ク此ハ温湯ヲ水鏡ニテ耳孔ニ注入シ洗淨スルハ容易ク治スニ聾聾堅キモノハ溶解シテ後水鏡ヲ施スニ

其膜ヲ

○耳孔ニ膜ヲ以テ守塞スル字ニ形ニ截罷クニ此ニ就テ其後ニ在ル鼓膜ヲ毀傷スルナキヤウニ急用ニシテ小児ハ骨様ノ孔ニ幾ニトナキカ如クナル鼓膜ヲ破壊シ易キナリ○此膜深キモノハ截リ難キ

○道



ニ由テ治セス然リ之為ニ此ヨリ啞ヲ為ス  
**注** 耳孔ニ膜アリテ然リ之為スモノハ  
腐葉ヲ施スヘカラス此ニ由テ鼓膜ヲ  
害スレハナリア耳ノ子ノ人ハ唯尖利ノ  
小刀ニテ截ルナリ

○鼻孔汚物ニテ牙塞スルハ温湯乳  
汁粗油雞卵油ヲ以テ緩和スレ  
ドイツラント國ノ產産ハ此ニ物心テマヨラシ  
ボートル第七編ヲ用エ然レ乳汁或ハ油  
ヲ施シテ効アリ此ヲ小鳥ノ羽ニ塗リ鼻

孔ニ挿スヘシ

○鼻孔ニ膜アリテ牙塞スルハコレヲ截リ  
透シ其創ヲ瘡イヤスナク軟ナル挿絲イヤヲ  
挿シ置クヘシ小兒乳ヲ吮トキハコレヲ抜  
クヘシ

○唇合着スルモノアリ然レ此ニ差合縫  
ノ凹溝アリ此ハ尽ク截ルニ及ハス唯一指  
ホドノ大サニ切り完キ此ヨリ乳頭ヲ挿シ  
容テ乳ヲ吸シクヘシ小兒ノ啼叫スルニ  
由テ漸次ニ自ラ廣ク完ナリ○白晁

其唇ノ合着守塞ハ速ニ術ヲ施ス  
一ニ小児ノ呼吸其吮乳ヲ妨ヘナリ

○免唇第六章

真ノ免唇アリテ生ル小児ハ(創傷

ニ由テ此症ヲ發スルヲ<sup>蝦蟇</sup>唇ト名ク)上

唇缺列表スコレニ單症アリ複症アリ

三複症アリコレ其披裂衣ノ中ニ一片肉

懸心壅ノ如キモノアリ○蓋頸ノ骨質

ノ部モ共ニ披裂衣スルヲ夾雜ノ症ト為ス

此症ハ一齒或多齒モ其裂衣間ヨリ

露出ス○蓋頸ノ<sup>一</sup>懸心壅上マテ

披<sup>○</sup>モノアリ或ハコレ<sup>全</sup>ニツニ分離シ在

ルモノアリ又ズウイ<sup>テ</sup>ノ<sup>全</sup>書ニ蓋頸

披列表シテ唇全キ小児ヲ見ルト云リ

○ロウイス<sup>全</sup>ノ書ニ曰ク此病性ヲ考

ルニ生レナカラ此症アルハ此<sup>○</sup>缺損ニ非ス

シテ唇頸等ノ筋ノ所為ニ由テ此部

ノ皮肉等披裂スルナリ故ニ其筋ノ

機力ノ多少ニ因テ其披裂ニ多少

○鼻ヲ為ス

口部ノ  
体質

○引レ其

アリ又蓋頸諸骨、缺脱ニ非ス唯コ  
レガ天質自然ニ力引衣スルナリ故ニ此  
疝アル小兒ハ上頸廣濶ナリ此故ニ頸  
唇ノ筋毛相分レテ牽。執力カニ由テ唇  
ノ皮肉モ缺裂衣スルナリ

○兎唇ハ唇ニ面部醜怪ヲ為スノ  
ミナラス小兒ノ吮乳ヲ妨ケ或ハ此ニ由  
テ全ク吮フテ能ハサルモノアリ○蓋頸  
ノ骨質ノ部披裂衣スレハ小兒乳ヲ吮  
カキキノミナラス乳頭ヲ含マシメテ乳

ヲ吮フトイ一氏白異へ反流シ或ハ気管  
中ニ流入ス故ニ此疝アリテ生ル、小兒ハ  
生ル後暫ク甚ク壯健ニ見エトモ  
右ノ患ヒニテ速ニ死スルナリ

○ベチツト右ノ疝ニ野羊ノ乳頭ヲ  
小兒ニ含シム此レ軟柔ニシテ其大井  
并ニ長サモ蓋頸ノ披裂衣并白異孔ヲ適  
宜ク塞ク。由テ乳ヲヨク嚙ミ又此ニ由  
テ呼吸ヲ妨ルナレ○小兒多クハ此  
疝ニ慣テ

舌ヲヨク

○ノ口中ニ  
半ハ充ル  
モノナリ

○ホトナルニ

揚テ頸ノ披孔ヲ塞キ舌ノ尖リニテヨク  
乳ヲ吮フ者多クシ

○此志アル小兒ハ乳頭長ク太キ乳母  
ヲ擇ミ乳ヲ与フニシ○但シ此志ニ由テ  
絶テ乳ヲ嚙テ飲ハサル小兒ハモルガクニ  
人ノ説ニ院賜法ニテ營養ノ液ヲ灌  
入シ一暫時其命ヲ保續スヘシト云リ

○兒唇アリテ生ル兒ハ生レテ後速ニ截  
断スヘキヤ或ハ斬日ク時日ヲ経テ療術  
ヲ施スヘキヤ予ニ答テ曰ク此療術ハ其

披孔ヲ塞キ此志ヲ治スル爲メノ法ナレ  
ハ必ス遲滞セス速ニ施スヘシ殊ニ此ニ  
申テ乳ヲ吮ニ妨ケアルハ早ク瘡スヘシ  
尚又小兒ハ幼ナルホドイヨク療術ノ痛  
ヲ覺ユルナクナレコレ常ニ腫ルナク  
又其創モ大人ヨリハ速カニ治スルハナリ又  
此療術ニテ刃ス創殊ニロウイス名ノ鍼ヲ  
用ヒス治スル法(此術後ニ記ス)ニ由テ作ス  
創ハ甚ク速ニ治シ唇ノ創治スル際ニ亦  
漸ク骨ノ披孔モ牙ヲ生合スルナリ

○數年磨  
擦スルニ  
由テ

或ハ

○頰骨ノ披孔ノ周縁ニ何以テカ自然ニ  
断肉ヲ生シテ其孔ヲ被ヒ瘡合スルヤ  
明白ニ了解シ維キ所ナリ此氏予按  
スルニ甚々年老老人ハ齒既ニ脱シ蓋  
頰一以前ハ厚子キモノガ唯一薄片一  
トナルホドニ減敬スレモ断肉損害十  
キヲ以テ見レハ此古又ニ於テモ怪クニ足ラ  
サルナリ○此故ニ蓋頰ノ骨質ノ部披  
列表スルモノハ必ス療術ヲ旋スレシ此ヲ治  
スルニ甚々艱<sup>カク</sup>シ療術益ナシト云フ人ノ

説ヲ聞クナク勿レ如此シテ全治スル者甚  
々多ク經驗スレハナリ

○生レテ後速ニ此術ヲ施スナク勿レ朝夕  
時日ヲ経テ施スレシ又○次ニ記ス所ノ縛法  
ヲ施シ置クニ己其骨ノ披孔ガ筋ノ  
牽引ニ由テ大キクナラサル為ナリ但シ  
唇ハ此ヲ治スルニ殊知<sup>ル</sup>ル一法ナシ  
施レテ收清スレシ

○免唇治法第七卷  
其療法ハ披裂セル唇ノ縁ヲ截リ新

○其間

創トカシ<sup>テ</sup>適宜ク其截リ先所ヲ接合シ  
愈着セシムヘシ○此術ハ諸ノ外科書  
ニ詳ニ載先ハ予唯コレニ開ル考後ヲ  
次ニ記ス○此術ヲ施スニ就テ其破裂  
ノ縁ヲ截ルニス<sup>ハ</sup>鉸刀ヲ用ユ但シレバラン  
名ハ小刀ヲ用ユ近來ノ著述家殊ニ<sup>ハ</sup>イ  
名ハ必ス小刀ヲ用ユコレ<sup>ハ</sup>鉸刀ニテハ必ス押シ  
截ルニ由テ其創愈ガタトスレハナリ

○——其唇ヲ手ニ持テ瘰術ヲ施ス  
ナリ然凡古ハ一種ノ小ナル<sup>ハ</sup>タング<sup>ハ</sup>釘接ノ<sup>ハ</sup>由  
テ

ヲ用ヒ此ニテ唇ヲ夾ミ固メ且ツ<sup>ハ</sup>血モ障  
止スト思ヘリ然凡此<sup>ハ</sup>蓋ハ押シ夾ムニ由テ  
瘰ヲ起シ近世ニテハ<sup>ハ</sup>全ク瘰セリ

○頸ト唇トノ間ニ木ノ薄片、厚紙或ハ  
鉛ノ薄片ヲ置クヘシ此レニテ小刀ノ尖リヲ  
固ク支持シテ切斷シ易ケレハナリ唇ガ  
韌ヲ予ニテ斷ニ合着スルモノハ此瘰術ヲ  
施スニ就テ切り難スヘシ但シ此ヲ切ルト  
津唾ハ湧出スルニ由テ——瘰タ生合  
スルヲ障支シテ愈着セシムルヲナシ

ロイ一尺  
ロイ五分

○然テ六

○レテ附着  
スルノ

○唇ノ披裂ノ縁<sup>フチ</sup> 脣<sup>クサ</sup>脣<sup>クサ</sup>様ナリト思ヒ  
 者アリコレ大ニ誤リナリ如此ナル者齒<sup>ハ</sup>テ  
 ナク皆軟カニレテ鮮紅色ノ肉ニ甚ク  
 薄キ表被ヲ被フナリ但レ此ヲ全ク切  
 去ルレ。十方ニ合着シ愈<sup>ハ</sup>ス或ハ瘻管  
 瘡ヲ發シ愈<sup>ハ</sup>心カクキナキナリ  
 ○古ノ外科ハ其創唇ニ纏<sup>マ</sup>卷<sup>マ</sup>。法ヲ  
 施シテ生合シ其合縫ニ縛<sup>マ</sup>帶<sup>マ</sup>ヲ施シテ  
 固持スルヲ常<sup>ニ</sup>法トセリ  
 ○幾多ノ鍼ノ一ノ一ノ種<sup>ノ</sup>其形状

○予此

○ヲ知ラシム

長短并ニ其体質モ各異ニレテ其  
 合縫ヲカスノ法モ種々アル此ヲ從<sup>ヒ</sup>ク  
 ナレ右ノ古又件ハ諸ノ外科書ニ明  
 詳ナレハナリ○予今友ニ從<sup>ヒ</sup>ク所ハ古ノ名  
 匠ノ中ニモ此志ニ於テ鍼ヲ用<sup>ヒ</sup>ス唯固着  
 スル膏<sup>ニ</sup>糸<sup>ヲ</sup>貼<sup>シ</sup>テ其創唇ヲ合着  
 シ人愈スヲ最モ良法トスルナル○近世  
 ニモピブラク<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>口<sup>ノ</sup>ウ<sup>イ</sup>ス<sup>ノ</sup>上<sup>ノ</sup>イ<sup>ヨ</sup>ク<sup>ク</sup>此ヲ良  
 法トセリ○或<sup>ハ</sup>者曰ク軟<sup>ニ</sup>柔<sup>ニ</sup>ノ部ハ鍼ヲ  
 用ヒテ縫<sup>フ</sup>ニ非<sup>ズ</sup>レハ醜<sup>ク</sup>痕<sup>ナ</sup>ク生合愈着

○其創

レ難シト然氏予此ニ證シテ曰ク唇口ト  
頰ノ下縁トノ間ニ小薄片ノ物ヲ置ク  
トキヨク收合シテ連着シ一固着ス  
ル膏藥ノミニテホトヨク治スナリコレ  
高明ノ諸外科經驗シコレニ鍼ヲ用  
ヒスレテヨク生着セシムナリ

○古ニ於テ物々テ重複ノ免唇ヲ治ス  
ル法ハ其中間ノ挺出セル片肉ノ兩側ヲ  
少シ截去リ三稜形ヲ為シ其披裂衣ヲ  
常法ノ如ク一鍼ヲ用テ其中間片

○刺シ

肉ニ貫キ合着スナリ○但シロウイス  
人其ニ披裂衣ヲ兩回ニ愈スナリ則チ  
一裂衣ヲ初ニ治シ愈テ後又一裂衣ニ術ヲ  
施シ愈スナリ此亦良法トスコレ宛モ軍  
志ノ免唇ヲ療スルト同シ

○披裂衣ノ内ニ毒見ズルモノハ甚シク妨  
碍スルナリハ拔去ルナ勿レコレヲ拔  
キハ激衝疼痛甚シク増劇スレナリ  
故ニ其毒披裂衣ノ内ニ出スレテ常居ノ  
所ニ正ク退○ベキカヨク隨症察シテ療術

○キ復ス



○イマカ  
ヲ益シ

ヲ加ふ試ムヘシロウイス名曰ク此ノ如キ業ハ  
正位ニ復スルモノ多シト○然氏其業全  
ク復スヘカラサルモ人此ヲ抜キ去リ或突  
出スル骨ヲ除去ルヘシ但シ如此ナルモ人此療  
術ヲ行フ教日以前ニ為スヘシ然ラサレハ療  
術ヲ施スニ就テ先ツ煥衝ヲ禁ムニナリ  
○此術ニ於テ鍼ヲ用ヒ或ハロウイス名ノ法ニ  
從テ唯固着膏ニテ創唇ヲ連合スルニ  
就テモ縛締ヲ施シテ保持スヘシ或ハハ  
名ノ法ニ圓ク勾カリ糸鋼鉄ノ具ヲ用ヒ或ハ

縛此ノ具ニ由テ頬ヲ前ヘ壓シ或ハ  
セルシヌ名ノ法アレモ皆用ユヘカラス○此ニハ  
唯縛法ヲ施シテ創唇ヲ收合連着セシ  
メ其筋ノ放鬆スル機力ヲ減スルヲ最良ト  
スロウイス名ノ法ニ固着膏ヲ貼スル後  
壓布ヲ施シ縛縛スナリ  
○其後ハ十リ々々多ク用テ幼児ハ啼叫  
嘔吐、笑等物心テ面部ノ筋ノ運動  
スルヲ禁スヘシ○乳ヲ蒸ク見ハ暫ク中  
ハ其乳ヲ匙ニテ口中ニ容ルヘシ

○蓋頸骨質ノ部成長スルマテ其披  
列衣愈サル片ハ言語ヲ妨ルナリ此處ハ  
ベツキ各ノ法ニ一片ノ犢牛皮ノ軟ニシテ水  
棉ノ如キヲ蓋頸ノ孔ニ充テ白晁孔ニ向テ  
牙塞シ固持ス但シ幼生児ハ鼻孔窄  
小ナルニシテ施シ難シ

○舌并咽喉病第八章

乳卷ノ小児ハ口中咽喉ノ病ニ由テ乳  
ヲ嚥フナリ妨ルナリ殊ニ舌ノ運動ヲ

妨ルモノ甚タシ○舌下ノ靱帯ハ口中  
ニ被布スル膜ヲ以テ重被シ又一ニ以テ  
纖維ナリ此靱帯ノ主用ハ舌ヲ過ク  
後部ニ牽縮スルナカレム然レモカ  
常度ニ過テ舌尖ノ下マテ連着スル片ハ  
舌ヲ蓋頸ニ附テ揚ルナリ又ニ唇端  
マテ挺出シ難シ此ニ由テ幼生児ハ舌ヲ自  
由ニ運動スルナ能ハスレテ乳ヲ吮テ得  
ス又年長スレバ言語ヲ妨ク○或ハ此ニ由  
テ舌尖ノ下ニ牽縮シテ心藏ノ形ノ如ク見

ユルモノアリ

○幼生見ヲ試ルニ乳頭ヲ小見ノ口中ニ容レ或ハ指ヲ容テ吮ハシムルニ其舌ヨク断外へ出スヲ得ルハ療術ヲ施スニ及ハス假令ヨク鞞帯長シトイハレ乳ヲ吸フニ妨ケサレハ療術ヲ施スヘカラス其故年長スレハ自然ニ舌ヨク運動スル者多ク又年長シテ療術ヲ施セハ危フカラス且ツ施シ易ケレハナリ○此鞞帯ノ長キヲ截ラサルニ由テ比白必スニ言テ寤寔吃スル

○年長シテ後

○ホドヨク

○舌

○鞞帯ノ長キニ由テ

○療術ヲ施スニ就テ

ニ非スヨシ多クハ其他ノ病患アルニ由ル○療術ヲ施スニハ小見ヲ平カニ坐セシメ外科其後ニ在リ或ハ前ニ在ルヲ尤良トス而シテ見ノ鼻ヲ牙ク中ハ舌ヲ出スナリ此ニ由テ舌ヲ卷キ其鞞帯ヲ切断スヘシ或ハ左手ニ綿布ヲ卷キ見ノ舌ヲ持テ右手ニテ切断ス或ハ小ナルメシグ<sub>釘後ノキニテ</sub>ヲ夾ム者アリ

○其舌後部へ牽引シ且ツ固ク生着スルモノハ其舌ヲ揚ケ難キモノナリ故ニ此が

風

○其鞞帶ヲ切ルニ就テ

為ニ種々ノ療具ヲ製スル者アリ○ペチット  
人曰ク舌固着ニテ舌夫揚ラサルモノ○舌  
下ニアル大ナル静脈ヲ誤テ截リ此ニ  
由テ大ニ出血スルヲアルヲ防クニ故ニ小刀  
ニ一箇ノヘール北鑰ノヲ備ヘタルヲ以テ截  
ルナリト其後又曰ク此症ヲ療スルニ鉄ノ小  
薄ヲ加テ鉸ヲ一作りコレニテ舌ヲ擧ケ  
血脉ヲ防護スト○通例ノ一ハ窪ハルレ  
消息子ノ柄心藏状加ク扁平ナルヲ以テ  
舌ヲ揚ケル中ハヨク鞞帶ヲ固持スルナリ

○下ニ向テ

○此ヲ切ルニ大ニ鉸ヲ用ユ  
○此ヲ切ルニ就テ出血ヨリ心ルニキハナシ此ヲ  
甚タ低ク切ル中ハ出血ス又外科ノ罪  
ニ非スレテ出血スルモナリ此ハ其鞞帶ノ質  
ニ大キ血脉ヲ備ルモノアレハナリ此レ知見  
ハ舌ノ運動ヲ静止スルヲ純ハサルニ出血  
止ズ危篤ニシテ或ハ死スルヲアルナリ○往  
年レイプリ名都ニテ石小見ノ舌鞞帯ヲ  
切リ且ツ舌モ毀傷スルニ由テ他ノ  
患症ナク唯此出血ニテ死セリ

○鞞帯ノ人

○小兒年長スレハ出血ノ心レ火ナシコ  
 其舌ヲ幼見ノ如クニ運動セス又輕キ流  
 瀆割ヲ口中ニ貼シテ血ヲ止ルテアレハナリ  
 ○ペケツト欲曰ク此術ニテ出血スルハ敷テテ  
 甚タ深ク切レハナリ故ニ此ヲ防クニ一箇ノ具  
 ヲ製ス此ハ柔木ノ枝ニテホルコノ義形ヲカス  
 ヲ作り岐ヲ為シ其体ハ二分ハ厘強枝ハ五  
 分ハ厘強ナリ此ヲ軟布ニテ巻キ此ヲ舌下ニ  
 夾シ其体即チ柄ヲク下頸ニ摺持シ其  
 岐ノ間ニテ出血ノ血脈孔ヲ押ヘ牙ルナリ又

其枝ヨク舌ノ兩側ニ行テ正ク保持シ  
 前後左右ニ轉移セサルヤウニ固ク挿ス  
 ナリ此具ヲ挿テ綿布ニテ纏縛ヲ施  
 スヘシ此布長サ二尺許、幅五分ハ厘或ハ  
 七分ハ許ニ為シ其布ノ中分ノ所ヲ舌ニ當テ  
 唇ノ兩隅ニ掛ケ頸ノ下ニ取り結喉ノ部  
 ニテ十字ニ取り違ヘ此ヨリ後頭ニテ結フ  
 ナリ予如此縛法ヲ詳ニ記ス所以ハ此更  
 最モ所要ナレハナリ此ニ標挿ヲ施スト  
 雜モ縛法ヲ施サレハ功益ナシ

見

○ベキツト名ノ書ニ小兒ノ舌靱帶ヲ甚ク  
深ク切り舌其靱帶ヲ離テ喉ノ方  
へ卷キ入り氣管頭ヲ塞キテ死ス者  
ヲ死セリ此ヲ救フ法ハ速カニ手指ヲ児ノ  
口中ニ入レ舌ヲ前部へ引戻スへシ而シテ  
乳母ニ教ルニ若シ小兒舌ヲ吞ミ呼吸塞  
塞スル者聞セハ速ニ指ヲ其口中ニ入テ引  
戻スヲ以テ治ス○此治法ハ壓布ヲ口中  
ニ入レ舌ヲ押シ下シ縛法ニテ固持セシム  
へシ此縛帯ハ四頭ノモノヲ施スへシ小兒

乳ヲ吮中ハ縛帯ヲ去ルへシ

(注) 腐系ヲ以テ舌靱帯ヲ腐蝕ス  
ルハ甚ク害アリ其腐系津唾ニ溶  
解シテ西ノ疔ヲ發スレハナリ

又——蜜ヲ大麥水ニテ溶シ指ニテ  
シバク攪動シ塗ルへシ此ニ由テ大抵十  
二時ノ中ニ痂ヲ結フナリ

○或ハ舌ノ兩側ノ靱帶甚ク長ク着  
テ舌ノ運動ヲ妨ルモノアリコレ甚ク厚ク  
肉ノ如キモノアリ此ハ鋏刀ニテ切ルへシ

口其創ニ

風雲堂

此

○或ハ顯著ノ起因ナクシテ舌カ蓋頸ニ着キニ由テ乳ヲ吮ク妨ルモナリ此管比或ハ匙ノ背ニテ下ニ押セハ離ルナリ○咽喉ニ膜アリテ牙塞スルモノ也干ナリ然レ蓋頸ノ肉様ノ物懸垂シテ乳ヲ吮ク妨ケ或ハ言語ヲ妨ルモノハ切斷シ除クニシ又鬚癭土兩ツ重ルモノアリ

○胸病篇第九

ゴハリ臭人曰ク初生児竅ニ頸癭ト名

○呼吸

ル腫瘍ヲ外弁スルナリ此ハ甚タ大ナル腫ニシテ小児生シテカラ此ヲ生シ右耳或右頬ヨリ下垂シ胸腹マテモ至ルモノアリ又此腫ハ氣管ト交通シ其中ニ氣充テ呼吸ハ脹リ喘呼スレハ小サクナリ此法法ハ精烈ニシテ滋清スル也此劑ヲ此腫ノ初發ニ施セハ効アリコレ其腫軟柔ナルニ由テ此劑ヲ施セハ其氣速ニ二三ノ腺ニ滲通シ自然ノ氣張ノ精カ回復シテ治スナリ○但シ其腫甚タ大

ニ膨張スルモノ其腫ノ處々ヲ刺シ截リ  
テ其氣ヲ出スヘシ氣管ニ交通ノ孔  
アリトイハレ自然ニ牙宜全スルナリ

○又生レテカラ頸被腫ノ一種アリ此ハ  
鵝腫ト甚ク近シコレ頸ノ腺牙塞シ腫

起スルナリ此ハ年長ストイハレ治セズヤ任再  
タルモノナリ然レ或ハ効ナテ此ヲ結ヒ切リ  
或ハ如此レテ治セザルモノ切斷スルナリ

○生レテカラ胸部ノ病ニ羅維ル者アリ此ハ  
肋或ハ胸骨ノ下部其分岐ニ就テ壓

撞<sup>イシテ</sup>レ或ハ子宮中ニテ其一胎

居ノ悪キニ由リ或ハ受胎ノ初ナリ形質

ノ異常ナルヨリ既ニ右ノ部陥没スルモノ

アリ○此志ハ產婦コレヲ治セント欲シテ

此部ヲ手ニテ壓シ或ハ緊ク縛テ

施ス等ノ古又ヲ細慎シテ禁ホスヘシ唯緩

ク縛縛ヲ施シ物心テ自然ノ良能ニ任

セ置クヘシ此ニ由テ自ラ治スナリ然レ亦此

カ生涯去ラズレテ此ニ由テ呼吸不利其

他ノ緒志ヲ考及スルモノアリ



注 ストルク臥ノ書ニ曰ク一種ノ頸破腫  
アリ此ヲ肺破腫ト名ケテ可ナリ此ハ腋  
下ニ腫瘍ヲ發シ此内ニ氣充滿シ呼吸  
ニ就テ肺ノ氣此腫ニ滲入ス此患者  
成長シテ胸ノ水腫ヲ患テ死ス  
○生ル時他ノ病ナク生レテ後連ニ胸  
ニ一箇ノ腫瘍ヲ發此ニ次テ胸  
ノ膿腫トナルモアリ其故ハ初生兒ノ胸ニハ  
空イ様ノ液充滿セザリ此腫ハ余々ニ  
壓シ或ハ空イ様ノ液ヲ吸出し而後軟カレ壓上

布ヲ覆フヘシ但シ膿腫トナラハ軟化  
糊創、其系ヲ系、膏月系ニテ膿熟セ  
レメ此ヲ潰破シテ通例ノ如ク治スヘシ

○疔病者十三年

小兒生レテ數日ノ後ハ疔帯ノ根ニ皮  
并ニ表被カ

離断シテ疔帯脱落ス但シ  
生レテ未タ啼呼セサルウチハ右ノ皮  
尚其根ヨリ疔帯ニ多ク連続ス然

○輪狀者  
レテ被所

氏啼叫スル後ハ腹外ニ見<sub>レ</sub>サルホトニ  
去<sub>レ</sub>年縮<sub>ス</sub>

○臍帯ハ其根ニ甚<sub>ク</sub>多<sub>ク</sub>接<sub>シ</sub>テ結<sub>フ</sub>テ勿  
レ前<sub>ニ</sub>促<sub>シ</sub>皮被<sub>ノ</sub>臍帯ニ連続<sub>スル</sub>モ  
ノヲ緊<sub>ク</sub>結<sub>スル</sub>中<sub>ハ</sub>壞<sub>レ</sub>瘰<sub>ヲ</sub>皮<sub>シ</sub>易<sub>ク</sub>  
ハナリ○臍帯ノ殆<sub>ト</sub>脱<sub>落</sub>セントスルハ  
尚<sub>十分</sub>ニ熟<sub>シ</sub>テ居<sub>ル</sub>マテ其<sub>マ</sub>置<sub>直</sub>ヘ<sub>シ</sub>此<sub>ヲ</sub>  
強<sub>ク</sub>テ引<sub>キ</sub>離<sub>セ</sub>ハ潰<sub>レ</sub>瘍<sub>ヲ</sub>成<sub>シ</sub>或<sub>ハ</sub>此  
ヨリ出血<sub>スル</sub>テ稀<sub>ナラ</sub>ス此<sub>ヲ</sub>適<sub>宜</sub>ク壓<sub>シ</sub>  
止<sub>ル</sub>テ純<sub>ハ</sub>ス又洗<sub>滌</sub>止<sub>血</sub>ノ劑<sub>モ</sub>効<sub>ナ</sub>ク<sub>テ</sub>

死<sub>スル</sub>者<sub>多</sub>シ

往<sub>レ</sub>此<sub>ハ</sub>出血<sub>ノ</sub>臍<sub>ノ</sub>皮<sub>肉</sub>ヨリ来<sub>リ</sub>唯<sub>滴</sub>流  
スル<sub>ノ</sub>ニ<sub>十</sub>ル<sub>ハ</sub>危<sub>篤</sub>ナラ<sub>ス</sub>

如此<sub>ハ</sub>危<sub>篤</sub>ノ出血<sub>ハ</sub>レ<sub>レ</sub>ツト<sub>人</sub>柳<sub>栉</sub>ノ一  
片<sub>ヲ</sub>創<sub>ニ</sub>當<sub>テ</sub>牢<sub>ク</sub>着<sub>セ</sub>ル膏<sub>ヲ</sub>茶<sub>ヲ</sub>蓋<sub>テ</sub>  
封<sub>固</sub>セ<sub>リ</sub>

○臍帯ヲ引<sub>離</sub>シ或<sub>ハ</sub>其<sub>皮</sub>被<sub>ヲ</sub>結<sub>ヒ</sub>  
テ壞<sub>レ</sub>瘰<sub>ヲ</sub>癩<sub>スル</sub>モ人<sub>ニ</sub>死<sub>スル</sub>テ多<sub>ク</sub>シ此<sub>ニ</sub>  
良<sub>効</sub>ヲ得<sub>ル</sub>テ未<sub>タ</sub>證<sub>シ</sub>難<sub>シ</sub>○此<sub>ヨリ</sub>  
出<sub>血</sub>スル<sub>モ</sub>烙<sub>鉄</sub>等<sub>ヲ</sub>施<sub>シ</sub>ム痴<sub>ヲ</sub>生<sub>ス</sub>ル

玫瑰

其痲濕脫落シテ出血全ク遏止スル  
一紙ハサルモアリ故ニ前従ノ楳栴ヲ  
貼スル尤モ良法トス但シ此ヲ貼シテ後  
ハ精ク意ヲ用ヒテ小兒ヲ多ク啼シムル  
ナク又其体ヲ際締結シ壓スル勿レ此ヲ  
壓土榨シテ疼ヲ散セサルカ為ナリ

○或ハ臍帶甚々早ク脱スル中ハ潰瘍  
ヲ生シ又汚穢潰爛シ且ツ息肉ヲ生  
シ或ハ瘰癧トナリ此ヲ全ク遏止シ難  
キトスル○在産後ハ此潰瘍ニ赤膏

薔薇葉ノ細末ヲ搗シ或ハ石松實ノ細末  
ヲ搗ス但シ或ハ枯礬末ヲ搗ス者アリ  
コレ洗滌ノ功カニ由テ痲ヲ結フナリ

(注) 臍潰瘍ハ産後ノ候リニテ臍ヲ  
内部ニ壓作スルニ由テ散スルト多シ又如  
此壓土スニ由テ内部ニ潰瘍ヲ醸成ス  
ル者アリ又臍ノ肉破腫ヲ散スルモアリ  
此ハ結ヒ切リテ治スルナリ

○臍諸腫瘍ノ腹腫瘍ノ第十卷

示

疝腫起シテ潰瘍トナラサルモ通例  
腫瘍ト名<sup>此カ</sup>疝外ニ突出ス<sup>此</sup>ヲ  
エキセムバリト名<sup>此</sup>ニ種類多シ或ハ腸  
ノ突出或ハ疝破腫ト名<sup>ク</sup>

○腸ノ突出ス<sup>テ</sup>或ハ腹膜ノ破綻ニ  
由リテ此カ保出シ或ハ皮ヲ被テ突出  
ス故ニ破腫ノ類ニ收入レテ誤ラスト偶ッ  
ヘシ然レモ真ハ破腫ハ皮ヲ被フテ突腫  
スルナリ○腸カ疝ヨリ突出シテ生ル小  
兒甚タ罕ナラス此カ分娩ノ時トリア

疝

○保露

○母体ニ在テ  
既ニ此ヲ考

口皮下ニ

ツカヒテ廉鼻ハ十九ヨリ生スル<sup>テ</sup>多クシ○モル  
ガ<sup>二</sup>名<sup>人</sup>半産ノ胎ニ此病ヲ見ル<sup>テ</sup>アリ此其  
胎完クシテ諸膜ヲ被フテ脱出セリ其フ  
疝ニ腸固ク生着ニテ腹外ニ突出セリト  
然レハ此病ハ既ニ胎中ニ発スルナリ○フリイド  
人<sup>ノ</sup>後ニ一ハ兒腹膜ニ腸生着シ疝<sup>口</sup>  
輪状<sup>シ</sup>形成セリト但シ如此病ハ多クハ  
腸網、肝、胃、脾、等モ他ノ内臓モ此腸  
ノ突出ノ内ニ包容スル<sup>テ</sup>アリ  
○如此内臓ノ突出ハ大抵生レナカラニ在テ

胎児ノ腹中ニ膨脹スル所ノ水ニ由テ若及  
シ而白條任脈ノ健モ破裂セルナリ然レ此症  
亦生レテ數日ノ後臍帶ヲ引離スニ就  
テ獲スル一罕ナラズ此ニ由テ時日ノ遅速  
ハアレモ死ヲ免レス己十二時ヨリ多ク生  
活スル一罕ナレハナリ

○第一種ノ症ハ腸ニ腹膜ヲ被リテ突出  
ス此ハ一二ノ起因ニ由テ腹ノ筋皮破綻シ  
共ニ其筋皮ヲ加ヘテ突出ス又腸ノ蠕動機  
其完キ腹膜ノ内ニ在テ明カニ見ユ○

モルガクニ名ノ腹膜囊状ノ内ニ肝ヲ包ミ  
突出スルヲ見タト此  
腹膜囊

重復ナリ此腫壞疽トナリ生レテ三十  
五日ニシテ死セリ○此ノ如キ生レナカラノ臍  
破腫ノ種ナハ疑ヒナク此内ニ肝ヲ包  
ムナリ肝ハ突出セル腹膜ニ固ク生着シ此  
ニ諸筋連ルテナク皮ヲ牽縮シテ輪状ヲ  
為シ其突腫ノ外面此系色ヲ著セリ  
○第三種ノ突腫ハ臍破腫トナリ此亦種  
類多シ○此種ナク破腫ハ或ハ生レナカ

臍  
單層破腫ト稱ス  
ハ皮ヲ被フモノ

ラニ散セルモノアリ、或ハ生レテ後発スルアリ  
○生レテカラノ病ハ罕ナリ生後ノ病ハ多シ  
コレ甚タ啼叫シ并ニ臍差突起セルヲ  
壓布ヲ施サ、ルヨリ発スレハナリ

○或ハ此破腫ニ肝ヲ包容スルナリ此  
腸綱ヲ包ムナリ尤モ多シ○或ハ臍破腫  
ニ腹膜ヲ破ハサルモノアリ此ハ其膜破  
列衣セルナリ

○腹筋ノ腱質ノ牽張セルモノ臍ノ  
輪圍ヲ成スユエニ甚タ強靱、此ガ腸  
ノ筋ニ退クナリ但シ臍ノ近傍ニ突出  
スルハ臍破腫ト称スヘカラスシテ腹破腫ト  
称スヘシ

○破腫ニモ其突出ヲ容易ニ腹内ニ收  
メ容ルナラ得ルモノアリ或ハ久ク急リテ收  
ムルモノハ緊窄ニシテ容レ難キモノアリ此  
小兒ハ其体柔捷ナルユエ軟化ノ糊劑  
并ニ浣腸法ヲ施セバ其突出收リ易キナリ  
○此諸種ノ臍破腫アルユエニ治法モ亦  
一道ナラズト知ルヘシ

裸出

○腸が腹外に具露スルモノハ温乳  
汁ヲ蒸劑ノ如クニ施シ或ハ新クニ殺シ先  
獸ノ腸綱ヲ取テ蒸湯ニ此ニ由テ徐々ニ  
腸ヲ收メ内レ結法ヲ施シテ保固スヘシ  
然ル如此小兒ハ大抵ニ不日ニ死ス

○腸ニ腹膜ヲ被リテ突出スルモノハ此ヲ  
收メ容レ而メ輕ク壓定スルノ法ニ保固  
スヘシコレ予カ真ノ腑破癒ヲ治スル法  
下ニ從フヘシ○如此破癒ニ肝ヲ包シモノハ  
一月中ニ縮小スルナリ然ル如此カ兒ハ他病

ニ由テ死ス

○直ノ腑破癒ハ小兒ニ於テハ治シ易シ

生シナカラニ考ムセルモノハ其腑ヲ布ヲ結フニ  
一二方モ其腫瘍ヲ避テ結フヘシ然ラセ  
ハ其線ニテ腹膜ヲ結ヒ截ル中ハ腸カ  
腹外ニ保スレハナリ——物テ腹膜在  
ク被フ中ハ腸ヨク收リ結テ布ヲ施スニ由  
テ保固シテ治スナリ○此突腫腹内ニ  
收リテ後ハ鉛ノ薄片ヲ當テ或ハ肉豆  
蔻大ノ鑰球ヲ二ツニ割リ其半片ヲ置キ

出

真ノ腑破癒  
ニ由テ死ス

或ハレフマト名ノ法ノ如ク衛次ニ押ス所ノ  
 厭土布ヲ施スヘシ但シ此壓布ハ其最モ  
 下ニ當ル布ヲ廣クスヘシ然ラサレハ夫レ物  
 ニテ其孔ヲ押カメクナルニ由テ其腑痛孔  
 イヨク大キクナレハナリ壓布ヲ施シテ後ニ  
 繃子ヲ施スヘシ但シ甚シク緊札スルト勿  
 レ此ニ由テ毀傷スルトアレハナリ○パウリス  
 アエギ子ナ名ノ法ニ腸ヲ腹内ヘ收テ後ニ  
 所ノ皮針ニ絲ヲ通シ其連所ノ縦寬  
 ナル皮ニ引通シ結ヒ置クナリ又ニユラト名

○聚メ

モ此法ニ由テ治ル事ハ八日ヲ經テ其皮  
 既ニ服落セリ○幼弱ノ如ク右ノ法用  
 ヒ難シ唯適宜ノ繃子ヲ施シテ効  
 ヲ取ルヘシ○テレウ名此腫ノ性ヲ誤リ  
 認テ結ヒ切リ患兒死スルトシ犯セリ  
 ○或ハ此突腫ニ水ヲ集ルアリ此ヲ集ムハ  
 アキエウス或ハイトロムリヌト名クコレ腸破  
 腫カ臍ニ茂シテ腹水病ヲ併合スルユエニ  
 甚タ罕ナリ此腫ハ柔軟透亮水ノ流  
 動ノ声アリ此ハ腹内ニ收リカクシ此病ハ先ツ

○トナリ

○此ニ



腹水ヲ治スヘシ但シ小兒ハ腹水自參  
消散スルコトアリ故ニ腹水腫ハ内服劑  
ヲ用ヒ或ハ腹ヲ刺シテ水ヲ泄シ効ナク  
其水ヲ去リ治スヘシ但シ腹ヲ刺シテ水ヲ  
泄スヘシ小兒ハ施シ難キコト多クシ

○小兒生レテ三四日ニシテ起卧安靜ナラ  
ズ發熱シ横骨ヨリ臍マテニ一堅腫ヲ  
發シ甚ク疼痛シ此カ皮下ニ甚ク深ク  
根結セス此腫ヲ發スル見ハ多クハ死ス此  
腫ハ嫩衝スル種類ニシテ腹膜并ニ腹筋

ノ部ニテリ堅クシテ多クハ腹形ヲ為シ此  
ヲ按スニ宛モ綱如シ又嫩衝ノ條アリ  
此ハ臍動脈ノ壅塞ヨリ發ス予按ルニ  
臍帶ヲ截リ結フ中ニ其臍帶中ノ血ヲ  
壓出セス却テ其血ヲ腹ニ搾行スルヨリ發  
スルナリ○此治法ハ浣腸法ヲ施シ軟化シ  
蒸ニ柔ク腹ニ施シ夜分ニ右ノ如キ膏  
甘菜ヲ貼シテ治スヘシ

口軟化  
効アリ

○胤龍陰去寒破腫第十二早

胤龍并陰囊破腫生レナカラアルモノアリ  
 或ハ生レテ後棄スルアリ然レ共ニ腑破腫  
 ニ比スレハ罕ナリ○此ハ大氏小腸ノ各部  
 突出スルナリ己知見ノ時治セサレハ生涯迄  
 セス○陰囊破腫ハ他ノ破腫ト區別  
 アリ其故ハ陰囊中ニ腸下垂シテ瘰  
 術ニテ劬ナテ此ヲ收容トイフ此ヲ包ム  
 囊アルニ非ス唯辜丸ヲ包ム膜ナリ  
辜丸ノ包膜ハ  
 腸膜ノ鞘膜也 然レ往古ノ後ハ腹膜破裂  
 シテ奔セリトス故ニ亦破腫ノ名アリ○此

疝アリテ生ルハ見ヲ予此ニ詳ニ説ク所  
 以ハ近世ノ外科モ精密ニ記載セサ  
 レハナリ

○田方見未タ生レサルウチハ辜丸カ陰  
 囊中ニ下ラス腹中ニ在テ腰筋ノ上ニ於  
 テ腹膜被包シ宛モ腹中ノ他ノ諸臓  
 ノ如シ此腹膜陰囊内ノ下部マテ  
 行テ上細ク下闊キ管ヲ作シ此〇腺  
 質ノ物ヲ一織成スコレ陰囊ノ腺  
 質ノ織物ヨリ分レテ成ルナリ又此膜管

中ニ一二ノ肉纖維ト言フヘキモノアリ○  
 ヒユンテル名<sup>オモ</sup>意ヲク右ノ管ニ由テ臍  
 丸ノ下降ヲ扶ケテ依垂セシムト何ト十  
 レハ出產ニ近ツク頃ニ臍丸カ腹筋  
 ノ輪孔ヲ通シテ下行シ既ニ生ル時ニハ  
 大氏<sup>ノ</sup>胤籠マデ下ルナリ然氏生ルトイハ  
 陰囊衰マテ下ル者罕ナリ○  
 腹腔ニ水猪留スルハ臍丸下降スル  
 速カナリ○ハレル名曰ク臍丸ノ下垂ス  
 ルハ横隔ノ運動ニ因ルト然ハ横隔ハ

○丸ノ

未生ノ兒ニ於テハ運動スレキレ予按スル  
 ニ夫ノ膜管ニ由テ臍丸カ下部ヘ牽  
 引セラルナリ其故ハ一ニハ其管中ニ筋  
 纖維アルヲ以テ下降ノ運動ヲ為シ一ニハ  
 此管ト陰囊ノ腺質ノ織物ト連交  
 シコノ織物ハ胎月ニ合展完スルニ由テ  
 臍丸ヲ牽下スレハナリ○臍丸下降  
 スルハ腹膜ヲ以テ包ミ共ニ陰囊ニ下ル  
 即チ上尖リ下端キ懸垂ノ由囊管成  
 シ其下底ニ臍丸ヲ包容ス但シ上ハ完テ

○ミク

〇處

腹内マデ通ス故ニ腹ヨリ陰囊マテ  
通ル管ナリ此ヲ試ルニ七厘余ノ太サノ  
消息子ハ腹ヨリ陰囊マデ此管ニ由テ  
容易ク通スルナリ〇此管、小兒生レテ後  
久ク牙塞セス而ノ自ラ精血脈ニ固着  
シテ鞘状衣膜ヲ成ス此ノ固着スルハ腹  
筋ノ輪孔ニ就テ初メニ上部ニ着ク此處  
ニ於テ此膜ガ障膜ノ如ク或ハ半月状ノ縊  
績ヲ成シ此孔ニ處置セリ〇然ルニ此管ノ  
下部即チ上臍ノ在所ハ固着セス故ニ

〇繼

臍丸ノ寬疏ニシテ陰囊中ニ運動スル  
ナリ〇此管ハ大人ニ於テモ吹ク中ハ  
氣通シテ遍ク膨脹スコレヲ親シク刑  
屍ニ就テ兩臍丸ノ管膜ニ就テ試  
タリ此ヲ以テ予按スニ諸解剖家ニ  
於テコノ鞘状衣膜ノ真ノ起原并ニ性質  
ヲ今マテ發明セサル一怪シムヘシ  
〇右ノ如クナルニ臍丸ノ下行スルニ就テ未  
タ其孔ヲ示サルウチハ腹ヨリ陰囊マテ  
其道ヲ通シテ一腸并ニ腸網モ下行

シテ破腫ヲ散スルヲ稀ナラス

○腹部ニ水瀦留スルハ陰囊ニ下流

シ真ノ水破腫ヲ散シテ生ルハナリ其見

仰臥スレハ其腫消散スヨシ其管ヨリ

腹ニ返流スレハナリコレヲ一古ハ破腫

ト名ルヲ疑○其管孔牙チ甘ルハ破

腫ヲ兼ズトイハレ聖丸カ陰囊ヨリ腹

中ニ返行スルモノアリ

○女児ニ於テモ亦右後腹ノ腹膜ノ

管下此ハ子宮ノ圓韌帶ヲ崩落マ

口生レテ後

テ包容シ腹筋ノ輪孔ニ就テ生着在

牙ス然レ其管内牙スレテ空間ヲ

為スモノアリニエクハコレヲゲルキエリムト名

此管孔モ男児ニ於ルカメク崩落

腫ヲ散スルノ道ヲ為ス女児ニ於テハ腹

筋ノ輪孔下ニ亦腺質ノ織物ヲ以テ

韌ヲ成シ此ヲ以テ幼生女児ニ於テハ多ク

崩落腫ヲ散シ年長セル婦人ニ於テ

ハ腹破腫ヲ散スレテト名曰ク予今ニ

至ルマテ生シナカラノ崩落腫女児ニア

○女児ニ於テ

ルヲ見ス比自生シテ後ニ此及セリト○此鞘  
膜ガ圓鞞帶ニ周ク固着生合セサル  
片ハ水破腫ノ一種ヲ被ス○往年ケア  
シフ<sup>名地</sup>ニテ解剖術ノ觀場ヲ見ルニ一  
老婦ノ屍ノ腹筋ノ輪孔ノ直下ニ一囊  
アリテ清澄ノ水允滿セリ此ヲ以テ右ノ  
症ヲ徵スルヲアリ

○註 右ニ記ス尿管ハ既ニガレヌス<sup>名</sup>ノ書ニ  
男子ノ記シニエツク<sup>名</sup>ノ書ニ婦人ニアル  
ヲ化セリ然氏詳明ナラス

○ニアルヲ

○如此生シナカラノ破腫ハ或ハ云フ直チニ  
治シ難シ稍長育シテ治法ヲ施スヘシ此  
ニ破腫<sup>ニ</sup>縛帶ヲ施トイ<sup>ハ</sup>氏脆弱ナルユエニ其  
部ノ速ニ愈ルホドニ固結スルヲ純ハス又此  
小便ノ頻數ナルユエニ日<sup>ハ</sup>常コレヲ施シ進  
ト然氏此症ヲ早ク治セサレハ幾多ノ惡症  
ヲ継發スルユエニ速ニ施スホドイヨク容易  
ク治スヘキナリ予ニ於テハ煩勞ノ古又ヲ  
為サス唯速カニ縛帯ヲ施スノミ小兒此  
破腫アルウケハ病弱ニシテヨク長育セ

風雲堂

○ヨク按シ

ス然ルニ此志ヲ治スハ甚々壯健ニシテ  
ヨク長ク育スルヲ予シバク見ル所ナリ  
此ハレフレト名ノ筋破腫ニ施ス如ク漸次ニ  
壓布ヲ施シ而シテ縛帶ヲ施スヘシ此ハ  
縛帶ノ中、筋筋縮縛ト名ルモノヲ施ス  
ヘシ又小兒ハ大便ニ由テシバク新ニ更ニ  
ヘシ又手ニテ徐々ニ腸ヲ容レ納スヘシ

○陰囊、尿管、陰莖病患ノ第十三章  
前章ニ於テ臍丸カ腹部ニ陰囊ニ下

○中

降スルノ理著明ナリ但シ臍丸カ初生ノ  
見ニ於テ尚腹中ニ留リ腹筋輪孔  
ニ留テ下ラサルモノアリ此ハ意ヲ用ヒテ  
ヲ押スヲナキヤウニスヘシ○初生ノ兒筋  
ニ腫起ヲ散スルモノハ臍丸既ニ下ルカ或  
ハイマタ腹中ニアルカヲヨク見ルヘシ又此  
ガ臍丸カ破腫或ハ軟腫ニテ膿ヲ  
為スヘキ性ノ腫ト相混スルヲナキヤウニ  
診察スルノ最モ緊要ナリ

○臍丸カ腹筋輪孔中ニ留テ下ラ

○由テ散  
スルモノヲ

ナルモノハレフレト人ノ從ニ鞏丸ヲ指ニテ  
 引出シ或ハ下方へ押シ其間小児ヲ啼  
 叫セシムル中ハ此力下ルト云リ然レテ予按  
 スルニ小児ニ疼痛ヲ起シ却テ其腫ヲ  
 增長スル一ノ危懼アル工工ニ容易カニ  
 為シ難シ故ニ此ハ軟化スルニ由テ柔骨  
 柔肉ヲ施スニ此ニ由テ腹筋ノ輪孔  
 柔緩トナリ鞏丸漸次ニ其膜管ニ  
 由リテ下降スルナリ

○惣テ今晚ノ時殊ニ其見足ヨリ生レ

或ハ尻ヲ出ス等オモノシカニ壓シ在ニ産後  
 ノ不練ナリニ由テトリアツカイ悪心キ中ハ陰  
 所ニ堅硬ノ腫ヲ生シ膿潰スル一罕ナ  
 ラス如此病ハ分利疏散ノ甘菜草ヲ酒煮  
 テサ蒸スニコレ鞏丸ノ硬腫ニ施シテ  
 亦良ナリ或ハ乾キ名囊ニ苦菜花  
 草蔘蔘花ヲ充テ此ニ竜腦少許加  
 一テ施シテ亦良ナリ

○初生兒ニ於テ水腫ニ二種アリ一種

ハ類破腫ハ陰囊ノ腺質ノ織物ニ及



ク水充滿ス此カ生レテ後甚キモノアリ或  
ハ寡少ナルモノアリ或ハ少見甚シク啼叫ス  
ルヲ以テ水様液還リ退クヲ障碍カシ  
イヨク腫起スルモノアリ。ピエツス各人後ニ如  
此水破腫ハ乳母ヲ更ルヲ以テ治スル  
アリト云一リ

（注）或ハ少見生レテ後速カニ陰囊腫  
起レ此ニ由テ一二患志ヲ發セサルモノアリ  
予ニ種ノ志ヲ見テアリ此ハ少見生レテ  
速カニ甚シキ陰囊腫ヲ考レ此ガ

如此

甘条リセスレテ漸ク消散セリ

○一種ハ真破腫ト名ク此ハ夫ノ膜管  
中ニ水聚リ滿ルナリ

○類破腫ノ治法ハ大凡小兒年長ハ  
ハ自ラ治シ或ハ洗滌ノ効アリ甘条草ヲ  
酒ニ煮テ子スレ或ハ苦味ノ甘条草ノ煎  
湯或ハ石灰水ト大酒ヲ等分ニ合シテ  
子スルヲ施シテ治ス

○真破腫ノ治法ハ少見ヲ仰臥セシ  
殊ニ膜管カイマダ生着セサル者良ト

〇ムヘシ

○復々瘻  
ス故ニ此ヲ

ス其故ハ其水カ膜管ヨリ復々腹中  
へ歸レハナリ如此スレハ暫時生水消ス  
ト雜モ全治スルニハ此ヲ壁塞スルニ壁  
布ヲ施シ又洗滌ノ糸ヲ施スヘシ  
○之則ニ後ク所ノ凡破瘻ト此水破瘻ト  
ハ同病トス故ニ其治法モ同シクナリ  
仰臥セシメ而メ疏散シ洗滌ノ糸ヲ系  
ヲ施スヘシ

○但シ治方ヲ怠ルニ由テ膜管ノ下  
部ニ真ノ水破瘻殘ルモノ其見頗ル長

○狭窄ニ

レテ後刺破レテ水ヲ漏泄シ而メ強仕  
スル劑ヲ外用レテ治シ或ハ其瘻再發ス  
ルモノ如此自然ニ反セル囊ヲ截リ貫キ  
或ハ膏糸ヲ施シテ膿ヲ成シ其鞘狀  
衣膜ヲ生合セシメ脉外ノ水再々此内ニ泄  
出スルヲ無ラシムヘシ

○初生兒ノ陰莖種々患志ヲ散スル  
多シ或ハ龟头皮甚ク長ク突出スルモ  
ノアリ或ハコシが生着スルモノアリ○龟头  
皮長ク突出スルモノ小便スルニ妨ケ或ハ

透

亀頭ト其皮ト間ニ結石ヲ生ヌ如此志  
ハ截断シテ治レ或ハ此術ヲ施シ雖キモ人  
成長スルマテ此ヲ俟ヘシ然モ亀頭皮生  
合牙着シテ其孔通セサルモ人截リ完テ通  
スレシ○初生見ニ於テ亀頭皮并ニ亀頭  
甚ク腫起シテ亮ノ囊ノ如クナル志ハカラ  
スコレピモシス病ノ一種ニシテ水腫質  
ナリ此ハ其部ヲ壓スラアルニ由リ或ハ皮ト  
肉トノ間ニ水留滞スルヨリ常ノ水腫ニ  
由テ發レ或ハ亀頭根ヨリ滲出スル所

其腫

脂様ノ液ノ大ニ聚積スルヨリ發スルナリ  
○右ノ起因各ク區別シ易ク其故ハ水  
腫ヨリ起ルモノハ陰莖ノ下部ヨリ始ル  
或ハ脂様ノ液ヨリ起ル者ハ亀頭ヨリ始  
ルナリ○水腫ニ由テ發スルハ疏散其葉  
草ヲ囊ニ盛テ蒸マキトシ又輕キ下劑ヲ  
用ヒ并ニゼーアイウインノ蜜醋ヲ用レハ其腫  
減レテ全治ス但シ脂様ノ液ヨリ發スルモノハ  
消息子ヲ以テ其脂様ノ物ヲ除キ又乳  
母ヲレテ亀頭ヲ吸ハシムレハ治ス

廣學

風雲

○右ノ起因ニ由テ小便動モスルハ牙塞ス  
ルト多シ但シ尿管牙塞シテ小便牙  
ヲ殺スルモノハ殊ニ危険トス其故ハ尿管  
カ粘液ニ由テ牙塞スル中ハ消息子ヲ  
刺ス後其粘液池除スレハ小便勿心ヲ通  
利ス然凡  
初生児ニ於テ尿管  
ノ端末ノ處或ハ深ク根本ノ處生着  
牙塞スルモノハ外科速カニコレヲ瘳セサレ  
ハ死スルナリ

屏雲堂

ノ自然ノ良能ニテ膈ヨリ膀胱ニ連ル  
所ノ膈尿管ヨリ小便自ラ膈ニ通泄ス  
ル者アリ故ニ膈ノ尿管孔日常<sup>アタ</sup>兵キテ  
愈<sup>ユ</sup>ル<sup>ル</sup>トナシ如此小児年齢不同アレモ予  
シバク見ル所ナリ

兵

○尿管ノ孔甚ク窄狭ナレモ通スル者ハ  
接骨木枝ノ髓或ハ水棉或ハ尤モ良ナル  
ハ細キ蠟捻子ヲ造リ其孔ニ挿刺シテ  
漸次ニ廣凋ニスレ然凡其孔廣凋ナ  
ラサルモノハ細キ中刀ヲ以テ兩側ニ截リ廣

風雲堂

ケルコアリ或ハ其孔ノ端ニ薄膜アリテ  
牙塞スルモノハ此ヲ截リ尻キ其孔ニ軟カキ  
綿撒絲ニテ製シタル維子ニ油ヲ塗リ  
挿シ絲ニテ抜ケサルヤウニ結ヒ置テ其孔  
ヲ牙ヲササルヤウニシ或ハ蠟捻子ヲ刺スニ  
**注**或ハコレニ管ヲ造リ刺スモノアリ然凡  
此ハ維子ヲ刺スヨリハ尚無益トス其故ハ  
小便通スルニ由テ牙着スルコトナキユエニ  
維子サエモ少ナル莖孔ニ挿シ維キコト  
レナリ

○ヘイステル名曰ク亀頭ノ孔牙着スルヲ  
貫尻スルニ眼障ニ用ル鍼ヲ以テシ或ハ  
小刀ヲ以テスルヲ良トスト然凡其膜厚  
キモノハ管針ヲ以テスルナリ  
○亀頭ニ通例ノ孔ナクシテ  
陰莖根ニアリ或ハ會陰ニアリテ此  
ヨリ小便漏泄スルモノアリ此ハ其孔ニ消息  
子ヲ刺シコレヲ亀頭ノ方ニ向ケテ輸リ  
コレガ通例ノ亀頭ノ孔ニ通ズルカ或ハ尿  
管ガ亀頭孔マテ尻通セサルニ由テ消息

風藥

○ヲ刺レ此

子通セサルカラヲ試ムヘシ如此牙着セルモノ  
ハ管針ヲ以テ新タニ管ヲ造リコレニ縫  
ヲ刺レ或ハチヲニスルノ儀ノ如ク  
ト澁タ合牙セサラシムル為ニ管○ヲ長クシ  
テ夫ノ自然ナラサル漏孔ノ處マテ刺スヘシ  
○メルキアリスルハ亀頭ノ孔ナキモノヲ圓  
キ烙鉄ニテ串透スコレニ由テ出血ナク又  
其串孔硬ク膀胱質トナルカ為ナリ然レ  
此ハ今時施スモノナシ

○新尿管ヲ造リテ後ハ夫ノ漏孔ヲ愈  
スヘシ此ハ或ハ腐系ヲ施シテ其膀胱質  
ノ縁ヲ除キ愈スナリ然レチチヲニスル  
ヘイステルノ法ヲ良トス此ハ其縁ノ膀胱  
肉ヲ截リ去ルナリ其故ハ腐系ニテハ重  
キ煖衝ヲ惹クアレナリ○或ハ其孔縁  
ヲ針ニテ縫ヒ合着セシムルナリ縫ハス  
レテハ合着スルナケレバナリ○古法ニ亀  
頭ヲ切り去リ或ハ鑿ニ割ルナリ予ハ  
コノ兩件ヲ棄度ス  
○尿管尽ク貫通セス至ク尿管ナキモ

風雲堂

風雲堂

○其腫ヲ

ノハ前ニ後クめク夫ノ臍尿管ヨリ小便  
通シ或ハ尿管力直腸ニ通スル非  
レハ速カニ死ス如此志ハ前記ノ如ク小便  
聚ル所ニ動モスレハ自然ナラサル孔ヲ生シ  
テ通泄シ或ハ一腫瘍ヲ生スルナリ如  
此ハ其マニ彙舎ヨリハ刺死シテ小便  
通セシムルヲ良トスコレニ由テ自然ナラサル  
孔ヲ残ストイハレ其見ノ命ヲ救フカユ  
エナリ○イステル人後ニ會陰ヨリ膀胱  
ハ串刺レテ救フナリ然レバ未

○其部ノ

此術ヲ此志ニ施スナレト云リ其餘此  
ヲ施シ先治鬚ヲ聞ズ

○女児陰門生合、肛門合着、第壹章  
陰門唇ニ腫爛衝ヲ生シ膿潰スレ  
アリ此志ハ撲損傷或ハ其他ノ外傷ヨリ  
生ズルモノハ甚急ニ治シテ大抵ニ速ニ  
治スレバ然レバ如此外傷ナクシテ生ズルモノハ  
腫ニ尿管ニ自然ニ被布スル所ノ粘  
液ノ酷厲毒アルニ由テ潰膿スルカヲヨク

○レバク

鑿察スヘシ如此病温湯ニテ洗淨シ而  
輕キ乾燥ヲ施セハ治スヘシ

○右ノ如キ潰瘍女見ニ瘡シ或ハ男見ニテ  
モ如此種類ノ諸病ヲ瘡スルテ父母ノ梅毒  
ヲ遺傳シ或ハコレヲ乳母ニ付染スルニ因ル  
モ人精慎細戒ヲ加テ水銀劑ヲ用ユヘ  
シ然レバ如此ノ見ハ死スルテ多シ

○陰門生着牙合シテ生ル者アリ此亦  
輕重種類多シ

○或ハ陰門ノ孔全ク合牙シ全ク小便通

○法ヲ施シ  
且ツ  
○全ク

スルヲ能ハス唯陰所ニ凹溝ノ状アルノミノ  
者アリ此病ハ物心テ其凹溝ノ状ニ就テ截  
リ尻キ瘡スヘシ○或ハ云フ此病ハ生レテ  
一兩日過ルマテ截リ尻クナキヲ良トス其  
故ハ小便潴留スルニ由テ其截リ透スヘキ  
所自ラ起脹シ小刀ヲ以テ截ルヘキ所ヲ  
知ルニ宜シト然レバ此見ニ瘡術ヲ施スルナキ  
中ハ重志ヲ瘡スルニ却テ輕キ截尻○  
細慎シテ施セ急危殆ナキニ遲滞セズ  
速ニ瘡スルヲ良トス

風雲堂



○コレカ狭窄  
ニシテ

○多ク封牙  
セル  
○其傷

○凹溝  
ル

○尿管ノ孔造カニアリトイハ居其尿管ヲ  
尽ク通泄スルヲ能ハサルハ此ニ由テ小便  
其膜後ニ留滞シテ汚穢ニ濕爛シ皮  
剥傷シ或ハ此ヨリ直腸ニ連及スルアリ  
故ニ此病モ亦療術ヲ遲延セス速カニ施  
スヘシ此消息子ヲ其孔ニ刺シ此ニ倚  
テ小刀ヲ加ヘ其膜ヲ上或ハ下ニ截弇クシ  
但シ此ニ就テ膀胱或ハ直腸ヲ毀傷セサ  
ルヤウニ意ヲ用エシ皆人知ル如ク如此部  
ノ創傷ハ危険ナレハナリ

○通例  
如

○ル  
ハ  
ニ

○第三ノ病ハ腔ガ唯處女膜ニ由テ牙塞  
ス尿管ハ厚キ膜ニテ全ク牙塞スルナ  
リ此病ハイカホド腔ガ弇キアリモ小便  
通セス又甚ク細キ消息子ヲ挿ストイハ  
尿道ヲ發見スルヲ能ハサルヲ以テ知ルヘシ  
如此膜ハ甚ク細キ三稜針ニテ貫透スヘシ  
ヘイステル名<sup>人</sup>カブロウ<sup>ス</sup>名<sup>人</sup>如此女児成長シテ  
二十歳ニナリ小便ハ膀胱尿管ヨリ通泄スル  
者ヲ見テ其尿管ヲ穿ル膜ヲ截テ治シ  
又吐綴約此角ノ如キ紐子ヲ造リ膀胱ニ刺シ

○痂ヲ成シ

膈外ニ垂ル一三分許ニシテ結ヒ着<sup>ツケ</sup>其後  
其處ヲ燒テ○十二日ニシテ其創ニ痕ヲ成  
シ愈<sup>ナリ</sup>ト云<sup>ハリ</sup>

○下<sup>リ</sup>此

○尿管<sup>ニ</sup>通スルモノト雖モ處女膜ヲ以テ  
陰門全ク閉ル者○月經通スル年齢マテ  
切ル<sup>ト</sup>ナフ<sup>レ</sup>テ害ナシ此膜ヲ切ルニ幼見ハ其  
周邊ヲ毀傷スル<sup>ト</sup>アレ<sup>ハ</sup>ナリ年齢長<sup>ク</sup>月  
經来<sup>レ</sup>此膜アル<sup>ヲ</sup>以テ通セサル候ハ婦人  
通例月經来ル時ノ諸症ヲ發シテ經水  
ナク其膜後ニ留<sup>リ</sup>蓄スル<sup>ヲ</sup>以テ其膜差<sup>ナ</sup>

○血

腫起スルナリ此症ハ其膜ヲ斷<sup>ス</sup>ニ切<sup>リ</sup>或ハ十  
字状ニ切テ月經ヲ通ス<sup>ヘシ</sup>

○處女膜<sup>ヨク</sup>貫破ス<sup>ヘシ</sup>或ハ此膜厚<sup>ク</sup>  
シテ交媾ノ時男子ノ精液子宮マテ届<sup>カ</sup>  
ラサルモノアリ如此ハ子ヲ孕ム<sup>ト</sup>能ハス或ハ  
處女膜ヨク破裂セ<sup>ス</sup>レテ孕ム<sup>ト</sup>アレ<sup>ハ</sup>其  
兒ノ分娩ヲ妨ケ生レカ<sup>ク</sup>キ者アリ凡テ如此  
症ハ其膜ヲ斷<sup>ス</sup>ニ截<sup>リ</sup>或ハ十字状ニ截<sup>リ</sup>  
展<sup>ク</sup>ヘシ

○處女膜重複ノモノアリ一ハ低ク一ハ高ク

高ハ深ナリ  
低ハ浅ナリ  
アルナリ  
○或ハ臍ノ生着牙合スルモ

稀ナラス此臍ノ内圍

令婉ノ時毀傷ヲ

為レ且ツ潰瘍トナリテ終ニ愈合スルナリ

○初生ノ女児ノ臍尽ク生合シテ孔十

キモノアリ此ハ全ク治セズ截弍トイヘ血

出スシテ死ス○臍牙塞シテ肛門ニ其孔

相通シ或ハ腹ニ孔ヲ弍ク等ノ疝モ亦不

治ニ屬ス

○初生児ノ肛門牙塞セルモノアリ或ハ其

孔入至クナキ者アリ此ニ由テ黒糞腸中ニ

畜留シテ危志ヲ發ス則チ腹腫脹シ

種々ノ患志ヲ發シ劇痛、嘔吐、激衝、

發熱等ヲ發シコレヲ務セサレハ其見七

日ノ中ニ死ス○此志輕重ノ差別アリ牙

一腸牽縮シテ大便適宜ク通セス淋漓

シテ通ズ者アリ此ハローンホイセン名ノ説ニ

肛門ニ腫瘍ヲ生シ此カ

壓生スルニ由テ閉塞スルナリト此ハシバク軟

化ノ浣腸法ヲ施シ直腸ニ蠟捻子ヲ挿

テ良効アリ然此ヲ挿シテ

小児ノ動搖スル言損害ナキヤウ

ニ精ク意ヲ用ユシスキユルテクニス人ノ後ニ

如此腸ノ牽縮スル志ハ直腸ヲ截リ<sup>七</sup>洞

ケ或ハ截ルナク唯畜膽根ヲ直腸

ニ刺シテ甚タヨク<sup>七</sup>洞カルナリト云リ或ハ

ロインホイセン<sup>八</sup>ハサ園切刀ヲ以テ肛門ヲ截

リ<sup>九</sup>兵キ<sup>十</sup>兩側ハ<sup>十一</sup>鉸刀ニテ截リ<sup>十二</sup>洞ケ其創

ヲ尋常ノ如ク瘡ス<sup>十三</sup>ト云リ然<sup>十四</sup>予按<sup>十五</sup>ル

ニ直腸ノ<sup>十六</sup>膀胱<sup>十七</sup>結<sup>十八</sup>ルヲ截断ス<sup>十九</sup>ト甚タ危

〇就テ

殆ナリトス故ニ<sup>一</sup>唯<sup>二</sup>經子<sup>三</sup>或ハ<sup>四</sup>穢<sup>五</sup>捻子ヲ

挿シ良トス予如此小児ヲ瘡セリ此見浣腸

法ヲ施シ<sup>六</sup>難ク又施ストイ<sup>七</sup>凡<sup>八</sup>腸ノ<sup>九</sup>牽縮

ノ<sup>十</sup>處<sup>十一</sup>深キユニ<sup>十二</sup>速カニ<sup>十三</sup>其液<sup>十四</sup>流出ス此<sup>十五</sup>症

日ヲ<sup>十六</sup>經テ<sup>十七</sup>自然ニ<sup>十八</sup>治セリ

〇直腸<sup>十九</sup>尽ク<sup>二十</sup>閉塞スルモノ尤モ<sup>二十一</sup>治シ<sup>二十二</sup>難シ

但シ<sup>二十三</sup>腸カ<sup>二十四</sup>薄膜ヲ<sup>二十五</sup>以テ<sup>二十六</sup>其端ニ<sup>二十七</sup>封<sup>二十八</sup>牙

スルモノ<sup>二十九</sup>堅ニ<sup>三十</sup>切り或ハ<sup>三十一</sup>十字<sup>三十二</sup>状ニ<sup>三十三</sup>切りテ<sup>三十四</sup>兵<sup>三十五</sup>ク

ヘシ<sup>三十六</sup>フレット<sup>三十七</sup>名<sup>三十八</sup>ノ<sup>三十九</sup>後<sup>四十</sup>ニ<sup>四十一</sup>此ハ<sup>四十二</sup>圓ク<sup>四十三</sup>截リ<sup>四十四</sup>取ルヘシ

其<sup>四十五</sup>創<sup>四十六</sup>唇<sup>四十七</sup>膿ヲ<sup>四十八</sup>成ス<sup>四十九</sup>後<sup>五十</sup>合<sup>五十一</sup>着セ<sup>五十二</sup>ス<sup>五十三</sup>自然ノ

○大便スルニ

○効アリ

○此

○小カヲ

形ニヨク愈ルナリト ○截疝テ後直腸ニ  
 指ヲ入テヨク疝通スルヤ否ヤヲ探リ知ルヘ  
 シ但シ其狭窄ナルニ由テ小兒甚々疼痛  
 ヲ被スルモハ 蠟捻子或ハ消息子ヲ刺ス  
 へシ其間ニ黒糞ヲ通スルハコレ直腸疝通  
 スルノ良候トス若シ黒糞ヲ通セサルモハ  
 輕キ浣腸法ヲ施シテ催起スへシ此由  
 テ黒便十方通スル後ハ紐子ヲ挿シ小  
 兒大便スル毎ニ新更へシヒルメヌハ  
 鉉管ニ乾燥セル軟管ヲ塗リ

細慎シテ直腸ニ挿スナリコレニ由テ大便  
 其管ヨリヨク通スルヲ能ハス ○此ニ壓  
 布ヲ施シ而シテ締ヲ為スへシ此ハ工ノ  
 字ノ形ニスルナリ  
 ○或ハ其膜直腸ニ甚々深クアリテ封牙  
 スルモノ用ヒ紐ヲ且ツ危險ナリ此ハ管  
 鍼ヲ用テ貫破スルヲ尤モ良トス但シ腸  
 ノ裏面ヲ毀傷セサルヤウニヨク注意ヲ用ユ  
 へシ  
 ○直腸ニ厚キ膜アリテ牙塞スルモノアリ此

pharyngotomus.

trochant.

次其孔ヲ穿<sup>スル</sup>ニ<sup>ル</sup>孔<sup>ニ</sup>ニ<sup>テ</sup>膜<sup>ヲ</sup>厚<sup>ク</sup>且<sup>ニ</sup>腺  
 質<sup>ノ</sup>織<sup>物</sup>アリ<sup>テ</sup>肛<sup>門</sup>ヲ<sup>封</sup>閉<sup>スル</sup>ナリ<sup>但</sup>シ  
 此<sup>ノ</sup>膜<sup>ハ</sup>肛<sup>門</sup>ノ<sup>口</sup>ニ<sup>ア</sup>ラ<sup>ズ</sup>腸<sup>ニ</sup>深<sup>ク</sup>アル<sup>モ</sup>ハ  
 トロイス<sup>ス</sup>名<sup>ルト</sup>瘻<sup>具</sup>名<sup>ト</sup>或<sup>ハ</sup>最<sup>良</sup>ナル<sup>ハ</sup>ハリ  
 ゴト<sup>ニス</sup>ユ<sup>ス</sup>上<sup>ヲ</sup>用<sup>ユ</sup>シ<sup>テ</sup>前<sup>ニ</sup>後<sup>ク</sup>腸<sup>膜</sup>ヲ  
 毀<sup>傷</sup>セ<sup>サル</sup>ヤ<sup>ウ</sup>ニ<sup>精</sup>慎<sup>シ</sup>テ<sup>施</sup>ス<sup>ヘシ</sup>  
 ○肛<sup>門</sup>ノ<sup>孔</sup>ナ<sup>ク</sup>會<sup>陰</sup>ヨ<sup>リ</sup>尾<sup>骨</sup>ニ<sup>至</sup>  
 ル<sup>マ</sup>テ<sup>其</sup>孔<sup>ハ</sup>状<sup>ナ</sup>キ<sup>ハ</sup>鼠<sup>毛</sup>陰<sup>疝</sup>ト<sup>ス</sup>如<sup>シ</sup>  
 ハ<sup>見</sup>ハ<sup>肛</sup>門<sup>ガ</sup>或<sup>ハ</sup>陰<sup>莖</sup>或<sup>ハ</sup>腫<sup>或</sup>ハ<sup>疔</sup>  
 或<sup>ハ</sup>膀胱<sup>ニ</sup>尾<sup>骨</sup>通<sup>スル</sup>者<sup>甚</sup>タ<sup>ス</sup>故<sup>ニ</sup>

膜ニ一ニ腺様ノ織物アリコレ肛中ニ在テ  
 ハ外ヨリ見一カタシ此膜所在モ明白ニ  
 知レカタキ故ニコレヲ切ル浅深モ測リカタシ  
 糸<sup>氏</sup>肛門孔ヲ塞<sup>シ</sup>テ肉<sup>様</sup>ニ腫<sup>起</sup>シ此  
 ヲ指<sup>ニ</sup>テ押<sup>ハ</sup>退<sup>キ</sup>稍<sup>ヤ</sup>流動<sup>ノ</sup>毛<sup>ノ</sup>アル<sup>ヲ</sup>覺  
 一指<sup>ヲ</sup>去<sup>レ</sup>ハ復<sup>タ</sup>起<sup>脹</sup>スル<sup>モ</sup>ハコレヲ知リ  
 易<sup>シ</sup>此<sup>ノ</sup>候<sup>アル</sup>ハ前<sup>ノ</sup>儀<sup>ノ</sup>如<sup>ク</sup>切<sup>リ</sup>尾<sup>骨</sup>ニ  
 ○昔<sup>時</sup>バ<sup>ゲ</sup>ユ<sup>ア</sup>名<sup>地</sup>ノ<sup>産</sup>産<sup>婦</sup>肛<sup>門</sup>生<sup>合</sup>牙  
 着<sup>ノ</sup>疝<sup>ヲ</sup>唯<sup>針</sup>ヲ<sup>以</sup>テ<sup>截</sup>ス<sup>キ</sup>其<sup>孔</sup>ニ<sup>蠶</sup>  
 簾<sup>根</sup>ノ<sup>一</sup>片<sup>ヲ</sup>挿<sup>シ</sup>テ<sup>洞</sup>ケ<sup>希</sup>此<sup>法</sup>漸

風雲堂

腸ガ膀胱或ハ陰莖ニ不通スルモノハ  
死スコレ大便ガ膀胱或ハ陰莖ヨリ通  
利スルヲ能ハス終ニ壞疽ヲ起スルヲ  
但シ腫ニ不通スルハ甚ク危殆ナラズ此  
ヲ以テ成長スルナリ然レ此ヲ救療スルノ  
術ナシ

○或ハ直腸カ囊ノ如ク孔ナク其骨ニ着  
キ此内ニ塊車ナル如ク其内合着シテ  
空ニ管ナク死モ網ノ如ク肛門マテ連ルモノ  
アリ○前志ト此志トヨク區別スヘシ此ハ

前説ノ志ハ大便自ラ他ノ部ヨリ通泄ス  
コレ其處ニ肛門ニ通スルノ候ナリ此ニ云フ  
志ニ絶テ此候ナシ未熟ノ外科右候  
ヲ察セス肛門ニ截ノ術ヲ施ス後ニ於テ  
瘻ニハ膀胱ニ不通スルヲ始メテ知ル  
テリコレ外科ノ候リト認ツシ其故ハ如此  
膀胱ニ不通ストイレ直腸ニ通孔ナク  
レハ術ヲ施トイレ其妻ヨリ死スレハナリ  
○腸尽ク管形ナク前説ノ如キ其甚ク  
罕ナリコレ志ハ直腸ガ網ノ如ク空ニ

ク又外面孔ナシ○如此志ハ危懼ナキ  
カラナルユエニ療術ヲ遲延スルナリ然レ切  
リ尻ント欲セハ先ツ其切ルヘキ処ヲ考テ  
用テ考テ一ニ此ハ大段ニ通例肛門ノ孔ア  
ル所ヲ察スルナリ但シ幼見ハ尾骶骨多  
クハ軟柔ナルユエニ此ヲ按シテ其骨ト肉  
質ノ部ト弁別シ難キナリ故ニヨク精  
察シテ肛門ト骨ト分ツニ  
○截尻術ヲ施スニ就テ考フヘキハ先ツ外  
面ヲ截尻クノ後直腸端ニ処マテ

深ク穿用シテ直腸ノ下端ヲ母見尻  
スレハ通例ノ人ノ如キ肛門ノ側括約筋アル  
ナリ但シ此ニ就テ腸ノ側面ヲ刺傷スル  
ト勿レ然レ甚タ深ク穿有セサルモハ  
黒糞ヲ停留スルヲ以テ肛門ノ処腫起ス  
ルヲ以テ療術ヲ施シ易シ故ニコレヲ母見  
尻スレハ黒糞流泄ス若シ他ノ処ヲ截尻ケ  
ハ黒糞出ズ諸患忘テ休ズ尚又斯  
ノ如ク外面ヲ截リ尻ト一ニ正ク腸ノ囊  
底ニ届ラス尚イヨク深ク腸ノ在ラサル傍



〇黒糞流  
ニ由テ其  
創内ニ

〇直

側ヲ截リ行ケル腸<sup>長ク</sup>突垂シ腸破腫ノ  
一種ヲ成シコレヲ<sup>長ク</sup>突截スレハ患者死ス  
〇此ニ反シテ正ク腸ノ下端ヲ突截スレハ  
黒糞流泄シ瘻術功ヲ得テ通例女  
名腸<sup>見</sup>見ハナリ〇一見此志アリテ截<sup>見</sup>  
キ適宜ク直腸ノ下端ヲ貫<sup>見</sup>突截シコレガ  
其中他ノ患志ヲ及セズシテ創治シ  
功ヲ收ムルモノアリ

〇予按スルニ外面ヲ截<sup>見</sup>突テ後黒糞流  
ニ<sup>見</sup>見ハシス腸モ露<sup>見</sup>ハシサルモノハ其處ヨリ

〇直ニ切レハ

少シ後部ノ薦骨ノ方へ差<sup>見</sup>截リ突ク  
ヘシコレ薦骨ノ方へ腸<sup>見</sup>突ルヲ以テ側面  
ヲ毀傷スルカ<sup>見</sup>ナリ如此ニシテ<sup>見</sup>括筋ニ  
至レハ其正中ヲ貫<sup>見</sup>透スヘシ

〇又其創中ニ指ヲ刺テ腸ノ位置直ヲ知  
リ細慎ニシテ截リ傍圍ノ部ヲ毀傷スル  
ト勿レ<sup>見</sup>然<sup>見</sup>凡指ヲ以テ腸ヲ貫<sup>見</sup>透スル<sup>見</sup>ト  
最モ戒ムヘシ其故ハ腺様ノ織物ノ韌  
帶ヲ以テ腸ヲ薦骨或ハ膀胱<sup>見</sup>（繫糸  
着スルヲ以テ<sup>見</sup>薦骨<sup>見</sup>ニトリアツカ<sup>見</sup>上<sup>見</sup>バ此カ破

裂之腸大ニ毀傷スル者多ク歴觀スル所ナリ

○ハツト名ノ法ニ管針ヲ以テ穿貫之而メ小刀ヲ以テ脩圍ヲ截<sub>ニ</sub>尻<sub>ノ</sub>クアリ<sub>ハ</sub>此亦恠実ナラス此ヲ施シテ死<sub>ヲ</sub>見<sub>ル</sub>多シ

○レテ直腸尻通ス

○截<sub>ニ</sub>尻術ヲ施<sub>ス</sub>トイ<sub>ハ</sub>尻<sub>ノ</sub>肛門ニ開括筋無キニ因テ肛門收ラス大便タモチ難キ<sub>ト</sub>ヲ<sub>ハ</sub>患<sub>ル</sub>モノアリ<sub>ハ</sub>此<sub>ハ</sub>コレ未タ經驗セザル説ナリ其故ハ直腸ハ輪形ノ纖維ガ療術ヲ施ス後肛門ノ裏面ノ開括筋

下端ノ

○自ラ

トナル其際ニ外面ノ創皮ヲ被フテ愈ルナリ<sub>レ</sub>レ<sub>ト</sub>ト<sub>ハ</sub>名ノ説ニ物<sub>ヲ</sub>テ小兒肛門牙塞スルヲ療術ニテ截<sub>ニ</sub>尻<sub>ノ</sub>ク後大便失<sub>ル</sub>示<sub>テ</sub>患<sub>ル</sub>モノ無<sub>レ</sub>ト云<sub>フ</sub>ナリ

○小兒肛門ノ孔全ク無ク截<sub>ニ</sub>尻術モ施ス<sub>レ</sub>ト能<sub>ハ</sub>サル<sub>ハ</sub>疝間自然ノ良能ニテ如此慘酷ナル小兒ヲ保護シ時日ヲ経テ尚命ヲ保チ大便ハ自然ニ吐出シ除クモナリ如此小兒六箇月モ命ヲ保ツモアリ或ハ年々成長スルモノモアリ

此志ノ

(注)

バナロリス人名ラミユレ上日バウキス上等ノ

書ニ云多一女見年長シテ二十歳ニ至ル  
コノ女子陰門在尿管肛門在至全  
ク無し然ル小便ハ乳頭ヨリ通利シ  
大便ハ口ヨリ吐スト又サウハゲス人役ニ  
一婦人此志アリテ二日或ハ三日毎ニ大便  
ヲ嘔吐セリト

○予又斯ニ危篤ノ志ヲ奉クコレ亦死  
スルヲヤナカラス又此ヲ患ルモ多ク此病  
ハ生レナカラニシテ腸ノ縮窄ヲ塞スル

〇ニ生レテ

ナリコレ結腸ノ部ニシテ直腸ノ端ニ近  
キ処ヲ塞スリドウイフ人ゲイルル人  
生レテ六箇月ノ女見ヲ見ルニ初生ノ時  
大便常例如ク通ス然レ大便通泄  
スル中呼吸短促ニシテ強シ其後漸ク  
大便通セスサネ効ナク終ニ七箇月  
ニシテ死ス其死スル火レ所ニ粘液ヲ交  
ハタル鮮血ヲ下泄ス其以前浣腸法  
ヲ施スニ腸中ニ通セス直クニ逆流シ  
外出ス境捻子ヲ刺スニ腸中ニ支障

境捻子ヲ刺ス

支障

ロコノ

結腸ガ

○スルヲ以テ此腸ヲ

レテ通セス○此死体ヲ剖視スルニ結腸  
 ノ左側ノ下部ニ大畧四方余ノ長サオト  
 之半縮レ又。腸ヲ解觀スルニ結腸尽  
 ク其積滯ニ由テ自ラ牙塞シ且ツ  
 盲腸モ残ル一十キオトニ  
 内ニ翻反ス而ノ結腸ヲ解剖シテ其  
 牽縮ヲ解ケハ一尺一二寸モヨクオトヨ  
 リハ長シ如此ニ牽縮狹窄シ入キ牙  
 塞ス此カ生レナカラニ有テ日時ヲ經ル  
 ニ從テ増劇シ臍質ノ筋條ニ由テ為ス

如クニ此腸甚ク烈ク生着緊牙スルナリ  
 如此志ノ種類ヲ一ヘンストイト名亦見ル  
 一アリト云一リ

○初生見ノ

○腹節并ヤ疳積病ノ第十五章  
 惣身ノ諸志ヲ述ル後又。腹ノ節ノ諸  
 患志ヲ論ス  
 ○支節ノ患志ハ三種ニ分ツ一ハ定數ニ  
 違フナリ一ハ非常ノ所在ト連合生着  
 ナリ一ハ自生ニ及セル離分ナリ○小兒雜

産ニ就テ爾皮膚傷、腫瘍ヲ凝留ノ  
血ニ因テ著スルモノアリ物テ如此類ノ由傷  
ハ甚ク多ク數ヲ施セハ容易ク治ス故肢節  
ノ病トイハレ初生見ニ於テ腕臂ノ腫起  
ヲ散スル等ハ右ノ三種ニ屬スルナシ

○肢節各部數多キモノアリ殊ニ手足  
ノ指ノ如シコレ尤モ顯著ナリ初生見ノ  
指六七或ハ八ノモノアリ己カ足指ニ於テ  
モ其骨筋皮膜等通例ノ如ク全備シ  
足跗ヨリシテ其骨<sup>指</sup>六ツ備ルモノアリ或ハ

○或ハ

○其指

其指形全成セスシテ唯ハ分裂セル如ク  
或ハ半分以上分裂セル或ハ一ノ骨<sup>指</sup>ノ  
如ク一ハ小ニシテ枝ノ如ク或ハ結節ノ如キモノ  
アリ

○ハルル人ノ書ニ鼻、耳、數多キモノ  
アルヲ記セリ其鼻通例ノ如クアリテ其他  
ニ骨ナク一鼻アリト

○右ノ諸症アラハ殊ニヨク其部ヲ觀察  
シテ小兒ノ健康長育ニ妨ル<sup>テ</sup>アルカ其  
他<sup>ニ</sup>拳止運動ヲ障碍スルカ或ハ大ニ醜怪

○此ヲ以テ

○肝要ナル

畸形ヲ為スカヲ并知シモシ如此モノハ危  
ブルナク截去ルヘシ但シ此ニ就テ截断  
術ヲ施スヘキカ或ハ施スヘカラサルカヲ  
考定スヘシ

○若シ其術ヲ施スヘキ病ハ速ニ施スヘシ遲  
延スルホトイヨク施シ難ケレハナリ○創惣  
テ小兒ハ愈易シ又疼痛モ甚シカラ  
サルナリ己知覚少ナケレハナリ

○凡ソ數多キ部モ肉ノミニテ骨ナキモノ  
ハ息肉類ニ屬ス諸器ノ類ニ屬セス  
故ニ結ヒ切り易シ

○ヨリ常ノ指ノ傍ヨリ小指骨生スルハ  
ヘイステル名ハ鉸刀ニテ切ルナリ予ハ小刀ヲ  
良トス

殊手

○幼生兒各部生着連合スル凡ソ指  
或ハ足指連着スルモノ多シコレニ筋肉  
連着スルアリ或ハ骨共ニ連ルアリ然レ亦  
唯膜ノミニテ連着シコレカ全ク着クア  
リ或ハ各所一二着クモノアリ如此モノハ皆切  
リ離スヘシ然レ其後再ニ連着スルヲ防

○初生児ノ

ク一肝要ナリ此ハイステル名ノ後ニ指ノ幅  
ホドノ縛縛ヲ以テ巻キ此ニ石灰水ト伏  
酒ヲ浸シ濕スナリ

○胎見子宮ニ在テ胎居ノ悪キニ因リ  
或ハ形体ノ畸缺スルニ由リ或ハ生後ト  
リアツカヒノ悪キニ由テ足蹠カ内ハ方  
翻反スルナリ此志ハ年長シテ歩ム  
能ハスコレ常ニ外蹠ヲ以テ地ニ着ケ  
踏ヲ以テナリ此ハ諸種ノ縛帯異ニ云  
ヲ以テ施スナレモ利益益ナシ但良法

○其足

トス(キハスメルリイ名ノ後ニ両方ノ蹠ニ柔  
撓ナル革ヲ軟カタル繃帯ニテ固着シ  
蹠ノ間ニ敷布ヲ置クニ但シ此ハ一方  
ノ足ニテ病アル足ヲ固定スルヤウニ施ス  
ナリ此レケセルデン名ノ法ヨリハ尤モ勝  
レリトス而シテ雞子白、麦粉ヲ合シテ綿  
布ニ引キ足蹠ニ貼シテ綿布カ乾  
キ硬クナリテ適宜名固持スルマテ貼シテ  
クヘシ

○初生児ニ於テ母斑ト名ル斑ヲ皮膚ニ

小兒身  
体

生セルモノ多クシ此斑ハ平カニシテ皮上ニ隆  
起セス但シ一種ノ斑アリ此ハ〇ノ水棉様  
ナル中ニ粘液敷キニ由テ己カ一二ノ腺様  
ノ織物ノ處ニ聚リテ一箇ノ腫瘍ヲ成  
ス〇此ノ如キ自心肉様ノモノハ畸形ヲ為ス  
ニ由テ此ヲ小刀ニテ切斷ス〜キカ或ハ結ヒ切  
ル〜キカヲ思量ス〜シ然レ深ク根ヲ結ヒ  
テ皮或ハ肉ヲ多ク除カサレハ取り去ル  
能ハサルモノハ其終ニテ置クヲ良トス但シ  
此腫ノ傍圍ノ脉腫起シ癌腫ノ性ト

見ユルモノアリ故ニ腐肉ヲ施スニヨク意  
ヲ用ヒテ心レ慎ム〜シモシ癌性ノモノハ全  
クコレヲ示ス〜シ

〇丹斑ノ類ノ平カナルモノハ其腫起セル  
モノヨリハ却テ治スルニ艱シ但シホリゲ  
ノ從ニ此ヲ消除スルニ良法アリ此ハスパー  
石鹼ト撲滅セサル生石灰トヨク混和シ  
泥ト爲シ而モ其斑ノ周圍ノ無吉ナル處  
ニ粘着ノ硬膏ヲ貼シテ右ノ石鹼石灰ノ侵  
蝕膏ニ觸ル〜勿ラシメ其斑ノ大サホドヲ

〇先ツ



マ以テ

孔トカシ其孔トカシ名所ホドヲ截リ而シ  
其外面ニ右ノ侵蝕ニ膏ヲ貼スレハ六時  
ノ間ニ痂ヲ結ヒ其後膿ヲ成スニ由テ痂  
脱スルナリホド名此ヲ最良法トス  
但シ此ノ如クナリ名中ニ疎散ノ膏ヲ貼  
貼シ蒲桃酒ヲ温メテ蒸スヘシ其故ハ此  
ノ腫起スルユエニ他志ヲ散センコトナリ  
ハナリ

○幼見ハ身体各所殊ニ腋下、鼠籠或  
ハ耳後ニ皮膚剥爛ヲ生スルコトアリ此ハ

○甚ク称  
卷七六

鉛ヲ以テ一制衣スル削ヲ施セハ速カニ治ス  
但シ此ヲ施スコトヲ患ル者多ク又幼見ニハ  
施シ難シト患ハリ如此ナル中ハ愈創氷ヲ  
施シ而シ石松ノ細末ヲ掺ケ或ハ亜鉛  
削ヲ施スヘシ○レフット名此志ニ腐肉朽ス  
ル木ノ細末ヲ掺シ或ハ此ヲ掺ケ名上ニ婦  
人ノ乳汁ヲ以テ濕スナリ

注 サウハゲス名殊ニ楊柳ノ腐木ヲ稱ス  
此ニ就テ精ク多量ヲ用ヒテ身体ヲ洗淨  
潔ニスルコト最モ所要ナリ又襪襪等

ヲ清潔乾淨ニスルヲ所要ナリ  
 ○幼見ノ皮膚層ニ大ナル疱ヲ潰レシ此内ニ  
 汚穢ノ水充テ其縁暈嫩衝スル症アリ  
 此泡幼ニ崩脆ニ潰レシ此ヨリ脛ノ周  
 邊・腋・指等ニ潰レシ此力三四日ヲ過レバ  
 乾收ス此症或ハ流行スルアリ一年數  
 々此ヲ患ル小見アリ然レ其此疱甚ク夥シ  
 癩スルニ非レハ必ス危症ヲ示スルナリ○  
 然レ其液酷厲ニシテ荏苒タルモノハ輕  
 キ下劑ヲ用ヒ又其泡ヲ刺破リテ水ヲ

泄スレシ其汚水除ケハナリ其後愈創水  
 ニ清メテ加テ洗淨シ石松ノ実ヲ搗  
 スレシ此ニ由テヨク汚漆ヲ清除レヨク全  
 愈スルナリ

註 甘ウハゲス名此症ヲ凡瘡ト區別  
 アリト云一リテニグエドク名ノ人コノ症ヲ  
 ビユルグエイロト名ク

小兒幼生病外療法篇終 大尾

Hand Lezing

tot de

Kennis en gunsting

van de

Rijkstem:

der

Kin Derren.

in het Koninkrijk gebrueden

doen den: haren

N. totten van tottenstem;

lyf-art der Koningz van Nederlanden en  
vrijen van de noord-ster-orde  
verstaet, met antekeningen van byvoegde  
ten nummeren

over

Deinse Landijsort,  
med. Dots. heeglinaar in de gemet-  
onthoed-om hulkinde op is landt  
hooge school te Leiden.

Twende Dink

aanmerckelyk vermerckend. waerby geboeg  
in een verhandeling over de geboegekeny,  
welke de kindren alomteylt kent na  
de geboorte hebben, en tot de heeg  
kinde het seckking hebben.  
verste oed.  
in d' gravenhage  
by isaac van sloeck,  
M D C C I X X I X.

in hand

zet

hoop of tekken

I. hoop stek

van de minnen.

II. —

van de ongemakken welke het keijzen  
gebullyk, of gebullyk, belaten.

III. —

van de vesttoering

IV. —

van de uitkalking van den indel-  
zaam.

V. —

van de ontvelling

VI. —

van de wind of water-zeukken.

VII. —

van de verhouding.

VIII. —

in hand

zet

hoop of tekken

I. hoop stek

van de minnen.

II. —

van de ongemakken welke het keijzen  
gebullyk, of gebullyk, belaten.

III. —

van de vesttoering

IV. —

van de uitkalking van den indel-  
zaam.

V. —

van de ontvelling

VI. —

van de wind of water-zeukken.

VII. —

van de verhouding.

VIII. —



Van de twilckpennen

IX. — 106

Van de ongemakkelijk Krijgen der tanden

X. — 123

Van de Oproeven

XI. — 132

Van de Othippen

XII. — 169

Van de doop

XIII. — 214

Van de geestjicht.

XIV. — 305

Van de inventing der geestjicht.

XV. — 371

Van de makelom

XVI. — 399

Van de inventing der makelom

XVII. — 400

Van de roodvonk

XVIII. — 425

Van de Straalen.

447

XIX. —

Van de Heest:

459

XX. —

Van de Kink-Heest.

477

XXI. —

Van de gul Zigt.

Fulde De Gul.

1

XXII. —

Van de tuchthuisproostijns Heest.

XXIII. —

30

Van de Worman.

XXIV. —

139

Van de ongelijke Zichte.

XXV. —

166

Van de weter-Heest.

XXVI. —

188

Van een bysondere Heest Van

Kul-Zichte.

XXVII. —

220

van de afzigt.

229

XXVIII—

van het oogzigt op de Hoofde.

230

XXIX—

van de Vernis-Riekte.

Verhandeling over de getreken, welke de  
kinderen dertig kort na de geboorte  
treffen en het de veelvuldige betrekking  
tusschen de C. J. of H. m. e. . . . . 299.

目錄畢

弘化乙巳仲春

男 楷 謹 裝 釘



