



彌弗涅兒列布羅奇効方
全

洋学文庫
文庫 8
B 66

紅海堂藏



彌弗涅見氏列布羅奇効方

列布羅治法

古今列布羅ノ治法藥劑百般一ナラス今予カ見
ル処ヲ以テスレハ此ノ治法ヲ分テ三綱トナ
ス丁尤ニ當レソトス○第一綱預防治法第二綱
窮理治法第三綱妙効治法コレナリ

預防治法

其一法ハ凡ソ体中ニ在ル邪毒此病ノ原因トナ
リテ此ノ如キ患害ヲ催起スル所以ノ者ヲ馳除

スルニアリ○其第一法ハ患者ノ榮養ヲ致シ健
康ヲ促ス可クノ処置ニ在リ○其第二ハ浴湯或
ハ蒸氣浴ヲ以テ患者ノ表圍ヲ清淨ニシ表發並
氣ヲノ常ノ如クナラシメ鱗屑及ヒ痂ノ如キ者
ヲ緩和シ以テ其表圍ノ體質ヲメ常ノ如クナラ
シムベシ○列布羅ノ輕シ輕症未タ甚タレキ原
因アリテ體質中ニ振起スルニ非ル者ハ大抵此
ノ預防治法ニ因テ良能ノカヲ扶助スル片ハ自
愈

窮理治法ヲ論ス

此ノ治法ハ一ニ病理學ノ則ニ從テ之ヲ治スル
ノミ○若シ堅硬不消化ノ食養或ハ右部ノ分離
益ヲ失スル等ニ因テ腸胃中汚物ヲ生レ此ニ因
テ更衣不可者或ハ門脈中血液運行ヲ妨害セル
者ハ泻下劑ヲ施スヘシ體質稍刺衝性ニ傾ク者
ハ清涼劑ヲ用ヒ之ニ及ノ運行怠慢ニ屬スル者
ハ刺戟興奮ノ劑ヲ用フヘシ即チ大黃耶刺巴蘆
蒼藜蘆等コレナリ或ハ甘瀉ヲ加フルモ可ナリ
○古人此病ニ泻血ヲ施ス法アリ然レ此法ハ
刺絡或ハ水蛭角法ヲ論セス皆不當ナリトス○

若シ其患者ノ体質傍發ノ諸症ニ燬衝性ヲ帶ビ
果ノ浮血ノ正的ヲ露ス者ハ止ムコトヲ得ス慎戒
シテ事ニ從フヘシ

○攝生法ヲ慎ミ食養ヲ節ミ以テ補給ノ機能
ヲ助ケ血液ノ混合製造ヲ常ニ復セシムヘシ
蓋シ此病ノ本質ハ專ラ血質ノ不良ナル因テ除
体質常ノ如クナラサルヲ以テナリノ故ニセ
プリス、キリノ病ニケウルボイタクシキムフト
等ノ如キ諸病ニ用ル劑ハ皆以テ此病ニ的施ス
可シノウイルラン氏曰ク「プロラニタクカシス」

ニ於テハ列布羅ヲ治スル尋常ノ劑ハ大抵其効
ヲナスコト稀ナリ而シテ此症ニ於テハ常ニ滋養ノ
攝生ヲ施シ自體ノ運動ヲ節ミシ幾那礦酸海水
活等ヲ用フルコト尤モ的當ナリノウイルラン氏
ノ此病ヲ論スル大抵此ノ治方ヲ推テ知ルヘシ
而シテ常ニシケラルボイタク質ヲ以テ其ノ目的
トナセルナリ

奇効治法ヲ論

或曰列布羅ハ全体中ニ隱常惹スル一種得テ探
索スヘカラサル原因ニ因テ發ス故ニ其因テ生

ル所以ト曰其本色ト得テ知ルヘカラスト又曰
此病ハス^レコロヒ^ユニセ^レ癥毒カシクルアクチハ
及ヒ^レ百化此ノ如キ諸病ノ如ク一種奇効ノ治法
アリテ尋常窮理治法ヲ以テ決シテ治スヘカラ
スト今此説ニ從テ試ミ奇効割ノ尤モ顯著ニメ
稍列布羅ノ為メニ一種ノ能力ヲ具有スルカ如
キ者左ニ掲示ス其試驗ノ如キハ或ハ大ナル奇
効ヲ奏シ或ハ稍否ナル者アリ
○奇効割ハ内服外用ヲ論セス其效極メテ許多
ナリ此^レ病ヲ療スル者預防法ニ從テ其原因ヲ

除キ或ハ究理治法ニ因テ其治法ヲ施スト虫ニ
膏テ其効ヲ見サルハ宜シク此割ヲ撰用スヘ
キナリ而シテ之ヲ撰用スル^レ甚タ難シトス蓋
シ^レ名家ノ所見各異ニシテ從來ノ經驗或ハ異同
アリ且ツ術者甲ハ種用スル割乙ハ以テ否トナ
シ乙ノ挿用スル処ハ甲ノ癢毒スル処ナレヲ以
テ奇効割ノ撰用極メテ難事ニメ未タ一定ノ規
則アル^レナレ
○古人此病ニ於テ列ラステス下割ヲ稱用ス殊
ニ黑藜蘆白藜芦ヲ稱ス○加羅菟兒耶辦巴芦蒼

等ニナ此劑ニ充ツヘレ○蓋ニ下劑ハ只ニ快ヲ
一時ニ取ルニ足ルト云トモ未タ十全ノ快復ヲ
致ス丁能ワス○蓋ニ患者腸管ヲ清淨ニ表圖ノ
患腸管ニ引導ス

○安質謨扭製劑及ニ尋常安質謨ニ硫黃消石ヲ
加工タル劑單用ニ或ハ複用ニ並ニ微々効ヲ奏
シ或ハ全ク効ナレ但シ *Strobil. etc. in company etc.*

De Loman 良劑タレレレプラニ効ナレ猛永ヲ
○水銀製劑劑大ニ稱譽ニ或大ニ毀損ス但シ此劑

燒酒ニ溶化シレプラノ秘薬トシ大ニ賞譽スレ
凡此劑々、 *Siphoclethra Complicata*ニ効アルノミ

藥地水銀劑 *Complicata*ニ用ント飲セリ飲劑

及ニ安質謨製劑ヲ任用スベシ

○礦酸ロプラニ稱用ス此酸シケラレホイクノ

*durogis de water*ニ緊要タレレ硝石酸海塩

酸ヲ以テロプラ奇効薬トナレ推シ

○羅伍塩殊ニ整典垣羅伍ノ製劑ニラナルヲ

毎時其峻効アルヲ実験ス用法十滴ヨリ三十滴

マテ一日ニ三次

ホウレシ及ヒ「アソソ」ノ人ノ血見鮮了後去爾
扶蘭私ニテ頑固ノ症ニ稱用ス「ロユイ」名地ノ町
ノ病院ニ於テ血見鮮了後去爾其永光着了後去
爾ヲ後換レ必用ス

○安多羅古加里「ホルベ」名人「ルベ」名大
稱譽シ「アラ」ニ次方ヲ專用ス安多羅古加里ニ

或ハ金硫黄半或ハ *Cantim. aristata* 三 或麻

膠源矢豆或 *Pericallis* 耳中ホ *三* 右調勻分

テ三包トニ二十四時間ニ用盡ス
右劑ヲ以テ全身或ハ局部ニ於テ抗拒ヲ顯スマ

テ持重スハレ

○論者曰安多羅古加里ハ「レ」レ制伏レ安病

レテ「アラ」レ原因タレハナリ
ノ古人此病ニ蝮ヲ稱用セリ而シテ用法モ亦一ナ

ラスノ或于肉ヲ未トシ或ハ煮テ美汁トナシ其
蝮皮ヲ以テ或ハ幼雞ヲ養畜シ患者ヲレテ其雞

肉ヲ喰シムノ當時此用ナレ

○芫菁了後去爾他ノ頑固ナル皮膚病ニ於テ
如ク亦タ以テ「アラ」ノ奇効劑トセリ○ウ井ルラ

アレン及ヒハルコンブル氏ハ之ヲ用テ未タ其効
ヲ見ス〇ロイートトライル及ヒクレートン氏ハ
此劑ヲ以テ「ロブラ」有力劑トセリ或ハ頑久ク
症ニ之ヲ用テ四週ヨリ六週ニ至テ全治スルヲ
見ル〇其用法ハ四滴ヨリ五滴ニ至ルマテ緩和
ノ茶汁ニ和シ其ハ漸次ニ進テ十滴ヨリ十五滴
ニ十滴ニ至ル〇然レハ漫リニ其量ヲ増シ或ハ
本患ノ之ヲ各服セシムルコトナカレ蓋シ此劑ハ
ヨク飲食消化機ヲ害シ且ツ諸般ノ患者ヲ生ス
ルコトアレハナリ

〇草木中ニモ赤タ「ロブラ」ニ効アルモノ諸種ア
リ即チ薩撒巴列爾羅瑞香皮榆皮リムスラシカ
ニ「アサ」ニ余カ著ス其ノ書中ニ隨ハハ榆皮
ヲ取リ更ニ茶汁ヲ搾リ之ヲ以テ患部ヲ洗ヒ竟
ニ「ロブラ」ノ全治ヲ致セルコトアリ
〇胡瓜及ヒ「アサ」キユルケシ新鮮ナルモノ或ハ醋
ニ浸出シ用テ「ロブラ」ノ奇効劑トス或ハ此草
實及ヒ葉ノ煎劑ヲ用ルコトアリ
〇ウラシラシ氏ハ白藜芦黑藜芦根丁幾去爾ヲ輕

量下利セサルマテ用テ良効ヲ得ルコトアリ
○レリクトン氏曰蜀羊線ハレプラノ為ノ奇
効ヲ具フ○用法蜀羊線一弓煎レテ一升ノ液ヲ
取リ日ニ蜀羊線二弓ノ量ヲ其ノ竟ニ進テ日ニ
一升ヲ服スルニ至ル外用此ノ煎汁ヲ以テ洗滌
割トス○用テ八日ニ至レハ其効ヲ見ルノ脆弱
知覺レ易キ人ハ此茶ニ由テ心悸動困悶眩暈等
ヲ致スルコトアリ然レバ此症ハ其量ヲ減スレハ
自ラ愈エ或ハ同時ニ起發丁幾告甬飲科トナシ
其レハ能ク此茶ニ堪ルコト得○此茶ヲ以テ患

者廿三人ヲ療シ其二十一人ヲ全治セリ
○外用割モ亦石種ナリ今其綱ヲ左ニ揭示ス
○洗滌劑 水銀膏ニ更ニ鉛花ヲ加ヘ 或ハ水
銀單味 或ハ猛汞溶液 或ハ硝酸汞膏及ヒ硫
黃膏十二人ヨリ十五人ヲ猪脂一弓ニ和スル者
或ハ瀝青一弓猪脂四弓ニ和シ毎夜患部ニ搽劑
トシ毎朝水皴温水若クハ羅漢錫水ヲ以テ清滌
ス同時ニ硫黃ヲ以テ製スル里没那埵若クハ野
薑煎汁ヲ内服セシム○此劑ニ由テ結茹自ラ解
脱シ皮膚潤澤ヲ生シ痒百亦隨テ自ラ散スノ療

法損害ナク十二日ヨリ百九日ニ至ルの時トレ
テ輕キ変症ヲ生スの又景状ニ隨テ水銀諸菜及
ニ他ノ礦物ノ軟化膏ヲ伍用スハシ
○活法ニ亦療術ノ一ナリ以テ皮膚ヲ清淨ニレ
蒸氣ヲ催進スの病發未タ大ニ侵襲セズ或ハ其
景状活法ヲ希望セハ第一温活法洗滌法蒸湯法
蒸氣活法等ヲ試ミ爾后硫黄泉及ニ硫黄ヲ以テ製
成力以テ活湯蒸氣活湯海水活湯等ヲ用ユハシ蓋シ
海水温ハ最初温ニシテ活ニ爾後海中ニ於テ治
スハレ○夏ニ當テ病ヲ進襲スルヲ防カン為ニ

又稜輝數回活法ヲ施スヘレハタトノ水口ナ
ラニ峻効ヲ備フ飲劑并ニ活湯トレ用フの曾テ
患者八十三人此法ヲ行フ其内五十三人全愈シ
二十四人稍快ヲ得タリ○爾他古今稱用ニ来ル
外菜ヲ左ニ掲示ス
明礬 硫黄 硝石 生石灰 石胆脛 鼠糞
狐糞 人尿 熊膽 藜蘆 白百合球
○右ノ諸菜ヲ實驗スルニ口ガラニ於テ其驗ナ
レの其酷厉性衣ハ其他腐爛侵蝕ノ諸菜及ニ芫
菁膏等亦々時々施用ヲ要スの外見ヲ飾ラシ

為ノ此ノ如キ諸菜ヲ施スノ後皮膚層共ノ腐爛侵蝕ヲ被リ其部ニ於テ新ニ皮膚ヲ萌起シ而シテ竟ニ口プラノ真症ヲ次クアリ

ノ身体ヲ清潔ニシ戒慎ニ作業ヲ適宜ニ十分ニ保持スル由テ口プラヲ克制スルアリノ自然良能ニ茶ヲ須スノ此病ヲ復食スルアリ

ノ著者経テ経久諸病ヲ以テヘルプストニ笑収水泡状瘡状鱗屑状腫瘍状等ノ諸状ニ隨テ單ト根トニ分フノ其單ナル者ハ深ク身体諸苦根トニ而シ皮膚ニ異性ノテイカスレトシテ發ス

ノ其根ナル者ハヘルベチセ他ノケイスカラレエント相合シ發ス便チケカレセ也微毒性癩病性羅斯性木節腫性等ノヘルベチセ是ナリ

ノヘルベチセノ近因ハ一種ノケイスカラシドヨリ来ル一異變動ナリ故ニ他ノケイスカラシドノ如ク妙効薬ヲ望ムノ安多羅古加里ノヘルベチセニ於ケル硫黄ノスカレエセ水銀ノケイシリチセ安墳護ノケイフロセ伊達爾護ノケルキマテエセケイスカラレエニ於ケルカ如キ各種ノケイスカラレエニ妙効薬ト一般ナルカ

故ニ「ホリアス」氏安多羅古加里ノ「ベルベ」以妙効
タルヲ諸ノ「コム」アリセアテイシノ「ユシ」ヘセト
ル「芭葉」トセントス

○安多羅古加里コト「ル」ニ「カルキ」ハ石炭ト譬乙
典埴加里ト溶化セル者ナリ褐色石炭ヲ用ユ黒
色石炭ハ用ズ蓋シ
其水ニ溶解セ
アル故ナリ

製法 新製ノ譬乙典埴加里ト極末ノ石炭
ヲ取リ手ヲ留メス根根和燥化シ火ヨリ下レテ
ラセバ「ラ」ト「ト」ヲ温メタル小田田ニ入レ極末同等
ノ軟質至マテ研磨シ一「ク」容ノ硝子壺ヲ温メ固

密ニ収メ貯フ

○硫化安多羅古加里アンタラコカリ
スエソクエナリ

製法前法中硫黄半子加五褐色如見トス製法上
ニ同レ

○安多羅古加里ハ黑色軟ニメ絶潔ナル散末ナリ

其味酷石羅偃塩ノ如ク舌ニ點メ燒カ如シ煤臭
アリの大氣ニ觸レテ温ヲ引ク然レテ流動スル
ニ至ラス乾淨ノ氣ニ逢ハ再ニ温ヲ浸シ隨テ又
羅偃様ノ味ヲ失ス

○豆見筒見ニ投メ些少ヲ溶解シ蒸餾水ニハ甚ク

能ク溶解スノ精密ニ製タル品ハ溶解シテ其液
 同等ノ秤量アリ其液ヲ蒸餾スルニ其色ヲ失ハ
 ス若シ其色ヲ失フハ製造精シカラサルナリ
 ○効能 健康ノ人ニ食料一日三羹汁ト極メ安
 多羅古加里十氏ヲ十時ニ與フ尔右血液大ニ皮
 表ニ烈流シ恰ニ灼カ如ク脉速關節急痛夜ニ及
 テ大汗淋漓晨ニ徹ス而ノ大ニ浮下スルヲ西
 皮膚兩用ヲ經テ猶温潤セリ
 ○用法 経久皮膚病ヲ患テ消食機損害ナキ者
 ニ後方ヲ與フ

其方

安多羅古加里 二氏

甘草 五氏

右混合一貼ト為ス一日ニ三貼或ハ四貼與フ
 ○或ハ患者ニ與テ即夜先ニ起熱シ次ニ脉定至
 ノ連金身發汗ニ皮表灼カ如キヲ覺フノ又患者
 ニ由テ五日或ハ七日十四日二十五日甚ニキニ
 至テハ五十日ニ至テ上ノ諸症ヲ發スルアリ○
 發汗多分温ナレバ又少シニ冷ナルアリ○其汗
 始メ數時ヲ限リ終ニ終夜發スルニ至ル然レバ
 薄テ衰弱ヲ顯ワサス却テ健康ヲ促ス○發汗后

猶局部ニ温汗或ハ冷汗ヲ余ス其經過ノ間一定
セスノ多分此汗皮膚病ヲ具ル部或ハ腋下手頭脚
尻陰部等ニ發スノ大抵病毒分利シ盡ルニ至ル
マテ經過スノ全身ノ發汗局部ノ發汗共ニ業力
ノ致ス処ナリノ夜汗始テ發スルヤ忽チヘルハ
チセフレフケニ廣大ニ為リ赤色増進シ病毒分
泌旺盛ニ痒ヲ覺テ新ニ斑ヲ發ス患者或ハ子午
テ羅私ニ罹リシカヒセノ患者ハ「レカヒセ」ニ罹ル
ニ罹リ「レカヒセ」或患者ニ於テハ痒甚シク分朝
消散ス所謂「ベユケル」ハニ羅ルノ局部抗拒ノ經過

一定セスト蚤モ其間夜毎ニ痒減シ隨テ赤色分
泌共ニ減少ス單ナル「レイペル」ハ着レク快復
スノ甚タ劇キ患者ハ一月ヲ経テ「レ」ニ「レ」ニ
得ルナリ
○全身及ニ局部ノ抗拒「レ」ルベチセ「レ」ノ病毒ヲ驅
除セズ何トナレハ熱ナキカ故ナリノスハ「レ」エ
止及ヒ一種ノ変動ハ熱由テ明症ス此熱ヲ發
セシ為メニ安多羅古加里ヲ持久シ便チ運営「レ」
盛「レ」十分ノ發汗ヲ得ルニ至ルハ「レ」
○第一変動ハ「レ」ニ全身各部ニ發汗ヲ催進ス

ル処ノ衝動ナリノ事ニスヘシセシハ百葉ニ由
テ發タル熱ナリノ熱様抗拒ノ經過ノ間ヘルベ
ル凶惡候ヲ顕ハレ流テ之ニ属スル諸症較著ニ
増劇スノ解熱ノ后患者ノ症候頃良ニナリ快復
日ヲ追テ進ムノクレ正ニ氏此ノ全身各部ノ惡
候ヲ以テ快復ノ確徴トス
○总体ノ變動大甚ニ過ハ安多羅古加里ヲ停止
スヘシ而此變動硝石ノ力ヲ以テ抑制シ難シ若
シ能ク抑制セハ安多羅古加里ヲ停止スルニ至
ラスノ抗拒ヲ挺^挺發スル最初ニ於テ消食機ヲ廢

ス爾后然ラスノ順序ノ脈ヲ以テ變動ノ終期又
ヒテヒシカレシノ快復ヲ徴ス^テイレカレシハ
元來變性ヲ素トスル者ナリ
○硫化安多羅^ゴ加里 其効安多羅古加里ヨリ速
速ナリ然レハ安多羅古加里其上位ニ抽キンス
何トナレハ緩除ノ効力彼ノ迅速驗ヲ一時ニ顯
ハスニ優レハナリ
○良善ノ概生ヲ保持スレハ弱年ノ徒頃良ノ形
況ヲ得ルニ隨テ七月ヲ經テ快復ヲ得四十六十
齡ヲ革ハ一兩年ヲ任テ其域至^ル此ニ任^ル久

療法効ヲ芭菜ニ假ラサルモ亦夕能ク疾病ヲ快
復ニ又夕能ク芭菜ノ効力ヲレテ選ニカラシム
ルノミ

彌布涅列布羅奇効方終

終

