


悞乙斯的盧產論
完

洋学文庫
文庫 8
B 73

紅海堂藏



痛刺ヲ投シ宜クソノ痛ヲ避ケ以テ臨ニ至
ルベシ何者ハ未タ其期ニ至ラズ慢ニ他ノ
痛ニ從テ頻ニ分娩ヲ促シ或ハ產婆若クハ
傍看婦早ク之ヲ催進スレバ婦徒ニ困苦シ
終ニ母子共ニ死ヲ致スコアルカ故ナリ然
ル受胎後九月又ハ四十週ニ及フ者已ニ真
ノ臨産痛ヲ發スト雖ホタ分娩ニ至ラサル
ニ於テハ醫宜ク胎兒ノ居状順ナルカ逆ナ
ルカツ候フヘシ都テ順ナル者ハ兒頭及ビ
顔頰下リテ子宮口ニ向フ即チ回譜ノ弟二

十三丁ノ弟一回ヲ見ルヘシ若シ然ラナル
者ハ都テ之ヲ及常居レテキケンナチエールル或
ハ異常居ホイラシゲトス但シ異常居
ニ二種アリ其一ハ臨産ニ當テ兒先ツ兩足
ヲ出ス者其二ハ殿尻産門ニ向ヒ其体兩折
トナリ出ル者是ナリ即チ弟二弟三ノ回ニ
見ユ是等ノ如キハ其居稍異ナルト雖真ノ
及常居ニ屬スル以テ衆人或ハ之ヲ尋常居
ニ屬スルコトアリト雖真ノ及常居ニ屬スル
コトナシ中ニ就テ其弟二ナル者ハ分娩スル

丁稍堆シテ併モ産婆其術不良ナルニ於テ
ハ或ハ兎ラシテ死セシムルニ至ル然レ其
第一ナル者ニ於テハ術ヲ施ス丁甚ク易シ
其他ニ於テハ醫能ク手挿ツ以テ胎兒轉廻
ノ術ヲ施シ救フニ非レバ母子共ニ死ラ免
ル丁能ハズ故ニ是等ハ最モ危篤ノ症ニシ
テ真ノ及常居ト唱フベキ者ナリ

第二章

手足ヲ露スガ如キ異常ノ候ナキシテ胎兒
ノ居状未タ弁認シ難キ者ハヨク之ヲ産婆

ニ究問スベシ然レハ産婆ノ技柄其巧拙認
ノ難ク且ツ其言必謬誤多ク信據スル可
クサルニ於テハ醫自ラニ指若クハ腕ヲ宮
内ニ指シ仔細ニ其居状ヲ候ベシ若シ兒頭
指頭ニ觸レ居状常ニ異ラズト虽ヨク分娩
ヲ得サル者ハ其因産門不具ナルカ或ハ兒
頭甚ク大ナルニ在リ若ク息陣痛至ラズ出
産ノ力足サル者ハ是レ産婦ノ虚弱ニ依ル
トス但シ力息陣痛ノ至ラサル者ニ於テハ
強壯劑又ハ催生劑ヲ與ヘ宜ク分娩ヲ促ス

バシ若シ産門ナルカ或ハ狭窄ナルカ或ハ
乾燥スル者ニ於テハホーテル、胎油等ノ如
キ滋潤劑ヲ塗擦スヘシ（註若シ膜様ノ物ア
ツテ産門ニ梗塞スル者ハ上ニ説示スル如
ク之ヲ開破スヘシ産門甚ク腫起シ胎兒下
ル丁ヲ滑サル者ハ若蕙接骨花ヲルレコロ
イド無爾麥豆錦葵葉ノ屑ヲ乳汁ニ煮テ軟
和消散ヲ琶布トシ暖ニ乘シテ敷之ヲ貼ス
ベシ若陰中息肉ノ分娩ヲ妨ルナレバ宜ク
之ヲ剪去スベシ然レ若硬結腫或ハ其他ノ

疾患アツテ新テ分娩スル丁ヲ滑サル者又
ハ子宮胎兒ノ為ニ破裂スル者ノ如キハ、ケ
イセルレ一ケス子一ヲ施シテ効ヲ得ベシ
然レ此等ノ疾患ハク胎兒ノ居状亦常ニ
異ナラズシテ頻ニ陣痛ヲ發スト多ク分娩シ
得サル者ハ婦ヲ椅子ニ上シ兩側ヨリ其体
及其兩足ヲ扶持セシメ塗擦藥ヲ子宮口ニ
塗リ指ヲ以テ徐々ニ之ヲ擴潤ナラシメ魚
ヲ催生劑ヲ投シ自ラ分娩スルニ至ルベシ
但シ胎兒未ク死セサルノ間ハ必ラズ器械

月ル丁ナク勢テ午ヲ以テ之ヲ救フベシ然
ラサレハ器械ノ為ニ或ハ兒ヲ損傷スル丁
アリ都テ外國ニ於テハ多クハ臥床ニ在テ
分娩ス然レニ獨都蘭土ニ於テハ別ニ之カ
為ニ備ルルノ椅子ニ憑テ分娩スルヲ其恒
習トス宜ク茅七回ヲ見ルベシ
〔註〕ホルテル曰一婦人妊娠スル丁七回産門
甚ク狭窄ニシテ曾テ生産スル丁能ハズ故
ニ毎回胎兒ヲ截断シヨク分娩スル丁ヲ得
タリコノ例コノ編ハ百十二丁ニ見ユ

第三章

○然レ前章示スカ如キ者殊ニ兒頭甚ク大ナ
ル者ハ容易ニ分娩シ難ク且ツ兒頭圓ニシ
テ粘滑ナルニ依テ容易ニ手ヲ以テ之ヲ握
シ難ク必克母子兩斃ヲ致スノ恐アル症ニ
於テハ之ヲ救フベキ為ニハルハ一ニ氏ニ
ツク器械ヲ造製セリ其製兩箇全ク同等ニ
シテ其形大ニ匙ニ類シテ其先尖利ナラズ
稍豊大ニシテ扁平ナリ四譜ノ第一二十五丁
第一五回是ナリ其之ヲ用ルヤコノ兩箇ヲ分

ラ兒頭ノ兩側ニ当テ剝傷スルヲナク徐々
ニ引テ分娩セシム都ラコノ器ハ胎兒ノ死
生甚ク辨認シ難キ症ニ用テ殊ニ良ナリ概
スルニコレ等ノ症ニ於テハ兒ノ生死ヲ存
スルヲ甚ク難シ間既ニ死胎ニ跡シ母体ヲ
救ハント欲シ尋常ノ器械ヲ以テ分娩セシ
ムルニ其兒未ダ出胎ニシテ却テ器械ノ為
ニ大ニ損傷スルニ至ル者アリ余尚コノ器
ニ於テ稍改正ヲ加フ然レモ自ラ用テ的突
ノ効驗ヲ得ザルニ先テ此ニ之ヲ示ス

款セズ
第四章

○回譜ノ第四五六等ノ回ハ則チマエリセアユ
人及セ、人ブラニテ、人ブルダ、地ノ産婆等ノ回
譜並ニ「ウユルス」人ホルテル名回テハニテル同
氏等ノ著書其他諸家ノ冊子中ニ載ル所ノ
者ニ同シコノ回ノ如ク平常居ナル者ハ胎
兒廻轉スルニ非レバ絶テ分娩スルヲ得
ズ此ヲ以テコレ等ノ症ニ於テハ速ニ胎兒
廻轉ノ術ヲ施スヲ緊要トス必ズ限リニ努

カセシメノ益益ノカヲ費シ徒ニ産婦ヲシテ
疲勞セシムルコト勿レ其術ヲ施スヤ愈早ケ
レハ愈良ナリ但シ及常居ニ於テハ胎児ノ
足ヲ捉ラ徐々ニ分婉セシムルヲ其定式ト
何者バ未熟輩ノ説ノ如ク及常居ヲシテ尋
常居ニ轉スルコトハ容易ニ成シ滑ベキニア
ラズ殊ニ児頭ホト圓ニシテ粘滑且ツ眼目
其他ノ部分ヲ損傷スルノ恐アツテ加ルニ
宮内狭迫ナルヲ以テヨク意ノ如ク之ヲ捉
定スヘカラサレバナリ都テ諸及常居ノ内

ニ於テ胎児ノ腕ヲ出ス者是レ真ノ及常ノ
名ヲ下スヘキ者ニシテ是ヨリ危篤ナル者
未タ曾テ見ルコトナシ何者バコノ症ノ如キ
ハ胎児宮内ニ横リ頭ハ其一方ニアリ体ハ
他ノ一方ニ在テ腕ヲ以テ産門ニ朝ス故ニ
其術ヲ施スニ當テ直ニ腕ヲ探リ滑ヲ以テ
其分婉セシムルヨリハ却テ腕ヲ引テ大ニ
危篤ヲ致スニ至ル若シ居状斯ノ如クナラ
テ凡者ハ大ニ分婉シ易シ爰ヲ以テ母子共
ニ其ノ死ヲ免ラシメント欲ルニ於テハ児

体ヲ廻轉シ其足ヲ捉定シ引キ出スニ至ル
ヲ緊要トス但シヨクコノ術ニ通シヨク也
ヲ行フ輩ハ種々他ノ反常居ニ於テモ自ラ
ヨク其術ノ精巧ヲ致スヨク滑ン殊ニ其美
疵甚ク多種ナルヲ以テ各爰ニ之ヲ説明セ
ント欲スルニ於テハ甚ク繁冗ニシテ大ニ
編章累ルニ非レバ盡スヨク能ハズ故ニコノ
一疵ヲ奉テ之ヲ模範トシ聊其分婉ノ方法
ヲ示ス然レ尚他ノ諸疵ニ於テヨク其胎兒
ノ居状ヲ的知シ各其方術ヲ仔細ニ通悟セ

ント欲スル輩ハ宜ク上ニ掲ル書冊ウエル
ス、ホル
ルデハシテ氏
ホ着書ヲ云就テ熟讀ス夫ヲ致スベシ

第五章

○胎兒ノ手ヲ露出スル者其術ヲ施シト欲セ
バ先ツ母体ヲシテ其居状術ヲ行フニ便ナ
ラシム其法宜ク此ニ備ル一種ノ産椅ヲ用
ユベシ其製第八回ノ如ク隨意ニ後疊折シ
テ殆ト臥床ノ如ナルヨク滑若シコノ番ヲ
備ヘザルニ於テハ直ニ臥床ニ臥セシム窮
家ニ在テハストロト「サツカ」トヘル「ブル

一ル等皆用スベシ先ツ産婦ツ仰臥セシメ
頭ヲ低ク聲ヲ高クシテ兩足ヲ左右ニ分チ
傍ヨリ持扶セシメ從テ兒足ノ在ル処ヲ辨
認センガ為ニ其露ス所ノ手ニ就テ其左右
ヲ的知シ胎兒ヲ廻轉スルニ其進ル手ノ左
右ヲ預メ亦定テスバシ既ニシテヨク胎兒
ノ居状ヲ辨識スルニ在テハボルトル又ハ
油ヲ以テ手ニ塗リ穿五回ノ如ク胎兒ノ足
婦ノ右側ニ在ル者ニ於テハ醫左手ニ其出
処ノ腕ヲ取リ徐々ニ宮内ニ進メ胎兒ノ腕

下ニ至テ腕ヲ内ヘ向テ推送シ漸ニシテ兒
頭並ニ肩ヲ并テ上ニ向テ押シ上ケ兒ノ腕
再ニ宮内ニ入ルニ至ラシメ其足ヲ探索ス
バシ然レコノ處ノ如キハ足ノ在ル処甚ク
高クシテ手ヲ進ルニ最モ深ク第六回ニ示
ス如ク肘ニ及ニ非レバ其足ヲ探リ得ルニ
難ク併モ宮内ノ如キ甚ク狹窄收縮スルヲ
以テ四ノ如ク手ヲ深ク進ルニ最モ容易ナ
ラズトス然レ他術ノ如キハ皆每益ニシテ
殊ニ術ノ精乃只コノ兒足ヲ得ルニ歸スル

ヲ以テ愈勉屬シテ其足ヲ探索スルヲ緊要
トス此ノ如クシテ漸ク其一足ヲ探ル得ル
：於テハ漫々地ニ引テ宮外ニ出シ緊帶ヲ
以テ之ヲ纏約シ再ニ宮内ニ入ル丁勿ラシ
ム既ニシテ復其足ニ循テ再ニ手ヲ陰中ニ
進メ胎兒ノ解ニ至リ從テ他ノ解ニ移リ又
他ノ一足ヲ解セテ始ノ如ク引出シ復タ綿
布ヲ以テ其兩足ヲ保セラテ纏約シテ捉定シ
兒背面スル者ハ_{檢糸スル}微宜ノ兒足ニ從_得直ニ
引テ分娩セシムベシ若シ腹面スル者ハ引

ク腹ニ至テ宜兒体ヲ迴轉シ背面ナラシメ
次テ分娩セシム然ラザレバ或ハ兒ノ頷横
骨ニ礙シ未熟ノ產婆ハ其既ニ兒頭子宮ヲ
脱スル者ヲシテ誤テ死ニ至ラシムル者亦
アリ然レ醫連ニ兒体ヲ回轉スルニ於テハ兒
ノ頷後ニ向フヲ以テ横骨ニ礙スルヲナク
容易ニ活体ヲ舉ル丁ヲ得蓋シ初メ兒ノ腕
ヲ推送スル丁必ス缺クベカラサルニ非ズ
宜ク兒ノ腕ト共ニ直ニ其手ヲ進メ兒足ヲ
捉定シ引出シテ可ナリ然トキハ兒足ノ出

ルニ從テ兒手自ラ内ニ入リヨク分娩スル
コトヲ滑

第六章

○都ラコノ術ヲ施スニ於テハ前章示ス如ク
一足ヲ捉テ宫外ニ出シ復タ手ヲ進ルノ時
必ス其出ス処ヲ足ニ從テ手ヲ進メ解ニ至
テノチ他ノ二足ヲ探リ捉ルヲ良トス何者
若シ其胎双胎ナルニ於テハ誤テ他兒ノ足
ヲ捉リ其強ク引ニ及テ無益ニ困苦スルノ
コトナラズ却テ危島ヲ致スノ恐アレバナリ

如此ク胎兒ノ數詳ニ辨識シ難キヲ以テ必
ズ注意シ一兒ノ兩足ヲ正ク捉定スルヲ要
トス都テ兒頭ノ位置其常ト異ニシテ再び
常位ニ復スルコトヲ滑サル者ハ直ニ其足ヲ
探索目前ニ示ス所ノ方法ニ從テ之ヲ摸キ
出サバ爾可カラズ故ニ此術ノ如キハ諸及
常居ニ於テ皆通シ施ス可キハ術クノ但シ
及常居ニ於テ殊ニ胎兒ノ腕ヲ露ス者其兒
ヲ死スルコト勿ラシメント歎ルニ在テハ速
ニ術ヲ施スベシ然ラサレバ兒宮内ニ於テ

速ニ死ヲ致スコトアリ其他又常屬居ニ屬ス
ル者三種アリ第一種ハ胎児分娩ニ臨テ一
足或ハ兩足ヲ露ス者コノ症ノ如キハ法ノ
如ク其兩足ヲ捉定シ直チニ拽ラ容易ニ分
娩シ得ルヲ以テ其居状ヲ轉スルコトヲ要セ
ズ只兒ノ俯仰ヲ辨シ若シ腹面スルニ在テ
ハ宜ク兒体ヲ回轉シテ分娩セシムベシ第
二種ハ胎児一足ヲ露ス者コノ症ニ於テハ
再々之ヲ宮内ニ推進スルコトナク上ニ示ス
方法ニ從テ他人一足ヲ取り拽テ分娩スル

ニ至ル第三種ハ胎児臀ヲ以テ産門ニ向フ
者コノ症ノ如キハ胎児兩打トナリ出ルヲ
以テ容易ニ分娩シ難ク殊ニ若年ノ女ニ於
テハ胎児死ヲ致スカ或ハ自ラ斃ルニ至リ非
サレバヨク免レ得ヘキニアラズ若シ幸ニ
兩手ヲ全スルコトアルカ如キハ或ハ産門ヲ
破傷スルコトアリ故ニコノ症ノ如キハ胎児
腹ヲ把テ緊ク産門ニ逼ラサルニ及テ産婦
ヲシテ臀ヲ高クシ仰臥セシメ直ニ其臀ヲ
内ニ向ニ推轉シ次テ其足ヲ捉テ引抜ス

シ若シヨク之ヲ推轉シ滑サルニ於テハ醫
兩手ヲ以テ兒ノ臂ヲ緊捉レ劇ク引テ速ニ
分娩セシムベシ若シ胎兒既ニ長ク爰ニ困
窘スルニ在テハ宜ク速ニ術ヲ施シ必ズ兒
ヲシテ斃ルニ至ラシムルヲ勿レ但シ兒
ノ腋産門ニ礙スレバ指ヲ以テ之ヲ探リ其
腕ヲ挑出シ全ク分娩セシムハシ都テ明達
ノ醫家若クハ産婆ハ胎兒手ヲ把テ産門ニ
向フヲ認レバ未タ其手全ク露レサルニ
及テ速ニ之ヲ推送シテ再ヒ宮内ニ入ラシ

ル若シノ術施スル延滞スルニ於テハ之
ヲ推送スルノ容易ナラズ或ハ全ク成シ滑
カタク是ヨリシテ速ニ母子兩斃ヲ致ス
至ル但シ其初ニ於テ又ク其手ヲ托入スル
ニ在テハ兒体自ラ轉シテ頸或ハ足ヲ把テ
産門ニ向ヒ生産常ニ異ラサルニ至ル然レ
尚兒体速ニ常位ニ轉セナル者ハ宜ク其足
ヲ捉テ拽テ分娩セシムベシ
死胎篇 第一
胎兒宮内ニ死スル者ハ容易ニ分娩シ難ク

殊ニ其胎及常居ニシテ手術ヲ要スル者ノ
如キハ尤モ難ナリ何者ハ元来コノ難産ノ
因ハ譬ヘ其胎尋常居タリト雖一ハ胎兒動
搖セサルツ以テ産婦カ息ヲ發スルコトナク
偶之ヲ發スルコトアリト雖其ク微弱ナル
ニ依リ一ハ胎兒自ラ分娩セント欲ルノ勢
ナキニ依リ或ハ兒頭大ナルカ若ハ其他分
娩シ得ベカラサルノ因アツテ終ニ死ルニ
至ルニ依ル抑コノ術ヲ施サント欲スルニ
於テハ宜ク先ツ胎兒ノ死活ヲ承認スベシ

但シコノ事タル甚ク容易ナラズ殊ニ胎兒
肩臂背其他頭ノ偏側ホノ部分ヲ以テ産門
ニ向フ者ノ如キハ最モ難ク然レ全ク亦
認シ得ヘカラサルニ於テハ宜ク意ヲ盡シ
テ之ヲ明認スルヲ緊要トス都テ述作家説
明スル所ノ死胎覽法ハ甚ク分明ナラズ
ヲ証據トシ難シ假令ハ孕婦又ハ臨産ノ婦
暫ク胎動ヲ覺ヘズ只腹内斃重ヲ覺ヘ其氣
ヲ轉スルニ從テ胎亦傾側シテ動ズ或ハ數
戰慄患寒ニ或ハ眩暈若クハ尻臂重墮ヲ覺

ハ又々氣息臭氣ヲ帯ビ及ヒ膿様ノ穢物宮
内ヨリ漏出スルノ變ヲ以テ專ラ死胎ノ確
徴トス又クヒアルテル氏ノ産婆ノ書及ヒ
コウズイノ氏等ニ其他ノ著書中ニ宮中ヨ
リ胎兒ノ黒便ヲ漏出スル者ハ胎兒既ニ斃
ル、ノ証據トス然レ余嘗テ是ホノ標的ヲ
信據ニ大ニ謬誤ヲ致セリ其忘タル變ニ示
ス所ノ死胎標的變ヲ備リ且ツ胎兒既ニ黒
便ヲ泄スヨアルヲ以テ之ヲ死胎ニ斷テ分
曉セシム然ルニ尚出胎ニシテ其兒今ニ至

ク生育セリ是ヲ以テ之ヲ觀レバ此ニ示ス
所ノ標的の信據ニ難キヲ自ラ明ナリ然レ宮
外ニ脱スル胞帯或ハ胞衣ヲ診スルニ脈動
應ゼズニテ厥冷スル者其他腕又ハ足ヲ露
ス者其脈動既ニ絶シ厥冷シテ其色青黒表
皮刷脱スル者等ノ如キハ實ニ死胎ノ確據
トスルニ足ル但シ尋常據ニシテ兒頭産門
ニ向フ者是亦胎ノ死活糸スルヲ難シ然レ
其頭蓋骨接合ノ処所謂ホシタ子ルニ當テ
脈動ヲ見ズ殊ニ其部充實ナラズシテ陥凹

レ之ヲ抑テ柔軟ナル者ハ死胎ノ徵トス
候虚弱ノ兒ニ於テハ都テ胎兒死シテ既ニ
破水スル者ハ其胎速ニ腐敗ス剛是ヨリシ
テ種々患症ヲ發シ終ニ産婦死ツ歎スニ及
ビ者アリ故ニ婦ヲシテ其死ヲ免レシメン
カ為ニハ勢ヲ早ク胎ヲ墮スルヲ緊要トス
然レ臨産期ニ至ラズシテ胎兒既ニ死シ胞
膜未ダ破裂セサルニ依テ破水セサル者ハ
其胎數週宮内ニ在テ腐敗スルヲナク其他
コノ患症ヲ發スルヲナシ
撃スル所ナリ

此症ノ如キハ業刻或ハ手術ヲ以テ強ク分
挽ク促スルヲナク宜ク良能ニ從テ其胎自ラ
墮スルニ至ルヲ待ツベシ

第二

前症初ニ示ノ症^{即チ反常居殊ニ胎兒臨産}
ニ至テ死シ保モ尋常居ナル者、於テハ直
ニ器械ヲ用ルルヲナク先ツ産婦ニ強壯刻ヲ
興ハ宜ク分娩ヲ促スベシ若シ其刻効ヲ奏
セザルニ在テハ剝シキ水鏡法ヲ行ヒ以テ
其生産職^職ヲ振起シ頻ニ胎兒ヲシテ産門

進マシムベシ然レ尚効ヲ認メサルハ手術
ヲ以テ分娩セシムルノ期トス何者ハ此ノ
如ク烈ク運営ヲ衝動スル催玉刺又ハ強壯
刺ヲ甚ク長ク聽用シ且ツ數回之ヲ施スニ
在テハ容易ニ危馬ノ脱血又ハ劇熱ヲ發ス
ルニ至レハナリ故ニ手術ヲ以テ分娩セシ
メント欲セハ前ニ説示スル如ク産婦ヲ臥
床又ハタリヘルニ横臥セシムルカ若クハ
尋常ノ産椅ニ憑ラシムルニ但シ預メヨク
通尿セシメ以テ膀胱ノ膨脹ヲシテ兒ノ生

産ヲ阻礙セシムルノ勿レ若シ兒頭膀胱頸
ヲ壓迫シ意ノ如ク通尿ヲ得サル者ハカテ
リテルヲ用ユベシ既ニシテ十分通尿ニ得
ルニ至テ手ヲ進メ直ニ兒頭ヲ捉定シ拽出
スニ至ル若シ兒頭枕骨ニ一手ニシテ之ヲ
分娩シ得サルニ於テハ兩手ヲ以テ兒頭ノ
兩側ヲ緊捉シ徐々ニ之ヲ拽クハシ然レ尚
ヨク分娩ニ得サルニ於テハ二十五丁ノ剪
ニ回ノ如キハルヘーシ氏ノ械吾或ハ鈎又
ハレトペルヲ用ベシ若シ兒頭大ニシ子宮

頭：礙シコノ術ヲ以テ容易ニ下リ来ラザ
ル者ハ指頭或ハ翫ヲ以テ兎ノ「ホシ」タ子ル
ヲ破閉シ腦ヲ抓キ出シ腦蓋ヲ収縮セシメ
捉定シ易カラシメノ既ニシテ手若シクハ「
」ペルラ進メ分挽セシムハシ「マ」スリセアニ
人ハコノ「宍」ニ於テ第二十三丁ノ十三回ノ
如キ「ホ」フドラ「ッ」ケルト名ル一種ノ精巧
ナル器械ヲ用ニ彼毎時コノ器ヲ用テヨク
是等ノ兎ヲ分挽セシメ甚タ自賛セリ其ノ
之ヲ用ルヤ十四回ノ如キ刀尖ノ兩側ニ又

アル小刀ヲ以テ先ツ「ホ」シタ子ルヲ開破シ
既ニシテ「ホ」フドラ「ッ」ケルヲ進メ安頓シ
兎頭ヲ併セテ拽キ出スニ及ルコノ術ニ依
テ「マ」スリセア「マ」大ニ評誦ヲ得ルコトアリ然
レ人ヨリ上ニ説スル術ヲ施シ得ルニ於テ
ハコレ等ノ器用ハ必竟無益ニ屬ス

第三

死胎ニシテ反常居ナル者ハ活胎反常居ノ
余ニ説スル如ク胎兎ノ兩足ヲ索テ分挽セ
シムベシ然レ既ニ腐敗スル者ニ於テハ必

ガヨク用意ニ割シク拽キ兒頭切ニ至ラシ
ムルコ勿レ若シ其拽クコ割ニ依テ兒頭断
テ宮内ニ懸至スル者ハ子宮再ヒ開收セサ
ルニ先テ速ニ之ヲ拽キ出スバシ之カ為ニ
救危為ノ疾患ヲ發スルニ至ル

第四

殊ニ兒頭ハ圓ニシテ粘滑ナルヲ以テヨク
握定ニ難シ故ニ余ハ其兒口ヲ索メ之ヲ緊
捉スルコトヲ要ス之ニ依テ毎時他人ノ器拽ツ
用ルズシテヨク之ヲ拽キ出セリ若シ意ノ

如クナラサルニ於テハ之ニ備フル者十第
十一回等ノ鉤ヲ以テ兒ノ口、眼、鼻、後腦ノ創
口、其他鉤ノ堪エハキ部分ヲ撰ニ之ヲ上ヨ
リ下ニ向ケテ懸テ又左手ヲ以テ上ニ向ケ
其頭ヲ捉定シ拽出スハシアルナウド氏ハ
一種ノ袋ヲ以テ其頭ヲ拘シ之ヲ拽テ下シ
弟五
胎兒既ニ分娩スルニ至テ腕ヲ捉出し死ス
ル者多シコトノ症ノ如キハ漸次ニ金手ヲ出
シ終ニ兒肩産門ニ授法ニ再ヒ宮内ニ推送

シ得サルニ至ル故ニ容易ニ之ヲ容ルコトヲ
得ズ殊ニ死胎ノ微頭着ニシテ腕黒色ヲ帯
ビ厥冷シテ脉動ナク表皮剝脱スル者保ミ
其足ヲ索ント欲スニ腕ニ從ヒ手ヲ宮内
ニ進メ得サルニ於テハ宜ク其腕ヲ切斷ス
シ其之ヲ切斷スルヤ先ツ兒ノ腕ヲ取テヨ
ク輪轉シ肩ノ靱帯ヲシテ延拵裂セシメ
且ツ剝ク其腕ヲ拽キ出ヌヘシ此ノ如クシ
得ルニ在テハ容易ニ腕ヲ肩ノ關節ノ際ニ
於テ切斷スルヲ得ベシ然ルコトノ術ヲ施ス

ニ於テハ宜ク用意シ産婦ヲシテ彼ヲ
シクルコト勿レ預メ之ヲ防ニガ為ニハ弟十
二回ノ如ク刀尖ニ小球ヲ具ル一種ノ小刀
ヲ用ルヲ良トス既ニシテ之ヲ切斷シ得
ルニ至ラ取テ拽ガ為ニ手ヲ陰中ニ進メコトク
之ヲ探索スヘシ然モコトノ症ニ於テハコトノ
術容易ニ施シ難シ何者ハ兒ノ肩宮内ニ杖
淡スルコト甚ク其術ヲ行ニ当テ産婦ヲシ
テ苦痛セシメ且ツ宮内ノ損傷スルコト恐ラ
ルヲ以テ根ニ逆引廻轉シ得ベカラス一ハ

ナリ爰ヲ以テコノ症ノ如キハ指頭若クハ
鉤ヲ以テ徐々ニ胎兒ノ胸若クハ小腹ヲ開
破シ手ヲ以テ兒ノ内臟ヲ抓キ出シ魚テ肋
骨ヲ折斷シテ兒体ヲ收縮セシメ以テ腎系
ニ足ヲ子宮頭ニ近カシム既ニシテ其足ヲ
捉定シ滑ルニ至レバ拽テ分娩セシムヘシ
然レ宮内狭窄ニシテ甚タ閉法ニ常傳起ノ如
ク兒足得難ニ於テハ醫友手ヲ以テ兒頭腎ノ
下側ニ當テ鉤ヲ其上側ニ懸ケ鉤手併セラ
腎ヲ持テ拽キ出スヘシ之ニ依テ兒ノ足胸

頭等次ヲ進テ下ニ来レ但シ全体ノ未タ墮
セサルニ及テ他ノ骨肉ハ小碎片多少出ス
ルコトアリ然レ其鉤ヲ用ルニ於テハ宜ク子
宮ヲ破傷セサルコトヲ要ス故ニ余カ用ル鉤
ハ其尖頭子宮ニ向フコトナクヨク兒胎ニ向
フコトアルヲ知ラシカ為ニ本柄ニ記号ヲ刻
シ以テ其内外ヲ辨ス余コノ術ヲ以テ死胎
ノ産婦ヲ救フコト甚タ多シ

第六

或鉤ノ代リニ二十一丁第五回ノ「ス」トシス

子トテ此ノ如キ大ナルタニゲシヲ用ム之
ヲ鉤テ比スルニ子宮ヲ破傷スルヲ甚ク少
シ故ニスレトホリダト氏ハコノ類ノ器ニ
於テ尤モ良好ノ器トス

第七

都テ手ヲ以テ術ヲ成シ得ヘキ間ハ宜ク用
意シ器械ヲ用ルコト勿レ若シコレヲ用ルニ
於テモ亦ムコトヲ得サル者ニ非レバ損リニ
之ヲ用ルコトヲ禁ス若シ鋭利ノ器械ヲ用ル
ニ在テハ醫必ス先ツ仔細ニ胎兒ノ活ヲ辨

認スバシ何者ハ器械ノ為ニ破傷セラレハ
所ノ半生ノ兒ヲ挽シ大ニ耻辱ヲ残シ且ツ
訛訛セラレハ至レハナリ都テ是等ノ事
ハ常ニ醫ノ輕率ニ出ツ故ニケイシユス氏ハ
コノ術外科ニ於テ尤モ雅ニシテ容易ナラ
サレ事トス或ハ子宮ノ擴張セレガ為ニマ
ウリセアス氏ノ圖譜ニ載ル心ノムリテ
スビリゲルヲ用ユ然レコノ器ニ依テ子宮
ヲ破傷スルコト稀ナラサルヲ以テ余ハ之ヲ
無益ニ屬スル耳ナラズ却テ有害ノ器トス

脱血篇第一

醫孕婦ノ脱血ヲ芟シ大ニ衰弱スル者少為
ニ招カレ殊ニ其疾胞宮底ヲ離断スルニ由
テ發スルヲ察セバ母子ノ死ヲ救ハンカ為
ニ宜ク用意シテ其分娩ヲ促ラ良トス抑是
是ヲ治セント欲セバ難産ノ糸ニ説示スル
如ク患婦ノ兩足ヲ開テ臥床ニ仰臥セシメ
醫手ニ脂油ヲ塗ノ徐々ニ陰中ニ指シ進シ
テ子宮口内ニ入ルバシ然凡コノ疾ニ於テ
ハ子宮口多クハ狹窄ナルヲ以テ其初ノ一

指ヲ進メ次テ二指三指ニ及シ漸次ニ子宮
口ヲ擴張ナラシメ終ニ全子宮内ニ進ル
ヲ得バ指ヲ以テ胞膜ヲ破裂シ直ニ胎兒ヲ
捉スルニ至リ其足ヲ取テ拽キ出スベシ但
シ見足下ニ在ル者ハ頭ノ下ニ向フ者ニ地
スルニ此術甚ク行ヒ易シ何者ハ兒頭下ニ
向フ者ハ容易ニ足ヲ捉定シ得ザルカ故ナ
リコノ疾ノ如キハ胞衣既ニ宮底ヲ脱シア
ルヲ以テ兒挽スレバ胞衣次テ墮シ来リ脱
血又自ラ減シ終ニ適宜ノ内服藥ニ依テ全

ク閉止スルニ至ルモトヨリ飲料ニハ他ノ
烈キ脱血症ノ如ク臑羹ビール、乳汁等ヲ暖
シテ之ヲ其ハ以テ損乏ノ血ヲ補ヒ再ビ
速ニ血脈ヲ充盈ナラシムヘシ此ノ如クシ
テ保命六帖ニ及フ者ハ漸次ニシテ其死ヲ
免ルヘシ都テ之ニ依ラ死スル者ハ多クハ
其初發刺シク脱血スルノ期ニ在リ且シコ
ノ症ニ於テハ「マユリセアム」氏之治例アリ
宜ク其書ニ就テ熟讀スヘシ

胞衣ハ分娩後直ニ下リ来ルヲ其常トス然
レ間醫別ニ術ヲ以テ下スベキ者アリ殊ニ
胞帯離断シテ胞衣宮内ニ残り剝シキ兒枕
痛又ハ剝熱ヲ發シ胞衣速ニ腐敗シ或ハ剝
シキ脱血ヲ發スルニ於テハ多クハ是ガ為
ニ死ヲ致スニ至ル都テ分娩後胞衣宮内ニ
残り數日ヲ経ルニ於テハ必ス腐敗シ自ラ
墮スルト是レ必然ノ事ナリ故ニ或ハ思フ
ク強テ手ヲ以テ之ヲ下スコトヲ要セズト
然レ老練ノ徒並ニ「ヒッホカラテス」ハ胞衣手

ヲ以テ下シ得ヘキ者ニ於テハ長ク之ヲ子
内ニ停滞セシムルコトナク早ク之ヲ下スヲ
良トセリ是ヲ以テ分娩後胞衣速ニ墮シ来
ラズ殊ニ別ニ故ナキ者ニ於テ未ダ其胞衣
ヲ下サズル間ハ其婦ヲシテ産椅ヨリ退カ
シムルコト勿レ若シ其ノ胞衣ヲ下スコト遅速
スルニ於テハ子宮再ビ開放シ胞衣容易ニ
下リ難ク終ニハ全ク下シ得ヘカラサルニ
至ル者又稀ナラズ分娩後胞衣ヲ拿リ緩々
ニ扱テ之ヲ試ルニ胞衣査ニ下リ来ラザル

者ハ八百七十六寸ニ示ス如ク胞帯ヲ緊札
シ速ニ之ヲ切斷シテ先ツ出生ノ兒ヲ奉ク
ヘシ既ニシテ醫左ノ手掌ニ胞帯ヲ纏フ一
ニ回右手之ニ從テ陰中ニ進ニ三十寸第八
回ノ如ク胞帯ノ莖ニ至テ之ヲ捉定シ且ツ
扱キ且ツ振搖シテ胞衣離レ来ルニ至ルベ
シ若シ尚下リ来ラサル者ハ其勢ヲ振起セ
ガ為ニ産婦ヲシテ咳セシメ又夕ハ臨産ノ
如ク數努カセシメテ胞衣終ニ墮スルニ至
ルニシテ其他スノイフ夕バツクヲ以テ噴セシ

ムルモ亦甚々良ニシテ得テハ心ニ依テヨ
ク下リ来ルアリ但シ胞帯ヲ拽ルト甚々強
クシテ終ニ離断シ再々之ヲ拿テ拽キ得ベ
カラサルニ及ボスト勿レ且ツ妄ニ拽テ子
宮ヲ保セ拽キ出スニ至ルト勿レ
前章示ス所ノ術ヲ施シ胞衣尚宮内ヲ脱セ
ズ且ツ緩々ニ拽キ垂散ラ下シ得ヘカラサ
ル者或ハ胞帯既ニ腐敗シ若クハ他ノ因ニ
依テ片々ニ断裂スル者等ニ於テハ醫直ニ
手ヲ子宮身ヲ子宮中ニ進メ之ヲ探ルニ胞

衣既ニ宮底ヲ離ルル者ハ速ニ拽キ出スベ
シコレ等ノ術ハ本ヨリ常ニ行ヒ易シ然レ
胞衣尚宮内ニ懸リ容易ニ下リ来ラサル者
ハ胞衣未ダ宮底ヲ離レテアルカ指ヲ
以テヨク之ヲ候シ若シ其離レサル所アル
カヲ認メ得ハ指ヲ以テ徐々ニ其部ヲ離断
シテノチ拽キ出スバシ但シ胞衣全ク子宮
内ニ附着シテ少モ離レサル者ト虽輕易ニ
離レ得ハキ者ハ指ヲ以テ之ヲ離シテ下ス
ハシ都テコレノ術ヲ施スニ瓜ヲ以テ子宮ヲ

損傷セサルヲ緊要トス然レ若宇着シ之ヲ
離断スルヲ艱難ナルニ於テハ強テ割キ術
ヲ施シ産婦ヲシテ危篤ニ至ラシムヨリ
ハ只肥沁割珠ニ乾タルアルヘルス又ハ没
藥礪砂等ノ散割ヲホトテテラ以テ内服セシ
メ強キ水鏡法或ハ坐藥ヲ施シ若クハ
スコロイトヲ以テ噴セシメ其良能ニ委任
スルヲ良トス何者ハ地ノ如クシテ其期ヲ
待ニ於テハ胞衣自ラヨク下リ来ルヲ有カ
故ナリ都テコノ患者ヲ初テ診スルノ時先

ツ是等ノ割ヲ其ニ試ルヘシ其他子宮既ニ
閉澁スル後ト云亦ク宜クコノ割ヲ施スベ
シ但シ胞衣自ラ下リ来ラズル者ニ於テハ
未熟ノ産婆ハ速ニ之ヲ下スヘキ術ヲ施ス
コトヲ欲セズ本ヨリ以為ク此ノ症ノ如キハ
是レ胞衣宮内ニ生合セリト依テ案然トシ
テ産婦ヲ臥セシメ別ニ術ヲ施シテ之ヲ下
スノ意ナシ故ニ多ハ其術ヲ施スコト大ニ違
延シ子宮口閉澁スルヲ以テヨク成シ得ハ
キノ術ト云然ニ施スヘカラサルニ至ル況

ヤ手ヲ以テ胞衣ヲ拽キ出スガ如キニ至テ
ハ斷ラ施スヘカラザルニ至ル其閑淡セサ
ルノ以前ニ於テハ其手ヲ以テ拽キ出スガ
如キハ甚ダ成シ易キノ術タリ都テ其術ヲ
施スバカラザルガ如ク疔ニ於テハ只藥劑
ヲ以テ之ヲ下スルヲ務ルヨリ良法アルハ
アラスラルダハノ醫學教頭リユエハ近來
經驗者ヲ著セリ其書中ニ曰胞衣後々ニ拽テ
下リ来ラザル者ハ必ス強テ之ヲ下スルヲ
禁ス以為ク強テ胞衣ヲ離斷シ或ク剝テ拽

キ下スルヲ以テ產婦危篤ノ諸症ヲ發シ是ガ
為ニ死スルニ至ル者甚多シト爰テ以テ同
氏曰輕緩ニ之ヲ拽テ下シ得サル者ハ產婦
ヲ床臥ニ就カシメ必ス強テ之ヲ下シト欲
スルコト勿レ期ニ至ルバ良能ニ依テ胞衣自
ラヨク下リ至ルコトアリト都テ此ノ如ク良
能ニ委任スル者ハ死ヲ致スル毎ク強テ之
ヲ下ス者ハヨク死ヲ致セリト是レリユエハ
モ舊來九十年自ラ確證スル処ナリ故ニ
レ等ノ症ニ於テハ醫最モ慎謹用意スベキ

トニシテ猥ニ街ヲ施シ産婦ヲ危篤ニ至ラ
シタルト勿レ我意ヲシリエエトシ氏ノ述ル
所ハ是レ只剥ク胞衣ヲ引抜スルヨリシテ
害ヲ生スル者ノ為ニ戒ムル者ニシテ必ス
尋常後徐ニ拽ク者ニ就テ言者ニアラズ何
者ハ胞衣ヨク下シ得ベキ者ト云産婆ノ急
情、依テ速ニ之ヲ下サバハ胞衣自然
ニ下リ来ルコト得ズ終ニ是レ為ニ鬼録ニ
上ル者ニ就テ再ナラズ諸名達ノ醫家並ニ
産婆等毎時日撃スル所ナリ故ニ都テ穩和

ハ術ヲ以テヨク之ヲ下シ得ベキ者ハ断テ
之ヲ宮内ニ止ルコトナキヲ以テ良ナリトス
雙胎或ハ品胎ニシテ一兒分娩シ次ノ兒將
ニ娩セんと欲スル者ハ其兒分娩セサルノ
先ニ初ノ免スル兒ノ胞衣ヲ下スコト勿レ早
ク之ヲ下セバ危篤ノ脱血ヲ發シ母子共ニ
死ヲ致スニ至ルコト余毎ニ視ルコトアリ若シ
胞衣宮内ニ蓄敗シ臭氣ヲ發スルガ如ク者
ハ之ヲ防シガ為ニコトバヘルコトイドダイコンアラ
コトヲ臭口臭ク又ハアルセムノ煎汁ニ致

塊密或ハ少ノ、^エソキシルツ加ハ緩和清潔
ノ水鏡剝トシ、^四丁ノ第六回ノ水鏡又ハ第
十圖ノ管ヲ以テ日ニ數回之ヲ陰中ニ注射
シ或ハ胞衣既ニ墜下シ宮内少モ腐敗物ヲ
見サルマズ強壯水鏡法ヲ施スバシ其他腐
敗ヲ防禦シ胞衣ヲ離断スベキ為ニツトノ
テ内用ノ藥剝ヲ撰ヒ宜ク之ヲ服スバシ都
テマツリユセア^二ノ著書第二卷ノ第九編並
ニ其治驗ノ書等ニ於テ胞衣ヲ下ス術ヲ詳
説スモツトテ亦タ之ヲ論ス事ニ就テ之ヲ

第一

毎時子宮内ニ一種内様ノ^生塊ヲ生
スルコトアリ世人名シテ^イヘルス。ミスラグ^テシ
偽孕或ハト唱フ柳コノ者タル多ハ子宮中ニ
誤孕ノ^義疑結セル血液或ハ胞衣ノ浅片若クハヨク
孕ヲ結バザル卵ヨリ生スコノ^義疵少女及ビ
寡婦ニ生ズルコト固ヨリ壯年ノ婦ニ多
シ每亦其形状大小同一ナラズ或ハ少モ宮
内ニ生着セサル者アリ或ハ一二ノ血結ヲ
以テ子宮連續スル者アリ或ハ全ク子宮ト

生合スル者アリ又稀ニハ胎ト共ニ宮内
ニ生スル者アリ然レコノ宍ノ如キハ最モ
稀ニシテ多ハ胎ヲ共ニスルコトニ其胎ヲ
共ニセテアル者ハ三四箇月ニ至テ間ヨク自
ラ墮下スルニ至ル其墮スルニ当テ患婦臨
産ノ如キ疼痛ヲ發シ動モスレハ尚一層劇
痛スル者アリ其他劇ノ脱血ヲ發シ危篤ニ
至ル者亦少ナカラズ又稀ニハ數月宮内
ニ在テ成長シ其大サ殆ント真ノ妊娠ニ異
ナラザル者アリ

第二

此宍初メ四箇月ノ間ハ妊娠ト諸候全ク異
ラサレテ以テ其際モタ認メ難シ然レ此日
ヲ經ニ從テ稍ク一二ノ區別ヲ得バシ概ス
ルニ其一ニスタラクトテ孕スル者ハ懷孕
後既ニ半ニ至ルトモ真ノ妊娠ノ如ク生油
ノ氣ヲ覺ルコトナシ其二コノ宍ノ如キハ腹
平等ニ充脹ス此ニ及シテ真ノ妊娠ハ臍脘
又ハ腹ノ偏側殊ニ充脹シ或ハ隆起シテ全
腹平等ナラズ其三患婦彼此身ヲ轉スレバ塊

亦從テ轉例ス妊娠ノ如キハ是等ノ要件嘗
テ曾テアルコトナシ其四妊娠ハ乳汁ヲ出ス
ニ至ル者多シニスダラクトノ如キハ乳汁
出ルコトナシ其五コノ宐ハ莫ノ妊娠ニ死ス
ルニ多ク危篤ノ宐ヲ發シ多クハ動作艱難
ニシテ顔色萎衰腰腿牽引若クハ刺痛ニ其
他種々ノ宐候ヲ發ス爰ヲ以テ其婦ノ生胎
ヲ孕セサルコト自ラ明認スルニ足ル毎胎亦
水腫ヲ絶發スル者アリ宜ク注意スベシ

第三

コノ宐未ダ莫ノコトニスダラクトタルコトヲ認
メ得サルノ間ハ護ニ駝泄劑ヲ用ヒ誤ラ生
胎ヲ墮下スルニ至ルコト勿レ然レ莫ノ妊娠
ニ非ルヲ的知スルニ於テハ之ヲ駝泄スベ
為ニ先ツ内科醫ト謀リ當相ノ劑ヲ服スベ
シ若シ投藥徒効ヲ奏セサル者ハ速ニ外科
醫ヲ招キ宜ク其手術ヲ請フベシ但シコノ
宐ニ於テハ子宮口毎ニ閉緊アルヲ以テ其
術ヲ施スニ先テ強壯劑水鏡又ハ浴湯法ヲ

施シ或ハ峻下剉若クハ肥泄剉ヲ與テ陳痛
ヲ振起スルヲ要ス此ノ如クスレバハ
ダラクトト自ラ下リ赤リ且ツ子宮口稍開テ
二指ヲ以テ其口ニ進メ得ルニ至ルベシ爰
ニ於テ孕婦脱血門ニ示ス如ク指ヲ以テ漸
次ニ子宮口ヲ擴潤ニシ終ニ全手ヲ進メテ
ミスタラクトトツ捉リ徐々ニ拽キ下スベシ
問宮内ニ生着スル者アツコノ處ノ如キハ
ビルダニスノ方法ニ從ヒ指ヲ以テ之ヲ離
スヘシ若シ其生着スルヲ甚キニ於テハハ
グ

ラシテ^地フルグ^名ノ産婆書ノ凡例ニ著ス
如キ稍長クシテ尖利ナラザル剪刀ヲ以テ
之ヲ切斷スヘシ但シミスダラクトト甚ダ大
ナルヲ以テ其狀ヲ全シテ下シ得ベカラザ
ルガ如キ者ハ指又ハ曲タル一種ノメス或
ハハ^カヲ以テ之破裂シ扁片ニ切斷シテ
下スベシ蓋シミスダラクトト下スベキ諸
ノ試験ヲ閲セント欲スル輩ハマユリアス
ノ試験ニ就テ宜ク之ヲ通覽スベシ

子宮脱

第一

凡ソ子宮ノ脱出スル者之ヲ子宮脱ト唱ハ
ズ唯子宮ノ「フル」ヨリ脱スル者之ヲ子宮
脱ト稱ス或ハ人多ク思ラク子宮ハ元ト之
レ脱出スバキノ理ナシ故ニコノ症ノ如キ
ハ人々其想像ノ上ニ立ノミト然レ諸述作
家ノ多ク試験ニ依ルニコノ症ノ發スル
別ニ疑フ容ルハ「足ラズ殊ニ「リ」ス」ナ
ル人近來子宮脱ヲ論スルニ甚ク詳明ニシ
テ其外科試験ノ内ニ別ニ圖譜ヲ附シテ仔

細述之ヲ示ス即其書中第一第七第九第十
等ノ試験是ナリ故今其圖中ヨリ二種ヲ撰
テ此ニ摹写ス則圖譜ノ二十四丁第一第二
ノ圖是ナリ其後又「アルトドル」名地ニ於ケ
ル故醫學教頭「ドクトル」名地「ホフマン」及「ワイプ
シク」名地ニ於ル「ドクトル」シカケル氏真ノ子
宮脱ヲ目撃シ詳ニ之ヲ説明セリ蓋シテコ
レ二種アリ其一ハ子宮翻セシテ脱出シ之
ヲ候フニ其下邊子宮口アツテ第一回ノレ
ノ記ニ於テ見ル者ノ如シ其因本ト子宮ノ

勒帶大ニ縦緩衰弱スルヨリ發スル者ナリ
其二ハ子宮脫出スル耳ナラズ其狀一ノ袋
ノ如ク翻ク之ヲ候フニ子宮口ヲ見ズ殆ド
血ニ染タル一大片内陰戸ヨリ脫スルガ如
キ者則第二回是ナリ是等ノ症ドクトルルゲ
ンセリユス亦夕曾テ言フ処ニシテ妻ク之ヲ
其著書ニ載タリ但シ未熟ノ產婆及ク未熟
ノ産科ハ誤リ認メ肉様ノミスタラクトト
シテ強ク拽テ下サント欲シ却テ患婦ノ死
ヲ捉スニ至ル者稀ナラズ其二ナル者ハ分

娩少時間ニ發スルヨリ外他ナシ何者ハ其期
ノ如キハ子宮口開ラ未ダ全ク開渋セサル
ヲ以テ子宮翻テヨク其口ヨリ脱シ得ルヲ
以テナリ蓋シコノ症ハ剥シク胞衣ヲ拽キ
終ニ子宮ヲ併セラ拽キ出ヨリシテ未リ或
ハ産後剝ク兒枕痛ヲ發スルヲ以テ強ク其
腹ヲ拽シ直ニ子宮ヲ拽シ出スヨリシテ未
ルコノ故ニコノ症ノ如キハ速ニ之ヲ推納
セザルニ於テハ毎ニヨク死ヲ致スニ至ル

子宮胞衣ト共ニ脱スルカ或ハ胞衣下ルノ
後脱シ来ルニ於テハ醫或ハ產婆直ニ之ヲ
納ムバシ若シ胞衣子宮ニ生着スル者ニ於
テハヨク用意シ指ヲ以テ子宮ヲ破裂スル
コトナク速ニ是ヲ離レ手ヲ以テ緩々ニ推納
シ再び故ニ復スベシ其之ヲ行フヤ尤モ速
ナルコトヲ要ス何者ハ子宮未タ其口ヲ閉ジ
サルヲ以テ其推納スルコト甚タ易シ術ヲ行
フノ後ハ患婦兩足ヲ併セラテ臥床ニ靜臥ス
ベシ然レ子宮口自ラ開洩シテ再び脱スル

コトナシ都テ之ヲ納ルコト速ニセサルニ於テ
ハ患婦暫時ニ死致スコトアリ偶其初メ死ヲ
免ル、ト云子宮閉テ再び故ニ復スルコト
得難シ何者ハ血液其内ニ凝滞シテ脱疽ヲ
發シ終ニハ死ヲ致スニ至レバナリ若シコ
ノ症醫ノ未ダ来ラザルニ及テ嫩衝腫起既
ニ甚シキニ至ルト云尚ヨク之ヲ納メ得ベ
キノ症ニ於テヨク之ヲ輕易ニ推納スベキ
為ニ先ツ產婦ヲシテヨク小便ヲ為サシメ
勒テ小腹内ヲ寬擯ニシ以テ子宮ヲ儉スル

ニ阻礙スルコト勿ラシム既ニシテ患婦ヲシ
テ頭ヲ低ク臀ヲ高クシテ仰臥セシメ微温
湯或ハ乳汁ヲ以テ子宮ヲ潤シ油又ハホ
トルヲ塗リ或ハ緩和消毒ノ葯ヲ施シ以
テ其部分ヲ柔軟潤滑ナラシメ其後手ヲ以
テ之ヲ軟々推納スバシ若レヨク納メ得サル
者ハ晝日ヲ移サスシテ死ス但シ衆人思フ
如ク其子宮ヲ切斷スルガ如キハ絶テ死ヲ
免ルコトナシ

第三

コノ二種ノ子宮脱ニ於テ第二種ノ症ハ之
ヲ第一種ノ症ニ比スルニ生命危篤ニ至ル
コト少シ何者ハコノ症ノ如キハ都テ其部分
衰弱縦緩スルヲ以テ腐爛スルノ恐レナク
レハナリ然レ脱出シテ時日ヲ経ルニ於テ
ハ腰部劇痛或ハ通尿管非若ハ全ク閉止シ
又ハ焮衝脱疽硬結腫カシケル等ヲ發ス但
シ脱出後日時ヲ経ル程愈之ヲ推納スルコ
ト難ク譬ヒヨク納メ得ルト亟起行動作嘔咳
等ニ依テ再レ脱シ易ク之ヲ護持スルコト甚

夕唯シ若シ頑固ニシテカシケルヲ成スニ
至ル者ハ敢テ之ヲ推納スルヲ勿レ何者ハ
ハリユエトスル第九ノ試験ニ示ス如ク其脱
出セルヨリハ却テ患者ノ為ニ害ヲ捉スニ
至レハナリ

第四

子宮脱ノ硬結腫或ハカシケル状ヲ成サル
者ニ於テハ之ヲ治スルニ宜ク此ノ二条ニ
注意スヘシ一ハ之ヲ推納スルニ在リ二ハ
其再脱ヲ防禦スルニ在リ子宮脱未ダ

時日ヲ経サル者ハ其術尤モ施シ易シ先ヅ
患婦ヲシテ低頭高臀シテ仰臥シ兩脚ヲ開
カシメ醫手ヲ子宮ニ當テ上ニ向フテ腔内
ニ納メ更ニ指頭ヲ以テ推送シテ其本位ニ
復スヘシ然レ其再脱ヲ防禦スルヤ甚タ容
易ナラズトス何者本ト子宮ノ靱帯衰弱繼
緩ニシテヨク緊約スルヲ能ハサルヲ以テ
或ハ再發シ易キ故ナリ其之ヲ防止スルノ
法譬ヘハ割シキ薰蒸水鏡法耐蒸法及ヒ是
ガ為ニ設ル一種工形ノバンクトヲ施スドシ

等都テ良驗ツ奏ス其他一三日ノ間患婦ツ
静臥セシムルツ良トス但シ之ツ薫スルニ
或人二十三丁第九圖ノ器械ヲ用ユ其法其
器ヲ腔内ニ挾ニ別ニ橐籥ヲ設ケ以テ薫ツ
宮内ニ財入ス

第五

子宮脱既ニ時日ヲ経ル者又ハ前章示ス所
ノ術其効アラサル者等ニ於テハヨク之ヲ
其本位ニ護持シ且ツ其再脱ヲ防禦スベキ
為ニ或ル述作家ハトテルリシト唱ル器

械數箇ヲ製造セリ其器ハ則テ二十四丁ニ
開スル第三第四第五第六圖ノ如キ正中ニ
孔ヲ穿ツ者最モ良ナリ其製金銀若クハ適
宜ノ木ヲ用ユ尤モ固ク蠟ヲ以テ之ニ塗リ
其足ヲ用ルヤ大ヤ適宜ノ者ヲ取リ腔内ニ
入レ進テ子宮口ニ及スヘシ但シ步行スル
ニ當ラ或ハ脱出シ易キヲ以テ其器陰戸内
ヨリ稍大ナルヲ要ス本ヨリ之ヲ其内ニ固
定スベキ為ニ稍強ラ推送スベシ尚之ヲ固
ク保持セント欲セバ糸ヲ以テ其帯スル所

ノウインドセルス 帯ノ又ハ衣服ニ緊約ス
ルヲ良トス但シコノ孔ハ必ス無ンバアル
ベカラズ之ニ依テヨク月経其他ノ穢物ヲ
通泄スルヲ得故ニグレースス及ビルダニ
ズノ書中ニ載ル第七回ノ如キ梨子又ハ雞
卵状ノ器及此炎ノ器械ハ都テ便ナラズト
不殊ニコノ孔ハ妊婦ノ妊娠ヲ妨ルヲナク
又々子宮強壯ノ水鏡ヲ施スニ聊カ障碍ア
ルヲナシ其他コノ器ヨク腔内ニ湊合シ患
婦之ニ馴ルニ於テハ些少ノ不悖ヲ覺ルヲ

ナシ

前陰脱出篇

腔ノ脱出ハ其状子宮脱ト大ニ疑似スルヲ
以テ産婦産婆ハ勿論識ト虫間ニ症通シテ
子宮ト唱ルヲアルガ故ニ混目シテ區別ナ
キニ至ル然レ解部術ニ依テ子宮ノ常態ヲ
詳ニシ且ツ前篇示ス所ノ諸候ニ注目スル
ニ於テハ其之ヲ認辨スルヲ甚タ易シ何者
腔ノ脱出ハ直腸脱ノ如ク其部從緩延長シ
テ遂ニ陰外ニ垂ルノ他ナシハナリコ

症二種アリ一ハ腔ノ周圍延長ニ殆ト生肉
ノ「カ」ラシスノ如ク多少燼衝シテ陰外ニ至
ル者是ナリ但シ其腫起燼腫甚シキニ於テ
ハ間ヨク脱疽ヲ發ス然レ腫起^甚シカズ則ク
燼腫セサル者ハ其婦尚久ク顯著ノ疾志ヲ
覺ヘサル者アリ一ハ重荷ヲ擔シ或ハ努力
又ハ難産等ニ於テ腔ノ一部分延長シテ陰
外ニ腫脹スル者ニシテ其状子宮脱ノ如ク
即チ五十一篇ニ述^レノ^一ク^レン^ノ試驗ノ如
キ是ナリ然レ^レコ^ノ症多ハ贅肉ニ屬シ上ノ

百四十三篇ニ示ス如ク系ヲ以テ之ヲ緊札
シ又ハ刀ヲ以テ切斷シヨク之ヲ除ク^レト
得^レコ^ノ症ノ如キハ子宮ノ翻テ脱出スル者
ト甚ク辨認シ易シ何者ハ子宮ノ翻テ脱ル
者ハ多ハ分娩後ニ在テ併ミ不意ニ發スコ
ノ症ノ如キハ其發スル^レト必ス産後耳ニ系
セザレバナリ^レト千七百二十四年一婦人難産
ニ系シ十二時ニシテ前陰脱スル^レト其厚サ
二掌既ニ脱疽ヲ發ス然レ分娩後八日シ經
テ遂ニ死ヲ致ス是余親ク目撃スル所ナリ

蓋シ子宮脱ト腔脱トハ其際甚ダ辨シ雅キ
ヲ以テヨク其症候ト區トシ詳ニセサルニ
於テハ謬誤ヲ致ス丁僅少ナラズ甚ニ於テ
ハ述作者ノ説スル如ク子宮脱ヲ切斷シテ
也少ノ妨害ナキ耳ナラズ其尚ヲヨク懷孕
シテ故ナク分娩セルトアリト云フニ至ル
嗚乎杜撰ノ甚キニアラズヤ若シコノ説ノ
如ク實ニ子宮切斷スルニ於テハ是等ノ
支件曾テ有ルベキ理ナシ爰ヲ以テ之ヲ觀
レバコノ症ノ如キハ是全ク贅肉又ハ腔脱

ノ貴タルト疑フ容ルニ足ラズ
コノ症ノ如キハ腔脱出物腔或ハカシケル
状ヲ成サバハ先テ速ニ之ヲ納ムハシ若
シ是等ノ患ヲ發ルニ至テ終ニ治シ堆ニ至
レバナリ然ルヲイダクルトインダグ及ビ
トワスノ如キハ腔脱ノツイトワスノ如ク宜
ク之ヲ截リ去ルベシ但シ腔ノ周圍脱シテ
嫩衝ヲ魚子ザル者ハ強壯並藥ヲ以テ並溺
シ或ハ指若ハ口スシカトル
者成スヲ以テ之ヲ推納シ其後兩三日ノ間ハ

患婦兩足ツ併ヤテ静臥スルカ或ハ兩脚ツ
又ヒテ十字形ト成シ仰臥スルツ良トス殊
ニ其間絶ベス石灰水ニ火酒ツ交ル者或ハ
強壯又ハ收斂ノ藥草ツ取リ葡萄酒ツ以テ
煮テ莖葉トシ陰所ニ打漏シ或ハ工字形ノ
繃帯ツ施シ固定シテ脱出スルコト勿ラシム
コノ藥葉又ハ乳香ライロクノ其他コノ葉
ノ薰藥ヲ以テ持久之ツ施シ内科ノ示揮ニ
從テ適治ノ内服藥ヲ用ヒ且ツ脱出未ダ此
日ツ經ザル者ハヨク全癒ツ得ルニ至ル但

但シ薰藥ハ二十三丁第十六回ノ管ヲ以テ
之ツ薰スベシ然ル經久ノ者或ハ上ニ説ス
ル術其効ツ萎セサル者等ニ於テハ上ニ説
示スル処ノ工字形ノバンドツ持久帯スバ
シ之ツ以テ脱疽ガシケル等ノ如キ惡症ヲ
發ルコトナク脱出物ヨク其本位ニ復スルニ
至ル但シ脱出物既ニ焮衝スル者ハ他ノ焮
衝ヲ治スル如ク退焮衝刺ヲ内服セシメ兼
テ消散刺ヲ外用シ焮腫全ク退クニ至テ緩
々ニ推納シ其他都テ上ニ示ス如ク療スベ

シ若シ其脱出物剝シク焮衝スル者ハ強ク
之ヲ推納スルハ勿レ何者強ク之ヲ納ムル
ニ於テハ呼吸窘迫シ終ニ死ヲ致スニ至レ
バナリ然レ焮衝剝シカラサル者ハ甚ク恐
ニ足ラズ早ク推納スルヲ良トス若シ之ヲ
納ニ古ク窘迫スルニ至レバ直ニ患部ニ適
宜ノ煎藥共他緊要ノ諸藥ヲ撰テ之ヲ用ム
ハシ

袖珍内外方叢序

此書和蘭紀元一十一百二十九
年謨烏普刺歌氏之所著西書

... 卷之二十一 ...
... 卷之二十二 ...
... 卷之二十三 ...
... 卷之二十四 ...
... 卷之二十五 ...
... 卷之二十六 ...
... 卷之二十七 ...
... 卷之二十八 ...
... 卷之二十九 ...
... 卷之三十 ...

晴
...
...
...