



洋学文庫  
文庫 8  
B 74



叙  
有客誥余曰。子之所著七氣菜說者。善則善矣。其珊  
多尼。次顛。肝油。既已領之。至如規尺。莫非吐沔石。硝  
酸銀。則古皆有之。何以謂新。且子著書之意。非據  
西州各哲之言。欲使夫拘泥於旧套。痼痼于成局者。  
知輒今日新之說。正而且確也。哉。若規尺。次顛之製  
劑。舍其孰以論其稍右者。非持自言。又舉兩百氏之  
說為證。乃無事于孰菜之名乎。夫兩百氏。兩百氏而  
可。吾儕後學。蒐羅衆業。試驗諸功。又何得進退一方。  
而期其効于無量乎。麻就中麻商突。鐸禿漢埕華。乙

八耳列斯等。皆西洲有名之英雋。其所祿華之諸菜。鳥得委之於無用乎。余答之曰。子知其一。未知其二。者欲子不見被火船汽車乎。其輸遠行。溟之妙機。人皆慣知而不異。若今使船行於沙上。車奔于波間。則不愕其奇者。殆鮮矣。子徒知吐石。催吐規。屈之解。熱而不知其有特拔之真功也。柳菴者古在。而用則今。瓶焉指之謂新。不亦可乎。如莫非硝酸銀亦然。近古西洲。化學漸盛。新奇爭出。其名不千百而止矣。中間有一二存殊効者。要皆驗試未廣。徑歷亦歎。若不洞悉其物理。以胡措之。則其害實在于睫間也。如莫

非我知人。止目之於書中。而未經經實試者。有年于茲。今能首知其面。勳者以崎嶇為嗚矢也。爾來人々喜其奇異。亂投妄施。斃人于冥々者。徃々有焉。余初聞之。有疑。已而知其突然。喟然嘆曰。嗟。天之降此靈品。固將救萬生于冰炭之中也。然而暗行賈搜。殺人之于非命。兀々意不自曉。斃首寬袖。虽幸免國家之斧鑕。那忍恬然愉生於今日耶。苟且以濟生為貴者。豈可不畏而慎哉。我聞百氏。蚤有見于斯由。以欲拒其禍於微毫。初辨其功用利害。而徧示門下之人。余虽無似亦幸蒙其提擢。孰聽其言。深知其情。豈可默而止哉。

今有斯舉。但要國家裨益之萬一耳。固不釣射。功名利之吏也。子能撰焉。若夫独斷。自放猜忌。人之勉厲。抗拒人之忠告。知之銜奇。唱新以流毒於蒼生者。則不独我用百氏之罪人。侂以天與道之罪人也。噫。客太感焉。揖余而去。余亦有悚然。自省之所。由姑記之。以代七菽菜說之叙云。萬延元年復五月。蘭衡司馬津公。勳父。識於傳教公館之西樓窓下。

七菽菜說目次

凡例

第一篇 解血變質之菜 上

沃顛

第二篇 解血變質之菜 中

硝酸銀

第三篇 解血變質之菜 下

酒石酸 鱒安質王

第四篇 補血強神解熱之菜

規尺

第五篇 驅虫滌腸之茶

珊多尼

第六篇 峻列麻神鎮瘧之茶

莫非

第七篇 緩和滋養解凝之茶

肝油

終

例言

一 或人予ニ詰テ曰 晚今西国ノ医学日ニ新ニ月  
ニ積ニ新方新茶陸讀シ世ニ出ツ世人其説ノ新  
奇ナルニ泥ニ漫ニ之ヲ慕<sup>慕</sup>求シテ其減否ヲ判ツ  
ナク乱投胡措人ヲ誤ルヲ斯ナカラス予何ヲ  
一書ヲ著シテ以テ辨セザルヤト嗚呼予ノ浅学  
薄聞ナル焉リ此任ニ当ルヲ得ンヤ然リト虽  
凡謂フ所ノ如キハ亦実ニ吾儕今日ノ急ナレハ  
苟モ道ニ志アル者孰カ能ク之ヲ尋問ニ者過ス  
ハキ因テ自ラ湧劣ヲ揣ラス潜カニ西国諸賢ノ

論スル所ヲ取テ之ヲ用百氏之説ニ負シ又加フ  
ルニ予カ井蛙ノ見ヲ以テシ參互ニ聚撮シテ以  
テ此一篇ヲ著ス諒ニ此瓊之タル小冊文辭拙極  
ニシテ大方君子ノ觀ニ供スルニ足ラスト虽モ  
人ニ此ヲ讀テ自ラ警メ切害ヲ商量シテ新奇ニ  
誘セラル、<sup>禪</sup>ナクンハ則チ僅モ予カ書ノ世  
間ニ禪補アル<sup>禪</sup>ナレバ英名ノ電買ヲ<sup>經</sup>テ大方  
ノ一嚶ニ充ツル<sup>禪</sup>アルモ亦予カ辞セサル所ナ  
リ  
一此書ノ原標トナス者ハ悉ク用百氏ノ所説ナリ

而シテ又引證アル者ハ皆西国名家ノ書ニ羅ル  
爰ニ其一ニヲ舉クレハ独逸ノ<sup>ウー</sup>ストル<sup>レ</sup>ノ茶性  
論<sup>リ</sup>ク<sup>テ</sup>ル<sup>ノ</sup>茶説<sup>レ</sup>イ<sup>マ</sup>シ<sup>ノ</sup>化学書知蘭ノ<sup>コ</sup>ル<sup>レ</sup>マ<sup>シ</sup>ノ茶性  
論増註<sup>コ</sup>ス<sup>テ</sup>ル<sup>ノ</sup>重譯茶性論<sup>ア</sup>ッ<sup>セ</sup>ン<sup>ペ</sup>レン<sup>ニ</sup>子<sup>ル</sup>ノ新茶説  
<sup>ウ</sup>サ<sup>ット</sup>ス<sup>テ</sup>イ<sup>シ</sup>ノ製煉書<sup>ウ</sup>グ<sup>テ</sup>ル<sup>ノ</sup>化学簡明<sup>ギ</sup>ラ<sup>ル</sup>デ<sup>イ</sup>シ<sup>ノ</sup>化  
学高歩<sup>ケ</sup>リ<sup>ク</sup>ト<sup>ノ</sup>化学韻府<sup>イ</sup>ン<sup>グ</sup>ラ<sup>ノ</sup>茶論  
大成佛國ノ<sup>カ</sup>ン<sup>パ</sup>シ<sup>ノ</sup>三有茶論和蘭局方瓜哇局方  
英國ノ局方和蘭英國及ヒ米利幹ノ新聞紙等ナ  
リ而シテ此中ニ<sup>ウ</sup>ー<sup>ス</sup>テ<sup>ル</sup>レ<sup>ニ</sup>及ヒ<sup>ウ</sup>グ<sup>子</sup>ル<sup>ノ</sup>所説多  
キニ居ル見レ此ニ氏ハ共ニ用百氏ノ宗トスル

所ニシテ其論說モ又用百氏ト同シケレハナリ  
一此書ハ既ニ諸名家ノ説ヲ聚掇スルニ由テナ  
レハ其説毎ニ必ス其人ノ名ヲ標識スヘキナレ  
虽多クハ之ヲ為サズルハ其繁雜ヲ厭ヘハナリ  
顧フニ我カ短識努方ニシテ數般ノ論設ヲ聚掇  
セシナレハ真個ニ知ニ錯雜紛离シテ前後ノ  
文理通暢セサルトモアル可ク且ツ我カ腹中一  
滴ノ黒汁モナケレハ行文拙陋ニシテ往ニ讀ム  
ニ堪ヘサルノ如モアルベシ願クハ諸方ノ君子  
予カ浅粗ヲ咎メスシテ唯有益ノ要件ヲ領會セ

ハ亦濟生<sup>ニ</sup>少裨ナキニ非スシテ予カ欣<sup>林</sup>採之ニ  
過タルハナシ  
一書中往々予カ雷見ヲ付スル所アリト虽モ別  
ニ款識シテ以テ見ヲ令タス然レモ身師友ニ隨  
ツテ周旋スルノ間自ら聞見スル所ナレハ皆見  
レ西國賢哲ノ規模ニ由ル者ニシテ一モ孟浪杜  
選ニ非ス賢者之ヲ諒ニセヨ  
一方其ノ名称ノ如キ古昔ハ其性効ニ取リ或ハ  
其形狀等ニ因テ名ツケタレモ輒今化学大ニ高  
尚シテ百葉ノ成令悉ク之ヲ精<sup>細</sup>誦ニ令<sup>折</sup>シ以テ

蘭衛子曰モル  
 ヒ子<sup>ニ</sup>キ<sup>サ</sup>サ<sup>ト</sup>ニ  
 子<sup>ノ</sup>決<sup>ス</sup>ル<sup>ニ</sup>  
 驅<sup>ル</sup>虫<sup>ハ</sup>塩<sup>ハ</sup>片<sup>ハ</sup>塩<sup>ニ</sup>  
 フ以<sup>テ</sup>セ<sup>サ</sup>ル<sup>ハ</sup>  
 亦<sup>レ</sup>此<sup>ノ</sup>意<sup>ノ</sup>ミ

新名ヲ下ス者モ亦勘ナカラス蓋シ此名ニ由レ  
 ハ一見シテ其成今ノ何者タルヲ知ルヘシ今  
 若シ之ヲ用ヒハ右未傳習ノ又シキ或ハ疑惑ヲ  
 惹カン<sup>ト</sup>ヲ恐ルト虽耳目漸ク之ニ熟セハ亦若  
 于ノ利益アルヘル此書吐酒石ヲ以テ酒石酸礬  
 安貞王ト署スルカ如キハ亦此理ニ因ル<sup>ミ</sup>者  
 官之ヲ以テ予カ街奇トナス<sup>ト</sup>ナクンハ可ナリ  
 一規<sup>居</sup>ノ如キ前脩ノ沢<sup>昏</sup>多クハ之ヲ幾那塩ト  
 沢セリ今正ニ之ニ從フヘシ然レ<sup>モ</sup>凡幾那皮ノ滷  
 塩一ニシテ足ラス若シ規<sup>居</sup>ヲ脩ムルニ幾那塩

ヲ以テセハ他ノ聖<sup>シ</sup>華<sup>ゴ</sup>尼<sup>ニ</sup>規<sup>キ</sup>誨<sup>イ</sup>実<sup>ゲ</sup>略<sup>ゴ</sup>啞<sup>イ</sup>ノ如キ又何  
 ヲ以テ之ヲ沢センヤ此書幾那塩ト云ハスシテ  
 規<sup>居</sup>ト云ハ之カ为メノミ  
 一此書茶効ヲ論スルヤ先ツ健康作用ヲ擧ケテ  
 後ニ<sup>ニ</sup>医<sup>治</sup>功<sup>用</sup>ヲ論ス蓋シ此両箇ノ名目ハ省官  
 ノ創見ニ係リ或ハ猜疑ヲ致ス<sup>ト</sup>アラシ乎然レ  
 凡此名目ハ輓今高上ノ學術ニ由テ起ル所ニシ  
 テ之ヲ用ヒサレハ茶性ヲ説ク<sup>ト</sup>甚々難シトス  
 蓋シ健康作用ハ茶劑ヲ健康ノ人身ニ用ヒテ発  
 スル所ノ確然正切ノ作用ヲ云ヒ医<sup>治</sup>功<sup>用</sup>ハ疾



疾ノ名異ナルニ從フテ運為ノ差等アルヲ云フ  
学者先ツ其意ヲ得ハ則チ可ナラン  
一方茶ノ秤量ノ如キ正ニ皇國ノ分兩ヲ用ユヘ  
シ然レモ西國ノ医法 皇國ニ入ルト既ニ久シ  
ク人ニ皆能ク習フテ之ニ熟ス故ニ今簡ニ從フ  
テ凡及多々此等ノ標字ヲ用フ別意アルニ非ス  
一時ハ皆 皇國ノ法ニ從フテ晝夜平今ノ十二  
時ヲ用ヒ刻ハ西國ノ腎<sup>ニユト</sup>ニ從フテ之ヲ小時  
ト署ス即<sup>チ</sup>皇國ノ一時ヲ百ニ十分<sup>ト</sup>シタルノ一ナリ  
例言終

七款茶説上卷目次

第一篇 解血變質之茶上

汰顛

汰顛及ヒ其製劑切用利害

汰顛中毒救治法

汰顛各般製劑

第二篇 解血變質之茶中

硝酸銀

硝酸銀切用利害

硝酸銀中毒救治法  
第三篇 解血疫瘧之藥下  
    酒石酸鱒安質王  
    酒石酸鱒安質王製劑  
    酒石酸鱒安質王功用利害

上卷目次終

七 新藥說下卷目次

第四篇 補血強神解熱之藥  
規 屈

規 屈 功用 利害

規 屈 各 般 製 劑

附 錄

撒 里 質

第 五 篇

珊 葛 屈

○ 珊 多 屈 功 用 利 害

附錄

石榴根皮

第六篇

峻列麻神鎮瘥之菜

莫非

莫非功用利害

莫非中毒救治法

莫非各般ノ製劑

第七篇

緩和滋養解凝之菜

肝油

肝油功用利害

肝油製劑

下卷目次終

七新藥說上卷

大日本 佐渡 凌海司馬津 公勲著

第一篇

解血斐質之茶上

沃顛 ヨリヂエーム沃顛  
ケルグストフ結耳布素

沃顛ハ孰出ノ元素ナリ文化八年西國記元年西國  
取濟西各之ヲ海塩ノ中ニ得タリ沃顛ハ紫色希  
臘言ナリ此物ノ霧気董花色ナルヲ以テ英國ノ

大儒<sup>テ</sup>堙<sup>テ</sup>喜氏コレニ資テ以テ名付ト云フ  
汰顛ハ天下ノ物トシテ之ヲ胎セサルハナシ從  
令此ノ如ク廣汎ナラサルモ之ヲ求ムレハ必ス  
其蹤跡ヲ見ルヘシ故ニ輒今ノ化学家ハ之ヲ以  
テ万物普通ノ一成分トナス其現ル、又單一遊  
離ノ者ナシ多クハ塩<sup>ル</sup>素<sup>ニウム</sup>臭<sup>ニウム</sup>素<sup>ニウム</sup>苦<sup>ニウム</sup>素<sup>ニウム</sup>金<sup>ニウム</sup>塩<sup>ニウム</sup>金<sup>ニウム</sup>等ノ諸  
原素ト相合ス之ヲ胎ムト最モ多キモノハ海産  
ノ動物植物泉源溫泉等ナリ瓦<sup>カ</sup>礫<sup>チン</sup>各ノ説ニ曰ク  
汰顛ハ大氣ノ中ニ散佈シテ在リ呼吸ニ由テ肺  
中ニ入ル所ノ量一日夜ニシテ十五氏ノ四十五

合一ナリト汰顛ハ晶芒ヲナシテ青黑色石墨ノ  
如ク片々鱗状ニシテ金屬ノ光輝アリ異重ハ四  
又九四八ニ齊シク合容ハ一二七又一二同シ概  
氏百七度ノ熱ニ逢ヘハ溶流シテ紫色ノ霧氣ヲ  
發シ之ヲ放冷スレハ又小貝ヲ結フ皮層ヲ染メ  
テ賴黄色ト為シ植物ノ色ヲ消褪ス電気ヲ導ス  
水ニ溶<sup>ル</sup>難シ但酒精ニ能ク溶解ス味淡黄ニシ  
テ氣塩酸ノ如シ汰顛ノ賣販ニ出スル者ハ大約  
水ヲ以テ之ヲ涅シ以テ其称量ヲ重カラシム紙  
間ニ挿シテ輕ニニ之ヲ壓重スレハ紙ノ濡涅ス

ルヲ以テ其水アルヲ知ルヘシ又石墨<sup>マンガン</sup>石炭土  
酸化銕等ヲ加ヘテ之ヲ質造スル者アリ其外貌  
ノ比較ニテ半之ヲ知ルヘシト虽モ若シ辨シ難  
キニ逢フハ正ニ之ヲ酒精ニ溶シ試ムヘシ沃顛  
純ナレハ全ク溶解シ他物<sup>キ</sup>含ム者ハ否ラス或  
ハ之ヲ熱セシムルモ又可ナリ沃顛ノ紫霧蒸化  
スルノ後必ス其雜物ヲ遺ス又食塩ヲ雜フル者  
ハ其能ク水ニ溶解スルヲ以テ之ヲ知ル可シ  
沃顛及ヒ其製劑功用利害  
夫レ薬剤ヲ学フヤ功用利害ヲ窺知シテ以テ變

ニ無究ニ應スルニ在リ故ニ之ヲ学フヤ必ス健  
康作用ヲ知ラサル可カラス蓋シ健康作用ハ医  
治功用ノ由テ出ワル所ニシテ確然正切千人ニ  
用ヒテ其功同シク万人ニ用ヒテ其<sup>續</sup>功<sup>奇</sup>シ<sup>シ</sup>医  
治功用ハ否ラス之ヲ用ユル病ニ從フテ其<sup>功</sup>功<sup>ヲ</sup>  
異ニシ之ヲ服スル人ニ隨テ別ニス吾正ニ先ッ  
其健康作用ヲ説上セシトス下皆之ニ倣フ

天 健康作用

沃顛ノ健康體上ニ現ハル、者ハ唯局癆ノ作用  
ノミ克ク確切不變ト言フ可シ汎癆ノ作用ニ至

ツテハ製劑ノ各異ナルニ從フテ功用モ亦大ニ  
経庭アリ然レ氏其最モ汎通ニシテ且ツ適切ナ  
ル者ハ大抵左ノ如シ

④局部ヲ刺戟シ甚シキハ之ヲ腐蝕シ皮膚層ニ  
貼ンテ燠衝ヲ起シ漿液滲出シ表皮脱落ス純沃  
顛ハ兼テ其部ヲ赭黄ニ染ム之ヲ用ヒタルノ部  
本ヨリ膿膿セルカ若クハ粘液膜ナレハ之ヲ燥  
化シ里<sup>黒</sup>痴<sup>赤</sup>ヲ結成シテ分泌ヲ減シ其部ヲ乾燥セ  
シム沃顛ノ霧氣ヲ用ユレハ眼鼻及ヒ呼吸器ヲ  
刺戟シ咳嗽若クハ气管枝燠衝ヲ起スニイタル

○純沃顛ハ其觸ル、所ノ部分ニ抵ツテ水素ト  
和合ス或ハ土質金質ノ者及ヒ蛋白質ノ者ト相  
結合シテ以テ其功ヲ發スルナラン

⑤沃顛及ヒ其製劑之ヲ少量<sup>即チ量</sup>ニテ内服スレハ  
通例重切ノ證状ヲ發スルヲナシ故ニ消食ノ運  
為障碍ヲ生ス胃腸輕キ刺戟ニテ食氣却テ進ミ  
少シク<sup>脈</sup>數トナリ汗尿ノ分泌又少シク増進シ婦  
人ニ在テハ月徑ニ未至ヲ早メ少シク頭痛<sup>ニ</sup>夜  
中動モスレハ眠リ易カラス上圍ノ機或ハ増減  
スルヲ有ト虽モ是又必然ト云フニ非ス唯常發

ノ症ト為ス可キ者ハ之ヲ用ユルノ時若シ一二ノ腺腫アレハ其腫次第ニ減少シ遂ニ消散スルニ至ル

④少量ヲ用ユルト長久ナルカ若クハ其人各別ニ嫌忌アレハ則チ中毒ノ症状ヲ発ス名ツケテヨテスミスト云フ其症タルヤ消食ノ運営碍害ヲ受ケ食気喪亡シ患者食道及ヒ胃部ニ當ツテ一種腫<sup>ウルクサキ</sup>腊タル疼痛ヲ覺ヘ下痢疝痛ヲ兼<sup>カ</sup>子流<sup>カ</sup>シ身軀前瘦ス是皆第一<sup>カ</sup>道ノ劇刺戟ニ由ル者ナリ其他腦脊髓及ヒ其神經ヨリ発スル所ノ證ハ

阿煩心動悸頭痛眩暈視聽變常等ナリ是等ノ諸症其初ハ皆感冒ノ症ノ如シ故ニ此時速ニ後服ヲ止ムレハ更ニ危篤ニ至ルトナシ若又梅毒ノ劇症ノ如キ止ムトヲ得スレテ之ヲ持長スレハ止件ノ諸症ヲ発スルノ外手足ノ戰慄ヲ発シ遂ニ播製ヲ致ス時トシテハ表皮赭色ニ變シ或ハ発疹ヲ得ル者アリ此中毒ノ諸症ハ唯内用ニ由ルノミナラス外用スルモ又然リ以テ他ノ鑛類諸薬ニ異ナルヲ見ルヘシ

⑤一頓ニ大量<sup>一ト</sup>ヲ服スレハ急性中毒ノ症ヲ発



腸胃熾衝シ吐下度ナク疼痛甚シク心悸動戰  
慄苦悶呼吸困難神力虛脱シテ遂ニ斃ル然レモ  
製劑ノ品<sup>真</sup>質ナリ各人ノ質好<sup>ア</sup>リ一定シテ之  
ヲ論スルヲ能ハス李<sup>コ</sup>高<sup>ル</sup>耳<sup>ル</sup>一人ニ次顛<sup>コ</sup>丁<sup>ル</sup>幾<sup>ル</sup>三  
ヲ与ヘテ小害ナク麻<sup>ア</sup>高<sup>シ</sup>實<sup>シ</sup>一人一丁幾シ静  
脈ニ<sup>注</sup>注射シテ此症ヲ發セスト云ヘリ中毒ノ死  
後屍ヲ解テ之ヲ驗スルハ胃腸熾衝充血ノ痕跡  
歴然トシテ見ルヘク粘液膜張<sup>厚</sup>厚シ或ハ又軟柔  
トナリ如ニ剥脱シ或ハ小潰瘍ヲ生シ純次顛或  
ハ其丁幾ノ毒ニ中ル者ハ胃ノ粘液漠<sup>如</sup>々深黄

色ノ班痕ヲ見ワス

地 医治作用

次顛ハ<sup>コ</sup>華<sup>イ</sup>應<sup>シ</sup>垓<sup>テ</sup>初メテ之ヲ<sup>コ</sup>医<sup>ル</sup>菜<sup>ニ</sup>用ヒシヨリ  
以來其称大ニ貴ク其用大ニ廣<sup>ア</sup>リ世界之ヲ用  
ヒサルノ国ナク医家之ヲ用ヒサルノ病方キニ  
至リ實ニ病津ノ寶<sup>寶</sup>寶<sup>寶</sup>医家ノ金丹トナレリ二十  
年前ハ一年用ユル所ノ量僅ニ五<sup>サ</sup>サ許ナリシニ  
方今ニ至<sup>ツ</sup>テハ一年ニシテ大約其量五十<sup>サ</sup>サヲ  
費スニ至<sup>リ</sup>テ其用ヒ廣キヲ見ルヘシ  
医菜トシテ次顛ヲ用ユルノ標的左ノ如シ

④ 蛋白質ノ者ノ修<sup>滲</sup>及ヒ之ヨリ發スル諸病諭  
 へハ頭下腺胸腺乳房子宮睪丸卵巢肝脾攝獲腺  
 鼠蹊腺等其他均乙腺腺ノ硬結腫脹厚大ニ効ア  
 リ殊ニ頸下腺ノ腫大ニ由テハ其効實ニ百発百  
 中ト云フヘン然レ凡其腫大他ノ原因ニ由テ来  
 ル者ハ否ラス蓋シ其次頭ハ蛋白質ノ者ノ修<sup>滲</sup>出  
 硬結ヲ解ク者ニシテ他ノ癌毒ノ如キハ更ニ實  
 効ナケレハナリ故ニ之ヲ精密セシテ乱投セ  
 ハ却テ中毒ノ害ヲ招クアラン須ク小心スヘ  
 シ

荷衛子曰ク胸腺凡  
 ハ慢性ノ結核及ヒ服  
 液療癩梅毒ニ由テ  
 起ル小兒ニ發スル者ハ  
 多クハ父母遺毒ニ  
 由テ起ル大人ハ梅毒  
 毒癩癩ニ毒ノ合  
 併ニ由ル者古未ハ  
 癩思癩思ニシテ其治  
 術ヲ儀スト虽モモ  
 之ヲ全治セシ者ナシ他  
 ナシ只局処ノ治術ヲ  
 用ヒテ汎発病患ヲ  
 治セザルハナリ此故ニ  
 局処ニ收斂ノ薬方ヲ  
 用ヒテ一旦治セルカ  
 如クテトモ數日ニシ  
 テ又發シ終身此ノ  
 如クニシテ世ニ良医

⑤ 腸間膜腺水脉管腺表皮骨關節等ノ癩癩性諸  
 病尙俾病肺旁脂肪腫等ニ効アリ○癩癩性ノ諸  
 病ニ在テ次頭ハ實ニ峻有カノ一薬タリ故ニ頭  
 腺ノ癩癩及ヒ癩癩性ノ眼及ヒ眼臉結膜喉衝腺  
 ノ硬結腫ニ大効アリ然レ凡骨及ヒ骨膜ノ諸病  
 腐骨疽白腫等ニハ其効稍少シ而テ之ヲ用ユル  
 モ病者暗室ニ居リ大氣ノ通暢宜シカラズ食養  
 不善ナレハ次頭更ニ効ナシトス昔未次頭ヲ癩  
 癩腫ニ用ユルニ許多ノ禁忌ヲ擧ケテ患者胸痛  
 アリ知覺機元進シ下肢充血ノ膜様アリ胃痛ノ

ナク大ニ良薬ナキヲ  
 歎キ恍トシテ一生  
 フ枉了スル者又幾何  
 ワヤ寒郷僻邑ノ  
 ノミナラス大都名邑  
 ラ通シテ比<sup>レ</sup>比<sup>レ</sup>豈然リ  
 豈嘆ス<sup>キ</sup>至リナラ  
 スヤ蓋シ此病ハ次  
 願大効アリ是レ尤モ  
 内服ニ与フヘシ即チ  
 十<sup>八</sup>以テ始メテ三  
 十<sup>八</sup>ノ用法ヲ最モ  
 良トス其外ノ如キハ  
 予正著ス<sup>テ</sup>アラントス

癰アリ甚シク衰弱スル者等ニハ決シテ之ヲ用  
 ヲ可カラスト云ヘリ然レ<sup>レ</sup>氏謹慎シテ之ヲ用ユ  
 レハ可ナリトス肺勞ノ如キハ只其初期ニ効ア  
 リ病既ニ全成スルニ至ワテハ却テ害アリ<sup>コ</sup>シダ  
 ラル<sup>ル</sup>及ヒ<sup>レ</sup>テニバスク<sup>ル</sup>名ハ之ニ次顛鉄ヲ用ヒ又輓今  
 ニ至ワテ<sup>レ</sup>ラツホル<sup>ル</sup>ハ次顛鉄ヲ用ヒテ共ニ其効ア  
 ルヲ称ス蘭衛子曰ク肺勞ニ次顛ヲ用ユルハ唯其初期病未タ肺勞ニ隔アル者ニミ用ユ  
 未タ全成セシテ次顛ヲ用ユキノ時ニ至フ<sup>カ</sup>タカラシ  
 波<sup>波</sup>纖維様若ハ<sup>乙</sup>様ノ<sup>焮</sup>衛胸腺間<sup>ニ</sup>乙<sup>乙</sup>滲<sup>シ</sup>  
 スル者急性頭水腫義膜咽喉焮衛ノ遺病トシテ

蘭衛子評月經ノ  
 不須他<sup>ノ</sup>惡液<sup>滲</sup>潤<sup>潤</sup>  
 二由テ<sup>發</sup>スル者<sup>ニ</sup>ミ  
 次顛効アリ然レ<sup>レ</sup>此  
 此症甚タ稀ナリ

癆スル部分ノ慢性刺戟腫脹硬結等論ヘハ結膜  
 扁桃腺表皮等ニ癆スル者骨焮衛骨膜焮衛靨膜  
 焮衛梅毒或ハ水銀毒ニ由ル者皮水腫腹水腫結  
 膜粘液流出痲疾直腸粘液流出惡性馬病ノ傳染  
 直腸及ヒ陰具ノ潰瘍及ヒ厚大諸般ノ皮膚病等  
 = 次顛効アリ蓋シ此等ノ諸病ニ次顛ノ効アリ  
 所以ハ其<sup>乙</sup>ノ<sup>乙</sup>滲<sup>シ</sup>出<sup>ラ</sup>妨<sup>妨</sup>ケ既ニ滲<sup>シ</sup>出<sup>セ</sup>ル者ハ  
 之ヲ解散セシムルニ<sup>ニ</sup>電<sup>電</sup>アリ又月經不須ノ婦  
 人ニハ鉄劑或ハ強壯劑ヲ加ヘ用ヒテ効アリ又  
 諸般ノ表皮病總テ硬結腫大ヲ兼ヌル者ニ効アリ

リ麻<sup>三</sup>高<sup>ハ</sup>及ヒ<sup>ハ</sup>璞<sup>ハ</sup>刺<sup>ハ</sup>斐<sup>ハ</sup>名<sup>ハ</sup>ハ之ヲ倭<sup>ハ</sup>質<sup>ハ</sup>私<sup>ハ</sup>及ヒ痛  
風<sup>三</sup>用ヒテ効アルヲ称シ用百氏モ又此説ヲ唱フ  
予数ニ之ヲ経験スルニ其効良善ニシテ鬼助ア  
ルカ如シ  
①血液混合ノ不良及ヒ之ヨリ発スル諸病新旧  
ニ性ノ梅毒及ヒ之ニ起因セル粘液膜腺皮膚骨  
膜虹彩鼠蹯腺等ノ疾患汞劑ヲ連用シテ絶テ其  
功ヲ見サル者梅毒倭<sup>ハ</sup>質<sup>ハ</sup>私<sup>ハ</sup>ヲ兼ヌル者汞劑ノ  
連用ニ由テ患者ノ血質不良トナリ所謂水銀病  
ヲ発スル者汞劑瞑眩ニ由ル流涎尋常ノ梅毒高

年衰弱瘰癧<sup>ハ</sup>質ノ人ニ発スル者及ヒ其他梅毒ノ  
所患部合ノ滲出腫脹厚大硬結ヲ兼ヌル者ニ大  
ニ効アリ又血液閉節ニ灌流シ洩乙其間ニ蓄<sup>ハ</sup>ス  
ル者倭<sup>ハ</sup>質<sup>ハ</sup>私<sup>ハ</sup>性閉節<sup>ハ</sup>焮<sup>ハ</sup>衝<sup>ハ</sup>及ヒ其慢性ノモノニ  
人多ク称用ス  
②慢性ノ神経病諸症即チ神経痛瘧率麻痺不遂  
癩<sup>ハ</sup>癩<sup>ハ</sup>舞<sup>ハ</sup>踏<sup>ハ</sup>病<sup>ハ</sup>喘<sup>ハ</sup>息<sup>ハ</sup>間<sup>ハ</sup>歇<sup>ハ</sup>熱<sup>ハ</sup>瞬<sup>ハ</sup>ノ腫大ヲ兼ヌル者耳  
聾鉛毒ニ由ル麻痺等ニ効アリ然レモ其功確切  
ナラス而テ其功アルノ理人未タ講明スヘカラ  
スト云ヘリ予潜カニ説アリ録シテ以テ之ヲ質

西サレ夫レ神経ノ諸病ハ炊衝損傷等ヲ除クノ  
外ハ之ヲ只其機能ノ障碍ニ歸シテ以テ器械ニ  
此ノ変化ナクシテ發スル所ノ病トナスヲハ古  
来皆然リ然レ凡ソ天下之變ニ於ケル器械ニ  
損害アルヲナクシテ其機能ヲ變スルノ理アラ  
ンヤ是レ神経ニ必ス損害アリト虽モ眼之ヲ見  
ルヲ能ハス尚且從來瞻視ヲ補クルノ器具未タ  
十全ノ精微ヲ得ルヲ能ハサルナラン故ニ次顛  
ノ神経諸症ニ効アル所謂モ又滲出血流等諸般  
ノ害件ヲ越治スルニ在ルノミ他ノ次顛ヲ用ヒ

テ寸効ナキ所ノ神経症ハ其原由蓋シ他ニアル  
ナランカ

〔邊〕解毒劑トシテ「蕃木電子元素」アリエチ子「莖葉元素」ベラト子等植性毒塩

中毒ニ用ヒテ動レ及ヒ歩ガ取テハ大ニ其  
効ヲ稱セリ然レ凡ソ次顛ノ解毒ノ功ニテハ其輕  
驗未タ過功ナラス且ツ疑フ所多シトス外用ニ  
次顛ヲ用ユルノ標的ハ大率上件ノ如ク而シテ  
能ク内外並用スト虽モ又時トシテハ外用ヲ以  
テ主トナスヲアリ故ニ爰ニ別ニ論セサルヲ  
得ス

④ 乃如ノ充血慢性嗽衝及ヒ之ヨリ発スル諸病  
諭ヘハ硬結厚大腫脹滲出潰瘍等諸般ノ皮膚病  
即チ結囊腫梅毒性疼痒瘡蜜瘡斑點母斑微瘡疥  
癬鱗屑状腫癬癩禿瘡疥癬疥癩疥癬疥癩疥癬  
嗽衝靨帶嗽衝白膜翳咽喉嗽衝潰瘍瘡腫殊ニ舌  
疽腐骨疽白腫沔乙ノ關節間ニ滲出スル者粘液  
流出病眼淋痲疾腔淋血尿赤痢腸間膜腺甲状腺  
胸腺ノ腫脹厚大子宮及ヒ胸腺ノ腺様腫等以上  
数般ノ病ニ沃顛ヲ外用シテ良切アリ  
⑤ 沔乙ノ滲出殊ニ其關節間ニ於ケル者陰囊膜

膜ノ沔乙腫腹水腫龜頭包皮ノ粘液腫膝蓋腫腋  
腺ノ沔乙腫流註腫瘡瘡便毒腫等ニ沃顛ヲ外用  
シテ効アリ此際ニ沃顛ヲ用ユルハ其部ニ新嗽  
衝ヲ起シ以テ互ニ癒着セシメ或ハ之レニ兼扱  
スル病状尅治スルニアリ○沃顛ヲ外用スルニ  
ハ沃顛ヲ浴湯トシ或ハ丁幾ヲ射注シ或ハ沃顛  
醃ヲ水ニ溶シテ射注含漱洗滌ノ諸劑トナスヲ  
良トス又人好シテ之ヲ膏油ニ和シテ擦劑トナ  
ス者アリ蓋シ其宜キニ従フテ可ナリ  
沃顛ハ之ヲ溶劑トシテ用ヒサルモ胃ニ入ルノ

後其中含有セル所ノ水液ヲ扶助ニ由テ蛋白質  
ニ溶解シテ速ニ汰顛水素ニ化シテ他ノ分泌排泄  
ノ諸器械腎肺表皮等ヨリ再ヒ幹中ヲ出去スル  
者タリ麻<sup>ル</sup>加<sup>ル</sup>耳<sup>ル</sup>及ヒ葛<sup>ル</sup>耳<sup>ル</sup>比<sup>ル</sup>共<sup>ル</sup>ハ唯四合氏ノ汰  
顛端ヲ用ユルノ後三十小時ヲ経テ尿中速ニ汰  
顛気アルヲ見シト云ヘリ血液及ヒ蛋白質ノ成  
分汰顛ニ由テ什麼ノ変革ヲ受クルヤ方今未タ  
詳明ヲ得スト虽凡血<sup>ル</sup>乙<sup>ル</sup>乳<sup>ル</sup>及ヒ蛋白質ノ液ヲ  
溶解シ其ヲシテ凝固ノ性ヲ失ハシムルノ作用  
アルヲハ従前諸哲ノ著述ニ由テ之ヲ知ルヲ

得タリ

人 汰顛ヲ用ユヘカラサルノ症

業ニ既ニ上ニ論スルカ如ク汰顛ハ其効廣シト  
虽凡已ニ効アルハ又害ナキヲ能ハス若シ其當  
否ヲ商量セスシテ之ヲ乱投胡措スレハ其害モ  
亦甚シ故ニ医家之ヲ用ユルニ臨ンテ病症ヲ商  
確セン<sup>ル</sup>ヲ要ス今其汰顛ヲ用ユヘカラサルノ  
症ヲ舉テ以テ医家ノ注目ニ充ツ即チ  
凶胃腸肺心等總テ貴重ノ器械ニ刺戟<sup>ル</sup>及ヒ  
知覚機<sup>ル</sup>亢進<sup>ル</sup>等アル者下痢熱アル者等ニハ汰顛

ヲ用ユヘカラス

④ 知覚機甚シク亢進スル者及ヒ其癖アル者殊ニ胸腹ノ諸藏ノ知覚機亢進ヲ兼ヌル者ハ之ヲ用ユルヲ禁ス若シ注意セズシテ慢ニ之ヲ投スレハ患者通例堪ユルヲ能ワス而シテ動モスレハ危劇ノ症状下痢疝痛心動苦悶煩燥戰慄熱呼吸困難等ヲ起ス

⑤ 患者甚シク衰弱スル者及ヒ惡液質ノ人ニバ之ヲ用ユヘカラス若シ止ムヲ得スシテ之ヲ用ユルヲアルモ必ス小心注意ヲ要ス

次顛ヲ用ユル一般ノ規則

次顛及ヒ其製劑ハ之ヲ内用シ或ハ之ヲ外用スルニ論ナク總テ少シク局処ヲ刺戟シ其功達スルニ及ンテハ全身ノ諸器殊ニ神経系統ヲ刺戟スルヲ甚タ強シ故ニ之ヲ用ユルニ臨ンテハ必ス少量ヲ以テ始メ漸ニ増和シテ大量ニ至ルヘシ之ヲ用ユルヲ長久ナラント欲スル時ハ殊ニ然リトス之ヲ用ユルノ間ハ時々間歇シ他ノ諸劑ヲ用ユルヲ良トス若シ人之ヲ用ユルヲ甚タ久シクシテ患者之力為ニ衰弱ヲ致スヲアレハ



其原病速ニ治シ難シ然ル時ハ強壯劑ヲ用ヒテ  
患者ノ精カヲ復故シ其血質ヲ良善ニシテ而シ  
テ後又前劑ヲ用ユヘシ終久ノ梅毒瘰癧毒等ニ  
於ケル殊ニ然リトス○患者下痢疝痛等ノ瘵ア  
リ或ハ其知覺機敏捷ナル者ハ空心ノ時沃顛ヲ  
用ユヘカラス其飲食度ニ適スルノ後之ヲ用ユ  
ルヲ要ス○機生ノ物品ハ沃顛ヲ解哲シテ其ヲ  
シテ切ナカラシム澱粉ノ如キハ殊ニ然リ 皇  
國人ノ如キ米麦ヲ以テ其常食トナセハ之ヲ回  
避スルヲ難シト虽氏上ニ記スルカ如キ諸症ナ

クハ食後一二時ヲ過テ之ヲ用ヒ且ツ其病症内  
用ヲ必須トセサルカ如キハ之ヲ外用スルヲ適  
切トス又沃顛ヲ内用スルニ兼テ食塩アルカリ  
塩ノ浴湯洗滌法等ハ必ス行フヲ要ス是レ沃顛  
ノ効ヲシテ益ニ強カラシムルナリ○其病能ク沃  
顛ニ由テ治スヘシ而シテ之レニ沃顛ヲ用ヒシ  
ト欲セハ其什麼ノ製劑ニ論ナク總テ單品ヲ用  
ユヘシ切ニ他藥ニ配スルヲ要セス蓋シ沃顛ハ  
他ノ機生及ヒ無機生ノ諸物ニ過テ之カ為ニ自  
家ノ本質ヲ解抗サルレハナリ殊ニ阿片莫非莨

若蓄木鼈等ニ配用スレハ次顛ノ効ヲ見ルナ  
ク又此等ノ配合物ノ効ヲ得ルナシ故ニ次顛  
ノ効ヲ取ラント欲セハ次顛鱗單品ヲ清水ニ溶  
解シ用ユルヲ最モ良トス蓋シ次顛鱗ハ其量ノ  
百分ニ次顛七十分ヲ含ミ之ヲ他ノ製劑ニ比ス  
レハ其含有スル所ノ次顛ノ量最モ多ク其功モ  
亦最モ強ク殆ント諸製劑ノ最上等ニ位スレハ  
ナリ

### 次顛中毒救治法

大量ノ次顛ヲ一次ニ用ユルニ由テ発スル者ハ

荷衛子田ク凡中毒  
ノ吐茶ニ六常必然有  
功ノ品用ニシ故ニ福若  
結着吐根等皆用ニシ  
而シテ鑛物ノ中毒ニ  
模性吐茶ヲ用ヒ模物  
ノ中毒ニハ鑛物ノ吐  
茶ヲ用ユル良トス爰  
ニ吐根ヲ用ユルハ蓋シ  
此ノ理ノミ

ナルタケ早ク其近傍ニアル所ノ水液殊ニ其性  
緩和ナル者ヲ大量ニ与ヘ其毒ヲ稀釈シテ吐出  
シ易カラシメ速ニ吐根ノ吐劑ヲ用ヒテ吐出シ  
シムヘシ就中消毒ニ適當ノ者ハ米麥稗黍等澱  
粉ヲ含ム者ノ煮汁ナリ次顛鱗ノ毒ニ當ル者ハ  
上件ノ水液少許ノ塩酸或ハ硝酸ヲ加ヘ与フル  
ヲ良トス然レモ次顛鱗ノ毒ニ中ルハ甚々稀  
ナリトス〇次顛ノ慢性中毒所謂ルヨダスミスナル  
者ハ其證状発見スルヤ否ヤ直チニ方策ノ内用  
ヲ止メ其劇易ノ度ニ應ニテ阿片製劑緩和滋養

ノ品善良ノ食餌ヲ与ヘ浴湯ヲ行ヒ精カラ保全  
シ血質ヲ復故スル等諸般ノ治術ヲ行フヘシ

洗頭各般ノ製劑

第一

洗頭

ヨードゲムアムヨゲムヨードゲチア羅甸ヨゲチヨゲチヨードロケルケル  
ロイラレットストフ和蘭ヨード獨逸ヨード法郎西ヨード子英吉利

其化学ノ性質ハ既ニ前ニ説上セリ故ニ爰ニ唯  
其用法ヲ説カントス

單純ノ洗頭ハ古未能ク之ヲ内用ニ用ユト虽凡  
輒今ニ至ツテハ其質貴全ク止ミ唯外用ニ供ス  
ルノミニシテ医家一人モ之ヲ内用ニ用ユル者

ナシ他ナシ味不佳ニシテ氣峻烈患者大約之ニ  
堪フルヲ能ハス而シテ洗頭癖ノ如キ良善ノ製  
劑アリテ以テ其用ニ代レハナリ外用トシテ動  
スレハ之ヲ霧氣トナシ肺勞慢性氣管支嗽衝及  
ヒ氣管支ノ粘液流出病等ニ吸入セシムル者ア  
リ然レ凡此浴危馬ニシテ或ハ可畏ノ症状ヲ発  
スルヲアリ寧口用ヒサルヲ勝レトス  
外用ハ膏葉トシテ大ニ綿アリ以テ前ニ記セル  
所ノ諸患ニ用ユヘシ

軟膏ノ方

次顛

一分適宜ノ酒精〇分八分厘ノ分ニアラ  
ニ溶解スル者分下皆同シ

次顛 十今

家猪脂或ハ阿列布油 二百今

右研合シ以テ軟膏トナス

肝油ノ代用トシテ麻兒ル加耳ルハ次顛一分ヲ扁  
桃油十五分至二十分ニ溶解シ之ヲ瘰癧ノ患者  
ニ与ヘテ良功ヲ得シト云ヒ而シテ之ヲ書ニ筆  
セリ然レ其理殊ニ疑フヘク價モ又蓓蓓ス別  
ニ此ノ如キ方ヲ知スルヲ要セス若シ唯肝油  
ノ欵クルニ逢ヘハ則チ之ヲ試ムヘキナリ

瘰癧腫或ハ經久頑固ノ梅毒等ニ次顛軟膏ヲ内  
皮法トシ用ユル者アリ蓋シ此法ハ他ノ患者ノ  
体質次顛ノ内用ニ堪ヘサル者ニ試用シテ可ナ

リ

慢性眼嗽衝ニハ点眼水トシテ用ヒテ効アリ然  
レ凡次顛六分ヲ加フルニ加カストス

次顛 一分

次顛 六分

薔薇子 四分

右研和シ點眼水トス

次顛ヲ浴湯トシテ用ユルニハ一ノ次顛ヲ食  
 塩汁ニ溶解シ全浴中ニ混シ患者ヲシテ湯中ニ  
 在ルノ半時若クハ一時ナラシムルヲ要ス見レ  
 食塩ハ能ク次顛ヲ溶解スルノ効アレハナリ故  
 ニ他人ハ之ニ代ユルニ海水ヲ以テス湯ノ温度  
 ハ甚シク熱ナラシムヘカラス唯寒温人ニ適ス  
 ルヲ以テ良トス過<sup>于</sup>茂<sup>ル</sup>耳<sup>ル</sup>ハ次顛ヲ灌腸劑トシ  
 テ赤痢ニ用ヒ大ニ其効ヲ効ス即チ次顛及ヒ次  
 顛<sup>五</sup>氏至<sup>十</sup>氏ヲニ多至<sup>三</sup>多ノ清水ニ和シ日  
 ニ一次宛之ヲ灌腸ス又厚腸ノ疾患及ヒ粘滑液

ニ和シ硝酸銀ニ代用シテ効アルヲ効ス然レモ  
 是屢用ユヘキノ方ニアラス

第二

次顛丁幾

ヲリユシラ、ヨゲイ、アルコホリカノチンクチエラヨゲイ羅  
 ラツプロツシク、フアン、ヨゲイ、イン、ウエイ、キヤスト、ヨドナキ  
 チユル蘭

此方ハ次顛ヲ濃精<sup>ル</sup>酒ニ溶漬<sup>清</sup>スル者ニシテ次顛  
 四十八氏濃精酒一多ヲ以テ之ヲ製シ此液八滴  
 中次顛一氏ヲ含ム蓋シ濃精酒ハ揮発輕稀ナル  
 カ故ニ尋常諸液ノ如ク一滴ヲ以テ一氏トセサ  
 ルナリ和蘭局方ノ方ニ從ヘハ一分ノ次顛ヲ十

二分ノ濃精酒ニ溶漬シテ以テ之ヲ製シ此液一  
号中次顛四十八ヲ含ム者トス

此方ハ内用ニ供シテ良方トナスヘカラスト虽  
凡古人之ヲ既ニ内服ニ用ヒ輒今又之ヲ用ユル  
者アリ其之ヲ用ユルヤ五滴ヨリ十滴白糖水或  
ハ良好酒ニ和シテ一日ニ三次ニ之ヲ用ヒ漸ク  
其量ヲ加フ然レ凡之ヲ糖水ニ和スルノ方ハ予  
之ヲ良トセス英國局方ニ從ヘハ八分ノ次顛丁  
幾ニ五分ノ次顛藤ヲ加ヘ用ユ蓋シ此方ヲ勝レ  
リトス然レ凡次顛丁幾ハ總テ胃中ニ入テ解抗

サル、<sup>線</sup>極メテ速ニ多クハ其性ヲ愛シ之ニ加  
フルニ光腺ニ當テ速ニ其功ヲ失フカ故ニ用ニ  
臨テ必ス新タニ之ヲ製セシテ要ス次顛丁幾  
ハ外用シテ大称アリ其功大約硝酸銀ノ如シ而  
シテ峻刺戟腐蝕及ヒ分解消散ノ効ノ次顛ニ在  
ル者ハ皆此方ニ悉ス故ニ之ヲ潰瘍ノ贅肉其荒  
蕪甚シキ者瘰癧毒様ノ腫瘍疣贅毛髮脱落疥瘡瘰  
癧腫眼焮衝ノ粘液流出ヲ兼タル者羅斯様腫皮  
下組織ノ蔓延焮衝將ニ脱落ニ陥ラントスル者  
病院脱疽母班瘻肉標疽破腮肛門ノ瘻瘡白帶下

等ノ諸症ニ用ヒ其功ヲシテ強カラシメント欲  
スレハ次顛ヲ加倍シ弱カラシメント欲スルハ  
之ヲ減去ス○人此丁幾一二ヲ次顛及ヒ食  
塩ニ和シテ之ヲ浴湯中ニ注キ以テ全浴トナス  
者アリ其蒸氣鼻肺ヲ刺戟シテ甚タ病ニ佳ナラ  
ス用ヒサルヲ良トス○總テ其部ヲ刺戟スル  
極メテ甚シク遂ニ之ヲ荒蕪消散セント欲スル  
ノ地ニ當ツテハ此丁幾其功少シク弱シ唯部分  
ヲ多少刺戟シ以テ之ヲ變調セント欲スル如キ  
ノミ之ヲ用ユルヲ要ス通常毛筆ヲ以テ之ヲ塗

擦シ其上ニ此液ヲ浸ス所ノ厚紙若クハ斤布ヲ  
置クヲ良トス是レ其功ヲ強メンカ為メナリヒ  
テリギロウ山共ニ等ノ諸人ハ肺勞患者ノ胸上ニ之ヲ  
塗擦シ或ハ聖京伍倭ノ廣私痛凡等ニ之ヲ皮表  
ニ塗擦シテ誘導寛解ノ効ヲ欲シ鄂魯ゴロ西及ヒ蕨  
耳ト鐘共ニハ慢性ノ關節疼痛倭ノ廣私ニ之ヲ布帛  
ニ蒸シテ患部ヲ包纏シテ効アリト云ヒ薊ト尼ト外  
名ハ其布帛ヲ以テ痘瘡兒ノ顔面ヲ掩ヒ其起脹  
ヲ障ケ且ツ速ニ之ヲ乾加セシメ以テ醜痕ヲ防  
クト云ヘリ此等ノ諸方ノ如キ頗ル新奇ニ渉ル

尚衛子曰此丁幾ヲ以テ硝炭銀汚点ヲ除クハ実ニ効アリト虽凡又其黄炭ヲ残スカ故ニ青酸鹼ヲ以テスルヲ優レリト云

ト虽凡又之ヲ試ミテ害アルニアラス此丁幾ハ又一箇ノ奇性アリ能ク硝酸銨ニ由テ生スル所ノ皮表ノ汚黒点ヲ消散ス蓋シ黒点ハ百方除クヲ能ハサル者ナリト虽凡此方ヲ用ユレハ能ク此ヲ一掃スルノ外後害ナシ而シテ之ニ由テ生スル所ノ赭黄班ハ磁砂精能ク之ヲ除クハシ若シ此ヲ試ミテ効アラサル者ハ是レ其製ノ良ナラサル者ナリ

第三

沃顛 鹼

ヨラヂム、カリキウム、ヨドカリウム、ヨカリウム、ヨタキウム、ヨカリ、ヒドロヨキキウム、ヨチキキウム、ボッタアス、ヨドヨロ、チキキウム、ヨドボッタアス、ヨドヨロ、チキキウム、ヨドボッタアス、和尙

沃顛 二容

見レ雪白方形ノ晶塩ナリ味鹹ニシテ黄ナリ氣ヲ見テ變セス然レ凡氣甚シク濕冷ナレハ少シク濡流ス水及ヒ酒精ニ克ク溶解ス之ヲ水ニ溶解スル者ハ能ク復多分ノ沃顛ヲ溶スヘシ沃顛鹼ハ其用甚タ廣キカ為ニ動モスレハ茨高ノ質製ニ出ツル者アリ能ク之ヲ辨別スヘシ純真ノ沃顛鹼ヲ知ルノ方ハ即チ左ノ如シ



④ 次頭銀ノ晶ハ必ス白雪ナルヘシ其他色アル  
ヲ要セス灰塩ノ性アルヘカラス⑤之ヲ熱スル  
ト甚シケレハ純次頭ノ如キ霧氣ヲ発スヘシ⑥  
之ヲ清水ニ溶シテ後又硝酸銀ヲ溶シ沈澱ヲ生  
セシメ之ヲ取テ始メハ清水逐ニ硝砂精ヲ以テ  
洗ヒ乾固シテ之ヲ称スレハ十分ノ次頭銀ハ十  
四分ノ次頭銀ヲ造スヘシ⑦醋酸或ハ塩酸ヲ加  
スナラシラ和勻スルモ沸騰セズ泡起スルナシ  
次頭銀ノ性効ハ既ニ上ニ之ヲ一丸ニ論セリ医  
家トシテ之ヲ用ユレハ其功實ニ諸製劑ニ卓越

シ一モ之ニ代フヘキモノナシ  
此薬一ニシテ一次ニ内服スレハ通常嗽衝液滲  
出等ノ諸症発シテ危険ニ至ル小動物ニ於テハ  
殊ニ然リ一ニハ水ニ溶解シテ之ヲ犬ノ静脈  
中ニ注ケハ搐製ヲ発シテ忽チ斃ル○人ニ用ヒ  
テ害ヲナス所ノ分量ハ爰掲示シ難シ是レ製法  
ニ異同アリ各人ハ各種ノ性アリ三四ハヲ用ヒ  
テ痲痛嘔吐等ヲ起ス者アリ二三ヲ服シテ之  
ナキ者アレハナリ然レモ通例其製淨新ニシテ  
他物ヲ含ムナケレハ半ヲヨリ一ヲ量能諸

症ヲ起スモノ也内用ハ一日十匁ヨリ始メ漸ク  
増和シテ三十匁ニ至ル小兒ハ一日三匁ヨリ始  
メテ十五匁ニ至ル<sup>蓋</sup>十匁以下ハ之ヲ用ユル  
モ必<sup>源</sup>須<sup>効</sup>ヲ見ル<sup>能</sup>ハス又三十匁以上ハ  
却テ多量ニ<sup>過</sup>キ<sup>過</sup>テ害アリ獨逸<sup>獨逸</sup>國ノ<sup>醫</sup>鳥<sup>鳥</sup>西<sup>西</sup>島<sup>島</sup>  
耳<sup>耳</sup>撻<sup>撻</sup>名<sup>名</sup>ハ<sup>八</sup>克<sup>ク</sup>ク<sup>ク</sup>大量ヲ用ユルト<sup>蛭</sup>氏<sup>氏</sup>蓋<sup>蓋</sup>シ<sup>其</sup>製<sup>製</sup>ノ  
不良ナラシ<sup>疑</sup>ヘリ若シ今之ヲ大量ニ用ヒテ  
効<sup>効</sup>ヲ奏スル<sup>十</sup>分<sup>分</sup>ナラ<sup>ス</sup>而シテ<sup>些</sup>ノ<sup>茶</sup>害<sup>害</sup>ナ<sup>キ</sup>  
時ハ是レ其製ノ良ナラサルヲ證シ或ハ他物ニ  
配合シテ之カ為メニ解<sup>抗</sup>サル、ニ由ル<sup>用</sup>百<sup>氏</sup>

ノ用法ハ十匁ヲ清水ニ溶解シ一日數次ニ用ヒ  
各日三匁ヲ増加シテ三十匁ニ至テ止メ十四日  
間<sup>蒙</sup>モ<sup>茶</sup>液<sup>液</sup>ヲ<sup>与</sup>フル<sup>十</sup>ク<sup>大</sup>氣<sup>氣</sup>ニ<sup>直</sup>達<sup>達</sup>シ<sup>身</sup>軀<sup>軀</sup>  
ヲ<sup>運</sup>動<sup>動</sup>シ<sup>良</sup>善<sup>善</sup>ノ<sup>食</sup>餌<sup>餌</sup>ヲ<sup>用</sup>ヒ<sup>悠</sup>々<sup>々</sup>和<sup>和</sup>適<sup>適</sup>ノ<sup>後</sup>又<sup>十</sup>  
匁ヲ以テ始メ三十匁ニ至テ止メ又四日間休息  
シテ後始メ<sup>十</sup>匁<sup>匁</sup>又始メ<sup>如</sup>シ<sup>以</sup>テ<sup>病</sup>者<sup>者</sup>ノ<sup>全</sup>治<sup>治</sup>ス  
ルニ至ル<sup>柳</sup>氏<sup>氏</sup>用法ハ十全無害實ニ適切ノ法ニ  
シテ<sup>後</sup>来<sup>来</sup>ノ<sup>諸</sup>用<sup>用</sup>法<sup>法</sup>ニ<sup>冠</sup>タ<sup>リ</sup>ト<sup>云</sup>フ<sup>ヘ</sup>シ<sup>故</sup>ニ<sup>或</sup>  
ハ之ヲ酒精ニ和シ或ハ之ヲ芳香水ニ調スル等  
ノ用法アリト<sup>蛭</sup>氏<sup>氏</sup>皆用ユルニ<sup>適</sup>セ<sup>ス</sup>ト<sup>ス</sup>蓋<sup>シ</sup>

之ヲ清水ニ知用スレハ他物ニ由テ解折サル、  
ノ憂少ナケレハナリ

外用トシテ之ヲ軟膏ニ製シ或ハ洗滌浴湯ノ諸  
劑ニ製ス然レ凡浴湯ニハ洗頭ヲ以テ優レリト  
ス軟膏ニハ一匁ヲ半ヲ至一ヲノ脂膏ニ研和ス  
和蘭局方ニ從ヘハ尚之ニ炭酸苦土六匁ヲ加フ  
是レ其解折ヲ防クカ為メナリ然レ凡用ニ臨シ  
テ新ニ之ヲ製スルカ若クハ水ニ溶解シテ之ヲ  
用ユルノ解折サル、フナキニシカス其水劑ハ別  
テ一分ヲ六匁至二十分ノ清水ニ溶スル者アリ

第四

單次頭

ヒダラルギリユムフエム〇プロテヨデニチエム、メルキユリイ  
エニケルホラウデゴヨドエムキウイハキ〇クウキヨクヨクニ

羅 加丹

頭 ニ容 次 ニ容

是レ濃精酒ヲ以テ濡シタル生水銀ヲ次頭ト共  
ニ一盃ニ混和スルニ由ルテ成ル者ニシメ青黄  
色ノ粉末ニシテ香味共ニナク水沔精等ニ溶解  
セス唯越的耳及ヒ洗頭鱗ノ溶水ニ能ク溶解シ  
大氣ニ逢テ黒色ニ變シ之ヲ熱ス十五匁ノ量ヲ  
用ユ而シテ其膏橙黄色ヲ見ハスヲ見ハ速ニ其

用ヲ停△ヘシ之レ其中ニ在ル所ノ草次頭頰既ニ復次頭頰ニ変スルノ微ナリ若シ尚之ヲ用ユレハ刺戟ノ度極メテ峻劇ニシテ局処ヲ荒蕪スルニ至ル

第五

複次頭頰

ヒダラルキリユム、ヨダチユム、リニアリユム、デウトヨヂユレチユム、マルキユリイ四羅ロードヨリナチムクウサツキ、ゲッペルドヨリニチムクウサツキ

頰 密次頭 二容

真紅朱色ノ粉末ニシテ香味共ニナク之ヲ熱スレハ共色橙黄ニ変ス水ニ溶解セ入濃精酒及ヒ

沈頭鰾食塩苛性塩類頰属諸塩ノ溶水ニ能ク溶解ス

此茶ハ局処ヲ刺戟スル下極メテ峻烈ニシテ動モスレハ之ヲ腐蝕シ胃ニ入テ容易ニ嘔吐ヲ起シ劇症ヲ発ス其性効ノ猛烈ナル下大ニ前茶ニ倍蓰シ之ヲ水銀劑ニ較スルニ甘汞遠クシテ外汞ニ近シ此茶半量ヲ一量ノ脂ニ研和スル者ハ其性稍緩ナリト虽凡之ヲ皮表ニ塗擦シテ錢癬状ノ瘡疹ヲ発ス此茶ハ外汞ノ如キ水銀劑ノ功ノ外ニ尚劇シキ

衛子日草汝顛

汝顛ノ効アリ故ニ前菜ノ如キナリ之ヲ梅毒瘰  
瘰殊ニ其二病合併ノ者ナレハ霧氣ヲ焚シ膏脂  
及ヒ蛋白等機生ノ者ニ觸ルレハ忽チ化シテ複  
汝顛傾トナル故ニ黒紙ヲ包纏シタル瓶中ニ貯  
ヘ用ユルニ臨ンテ汝等ノ品ニ配スルヲ禁ス中  
量及ヒ大量ヲ即チホ氏至  
三十八ノ量用ユレハ局処ヲ刺戟シ胃  
腸ノ嫩衝ヲ起シ峻解凝變質ノ功アリ恰モ緩製  
水銀劑ノ如ク長服シテ甚シク身軀ヲ害スル  
ナク流涎ヲ致スヲ稀ナリ  
医菜トシテ之ヲ梅毒殊ニ其經久ニシテ瘰瘰ヲ

頭ハ之ヲ水銀ノ  
製劑ニ比スルニ其切  
用ノ緩劇殆ト甘  
秉ノ如シ梅毒ニ用  
ヒテ良切アリト臣  
氏草純新鮮ノ傳  
染ニハ別ニ此菜ヲ  
撰用スルニ及ハス甘  
秉ヲ用ヒテ忌リ  
トス

毒又ル者慢性腺腫肝臟閉塞瘰瘰性白腫關節水  
腫慢性結節ノ皮病癬癩癌毒様腫疣瘰瘰面痛梅  
毒性瘡癬洵乙腫瘰瘰腫ニ用ヒ殊ニ軟膏トシテ  
之ヲ小兒ノ従前諸痛ヲ患フル者ニ外用シテ妙  
効アリ  
内用ハ四分一乃至一分一ヲ一日數次ニ用ヒ丸若  
クハ散トシ乳唐劑並刺伯膠阿片瘰瘰木越幾私  
等ヲ加フ法國ノ大匠李高耳私小兒ノ梅毒ニ用  
ユル一良方アリ左ニ挙ク  
方

草汝顛頤 六

癰瘡水越幾私 四十八

甘草膏 半

右研和シ四十八丸ヲ作り其年數ニ從テ丸數ノ  
多少ヲ議シ用テ工  
外用ハ一ヲ一乃至ニ多ノ脂ニ研和シ一日ニ  
大抵十氏至ニ用ユト虽凡其性功ノ劇烈ナルカ  
為ニ内用ニ供スルヲ稀ナリ唯外用トシテ諸般  
ノ皮膚病頭瘡癰毒様腫癰腫○腺腫梅毒性癰瘡  
性及ヒ瘰癧性ノ潰瘍白腫關節焮衝腐骨疽ノ初期  
癰瘡家ノ骨腫角膜闇黒眼瞼及ヒ其腺ノ慢性焮

衝爛弦風メーボーム腺ノ硬結牛眼倭テ質私後  
遺ス所ノ關節靱帶ノ硬靱ニ變スル者等ニ良効  
アリ

止ムヲ得スシテ之ヲ内用セハ十六分氏一至  
八分氏一ヲ濃精酒或ハ過的耳ニ溶シ一日數次  
反復シテ之ヲ用ユ此時決シテ空心ナラシムル  
ヲ勿シ外用ハ之ヲ軟膏トナス即チ十氏至二十  
氏ヲ一乃至ノ膏脂ニ研和シ用ユ忽布滿各八又二  
氏ヲ二乃至ノ脂膏ニ和スルヲ用ヒテ良方ト称ス  
他ナシ患部ノ差異用効ノ強弱ニ從テ医家ノ商

量ニ從フノミ必ス一方ヲ確守セスニナ可ナリ  
眼膏ニハ此菜一匁ヲ蠟膏甘扁桃油各一匁ニ和  
スルヲ以テ良ナリトス

第六

次顛鉄

フェルリウム、ヨダチニウム、フエルリウム、ヒドロゲニウム、ラキンゲニウム、  
ロシニウム、ヨダチニウム、フエルリウム、フエルロク、フエルロキニウム、ヨダチニウム、フエル  
ロシニウム、ヨダチニウム、フエルリウム、フエルロク、フエルロキニウム、ヨダチニウム、フエル

鉄一容 次顛一容

暗緑帶青色晶体ノ塩ナリ水及ヒ酒精ニ溶スル  
ヲ尤モ易シ気ヲ見テ沸流シ且ツ解折ス味淡黄  
ニシテ微鹹ナリ次顛ノ味ヲ口中ニ残ス

鉄及ヒ次顛ノ効アリ強壯解凝變質ノ劑トス之  
ヲ用ヒテ髮細管ノ運為ヲ奨進シ大便ヲ増シ利  
尿ヲ進ム大量ヲ用ユレハ胃ノ粘液膜ヲ刺戟シ  
悪心嘔吐下痢胃腕痛ヲ發シ尚其量ヲ大ニスレ  
ハ遂ニ胃腸ノ攣衝ヲ起ス  
医菜トシテ之ヲ用ユレハ大約患者衰弱ノ強壯  
菜ヲ用ユヘキノ症アリ而シテ兼テ解凝變質ノ  
効ヲ欲スルノ地ニアリ故ニ之ヲ左ノ諸患ニ用  
ユ即チ瘰癧性腸間膜病腸間膜ノ養育過少癌毒  
膿腫瘰癧性頭瘡及ヒ諸腺ノ瘰癧性病結節肺勞

粘液流出病月経閉ニ歸因セル胃腕痛白帶下月  
経閉止殊ニ腸間膜及ヒ肺ノ結節腫ヲ兼ヌル者  
夢中遺精經久蔓延ノ梅毒慢性痿疔瘰癧ヲ帶ビ  
サル者等ナリ  
外用トシテ腫及ヒ子宮ノ粘液流出及ヒ淋疾等ニ之ヲ注射シ  
慢性梅毒性ノ潰瘍及ヒ皮膚病等ニ軟膏トシテ  
用ヒテ効アリ此茶ハ諸般ノ物品ニ過ラズ其解  
折サル、ト尤モ早キカ故ニ之ヲ他茶ニ配スヘ  
カラ入唯之ヲ内用セント欲セハ二匁至六匁ヲ  
取り糖水ニ和シテ与フヘシ又之ヲ丸劑トシ用  
ユルモ可ナリ

外用ニハ軟膏ヲ佳トス即チ半匁至一匁ヲ半匁  
至一匁ニ和シ用ユ注射洗滌ノ諸劑トナスニハ  
半匁至一匁ヲ取り八匁至十二匁ノ水ニ和スヘ  
シ從來諸家此茶ノ解毒ヲ防クノ法ヲ講スト虽  
凡一モ其効アル者ナシ故ニ内外共ニ用ニ臨ン  
テ新ニ之ヲ製スヘシ

第七

沃顏阿摩尼亞

第八

沃顏安質王



第九

次顛硫黃

第十

次顛炭素

第十一

次顛銀

第十二

次顛塩酸

第十三

次顛塩

第十四

次顛水素酸

第十五

次顛澱粉

第十六

次顛亞鉛

第十七

次顛再前塩

第十八

次顛鉛

第十九

沃頓幾那塩

第二十

沃頓石灰土

第二十一

沃頓重土

第二十二

沃頓金

第二十三

沃頓砒

以上列挙スル所ノ沃頓製劑十七品ハ人或ハ其  
ノ奇効ヲ歎スル者アリト虽氏要スルニ是皆小  
異大同ノ功アル者ニメ用ニ供スルニ是ラスト  
ス今夫レ世間新ヲ弄ヒ奇ヲ好ムノ癖人々皆ア  
リ當時尚然リ況ンヤ後世ニ至ルニ及ンテヤ若  
シ尚幾多ノ新薬之ニ増加スルヲアラハ正ニ之  
ヲ如何センヤ本ヨリ是レ学ヲ好ミ道ヲ廣ムル  
ノ好志ニ由テ生スル所ナリト虽氏弊又之ニ添  
ハサルヲ得ス縱令今予口吻ヲ酸了シ剝シク  
之ヲ論スルモ後世増乘スルノ時ニ当テ又克ク

之ヲ過ムルヲ得ンヤ噫兩百氏ノ説ニ由ルニ  
 輓今化学ノ進歩益々其ノ高向ヲ極メ徒ラニ焦  
 思苦心シテ斯ノ如キ剩茶ヲ造成シ以テ人ノ耳  
 目ヲ新ニシ羨觀ヲ茶室ニ供シ後進ヲシテ撰萃  
 ニ土地ナカラシム蓋シ斯ノ如キ剩茶ハ之ヲ一  
 擔ニシテ河濱ニ捨テ可ナリ而シテ後筆ニテ医  
 道ノ真面目ヲ見ルヘキノミト誠ナル哉此ノ言  
 ヤ一双ノ眼アル人ハ能ク其真味ヲ知ラン學者  
 夫レ此レヲ察セヨ

第二篇

解血變質之茶

硝酸銀

ニトラス、アルゲニチエキス〇ニトラス、アルゲニチノニトリエム、アルゲニチセム  
 サルトルシエラールニル独ニトラテアルゲニト法  
 ニトラテラスニルマル〇カヤラスナク英

銀 一容  
 窒素 二容  
 酸素

此ノ茶医用ニ供スル者ニ般アリ一ハ硝酸ヲ以  
 テ純銀ヲ溶解シ而シテ之ヲ結晶スル者ニシテ  
 此品特リ内用ニ供シ名ケテ硝酸晶ト云フ一ハ  
 其既ニ結晶セル者ヲ再ヒ溶解シ之ヲ小管ニ注

ヒテ以テ其形ヲ取ラシム地獄石即チ是ナリ

第一

硝酸銀具

下ラスアルゲニチウス、キリスタリス、アロゲキリ、タルリセ、ルデサル、トルシール、シルフルラキセ、デー、

具、体四角或ハ六角整齐ナラス色ナク透明ナリ  
味苦クシテ嘔スヘク他ノ鑛物ノ如シ氣ヲ見テ  
変セス日光ニ逢テ速ニ黒色ニ変ス同量ノ冷水  
半量ノ温湯ニ溶解シ又酒精ニモ能ク溶解シテ  
火ヲ点スレハ焚ヘテ爆列シ唯之ヲ過ムルハ熔  
化シテ流動ス

第二 外用品

硝酸銀熔

地獄石ニトラス、アルゲニチウス、フエニユス、アルゲニチウム、ニトリキウム、フエニユム、  
○カウスタキウム、リユナール、ラビシ、インフルナール、アロゲキリス、アロゲキリス、タル、  
シニール、シルフル、アルセス、ナール、

長圓管状ニシテ色灰白中ニ線状ノ裸体ヲナシ  
光輝ニ逢テ黒色ニ変スルヲ猶前品ノ如シ故ニ  
共ニ黒紙ヲ包纏シタル瓶中ニ貯フヘシ其  
性質ハ皆前ニ全シ唯水ニ溶スルノ量稍大ナル  
ノミ

硝酸銀功用利害

〔乾〕健康作用

〔以〕小量ヲ用ヒテ胃腸ニ入レハ初メ先ツ其中ニ

存在スル所ノ蛋白質ノ者ヲ結ニテ一種ノ機生  
塩ヲ作り遂ニ塩酸ニ合フテ塩酸銀トナリ是ニ  
由テ其効分ノ発達ヲ妨ク故ニ動モスレハ大量  
ヲ服スルモ更著ノ患害ヲ見ハサ、凡者アリ歩  
捷<sup>エ</sup>過<sup>ル</sup>耳<sup>ル</sup>名<sup>ル</sup>ノ説ニ曰ク予嘗テ一次ニ十五<sup>ハ</sup>ノ硝  
酸銀ヲ丸劑ニ製シ之ヲ用ヒテ更ニ患害ヲ發セ  
ス五<sup>ハ</sup><sup>ハ</sup>ヲ清水ニ溶解シ用ヒテ危劇ノ諸症ヲ見  
ワスヲ見タリ如何トナレハ溶劑甚々稀薄ナレ  
ハ機生物ニ會合スルモ最<sup>ニ</sup>テ塩ヲ作ル<sup>レ</sup>能ハス  
以テ十分ノ効力ヲ發セサレハナリト見レ或ハ

然ラシ○少量ヲ長服スレハ別ニ患害ナシト虽  
凡皮膚層黑色ヲ見ハスニ至ル蓋シ此奇性ハ硝酸  
銀什麼ノ變革ヲ血中ニ受クルノ致ス所ナルヤ  
尙未タ溶解ヲ得ス加<sup>カ</sup>羅<sup>ラ</sup>母<sup>ル</sup>耳<sup>ル</sup>名<sup>ル</sup>ハ之ヲ硝酸銀ヲ  
以テ成ル所ノ機生塩皮膚層分佈スルノ間光輝ニ  
逢テ以テ黑色ヲ生スルノ致ス所ナリト謂フト  
虽凡若シ果メ然ラハ分泌排泄ノ機何<sup>レ</sup>之ヲ驅  
除セスシテ長ク黑色ヲ皮膚層ニ留<sup>ル</sup>ルノ理アラ  
シヤ此説又信シ難シトス諸酸硝酸酒酸等能ク  
黒斑ヲ除クト称スレ凡之ヲ実験メ良効アル者

ハ汝類及ヒ青酸鹽ナリ

四大量ヲ用ヒテ之ヲ吸収スルノ速ニ且ツ他物  
ニ抱合スルノ機會ナケレハ局処ヲ刺戟シ之ヲ  
腐蝕ス惡心乾嘔或ハ嘔吐下痢ヲ發シ神経系流  
甚シク侵掠サル、所アリ血行之力為ニ良カラ  
ス動脈ノ血動モスレハ黒色ニ變シ精神沈鬱苦  
悶シ四支麻木スルカ如ク呼吸困危シ眩暈目眩  
動モスレハ痙攣搐製ヲ發シ遂ニ窒息ニ由テ斃  
ル〇死アラ割驗スルニ胃腸ノ腺液膜処々ニ白  
色ノ凝固シタル乳汁ノ如キ者アリ或ハ膜腫大

ニシテ恰モ燐灼スルカ如ク又ハ既ニ破潰ノ孔  
穴ヲ為ス者アリ口孔咽喉食道ノ腺液膜モ又此  
ノ如シ然レ氏硝酸銀ノ人々ヲ害スルヤ常ニ甚  
ク一様ナラス其之ヲ丸散トシテ用ヒ或ハ溶劑  
トシテ用ユルニ由テ違ヒ又其死スルノ速  
ニ由テ違フカ故ニ爰ニ記スル所ノ要件ヲ以テ  
毎常不動ノ確状トナスヘカラス  
總テ硝酸銀ハ機生体ニ抵觸シテ速ニ其部ノ蛋  
白質ノ者ト結ヒ胃ニ入レハ其中ノ酸塩ト相合  
フ以テ一種ノ塩トナル之ヲ外用シテ大切アル

所以ノ理モ亦蛋白結合ヨリ外ナラサルナリ

坤 医治作用

以 亘古ヨリ胃院痛胃疼ニ用ヒテヨソニ及ヒ  
ラウケンリト鎚ハ丈ニ硝酸銀ノ効アルヲ称  
セリ輒今ニ至ワテハ腸管ノ胃寒性及ヒ激衝性  
ノ諸病下痢ヲ兼ヌル者腸ノ弟扶思垂細垂霍乱  
慢性下痢胃ノ潰瘍胃軟化白帶下義膜咽喉焮衝  
鶯口瘡ニ之ヲ称用ス然レモ其効ヲ致スノ理ハ  
尚凝團ノ中ニ在リ

呂 諸般ノ神経病殊ニ其病間歇ナル者舞蹈病癲

痲喘息百日咳ニ効アリ而シテ癲癇ニハ克ク小  
心シテ之ヲ用ユレハ従前諸般ノ薬剤ヲ用ヒテ  
治スルコト能ハサル者モ亦治スルコトヲ得ヘシ実  
ニ癲癇ノ妙薬ト称シテ可ナリ然レモ此方ハ百  
方其効ナキノ症ニ用ユヘク而シテ用ニ臨  
ンテ極メテ小心翼々タラシムコトヲ要ス然ラサレ  
ハ大害ヲ惹クコトアリ  
用法 八分ハ一至半分ヲ一日数次ニ用ヒ漸次ニ  
増加シテ二分ニ至ル丸劑ヲ尤モ良トス且ツ之  
ヲ用ユルノ間ハ塩味ヲ避クヘシ是レ其用薬ト

結ニテ塩酸銀ヲ作り以テ効力ノ尅達ヲ防ケン  
ヲラ恐ルレハナリ之ニ配スルニハ蜀葵根末甘  
草末血刺伯膠白糖魚餅母等ヲ以テス左ノ方尤  
モ良ナリ

方

硝酸銀晶 三瓦

清水ニ溶解シ左品ヲ加フ

甘草末 半瓦

甘草膏 適宜

右研和シテ三十丸ヲ作り一次ニ一丸ツ、一  
日三次服サシム

硝酸銀ハ溶劑トシテ用ユレハ其功最モ強シ故  
ニ又大害ナキニ非ス唯之ヲ用ユレハ小兒ノ経  
久泄瀉慢性ノ腸嫩衝等ノミナリ總テ此薬ハ機  
生ノ物品ニ逢テ速ニ其性質ヲ失ニス故ニ切ニ  
他薬ニ配スルヲ禁ス  
硝酸銀ハ之ヲ外用ニ供スレハ其大功實ニ正切  
通、怡百堯百中ニシテ外科ノ一大良薬タルハ  
猶他ノ幾那阿片汝顛安質王等ノ外科ニ於テ必  
須ニシテ闕如スヘカラサルカ如シ西国ノ諸賢  
皆曰ク世若シ硝酸銀ナカワセハ吾又外科タル



トヲ得スト「硝酸銀ヲ外用ニ供スルハ数般ノ標  
的アリ故ニ或ハ之ヲ刺戟衝動ノ劑トナシ或ハ  
之ヲ解血變質ノ方ニ作り又ハ之ヲ腐蝕燻灼ノ  
藥トナス等病ニ從テ各異ナリ然レモ腐蝕劑ト  
シテ之ヲ用ユレハ其効實ニ他ノ諸藥ニ冠タリ  
ト云フヘシ但シ其効ノ深達ヲ要スルノ地ニ至  
ツテハ他ノ峻腐劑ニ讓ルノモ  
〔波〕疣癬々肉等瘡毒ニ由ラスシテ癩者小靜脈怒  
脹スル者母斑等ヲ消除スルカ為ニ硝酸銀ニ用  
ヒテ効アリ

〔仁〕創若クハ潰瘍努内ヲ生シテ其痊癒ヲ妨クル  
者下疳ノ初癩瘡角膜ノ潰瘍耳内ノ諸病骨潰  
瘍乳房及ヒ唇皮ノ剥脱子宮及ヒ腔ノ潰瘍寒腫  
陰囊水腫及ヒ其他外表ニ交通スルノ部潰瘍ヲ  
癩スルニ注射劑トシ或ハ洗滌劑トシテ良功アリ  
〔保〕突創及ヒ咬傷創殊ニ毒獸ノ咬傷ニ由ル者水  
蛭創或ハ拔齒ニ由テ癩スル劇シキ出血効アリ  
〔邊〕諸般ノ外部將ニ斃傷ヲ癩セントスル者ハ直  
チニ之ヲ用テ其部ヲ燻灼シテ効アリ又其斃傷

既ニ慢性ニ變シ其症頑<sup>牢</sup>ニメ治シ難キ者ニ効アリ故ニ咽喉焮衝義膜咽喉焮衝鶯口瘡百日咳口内ノ焮衝劇甚ナル者<sup>凡眼</sup>眼<sup>類</sup>眼<sup>類</sup>焮衝急慢ニ性ノ皮膚焮ヲ兼ヌル者梅毒性ノ眼焮衝急慢ニ性ノ皮膚焮衝凍瘡火傷ノ軽度ナル者標疽打撲創皮疹錢癬梅毒性瘡疹癬角漠水泡白腫關節ノ焮衝様諸病夢中遺精寢中遺便痲疾後痲等ニ用ユ○總テ此般ノ諸病ニ硝酸銀ヲ用ヒテ大効アルハ善ク其量ヲ詳カニシ良久其法弁スルニアリ故ニ病ニ從フテ小量ヲ用ヒ又大量ヲ用ヒ加之草質ヲ

以テ直チニ患部ニ抵觸ス  
 〔登〕硝酸銀ハ神經ノ知覺亢進スル者神圣痛痒癢等ニ蒸劑トシ用ヒテ効アリ  
 〔知〕尿道狹窄食道直腸耳孔鼻竅等ノ狹窄及ヒ斜視眼ニ燻灼劑トシテ用ヒ効アリ但シ人ノ説ニ曰ク硝酸銀ハ諸道ノ狹窄ヲ治スルノ功アリト雖<sup>尿</sup>尿道ノ狹窄ニ至ツテハ止ムヲ得サルノ外ハ之ヲ燻灼スレハ或ハ硬痂ヲ結成シテ大ニ通利ニ妨ケアレハナリ若シ草ニ紙捻子ヲ用ユルニハ是或ハ然ラン

利硝酸銀ハ白髪ヲ黒染スルノ奇性アリ故ニ染  
髪ノ方ニ用ユヘシ其法海夜硝酸銀一分ヲ水八  
分ニ溶解シメ毛髪ニ塗リ次朝硫黄蘇ノ溶劑ヲ  
以テ之ヲ梳リ遂ニ銀ノ溶劑ヲ以テスルニ至ル  
此ノ如クスルヲ數日白髪變シテ全黒トナル用  
法ハ疾疢ニ從ワテ各異ナリ其功ノ輕易ナラン  
ヲ欲スル者ハ硝酸銀熔ヲ用ユルニ適當セス  
唯其硝酸銀晶ヲ用ユルヲ良トス○溶劑ハ大抵  
二匁ノ硝酸銀熔ヲ一匁ノ清水ニ溶スルヲ要ス  
是レ其少量ナル者ニシテ其効モ亦緩ナリ以

テ眼炊衝皮膚病義膜咽喉炊衝等ニ用ユヘシ若  
シ又劇甚ノ刺戟腐蝕ノ効ヲ取ラント要セハ四  
十匁至六十匁ヲ一匁ノ清水ニ溶解スヘシ之ヲ  
灌腸劑ニ製スルニハ半匁至五匁ヲ一匁ノ菜液  
ニ和シ軟膏ヲ作ルニハ一匁至十匁ヲ一匁ノ脂  
膏ニ混ス若シ局處ノ刺戟甚シクメ疼痛堪工難  
キ者ハ食塩ノ溶劑或ハ塩酸能ク之ヲ寛解スヘ  
シ  
硝酸銀ヲ外用スルノ法ハ疾病ノ各異ナルニ從  
ツテ其宜ヲ撰ハサルヘカラスト虽氏大抵其定

規ナキニ非ス故ニ今記シテ以テ用者ノ撰擧ニ  
供ス即チ

以腐蝕ノ功ヲ要スル者ハ先ツ其草質ヲ水ニテ  
濡シ且ツ又之ヲ施スヘキノ地ヲモ湿シテ後之  
シラ抵觸セシメン<sub>一</sub>ヲ要ス

呂小節斑点水泡等ハ之ヲ施スノ前<sub>先</sub>ツ能ク其  
部ヲ洗滌スヘシ波腐蝕法ヲ行フノ後<sub>繡</sub>帶法ヲ  
施スニハ草質ノ綿撒糸ヲ良トス若シ患部ヲ刺  
戟スルノ恐レアレハ草蠟膏ヲ布帶ニ攤シ行フ  
ヘシ仁腐蝕ノ効深達セン<sub>一</sub>ヲ望ム時ハ屢反復

シテ之ヲ施シ或ハ散末トナシテ其上ニ撒布シ  
掩フニ硬膏ヲ以テスヘシ

保患部ニ膿粘液等アル者ハ海綿ヲ以テ淨刷シ  
而シテ<sub>後</sub>之ヲ施スヲ要ス邊<sub>邊</sub>脛脰及ヒ瘻瘡下疳咬  
傷等ハ注意シテ悉ク其部ヲ燻灼スヘシ<sub>一</sub>点モ  
残遺スル処アラシムル<sub>一</sub>ナカレ<sub>一</sub>眼脰ノ<sub>一</sub>嗽衝  
皮表ノ<sub>一</sub>嗽衝及ヒ粘液膜ノ<sub>一</sub>嗽衝ハ草質ヲ以テ唯  
其外表ニ抵觸スヘシ角膜ノ深潰瘡及ヒ脛尿道  
等ノ潰瘍ニハ小刀ニテ草質ヲ削リ細メ以テ之  
ヲ腐蝕スヘシ

〔知〕關節ノ焮衝白腫便毒陰囊焮衝等ニハ初メ先  
ツ表皮ヲ濡シ而シテ後草ヲ以テ之ニ觸ルヘシ  
〔利〕倭テ質私ニ発泡法ヲ施スニハ芫青ヲ用ユル  
ヨリ硝酸銀ヲ用ユレハ其力劇クシテ効モ亦強  
シトス既ニ水ニ濡シタル草質ヲ以テ患部ニ抵  
觸スルヲ一ニ少時ニシテ掩フニ草蠟膏ヲ以テ  
ス〔奴〕尿道狹窄ニハ硝酸銀ヲ塗タル紙捻子ヲ用  
ユ但シ之レニハ硝酸銀晶良トス〔留〕出血ノ  
ルニハ火酒ニ硝酸銀ヲ溶解シテ用ユヘシ  
〔遠〕慢性ノ眼焮衝ニ嚏茶トシテ用ユル人アリ其

方ハ則チ硝酸銀一分葦菜根末三十分龍腦一分  
右絹勻シテ以テ嚏茶トナス  
〔和〕羅私及ヒ其性ノ諸病ニハ若クハ表皮ヲ洗滌  
スルノ后草ニ其焮衝ノ部ニ抵觸スルノミナラ  
ス又蕭テ近圍ノ部モ共ニ燻灼スルヲ要ス〔如〕咽  
喉ノ所患肺勞気管支ノ焮衝等ニハ七十分ノ白  
糖ニ研和シ極精細ト散末トナシ小管ヲ以テ之  
ヲ吹キ以テ其部ニ抵ラシム〔與〕白帶下及ヒ子宮  
ノ諸病ニハ水箒ヲ以テ其溶劑ヲ射注スヘシ〔因〕  
痲疾ニ射注劑トシテ用ユルニハ五氏至十氏ヲ一

〔礼〕慢性ノ膀胱炎  
 衛六硝酸銀ノ緩溶  
 水ヲ射注シ引瀉器ヲ  
 壓重シテ其流出ヲ妨  
 ケ中ニ留ムルヲ少時  
 ナルヘシ

為ノ清水ニ溶解シ先ツ患者ラシテ尿ヲ利セシメ  
 而シテ之ヲ射注シ暫ク寢休ニ安卧セシメ若シ  
 尿道ノ疼甚シクハ再ヒ寒水ヲ射注シ或ハ其疼  
 アランヲラ恐ルレハ初メ溶劑ニ混スルニ阿片  
 幾ラ加フヘシ。〔曾〕輕易ノ湯火傷ニハ之ヲ膏ニ作  
 リ施スヲ要ス即チ硝酸銀十凡ラニ号ノ脂ニ研  
 和シ綿布ニ攤シテ之ヲ貼シ或ハ一号ノ硝酸銀  
 ヲ適宜ノ水ニ溶シ四号ノ脂膏ニ研和シテ之ヲ  
 用ユ〔都〕白髪ヲ黒染スルニ左ノ方最良トス即チ  
 硝酸銀酒石英各八分阿膠尼垂十五分ヲ混和シ

之ヲ以テ白髪ヲ梳ラシム是レ加設那散名ノ方  
 ナリ〔藤〕皮表手指等ノ硝酸銀ニ由テ生スル黒点  
 ハ汰蕪蟬ノ溶劑ヲ以テ洗滌シ能ク除クヘシ又  
 硫酸鐵青酸鐵及ヒ升汞等皆ナ良棟ナリ  
 安政元年<sup>西</sup>百五<sup>元</sup>十<sup>一</sup>年<sup>十</sup>一<sup>月</sup>紐約<sup>ニ</sup>アル<sup>グ</sup>格<sup>ル</sup>名<sup>地</sup>ノ一<sup>医</sup>琪<sup>列</sup>  
 延<sup>人</sup>名<sup>一</sup>新<sup>法</sup>ヲ<sup>創</sup>メ<sup>以</sup>テ<sup>名</sup>声<sup>ヲ</sup>驅<sup>ス</sup>ル<sup>ノ</sup>由<sup>米</sup>利  
 幹ノ新聞紙ニ見ユ其法柔橈スヘキ一個ノ管ヲ  
 気管支尚且肺中ニ嵌入シ以テ硝酸銀ヲ此中ニ  
 送り喉頭気管支ノ嫩衝肺旁ノ膿囊ヲ作ス者ヲ  
 燻灼シテ以テ大効ヲ奏スルナリ然レ此般ノ

術ハ実ニ新奇ニ出ワルト虽凡豈損害ナシト云  
ンヤ吾人謾ニ之ヲ擬スヘカラス

硝酸銀中毒救<sup>治</sup>法

硝酸銀ノ消毒トナス者ハ塩酸灰塩殊ニ食塩ノ  
溶水ナリ是レ其理蓋シ両晶ノ相合フテ塩酸銀  
トナリ一個ノ溶解セサル塩類ヲ作ルニ原ク〇  
硝酸銀ノ溶劑ノ毒ニ中ル者ニハ塩酸ヲ用ユル  
ハ又功ヲナスヘカラス此時ハ唯粘滑緩和ノ菜  
液ヲ与ヘ胃腸ノ攪衝ヲ処置スヘシ

第三篇

解血変質之菜 下

酒石酸鱒安質王

タルタリユス、カリユ、スチキユス〇タルタリユスエメチキユス〇タルタリユス、  
スチキユス〇スチキユス〇タルタリユスタルタリユスタルタリユスタルタリユスタルタリユス、  
アンチモイ〇カリファンチモニアトタルタリユスタルタリユスタルタリユスタルタリユスタルタリユス、  
プレークウエイニステイニ独ケレタルタルエメチセ法タルタルエメチセ英

鱒<sup>各異</sup>容<sup>各異</sup>炭素<sup>各異</sup>容<sup>各異</sup>水<sup>各異</sup>容<sup>各異</sup>酸素<sup>各異</sup>容<sup>各異</sup>安質王<sup>各異</sup>容<sup>各異</sup>水<sup>各異</sup>

酒、石酸鱒安質王ハ即チ坊間ノ吐酒石ナリ其製

ニ由テ以テ名ク白色具俸ノ塩ニ臭気ナク嘔  
スヘキ鑛味アリ十五倍ノ冷水及ヒ三倍ノ熱湯  
ニ溶解シ酒精ニハ溶解セス灰塩諸酸韃素ハ皆

安貨王ヲ降沈セシム此ノ品ノ百病ニ大効アル  
ハ又皆之ヲ知ル實ニ其ノ褒称硝酸銀ノ外科ニ  
於ケルト一般ナリ而メ諸般ノ安貨王製劑モ若  
シ此品ノ在ルヲアレハ又之ヲ撰用スルノ地ナ  
カルヘシ

酒石酸鑷安貨王切用利害

〔乾〕健康作用

〔以〕局処ノ作用ハ胃腸ノ粘液膜ヲ刺戟シ之ヲ皮  
表ニ攪スルハ同シク之ヲ刺戟シ然熱腫痛ヲ発  
シ遂ニ痘瘡ノ如キ瘡疹ヲ発ス又咽喉食道ニモ

此疹ヲ発スルヲアリ○吐酒石ハ之ヲ散若ハ膏  
ニテ用ユレハ扁平ニメ大ナル疹ヲ発シ之ヲ溶  
劑トメ用ユレハ球状ニメ小ナル疹ヲ発スベク  
ステイン欲ノ説ニ曰ク酒石酸鑷安貨王生スル  
所ノ疹ハ其中含ム所ノ漿液ノ生貨他ノ牛痘ト  
甚々相讓ラス故ニ天行痘流行ノ時他ニ牛痘ノ  
良漿ナキ時ハ正ニ此疹ノ漿ヲ以テ人ニ播腫シ  
以テ傳染深ク防クヘシト甚々疑フヘシ

〔呂〕此菜胃ニ入レハ局發汎發ノ作用並ヒ作ル但  
シ其劇易ハ用量ノ多少ト患者ノ知覚機ノ敏捷



トニ應シテ異ナリ。此茶ハ血中ニ入ルテ極メ  
テ速ニメ諸般ノ器具ニ積布スルカ故ニ「ラ」ルセ  
「ハ」ハ之ヲ脳肝及ヒ脂中ニ見ヘタリ尚他人ハ  
之ヲ尿中ニ得タルアリ則尔云ト虽凡此ノ品胃  
中ニ入テ什麼ノ結合ヲナシ血中ニ入テ又如何  
ニ変化シ而シテ諸器ニ積布又又何様ニ結成ス  
ルヤ吾人明カニ之ヲ知ル能ハス唯其作用ノ迅  
速ナルニ注目メ之ヲ推考スレハ此品胃ニ入テ  
蛋白質ノ者及ヒ其他ノ諸品ニ過フト虽凡決合  
スル「直」ニ速ニ血中ニ至ル者ナラン

**波** 少量十分至内服後スレハ別ニ較著ノ現状ヲ  
スル「ナ」シ若シ反服後シテ之ヲ用ユレハ惡心ヲ  
尅シ胃腸脾肝及ヒ唾腺ノ分泌増進シ蒸気汗尿  
等大ニ增多ス

**仁** 少シク大量半至ヲ用ユレハ上件ノ諸症ノ外  
尚神圣枢位ノ病状第十對神圣ニ属スルノ諸症  
ヲ尅ス即チ惡心違和倦勞腹肚カナク時トシテ  
ハ痲痛シ眩暈シ下唇及ヒ下肢戰栗シ舌運動シ  
難ク心動大ニ減シテカナク脉軟徐トナリ彼部  
ニ血液充積メ是部ニ血液減少シ腸ノ運動増進

荷衛子曰第十對神  
聖即十蔓延神聖ニ  
又胃肺神聖ト名ク  
凡ソ胃肺肝三器ニ  
尅スル所ノ諸症悉ク  
此ノ神聖ニ關係セセ  
ハナリ

メ胆汁ヲ交ヘタル水便ヲ浮下スル者ナリ  
保稍大量二用ユレハ即テ催吐ノ効アリ其ニ  
於テヤ胃大ニ脹大シ其下口収縮シ横隔膜ハ縦  
緩シ食道モ亦反常ノ運動ヲ起シ腹筋収縮メ呼  
出ノ時ニ胃中ニ在ル所ノ物ヲ吐出シ兼テ又腹  
痛ノ水便ヲ浮下シ然レモ尚反復メ之ヲ用ヒテ  
吐浮又発セテ却テ上件ノ神圣血行ノ諸症ヲ発  
ス此ニ由テ之ヲ見レハ此茶胃腸ニ抵觸スル  
少ナケレハ其汎発ノ切益強シトス故ニ催吐ハ  
此茶ノ定発功トナスベカラス古人誤テ之ニ吐

酒石ノ名ヲ命ス大ニ其実ニ称ハス  
瀉大量二十以上至四十ヲ用ユレハ胃腸ヲ刺戟スル極メ  
テ甚シク嘔吐下痢シ肚腹劇痛シ患者倦疲又百  
事ニ堪ヘス眩暈苦悶搐製轉筋呼吸困難精神知  
覺ヲ失フテ遂ニ斃ル或ハ然ラス又吐嘔下痢ヲ  
発セサレハ神圣諸症愈劇烈ニメ其死愈速ナリ  
○ラリ欲及ヒ意太且並組諸医ノ驗經説ニ曰ク  
酒石酸鐵安貨王三十以上ヲ用ユレハ更ニ嘔  
吐ヲ発スルナシ死後其屍ヲ驗スルニ胃腸ニ  
少シモ斐常ノ状態アルナシ唯其生前驗視ス

ルノ症ハ眩暈疲倦大衰弱ニメ心動脈搏共ニ減  
シ脈一少時五十至或ハ六十至ヲ為シ呼吸又減  
シテ一少時間十次或ハ十五次ニ至リ皮膚ノ温  
度大ニ減却スト是レ恐ラクハ催吐ニ適應セル  
ノ機具胃腸腹筋横隔膜等其過劇ノ刺衝ニ逢フ  
テ其運營ヲ為スヲ能ハステ痺不遂ノ状態ニ沈  
ムニ由ル者ナラン

**坤** 医 治 功 用

酒石酸<sup>酸</sup>安<sup>酸</sup>貨王ノ医治功用ハ廣汎ニメ凡テ之ヲ  
用ヒサルノ病ナシ是其無味ニメ用ヒ易キ為メ

ノミナラス其功數般ニメ能ク劇易ノ度ヲ殊ニ  
スレハナリ

**乾** 内 用 ニ 由 ル

以此菜ハ胃腸肝脾ニ局<sup>ル</sup>テ効アリノミナラス  
又兼テ発汗利尿ノ効アリ故ニ此ノ標的ヲ以テ  
之ヲ左件ノ諸病ニ用ヒテ効アリ即チ腸胃汚物  
ノ、症腸ノ粘液膜ノ聖京屈病胆汁分泌ノ障碍ア  
ル者急性皮膚病痿<sup>ル</sup>テ痲<sup>ル</sup>諸病羅斯様<sup>ル</sup>痲<sup>ル</sup>衝等ニ  
小量ヲ用ヒ又急性ノ腹水腫及ヒ胸膜间<sup>ル</sup>洩<sup>ル</sup>乙<sup>ル</sup>滲<sup>ル</sup>  
出ノ症ニ用ヒテ効アリ

呼吸器ノ粘液膜ニ膿粘液等ノ者アリ之ヲ除  
去シ兼テ鎮疼ノ諸方ヲ用ヒンカ為ニ気管支ノ  
聖京屈肺ノ凡気腫及ヒ水腫気管支ノ廣潤ニ變  
心タル者喘息百日咳肺勞病気管支ノ嗽衝義膜  
咽喉嗽衝等ニ用ヒテ効アリ○ベルナルヨウ  
ハ肺勞及ヒ喘息ニ一日ニ五分ノ一ヲ用ヒテ  
莫非涅ノ如ク鎮降ノ効アリト称ス

波其鎮降寛解ノ効アルヲ以テ神圣及ヒ血管系  
統ノ知覚機刺衝機亢進スル者精神ノ病的變革  
ヲ受クル者狂病鬱憂病黒胆液病相思花風病酒

客ノ震惕譫妄諸般ノ疼痛瘁等神經性ノ者子癇  
破傷風搐掣神圣熱家ノ譫妄正ニ腦嗽衝ヲ殺セ  
ントスル者舞蹈病間歇熱金創等ニ用フ蓋シ間  
歇熱ニハ小量大量共ニ用ヒ或ハ催惡心劑トナ  
シ或ハ催吐劑トシ胃腸ノ汚物ヲ驅テ神圣ノ機  
カラ變調又以テ効ヲ奏セシム○腦脊髓ニ直下  
ニ鎮降ノ効ヲ達セシム以テ筋ノ強ク挛縮スル  
者ヲ寛縱スルガ為ニ關節ノ脱臼ニ用ヒテ施術  
ヲ容易ナラシム又此ノ標的ヲ以テ箱頓癩頸筋  
ノ牽張子宮ノ瘕瘕等ニ用ヒテ効アリ○催惡心

劑トメ之ヲ用ヒテ肚腹ノ諸病殊ニ肝臟ノ厚大  
瘦實ニ効アリ又皮膚ノ諸病ニ用ユ其法十六分  
凡一至八分凡ノ量ヲ一次ニ飲マシム即チ一日  
ニ半凡至二凡ヲ六乃至八乃至清水ニ溶解シ一  
茶匕宛之ヲ服セシメ患者將ニ吐セント欲スル  
ニ至テ止ム此ノ方ハ大飲家ノ酒癖ヲ断タント  
欲スルニ用ヒテ効アリ

仁 大量ヲ以テ血液ノ運為ヲ變革シ一凡ノ代謝  
機ヲ變調シ以テ神聖血管ノ系統及ヒ呼吸ノ諸  
器ニ解血變血鎮降ノ功カラ致サシム故ニ肺嗽

衝助膜嗽衝胸膜嗽衝氣管支嗽衝關節嗽衝急性  
痿了實私痲疾ニ卷スル陰囊嗽衝靜脈嗽衝子宮  
嗽衝眼嗽衝及ヒ其粘液流出病咳血痰血肺ノ組  
織中ニ血液ノ滲出スル者腦中凡腦嗽衝指致ノ  
標疽等及ヒ其余諸品ノ嗽衝諸病ニ用ヒテ良効  
アリ○此薬ノ胸腔諸器ノ嗽衝ニ於ケル其消炎  
ハ切歷々トメ確指スヘク實ニ無比ノ良方タリ  
而シテ肺嗽衝ハ尤モ其功ヲ見ルノ病ナリ人嘗  
テ刺絡ヲ施セハ却テ其功ヲ減スト謂フ者アリ  
ト蚤氏是レ無誓ノ説ニメ信スルニ足ラス今之

ヲ用ヒント欲セハ先ツ初メニ刺絡メ適量ノ血  
ヲ放テ而メ後一時毎ニ一匁ニ用ヒ其症劇  
烈ナル者ハ十二時間ニ二十匁至四十匁ヲ用ス  
ルニ至ル通例之レニ由テ嘔吐下痢ヲ發シ大ニ  
發汗シ呼吸容易トナリ疼痛減シ諸般ノ検査共  
ニ疾患ノ輕快スルヲ見ル此ノ如クナラハ漸次  
ニ其量ヲ減スヘシ若シ然ラスメ之ヲ用ヒテ疾  
苦少シモ解セス却テ増重セハ速ニ其用ヲ停メ  
テ他ノ法方ヲ講スヘシ○之ヲ用ヒテ病苦ハ大  
ニ寛解スト虽凡口舌嫩衡メ驚口瘡狀疹ヲ發セ

ハ明者塩酸硝酸銀等其症ニ的疾スルノ薬方ヲ  
用ヒテ之ヲ治スベシ若シ其毒ニ中ル者ハ中毒  
ノ救療法ニ隨テ之ヲ処置スルヲ要ス○肺嫩衡  
ニ此薬ヲ用ユレハ其功實ニ正切無比ナリト虽  
凡是レ必ス小心スヘキノ法ニメ敢テ乱投胡措  
スヘカラス故ニ患者甚々少杜ナルカ或ハ虚脱  
スル者知覺敏捷ノ人殊ニ産婦ニハ此法ヲ用ユ  
ヘカラス○已ニ上叙ニ列挙スルカ如ク此薬ノ  
諸病ニ効アルノ實ニ欣賞スヘシト虽凡其中或  
ハ其功害決シ難キ者モ亦之ナキニ非ス蓋シ一

時新法モ癖スルノ風習ニメ褒祿其實ニ適セサ  
ル者モ又之アリ故ニ医家別ニ心眼ヲ注ヒテ以  
テ其當否ヲ斟酌セハ又他ノ乱投大害ヲ惹クノ  
癖ヲ免ルヘシトス

**保**吐劑トメ之ヲ用ユルノ病百般ナリト虽凡之  
ヲ要スルニ此茶ハ動モスレハ吐ヲ免セスメ却  
テ下痢ヲ起シ或ハ少吐ヲ得シト欲メ暴吐ヲ免  
シ其惡心遠和ノ症時トメハ患者ニ幾般ノ苦悩  
ヲ遺シ之レニ由テ或ハ原病ノ痊愈ヲ妨クル  
アルカ故ニ總テ胃中ニ含有スルノ物品ヲ吐出

サシムルノミニメ別ニ他効ノ煩<sup>煩</sup>者ナキノ時  
ハ更ニ此茶ヲ用ユルヲ要セス吐根皓蒼及ヒ其  
余ノ諸劑皆上等ニ列スヘシ然レ凡爰ニ又吐酒  
石ヲ吐劑トシテ用ヒテ其功諸茶ニ勝ル所ノ病  
症アリ即チ左ノ如シ

**上**内臟諸品ノ胃寒症肝臟ノ分泌機碍得ヲ受ル  
者胆汁湧出ノ腸胃汚物ヲ生スル者及腸胃ノ粘  
液夥多等依テ催吐ヲ要スルノ外魚テ肝脾癖等  
諸器ノ分泌ヲ催進シ或ハ之ヲ変革セント欲ス  
ル症ニ吐劑トシテ効アリ

〔下〕肺嗽衝胸膜嗽衝氣管支嗽衝咽喉水腫羅斯様  
嗽衝血液溶崩症眼嗽衝腺嗽衝様感惕乳房嗽衝  
便毒腫腦嗽<sup>衝</sup>等<sup>衝</sup>。テ其症嗽衝洵乙滲出等。由テ  
發シ而ノ大ニ身軀ヲ震暢メ神任血管ニ一個ノ  
大變化ヲ受シノント歎スル者ニアツテ肚腹多  
血ノ症ナク心臟及大血管ニ器械様ノ缺損ナク  
絶久ノ便秘積年ノ閉塞ナク卒中風ノ素因頭腦  
ニ血液上逆スルノ癖ナケレバ之ヲ吐剉トシ用  
ヒテ良効アリ尚且酒客ノ震暢謔妄百日咳諸般  
ノ肺病喘息咽喉ノ症善性腫瘍結節肺旁ノ初

期ニ効アリ○蓋吐酒石ノ此等ノ諸病ニ効アル  
所以ハ吾人明ニ之ヲ知ラズト多クハ其遠達  
ノ功ヲ以テ神經血管ノ常機ヲ一変シ多少血液  
ノ成分ヲ更改シ収斂諸識ノ變偏ヲ寛縱スルニ  
由テ以テ其功ヲ呈スルナラン用法ハ吐剉トシ  
テハ半匁至二匁ヲ八分時毎ニ反復メ用ヒ之ヲ  
散剉ト製スルヲ尤良トス或ハ又溶剉トメ用フ  
ルコトアリ然レ其漸次ノ量一次ニ崩散スル  
ノ恐アルガ故ニ長ク之ヲ持長スベカラス又動  
モスレバ腸胃ノ嗽衝血液上逆等ノ症ヲ發スル



コアリ是<sup>レ</sup>最<sup>ク</sup>畏ルベキノ症タリ故ニ正ニ吐根ニ  
配メ之ヲ用フベシ小兒ニ在テハ殊ニ然リ若シ  
又此ヲ用ヒテ更ニ嘔吐ヲ發スルコナクハ微温  
湯ヲ多飲シ羽毛ヲ以テ咽喉ヲ刺衝シ刺絡浴湯  
ヲ施シ以テ其運為ヲ助クハシ或ハ又患者ノ知  
覚機甚敏捷ナレハ少量ヲ用ヒテ己ニ大吐ヲ起  
ス者ハ速ニ後腹ヲ止メ鎮降ノ諸藥ヲ胃部ニ塗  
リ鎮吐散ヲ與エ灌腸浴湯ヲ諸方ヲ施スハシ○  
咽喉ニ異物硬塞スル者牙關緊急窒息假死等ノ  
症ニ在テハ某方ヲ用フルノ常路己ニ閉塞セリ

正ニ之ヲ灌腸法トシ或ハ静脉ニ射注シ或ハ之  
ヲ内皮ニ傳フヘシ殊ニ内皮法ヲ以テ最良トス  
鎮降寛縱ノ効ヲ要スルニハ半匁至一匁ヲ清水  
ニ溶解シ一時若クハ一時半毎ニ之ヲ用ユ催吐  
惡心祛痰發汗ノ効ヲ欲スル者ハ一匁至二匁ヲ  
以テ全日ノ量トシ必之ヲ接骨花水橙皮水薄荷  
若クハ蒸餾水ニ溶シ用ルヲ良トス決メ諸灰塩  
諸碳酸諸塩糖素ヲ含用スルノ品ヲ配スルコ  
勿レ若シ此禁ヲ犯セバ其質是カ為メニ分解セラ  
レテ寸効ナシ○爰ニ西洋諸家經驗ノ良方數款

アリ録ノ用テ撰用ニ供ス

方 催吐劑トメ用フ

酒石酸礬 安質玉 一匁

吐根新研末 十匁

右研和散トナシ四包ニ分ツ十小時毎ニ一包

ワ、

方 消炎解血ノ劑トナシ肺焮衝ニ用フ

酒石酸礬 安質玉 十匁

橙花水 五匁 白糖 半匁

右和勻シ一時毎ニ一食匕ヲ與フ

方 諸般ノ焮衝ニ用フ

酒石酸礬 安質玉 二匁

硫酸曹達 一匁

硫酸曹達 一匁

清水 四十匁

右和勻シ一硝蓋宛用ヒテ一日ニ此量ヲ尽シ

シハ

方 催吐劑トシ用フ

酒石酸礬 安質玉 六匁 清水適宜ニ和開スル者

吐根新研末 一匁

海葱醋蜜

右和勻シ錠六箇ヲ作り八分時毎ニ一錠ヲ與  
ヘ加密列茶ヲ飲シム

方

酒石酸礬安質五 六分

櫻實水 四分

蜂蜜 半分

右調勻シ一時毎ニ一合匕ヲ服ス

〔坤〕外用ニ由ル

酒石酸礬安質五ハ其誘導分解消散ノ効ヲ標的

トノ之ヲ九ノ諸病ニ外用ノ良効アリ則脳膜焮  
衝癩病百日咳喘息慢性ノ気管支冒寒慢性ノ喉  
頭焮衝胸膜焮衝肺旁癆ヲ質私痛神經痛ヲ痺脊  
髓痛ニ用ヒ又單ニ其局發ノ効ノミヲ以テ之ヲ  
急慢荒蕪ノ潰瘍慢性ノ皮膚病白癩瘡羅斯様焮  
衝諸腺殊ニ乳房ノ焮衝急慢二性ノ關節諸病陰  
囊水腫白腫慢性ノ眼焮衝陰囊焮衝頭瘡癩癩等  
ニ用ヒ又之ヲ慢性麻或ハ其閉止スル者白帶下  
潰瘍瘻瘡等ニ射注シテ効アリ  
用法ハ或ハ溶劑或ハ膏藥時ニ隨テ之ヲ換ムヘ

シ其分量ハ作用ノ劇易ヲ望ムニ由テ大ニ異ナ  
リ通例其効ヲ強クセント欲スル者ハ十五氏至  
三十氏ヲ一考ノ清水或一考ノ豚脂ヲ和シ余ハ  
類推スヘシ○溶劑ハ之ヲ膏菜ニ比スルニ其功  
サレク弱ク燼衝疣疹ヲ發スルコト亦多カラズ  
而ノ汚膩ナキヲ以テ用ヒ易シトス尤ノ法最良  
ナリ

方

酒石酸礬安質王 一考半

蒸餾水 四考

右調和シ患部ヲ洗入

○酒石酸礬安質王中毒救療法

多量ノ水液ヲ以テ胃ヲ充満セシメ羽毛ヲ以テ  
咽喉ヲ刺戟シ之ニ由テ吐ヲ起サ、ル時六櫛皮  
楊皮炭那皮波食子等從テ鞣素ヲ含シテ此菜ヲ  
分解スルノ性アル者ノ煎汁ヲ飲シメ其毒已ニ  
中和性トナラバ即粘滑ノ飲液ヲ與シ食道胃腸  
ノ患害ハ油質剗阿片剗浴湯刺絡等ノ法方ヲ以  
テ之ヲ治メ中毒ノ症全ク退去スルノ後モ尚振

生ヲ嚴ニシ食飲ヲ慎ニ遊運自適シテ身軀ヲ養  
フヲ要ス

酒石酸礬安質王液製劑

第一

催吐劑

催吐酒ハ之ヲ安質王酒ヲ云フ和蘭局方ニ從ヘ  
ハ酒石礬安質王二十四ルヲ上好酒一二ヲ溶  
化スル者ニメ此液一ヲニルノ吐酒石ヲ含ム  
後催吐發汗利尿揚奮ノ効アリ催吐劑トノ皮

疹倭ノ質私冒寒等ニ用ヒ兼テ其發汗祛痰ノ効  
ヲ賞ス吐劑トシテハ小兒及薄弱ノ又ニ妙ナリ  
貴重ノ諸器炊銜様ノ感揚アル者ハ之ヲ用ルヲ  
禁ス

用法ハ催吐心發汗祛痰ノ諸劑トメ一ヲ至四ヲ  
用ヒ小兒ニハ二十滴ヲ用ヒ吐劑トメハ半ヲ  
至一ヲ小兒ニハ一ヲ至二ヲ用フ

第二

發疹膏

吐酒石膏

諾天利膏

和蘭乃方ニ從ヘハ酒石酸礬安質玉一分ヲ家猪  
 脂六分ニ和スル者ナリ激府乃方ニ從ヘハ半ヲ  
 ヲ以テ家猪脂二ツニ和ス是甚強劇ニ過ゾ正ニ  
 前方ヲ以テ良トナスヘシ  
 用法當否ハ上ノ酒石酸礬安質玉ノ外用條下ヲ  
 参考スベシ

七新藥說下卷

大日本

佐渡

・ 凌海司馬津公勲

著

第四編

補血強神解熱之藥

規尼

キニムノキニムノ羅キニ子ノキナソウトノキナロクソウト 茵キニカキニ 独キナキ子法

規尼

キナノキニ子美解熱塩 笈那之塩 笈那之油塩

規尼ハ笈那ヨリ製スル者ナリ此物他ノ諸品聖

葦尼規餒實葦垣等ト相並ンテ笈那樹ノ皮中ニ

炭素

二十 水素

四十

窒素

二十 水

三

在リ以テ其成分ヲナス規那ハ伯刺西里<sup>國</sup>ノ方言解熱ノ藥方ヲ稱ス故ニ取テ以テ之ニ名クト云

規尼ハ灰白ノ樹脂様物ナリ乾白堅固ノ後變メ輕稀ノ粉ボラナシ味甚苦クシテ香臭共ニ無シ水ニ溶解セズ濃精酒及ヒ過的耳ニモ又難シト其量多クンバ則溶解ス紅変シタル青紙ヲ還元シ諸酸ト合スレバ結ンテ一箇ノ晶塩ヲナス規尼ノ強神解熱ノ功ハ卓然至大ニメ百葉ニ變絶シ他ノ諸品一モ其内牆ヲ窺フコト能ハズ然

那皮ノ世間ニ貴稱ヲ得ル所以モ亦此物ノ存在スルニ由ルノミ嗚呼<sup>規尼</sup>幾<sup>規尼</sup>那ハ是萬病ノ寶丹ニメ百葉ノ君玉タルカ尤件ノ所説得テ其聖功ヲ知ルベキノミ

規尼功用利害

返健康作用

返皮膚ニ攪布シテ少シモ變化ヲ生ズルコトナシ若其晶清淨ニメ其量モ亦夥多ナレバ唯少シク之ヲ刺戟スルニ似タリ然レバ皮膚能ノ之ヲ吸収スルヤ否其機微ニシテ見ルコト能ハズ

〔波〕小量一二<sup>ハ</sup>用レバ其苦味ニ由テ口中ヲ判  
戟シテ津液ノ湧出ヲ催進スルノミ別ニ較著ノ  
症状發セズ又或人ハ之ヲ用ヒテ脉搏ヲ添ヘ芫  
汗ヲ促シ神思揚芫スルコトアリト云ヘリハ小  
量ヲ長服スレバ消食ノ機ヲレク不和ヲ覺ヘ胃  
ノ下部ニ温熱疼痛ヲ覺ヘ惡心ヲ芫シ動モスレ  
ハ頭痛眩暈耳鳴寒戟下利嘔吐痧痛悸動等ノ症  
交起ル是規尼ハ消食機及ヒ神至系ヲ侵スモノ  
ニメ其漸積ノ量一時ニ運為レテ以テ此般ノ諸  
症ヲ芫スルナリ

〔正〕大量十六ハ至ニ用ユレバ初先口喉胃腸ニ局  
処ノ作用ヲ起ス即咽喉乾燥メ緊約セララルカ  
如ク胃部ニ燻カ如キ疼痛ヲ覺エ嘔吐下利シ全  
身熱ヲ芫シ漸クニシテ患者衰弱ヲ覺エ憎寒シ  
視聽共ニ衰エ上ニ記スル所ノ頭痛眩暈苦悶耳  
鳴寒戟悸動等ノ諸症陸續トメ次キ来リ其症恰  
ナ醉毒ニ中ルカ如ク瞳孔縮少シ或ハ散大シ思  
慮混乱シ謔語ヲ芫シテ狂躁シ或ハ昏睡シテ前  
後ヲ省セズ隨意ノ運動ヲ為ス不能ハズ筋肉震  
惕シ皮膚知覺ヲ失ヒ寒冷トナリ脉弱不同ヲナ



レ動モスレバ耳聾眼昏テ痺等ヲ遺スト至此迄  
大抵二三時ニテ止ム〇極大量ニ  
レハ精力一次ニ沈衰レ眼昏黒ニメ物ヲ見ル  
能ワズ瞳孔散大レ昏睡死セルカ如ク或ハ隨意  
ノ運動ヲ為スレ能ワズ遂ニ搐掣ニ由テ斃ル〇  
死後屍ヲ開テ是ヲ驗レハ其内部ノ変革テ辟毒  
ニ中テ死スル者ノ如ク而メ血質変メ闇黒ト為  
リ凝固セスメ流動ス

〔地〕醫治功用

〔以〕酸敗液飲食不消化胃皖痛等ニ規尼効アリ

〔豆〕血液貧乏ニシテ水質ヲ含ム者及此ヨリ發ス  
ル諸病萎病失苟兎陪苦經久ノ脱血下水腫殊  
ニ其間歇熱後ニ發スル者虚脱ノ人痛風ヲ患ル  
者ニ効アリ

〔波〕佝僂病癩癩殊ニ其勞熱ヲ魚ル者惡性ノ流行  
病赤斑熱痘瘡黃病疫熱ニ効アリ

〔仁〕亞細亞霍乱ニ神効アリ最其初起病熱猖獗ニ  
シテ進速ナルヲ一次ニ頓挫スルニ至テハ實ニ  
百葉無比ト稱スヘシ蓋三十年前ハ世界一般ノ  
疾病悉ク燼衝性ヲ帯タリ故ニ大抵ハ消炎ノ療

法ヲ用ヒ此病モ亦刺絡下刺等モ用ヒタレ凡今  
ヤ一般ノ病性悉ク神系統ニ關係セリ規尼ノ能  
ク此病ニ効アルハ又此理ニ由ル蓋此病ハ脊髄  
系統刺戟ノ大甚ニ起因スレハナリ然ルニ世醫  
動モスレバ此病ニ刺絡ヲ施シ吐下方ヲ行ヒ扶  
氏ノ遺方ヲ稱シテ以テ患者ヲ万一ニ救ハント  
欲ス何ゾ時變ヲ察セズシテ旧套ニ拘泥スルコ  
ト斯ノ如ク甚シキヤ我師蘭時先生ノ言ニ曰世  
唯克ノ扶氏ノ術ヲ施スヲ知テ而シテ却テ其心  
ヲ求ルコトヲ知ラスト悲ヒカナ

**保** 虚脱ノ人梅毒ヲ患テ經久トナル者殊ニ其勞  
熱ヲ兼ル者經久ノテ痺病脊髄病尋常ノ脱疽病  
院脱疽等ニ効アリ

**邊** 肺勞消渴病粘液流出病気管支ノ胃寒等分泌  
排泄ノ機大ニ亢盛ニ過ル者ニ効アリ

**登** 殺菌劑トメ腸炎ニ用ヒ殊ニ其ヨリ獲スル胃  
寒様諸病ニ効アリ

**知** 規尼ノ間歇熱神經熱瘧疾神經性諸病麻痺  
諸病ニ効アルハ其作用全ク一種固有ニメ克ク  
洞悉スルコト能ハズト虽精細ニ之ヲ考察スレバ

其病間歇ノ性アリ時日ヲ進テ未止スレバ規尼ノ効愈強シ今正ニ左ニ一二ノ病症ヲ列挙セントス

〔不〕間歇熱 規尼ノ此病ニ於ルハ無畏安行百發百中ニメ之ヲ捨テ又外ニ求ムヘキノ品ナシ〇病ニ規尼ヲ用ルハ正ニ其先熱ニ於テスヘシ是レ一凡ノ規則ナリ然レニ又一二此例ニ從フヘカラサルノ復件アリ則炎熱ノ諸國天ノ零露腐陳ノ大氣ニ由テ發スル所ノ惡性熱ニ在テハ其一發作アラシメハ患者ノ性命モ亦保全スヘカラ

サル等危篤ノ症狀アル者ハ其發熱時ニ於テ大量ノ規尼ヲ相次テ用ヒ以テ其熱ヲ截斷スヘシ〇規尼ハ突ニ此病ニ効アリト云フ之ヲ施用スルニ當テハ能ク注意シテ合併ノ諸症ヲ臧却シ而ル後其變ヲ行フヘシ殊ニ内部ノ貴要機器ニ燬衝克血刺衝機旺盛等ノ候アリ或ハ腸胃汚物ノ諸症アル者ハ瀉ノ預之ヲ除去セシムルハアルベカラズアル云ト云又其合併諸症ニモ亦能ク眼目ヲ注ギ精細ニ考察スルヲ以テ醫家ノ一大肯綮トス其故ハ吐下滌除ノ藥劑ヲ投スルト云其合

併症更ニ減退セズ規居ヲ施用スルニ当テ本病  
ト共ニ脱然トノ消散スルコト屢之アレハナリ○  
間歇熱ニ多ク後發スル所ノ肝脾ノ厚大ハ規居  
ヲ用ヒテ良効アリグロ<sup>リ</sup>名ノ説ニ曰子嘗テ此  
症ニ十五<sup>分</sup>ノ規居ヲ一次ニ用ヒ三分時過ル後  
其厚大ノ減却スルヲ以テ著シク知ルベキニ  
至レリト○間歇熱ニ規居ヲ用ルハ諸説紛々ト  
ノ一定セスト亟要スルニ舌苔胃部胸腹等ノ症  
ニ逆フテ之ヲ停ルコトナカルヘシ時トシテハ  
或那皮規居ニ勝ルコトアリト亟是只胃部ノ知覺

機格別ニ充進スルノ時ニアルノニ蓋此時ニ在  
テハ或那皮モ亦害ナレトセズ  
口諸般ノ間歇性ノ神經諸病至痛症寧心悸動  
寒性往來及喘息呼吸困難等ノ間歇性ヲ挟ム者  
ニ規居ヲ用ヒテ効アリ是此般ノ諸病多クハ皆  
髓系統刺衝ヲ受ルニ由レハナリ○(八)刺戟及ヒ  
血液蓄積ノ諸病加之諸部ノ刺衝出血病等ノ間  
歇熱性ヲ挟ム者或ハ時日ヲ定メテ調整ニ發歇  
セル者或ハ神經系統ノ官能甚シク障礙ヲ受ル  
精力一次ニ沈降シ症寧疼痛並ヒ起ル者ニ効アリ

リ故ニ其効ヲ擡メテ之ヲ腦炊衝肺炊衝義膜咽  
喉炊衝眼炊衝咳血皮表ノ疼痛等ニ用ヒテ良ナ  
リ(三)他ノ神經諸病其間歇性ノ有無ニ関セズ總  
テ脊髓ノ刺戟ニ因テ發スル者癩痢舞踏病百日  
咳咽喉症等ノ痺不遂筋ノ痙攣索縮喘息呼吸苦  
悶及心臓器械ノ損缺ニ由テ生スル所ノ諸病ニ  
効アリト稱ス然レモ此等ノ病ニ現居ノ良効ア  
リシ經驗モ亦多ケレハ吾人未<sub>レ</sub>之ヲ信スルコト能  
ハス若<sub>レ</sub>此ノ如キ病症ニ逢ハバ正ニ之ヲ試ルヘ  
キノミ(本)傳テ質斯痛風等間歇性ノ發汗アル者

衰弱纖維系液体質ノ人ニ發スル慢性ノ炊衝様  
諸病癩瘰癧性ノ眼炊衝瘰癧テ後残留スル所ノ疼痛  
ニ大効アリ神經熱及其般ノ諸病ニハ強壯劑ト  
シ之ヲ只其末期ニ用ユルノミラス又其初期病  
未<sub>レ</sub>十分ニ發達セルニ解熱劑トノ殊効アリ特<sub>ニ</sub>其  
ノミナラス一丸ノ解熱血管系ノ刺戟甚<sub>シ</sub>カラス  
而<sub>レ</sub>其<sup>人</sup>又衰弱セル者ハ之ヲ病ノ初期ニ用ヒテ  
其熱ヲ掃フコト實ニ響ノ喜ニ應スルカ如シ  
夫<sub>レ</sub>現居ハ然<sub>レ</sub>那皮ノ中ニ在ッテ他ノ諸品ト共ニ  
其成分ヲ成ス者ナレバ其効モ亦然<sub>レ</sub>那ノ如クナ

ルハシ然<sup>ル</sup>人<sup>モ</sup>特<sup>ニ</sup>此品ヲ貴<sup>シ</sup>テ其効規<sup>レ</sup>那ノ上ニアリ  
トナスハ実ニ見<sup>ル</sup>所アリトナス如何トナレハ  
規<sup>レ</sup>屈ハ之ヲ用ヒテ胃ヲ損スルコト然<sup>レ</sup>ヨリ少  
ク小量ヲ用ヒテ然<sup>レ</sup>那ノ大量ヨリモ其効強ク規  
屈ノ一二ハ能ク然<sup>レ</sup>那皮ノ五六多ク當<sup>レ</sup>ハナリ  
尚且是ノミナラス其解熱強壯ノ効ヲ以テ神經  
系統ヲ鎮降シ血行ヲ押沈シ寒熱ヲ變調スル等  
ハ實ニ然<sup>レ</sup>那皮ノ及<sup>フ</sup>所ニアラストス  
又規<sup>レ</sup>屈用<sup>フ</sup>ヘカラスナルノ症

規<sup>レ</sup>屈ノ用否ハ己ニ之ヲ其諸症ニ就テ論セリト  
雖尚反復ノ之ヲ云ハハ總テ在<sup>ル</sup>件ノ諸症ハ皆之  
ヲ用<sup>フ</sup>ヘカラストス<sup>ル</sup>以<sup>テ</sup>消食機<sup>械</sup>ノ刺戟<sup>シ</sup>然<sup>レ</sup>衝  
及<sup>シ</sup>其缺損アル者ハ規<sup>レ</sup>屈ヲ用<sup>フ</sup>ヘカラス<sup>ル</sup>且<sup>ニ</sup>腹内  
諸器ノ真<sup>ニ</sup>然<sup>レ</sup>衝熱病<sup>ニ</sup>然<sup>レ</sup>衝性ヲ挾<sup>ム</sup>者腸ニ潰瘍<sup>アリ</sup>  
ル者惡液<sup>ニ</sup>家ニ費スル熱病<sup>及</sup>其大衰弱<sup>ニ</sup>虚脱ノ又ニ  
費スル者ハ規<sup>レ</sup>屈ヲ用<sup>ル</sup>ヲ禁<sup>ス</sup>ス<sup>ル</sup>波<sup>ニ</sup>急性<sup>ニ</sup>天行ノ瘡  
疹病<sup>中</sup>濃液ヲ交<sup>ル</sup>者産婦ニ費スル然<sup>レ</sup>衝病<sup>神</sup>  
至<sup>ノ</sup>知覺<sup>非常</sup>ニ敏捷ナル者内臟ノ閉塞<sup>或</sup>ハ硬  
徑<sup>腫</sup>ノ徑年<sup>頑固</sup>ナル者等ニハ規<sup>レ</sup>屈用<sup>フ</sup>ヘカラ

ス尚其他ノ禁忌ノ如キハ健康作用ニ治功ヲ  
参考シテ医家宜ク高量スヘシ  
外用ニハ規屈ヲ用ルノ地甚多シ唯其病障碍ア  
リテ内葉ヲ用ヘカラサル者ニ灌腸割トシ或ハ  
内皮法トシテ其汎發ノ功ヲ達セシムルノミ  
夫規屈ハ其使用ノ標的ニ從テ各分量ヲ別ニセ  
サルヘカラス故ニ通常之ヲ以テ強壯ノ功ヲ取  
ント欲セハ四匁至六匁ヲ全日ノ量トス然レ凡  
單ニ之強壯割トシ用ルハ稀ナリトス間歇熱ニ  
ハ免熱時ニ於テ十二匁至十四匁ヲ用ヒ惡性危

割ノ者ハ免熱時ト發熱時トニ論勿ク一考或ハ  
高多量ヲ用ヒテ以テ性命ヲ救フヘシ觀今關節  
痿テ負私心囊焮衝及ヒ其余ノ神王諸病ニ半ヲ  
至一ヲ用ル者アリ然レ凡此方甚危シ用ルニ  
是ラス○規屈ハ之ヲ溶割トシ用レハ通常其功  
確ニノ且速ナリ丸散ニ勝ルユト雙ニ遠シ故ニ  
之ヲ溶割トスルヲ良トス然レ又症ニ從テ丸散  
割ヲ作ラヘカラサルノ地アリ然ルトキハ桂椒  
芎藭根龍腦阿片炭酸鉄ヲ配シ用フ其苦味ヲ減  
ズルニハ白糖ハ少モ効ナシ唯茴香鱈草等ノ香

竈菜ヲ一盞ノ濃煎膏喜或ハ濃煎菜ニ浸シ規斤  
ヲ服スルノ前後ニ之ヲ飲シメ且之ヲ以テ含漱  
セシムハ是是苦味ヲ除クノ最良法ナリ○亞細  
亞霍亂所謂虎ニハ唯其用法ノ善惡ニ由テ病ノ  
治不治ヲ致スナレハ能ク之ヲ斟酌高章スルハ  
蓋其人ニ存スルノニ然レニ通例三十人ノ量ヲ  
二時間ニ服シ盡サシムトルヲ以テ定規トナ  
ス若此量ヲ服シ盡シテ其病抗拒ノ良機ヲ見ハ  
サレハ是其症大抵危篤ナリトス故ニ規斤ノ量  
一日ニレテ六十人己下ヲ用フヘシ去年七八月

此病再大ニ崎嶼ニ流行シ災注衛ニ充ツ當時ノ  
鎮府岡部某君惻然ノ至ニ堪ヘス我師蘭晴先生  
ニ謀テ和蘭ノ教師海兵部医官兼日本地方究理  
總裁官朋百氏ニ諮詢シ医局ヲ開ヒテ大ニ病者  
ニ賑給ス規斤ヲ賣スコト五十瓶但一瓶一治ヲ  
仰クコト殆千人ニ及ヘリ而メ其中死スル者僅  
ニ十分ノ二ニ足ラス傳ヘテ以テ羨談トナスト  
云今爰ニ医局ニ於テ當日用ル所ノ方藥數款ヲ  
記シテ以テ異日ノ考証ニ備フ其方昂ク左ノ如シ

第一方



硫酸規片 十二片

出根 五片

葛粉 適宜

右研和シ四包ニ分テ我ニ時間ニ服シ盡サシム  
輕易ノ症ハ此散ヲ用ヒテ足リトス

第二方

硫酸規片 一及

阿芙蓉液 三十滴

忽布滿鎮痛液 三十滴

清水 一及半

右混合シ尋常ノ症ニハ此液四十滴至六十滴  
ヲ米麦ノ煮汁一盞ニ和シ半<sup>時</sup>毎ニ服サシム

第三方

硫酸規片 一及

甘汞 三片

醋酸莫非涅 <sup>四片</sup> 一或 <sup>半片</sup> 硫酸莫非涅

右散ト為シ四包ニ分テ我ニ時間ニ服シ盡サ  
シム

第四方

硫酸規片 三十八

龍腦

忽布滿鎮痛液 三十滴

上好大酒 五勺

右研和シ半時毎ニ三十滴至四十滴ヲ米麦ノ  
煮汁ニ和シテ之ヲ服サシム

業ニ既ニ之ヲ醫治功用ノ條ニ論スルカ如ク規  
屈ハ百般ノ諸病ニ於テ其用甚キ廣汎ナルカ  
故ニ悉ク其用法分量ヲ舉ルノ能ハス唯時ニ  
臨ンテ人能高量スヘキノニ若シ之ヲ溶劑ニ  
シテ用ント欲セハ須ク忽布滿鎮痛液若ハ上

好ノ大酒及少許ノ硫酸ニ溶シ而メ後之ヲ茶液  
ニ和入スヘシ胃ノ知覺敏捷ナル者ハ屢之ニ阿  
芙蓉或ハ苦扁桃ヲ加フ爰ニ西洋諸哲ノ良方數  
件ヲ舉ク賢良ノ君子之ニ由テ以テ其他ヲ類推  
メ可ナリ

方

硫酸規屈 二十勺

阿片 十勺

香竄茶末 三勺

右研和シ散ト為シ十包ニ分テ間歇熱ノ免熱

時ニ一包ヲ與フ

方

塩酸規庄 半斤

蜀葵根末 一斤半

蒲公英越笈斯 適宜

右研和シ六十丸ヲ作り二九至四九ツハ一日

數次用フ之ヲ丸割ニ製スルニハ其苦味ヲ避

ンカ為メナリ

方

硫酸規庄 一及

甘硝石精 十二滴

薄荷水 四斤

茴香糖油 一及

右研合シ一時毎ニ二食セテ服ス

方

硫酸規庄 十二斤

酒石酸 五斤

桂露 四斤

枸橼汁舍利別 一及半

右研合シ一時毎ニ一食セテ用フ

方

塩酸規庄 一及

丁子新研末

・ 茴香新研末 各一及

右研合シ散ト為シテ十包ニ分チ免熱時ニ於テ一包ヲ一七ノ上好酒ニ和シ一時毎ニ用フ

方

硫酸規庄 半及

収歛過的兒 半及

薄荷水

桂露 各二及半

右調勻シ一時半毎ニ二食七ヲ與ヘテ間歇熱ノ衰耗脱汗ヲ覆スル者ニ良効アリ

方

硫酸規庄 半及

阿片 一及

加密列花末 一及

蒲公英越炭斯 適宜

右研合シ九トナシテ六十九ニ分チ一時半毎ニ四九ヲ與フ

塩酸規尺 十二分

忽布滿鎮痛液

薄荷水 半分

香竈丁 三分

右研合之 一時半 每一茶匙用之

方

硫酸規尺 三十分

阿片 三分

甘草末 十分

右研和之 散トナシテ 十包ニ分チ 一時毎ニ一

包ヲ與フ 是知蘭首府ノ大學頭コベイ氏ノ方

ニノ劑甚ノ眼炊衝 牙謂 神經性ヲ帶ヒテ其痛

間歇アル者ニ神効アリ

方

硫酸規尺 十分

収斂過<sup>仰</sup>的耳 六滴

亞刺納<sup>仰</sup>膠 一分半

微湯温 六分

右混和シ 二灌腸 刻ト為ス

規尺各般ノ製劑

第一

單純規尺

キニユム、ゲユリユムノギニテ、プユウノヒダラス、キニユム、ソイフル、キニユム

炭素<sup>二</sup> 水素<sup>二</sup> 窒素<sup>二</sup> 酸素<sup>二</sup> 水<sup>三</sup>

白色無臭ノ塩ナリ水ニ溶シ難ク酒精及<sup>レ</sup>過<sup>レ</sup>的耳  
ニ溶解ス色茶ニ供スルコト甚<sup>ク</sup>シ唯<sup>ニ</sup>苦味<sup>精</sup>微ナ  
ルヲ以テ時トシテ之ヲ小兒ニ用ルノミ

第二

硫酸規尺

シエルハス、キニユム、バシキユスノキニユム、シエルフユリキスノシエルハス  
トニニシエルハス、ビキニユム、スワフルシエルキニ子ノハセス、スワフル  
シエル、キニ子、菌

〔炭素<sup>四</sup> 水素<sup>八</sup> 窒素<sup>四</sup> 酸素<sup>四</sup> 硫酸<sup>一</sup> 水<sup>八</sup>〕

雪白珠鬚針状ノ小晶塩ナリ香臭共ニナク味甚<sup>ク</sup>  
苦ク日光ニ当ツテ褐色ニ変シ紅変ノ青紙ヲ還元  
スルコト能ハス七百四十倍ノ冷水三十倍ノ温  
湯ニ漸ク溶解シ濃精酒ニハ克<sup>ク</sup>ノ溶解シ過<sup>レ</sup>的耳  
ニハ溶解スレトモ其量甚<sup>ク</sup>ナレテ許<sup>レ</sup>ノ酸<sup>二</sup>硫<sup>一</sup>ヲ  
加<sup>レ</sup>レハ之ニ由テ其中性ニナリテ冷水ニ克<sup>ク</sup>ノ  
溶解ス此塩ハ他ノ規尺諸塩ニ比スルニ其効出  
群ニテ一モ之ニ代<sup>ル</sup>ル品ナシ故ニ色家ノ之ヲ  
用ルコト又夥<sup>ク</sup>ナルヲ以テ勅モスレハ西國ノ

灰高他ノ概里有涅硝砂澱粉若土等ヲ以テ之ヲ  
 質造シ以テ高利ヲ貪ル者アリト云  
 須<sup>シ</sup>岩<sup>ハ</sup>羅<sup>コ</sup>西<sup>ス</sup>人<sup>ノ</sup>此<sup>ノ</sup>塩<sup>ヲ</sup>用ルノ一新法ヲ製メ之ヲ以  
 テ其速達正大ノ功更ニ内服ニ優ルコトヲ稱セ  
 リ即<sup>チ</sup>其法ハ此塩一ハ<sup>ハ</sup>硫酸過<sup>ク</sup>的<sup>ニ</sup>耳一及ニ溶解  
 シ筆毛ヲ以テ之ヲ齒齦頰内咽喉ニ塗擦ス此ノ  
 如クスレハ其甚味ニ由テ劇盛ノ流涎ヲ費シ之  
 ニ由テ骨髓ニ其効ヲ達シ以テ間歇熱神經熱病  
 ホニ大効アルコト実ニ其半<sup>ノ</sup>量ヲ内服スル  
 ニ優レリト云

第三

塩酸規正

キニユル、ミエリアチクエリノミユリアス、キニミのビドロ、コロラス、キニミ  
 のキニユル、ビドロ、コロラチエリノ 羅 コアルウトルストフシエールキニチのゼノソト  
 シエールキニチ 蘭

〔炭素<sup>早</sup> 水素<sup>四十</sup> 窒素<sup>四</sup> 酸素<sup>四</sup> 塩酸<sup>四</sup> 水<sup>三</sup>〕  
 白色針状ノ小晶塩ナリ味甚<sup>ク</sup>苦ク三十倍<sup>ノ</sup>濃精  
 酒ニ漸ク溶解シ熱湯ニハ克ク溶解シ冷水ニハ  
 前者ヨリハ克ク溶解ス  
 此塩ハ其功前者ノ如ク廣カラスト虽<sup>モ</sup>揮發利尿  
 ノ傍効アリ且<sup>ニ</sup>胃ヲ害スルコト甚カラサルヲ以  
 テ大量ノ規<sup>ニ</sup>用ント歎スルノ地ニ能ク適應

ス然レ凡其効別ニ異ナルニ非ズ

第四

硝酸規尺

ニトラス、キニキユス〇キニユム、エトリキユム 羅  
サルバートルスユールキニ子 蘭

第五

燐酸規尺

ホサス、キニキユス〇キニユム、  
ホスホルシエールキニ子 蘭  
ホスホルキニ子 羅

第六

砒酸規尺

アルセナス、キニキユス〇キニユム、アルセニコシユム 羅  
アルセキニユールキニ子 蘭

第七

次類規尺

ビドロヨツス、キニキユス〇キニユム、ビドロヨダキユム 羅  
ヨードキニ子 蘭

第八

青酸規尺

ビドロシアナス、キニキユス〇キニユム、ビドロシアナキユム 羅  
ブラウシエールキニ子 蘭

第九

鉄加青酸規尺

ビドロ五ルロシアナス、キニキユス〇キニユム、ビドロ、フェルロ、シア  
ニキユム 羅  
エイゼル、ブラウシエールキニ子 蘭

第十

枸橼酸規尺

シトラス、キニキユス〇キニキユム、シットトリキユム 羅  
シットルシエールキニ子 蘭

第十一

鉄加枸橼酸規尺

フェルロ、ビドロ、シトラス、キニキユス 羅  
エイゼル、シットルシエールキニ子 蘭

第十二

醋酸規尺

アセタス、キニキユス〇キニユム、アセチキユム 羅  
アセチシエールキニ子 蘭

第十三



緬草酸規尾

ハリアナス、キニキエス〇キニエム、ハリアニキエム 羅  
ハリアニシエール、キニ子 蘭

第十四

酒石酸規尾

タルツラス、キニキエス〇キニエム、タルツリキエム 羅  
ウエイニステーションシエールキニ子 蘭

第十五

規尾酸規尾

キニス、キニキエス〇キニエム、キニキエム 羅  
キニ子シエール、キニ子 蘭

第十六

鞣酸規尾

タニナス、キニ子エス〇キニエム、タニニキエム 羅  
ローイシエール、キニ子 蘭

第十七

乳酸規尾

ラクタス、キニキエス〇キニエム、ラクリキエム 羅  
ノルクシエール、キニ子 蘭

第十八

蟻酸規尾

フォルミカス、キニキエス〇キニエム、フォルミキエム 羅  
ミレンシエールキニ子 蘭

右件ノ如ク規尾ノ製創數般ニノ或ハ其各異ノ  
功用ヲ稱スル者アリトモ是皆<sup>今</sup>輓近新奇ノ流弊  
ニノ此中至茶ニ供スハキ者ハ特リ硫酸塩<sup>酸</sup>ハ二  
品ノニ其余ハ繁刺無益ノ品ニシテ皆其代ル  
ヘキ此ノ如キ刺茶ノ新奇ニ出テ实用ニ適セザ  
ルハ予既ニ之ヲ沃顛ノ條ニ論セリ茶室ノ美觀  
茶室<sup>入</sup>豈<sup>道</sup>ノ本首ナランヤ夫<sup>大</sup>試ニ思<sup>ハ</sup>此  
証塩ノ有功最ニノ成力ハ實ニ何ナル者ナル  
ヲ硫酸塩酸ノ両塩モ亦規尾ヲ以テ其成分ト為

スニ非ヤ然ラハ則此兩塩モ其効又他塩ノ如ク  
ナラサランヤ新説ニ感溺シテ設ニ多品ヲ募召  
スルコトナクンバ則可ナラン

附録

撒里質

白色小針狀ノ晶体ナリ味極ノテ苦シ二十二  
陪ノ冷水半陪ノ温湯三十陪ノ濃精酒ニ能ク  
溶解ス此物水楊樹ノ皮中ニアリ以テ其成分  
ヲ為ス撒里斯ハ羅甸ノ語ニシテ水楊樹ヲ云

故ニ資テ以テ名クトム文化八年西國紀元千八

洪且名初メテ之ヲ檢出シ後三年ヲ經テ列羅斯

人名之ヲ精製シ以テ医薬ニ供セシヨリ尔来其用

漸ク廣ク動モスレバ之ヲ以テ其解熱ノ功規居

ニ勝ルノ説ヲ唱フル者アリ蓋其功實ニ此ノ如

ニ至ラザルモ規居ノ統那皮ニ出ルガ如キ外國

遠来ノ品ナレバ偶其缺乏ニアワザルコト能ハ

ス水楊樹ノ如キハ各國各處之ナキノ地ナシ人

々得テ以撒里質ヲ製スヘケレバ其益蓋大ナリ

トス是附録ノ由テ起ル所以ナリ

撒里賓ノ健康作用ハ未<sup>ク</sup>詳<sup>カ</sup>ナラスト多<sup>ク</sup>色<sup>々</sup>茶トシ  
テハ從テ規<sup>レ</sup>屈<sup>ク</sup>用<sup>フ</sup>ヘキノ病ハ皆撒里賓ノ的  
疾ナリ而<sup>シテ</sup>規<sup>レ</sup>屈<sup>ク</sup>ノ如ク血管系統ヲ刺戟セ<sup>ル</sup>又  
胃ヲ害スルコトナシ此茶ヲ以テ規<sup>レ</sup>屈<sup>ク</sup>ニ優<sup>レ</sup>リ  
トナスハ之カ為<sup>ル</sup>ノ故ニ間歇熱殊ニ其粘液質  
ノ入惡液家衰弱ノ人及ビ屢<sup>ク</sup>之ニ再臨スルノ癩  
アル人ニ發スル者間歇性ノ神經病及ビ神經痛  
飲食不消化慢性ノ下利氣管支及ビ其余ノ粘液  
膜ノ寒冒諸症腸胃肺等諸器ノ粘液膜ノ衰弱諸  
病呼吸器ノ痙攣性諸病百日咳喘息粘液熱姜黃

病白帶下瘰癧性ノ眼焮衝等ニ撒里賓ヲ用ヒテ  
効アリ慢性恒久ノ痲疾時日ヲ玩愒シテ瘥ヘサ  
ル者及ビ白帶下等ノ諸症ニ良ナリ俱此症ニハ一  
日三回ヲ内服セシメ一及ビ清水一盞ニ和メ  
射法割トナス是<sup>レ</sup>輒今ノ發明方ナリ  
用法ハ間歇熱ニハ四回至十回ヲ一日數次反復  
シテ用ヒ他ノ諸病ニハ一回至三回ヲ數次反復  
シ又瘥ニ從テ一二回ヲ全日ノ量トナスコトアリ  
散劑ヲ最良トス規<sup>レ</sup>屈<sup>ク</sup>ノ條ニ列挙セル諸茶ヲ  
配シテ之ヲ用ユヘシ又或ハ溶劑ト為スコトアリ

方

撒里須 四分

塩酸規尾 半分

苗香水 十五分

右研和シテ散トナシ十包ニ分テ一時半毎ニ一

包ヲ服サシム

方

撒里須 半分

龍胆根新研末

黒椒末 半分

加密列越幾斯 適宜

右研和シテ丸ト為シ百丸ヲ作り一時半毎ニ六

丸至八九ツ與ハ服後薄荷茶ヲ飲マシム間歇熱

ニ良効アリ

第五編

驅蟲滌腸之藥

珊多尼

サントニニエハ〇キニエハ〇キニエハ、アシナヘルシシカ  
サトニ子〇サトニ子〇ウラルサトニ子  
サトニ子〇キニ子〇ズウオットルサトニ子  
ウラルサトニ子 粗 サルテ、セノ子法

〔炭素<sup>五</sup> 水素<sup>六</sup> 酸素<sup>一</sup>〕

此薬ハ雪白晶体ノ塩ニシテ光輝アリ之ヲ焚ケ  
ハ青焰ヲ發ス香臭更ニナク口ニ入テ微苦ヲ覺  
ヘ異重ハ一又二四七ニ同シク水ニ溶解セズ温  
湯ニモ亦難シ濃精油過的耳及ヒ脂油ニハ容易  
ニ溶化ス光輝ニ逢テ黄色ニ変ス故ニ黒紙ヲ糊

包シタル瓶中ニ貯フヘシ加列耳名初メテ之ヲ  
セメシ子ノ中ニ得タリ尔来之ヲ製シテ以テ  
芭葉ニ供ス此物珊東ハ都兒其及意大利ノ  
諸神聖ヲ称ス此物驅蟲ノ効神ノ如キヲ以テ資  
テ之ニ名ソト云珊多屈ハセメシ子驅蟲ノ一  
成分ナリ膠、塩、油等ト共ニ其中ニ在リ石灰及酒  
精ヲ以テ之ヲ蒸餾スルニ由テ今ルセメシ子  
ハ百耳西亞小亞細亞ニ産スル一種ノ草樹アル  
テシニコントラ或ハ「フリアナ」ノ小花実ナリ古  
来之ヲ驅蟲ノ良薬トメ称譽スルコト廣ク殊ニ

殊ニ皇國ニ於ル如キ之ヲ驅蟲薬品ノ首長ト  
メ誤用スルコトモ亦多カリ夫此花実ハ其驅蟲  
ノ効実ニ良ナラサルニ非レ厄烏斯多耳梭氏ハ  
之ヲ衝動揮芬ノ薬劑ニ列スルカ如ク其性衝動  
刺戟メ安ク之ヲ投スルコト得ス且尺嘔吐發ス  
ヘキ一種不佳ノ氣アリテ患者之ヲ嫌忌スルコ  
ト多ク殊ニ小兒ニ至テハ断テ之ヲ服シ得サル者  
モ亦之アリ故ニ諸家先生名西心ヲ焦シテ之カ  
為ニ簡易ノ良方ヲ求メ或ハ越發斯ヲ製シ或ハ  
錠圓ヲ作り以其好所ニ從ルト至未一モ適用有

用ノ製方アルコト聞カス輒今珊寫屈出テヨリ  
其量少クシテ其功却テ強シ更ニ兼葑ノ衝動性  
ナク無味無臭ニメ不辨皂白ノ小兒モ亦能ク之  
ヲ服スヘク從前ノ諸菜ノ如キ莫然トノ其名ヲ  
聞クコトナキニ至ル亦吾道ノ一大快事ナラスヤ

珊寫屈功用利害

珊寫屈ノ作用健康体上ニ見ハル、者ハ未<sup>レ</sup>之シ  
洞悉スルコト詳明ナラス故ニ示記シテ以テ定規  
ニ備フヘカラス然レ凡其能平常多葑ノ者ヲ奉  
ク之ヲ謂ヘハ大約左ノ如シ小量及中度ノ量ハ



之ヲ用ルモ絶テ変状<sup>状</sup>ヲ見ハスコトナシ若極大量  
シ用レハ惡心嘔吐苦悶<sup>痛</sup>ヲ發シ消食機ヲ刺  
戟スルコト極メテ甚ク血ヲ交エタル大便ヲ下シ  
腸<sup>腸</sup>熾<sup>熾</sup>衝<sup>衝</sup>眩<sup>眩</sup>暈<sup>暈</sup>テ醉<sup>醉</sup>症<sup>症</sup>等<sup>等</sup>搗<sup>搗</sup>學<sup>學</sup>謔<sup>謔</sup>長<sup>長</sup>等<sup>等</sup>ノ症<sup>症</sup>續<sup>續</sup>キ起<sup>起</sup>ル  
割<sup>割</sup>西<sup>西</sup>涅<sup>涅</sup>耳<sup>耳</sup>琪<sup>琪</sup>琳<sup>琳</sup>斯<sup>斯</sup>并<sup>并</sup>傑<sup>傑</sup>兒<sup>兒</sup>ノ輩<sup>輩</sup>ハ唯<sup>唯</sup>十二<sup>十二</sup>凡<sup>凡</sup>ノ  
珊寫屈ヲ以テ此般ノ諸症ヲ發スルヲ見シト云  
然レ凡是甚疑フヘシ若果ノ然ラハ是其製清淨  
ナラスレテステリシニ子ヲ含ミシ者ナラシ  
珊寫屈ハ腸蟲殊ニ蛔蟲ヲ驅逐スルノ神効アリ  
之ヲ用テ其病実ニ蛔蟲アル者ハ後急必之ヲ滌



蕩ス故ニ病ノ烟炎ニ起因セル者ニ之ヲ用ルノ  
ミナラス又他ノ病疾疑決シ難キ者或ハ原因已  
ニ除クト虫腸炎アリテ其痊癒ヲ妨ル者ニ用ヒ  
テ其有無ヲ試ムハシ實ニ奏功確切ニメ什麼ノ  
病疾ニテモ其當否ヲ弁スルニ及ハストス又或  
ハ之ヲ間歇熱ニ用ヒテ良功アリト云或ハ發汗  
劑トシ用ヒテ殊功アリト稱ス  
用法ハ小兒ハ三匁至四匁 中又ハ六匁大人ハ八  
匁白糖ニ和シテ散トシ一日ニ服盡ス或ハ間  
又甘糸ヲ配スルコトアリ



方

珊多尼 十二匁

白糖 三匁

右件和シ分ツテ六包トナシ朝夕各一包ヲ服  
サシム

珊多尼ヲ**茂**麻或ハ阿利布油ニ和シ用フルハ頗  
良方ナリト毎時ニ由テハ亦効ナキコトアリ小兒  
ニハ正ニ之ヲ糖菜ニ製シ以テ之ヲ用フヘシ  
珊多尼ノ驅蟲ノ効ハ斯ノ如ク較著ニメ確實ナ  
ト糸若腸中ニ條蟲寸白ノ存スルニ逢ヘハ決





レテ之ヲ驅ルコト能ハス解外ニ在テ之ヲ驗ス  
ルニ一盃ニ研多居ノ溶水ヲ盛リ此中ニ諸種ノ  
腸虫ヲ投スルニ蛔虫、直チニ死シ他ノ諸虫モ又漸  
々ニ死ス其死セサル者ハ特リ條虫ノ遊泳依  
然トノ更ニ某<sup>液</sup>ヲ畏レズ研多居ノ量ヲ増多ス  
ルモ亦然リ故ニ研多居ハ能ク諸虫ヲ殺スト多  
特リ條虫ヲ殺ス能ハサルコト明カナリ嗚呼此神  
聖特一ノ驅虫ノ良薬特リ條虫ヲ殺スト能ハサ  
ル者如何ソヤ夫百能ク以テ一物ニ付スルヲ欲  
セサル予予正ニ他ノ條虫ニ神効アルニ某ノ附

載セントス石榴根皮昂ク是ナリ

附録

石榴根皮

コルテキス、ラチキス、ガラチチ、セウ、ガラチトリユー  
ガラチトリウラトルバスト 蘭 ガラチトリウエルセルバスト 独  
ハリス、デ、ラチチ、ガラチチル法、ボノガラチトリトス

〔蘆素 脂油 澱粉〕

石榴樹ハ実樹根共ニ薬用ニ供スト根皮最モ有  
カト為ス園生ノ者ハ野生ノ者ヨリ其功頗<sup>弱</sup>カ  
又、皇國ノ産ハ之ヲ西國ノ産ニ比スレハ其力  
最モ強ク西國産ノ新皮以テ皇國産ノ乾皮ニ當リ  
ハシ天此良木ヲ 皇國ニ産セシムルハ之ニ至  
林ノ大慶ナリ東方諸國珠ニ印度ニテ此ヲ以テ

馳名ノ家貯茶トナセシヨリ英人ニシテ得テ以テ  
其成分ヲ分析シ初メテ條虫ノ神薬トナス  
石榴根皮ハ唯條虫ニ効アリ蓋其ノ神薬トナス  
ナキニ非ト云其經驗未ダ廣カラス且所多居ノ如  
キ希世ノ神薬ニアレハ石榴皮ヲ用ヒテ他ノ  
腸虫ヲ治メント欲スル者又稀ナリ  
石榴根皮ノ健康作用ハ之ヲ知ルコト明カナラズ  
蓋別ニ較著重切ノ麦芽ヲ飲スコトナレ倒スルニ  
之ヲ大量ニ用レハ悪心嘔吐下利腹痛ヲ起シ時  
トシテハ眩暈戸眸等ヲ發スルコトアリ然レバ其

症二三時ニメ消散ス  
此根ノ條虫ヲ駆逐スルハ全其用法ニ關係ス故  
ニ用法ヲ詳ニセサルベカラス  
スベエイル氏ノ用法ハ左ノ如シ  
石榴根新鮮ノ者ヲ取り其皮ニ号ヲ削リ取り二  
片ノ水ヲ以テ煎メ一升トナルニ至リ水製蘆<sup>膏</sup>五  
キス十二ハ蜂蜜一号ヲ其中ニ和勻シ以テ之ヲ  
服サシム  
此方ハ其蘆膏蜂蜜等ヲ品ヲ合スルカ為ニ患者  
動モスレハ之ヲ嫌忌シ繼令ハ然ラサルモ其功

確シカラス故ニ正ニ朋百氏ノ用法ヲ以テ最良トナスヘシ即左ノ如シ

石榴根新鮮ナル者ノ皮ヲ削リ去ルコトニ多クシ一日夜間一升ノ清水ニ浸漬シ置キ文火ニテ煎ノ其液一升トナルニ至リ放冷シテ濾過シ之ヲ用ヒントスル前日夕飯ヲ喫スルコトナク次日早朝空心ニ乘シテ其液ヲ三分シテ其一分ヲ服シ後半時毎ニ一分ヲ服尽シテ蓖麻油一升ヲ飲ミ而メ後飯ヲ喫スルモ可ナリ若効ナクハ次日亦之ヲ行ヒ一二回モ連用スヘシ此ノ如クシテ

其効アラサル者殆稀ナリ

今茲萬延元年春和蘭在留ノ領事官勅某及其下官拔某共ニ條虫ノ症ヲ患フ朋百氏之ニ小石榴根皮ヲ右ノ如ク用ヒテ良効ヲ得タリ後又條虫ヲ患ル者ニ人アリ共ニ此方ヲ用ヒテ之ヲ治ス後來人々能ク此用法ニ依リテ其驗經テ廣ムルコトアラハ吾道ノ闡化日ヲ期シテ遂ニハル勉ヨヤ諸君子

第六編

峻烈麻神鎮症之藥

莫非

モルフィネのモルフィウム 罂 莫ルフィ子の(ウルサフソラト)ラビウムソラト南。  
モルフィナ独 モルフィナ法 モルヒア 莫 打睡薬 阿片之塩

炭素

二十

水素

四十

窒素

二

酸素

六

水

二

莫非

莫非ハ阿片ノ一成分ナリ他ノ諸ト相合シテ共

ニ罂粟ノ中ニ在リ百分ノ阿片太約八分ノ莫非

ヲ含ム阿片ノ諸病ニ神効アルハ蓋シ又莫非ニ由

ルノニ文化元年 西國紀元千セルチエル子ル名劇

ノテ之ヲ阿片ヨリ分チ得夕リ莫非西ハ神ノ名

人ノ睡眠ヲ主ル此物大ニ打睡ノ性効アルニ資  
テ以テ之ニ名クト云「莫非ハ無色ノ三尖状ニメ  
光輝アル小晶体ナリ諸酸ト合セタル者ハ過的  
耳ニ溶解セス千陪ノ冷水ニ溶解シ熱湯及酒精  
ニハ溶解スル」猶多ク脂油鹼水灰汁及硫酸塩  
酸消酸醋酸等ノ稀薄ニシタル者ニハ克ク溶解  
シ口ニ入テ味甚苦ク試茶ニ由テ灰塩性ヲ見ス  
莫非功用利害  
莫非ノ性効ハ甚阿片ニ相遠カラスト凡其之ニ  
異ナル所以ハ唯左ノ數件ニアリ曰ク莫非ハ阿

片ノ如キ興奮衝動ノ効アルコトナク之ヲ用ヒテ  
心ノ運営ヲ元<sup>タカ</sup>ノス脉搏ヲ増<sup>カ</sup>サス血行ヲ進メス  
又大小便ヲ臧却スルコトサレ然レ凡消食機<sup>器</sup>ヲ侵  
ス事ハ却テ阿片ヨリ甚シク大量ヲ用レハ動モ  
スレハ下利ヲ發ス

（大）健康作用

（以）局処ニ用ヒテ之ヲ内皮法トナセハ其部疼痛  
ヲ發シテ汗流沆滴シ水泡状疹ヲ發レテ其痛熾  
カ如ク時トシテハ咽喉乾燥レ惡心アリテ食機  
ヲ失ヒ大便閉止レテ小便困難トナルコトアリ（宣）

小量 四分氏一ヲ飲服スレハ已ニ消食品ヲ侵シ其  
苦味ニ由テ惡心嘔吐ヲ發シ動モスレハ下利ヲ  
發ス之ヲ内皮法ニ用ル者ハ然ラス其神經症ハ  
頭痛眩暈輕易ノテ醉態昏睡瞳孔散大等ヲ發シ  
脈搏毫モ変スルコトナク或ハ時トメハ遲徐トナ  
リ口鼻咽喉脊背ニ燻カ如キ痒痛ヲ發シ漸次ニ  
蔓延シテ全身痒痛ニ遂ニ皮膚赤色ヲ發シ水泡  
狀ノ瘡疹ヲ發シ小便減少シテ通利困苦ス是ハ  
膀胱及腹筋ノ收縮力ノ減殺スルニ由ル波大量  
及極大量ヲ用レハ其直下ニ抵觸スルノ部即胃

腸ノ如キハ別ニ患害ヲ生セスト矣神經系統及  
生活ノ妙機一次ニ變調シ眼目昏黒ニシテ物ヲ  
見ルコト能ハス眩暈瞳孔甚ク縮少シ全身疲倦シ  
テ昏昏々睡眠シ或ハ筋肉戰震シ痙攣搐搦交起リ  
呼吸困難ニシテ口吻斜角弓反張ト破傷風ノ  
如ク窒息或ハ卒倒ニ因テ死ス之ヲ内皮法ニ用  
レ或灌腸シ或之ヲ靜脈ニ射注スルモ又同シ

地色如用

以テ神經系統知覺機尤進スルノ諸病顔面痛  
胃腕痛腰痛百日咳狂久頑固ノ咳嗽等ニ効アリ

又苦土ト合シテ酸敗液ノ剝痛アル者ニ効アリ  
[包]急性關節痿ナ有私及其他各械ノ鉄換剝痛ヲ  
兼ルノ疝瘻瘡梅毒<sup>毒</sup>瘡諸潰瘍ノ剝痛アル者ニ効  
アリ[波]諸般ノ焮衝間歇性ヲ挟ム者神經ノ侵掠  
サルト甚シテ之カ為ニ剝痛ヲ發スル者患者  
虚脱シテ焮衝アル者モ刺絡ヲ施シ剝烈ノ消炎  
法ヲ行フヘカラサル者ニ莫非ヲ用フヘシ而メ  
又阿片ノ如ク之ヲ怕レスシテ可ナリ即諸般ノ  
焮衝痿ナ有私痛凡梅毒瘰癧等ノ惡液家ニ發ス  
ル者梅毒性虹彩焮衝骨痛關節焮衝腹膜焮衝痔

熱咽喉焮衝氣管支焮衝肺旁肺結節腫慢性眼焮  
衝膀胱焮衝中毒ニ起因スル腸胃ノ焮衝腦焮衝  
ノ不眠譫妄狂躁ヲ兼ル者赤斑熱痘瘡苔癬瘰癧毒  
株腫經久ノ冒寒咳嗽アル者等ニ効アリ  
[仁]尿道膀胱ノ症寧性諸病產婦ノ癩痢症寧肺旁  
ノ咳嗽甚ナ者窘迫痢子宮症寧呢逆舞蹈病癩痢  
産婦嘔吐百方鎮ムルト能フサル者航海ノ間嘔  
吐ヲ發スル者喘息症咳及ヒ其性ノ諸病<sup>諸</sup>股ノ  
齒痛耳痛ニ効アリ  
[保]百般ノ精神病子宮病當憂病酒客ノ狂躁病華

風想思病等殊ニ其諸病精神揚發シテ不眠躁亂  
シ之ニ由テ患者ノ虚脱セシテ怒ル者陰火  
熾盛ニシテ百方過ムルヲ能ハサル者ニ効アリ  
邊百般ノ症性諸病神經統系什糜ノ変状アリテ  
發スルヤ未疑圍ヲ免ル者金創熱恐水病破  
傷風筋肉戰震又腦髓脊髓ヨリ生スル諸病諸般  
ノ神經熱利病亞細霍亂間歇熱等ニ効アリ  
〔盞〕ステリキニイ子執腦光膏等ノ中ニ効アリ莫  
非ハ以上百般ノ病患ニ用テ皆良効アリト雖  
要スルニ大抵皆始息覚解ノ用アルノニ悉ク根

治ノ効ヲ望ムコトナカレ是莫非ヲ用ル一般ノ定  
規ナリ而メカ所及内皮法ニテ用ルヲ以テ之ヲ外用ニ施  
スヘシ其効大ニ内用ニ勝ルコトアリ莫非ヲ内用  
ニ供スルハ其量常ニ十分ハ一至五分ハノ一ヲ  
以テ始メ小心シテ漸次ニ増加シ以テ半ハ若ク  
ハ二分ニ至シテ要ス然レ凡長服ノ間一旦其  
用ヲ止ムル者ハ復再小量ヲ以テ始ムヘシ〇之  
ヲ内皮法ニ用ルニハ其量少レク大ナルヘシ即チ  
芫菁膏ヲ以テ表皮ヲ除去スルノ後莫非六分ハ  
一至半ハヲ取リ少許ノ白糖ニ和シ其上ニ傳シ



○内用ニハ散凡溶劑皆可ナリ又之ヲ錠トノ用  
ル者アリ礦物ニ屬スル諸藥殊ニ礦屬藥及植性  
諸藥ノ鞣素ヲ含ム者ヲ配合スルヲ禁ス○外用  
ニハ莫非二ハ至三ハヲ脂若クハ油一ヲニ研和  
シテ塗擦ノ膏油トナシ用フ灌腸劑ニハ脂油若  
クハ鷄子黃ニ莫非四分ハ一至一ハヲ和シ行フ

莫非中毒救療法

莫非ノ消毒藥ハ骨喜龍腦阿摩尼亞及鞣素ヲ含  
有スルノ諸物ナリ故ニ其中毒症ニ逢ハ、此等  
ノ藥ヲ用ヒテ其毒ヲ分解シ多量ノ水液ヲ服セ

レノ皓礬胆礬ノ吐劑ヲ用ヒテ吐ヲ起サシムハ  
レ胃水稀ヲ以スレハ尤可ナリ若シ其毒ニ中ル  
レ既ニ多時ニシテ胃腸ノ炊衝ヲ發スル者ハ病  
學ノ定則ニ從テ之ヲ療スルヲ要ス

莫非各般ノ製劑

夫莫非ハ之ヲ單用スルレモ稀ナリ通例之ヲ酸  
ニ合スレハ大ニ其性効ヲ發揮シ且易ケレハナ  
リ今爰ニ其製劑數事ヲ挙グ

第一

單純莫非

モルフェニユクノモルフェー４ビニリユクノモルヒナビニラ羅  
ソイフル、モルヒ子菌

〔炭素<sup>二十</sup> 五容〕 水素<sup>四十</sup> 窒素<sup>二</sup> 酸素<sup>六</sup> 水<sup>二</sup>〕  
 乾今又之ヲ用フル者ナシ其用ヒ易カラサルガ  
 為ナリ

・第二

醋酸莫非 モルフエハ、アセチキエスのアセタス、モルヒールのアセタス、モルフリス

〔炭素<sup>二十</sup> 水素<sup>四十</sup> 窒素<sup>九</sup> 酸素<sup>各異</sup>〕

帶黄灰白ノ粉末ナリ結晶シ難シク醋酸ノ氣  
 アリ十七階ノ冷水及温湯四十階ノ濃精酒ニ  
 能ク溶解シ風ヲ見テ其酸ノ半分ヲ失ヒ溶解ヲ  
 難カラシム故ニ之ヲ用ヒント欲セハ一二滴ノ

醋酸ヲ加フルヲ要ス

此刻ハ獨逸人多ク此ヲ用ヒ以テ其良劑ナルヲ  
 稱ス内用ニハ八分ハ一至四分ヲ溶劑丸散錠等  
 ニ製シ内皮法ニハ四分ハ一至三分ヲ用フ

方

醋酸莫非 一ル

菩提樹花水 三多半

橙花~~水~~ 劑別 一

右調勻シ紙剝トシテ毎食後一茶匕ヲ服サシム  
 方

醋酸莫非 二丸

結列阿曹多 十二滴

甘草 一丸

龍胆越綫斯 適宜

右調和レ十二丸ニ作り二時毎ニ一丸ヲ服シ

止ハ丁ナケレハ二丸ヲ服セシム

方

醋酸莫非 四丸

失鳩若越矢斯 各一丸

菲沃斯越矢斯 各一丸

甘草 適宜

右調勻シ二十九ヲ作り一日ニ二丸宛二回用ユ

方

醋酸莫非 三丸

醋酸 四滴

蒸餾水 三勺

右調勻シ一日ニ三次宛一次ニ十滴至二十滴

ヲ服ス

方

醋酸莫非 四丸

蜀葵根末 ニ及

甘草膏 適宜

右調和以四十九才作り一次ニ二九宛一日二

・回用フ

醋酸莫非 ニ及

白糖 一多半

右和勻シ八包ニ分チ一日ニ一包ヲ内皮法ニ

用シテ荒着膏痕ニ傳ク

方

醋酸莫非 ニ及

豕脂 半斤

右和勻シ軟膏トナス

第三

硫酸莫非

シエルフラス、モルヒキユス〇モルヒユーム、シエルフエリキユム  
シエルフラス、モルヒニナエス 四瓶、スワールシエール、モルヒチニ蘭

炭素 二十

器

水 一甲

器

空素 二

器

酸素 六

器

硫酸 一

器

水 六

器

小尖針状白色ノ晶体ニシテ味甚苦ク水及濃精

酒ニ能ノ溶解ス

此劑ハ其諸液ニ溶解シ易ク其量少シテ其功大

ナルカ為ニ意太里入大ニ之ヲ称用ス然レ凡獨

逸人ハ之ヲ用フルコト稀ナリ

内用ニハ十六分ハ一至四分ハ用ヒ内皮法ニ  
ハ半ハ用フ

方

・ 硫酸莫非 二ハ蒸餾水ニ溶解スル者

蜀葵根末 半ヲ

甘草膏 適宜

右調和シ三十九ヲ作り一次ニ二九宛一日二

方 回

硫酸莫非 二ハ

桂露 二ヲ  
薄荷油

右調勻シ綿布ニ蘸シ齒痛ニ施ス是ハステリ  
名ノ稱用スル所ナリ

方

硫酸莫非 十五ハ

白鉛末 半ヲ

風茄膏 一ヲ

阿列布油 適宜

右調合シテ軟膏トナシ痔腫ノ焮痛甚シキ者ニ

施シテグツキニ氏大効ヲ得タリ故ニ又之ヲ名  
ケテグツキン氏治痔膏ト云

第四

塩酸莫非

ヒドロゲンフロホス、モルフェキエスのモルフェニール、ミニリアキエムのミニ  
リアス、モルフェイ、コロンワートルストフェニール、モルフェ子のワウトシ  
モルフェイ子

炭素 <sup>三十</sup> 水素 <sup>四十</sup> 窒素 <sup>二</sup> 酸素 <sup>六</sup> 塩酸 <sup>一</sup> 水 <sup>六</sup>

白色針状ノ塩ナリ味甚タ苦シ風ヲ見テ変セズ  
二十倍ノ水及熱湯ニ溶解シ酒精ニモ又克シ溶  
解ス内用ニハ八分ハノ一至四分ハ一ヲ一次ヲ  
量トシの内用法ニハ半ハ至一ハヲ一日二回ニ

用ヒ漸次ニ増加シテ二三ハニ至ル蓋此劑ハ法  
人及英人ノ能ノ称用スル所ナリ

方

塩酸莫非 <sup>一ハ蒸留水</sup>  
ニ溶解スル者

桂酒 <sup>一ヲ</sup>

右調和シ毎夕一二茶セツ服シテ不眠ノ症ニ  
良効アリ

方

塩酸莫非 <sup>一ハ</sup>  
白糖 <sup>一ヲ</sup>

右研和シ五色ニ分チ毎夕一包ヲ薄荷水ニテ  
嚙下シ或ハ之ヲ内皮ニ傳フ

方 鹽酸莫非 ニル

蒸餾水 ニ多

右調勻シ八滴至十滴一日三次ニ用フ

法國ニテ高名ノ咳嗽ヲ治スル良薬タリ名ケテ  
パスチリテレヘアレト云而テ又此塩ヲ以テ若  
薬トナス其方左ノ如シ  
方

鹽酸莫非 十二ル

白糖 十二号

達刺侃多膠 適宜

右調勻シ以テ二十四塊ノ薬ヲ作ル

第五

青酸莫非

シアナス、モルヒキエス、モルフェー、シアケエ、セトロシアニキ、モル  
フー、ニユム、羅、ブライヤー、シキル、モル、フ、子、菌

第六

迷工酸莫非

モルフェー、サノコシキエム、メコナス、モル、フ、イ、キ、エ、  
シ、ニ、ル、モ、ル、フ、子、菌

第七

安負王酸莫非

アンチモニアス、モルヒキエム、モルフェー、アンチモニウム、  
アンチモニウム、シキル、モル、フ、子、菌

第七

安積本草

アムナモリス

以上三品ハ又唯化学ノ徒勞ニ由テ又ノ耳目ヲ  
新壽ニスルノニ決シテ有用ノ品ニ非ス之ヲ茶  
室ニ供セスメ可ナリ

第七編

緩和滋養疎解之茶

肝油

カリエー、エゴリス、アセロ、ロソエー、カヂ、モリエエ、ヨリエー、イナ、イナ、イナ

レール、ラレン、ベル、エタラレン、イヨ、セラレン、ストック、アイス、クラン、蘭、レイ、ベル、クラン、独、ウ、イル、テ、モリエウ、法、ウ、ル、ラス、テ、セ、リ、イ、ナ、フル、英、肝、油

此油ハ海鷄<sup>セ</sup>、鱈魚<sup>ス</sup>、鮫魚<sup>サ</sup>、鰵魚<sup>ア</sup>、等諸般  
ノ海魚ノ肝臟ヨリ出ル<sup>カ</sup>ノ者ナリ三種ノ別ア  
リ一ヲ淡黄肝油ト云ヒニヲ黒肝油ト云ヒ三  
ヲ褐色肝油ト云フ其之ヲ製スルヤ上件ノ海魚  
ノ肝臟ヲ剪取シ之ヲホ許ニ截断シテ大桶ニ入  
レ熱湯ヲ灌キ或ハ火力ヲ以テ之ヲ温メ其油消



タトシテ溶流スル者ヲ搗取シ布片ヲ以テ瀝過  
シ貯フ或ハ水ヲ以テ煮熬シテ之ヲ製スル者ア  
リ然レバ微火ヲ以テ温メ製レ或ハ風ニ逢フテ  
自溶流スル者ヲ最良ノ品トナス其製純精ナラ  
サル者ハ屢々又海獺カアシ 鯨魚クジラ 等ノ油ヲ雜ル  
アリ

第一種淡黃肝油 ツリニーム、エゴリス  
アセリス、アルビユ ハ澄清ニシテ金黃色其  
氣不佳ナラス微ク魚臭アリ甚稀薄ナラス味微  
甘ニシテ他ノ魚油ノ如ク後微シク咽喉ヲ刺戟  
ス異重ハ。又九二并ニ齊シク攝氏十七度ノ温

ニ逢テ半ハ凝固シ且氣中ニ乾燥シ過的耳ニ充  
ク溶解ス氷ヲ加ヘテ之ヲ震盪スレハ白色ノ乳  
状物ヲ為シ漸々澄清シテ遂ニ水分ト相分ル  
第二種闇黃肝油 オリニーム、エゴリス、アセ  
リ、シニエ、フェスキニム ハ其色前種ニ比ス  
レハ稍闇ク微赤ヲ帯ヒ其臭亦強ク味微苦ニメ  
刺戟ス異重ハ。又九二四ニ同シク過的耳ニ充  
ク溶解ス水ヲ加ヘテ之ヲ震盪スレハ灰白色ノ  
乳状物ヲ為シ須ニシテ相分ル  
第三種褐色肝油 ツリニーム、エゴリス  
アセリス、スキニム ハ澄清ナラス帯赤闇  
黒色明光ニ照セハ青黃色ニシテ一種固有ノ不

状ニシテ焚カ如キ臭アリ味苦シテ焚カ如ク後  
甚シク咽喉ヲ刺戟ス異重ハ〇又九二九ニ齊シ  
ク寒ニ逢テ凝固セズ過的耳ニハ克ク溶解ス水  
ヲ加ヘテ之ヲ震盪スレハ褐黄色ノ乳状物ヲ為  
シ一日ヲ経ルノ後油分上面ニ浮フ若シ之ヲ藏  
ハルコト久シケレハ油分ハ全ク別ルト雖其水尚  
澄清ナラス

肝油ノ種類此ノ如ク數般ナリト雖各家ニ供  
ル者ハ特リ第二種ノ者ヲ佳ナリトス蓋其善ク  
胃ニ堪レハナリ然レハ或ハ第三種ノ者ヲ以

テ最有効ノ品トナシ者アリ未其然否ヲ知ラス  
ト雖前者ノ缺ルニ逢ハ、又之ヲ用フヘレ  
肝油ノ能ク諸病ニ偉効ヲ奏スル所以ハ諸家各  
其説ヲ一ニセス或ハ之ヲ其中含有スル所ノ沃  
類ノ効分ニ由ルト為シ或ハ之ヲ否ラスト云今  
其成分ノ多寡ヲ擧ケテ以テ効分ノ由ル所ヲ知  
ラシム  
肝油百分ノ量中含有スル所ノ成分ノ量左ノ如  
シ

油酸

七四又〇三二〇〇

マルカルニウム酸

脂素

ビュケリニウム

醋酸

フェリニウム酸

ヒリズリゲ子

一箇未詳ノ物

一箇未詳ノ物

沃顛

塩酸

一一又七五七〇〇

一〇又一七七〇〇

〇又〇七四三六

〇又〇四五七一

〇又四三〇〇

〇又二六八〇〇

〇又〇〇六〇〇

〇又〇〇一〇〇

〇又〇三七四〇

〇又一四八八〇

濃精酒ニ溶  
解スヘキ者

水濃精酒及過的  
耳ニ溶解セサル者

磷酸

硫酸

磷

石灰

塩

苦土

鉄

〇又〇九一三二

〇又〇七一〇〇

〇又〇〇一五五

〇又一五一五〇

〇又〇〇八八〇

〇又〇五五四〇

〇又〇〇一〇〇

右ニ列挙セル比較表ハ是、大學者イヨルグ氏自家精油ノ験試ニ由テ載録スル所ノ者ナリ而シテ亦肝油ノ効ハ沃顛ニ在ルヲ稱セリ然ルニ密

耳<sup>ル</sup>耳<sup>ル</sup>名<sup>ハ</sup>大<sup>ニ</sup>此説<sup>ヲ</sup>非<sup>トシ</sup>具<sup>ク</sup>沃<sup>ノ</sup>顛<sup>ノ</sup>在<sup>否</sup>未<sup>レ</sup>  
歴<sup>然</sup>ト<sup>メ</sup>確<sup>指</sup>ス<sup>ハ</sup>カ<sup>ラ</sup>ス<sup>ト</sup>云<sup>ヘ</sup>リ<sup>此</sup>ノ<sup>如</sup>ク<sup>諸</sup>  
説<sup>紛</sup>々<sup>ト</sup>メ<sup>一</sup>ナ<sup>ラ</sup>ス<sup>孰</sup>カ<sup>其</sup>善<sup>ナル</sup>ヲ<sup>知</sup>ラ<sup>ス</sup>然<sup>レ</sup>  
然<sup>レ</sup>凡<sup>衆</sup>説<sup>ヲ</sup>参<sup>考</sup>シ<sup>テ</sup>之<sup>ヲ</sup>察<sup>ス</sup>ル<sup>ニ</sup>沃<sup>顛</sup>ハ<sup>是</sup>  
肝<sup>油</sup>中<sup>必</sup>然<sup>常</sup>在<sup>ノ</sup>成<sup>分</sup>ニ<sup>非</sup>ス<sup>唯</sup>時<sup>ニ</sup>隨<sup>テ</sup>隱<sup>現</sup>  
ス<sup>ル</sup>ノ<sup>ニ</sup>若<sup>ク</sup>沃<sup>顛</sup>ヲ<sup>以</sup>テ<sup>肝</sup>油<sup>ノ</sup>効<sup>分</sup>ト<sup>ナ</sup>シ<sup>ハ</sup>沃<sup>顛</sup>  
顛<sup>ヲ</sup>胎<sup>マ</sup>サ<sup>ル</sup>ノ<sup>肝</sup>油<sup>ハ</sup>毫<sup>モ</sup>其<sup>効</sup>ナ<sup>シ</sup>ト<sup>セ</sup>ズ<sup>ナ</sup>リ<sup>故</sup>  
故<sup>ニ</sup>肝<sup>油</sup>ノ<sup>効</sup>今<sup>ハ</sup>必<sup>沃</sup>顛<sup>ニ</sup>由<sup>ル</sup>ト<sup>セ</sup>ス<sup>シ</sup>テ<sup>亦</sup>  
ナ<sup>リ</sup>  
輒<sup>今</sup>肝<sup>油</sup>ノ<sup>價</sup>貴<sup>大</sup>ニ<sup>廣</sup>ク<sup>賣</sup>販<sup>甚</sup>多<sup>キ</sup>カ<sup>故</sup>ニ<sup>泰</sup>

西<sup>諸</sup>國<sup>ノ</sup>高<sup>勳</sup>モ<sup>ハ</sup>他<sup>ノ</sup>魚<sup>油</sup>鯨<sup>魚</sup>油<sup>或</sup>ハ  
少<sup>許</sup>ノ<sup>真</sup>肝<sup>油</sup>ニ<sup>松</sup>脂<sup>嬰</sup>粟<sup>油</sup>等<sup>ヲ</sup>加<sup>ヘ</sup>テ<sup>之</sup>ヲ<sup>質</sup>  
造<sup>シ</sup>禦<sup>ク</sup>者<sup>アリ</sup>之<sup>ヲ</sup>試<sup>ル</sup>ニ<sup>硫</sup>酸<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>ス<sup>ル</sup>ヲ<sup>最</sup>  
最<sup>良</sup>ト<sup>ス</sup>其<sup>法</sup>少<sup>許</sup>ノ<sup>肝</sup>油<sup>ヲ</sup>白<sup>キ</sup>厚<sup>紙</sup>ノ<sup>上</sup>ニ<sup>置</sup>  
キ<sup>硫</sup>酸<sup>二</sup>三<sup>滴</sup>ヲ<sup>其</sup>中<sup>心</sup>ニ<sup>滴</sup>ス<sup>レ</sup>ハ<sup>肝</sup>油<sup>忽</sup>テ<sup>運</sup>  
動<sup>ヲ</sup>始<sup>メ</sup>四<sup>方</sup>ニ<sup>向</sup>テ<sup>侵</sup>延<sup>シ</sup>美<sup>艷</sup>ノ<sup>紫</sup>色<sup>ヲ</sup>見<sup>ハ</sup>  
シ<sup>攪</sup>拌<sup>ス</sup>レ<sup>ハ</sup>紫<sup>赤</sup>色<sup>ト</sup>為<sup>リ</sup>其<sup>終</sup>遂<sup>ニ</sup>褐<sup>色</sup>ニ<sup>變</sup>  
ス<sup>若</sup>ク<sup>肝</sup>油<sup>淨</sup>清<sup>ナ</sup>レ<sup>ハ</sup>其<sup>紫</sup>色<sup>強</sup>ニ<sup>質</sup>造<sup>ノ</sup>者<sup>ハ</sup>然<sup>ラ</sup>  
ラ<sup>ス</sup>阿<sup>列</sup>布<sup>油</sup>ノ<sup>質</sup>造<sup>ニ</sup>出<sup>ル</sup>者<sup>ハ</sup>硫<sup>酸</sup>ヲ<sup>滴</sup>シ<sup>テ</sup>  
其<sup>汚</sup>灰<sup>白</sup>色<sup>ニ</sup>變<sup>シ</sup>嬰<sup>粟</sup>油<sup>ヲ</sup>雜<sup>ル</sup>者<sup>ハ</sup>淺<sup>黃</sup>褐<sup>色</sup>

シ見ハレ他ノ魚油ヲ混スル者ハ褐色ヲ為ス○  
福岡炭濟世好仁ノ顯徳アリ大ニ肝油ノ諸病ニ  
偉績アルヲ欽慕シ近一二年來其國中ニ命シテ  
遍シ汗油ヲ作ラシム其製良善ニシテ其品清淨  
ナリ船齋ノ者ト甚相讓ラズ崎陽ノ匠家圭齋若  
雄子及其他ノ諸子モ亦自ラ之ヲ製シ以テ醫藥  
ニ供ス実ニ肝油ノ皇國ニ其用ヲ廣ムルハ筑肥  
ヲ以テ嚆矢トナス道ヲ好ムル此ノ如ク是厚ク  
ハ何ソ吾道ノ闡ケサルヲ憂ヘン  
西國ニテ肝油ヲ醫藥ニ用ルハ英人及獨逸人ヲ

以テ其濫觴トナス果ヨリ以前北海諸島ノ人民  
之ヲ以テ家貯菜トシ肺勞尙僕病痛風ニ用ルト  
魚其功用ヲ書ニ著シテ之ヲ説ク者ハ文化五年  
西國紀元千八百二十二年獨逸人鮮<sup>シュンキ</sup>人<sup>メ</sup>ナリ遂ニ英國ニ傳  
リ荷蘭ニ及ヒ今ニ至リテハ全歐羅巴ニ傳播ス  
就中當時之ヲ稱用スルヲ盛ナル者ハ英ノ匠士  
ケイヘルキフエルトユル等數輩ヲ其最トス故ニ今肝油  
ヲ製スルヲ最<sup>モ</sup>多キ者ハ就<sup>モ</sup>勤<sup>モ</sup>都<sup>モ</sup>府<sup>モ</sup>ナリ以テ之ヲ  
四方ニ賣販セシメ利ヲ收ムルヲ多シト云

〔乾〕健康作用

肝油ハ本是他ノ植性諸油ノ如ク緩和滋養ノ性  
アルヲ以テ之ヲ健康ノ体軀ニ用ルモ別ニ較著  
ノ作用ヲ見ハスナシ唯之ヲ服スルノ後カク  
悪心ヲ發シ或ハ嘔吐シ噁氣敗魚ノ臭アリ然レ  
凡是唯之ヲ慣レルアラハ特其人ニ於テ幸アル  
ノミナラス至家モ亦大慶アリト云ヘシ。大量  
ヲ用ルハ嘔吐下利ヲ起シ蒸氣ノ發洩ヲ獎メ  
テ小便ノ分泌ヲ増ス縱令実ニ其効ナキモ嘔吐  
悪心ニ由テ諸液ノ分泌ヲ獎進スルコトナシ  
ベカラス之ヲ長服スレハ其人多クハ肥厚シ食

機増進レ全身魚臭ヲ發シ動モスレハ小疹ヲ發  
スルコトアリ

〔坤〕至治作用

肝油ハ至菜トシテ其功用頗大ナリ大約左ノ諸  
病ニ大効アリ

〔总〕テ一凡ノ諸病其初生ヨリ中年ニ至ルノ間  
機械ノ發育ニ障碍アリ或ハ血液貧乏ニ由リ或  
ハ養育減少ニ由テ發スル者ニ其身軀ヲ養育レ  
共血質ヲ快復スルノ目的ヲ以テ之ヲ用フ即瘰  
癧佝僂病骨節潰瘍肺癆水脉管腺腸向膜腺及諸

器ノ療癒性諸病ニ効アリ就中其人弛緩粘液病  
ナレハ其効愈著ルシ○東<sup>トム</sup>甫<sup>ブツ</sup>孫<sup>ン</sup>人ノ説ニ曰ク肝  
油ノ肺病ニ効アルハ蓋其中含有スル所ノ磷質  
肺中ノ酸素ト遇テ<sup>ト</sup>燐酸トナルニ由ル者ナリ  
トシモ<sup>ン</sup>人ノ説ニ曰ク肺ハ血輪ヲ增多スルノ  
功アリト<sup>ト</sup>兩説未<sup>ク</sup>其原ツク所ヲ知ラス<sup>ト</sup>ベ<sup>ク</sup>ト<sup>ト</sup>人  
ハ肝油ヲ肺病ニ用ルハ必其初期ニ於テスヘシ  
ト云ヒ<sup>ト</sup>ワ<sup>ル</sup>セ<sup>ト</sup>人ハ之ヲ其終期ニ用テ却テ良功  
アリト称ス英國<sup>ノ</sup>ブ<sup>ロ</sup>ム<sup>ト</sup>ン<sup>ノ</sup>地<sup>ノ</sup>大病院ニテハ  
少壯ノ人肺病ノ素因アル者ニ之ヲ常服セシメ

テ其病ノ發生ヲ防リト云ヘリ又之ヲ婦人ニ用  
ヒテ月経ノ閉止ヲ治スト云者アリ縱令然ラサ  
ルモ之ヲ奨進スルノ効ナシト云ハカラス蓋肺  
勞瘵<sup>ノ</sup>二病ニ於ケル吾人ノ識別未<sup>ク</sup>十分明亮  
ノ地ニ至ラサレハ肝油ノ肺病ニ良効アル所以尙  
未<sup>ク</sup>定説ヲ得ス  
○<sup>ト</sup>百<sup>ト</sup>般<sup>ノ</sup>皮膚病血貧不良ニ由ル者ハ之ヲ試用  
スベシ就中苔<sup>ノ</sup>鮮<sup>ノ</sup>瘰<sup>ノ</sup>毒<sup>ノ</sup>樣<sup>ノ</sup>腫<sup>ノ</sup>頭<sup>ノ</sup>瘡<sup>ノ</sup>潰<sup>ノ</sup>瘡<sup>ノ</sup>錢<sup>ノ</sup>癬<sup>ノ</sup>乳<sup>ノ</sup>房  
及<sup>テ</sup>陰<sup>ノ</sup>囊<sup>ノ</sup>硬<sup>ノ</sup>結<sup>ノ</sup>厚<sup>ノ</sup>大<sup>ニ</sup>良効アリ又麻痺病脊髓ノ  
偏曲初生ノ關節脱臼<sup>ノ</sup>蟲病<sup>ノ</sup>粘液病<sup>ノ</sup>出血<sup>ノ</sup>眼<sup>ノ</sup>諸病<sup>ノ</sup>諸

般ノ肺病惡液家ノ飲食不消化消渴病爛臉風癩  
テ後遺ス所ノ瘰癧瘻ニ効アリ

波痛風痿疝疝私及兩性ノ關節諸病神經痛<sup>腰</sup>痛  
脊髓刺戟舞踏病癩痢等ニ効アリ蓋肝油ノ克ソ  
此般ノ神經病ニ効アルハ唯其病單一ノ神經症  
ニシテ他因ヲ挾ムコトナキ者ノミナラン、○少女  
ノ皮膚粗糙ニシテ手指敏捷ナラス筋績ニ障ケ  
アル者ニ惠愛ノ茲母ハ善ク肝油ヲ用ヒテ脂肪  
ヲ増シ腠理ヲ滑澤ニシ以テ事ニ從ハシム  
肝油ハ他ノ沃顛ケレシ<sup>レ</sup>ト水銀安<sup>ノ</sup>項<sup>ノ</sup>王石<sup>ノ</sup>灰

等ノ諸品ニ比スレバ其害甚少ト雖亦之ヲ用フ  
ヘカラサルノ地ナキコト能ハス論ハ總テ極少ノ  
小兒胃弱ノ人胃ノ知覺<sup>敏捷</sup>ナル者消食<sup>機</sup>損<sup>害</sup>  
アル者病ヲ治スルコト神速ナランコトヲ欲セル時  
肚腹多血ノ痢病ノ流行スル時患者下利ヲ兼ル  
者肺勞ノ者咯血ヲ兼ル者極メテ炎熱ノ氣候等  
ナリ尚且患者此茶ヲ服シテ胃受容スルコト能ハ  
ス直ニ<sup>吐</sup>出スル者ハ亦肝油ヲ用ヘカラス然レ  
凡或ハ又左ノ説ヲ奉スル者アリ曰ク患者之ヲ  
服シテ直ニ<sup>吐</sup>出スル者ハ是<sup>レ</sup>其胃異<sup>常</sup>ノ刺戟ニ



慣レタル者ナリ正ニ其吐物ヲ搗取シテ再之ヲ飲  
シムヘシ之ニ由テ敏捷ノ神經ヲ頑テシ善ク受  
容スルニ至ルヘシ

用法ハ半匁至二匁ヲ一日三四次ニ用テ漸々増  
加シテ多量ニ至ル小兒或ハ胃神經敏捷ナル者  
ニハ尚少量ヲ與フヘシ其之ヲ服スルヤ單味寒  
冷ノ者ヲ最良トス即チ手ヲ以テ口鼻ヲ壓ヘ一次  
ニ嚥下シテ後水醋或ハ火酒薄荷水ヲ以テ口中  
ヲ洗ヒ糖菓桂皮蘆根等ヲ咬マシムヘシ或ハ之  
ニ炭那橙皮龍胆等ノ丁炭或ハ舍利塩ヲ加ヘ用

ル者アリ此等ハ却テ服シ易カラス〇從テ肝油  
ハ其呆不佳ナルヲ以テ人多クハ服スルヲ嫌フ  
故ニ諸家勉メテ之ヲ服シ易カラシムルノ方法  
ヲ議シ或ハ之ヲ飲割ニ製シ或ハ之ヲ以テ錠圓  
ヲ造リ或ハ之ヲ舍利別ニ含スル等若干ノ心思  
ヲ當スルト莫一モ能ク其肯綮ヲ得ルモノ少シ  
唯食後少時ヲ経テ之ヲ用ルノ法ハ急心ヲ發ス  
ルノ最良トス故ニ之ヲ空心ニ服スヘカラス  
此ノナケレハ又之ヲ臨卧ニ用フヘシ〇又人屢肝  
油ニ他ノ諸薬ヲ加ヘテ之ヲ用ル者アリ沃類及

紙那塩等ノ如シ  
外用トメ肝油ヲ用ルハ二般ノ目的アリ即チ一ハ  
局処ノ功アルヲ望ミ一ハ遠達ノ効ヲ求ム其局  
処ノ功アル者ハ角膜翳瘰癧腫爛<sup>眼</sup>風皮膚病痿  
六項私腰腕痛等ノ諸病ニ用ル者ナリ其遠達ノ  
効ハ之ヲ外用シテ以テ内服ノ効ニ同シカラシ  
ハ其患者ヲシテ憐慈スルコトナカラシム故ニ一  
切上ニ論スルノ諸病ニ用ヒテ其称却テ内服ニ  
優ルト云。肝油ヲ外用スルニ諸般ノ法アリ或  
ハ之ヲ単ニ皮表ニ塗擦シ或ハ蠟若クハ脂ニ和

シテ軟膏トナシ或ハ之ニ<sup>浴</sup>蛋黃皮及<sup>人</sup>碓砂精ヲ加  
ヘテ擦刮トシ或ハ之ヲ<sup>湯</sup>湯ニ加ヘテ小兒ノ諸  
病ニ用フ。東甬孫及<sup>人</sup>シモンハ内服ノ代ト  
人<sup>名</sup>之ヲ肺勞患者ノ胸上ニ塗擦シテ効アルヲ称  
ス然レ此ノ如キ擦法ハ屢々其室中ニ不快<sup>息</sup>息氣  
ヲ發揮シ却テ患者ヲ害スルコトアリ縱令芥若ノ  
香油ヲ和スルモ全<sup>之</sup>之ヲ消スルコト能ハス。英國  
ニ於テ之ヲ軟膏ニ製シ慢性疥<sup>狀</sup>腫ノ痒痛甚キ  
者疥癬癩癧羅私様疹頭瘡慢性皮膚凍瘡火瘡傷  
等ニ用ヒ又朱利幹ノ諸色<sup>中</sup>中<sup>名</sup>華乙<sup>名</sup>解<sup>名</sup>ハ之ヲ

稱シテ<sup>停</sup>緯續無比トス其法ハ則肝油<sup>ノ</sup>至四<sup>ノ</sup>  
ヲ脂一<sup>ノ</sup>号ニ和スル者ニシテ或ハ<sup>ハ</sup>醃<sup>ヲ</sup>加<sup>ハ</sup>或ハ  
至<sup>ラ</sup>ス近時北<sup>ノ</sup>統ノ醫家亦肝油ヲ以テ軟膏ヲ製  
シ數回<sup>ニ</sup>經<sup>テ</sup>驗スルノ後之ヲ我師ニ贈<sup>レ</sup>リ<sup>ハ</sup>同<sup>ノ</sup>檢<sup>ニ</sup>黃  
色ニシテ微臭アリ其功用ヲ書スルニ曰ク腸胃  
膜閉塞及<sup>シ</sup>之ヨリ發スル諸病ニ効アリ又諸般ノ  
皮膚病ニ良ナリト云々蓋必然ラン  
コステル<sup>ノ</sup>名曰ク<sup>ハ</sup>ウ<sup>ノ</sup>ル<sup>ノ</sup>人<sup>ノ</sup>謂<sup>ク</sup>ノ鵝魚及<sup>シ</sup>鱈魚ノ生  
肝ハ不佳ノ氣少クシテ甚ノ惡心ヲ發セス其油  
ノ落流ヲ防クカ為ニ初<sup>ニ</sup>先<sup>ニ</sup>熱湯ニ入<sup>レ</sup>之ヲ寸截

シテ絞<sup>リ</sup>榨<sup>リ</sup>シ其出ル所<sup>ノ</sup>油ヲ取<sup>リ</sup>テ<sup>ハ</sup>荅<sup>ノ</sup>薯<sup>ノ</sup>粉<sup>ニ</sup>和  
シテ服ス甚<sup>ニ</sup>妙ナリト知<sup>ラ</sup>ス患者能<sup>ク</sup>之<sup>ニ</sup>堪<sup>ル</sup>  
ヤ否ヤ

本

本

三三三



Faint, vertical Japanese text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



530



