

蘭畝叔載卷一

東都懷園先生纂輯

美作 源 輝雄
長門 豐田宗味 校
高崎 嶺 春泰

宇田川藏書

宇田川藏書

駝鳥

月池

斯^ス篤^ト爾^ル室^キ阿^ヲ 斯^ス篤^ト爾^ル室^キ阿^ヲ 局^カ 篤^ノ律^リ私^シ 羅^ラ亞^ア鳥^ウ篤^ト
律^リ設^セ 設^セ爾^ル拂^フ阿^ヲ 乙^イ色^セ末^マ胡^コ 祭^サ 蘇^ス篤^ト祿^ロ 乙^イ斯^ス訶^カ
傑^ゲ兒^ル 蘭^{ラン}和^ワ 此^{コト}物^{モノ}產^ス於^テ亞^ア弗^フ利^リ加^カ 局^カ 刺^シ比^ヒ亞^ア 露^ロ等^ト曠^ク

野鳥之極大者高六七尺。國瑞其高過於乘馬之
首視體則不甚大。腦髓亦少。毛小而黃。眼目橫
長似人有。臉毛喙短而尖。舌亦小。頸長。白毛細柔
而澤。生如獸毛。背廣翼短。羽毛軟而極厚。其色或
白或黑或黯。其羽多黑。雄者其羽多黑。雌者其羽多黑。身則錯黑
白或灰色。至尾則白。肢甚肥大。而裸不生羽毛。淡
紅皮。大皺文。至脛則有大鱗甲。脚指成歧。殆如牛
趾。亦極類。駝蹄。故名駝鳥。往往多群行。國瑞
近水處。間有利未。西。比。心。城。局。刺。比。西。等。其。曠。野。

然如軍行。騎翼短。不能飛。只張翅如棚。負風而行。
甚疾。其尾毛可以為盔。纓以飾笠。帽及車覆。雄者
最美。羽本堅。如角。亦似豪豬毛。一根而二莖。其卵
大如小兒頭。味最美。散極厚。任造器皿。國瑞
駝鳥性極淫。六七卵。同生。卵至八寸許。一箇重七
八斤。身重不能伏。卵賴其地。素熱。埋諸砂中。假
天日以煖。及至其化。之期。必識其時。與處而啼。
啄焉。然其雛不預出。必初日出。半身。至次日。全。
常食豆麥野草。又食銅鐵金石骨角至堅。諸物。然
如其至堅者。非以為養。特以磨胃中食物。助其消
化而已。是以多食堅硬過大之物。因發疾。至死者。

亦有之。其胃中薄膜曝乾末服開胃口壯胃其脂
化堅緩結兼補神經。

食火雞一名厄馬

明人音譯耶篋之轉訛

耶篋鳥。耶篋。鰻。葛。續。退。見。私。蘭。此物產於亞弗
利加州。馬。邏。可。諸。島。為。鳥。甚。大。其。擗。首。約。高。五。尺。
多。從。骨。至。臍。三。尺。許。據。體。視。之。頭。則。小。矣。自。頸。而
上。皆。無。毛。其。色。青。黑。眼。大。如。火。光。爛。然。可。懼。耳。孔
小。而。露。喙。上。有。兩。竅。即。其。鼻。也。頭。上。之。冠。連。喙。之
半。質。如。牛。角。黯。黃。色。與。羽。毛。偕。歲。一。革。頭。上。有。二。

皮膜赤如吐綬雞冠脚高而廣大皮有坵文三趾
而無後趾趾有五鱗其態度甚佻駝雞或云此亦
駝雞之一種也羽毛赭黑狀如獸毛其翼短小常
隱毛中不能飛舉但其行則張翼如颿最助行步
無尾唯臍上之毛比他處殊長其力在脚與喙卯
亦似駝雞而稍小其色帶綠殼上生小瘡痕鮮綠
彼土卑人煮食之是鳥也投與諸物則吞之然如
堅硬者不消而後矣脂主化堅解結化膿補神經
安永中和蘭獻食火雞雞于東都樊養西苑之

中大如鷄雞羽毛栗殼色從胃而上淺藍色而
無毛項上有紅瘡痕日食米一升半金石竹木
隨投隨食雖熾炭與之輒吞經一年高五尺許
羽毛黑而光美極能馴人但其畏寒之甚園吏
百計不能保其長三年而死余藏其退毛數莖
莖本沒肉處一其根出乎皮則歧為二莖用以
造筆甚良紅毛輿地圖說載此物產於番達之
島和蘭一千五百九十六年始致諸壅斯爾
覃舉以為珍奇矣今也余輩居然得觀遠物之

格豈不亦

昇平之鉅澤也哉

麋麋香

槐園

夫詢事考言必與名與物苟外乎此徒事鼓頰
也則空理之亡藝終始反復誰居不眩其亡端
倪者此其究必至利嘴長舌卒得擅場燦金銷
骨之言市虎卯毛之辯紛紛乎不可窮詰否則
齊是非同彼此厲與西施胥皆為伍莖之與楹
道通為一此其理雖可悅辭雖可觀亦唯玉卮

之亡當均之歸於不濟用耳。故衆言之淆亂折諸聖。聖也者一手夫實者也。而非有希夷窈妙之道存焉於其間。天下之事一斷諸實。辟曲引繩墨而正枉曲。手握規矩而縣權衡。以為方圓以校輕重。手誕罔講張奇衰狡僞之徒。莫不入焉而弱且窮矣。亡他故。斷諸實而已。是故能言而要諸實者。方外聖人之徒也。能言而不歸諸實者。洙泗蠻貉也。予驩于月池君。君語必及其所為翻譯之事。每稱蘭人所以精絕于衆。

者曰。事必顯門。人不貳能其操心。以為與其飾不我狎者。名吾技。則豈不得以其毋以名技者乎。則病者乎。是以有所不為。然後有以為也。為之弗能明。覈彰著於名與物。以獲其實。弗措也。予於是乎感述彼西土之子。鳩其舌而左其社。猶且進於技於實之果然乎。則殆于亡害為聖人之徒矣。會君就西書。自摹鹿射圖。以見贈。予譯其說以題之。獨祿厥列印者。志葦物者也。其言曰。

麝之香也。取諸一胞。大如雞卵。此其膽汁之汎濫。惡液之稽滯。經於播絡於越者。積久生熱。自鼻敗類。終淪胥。以歸其胞。乃成是物。其為獸也。如牝鹿。然其毛。曲局長。視少兒。指常處山林。人獲之。輒剔取其胞。傾出其香。以暴諸日。及其乾。鬆如粉。色成黯赤。而後還實諸胞中。以居。以貨。亞細亞諸國。並有之。而河東最多。為其捕之。必於春夏之交。云地多雪。積至十尺。若十一尺。若十二尺者。貫乎時。而不釋也。麝阻食。迨春末。流漸之時。承其怒飢之後。

大嚼。縱嗽。以逞貪婪也。則胃火之不可撲。熯熯乎。灼叙支體。鬱攸之所。煽血液之所。蒸其香以成矣。捕之。之所以必於春夏之交也。得香之始。不風不暴。則氣過乎烈。不可得。而當焉。或云。麝父方熱之。殷苦其胞。腫痒不可忍也。自觸木石。以救其患。血液潰而下。其所淋漓。亦結成香。

火浣布

蘭化子

按火浣布。和蘭謂之翁貌。蘭電埴。林能翁貌。蘭電埴者。不焦灼也。林能者。布也。此製一種。石所

謂亞密安都私者所織成之布也。至其垢汚則
投昇炎火而燒之。其潔白猶水洗濯之。見于西
書支那名之曰火浣。亦因此義也。亞密安都私
一名亞私別私都私共羅甸言也。

亞密安都私即石麻也。和蘭謂之亞密安都私。又云亞私。斯者布也。亞私獨者士也。弗斯也。弗斯也。弗斯也。

有光澤。如石決明。其石理成束絲文形狀。如重

橫截薄木片。其間有薄里皮隔焉。如第一圖。第二圖。其

質脆軟。分解之則如細絲。有纖微支絡相錯。以為

聯結。如第三圖。有製如麻桌而貿易之者。如第四圖。用以織

布。或以為燭心。猶用燈心草。或用製紙以寫文字

者。亦稀有之。其用以織布者。或為手巾。或為覆

被。卓子之布。古昔羅馬國有用此布於喪具者。

又有奉印度法教者。用以為法服。凡此布垢汚

投火燒之。其垢盡滅。潔然潔白。更倍其故。猶如水

浣濯。如第五圖。製法有二。第一為止波里之法。第二


為單殺得之法。皆地名。出後。第一法用灰水。加

靛花煮之。候其絲條如枯燥。益成細纖之狀。輕手


徐徐推打之則鬆解如絲迺以櫛梳理令可紡績
終致徹以為布以火燒之成一箇潔白石布也此
西密安都私出於波里者之第二法先浸諸水
經時以手辟之從而捫揉之則條分縷析漸成纖
細毳毳乎如獸毛迺雜以尋常麻絲媒成紡績已
得為絲旋織為布投諸烈火而焚灼之則所有麻
絲盡灰其所存者獨餘皓然一純石布而已再以
水洗淨之此法見於斐斯都私出於單殺得者
此石出于歐邏巴中諸國入尔馬尼亞中往往多

有又出于亞細亞中印度單殺得都兒格等以地
中海東止波里島所產為上品又歐邏巴中諾尔
勿惹亞出者其質脆而易碎折謂之法兒設亞私
別私都法兒設者假也亞私別私都者即石麻之
和蘭言也自餘諸國尚有多出焉者本邦亦出者
亞密安都私解諸毒去頭垢治白滯下調軟膏亦恐是類也
塗手握熾炭不灼爛膏方其一云此石鮮有效用
凡醫方中希用之者
左所列石麻數圖各有記號宜照前文併觀

第一圖




第二圖



甲乙 見其黑膜
丙丙 見細白條帶綠者
丁丁 見黑膜所隔
戊 見所爪取者

第三圖



第四圖



第五圖



晉按此篇所譯皆據諸術秘藏醫學寶函及裴斯等之說而此圖出諸術秘藏

火浣布の語

萬象亭

火浣布。蠻名アミヤントス。又ステインフランス
と云ふ。ステイン石。フランス布の事なり。典
籍便覧に載る所乃石麻に當り。明和年間。東
都の隱士平賀鳩溪多る者。若州の侍醫中川淳
菴と謀り。秩父山中より産する石麻以て。火
浣布以て作ると云ふ。只布乃形以成る所の云ふ。
折疊むる成り。其織と云ふ。數寸に過さ。是製
法。汝知さるに依る多り。近頃。重船乃。荷十束さる。

ヒブ子ルスの名 紅毛人 ボイス 赤毛人 等 著 一 書 の中

に委其製法以て載る。家兄の語るに。往年。粟客乃
旅亭あり。對話の時。火浣布の談及じ。鳩溪に贈る
にせらる。石麻以て出し。加比丹 カビタン アウレントウレンニヘイ
トに鑒定せしめんとす。此物上好の石麻なり。此より
製し。こゝんに。極品乃火浣布以て織成と云ふ。ね吾本國
に。製し。こゝんに。見せしめんとす。やうて取出し。こゝに
或見ま。地組切る。きんの如く。大き二尺四方乃手拭
形。掌に入て揉む。手當る木綿に異なり。時に

へイト。傍多ふ火壇に引寄せ。件の布は烈火の中へ投入。火箸より引寄せ見せし。聊も焼損せし。自若し。故の如し。退て考ふに。家藏の室唇に載る所の法は。以て石麻に製せし。若くは風土の違ふ。彼邦に作ら火浣布の如く。織得ざる。とせし。暇にふ日製し試んと申さし。有りき。

槐園云。此其所著紅毛雜話中載之。其書大行如予萬國新話序所言。後書賈因他事有所懲艾。而吹冷藿坊間秘之。闔閭不出。恐後大不得此等之

說。故不厭踏襲。援而附録。于茲耳。一

與氣奪氣使物死活之器 槐園

大矣哉。氣之生育萬物。自夫含靈。達其飛翔。群走。跛行。喙息之屬。凡此生物。無巨無細。無顯無微。盡莫不資生焉。得氣者生。失氣者死。夫陸處以為生者。元在氣中。吐納運動。不得斯須離也。則失之而之。死固其所也。可畧而知也。雖則蟠地之木。殖土之毛。亡論乎不見風日。則失生育。連其根基。所潛據深蒂。非得土中所含蓄之氣。則枯槁矣。然此尚

可言也。至如此淵，躍底潛之水，屬似不復仰氣而生者，猶尚失氣則死。此殆衆慮之所不達也。何以徵之？予於泰西氏知之。泰西氏裴斯所撰各中及予所珍藏物，粵列兒獨別私哥烏印屈列書名物粵世界也。別私哥烏者，窮理學也。印屈者，法助也。諸上法成一法，則猶言窮理學也。是皆以火氣水土之四元行為四部，網滿世界，凡屬是四行之事，千倍萬端，莫不彈說窮理。其微蓋彼土學校亦為造成髦士教育學士會其等載其試器與圖說近通知天地間之事也。

白河族某生素崎陽譯有井有所微製藩君借之予侍側觀之一如泰西氏所論實奇器也。迺試將小

會若小獸，納其器中。其器用硝子，可透觀知其蹊蹊。乃如法奪其氣，初則失勢，中之脚痿脛弱，不能起。猶能視焉，及其終也，頽乎仄焉，即為復生機之設。更始與氣，則卒然舉首奮然起焉，倏忽復常焉。顧視飲啄，莫不自若。又試諸水族，用器盛水，放小魚其中，照前法施設其機。其始也，喁喁如醉，險須失常。少選輒漬而橫浮水面，迺轉機活之，則亦應手而蘇。游泳相忘其中，觀畢放歸之，體軀精神毫無虧損。咸莫不奮飛挺犇，攸然而去。此予所親

自檢視尤大彰明較著者耳借器之際使侍臣問其施設法俟以圖記見醜予登時謄寫而藏焉今舉于左



リユクトボプ之圖

以諸般鼓索升降之水之器如布律密翻車等之類皆謂之密翻車也。是布者設機以鼓索使風氣以此為術之類也。其器數種不一施用亦多。此特其一種。驗死活因氣者已悉詳。泰西諸君亦載。



足ニテ西方フム

散圖



甲ハ硝子ナリ。此中へ何ニテモ生類ヲ入ル。魚ナレハ硝子ノ小器ニ水ヲ入レ。其中ニ放ツ。何レモ乙ノ上ニ置ク。

甲ノ下乙ノ上ニ子ジアリ。氣ノ泄ヌヤウニ能クシナル。

甲ノ硝子口ノ処ニ。庚ノ子ジアリ。此ヲモ能ク固メ。氣ノ泄ヌヤウニスル。

丙ハ氣ヲ通シ。或ハ塞ク。此ノ子ジ。鈕子ヲ横ニスレハ氣通シ。豎ニスレハ塞ク。一

丁ハ氣ヲ運送スルモノ。丁ノ口。穴ハ櫛ノ

木ノ棒ヲ通ス。戊ノ印是ナリ。戊ヲ揚レハ氣

ヲ吸ヒ。戊ヲ下セハ氣ヲ吹キ入ル。

己ハ。丁ヲ下ストキ。硝子ノ内へ氣ヲ入マシ

キ為ニスル息ヌキナリ。己ヲ丁ノ方へ向オ

キ丁ヲ下ス。己ノ溝ヨリ氣泄テ。硝子内へ入

ラス。

サテ死ニ用ルニハ氣ヲ吸フ。氣ヲ吸ニハ。丙ノ穴ヲ氣ノ通ルヤウニ。子ジ直ニ置キ。丁ノ

棒ヲ揚ル。丁ノ棒揚リテ。丙ノ子ニシテ元ノ如ク。溝ノ方丁ニ向フヤウニシテ。丁ヲ戻シ下ス。斯ノ如ク五六度。或ハ八九度ニテ。己ニ死ニ至ルヘシ。見ル其終活ニスルナリ。
活ニスルニハ。丙ノ溝丁ニ向ヒアルヲ。其終丁ヲ上ルトキハ。丙ノ溝ヨリ氣入り。丁ノ筒ノ中ニ氣ヲ含ム。其時丙ヲ子ニ直シ。通スルヤウニシテ。丁ヲ下ス。丙ニ含ミタル氣。硝子内へ入レハ。活ヲ得ルナリ。斯ク五度ホトシテ。

然レテ後ニ硝子口ノ處ニアル庚ノ子ニシテ。戻シテ採取セバ。活ルナリ。鳥モ魚モ同シ。

洎夫藍

晉按洎夫藍之為物。其功殊異。漢人亦頗知其能。本邦亦往々貴重之。然元末各土之所不產。亡論不識其物狀。併其効用。不得其實者。固其所也。東壁據其所視。目以為異地。红花僅知其主。治心憂鬱。積氣悶不散。活血久服。令人心喜。又治驚悸傷寒發狂。亦其功之不可以已也。如

是邪。此只其所發明若傳聞而如是也。則其原
士之經驗試功。人誰不欲觀之者哉。
昇平之鉅澤。遠人慕義。有異國異書。採航九萬
里而來。自夫徃籍所不載。前賢所不知。未嘗不
彰明較著。如披雲霧而覩白日。豈不亦一大盛
事乎。夫漢土之於我。僅是同州相望。其在比鄰
然。未能讀其舶來。無和訓之書者。寥寥亡幾。區
區感述矣。泰西懸隔斗絕。自其所貫習而視之。
書字如蚓耳。其出言如鳥語。

述彼泰西。斗絕懸隔。其所記載。固耳目之不貫。
書字如蚓。出言如鳩。豈可與比鄰對壤。耳目久
已。習貫。殆如固有者。同日而語哉。迺能讀之。文
義事物。鑿々可據。冰釋理順。不啻如與殊方異
域之人。交臂促膝。言論於一堂之上者。宣易得
乎。縱其翻譯之舉。僅止異聞奇說。人之所未曾
有。染指焉。亦足以資宏覽之談柄。供博物之一
助。令固執蛙見者。破蝸角之褊爭。偏安摸索者。
開豁眼於全象。又矧進之而利用。進之而厚生。

物隱。令人無天。昏札瘥之備。往籍所不載。前賢所不知。得之而知。得之而明。者豈不知珍而寶之哉。如此泊夫藍。槃水譯畧於前。桂公翻詳於後。源委曲暢。綱目悉備。無復餘蘊。後或得活本。藝殖諸斯。以共整事。以廣濟民之仁。惠則其培。養修治。百爾所需。偪焉則牆面耳。

六物新志

槃水

茂質按泊夫藍者。西洋諸國所產花內之葉也。漢人李氏載諸其本草綱目。命以番紅花者。蓋唯觀

舶來乾枯者。因其形狀。差似紅藍花。妄稱之耳。且以此謬見。終次之於紅藍花條下。可謂寃矣。而其有泊夫藍撒法郎之釋名者。俱對譯於番名。而填以字音也。余質正諸西醫之群籍。而得及其全狀。及性功之詳焉。於是試之於疾病。殊功奇驗。莫不響應焉。實乃圭家之大奇品也。哉。今采圖及主治於西醫鐸度涅烏斯之本草花部。取說於富葉都之書。摸譯而錄出。欲以此物。免其寃。而與天下之人。同建奏其殊功奇驗而已。

泊夫藍全狀圖

右出于鐸度涅烏斯本草花部



鐸度涅烏斯本草泊夫藍主治曰解胸中結痰通肺氣窒塞能開散鬱閉故強志益氣和筋脉神經

利眼耳鼻口或療頭面重而不仁或使人忘憂而悅虛弱之人服之裨益殊多卒死者復其脫氣而立甦用之自壹伍釐至叁分葡萄酒送下喘急卒發者亦葡萄酒服久喘難愈者亦有效食滯酒毒隨証加他藥為之引使又能開通肝膽閉塞故兼治黃疸而使肌膚復於其本色故先哲曰俛斯可里垓和所謂泊夫藍能使人面悅澤者以此言之也日俛斯可里垓和又曰此物作諸湯方內則治藏府諸疾外則通利關節又與衆藥相合則或隨

胎或通經開或下胞衣又作膏則治諸瘡瘍故膏
藥方中用之者居多凡此物宜鄭重戒服量過度
若實熱鬱菀於上部之人則尤慎勿多服恐其開
發之氣猛烈而使火煽動故也或曰此物能益氣
力故艱產婦人作其隨証之本湯而加此物少許
與之則大有効又一切咳嗽吐血者並用之甚驗
凡諸病在胃膈者悉皆主之用之自壹分伍釐至
肆分伍釐喘哮喘則加麝香壹分陸釐溫烈酒凡
中酒也下微之葡服有効冬月凍死者與之立甦

蜘蛛及蝎之螫傷亦服之妙俗間相傳方頗服白
夫藍三錢煎汁則能開散憂鬱故使人悅樂喜笑
不已凡此物和酒服之則其味異常故服之者動
過度而却受害者多甚者至歡笑如狂故宜微々
服之莫不有効焉
富葉都之書曰白夫藍梅吸蒲俗所著之
所呼之羅甸語謂之歌盧修斯原產於東方亞細
亞洲之諸國今則以西把尼亞諸厄利亞拂郎察
奧矢突利亞于歐邏巴洲麻打曷矢加爾島屬地

利加^ア洲^ア都兒格^{トル}百^ル西^ル亞^ヤ西^ヤ細^ニ吐^ニ國^ニ俱^ニ屬^ニ于^ニ等^ニ諸^ニ
國多產焉。而特以^テ喫^ク矢突^ス利亞^ヤ亞^ヤ覽^ス斯^ス河^ス岸^ス之^レ所^ニ產^ス
為最上絕品。殊勝於東方及諸國之所出者焉。其
物則其草花內之中心必作三線之葉者是。而其
葉恰若細長舌狀。其色赤黃。其味辛而帶微苦。頗
似有油氣。其氣極芳烈。而直撲人之鼻。按列聖加
其草春生。苗秋開。花六瓣。其色純黃。
其香似百合。花謝結實。共作三房。而其花內三
葉之間短矮之六葉相錯雜而生。其末各作淺黃
色。此六葉則不堪入
藥。唯用三房耳。其根則似葑蒜而作毡蓋品。

類無數。形狀亦隨地而少異。故不可以一定認之。
也。凡使用或生煮或末服。
鑿法。花葉強厚而長闊。其色鮮紅而清潔。不粘滑。
馥郁有芳香者為佳。其或腐黑或有黃白之污點
者皆不堪用。
主治。緩拘急。止疼痛。強心氣。益精神。使眠者覺通
利。經閉兼有催生之功。此物專為肺藏之要藥。故
名曰亞尼麻畢爾木奴模。此翻入肺
之藥。大抵其功與
拔爾撒摩樹脂相同。凡配合之於方劑者甚多。其

用之之量法。生而單用者三分三釐強。配合於方劑者。貳分伍釐弱。以為率。

泊夫藍種藝法

月池

泊夫藍羅甸ニテ「コロクスト」ト云種類甚多シ其中春秋ヲ以テ之ヲ分ツ春泊夫藍ト云者ハ冬月苗ヲ生シ早春ニ花ヲ開ク秋泊夫藍ハ七月苗ヲ生シ八月花ヲ着ク其名狀功用並ニ下ニ詳ニス

形狀

花ハ百合ニ似テ花頭六瓣ニ分レ其モトハ管ニナリテ漏斗ノ狀ノ如ク其鬚葉三條アリ花謝シテ實ヲ結フ三稜ニシテ長ク内ニ三隔アリ隔内多ク種子ヲ胎ム根ハ水仙ノ如ク球ヲ為シ其葉ハ狹長ニシテ正中ニ白條文一道アリ

種類

此物品類甚タ繁シ其有名ノ者二十三品左ニ舉ク

第一 コロクスト ヘルヨス ステリアス フルカリス

其花斑點アリ異様泊夫藍ト稱ス。

第二 コロックス ヘルユス ヲツテウス フルシコロル
プリムス 其花淡黄色上品 金哆囉呢 泊夫藍
ト称ス

第三 コロックス ヘルユス ラキホリウス フラユス
黄泊夫藍ト称ス

第四 コロックス ヘルユス ミユス アルビカンス
小白花ノ者ヲ云

第五 コロックス ヘルユス フローレ アルボ
ヱルプレヲヒヲラセヲ バリス 其花白ク心

淡紫色ノ者ヲ云

第六 コロックス ヘルユス ラキホリウス フラハ
ヘリヲ フローレ ヲツテウス 金哆囉呢 泊

第七 コロックス ヘルユス ラキホリウス
夫藍千葉ノ者ヲ云

第八 コロックス ヘルユス ラキホリウス フラハ
其花小ニシテ 闊瓣淡黄色ノ者ヲ云

第九 コロックス ヘルユス アンクス キホリウス
ホハリウス 闊瓣黄點アル者ヲ云

マグノ フローレ カンギト 細葉大白花ノ者ヲ云
第十 コロックス ヘルユス アルユス ストリヤ五ス
白花斑點アル者ヲ云

第十一 コロックス ヘルユス アルユス ポレイアントス
フルレコロル 白色ニシテ數花ヲ着ル者ヲ云

第十二 コロックス ヘルユス ラキホリウス フローレ
ペニ五ス アルボ アット インヒマ 毛プニパルム クウ
ユレスケンテ 白花ニシテ茸毛アル者ヲ云

第十三 コロックス ヘルユス ラキホリウス フローレ
ピルプレヲ マグノ 大葉大紫花ノ者ヲ云

第十四 コロックス ヘルユス ラキホリウス ピルプレウス
ハリীগキヲス 大葉紫花斑點アル者ヲ云

第十五 コロックス ヘルユス ラキホリウス フローレ
クールレヲ リ子イス ヒヲラレイス ハリイガト
其葉繁ク其花淡紫碧色ニシテ斑點アル者ヲ云

第十六 コロックス ヘルユス ラキホリウス アルユス
ヘル シ子レスケンズ 葉闊ク花灰白色ノ者ヲ云

第十七 コロックス ヘルユス ラキホリウス ピルプレウス

ヒシラセウス 其本小ニシテ大葉其花藕色ノ者ヲ云

第十八 コロックス ヘルユス ラキホリウス パルユス

フローリ エキスヒス パリド キム リユリス

ブルプレウス インユス クイルレスケニテ パリド

大葉小花外灰白色ニシテ紫縦文アリ内淡碧色

ナル者ヲ云

第十九 コロックス ヘルユス アンダグス キホリウス

パルホ フローレ 細葉小紫花ノ者ヲ云

第二十 コロックス ヘルユス カピツラリ ホリヲ

其葉茸毛アル者ヲ云

以上二十品春泊夫藍

第二十一 コロックス アウヒムナリス サキユス

秋ニ至テ發生スコレヲ真泊夫藍ト云

第二十二 コロックス アルピユス アウヒムナリス

牙^{アル}而^{ベス}白山中ニ産スル者ヲ云

第二十三 コロックス ユニホリウス アウヒムナリス

フローレ マグノ ブルプラセンテ 其葉蘭ニ

似テ大紫花ノ者ヲ云

以上三品秋泊夫藍

春泊夫藍ハ此他尚數品アリ好事ノ者園中ニ栽テ花ノ
新奇ヲ愛翫スル者ナリ皆子ヲ種テ種々ノ変態ヲ為
スコト「ピアレント」草燕子花等ノ類ノ如ク千状萬態究
メ盡シ難シ

産處

春泊夫藍二十品ハ歐羅巴諸國ニ産シテ吾邦亦多ク
コレヲ出ス第二十一真泊夫藍ハ「レハント」伊斯担尼
亞意大利亞「シーステンレイキ」ランクエドク「ノルマ」

テイ」及「イキリリズ」南地ニ産ス第二十二二十三ノ
二種ハ多クアルベ而白山中ニ産ス

培養

春泊夫藍ハ其性甚々強ク其根ヲ掘リ動サズ兩三
年ヲ経ル者尤能ク土地ニナレテ増生スルコト最多ク且冬月
芽ヲ生シテ早春未タ他ノ諸花ノ發サルニ花ヲ開キテ大
ニ園中ノ美觀トナル宜ク花塙ノ欄干ニ沿テ一路ニ排列
シ必ス他種ヲ雜ヘズ一種ゴトニ同ク一處ニ萃メ栽ユ
ヘシ然ラサレハ苗頭ハ高低花ノ遲速一様ナラズ

レテ観ニ宜シカラス

凡ソ根ヲ貯ルニハ葉茎根鬚ヲ連子掘起シ曝シ乾シ
乾クヲ候テ茎葉ヲ除去リ收メ貯ヘ七月ニ至テ新土
ニ分テ栽ユ根葡ヲ貯ル同勤テ鼠ノ侵サレヤウニ
スベシ鼠尤好テ之ヲ却避ムモノナリ特ニ防禦スベシ

十二月ノ初天氣融和ナレハ芽ヲ發ス其葉僅ニ長スレ
ハ茎ヲ抽テ花ヲ開ク花謝シテ後其葉長スル者六寸
許ヨリ八寸許ニ至ル後葉乾枯シテ觀ルニ堪ザレト必ス
芟去ベカラズ若其葉ヲ剪去レハ根葡衰テ肥壯半ク

減シ明年花ヲ着ルコトモ亦多カラス大抵三月ニ至リ
テ其實熟シ其葉漸ニ萎黄ス

秋泊夫藍三種ハ春泊夫藍ニ比スルニ甚ク弱クシテ
イタニ易シ宜ク煖地ニ種ヘシ吾邦ノ如キ氣候寒キ
地ニテハ實ヲ結バズ其本土ニ生シテ三年以上ノ者ヲ移
シ栽ヘシサレト其根ヲ掘起シ貯ルコト六月ノ初ニ過ヘカラス
七月ノ末八月ノ初ニハ花ヲ發スル故早ク栽サレハ發生ノ氣衰
テ花モ亦多カラス宜ク時ニ趣テ疾ク地ニ下スヘシ

此物吾邦ニテハ好事家ノ園中ニ栽テ花ノ新奇ヲ愛

玩スルノミナル故其培養意ヲ用サルニ非レ氏実用ニ
アタラス今余拂郎察陪入利亞等ニテ種藝スルノ
良法ヲ取テ畧左ニ條列ス蓋シ此物吾土ニ栽ル所甚
稀ナル故ニ其價モ甚貴ク用テ其功ヲ試ルルモ易カラサ
ルニ因テ其培養ノ法ヲ得テコレヲ吾邦ニ滋殖シテ多
ク国用ニ供センコトヲ冀フノミ此元吾邦使用スル所甚
ク多キモノニテ其價ノ貴ク常ニ得カタキヲ患レハナリ
凡ソ泊夫藍ヲ藝ルノ場圃大約一謨尔卧年半ニ
過ギズ一謨尔卧年約スルニ本邦
一萬四千四百坪ニ當ル小ナルモ半謨尔卧年ニ

下ラズ其地四面廣濶ニシテ瘠ズ又粘実ナラス鬆
柔ニシテ夾砂土ヲ撰フヘシ栽ツケテ二年ハ其俦ニテ
動サス第三年ニ及テ悉ク掘起シ一年其地ヲ休シ
或ハ他物ヲ種ヘシ此物一年休セタル地カ又ハ他物ヲ
種タル地ニ種ルモ亦妨ゲズ就中麥底佳ナリトス
其場圃耕墾スルコト三遍ナルヘシ第一遍ハ二月ノ
初ニ於テ心ヲ用テ土質ヲ勻碎ナラシメ畦間隔カラス
溝ヲ屬^レコト深カラシコトヲ要ス若其地ニ此物ヲ栽スニ
ハ他ノ種穀ヲ種ベシ明年泊夫藍ヲ栽ルニ甚ク滋生

スルナリ初ノ耕シテ後三四十日ノ後半謀ル即半ニ百
坪毎ニ二三十車一車載ル所ノノ牛半馬糞ヲ平鋪シ
耕墾スルヲ初ノ如クスヘシ是ヲ第二遍トス夫ヨリ夏
ノ半ニ至リテ耕スヲ第三遍ト為ス此時十六半夫土
一夫土 本邦九寸三分五厘ヲ一壠トシ四圍ニ廣ク溝ヲ劌リ其一
壠ヲ數畦ニ分ツヘシ尤モ意ヲ着テ圃中ノ雜草ヲ
除クヲ要トス圃ノ周圍ハ細キ木枝ヲ編テ垣トナシ獸
畜及ヒ其他ノ觸冒ヲ防禦セヨ免喜テ此物ヲ食フ旨
ク之ヲ防クヘシ

此物ヲ栽ルニ僅テ天時ヲ視其害有ラ量ルヲ要トス
夏月酷熱ノ時最モ種ルニ宜シ若シ過雨ノ後ニ之
ヲ種レハ萬ニ一ヲ失ハス秋収モ亦甚多クシ初メハ暴寒
雨雪等尤モ根腐ヲ害ス

栽法ハ五月中第三耕ノ後不日ニ之ヲ栽ユヘシ但天
氣宜ラ得サレハ少シノ遅速ハ必シモ拘ラズ先ツ一人斯
筆咨ス斯可布耕具ノ名ハ其狀細辛葉ノ如キ者
細辛葉ニ似テ尖リナリ斯筆咨ハ尖ナリ據テ梅スルニ其狀
タル者ナルベシナル者ヲ執リ畦ノ一邊ニ就
テ三四寸ヲ隔テ、土ヲ穿ツト深サ六寸許且ツ穿キ

且ツ進テ周ツ一畦ヲ穿テ了レハ復他ノ畦ニ移ル別ニ
二人ヲ用テ一人ハ根葡ヲ持テ畦ヲ穿ツニ隨テ却行シ
テ根葡ヲ排置ス大抵其間相去ル一三寸ナルヘシ一
人ハ隨テ土ヲ蓋フ是亦一畦ヲ種ヘ了レハ他ノ畦ニ移
ル此二人ハ婦人ヲ用ユヘシ畦間ノ狹闊ハ治畦ノ時ノ所
為ニ隨フヘシ此ノ如ク壟ヲ逐テ竟圃ヲ種ヘ訖ラハ意
着テ根葡ノ歪邪ナルヲ正シ安頓端正ナラシムヘシ

凡ソ半漢尔卧牟ノ地裁法上ニ説ク所ノ如クナレハ根葡
三十二七德^{ユツテ}斗ノ名一セ德大約ヲ裁ヘシ大抵根葡柵指
水八斤ヲ容ル

大ノ者其數三十九萬二千零四十箇ナリ
栽過ノ後七月中ニ至ルマテ別ニ事ナシ芽ヲ生スル
ニ及テハ宜ク其根ヲ培壅シ勤テ畦間ノ雜草ヲ耨去
ルヘシ耨鋤勤サレハ大ニ發生ヲ妨ルナリ且苗ヲ生ス
ルノ後不日ニ花ヲ發ス其花ノ充分放開セルモノヲ摘
採ルナリ治圃ノ者侵晨ニ多人ヲ用テ各手ニ摘採
ルヘシ摘テ把ニ盈レハ之ヲ大籃ニ投シ盡ク摘訖ラ
ハ持歸リテ大几卓上ニ攤用シ其花中ノ葉ヲ拔トリ
其葉ノ葉ニ看タル處及ヒ其花ヲ捨テル次早又摘採

ルノ前日ノ如ク葉ヲ取り一処ニ葺ノ日見此ノ如クシ
乾タルト未タ乾サルトニ拘ラス混シテ収ノ貯ヘ日ヲ逐
テ摘採リ以テ其盡ルニ至ル

修製

右ノ如ク鬚葉ヲ採リ貯ヘ置キ左ニ説ク如ク焙籠
ヲ造リテ焙リ乾スヘシ先ツ板ノ厚サ三寸許ナル者
ヲ以テ匡ヲ造ル其内ノ径方尺二寸高サモ亦尺二寸下四
短脚ヲ以テ之ヲ蔽ク其前面底ノ板ヨリ四寸上ニ口ヲ開
ク方八寸ナルヘシ以テ火ヲ入ルニ処トス匡ノ内四方皆

石灰白堊等ヲ以テ厚ク塗り其底ヲモ塗りテ中ヲ
凹ノ火ヲ受ル地トス別ニ上寛ク下窄キ無底ノ匡ヲ
造ル口ノ径二尺二寸高サモ亦二尺二寸下ノ径尺二寸
火ヲ容ルニ匡ノ上ニ緊ク釘帖ニシ其上寛ナル匡ノ中分ニ
粗キ毛織羅ヲ張り其両端ニ軸ヲ施シ螺轉或ハ榑ヲ設
テ其毛織羅ノ常ニ張テ弛ニサルヲ要トス或ハ毛織羅ニ代
ルニ鉄網ヲ用ル者アリサスレハ少ノ間火ヲ用テ連ニ乾クト
雖モ動モスレハ焦レタル味ヲ生ス故ニ先輩皆毛織羅ノ
鉄網ニ勝ルトヲ辨シ置タリ

焙籠ハ宜ク明火ニ安ヘシ先ツ白紙五六張ノ毛織羅ノ
上ニ敷キ花葉ヲ平鋪スルコト厚サ三寸許又白紙數張ヲ用テ
其上ニ蓋ヒ布ノ粗ク厚キ者五六重ヲ置リ或ハ之ニ代ルニ
粗布ニテ袋ヲ造リ稻草ヲ充タル者ヲ用ルモ亦可ナリ右
ノ如クシテ少間ク火氣ヲ通ラシメ板ヲ用テ蓋定シ其
上ニ重キ鎮ヲ置ヘシ

火候ハ初ニ武火ヲ用レハ此物ヲシテ柔軟ナラシム然レハ心
ヲ用テ將息セサレハ動モズレハ焦レ或ハ鬱壞シテ用ルニ堪
ヘス

上法ノ如ク焙ルコト一小時許ニシテ鎮及ヒ木蓋ヲ取り粗布白
紙順ヲ逐テ挑ケ去リ上蓋ノ紙ニ着タル鬚葉ヲ能ク拂ヒ
取り鬚葉ノ餅ノ如クナリタルヲ四邊ヨリ刀ニテ挑ケ起シ
再ヒ紙ニテ蓋ヒ下ニ敷タル紙ト毛織羅ノ間ニ板ヲサシ
入レテ上下ニ及覆シ再ヒ焙ルコト初ノ法ノ如クス
右ノ如ク及覆シ火候モ亦初ノ如クシ焙ルコト又一小時ニ
シテ取出シ餅ノ如クナリタルヲ撒用シ再ヒ焙籠ニ入レ
前法ノ如ク之ヲ育ス此初次二小時ノ間焦レ或ハ鬱
壞等ノ失誤ナクシハ其後火候ヲ節ニス少要トス其

火候ハ稍文ナレニ宜シ且小半時及覆ス上ニ復ク所
ノ如クスヘシ大抵二十四小時ニシテ焙乾ノ事終成ス
火ハ必ス木炭ヲ用ヘシ他物ハ烟氣多ク火力モ久キニ
耐ヘズ故ニ木炭ヲ以テ最上トス

此物摘採ノ候多テ三次トス毎一次各七日總テ二十
一日ヲ期トス第一次摘採所ノ者ハ生葉四百八十錢ヲ
焙乾シテ九十六錢ヲ得ヘシ第二次第三次ニ採ル者
ハ五百七十六錢ヲ焙乾シテ九十六錢ヲ得ルナリ
大凡根葡萄密排スル半漢尔臥半ノ地ニテ第一次

摘採所コレヲ中等ニ積リテ百九十二錢ヲ得第二次
第三次得ル所二貫三百零四錢ヲ得通計得ル所
二貫四百九十六錢ナリ其摘採スル所第二次ハ第一
次ヨリ多ク第三次ハ第二次ヨリモ亦甚タ多クシ

収根

花ヲ摘ムノ後明年三月中ニ至リテ根葡萄ヲ掘起シ
移シ栽ルノ備ヲ為ス先ツ巴突古^{バツトク}耕具ノ各其状
ナル者ヲ以テ根ヲ傷ラス遺漏ナキヤウニ再三掘
起スヘシ又十五人以上ヲ用テ其根葡萄ヲ採収ノ

シムベシ

根葡ヲ掘起シ袋ニ盛リ持歸リ舊根並ニ附着
スル所ノ宿土及ヒ莖葉皮膜等ヲ取去リ収メ貯レハ
再々新土ニ栽ルニ便ニシテ兼テ腐敗ノ患ナシ

根葡ノ收穫ハ初ノ栽ル時ノ疎密ニ因リテ多少一
ナラス然レ大抵半漢ル卧与ノ地培養防護失
誤アラサレハ壯滿無病ノ根葡栽種スベキ者四十八
セ徳ヲ得ヘシ

根葡ノ栽ルニ堪タル者ハ肥大ニシテ圓ヲ成ル者ヲ用

フヘシ瘠テ尖リ長キ等ノ者皆用ルニ堪ヘス

主治

此物常用及ヒ藥用ニ供スル者共ニ真洎夫藍ナル
者ヲ用ユヘシ其功用尤多シ先ツ常用ヲ以テ言トキ
ハ茶ニ和シテ服シ食膳ニ用ヒ莖餅等ニ雜ユ又染料ニ
用テ黄色ヲ染ム即チ洎夫藍色ト稱ス如シ夫レ醫
藥ニ用ルトキハ實ニ千金不換ノ良藥ニシテ特ニ胸膈
及ヒ肺藏ノ諸疾ヲ治スルニ最妙ナリ故ニ哮喘喘息肺
癰肺痿痰熱瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧不利心悸怔忡四支

顛掉眩暈中風心志鬱結夏同等ノ諸症ニ神効アリ得俵弗尔巴刺色尔須私ナル者此薬ヲ以テ解患ノ神薬ト稱スルモ右ノ功用アルヲ以テナリ又或ハ疝瘕腹痛大小便不利赤痢黄疸沙石淋病血液凝泣経閉難産諸中毒惡邪熱症及ヒ天行疫疾ヲ治ス

以上ノ主治相傳テ世人ノ遍ク知ル所ナリ今テコレヲ考ルニ尚茲ニ止ラズ元來此物急ヲ緩ノ壅塞ヲ通シ神氣ヲ壯ニシ虚ヲ補ヒ痛ヲ止ルノ功アリ故ニ経閉ヲ通

シ子宮中ノ瘀物ヲ除キ久咳嗽短息氣急等ヲ治スルニ各症ノ主方中ニ少許ヲ少レハ其効最速ナリ又腸胃中ノ稠粘ノ瘀液ヲ通利シ勞瘵肺癰肺痿等ニハ專ラ此物ヲ主薬トナシ多ク用テ大功アリ或ハ稱シテ肺藏ノ神ト云コヽ只ハ肺病ヲ治スルノ靈薬タルヲ以テナリ又外治ニ用ル者ハ諸腫瘍燥痛スモノ水濕ヲ含テ腫起スル者或ハ腫硬ク疼痛甚キ者ニ膏薬ニ和シ或ハ慰薬ニ加ヘ用レハ成ラサルハ消シ成ル者ハ

膿熟セシム又眼目爛腫ニ慰華ト為シ中ニ乳汁
ヲ加ヘテ用ルニ甚ク効驗アリ又痘瘡ニ用テ起
死回生ノ効アリ注船病及ヒ嘔吐甚キ者ニ小囊
ニ盛リテ之ヲ匄ニ掛クヘシ又能ク痔疾ノ痛ヲ和
ク

蘭畝俶載卷一終

蘭畝俶載卷二

美作 源 輝雄

東都槐園先生纂輯

長門 豐田宗味 校

常陽 嶺 春泰

診溺

晉讀西士南懷仁西方要記論其國醫有云醫有
内外二科内外又分為二有專以草木為藥者亦
有金石煅煉之藥兼用者其看病診脈之外以玻

璃瓶盛溺水驗其色識其病根又知病概後觀蘭
化子所藏西醫裴生著卷中有五診術焉五診者
一曰診溺水二曰診大便三曰診汗四曰診涎唾
五曰診嘔吐此溺水之外尚有四診而南懷仁特
舉其溺水而言之者竊按蓋日常所解瀉而出溺
獨居多矣且比諸他件最便于診察譬猶人身動
脈之浮在肌表可切按者不一而足而獨取寸口
及跌陽等以訣虛實吉凶為其易從事也且裴生
之論五診凡數百條而診溺之法殆半其數且為

診首者職是之由此其所以特言診溺也已友人
嶺子光名觀字春秦子光其字也為高寄侯之侍醫欲譯之以傳于世
刻苦有年惜矣哉未成而逝矣今僅得其遺稿以
載於此雖曰零篇畸冊加以未定庶乎足以窺其
端緒知其梗槩如其全論則責在幹蓋則從予游
者通卿嶺觀之子名春泰通卿其人行將繼其志
而成其業爾

和蘭五液論晉按蘭字楷梯改作五液精要然大便嘔吐居其二恐不得曰五液今不敢改

論小便第一

夫醫ノ最モ肝要トスヘキ者ハ凡ソ病ノ症候ト吾々診
法トシ能ク知覺シソノ病人ノ吉凶ヲ弁別明白ニスルニ在リ然
ノ其病症的當ノ藥ヲ與テ以テ其次序法則ヲ守リ當其
症候ヲ詳ニシ體中津液ノ有餘不足分利セサルヲ等アラハ
宜ク診察シテ之ヲ精密ニスベシ 且孳生固有スル体中有
餘ノ液ヲ外ニ瀉スル其由テ出ル所ノ路常ニ定リタルト非
常ナルトノ二ツアリ又夫ニ由テ瀉出スル液ニモ常ニ定リタル
ト非常ナルトノ二ツアリ宜ク之ヲ考ヘシ即チ吾此層ニ
於テ其專要ナル者ヲ撰述ス其症候診察ノ法ニ至テハ

亦其差別ニ從テ之ヲ考究スルヲアリ 其有餘ノ液ヲ
由テ瀉スル所ノ路常ニ定リタル者トハ何ソ之ヲ論スルニ固ヨリ
五ニ出テズ一ハ小便ノ出様ニハ大便ノ出様ニハ汗ノ出
様四ハ涎ノ出様五ハ嘔吐ノ様ナリ今是五ノ者ノ内一ツカ
又ハ三四カニ於テ病症ヲ現ストキハ醫者意ヲ用テ之ヲ
察シ之ヲ治シテ其故ニ復ラシム又其自然ニ瀉スル液ニ於テ
汗吐下等ノ過度ナルニ於テ其患ヲ戒慎シテ自然ニ乖戾
スル者アルハ以テ下條ニ於テ各コレヲ詳ニス 其非常ノ
瀉トハ噴清涕水泡薰法蒸法刺絡起腫潰破等是

ナリ其一処若クハ二三処各部ニ從テ各其治ヲ至リ届カシム
ヘシ然レモ右ノ諸術内科ノ醫者ニ在テハ尽ク具ルコト
ナレ外科ニ属スルコト多クシ尙コノ層ニ於テ續録ス 夫
吾生固有ノ餘液ヲ洩出スル其理如何ト考究シテ
之ヲ明白ニスヘシ且小便ヲ洩出スル其最要ニシテ称
スヘキ者ヲ詳説ス即チ其看法ハ古ノ醫者其要ヲ説示
セリ吾乃是層ニ於テモ尤篇首ニ之ヲ述フ 小便ハ
元ト如何ナル者ソ小便ハ吾カ体中経脈ニ保在スル血中
ノ鹹キ液ト諸ノ津液トナリ 小便ニ於テ在ル者ハ

本ト小便中ニ具在シテ尤モ称レ數又キ物即チコレ
鹽。硫黃。土。水。氣。ナリ又酸味灰汁。油脂。飲食ノ
液等ニ至ルマテ附合スルヲ為ス 小便ノ分利ヲ為ス
ハ何レノ処ヨリス諸ノ藏府ニ在テ種々ノ物ヲ血ヨリ
漉シ出スヲ為ス下項ニ説カシ乃チ肺藏ヨリスル者
ハ牛脂ノ如キモノヨク皮下ノ机里尔ヨリスルモノハ鹽ヲ
シク膽ノ府ヨリスルモノハ膽汁ニシテ大机里尔ヨリス
ルモノハ種々ノ酸味等ナリ 即チ多ク学者コレヲ較著明
備ニスルカ如シ肝ヨリスルモノハ油ノ如キモノ多ク脾ヨリス

ルモノハ酸味及ヒ酸鹹味多シ此ハ胆汁ナリ乳脉
ヨリスル者ハ飲食ノ液多ク水経ヨリスル者ハ如キモノ
多ク唾管ヨリスル者ハ是レ唾ナリ神經ヨリスルモノハ
生靈ノ氣ナリ骨管ヨリスル者ハ髓液多ク膈肌里尔
ヨリスル者ハ此血ニ入ルモノ大ニ多シ腎ヨリスルモノハ則チ
水ノ如キモノ且灰汁ノ如キ物多クシテ夫ヲ小便ニ漉シ
出シ小便ヲ送ル脉ヨリ胞脱へ持来リ從テ其処ニ保チ
溺道ヨリ外へ泻出スルナリ夫レ此ノ態ニ於テ実ニ肝要
ナルヲ醫常ニ商儀シテ精ク知テ小便ヲ能ク見覺へ切

實ニ弁別シ常ニ体中何レノ部ニ病アル又其藏府何レノ
部殊更ニソノ液ヲ血ヨリ漉シ出スヲ考索セリ
其小便ハ是レ幾品アル常ニ考ルニ小便ハ是レ二品ナリ
所謂ル血ヨリスルト飲物ヨリスルトナリ其血ヨリスル
小便ト名ル者ハ其血ト共ニ一身ヲ周流スル間已ニ其血中
ニ混淆シテアリ人々ノ性ニヨツテ後夜ニ於テ小便ト為リ
或ハ曉ニ當テ小便トナルアリ醫者總テ見ル所ノ終ニ則チ
其血ノ交ル状ヲ監識セリ飲物ヨリスル小便ハ其人
曾テ多飲セシヨリ屢泻出スルヲ為ス血ノ交ル状ヲ監識

スヘキヲ無シ其血ノ混淆スル間ナキカ為ナリ 無病ト
有病ト小便アリ是レ血ヨリスル小便ニ無病ト有病トヲ再ヒ
分ツコト為ス 血病ノ小便ハ人ニナヨリ五十ノ年齢ニ至ルマ
テハ佛手柑色或ハ金黄色ヲ為ス夫ハ程ヨク濃ク分量モ
常アリ且ツ微ク重キ臭アリ而シテ尿管ノ底ニ白ク中高ニ沉ム
モノアリ是ノ如キ小便ヲ醫者常ニ見覺ヘ居テ病人ニ対シ
其小便ニ病ヲ見ストキ己ニ説ク無病ノ小便ノ様子ト異
ナルコトアルヲ考ヘ弁スヘシ 病アル者ノ小便ハ或ハ血病
ノ者ノ小便ニ異ナルコト多クモノアリ少キモノアリ 殊更

ニ小便ノ看法ヲ説ク蓋シ其看法ニハアリ一ハ其小便
ノ質ナリ濃淡清濁アリ二ハ多少ノ分量ナリ三ハ汚出ス
ル音ナリ清濁アリ四ハ臭ナリ重キ臭アリ辛キ臭アリ酸
キ臭アリ悪キ臭アリ又総テ臭ナキモノアリ五ハ味ナリ鹹苦
甘アリ六ハ色ナリ白黄赤黒アリ而シテ就中各其種類アリ
七ハ小便ノ中ニ保在スルモノナリ尿管ノ底ニ沉ムモノアリ中
分ニ掛ルモノ雲ノ如キアリ冠ノ形ニ似タルアリ尿管ノ
上多ニ浮フ霧霞ノ如キアリ又尿管ノ側ヲ染ルモノアリ
各其処ニ於テ之ヲ説ク 其因テ發ル所ニ從テ三ツノ

異ナルアリ一ニ小便ノ性ニ小便ノ質三ニ小便ノ流来
ル部ニ因ルコトアリ 其小便ノ性ヲ弁セニトセハナルタケ
無病ノ者ノ自然ノ小便ニ因テ之ヲ分弁セヨ一ニ小便ノ
状ニ因テ分ツ夫ハ無病ト有病トナリニニ男子ト婦人トノ
種類ヲ分ツ三ニ人ノ自然ノ寒熱燥濕ノ程度ノ異ナ
ルニ因ル四ニ小兒少壯老人ノ年莖ニ因ル五ニ春夏秋
冬ノ候ニ因ル六ニ土地ノ土風ニ因ル寒ト熱トナリ七ニ
小便ノ出来ル持前ニヨル夫ハ卧ト起トナリ八ニ勞佚ナ
リ物ヲ持荷ヒスル人カヲ勞スル人又休息スル人ニ因テ

別アリ九ニ食物又ハ内葷ニ因テ別アリ十ニ情ノ動クニ
因ル喜怒哀楽ナリ然ト雖モ吾思フニ其変ニ至テハ斯
ノ如キニ因ルニモ非ス故ニ医者小便ノ状ヲ明察シテ常ニ精
ク考ヘシ蓋男子病アルトキ其小便毎々其色ノ薄キコトアル
等女子ノ小便ノ如キコトアリ毎々少壯幼穉老人ノ小便差
別ナクナルカ如シ而シテ且ツ多ク他ノ病症ヲ見ハスコトアリ蓋
此ノ二ツノ者ヲ處スルニ一ハ無病ノ自然ニ於レ一ツハ有病ノ
非常ニ於ス其無病ノ小便ニ病小便ヲ持来ルコトアリ是ノ
中ニ於テ彼ヲ分別シテ切實ニスヘシ猶其種々ノ精キコトハ

此昏ノ終ニ見ヘタリ。其小便ノ質ハ其人ノ持前
ニ因ル乃小便ノ性ニ從フナリ其年齡種類寒熱ノ程度
無病ト有病等ニ從フ其鑒識ノ差別ハ後文ニ各コレヲ具ス
小便ノ由テ流レ来ル部分ハ膀胱ノ中ニ膿腫アレハ膿
ヲ小便スルナリ夫ハ総テ血中ニ膿ノ滿テアル故カ然レ非ス
其人膀胱ニ膿腫アリテ小便流レ出ニトスルトキ其膿腫ノ
部ヲ摩スルカ為ナリ其餘皆コレニ倣ヘ小便ノ看法ハ則チ
説到テ此ニ詳ニス宜ク考ヘレ其法十アリ一ニ小便ヲ察
セニトセハ宜ク血ヨリスル小便ヲ以テスヘレ其二清キ硝子

ヲ膀胱ノ形ニ造リ而レテ尿管ヲ即チ注入ルヘレ其三
斯須ノ間ソレヲ静メ置クヘレ則チ小便中ニ存在スルモノ
順テ分ルナリ其四或ハ空氣ニ因テ其硝子中ノ小便濁ヲ
ナス者ハ宜ク文火ヲ以テ再ヒ之ヲ澄スヘレ其五硝子ヲ置
クハ宜ク熱セス寒セサル処ニ置クヘレ其六硝子ヲ置クニ氣
候ノ変ヲ防クヘレ又塵埃ヲ防クヘレ其七甚明ナラス甚暗
カラサル処ニ於テ看察スヘレ其八硝子ヲ置クニ目ノ便
利ナル程ニ於テスヘレ^{遠近ナキ}其九看察スル始ニ於テ宜
ク動搖スルヲ無キヤウニスヘレ其十傳染疫或ハ重キ疼痛

且熱痛等ノ惱ニ於テハ宜ク先ツ其硝子ノ上面ヲ見テ而メ
後其下面ヲ見ルヘシ

小便質

小便ノ質四アリ一ニ濃ニ淡三ニ清四ニ濁其中ニ
消化ト不消化トヲ相屬ス

濃小便 小便ノ程ヨク濃キモノハ是レ無病ノ状ナリ

濃シテ白キ小便ニ白キ膿ヲ作りコミタルハ是レ溺道

ニ膿腫アルニ由テ来ルナリ 濃キ小便黄赤色ニシテ

惡臭アリ且膿ノ如キモノヲ作りコミタルハ是レ腎ニ膿腫

アルヨリ發ス 濃シテ粘リ終リニ痰ノ如キ者尿管

底ニ沉ル胞脱ニ膿腫ヲ為スト知レ 別ニ濃キ小便總テ

消化セス且痰ノ如キモノ多ク而シテ土ノ如キモノシ現スハ是

レ血ノ多キ者ニ於スルナリ

淡小便 淡キ小便ハ是レ熟セス消化スルヲ無キノ徵

ナリ 淡ク赤キ小便ニ淡キ沫ノ浮タルハ是レ脇痛病又肺

熱痛ト知ルヘシ 其小便濃淡程好相叶ヒテ能ク熟シ

タル淡キ濁ニ倍タルハ其ニ是レ無病ノ徵ナリ

清小便 其小便時トシテ甚ク透通リテ且光アル者ハ

是レ氣鬱病及ニ自体疼痛ノ病ノ徴ナリ
消化少ク且澁キ小便ニ惡臭ノ久ク止テ去ルハ尿道ノ外
邊ニ三部ニ腐アルト知ヘシ

濁小便 濁小便 軛獸ノ小便ノ如キハ頭痛及ヒ「バーセ
リイ」^痛病ト知ヘシ 濁小便 惡酒ノ如キハ頭痛ヲ患フ
ト知ヘシ且或ハ其人持病ニ昏睡病アリ 夫レ小便ノ
濃淡清濁ヲ并別スルヲ為スニハ宜ク其尿管ヲ目ノ便
利ナル処ニ置クベシ何^レニトナレハ尿管ヲ目ノ近キ処ニ置ケ
ハ隨テ懐ク又目ノ遠キ処ニ置ケハ隨テ淡シ其所ニ隨テ

其監識ヲ失フ故ニ醫者尿管ヲ置クニ不遠不近其宜キ
処ニ拾シテ以テ之ヲ并別スヘシ

小便量

前章說ク所細領中第二小便ノ分量此ニ其目ヲ說ク
ニアリ一ニ小便多ニニ小便少ナリ
多小便 多小便 其飲物ノ分量ト調度相叶ヒ其
三分一減シ二分通シ來ルモノハ無病ノ者ノ宜キ小便
ナリト知ヘシ ^{三分ノ一ハ体ヲ} 飲物ノ分量多キ人肌
表ノ汗孔閉塞シテ腎ノ胞脱ノ開キタル者ハ小便多クノ

総テ汗ハ少シ 小便多キ証亦能ク尿道ノ塞ルヲ
アリ既ニ其道ヲ塞ク者アレハナリソレハ小便通シ来ルヲ
少シ 多小便少ク濁ルモノハ燒クカ如キ熱病ニシテ
且其人体ノ衰憊スル者知ルヘシ 多クシテ且白キ
小便肉ヲ爛シ溶シタルカ如キ者ハ遺溺ノ症ト知ルヘシ
小便多ノ大便鞭キ者發スルハ総テ之ヲ詳ニスルニ其
人渴多ク好テ多食シ且眩暈ス

少小便 常ニ小便出ルヲ少キハ是レ腎ノ閉塞スル
者ナリ 小便少キ者ハ其体中ノ鹹液尿道へ来ラ

ス他道へ持来ルカ故ナリ則チ総テ小便多キ者ハ
汗少シ故ニ汗常ニ多キ者吐多キ者乳婦ニハ小便少
シ亦下利ノ病人小便毎ニ少キヲ見ル 少クシテ且
濁ル小便ハ其人体中ノ蒸氣支那ニ所謂
元陽手乏クシテ外ニ通
徹スルヲ能ハス其尿道ノ閉塞シタルナリ是取征ナリ
小便少クシテ又総テ閉ルハ其人体中自然ノ氣カノ脱シ
タルナリ而シテ腎ト膀胱トノ管少ク戻リタルナリ是レ
長病ニテハ壞症急劇痛ニテハ死症ト知ルヘシ

右通計四十章

小便篇 凡四百二十九章
大便篇 凡百四十章
汗篇 凡八十八章
涎唾篇 凡八十五章
嘔吐篇 凡百章

右五篇譯文草稿之終。多校合不致打誤。只小便篇之內。少致書寫入內。覽以上

懷園曰。右數十條譯文。往々有不可解者。蓋僅高崎 嶺春泰觀稿

得諸意而未得乎涉筆者耳。於其譯者則不自知其不可解之至於斯也。要之非再就原書以校定之則不可也。看官且勿責備。

麟鳳考

磐水

自古謂麟鳳為王者之祥。世不恒有。聖代必出之。古今史籍不絕書。而未有詳說其物者。竊惟是諸種不必當其世出之。恐後人贊聖王之德。輝欲奇其事。假設以為出此靈鳥仁獸乎。往年社友中川攀卿之在世。涉獵蘭書之際。閱容私

東斯者所撰禽獸譜見其雜品中有稱五留斯
印度鳩斯密拉弼里斯此翻曰異者形狀似所
狀印度雞謂鳳凰者就讀其說則為印度地方之產因謂
呂氏春秋曰流沙之西丹山之南有鳳鳥之卵
沃民所食則所產之地不以為異者即是也乎
迺摸其圖從其說施采色題考按於上為一幅
以示人嚮又醫官月池君讀瀛海勝覽五雜俎
所載曰麒麟前足高後足短項長頭昂傍耳生
二短肉角古所謂麇身牛尾馬蹄者近之與今

俗所畫迥不類之說以與彼禽獸譜所圖疑拉
法者甚相似欲讀其說審其實而未果余頃日
投閑偶取其書考索其事則圖說明覈益知與
二書之說吻合矣因按自古謂麒麟者蓋表聖
王之美德所假設耳而二書所說者乃真麒麟
為此疑拉法不復容疑由是觀之麟鳳二物俱
異邦所產不必俟聖者而出顧上世聖王巨澤
洋溢于異域其人仰德慕化各執壤奠互輸遠
物貢此等珍禽奇獸猶越裳氏重九譯而獻白

雉者未可知也。友人曾煥卿精于赭鞭之業，一日來訪，余談次及此，且問漢人諸說。煥卿喜此舉，踴躍不已，為纂集經傳書史所載說涉麟鳳者，見贈余。因經攀卿及月池君之意，作為此編。列漢說及舊圖於前，載譯文及真圖於後，以備攷證。云爾。寬政辛亥春，後學僊臺大槻茂質識。

仙城大槻子煥

玄澤

嘗譯蘭書麟鳳說，附以

經傳史解之言焉。汎乎尚及稗官矣。於是請

余之舊抄，蓋慮博采無遺，漏然余素蠢愚狹

陋，未肯能膽涉群籍也。偶檢瀏覽者一二焉。

時佳日，窓前春光熙熙，焚香引酒，特感古昔

之德暉，與遺感而錄之。歲次辛亥仲春之月

藍水曾槃識。寬政之三年也。

麒麟

天不愛道地，不愛寶，人不愛情。故麒麟在郊，藪禮記

麟鳳龜龍，謂之四靈。麟以為畜，則獸不狘。禮記

禮禮運，麟以為畜，故獸不狘。注狘，驚走也。

詩周南麟之趾，振振公子。吁嗟麟兮，傳麟信而應。

禮以足至者也箋麟角末有肉示有武不用
孔叢子哀公十四年西狩時麟現於郊為叔孫氏
之車子鉏商所獲折前左足載以歸焉叔孫以為
不祥棄於郭外孔子往觀之曰麟也胡為來哉胡
為來哉反袂拭面而涕泣沾襟子貢問之孔子曰
麟之至為明主也時無明主故出而見害吾是以
傷焉廼感麟而作春秋
論語西狩獲麟嘆曰吾道窮矣
大戴禮毛蟲三百六十麟為之長

公羊傳孔子抱麟而泣曰孰為來哉孰為來哉
漢史武帝紀元光元年星辰不孛日月不蝕山陵
不崩川谷不塞麟鳳在郊藪○又元狩元年冬十
月行幸雍祠五時獲白麟作白麟之歌注應劭曰
獲白麟因改元曰元狩也師古曰麟麋身牛尾馬
足黃色圜蹄一角角端有肉○又元狩二年春三
月詔曰有司議曰往朕郊見上帝西登隴首獲白
麟以饋宗廟渥水出天馬泰山見黃金宜改故名
今更黃金為麟趾葛躡以協瑞焉注師古云武帝

欲表祥瑞故普改鑄為麟足馬踠之形以易舊法
耳

鷩冠子麟者玄枵之獸陰之精也德能致之其精
畢至

孫卿子古之王者好生惡殺故麒麟遊其郊野

孫氏瑞應圖一角獸者六合同歸則至○一本天
下大平則至

春秋運斗樞機星得其所則麒麟生和平合萬民
春秋感精符麟一角明海內共一主也王者不割

胎不剖卵則出於郊○一本德及幽隱不肖斥退
賢者在位則至明於興衰武而仁仁而有慮禽獸
有罔窅非時張獵則至○一本明王動則有義靜
則有容乃見
孝經援神契德至鳥獸則麒麟至
尚書中候帝軒提像配永修機麒麟在囿鸞鳳來
儀

禮斗威儀君秉金而王其政平麒麟在郊

春秋繁露恩及羽虫則麒麟至張網焚林則麒麟

去

說苑凡六經帝王之所著莫不致四靈焉德盛則以為畜治平則時氣至矣故麒麟麇身牛尾圓頂一角含仁懷義音中律呂行步中規折旋中矩擇土而踐位平然後處不群居不旅行紛兮其有質文也幽間則循循如也動則有容儀

說文麟仁獸也麇身牛尾一角張揖云牡曰麒麟曰麟郭璞云麒麟似麟而無角又云麟大麇也麇身牛尾狼額馬蹄五彩腹下黃高丈二

全上麇牝麒麟也釋獸麇身牛尾一角

廣雅麒麟含仁懷義行步中規折旋中矩游必擇土詳而後動不踐生草不履生蟲不群居不旅行不犯陷穿不罹罟網

東觀漢記章帝時麟五十一見又安帝三年潁川上言麟見

蔡邕月令章句凡麟生於火遊於土故修其母致其子五行之情性也視明禮修則麒麟見搜神記孔子夜夢豐沛邦有赤煙氣起顏回子貢

往觀之驅車到楚西北范氏之廟見芻兒挫麟傷
其前左足束薪而覆之孔子曰兒來汝姓為誰兒
曰吾姓赤松子字時僑名受紀孔子曰汝豈有所
見乎兒曰吾有所見一禽如麇羊頭頭上有角其
末有肉方以是西走孔子發薪下麟視麟蒙其耳
吐三卷書孔子精而讀之

博物志麒麟闕而日月食鯨魚死彗星出

孔演圖蒼之滅也麟不榮麟木情也麒麟闕則日
無光

陸機詩疏麇麇身牛尾馬足黃色圓蹄一角端有
肉音中鍾呂行中規矩道必擇地詳而後處不履
生蟲不踐群居不侶行不入陷阱不罹網文章斌
斌王者至仁則出
王隱晉書咸寧五年白麒麟見平原○又泰始元
年白麟見群獸皆從改元曰麟嘉

涼州記呂光時張掖金澤有麟見群獸皆從改年

麟嘉

韓文麟之為靈昭昭也詠於詩書於春秋雜出於

傳記百家之書雖婦人小子皆知其為祥也然麟之為物不畜於家不恒有於天下其為形也不類非若馬牛犬豕豺狼麋鹿然則雖有麟不可知其為麟也角者吾知其為牛鬣者吾知其為馬犬豕豺狼麋鹿吾知其為犬豕豺狼麋鹿惟麟也不可不知不可知則其謂之不祥也亦宜雖然麟之出必有聖人在乎位麟為聖人出也聖人者必知麟麟之果不為不祥也又曰麟之所以為麟者以德不以形若麟之出不待聖人則謂之不祥之亦宜

瀛海勝覽麒麟前足高九尺餘後足六尺餘頂長頭昂至一丈六尺傍耳生二短肉角牛尾鹿身食粟餅餌

留青日札我朝永樂甲午榜葛刺國乙未麻林國皆貢麒麟成化七年常德沅江縣產麒麟甲辰泗州牛武陵田家牛皆生麒麟俱殺之弘治辛亥蒲圻鄧家牛亦生麒麟不食而死嘉靖六年四月舞陽縣生麒麟雙角馬蹄口吐火煙其聲如雷野人怪而擊死其字又作麋麒麟見春秋傳

明史宣德七年天方國遣使以方物獅子麒麟來
貢

湧幢小品麟之青曰聳孤赤曰炎駒白曰素冥黑
曰角端黃曰麒麟雄鳴曰遊聖雌鳴曰歸昌

五雜組永樂中曾獲麟命工圖畫傳賜大臣余嘗
於一故家得見之其身全似鹿但顙甚長可三四
尺耳所謂麇身牛尾馬蹄者近之與今俗所畫迥
不類也

弇州彙苑麒麟麇身牛尾馬蹄一角角端有肉音

中黃鐘王者至仁則出故毛蟲三百六十而麟為
之長生火游於土故脩其母致其子五行之精也
通雅麒麟作麒麟殆天鹿乎公羊傳曰有麇而角
者孔子曰孰為來哉京房曰狼額馬蹄五彩陸機
曰麇身牛尾馬足黃色圓蹄一角角端有肉皆相
傳說耳拂林僧言天鹿卽麟湧幢小品曰麟之青
曰聳孤赤曰炎駒白曰素冥黑曰角端黃曰麒麟
雄鳴曰遊聖雌鳴曰歸昌皆附會也演繁露言唐
以麒麟名廐因改麒麟騏馬色也馬出冀州多良

故作驥世用騏驎閣者多矣智按穀梁傳已作驎
說文麒麟仁獸也麟大牝鹿也石徑通作麟而經
傳別無以麟為大牝鹿者爾雅有麇麇為縵文漢
武帝獲麟實鹿之異者相如賦曰射麇脚麟此麟
拜州界有之大小如鹿羅願指此為麟皆本說文
集韻廊廡訛郭璞曰麒麟似麟而無角元美譏陶九
成是也霧霧曰特感龍生麟篆家分荔音其兼為
鹿

池北偶談宋荔裳琬觀察說其鄉趙鵬程者官彰
德大守府庫中有一麟相傳明武宗時土人所獲
誤斃之以獻於官貯庫中趙任滿欲取之吏不可
乃斷其一脰携歸毛作黃色紋理如刻畫蹄通明
類黃玉宋常見之

康熙字典按經傳皆作麟字爾雅公羊京房易傳
皆作麇說文麇牝鹿也麟大牝鹿也揆此則麇與
麟有分爾雅注疏拜州界有麟大如鹿非瑞麟也
故司馬相如賦曰射麇脚麟謂此麟也爾雅麇大
鹿牛尾一角注云謂之麟者此是也然麟麇二字

今俱通用

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

鳳凰

書益稷鳳凰來儀

麟上書詔九成鳳凰來儀擊石拊石百獸率舞

鹿凡允諾師古曰言秦樂之和鳳凰以其容儀來

麟百獸相率蹈是乃眾官之長信皆和輯故神人

圖

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

鳳凰圖

書益禘鳳凰來儀
 同上簫韶九成鳳凰來儀擊石拊石百獸率舞鹿
 尸尸允諧師古曰言秦樂之和鳳凰以其容儀來
 下百獸相率蹈是乃衆官之長信皆和輯故神人
 交暢
 詩經鳳凰鳴矣于彼高岡雝雝喈喈小雅又鳳凰
 鳴矣又鳳凰于飛翩翩其羽亦傳于天
 論語楚狂接輿歌而過孔子曰鳳兮鳳兮何德之

衰

全上鳳鳥不至河不出圖

禮禮運鳳以為畜故鳥不獮

老子黃帝召天老而問之曰鳳象何如天老對曰

夫鳳象鴻前而麟後蛇頭而魚尾龍文而龜背燕

領而雞喙又頭戴德頸揭義背負仁心仗信翼狹

禮足履文尾繫武小音金大音鼓五色備舉遊必

擇地不妄

左傳陳大夫卜妻敬仲其妻占之曰鳳凰于飛和

鳴鏘鏘有鳩之後將育于姜

同上昭公十七年邾子曰少昊氏立鳳凰適至故

以鳥紀官

爾雅鷗鳳其雌鳳郭璞注瑞應鳥高六尺許邢昺

疏鳳鷄頭蛇頸燕頤龜背魚尾五采色高六尺許

呂氏春秋流沙之西丹山之南有鳳鳥之卵沃民

所食

禽經雄鳳雌鳳亦曰瑞鷗鷗者百鳥偃伏也羽虫

三百六十鳳為之長

莊子老子見孔子後弟子五人問曰為誰對曰子
路為勇其次子貢為智曾子為孝顏回為仁子張
為式老子歎曰吾聞南方有鳥其名為鳳所居積
石千里天為生食其樹名瓊枝高百仞以璆琳琅
玕為實天又為生離珠一人三頭遮起以伺琅玕
鳳鳥之文戴聖嬰仁右智左賢

宋玉對問鳳凰上擊九千里絕雲霓負蒼天乎窈
冥之中蕃籬之鷦豈能與之料天地之高哉至對
淮南子昔有三皇鳳至於庭三代鳳至於門周室

鳳至於澤可見德彌饒所至彌遠德彌精所至彌
近

鳳凰賦鳳凰為羽族之丹殊誕鳳鸞而稱傑邈區
宇以超棲撫朝陽于丹穴備六德以成文暉藻翰
之有烈

全上一曰口包命二曰心合度三曰耳聰達四曰
舌屈伸五曰彩色光六曰冠短州七曰距銳鉤八
曰音激揚九曰腹戶戶所由出入者也

楚辭獨不見鸞鳳之高翔太皇之野循四極而周

迴見盛德而後下

離騷爲鳳凰作鶉籠雖翕其不容

言以鶉鶉之籠不能容藏鳳之

形躰也

說文鳳神鳥也

說苑黃帝卽位惟聖恩承天明道一脩惟仁是行
宇內和平未見鳳凰維思影像夙夜晨興於是乃
問天老曰鳳儀何如天老曰夫鳳鴻前麟後蛇頸
魚尾鶴植鴛鴦思廉化枯折所志龍文龜身燕啄
鷄喙駢翼而中注首戴德頂揭義背負仁心信智

食則有質飲則有儀往則有文來則有嘉晨鳴曰
發明晝鳴曰保長飛鳴曰上翔集鳴曰歸昌翼挾
義哀抱忠足履正尾繫武小聲合金大聲合鼓延
頸奮翼五光備舉光興八風氣降時雨此謂鳳像
夫惟鳳爲能究萬物隨天祉象百狀達于道去則
有災見則有福覽九州觀八極備文武正王國嚴
照四方仁聖皆伏故得鳳之像一者鳳過之得二
者鳳下之得三者則春秋下之得四者則四時下
之得五者則終身居之黃帝曰於戲盛哉於是乃

備黃冕帶黃紳齋于中宮鳳乃蔽日而降黃帝降
自東階西面啓首曰皇天降茲敢不承命於是鳳
乃遂集東園食帝竹實棲帝梧桐樹終身不去詩云
鳳凰鳴矣于彼高岡梧桐生矣于彼朝陽葦葦雍
雍喈喈此之謂也

山海經靈鳳撫雲儀神鸞垂玉音雖非世上寶爰
得王母心

全上丹穴山鳥狀如鶴五采而文名曰鳳

全上軒轅之丘鸞自歌鳳自舞

全上南禺之山有鳳凰

周書王會鳳凰戴仁抱義

孫卿子古之王者其政好生惡殺鳳在列樹

韓詩外傳鳳之象鴻前麟後燕頤雞喙蛇頸魚尾

鶴頸鴛頤龍文龜背羽備五米高四五尺翱翔四

海天下有道則見其翼若竿其聲若簫不喙生蟲

不折生草不群居不侶行非梧桐不棲非竹實不

食非醴泉不飲

大戴禮羽蟲三百六十鳳為之長

子虛賦掩兔麟鹿躡縶脚麟

韓子昔者黃帝合鬼於西大山鳳凰覆上作為瀆
角

帝王世紀舜作大韶之樂簫韶九成鳳凰來儀

漢史昭帝後元三年冬十月鳳凰集東海遣使者
祠其處○又元鳳元年汪應劭曰三年中鳳凰比
東海之西樂鄉於是以冠元焉凌推隆按鳳凰不
出春秋戰國以來寥寥矣至漢昭之世而迺見乎
得非與赤雀黃鵠一類者○又宣帝本始五年五

月鳳凰集膠東千乘○同四年五月鳳凰集北海
安丘淳于○同地節二年夏四月鳳皇集魯郡群
鳥從之○同元康元年三月詔曰迺者鳳皇集泰
山陳留○又神爵元年三月詔曰南郡獲白虎威
鳳為寶○同四年鸞鳳萬舉蜚覽翱翔○同年冬
十二月鳳皇十一集杜陵○同五鳳元年汪應劭
曰鳳皇五至因以改元云○同三年三月辛丑鸞
鳳又集長樂宮東闕中樹上
蔡邕琴操周武王時天下化鳳凰來舞于庭成王

援琴而歌曰鳳凰翔紫庭余何德兮以感靈

廣雅鳳凰雞頭燕頤蛇頭鴻身魚尾 翼五色首

文曰德翼文曰順背文義腹文信膺文仁雄鳴曰

卽卽雌鳴曰足足昏鳴曰固常晨鳴曰發明晝鳴

曰保長舉鳴曰上翔集鳴曰歸昌

瑞應圖鳳凰者仁鳥也雄曰鳳雌曰凰王者不刻

胎剖卵則至

同上鳳凰負信戴仁挾義膺文包智不啄生蟲不

折生草不群居不侶行不經羅墜上通天維下集

河洛明治亂見存亡也

孔演圖鳳為火精生丹穴

孝經援神契德至鳥獸鳳凰翔

禮斗威儀君乘土而王其政太平鳳凰集於苑林

尚書中候堯卽政七十載鳳凰止庭巢阿閣謹樹

同上帝舜曰朕惟不乂百獸鳳晨

百獸率舞鳳凰司晨鳴也

尚書考靈曜明王之治鳳凰下之

春秋感精符王者上感皇天則鸞鳳至

春秋元命苞火離為鳳凰銜書遊文王之都故武

王受鳳書之紀

春秋合成圖黃帝遊玄扈雒水上與大司馬容光
等臨觀鳳凰銜圖置帝前帝再拜受圖

春秋運斗樞天樞得則鳳凰至

鷓冠子鳳凰鶉火之禽陽之精也德能致之其精
畢至

樂動聲儀鎮聲不逆行則鳳凰至

樂汁圖五音克諧各得其倫則鳳凰至冠類鷄頭
燕啄蛇頸龍形麟翼魚尾五米不啄生蟲

漢武內傳西王母曰仙之上藥有九色鳳頸次藥

有豢山白鳳之肉

十洲記鳳麟洲在西海之中四面有弱水繞之鴻

毛不可越也其上多鳳麟數萬各為群上仙之家

以鳳喙麟角合煎為膠

焦貢易林鳳生五鷁長於南郭君子康寧身悅榮

樂

列仙傳簫史教弄玉吹簫作鳳聲鳳凰來止其屋
秦穆公為作鳳臺一旦皆墮鳳飛去

東觀漢記光武生於濟陽先是鳳凰集濟陽故宮
皆盡曰鳳凰聖瑞始於此○又建武十七年鳳凰
出高八尺九寸毛羽五米集潁川群鳥從之蓋地
數頃○又章帝時鳳凰百三十九見○又安帝延
光三年鳳凰集濟南臺丞霍穆舍樹上賜帛各有
差

吳曆太元元年有鳥集苑中似雁高足長尾毛羽
五色咸以為鳳凰改元為鳳凰元年

抱朴子夫麟鳳以形狀為別聖人以心神為異古

者太平之世鳳凰常居其國而生乳至夏后始食
卵而鳳去之此則鳳有種

異苑東莞劉穆之字道民素居京口晉隆安中鳳
凰集其庭相人韋藪謂之曰子必恊贊大猷

韓文丹穴五色羽其名為鳳凰昔周有盛德此鳥
鳴高岡知聲隨祥風窈窕相飄揚

拾遺錄周時旃塗國獻鳳鷁載以瑤筆之車以五
色玉為飾駕以赤象至京師育靈禽之苑飲以瓊
漿飴以雲實二物皆出上元經方鳳初至之時毛

色未彪發及成王封泰山禪社首之後文彩炳耀
中國飛走之類不復喧鳴咸服神禽之遠至及成
王崩冲天去

酉陽雜俎鳳骨黑雄雌旦夕鳴各異皇帝使伶倫
製十二箏寫之其雄聲其雌音樂有鳳凰臺此鳳
脚下物如白石者鳳有時來儀候其所止處掘深
三尺有圓石如卵正白服之安心神

宣室志貞元十四年秋有異鳥其色青狀類鳩鵲
翔于睢陽之郊止叢木中有群鳥子類俱率其類

列于左右前後而又朝夕各銜蜚虫稻粱以獻焉
是鳥每飛則群鳥咸噪而導其前咸翼其旁咸擁
其後若傳喚警衛之狀止則環而向焉雖人臣侍
天子之禮無以加矣睢陽人咸適野縱觀以為羽
族之靈者然其狀不類鸞鳳由是益竒之時李翱
容於睢陽翱曰此真鳳鳥也於是作知鳳一章備
書其事

爾雅翼南恩洲北甘山壁立子仞猿狖不能至鳳
凰巢其上惟食虫魚遇大風雨飄墮其雛小者猶

如鶴而足差短

白孔六帖行鳴曰歸嬉止鳴曰提扶夜鳴曰善哉
晨鳴曰賀世

論摘表聖鳳有六象謂頭象天目象日背象月翼
象風足象地尾象緯

弇州彙苑辛繕治隱居華陰光武徵不至有大鳥
高五尺五色備舉而多青栖繕槐樹旬時不去弘
農太守以聞詔問百僚咸以為鳳太史令蔡衡對
曰凡象鳳者有五多赤色者鳳多青色者鸞多黃

色者雞多紫色者鷓多白色者鵠此鳥多青乃鸞
非鳳也上善其言

仝上前漢見武十七年鳳凰至高八九尺毛羽五
米集潁川群鳥並隨蓋地數頃留十七日乃去

本草綱目羽蟲三百六十鳳為之長故從鳥從凡
凡總也古作朋字象形鳳者美也大也

華夷考鳥鳳如喜雀色紺碧頸毛類雄鷄鬃頭有
冠尾垂二弱骨各長一尺四五寸其抄始有羽毛
一簇冠尾絕異大略如鳳鳴聲清越於笙簫然度

曲妙合宮商又能為百蟲之音生左右江谿洞中
極難得然書傳未之紀當由人所罕識云
仝上山鳳凰狀如鸞雁嘴如鳳巢西江深林中伏
卵時雄者以木枝雜桃膠封其雌于巢獨留一竅
雄飛求食以飼之子成即斃封不成則室竅殺之
此亦異物所未見

格物總論鳳凰者仁鳥也雄曰鳳雌曰凰太平之
世則見非梧桐不棲非竹實不食非醴泉不飲凡
所棲止衆禽必隨之而集故羽虫有三百六十而

鳳凰為之長

桂海虞衡志鳥鳳出海桂其形略似鳳音聲清越
如笙簫能度小曲合宮商又能為百鳥音

韻會雄曰鳳雌曰凰古詩鳳兮鳳兮求其鳳

廣東新語鳳羅浮不見山海經而南山徑言丹穴
之山其上多金玉丹水出焉南流注于海有鳥五
采狀如鶴而文是曰鳳凰今鐵橋瑤池之水南注
溟渤穴土皆赤而其洞曰宋明則亦丹穴之義也
山鳳凰峯鳳浴潭有異鳥五采而頭大者大頭鳳

飛則羽聲震山谷他若青鸞碧鷄五色雀山喜鵲
鷓鴣紅裙白練之屬人皆以為鳳鷄也豈卽所謂
丹穴之山耶凡鳥赤多者鳳南海鳥多赤皆鳳之
族而師曠禽經言赤鳳謂之鶉南方取象鶉火鶉
鳳也赤故云火也星經言南方七宿朱鳥鳳也南
方為朱雀之分鳳之所產故諸鳥之有文采者皆
為鳳之子姓記稱羽嘉生蜚翼蜚翼生鳳凰鳳凰
生鸞鳥鸞鳥生庶鳥凡庶鳥皆生於鸞鳥故謂之
鸞鷁山海經又言南禺之山有鳳凰鸞鷁南禺者

謂羅山之南番禺之東也莊子云鸞鷁發南海飛
于北海是也
同上有山鳳凰者大如鶖雁伏卵時雄者以木枝
雜山桃膠封其雌于巢而留一竅雄飛求食以飼
之子成發封否則室竅殺之蓋鳳之不仁者也而
大頭鳳者卵三尺者五彩冠似金杯天晴則雙飛
而出衆鳥隨之又有大如鶖者尾長羽色鳧鳧饗
若輪轉諸鳥見之斂翼俛首伏不敢鳴名大頭鳳
猶撞間射得之肉備衆美驪娘握兵者多以其尾

為求或以鸛鷓羽代之色久逾鮮潔而弗滓有句
云鸞女鷓鷃裘庖烹鳳大頭

同上小鳳凡數種有曰桐花鳳丹碧成文羽毛珍
異其居不離桐花飲不離露桐花開則出落則藏
蓋以桐花為胎以露為命也兒子捕之飲以蜜水
枕譚華陰班家庄謁漢定遠侯班超墓墓已為民
居離班庄出大道登鳳居山山一名龍骨其麓有
永慶禪院老僧云唐開元中有鳳逐二龍至此龍
墮地化泉二道鳳憤而死其一龍被鳳爪傷流血

泉色遂赤至今院中有飲龍泉赤泉惟灌池而已
僧又云鳳喜食龍腦故龍畏之鳳死時山之僧以
石函瘞其骨于山巔疊磚為塔覆之山因以名景
泰桑酉鄉之人因築城逼于州官盡取塔磚以去
而石函始露其僧少年猶及見之石上刻字云景
祐四年重修啓函鳳脛骨長二尺圍可六寸股骨
長一尺五寸圍如脛骨其潔如玉龍之畏鳳昔所
未聞斯亦異矣

郁離子荀卿曰臣聞王者之祥有三聖人為上豐

年次之鳳凰麒麟為下

通雅鵬卽鳳訛為鵬說文鵬古文象形鵬亦古文
蓋鳳飛群鳥從以萬數故借為鵬黨今鵬字橫斜
非二月字因翔也東方曰發明南方曰焦明西方
曰鷦鷯北方曰幽昌中央曰鳳凰郁離子曰南方
鳥曰昭明五采性好亂蔡衡曰赤多者鳳青多者
鸞黃多者鸛紫多者鸞鷲白多者鷦鷯飛鳴曰郎
都知我者惟黃持竹實來六象九苞詞人附會
廣見聞錄順治辛卯秋有大鳥高三四尺許其色

青集於淑浦龜山之麓衆鳥萬計翱翔嘈雜於左
右凡七日摩空而去鳥糞所污田土如堊林木槁
落下有死鳥不計其數又期年余往青州其時亦
聞巨鳥來自海上羽備五色而從鳥如之去後亦
多死鳥獨遺粒如珠色光澤而碧識者云竹實也
按文海披沙載金太和時磁州有鳳衆鳥圍之大
者在內小者在外以萬計村民俱驅牛數十頭擊
折以從逐之未至里許即有鷲鳥振翮逆擊翼長
丈餘擊水牛皆死肉盡見骨鳳高丈餘尾如鯉而

互留斯印度鳩斯容拉弼里悉

此容私東斯禽獸譜所載和蘭謂之印度泄滑
能此翻印度鷄按所謂鳳凰也

亞爾鐸魯方就斯名曰我輩載印度所產異鷄三

種俱羅甸名互留斯印度鳩斯其一種有稱互留

斯印度鳩斯密拉弼里私者此翻異狀兩耳三趾

羽毛文米甚可愛世無與比者就審其狀上齧鉤

曲色極鮮紅頭胸腹共紅唯胸部多班點色嬌紅

至腹部則稍大又有橫白紋其齧戴冠垂綏甚多

肉冠形長有青紋綏生羽毛達冠細小黃色時有

延長眼狹長殆類人耳聳如驢翼翎為諸種文米

重尾修短短小者五其翮赤長大者九其色共極

鮮麗項秀出白翮羽毛數條其色青亦甚美

茂質按容私東斯引此說未說其形狀及所產

之地名等顧亞爾鐸魯方就斯之說偶記其所

瞥見乎將出其所傳聞乎柳徒載人所圖說乎

似未目擊其物者近時所新撰書中應有精詳

之說冀他日得其書窮其物而已

疑拉法

容私東斯所載按五雜組瀛海勝覽所載麒麟
是也

疑拉法者臺駝一種厄勒齊亞及羅甸俱名曰加

墨魯八兒達留斯猶云駝類蓋其狀稍以似加墨伊兒

駝西洋呼曰加墨伊兒余曾於厄人多之地係于亞弗利加洲國都該

錄再得觀之審其形狀頸長如駝遍體班點如豹

額傍戴三角其長約六指橫徑中央突生一肉瘤

長約二指橫徑許如戴三角頭長約七指橫徑舉

頭乃高及一尺七寸許以我方曲尺法約之下倣之其上唇突

出覆下唇自頭至尾一尺九寸餘股前高於後然

脛脚則後足稍高於前自尾以上為階級峯起如

屋脊然躡中多班點色狀恰似鹿其點多為方在

自頸及躡九拇指橫徑之間其一點約一指橫徑

其餘為圓點者如豹而間雜方者全身分理望之

如張網羅尾細小端有毛自頭至背生鬣如馬甚

美其走也先出右足次進左足蹠跚跛行其飲食

地上物也必擲開前足乃得凡草木非延長潤大

突生地上者不能食。又與沙法多巴尔巴留斯之
書舌長二尺餘色淺青蓮而暗形圓長恰如鰻鱺
以其舌舐取諸木枝葉及諸草致諸口內甚速且
敏捷此篤學之士所嘗窮其實之說也。彪兒加悉
鳥斯人載噎索乙多歇爾囊受斯人之說曰或騎
此獸如馬云。又此獸產于亞弗利加洲中咄魯哥
魯牒伊甸地又斯答刺爸人曰產于黑地兀皮又
昔者加儉沙兒王時始出此獸。邏馬人以供觀場
衆競為奇觀云。其後愕兒夕納鳥地人屢以供觀

場後輸諸亞鳥力利安地人又獻黑地兀皮國王
劫伊泄尔力阿衣泄兒王云。又自巴皮羅泥亞地
亞細有獻都兒格帝王弗列牒里吉。又有都兒格
一王賜其醫官臘鳥冷斯者歇里謨鐸留斯人曰
此獸始獲之也甚躁暴不可擾馴。羈頸以韉以牽
服之云。又或曰如德亞國取此物為食料。顧其地
昔時有多產焉。

茂質讀西士所著喜望峯紀行曰亞細亞洲中
曾有生捕此獸者尚稱經二三日而斃。故人不

得熟觀云乃剥取皮併其骨贈于去巴古北岸

小縣酋長不刺歇索兒亞臘忙人其人博學篤

好輒輸諸其大學校中之秘庫深珍藏之云其

角甚異狀世無與比者全形如鹿角然僕着腦

骨而突起無光澤中實如牛角且有皮包裹之

似所謂稱肉端生黑毛又頂直鼻骨中央突出

如肉瘤者故其始人以為三角云云又曰勃風

名者說此獸甚盡矣詳其書中此物又產于亞

細亞洲中亞拔斯加或亞弗利加洲中贊西拔

爾之地多產焉原文前後猶有記傳聞之諸說

者事係冗長故今畧焉

蘭畝傲載卷三

東都懷園先生纂輯

美作 源輝雄
長門 豐田宗味 校
常陽 嶺春泰

腦與胃互相為因

槐園

玉函涅斯^{ヨハン}埜我爾德兒^{ネズ}名^デ西^ゴ匡^ル曰^レ就^ニ生^ク人^ノ之^{コト}事^ヲ態^ニ而^シ蹤^ヲ
蹟^ノ之^ヲ斯^レ有^リ侶^ニ甚^ク可^キ異^シ者^ヲ屢^ニ歷^シ試^シ之^ヲ其^ノ患^ヲ旋^ニ暈^シ眩^シ冒^シ等^ヲ
之^ノ人^ハ必^ズ有^リ惡^シ心^ヲ若^ク嘔^シ吐^ス証^ハ有^リ惡^シ心^ヲ若^ク患^シ壞^レ液^ヲ敗^レ瘀^レ在^リ

胃中者亦必為旋暈眩胃証其互相為因者見得是
頭腦所為主動與胃所為主動甚相通而不二學者
須達斯義也見內科撰要

又曰夫胃之與頭腦雖上下遠相隔處然其事甚相
通而近一者也何者頭之有疾率皆為善浸淫於胃
若上患頭痛之人下必有不思食証配之又其反對
下患惡液來瀦胃中者大抵上必偕發頭痛見百二
攘園曰據是兩節之言考其胃之與頭腦雖上下
遠相隔處然其事甚相通而近一之故斯得其情

蒲郎加爾都解剖術曰第八神經自腦直分以下
於胃絡其胃口周密遍滿若羅網然是以胃口獨
甚敏於感觸知覺而其部有最可貴重之殊能存
焉如同胃膈中具一頭腦一般又我爾德兒論心
腹痛曰內科撰要第自胃府最上開哆之部達食
道所終竟尽有神經布護於斯故善為重痛此以
其為受納飲食之要關人身死生存亡之所係故
令主知覺之神經當其誰何盤問之任是以神經
之賦在此者殊多於他部其致源委未遠上下相

通知覺感觸甚相近一職是之繇因考漢人以腦
所主精神主宰為心之官能其謬解之所自來亦
得其情矣蓋胃管在胃中直心位其作痛也西人
尚且謂之心胃痛以其神經聚焉者多凡胃腹之
有感觸必先知覺於斯妄意思像極如凡百感觸
知覺亦皆根乎斯乃為精神之所在亡論於其不
知其神在胃管乃以為心之官能抑有由也夫精
神意識之在頭腦也載在西書者昭昭焉觀之自
不俟辨然未讀西書之日予而既甘心其主宰在

心藏殊不知其所以想像如在胃然者即是其所
以不在胃也何者人不見氣魚不知水自其他而
見之乃可知已其所以不自知其在腦者却是其
所以在腦也亦唯其身在廬山中故爾非邪若夫
以腎為蓄精之藏亦是以其自動脈大幹分下於
辜丸以為製造精之精脈與自腎達於胞脫之輸
尿道兩管近相竝致些絲錯抑亦有由也共詳論
于東西病考中

乳糜

槐園

晉按乳糜謂之傑乙尔此飲食之精液腸胃所化製血之樸也漢醫所未說至輒近歸化之士能三拔肇於水法論之於是創著乳糜之名曰凡飲食蓋有三化一曰火化煮熟爛二曰口化細嚼緩嚙三曰胃化蒸變傳送二化得力不勞于胃故食生食冷大嚼急嚙則胃受傷也胃化既畢乃傳于脾傳脾之物悉成乳糜次乃分散于周身其上妙者化氣歸筋其次妙者化血歸脉用能滋益精髓長養肌體調和榮衛所云妙者飲食之精萃

也故能宣越流通無處不到所存糟粕乃下於大腸焉但其言傳脾者恐是熊三拔因漢醫每言飲食刻化必並稱脾胃取諸其易通曉就其所膾炙於衆口直云脾耳其實不傳脾也抑亦其人雖博豪多識頗言醫事然未精內景之詳說而唯陳其所粗通之大概乎今舉一二西說以明之西書云內科撰要第十八章夫食之入口咀嚼之際神水以漸漸溢與其所咀嚼之物相和揉以包攝之送下食道而入于胃轉輸諸腸腸凡有六名者皆

賴有此神水資焉。加之。以胃中之液。大機里尔汁。及
膽汁等。以胃與諸腸之官能。消磨於斯。化熟於斯。以
製造一箇乳糜。飲食至此。經諸官。主能與糟粕相泌
別。得成白液。即乳糜。和雜。乃導入一箇道路。其道路
謂之乳糜道。以混淆諸血中。遂與之偕化。成紅血。周
流身體。循環內外。又分利化成各部之諸液。以養吾
人。性命資給。運營無病。平全之人。皆然。
又云。夫人所飲食物。因胃與諸腸之官能。而消磨之。
並有助之之諸液。以製造之。從諸腸所主運化。噲收

于乳糜道之中。遂化成血液。以為養性命之基資也。
乳糜道一云液道。又另有乳糜會。新舊作奇縷科印。
又有乳糜管。新舊作奇縷管。本文不言及之者。幸一
以兼其餘耳。

漢醫認乳糜為腸垢

樓園

晉按。下利之証。古人見以為腸垢。或名積垢。呼積
謂膿。率皆乳糜之下利者耳。命名之失。其實不復
須辨。而昭昭焉。其中少曉之者。張景岳一人而已。
豈不異乎。其言曰。凡腹中積聚之辨。乃以飲食之
滯留。畜於中。或結聚成塊。或脹滿。鞭痛。不化不行。

有所阻隔者乃為之積此皆粗粕成形之屬所當
逐也今人不能辨察但見痢如膿垢者皆謂之積
不知此非粗粕之屬而實附腸着臟之脂膏皆精
血之屬也無論瘦人肥人皆有脂但肥者脂厚瘦
者脂薄未有無脂者也若果無脂則腸臟之間豈
容單薄赤露非惟藩籬不固而且臟必易傷無是
理也今之凡患瀉痢者正以五內受傷脂膏不固
故日剝而下若其臟氣稍強則隨去隨生猶無足
慮若臟氣至敗剝削至盡或以久瀉久痢但見血

水及屋漏水者此在庸人云其積聚已無反稱為
善而不知脂膏刮盡則敗竭極危之候也使今後
醫家但識此為脂膏而本非積聚則安之固之且
不暇而尚敢云攻之逐之或用苦寒以滑之利之
者否此固不及西說之精覈則有之然超然獨能
論及此可謂卓見矣予恨不令其聞乳麋之說耳
香川太沖亦時發新見間有可觀者然其論膿垢
駁景岳者却大非矣予性不好藏否人於與等說
實不得已而言之蓋名實之不切當其關係不鮮

淺故也。夫名不正則言不順，實之所寓終將行之。故古者名之必可，言之必可行。元氣常恐其虛而邪氣常恐其實，故正曰虛，邪曰實，則似矣。至若不識乳糜而題以臆垢積膿，則可謂認親為賊也。夫言井有仁，君子可逃，聞隣有賊，覺覺思逐，名之所使也。今舉至貴至重可愛吝可保持之物，名以污穢可惡之稱，而注意於排擯驅除，其究不為梁北丈人者殆希。唯恐俾及於真子，是故予之譯西書常不嫌新目，觀不憚駭物，聆不取牽強，以蹈襲

漢名之苟適衆好而獨斷然，曲翻西語直譯原名者，蓋為此耳。今畧引西說示之。

我爾德兒曰：夫人所飲食物，因胃與諸腸之官能而消磨之，並有諸液助其製造，從諸腸所主運化，喻收于乳糜道之中，遂化成血液，以為養性命之基資也。其經絞榨之賸滓糟粕，從而後焉，即是大便也。若其大便無論疎數，所下既非糟粕之屬，曾經製造而成乳糜，一變將至血液，其色稍白者，謂之乳糜利。又曰：為是乳糜利，既然下利，其經製造之乳糜則不

係消磨化熟其飲食之官失其能也亦不在助其製造之諸液廢其務之罪也元自明白矣只是不喻收于乳糜道之中是以泄利之耳其不喻收于乳糜道者因粘稠液者有因運行衰弱者有因乳糜道閉塞者尚有數因其証其治詳見予所譯內科撰要

辨胎男女

月池

俺貌曾止烏巴亞歷曰婦人妊娠之間神思爽朗顏色悅澤眼中有神彩身體壯健此男胎也且以男胎熱於女胎故妊婦身體常有微熱飲食日美重身之後至三四月腹中覺微動男也女則更遲孕男胎

者其腹突尖右半身比左甚輕便起坐行步皆先右足欲起之際每扶右手右眼快明乳頭右大於左胎動多在右其胎所在必上高於女胎如兒頭大或云男子所施射之精出右辜丸者成男胎何者右辜丸之精純熱且壯也曾見畜牛羊及野羊者繫繫其左辜丸而合之所生皆牡也此可以為的証矣按男子有因病損右辜丸者後生子男也然則造化之妙用固非智術人為所得及也但是交接之間反于常理或偏斜倚側男女易地而行事或女不快暢則

縱得成胎。皆為女矣。婦人只受男子之精。以養成其胎而已。其所以成男成女之根原。全在男子用功之專精與否爾。

重胎說

婦人有雙胎品。又有一孕數胎。其受胎之原亦不同。有每胎各胞者。有數胎同胞者。其每胎各胞者。已成胎之後。再受精成胎也。數胎同胞者。因一時受精過多而成也。瓦歷奴私曰。凡人已飲食訖。充滿胃中。之後。再復飲食。亦能共容納之。先自初次所納水穀。漸

胎

非

漸消化。以為乳糜。分布散達于周身。子宮之受精。亦猶此也。其所受只是一處。如虛器受物。期充盈而後已。初次所受精容在一邊。而後所受則又容諸其一邊。然因交接之時。與受精之變。便成雙胎品。胎若數胎也。子宮內非有各空。可以受許多精之地。獸類常一產數子。然觀子宮內。只是一室。可見已。或曰。子宮之受精也。必貯諸一邊。此說與古背馳。但子宮內含蓄氣。故精之純壯者。撞入宮內。則因其為氣所包之。變亦成雙胎品。胎若數胎也。觀每胎各胞與數胎同。

以

胞以為一時受胎與異時成胎之看法余顧男女構
精而成生育其理如亞利私突得歷斯瓦力奴私等
之說受其精純壯足以成胎者即胎立成矣而子宮
口尚未緊閉或成胎後偶爾有開口方是之時適有
交接則再受精而重成胎謂之重胎重胎之原無他
一或胎後再受精也詳于非剝加刺得私雙胎說考
其子宮已結胎閉口者所以再開口之故其說亦不
一或謂結胎後為吐出瘀塞其中之物開口者有之
及其時而交者則成重胎又謂情意萌動乃為交合

之際男子用功極力尽抵觸摩盪之態女人快笑之
極有至如狂者正是子宮開口之期當是之時男子
亦瀉精則再受其精重結胎矣因按凡人飲食飽滿
之後雖胃中充塞不欲飲食然若值異常美味管待
亦懇至倍勸有適意則再有催食氣右所論亦猶是
然非皆爾婦人之有雙胎猶人之有長生此所當有
而不易有之事耳只多在其人壯實甚所心愛而婦
人亦性淫者或有初受胎之後重受胎其間隔數日
者布利尼烏私曰一婦妊娠九月而孿生其一乃五

月胎也又曰一婦孖生其顏容一似其夫一似面首
男子布羅可念志亞曰一婢一日交其主與其管家
及產孖生一侶其主一侶其管家羅烏設突曰一婦
人產一子三七日之後又舉一子由是觀之重胎者
其產亦有隔日此其受胎不同時每胎各胞故也數
胎同胞者以一時受胎其生亦同時又曰重胎在受
初胎之後四十日以內過此以往以初受胎氣漸々
充實子宮內無地重受胎也羅馬人說亞力山的里
亞之婦人一產四子後經四十日再舉一子蓋婦人

止兩乳而一產數子實造化之變所以不可測知也
凡子宮之口在處女妊婦及石女則细小如男子陰
頭然至如既產之後與不遠當成胎之期則異此必
開哆矣其既受精者即緊閉不可辨自門口至產門
底洞然如無物然及其再受精之時或泄精之期或
當吐除月事淤塞其他水液之際則尚有再復開口
焉

和蘭草木畧上編

木俊卿

信陽小諸之醫官木俊卿從其君而東也刀圭錄

暇。遍就都下諸名家而諮焉。聞予近唱泰西疾醫
之術。盡歸手來。請曰。竊見世之從事蘭學者。大率
喜遐好異。詳于奇器遠物。而畧乎日用必需之事。
僕則不願也。矧有賤職在焉。卑卑然唯刀圭之從。
從公子邁。一彼一此。祇從之靡盬。不遑優柔。厭飲
於蘭晚之中。以俟其冰釋理順焉。願莫愛茲牙餘
論。使僕聞其說。予廼取宥坐所有西醫泥蘭度草
木畧撰斯土所有日供葶用者。及良功善能人。莫
之知懷才抱德。塊然湮滅山林。其情可憫者。旋讀

旋答亦唯絕域九萬里之異文。入手眼而出乎口。
口眼之間不能四寸。歐邏巴之言。轉為尋常之國
語。俊卿則隨聞隨筆。未嘗失之。每會期必與其所
友善水府監官伊藤氏。未嘗不炎笠雪簑以來訪
也。積而成編。以示予。予觀之。其性功主治西人之
所歷試亦足以知其梗槩。雖則藁爾小冊子哉。奚
徒尋常壞牛折軸之書。率皆踏襲一無卓識超出
範圍之表。屢次梨棗亦唯依樣一葫蘆者之比哉。
是書也。俊卿撰焉。伊藤氏校焉。今援數條。收載于

此以記其勤再寬政丁巳之春。字槐園題。

水仙

性功

溫而燥。在第二度。

鐸度濕烏斯品階草木寒熱極為四級其

最高者為四度其說詳于平著本草序例

主滌刷陳滯且收斂

附方治

諸般創傷及疥癬取根熟搗如膏貼患處又取花浸

油中暴諸日數日後用蒸露罐依法取油聽用 湯

泡火燒及皮肉擦壞取根熟搗和蜜如膏貼患處 **增**

此以盤學寶函所增補後做之和以豆粉外貼拔竹木刺柔硬腫

山慈姑

性功

溫而燥。功與水仙畧似

附方滌除諸

般粘稠液及痰飲惡液下利大便根二分苗香子或

蔣薤子少許酒若水煮服

西洋酒與和漢異皆以蒲桃造之然其性味不甚異

詳見述西名物考

金盞花

性功

花溫而燥。開發閉塞。消化堅硬。發汗。

治傳染惡氣 **附方**傳染諸病。心中悸動。用花製昆設

尔拂每朝空心服肉豆蔻大。天行疫疾取莖葉生

汁十六分頓服溫覆取汗又取底野迦和以花及醋

服。黃疸取生汁八分和製乾蚯蚓一分頓服 經

閉莖葉花酒煮服又取生汁八分空腹服 下胞衣

及死胎。取乾莖葉投諸熾炭烟薰下部 齒痛取

生汁合 創傷。莖葉搗如膏貼。寒熱經久取子七
枚用酒二十四分浸柔先熟發四時半服 眼目赤
腫 花露頻滴目中。增花強壯心肝。通經閉。
酸漿 [性功]寒而燥。功同酸模。附方口中生瘡污穢。
生汁或水煮含漱。鬱冒肝熱及熱病。取生汁製舍
利別取二十四分和蒸餾百二十八分頻服。增花
及葉治肺脹療白帶外用治眼疾。
蚤休 [性功]燥在第三度。毫無可知覺之熱味烏。收
斂發汗治中毒療傳染病。附方治諸傳染病婦人月

經過多吐血尿血。及胃腹內諸創傷。乾根為末。用莖
葉露若酒飲服一分。口中諸惡瘡根煎湯含嗽。
諸漏瘡根末摻患處。治小產。紫參根末一分以蚤
休水十六分飲服。旁用新根莖葉多少適宜熟杵如
膏貼腰上。增根發汗療中毒強心。治天行疫疾。以
性收斂故諸般下利出血用之外用全草治蝮蛇及
諸蛇咬傷。

水楊梅 [性功]溫而燥在第二度。強壯衰弱。少收斂。
收諸口藥品中。附方曾脇痛胃疝頭腦心肝衰弱。取

根十六分葉二溢以水酒煮取百二十八分日二三服。新舊創傷根葉酒煎洗。[增]強壯男女陰精是以令人有子取根酒若麥酒調服。

紫參 [性功]寒而燥在第三度強收斂發汗治傳染。

[附方]月經過多下利嘔吐及防小產取乾根一分為

末以赤酒茅苜水飲服又取根酒若水煮頻服 齒

斷出血齒牙不固根葉絞汁含嗽 天行疫疾傳染

諸病根為末一分取便用液飲服取汗 止諸出血

根末抹上。[增]根發汗解中毒療金瘡治赤利嘔吐

及諸疾甚良。

葶藶 [性功]溫而燥滌刷陳滯少收斂 [附方]面上點

鹽新根杵爛搯上又取根製露洗面上 愈傷損新

根擣爛如膏貼創上 淨刷粘稠液留飲惡水取子

十二顆至十五顆服上吐下利而愈 葉煎湯又為

末服一分同治前記 結血腎痛瘀血凝結經閉蒸

根取露服十六分 [增]根治白帶下外用治足膝痛

腫脚氣滅癩痕瘡諸瘡顏面黑痣小兒疥癬等露水

治暑沸美顏色。

狗脊

性功根温而燥。開發閉塞。少收斂。附方治肝

及子藏閉塞。根十六分。破裂細剉。酒煮取百二十八

分。日再服。腹中有虵根水煮以蜜和服。湯泡火

燒根多少適宜。白中杵熟加薔薇露少許。再杵絞取

汁塗患上。增根治脾子藏及他諸藏閉塞。殺諸蟲。

骨碎補 性功燥。開發閉塞。微利。下腐敗惡液及痰

飲。增方胸中痰塞。瘡久不愈。諸藏閉塞。根十六分。乾

葡萄五分。用大麥水煮取百二十八分。日再服。增

根主微利。開發諸藏閉塞。青腿牙疳及他病生於血

中腐敗者為。必用催生下死胎和以拔尔撒沒熟研

如膏能拔矢鏃入肉

兔葵 性功大熱而燥。吸引拔出。滌刷陳滯。剉開脉

口。以其峻烈。故唯供外用。附方污穢瘡腫。取露頻洗。

瓜甲瘍腫。及瓜甲蝦腫。生葉搗貼患處。齒痛及

及齒牙不固。全草酢煮含嗽。

烏頭 性功温而燥。在第四度。甚害人畜。可以致死。

增全草可以毒物。然治諸癩良。中烏頭毒者。斲答底

野迦。麝香。龍涎香。酒麥酒並解之。

地榆

〔性功〕温而燥。在第二度開發閉塞。滌刷陳

滯。少收斂。〔附方〕心痛悸動。腎痛石淋。惡心生葉。浸酒

中時服。一酒盃。又取露和酒服亦良。療諸瘡傷止

出血。莖葉煎湯。或入他治。創方中服。旁且擣莖葉貼

創上。天行疫疾及諸熱絞取液服八分。〔增〕根葉

子發汗利尿通。月經破石淋。治中毒解水銀毒。又療

諸般金瘡。良外用。除顏面野豔瘡。金瘡。經日治膿壞

諸腫小瘡。蝦腫。莖痛。益乳汁

藟菜 〔性功〕温而燥。在第三度頗走竄。開發閉塞

稀釋凝粘。〔附方〕催月經。令婦人有子。蒸取露頓服二

十四分。且以莖葉作浴湯。令患婦浴。內部傷損生

汁八分。酒和服

馬蘭 〔性功〕在寒熱之間。少燥。消化堅硬。今疏鬱

積。〔附方〕胃及眼目熱腫。莖葉搗熟如膏貼。風犬咬

傷。取花搗和舊猪脂貼瘡上。

絡石 〔性功〕温中等燥。更多主收斂。收在治創。某

中。〔附方〕諸般下利出血。全草酒煮服。諸毒蟲獸咬

傷。搗全草貼患處。婦人白帶。絡石三溢。用酒百二

十八分。煮取三分之一。服一酒盃。耳痛生汁温滴耳中。
[增]葉主收斂。諸般下利出血婦人帶下為必用。益乳汁求繼嗣良。調月經過多。

石韋。[性功]温在第一度。燥在第二度。或云寒而燥。開發閉塞。稀釋凝粘。少收斂。
[附方]脾藏鬱脹。久瘧。葉二溢用酒百二十八分。煮取三分之一。服一酒盃。日二三次。諸般下利吐血葉水煮加砂糖少許服。
[增]葉為脾肝損傷之要藥。治下利下血。外用療瘡傷。膿腫甚痛。

白微。[性功]温而燥在第一度。開發閉塞。稀釋凝粘。發汗。
[附方]治疝痛。通月經。根末一分。用酒飲服。諸毒與獸風犬咬傷。根末酒服數日。天行疫疾。或傳染諸病。根細搗為末。一分。葛兒カレ儒ジュ實シ屈ク蟄チ。類水及酸模水送下。温覆取汗。水腫黃疸根浸酒。令漚若酒煮服。一酒盃日再。諸毒根末小兒三分。錢之一大人一分。用莖葉蒸餾飲服。散體中凝血。根末一分。用醋飲服。發癩根二三分。芍藥子三分。白之一為末。以便用液飲服。汚穢膿瘡。根末搽上。

[增]根驅砂石通小水催月經解諸中毒治天行疫疾
毒與獸咬傷諸疝諸蟲鬱冒心痛動悸

桃朱術 [性功]清涼而少燥苦味開發閉塞滌刷

陳滯淨除腐敗惡液 [附方]諸藏閉塞黃疸青腿牙

疳久瘡疥癬全草四溢用乳酪清二百五十六分煮

取三分之一數日服之眼目矇昧生汁滴目中

黃花桃朱術 [性功]味苦性功同桃朱術特其導

達水液利諸小水殊為有力耳 [增]全草及花驅腐

敗膽汁下水液清淨血液開發閉塞

錦荔枝 [性功]在寒熱之間然主燥是以有收斂

治創之功 [附方]新金瘡及惡膿瘡葉搗熟貼上又

以油漬柔其實後再煮之蘸綿貼上腹痛葉酒煮

服 乳房爛壞痔疾湯火傷用實製油塗患處 婦

人難產用右油塗腹部 肌肉皸坼葉搗細大人一

分小兒五分酒服外用右油塗患處 [增]此草大有

拔爾撒沒之功 彼土呼此草為拔爾撒沒渴百爾以

有其功也渴百爾果實之義也 莖葉根又堪內服外用療諸般瘡傷製油治諸般新

創不發熱腫不出數日而愈最能治口中坼裂及乳

房破壞。陰處亦同。

鳳仙花

[性功]與錦荔枝同功

蘭名亦同錦荔枝但錦荔枝為雄而

此為雌耳

羅勒

[性功]溫在第二度消化堅硬分疏鬱積用

之

[附方]眼目旋運及矇昧取生汁滴目中

氣急

喘息子一分以蜜水飲服

利小水通月經荃葉酒

煮服

[增]此草主清淨肺藏催月經然罕用

芸香

[性功]溫而燥在第三度走竄潛搜決壅潰

圍稀釋凝粘而治傳染

[附方]通月經下胞衣作湯

服又取生汁酒和服 解中毒子一分搗末取便用

液飲服 天行疫疾及傳染病胡桃二顆無花果二

顆芸香二十葉食塩少許右件合杵如昆設尔拂每

朝取豆大服此方於豫防術殊驗 惡託熱病芸香

多少從宜加食塩及酢少許共搗和以貼動脈用布

縛定 水腫芸香二溢用百二十八分酒煮減半四

次分服 眼目矇昧芸香一味或和蔣蘿汁滴目中

耳聾耳痛耳鳴以生汁若油滴耳中 脾藏鬱脹

取油塗左脇脾之部位 昏睡發癩以生汁一匙與

服且和酢灌鼻中 滑精芸香子一及細末以少液
飲服 風犬咬傷生汁十六及共酒飲服且取葉搗
和以食塩及蜜貼患處 [增] 莖葉子利水便通月經
催生頭腦諸疾為必用治神經眼目諸中毒青腿牙
疳卒中昏睡發癩眼目衰弱及多眵淚

大蒜 [性功] 熱而燥在第四度氣峻烈而味酷辣
開發閉塞決壅潰圍消化堅硬治傳染中毒與葱同
功而更強焉 [附方] 諸般寒毒大蒜調和食膳用或
浸酒用 小兒諸費用甘乳酪煮與服旁擣大蒜以

新鮮牛酪和塗鳩尾 頭上惡瘡生汁以蜜和塗
咳嗽久不愈生汁和以猪脂塗足心及動脈上 天
行疫疾大蒜一顆芸香白屈菜各十葉共於臼中杵
加白酒及燒酒再杵取汁服 齒痛酢煮含之或灰
中煨乘熱貼痛齒 [增] 治諸疝腸痛咳嗽呼吸不利
肺病黃胆腎痛石淋細剉以燒酒飲服最能治結石
証蒸餾解諸般中毒

葱 [性功] 溫而燥在第四度然比大蒜不甚熱開
發閉塞稀釋凝粘決壅潰圍滌刷陳滯 [附方] 血痔

雍閉為患令其開泄生汁蘸絲納肚中 利小水通

月經分疏風氣常調食膳用 天行疫疾根白忒心

充以底野迦和佛手柑汁密封其孔煨熱灰中取出

絞取頓服溫覆取汗 兒枕痛葱酒煮和以膽八香

油搗如膏貼臍中 風大咬傷葱芸香蜜及食塩多

少適宜共合熟研貼傷上 眼中斑點眼目矇昧生

汁和蜜點眼中 淨除腦中粘液生汁灌鼻中 血

血生汁酢和灌鼻中 停耳生汁溫滴耳中 耳聾

耳鳴葱根拔心充以真防風子末 真防風華鋪所稱出江州伊吹山

熱灰中煨絞取汁滴耳中 湯泡火燒皮膚剥脫生

汁和以雞油塗上 毛髮脫落生新髮取生汁塗

增利尿發汗緩釋肺中粘液蜜煮用除砂石驅諸蟲

醋浸用通月經外用熟瘡腫開瘡口是以瘡腫及疫

瘡譯名天行疫瘡用以創口又狂犬咬用之

瓜 **性功**寒在第一度潤燥生津在第三度治胃

熱甚良然不良于患諸疝脾病若青腿牙疳之人瓜

子性功與胡瓜子同算得共列于四種大寒子之中

附方頭痛因熱者取穰切縛在額上 顏面斑點

子同蠶豆粉和以生汁作餅日乾酒和摩搯斑上
頭上疥癬取根乾末以蜜和塗 作吐藥取根乾末
以蜜水飲服一錢 腎痛石淋肝熱及府藏燔熱蒸
其熟者取露頓服三十二及外用生汁和酢蘸巾貼
患處 [增] 熱^清殺白臭然善發寒熱及下利宜以胡
椒及上好酒一盃共服乃得

藿香

[性功] 溫而燥在第二度強壯衰弱

[附方]

胃中水濕寒冷心中悸動腦中閉塞腹痛酒煮服又
取藿香昆設爾拂蠶豆大以其露飲服 氣急喘息

取生汁製舍利別頻々舐服 諸般金瘡生汁灌患

處 經水不利子宮衝逆子宮疼痛酒煮服旁取藿

香苦蒼花多少適宜以袋盛之水煮乘熱貼腹上

[增] 治頭眩眩冒卒中痲証最能療心腹膨脹陰吹通

月經下胞衣外用煮湯坐浴治馬蠅蜂螫毒

紫蘇

[性功] 溫而燥在第三度微帶收斂

[附方]

諸証因寒傷頭腦神經者取花製昆設爾拂用蘇蘇
露空心服蠶豆大又酒煮服 諸瘡不淨^{及創傷}搗如膏
貼患處 齒斷不淨酒煮含嗽 中毒取葉三個和

鹽少許服 腎痛石淋酒者服一酒盃 耳後腫紫

蘇葉溼的連等分細搗如膏貼上 豫防小產使

孕婦常食之 [增]花利小便便生產催月經下胞衣

胃家子宮病為必用治頭眩眩冒顫掉拘攣不孕天

行疫疾咳嗽肺病等葉功同花外用治出血齒斷臭

爛以指齒斷貼乳房減乳汁酒若麥酒浸用治水腫

及瘡三日一發者等

胡盧巴 [性功]溫在第二度而燥在第一度和柔

酷屬堅硬消化釀腫定痛 [附方]諸般腫瘍胡盧巴

末多少從宜以蜜水和為餅貼上 脾藏鬱脹末多

少適宜消石四分酢和為餅貼于左脇 脇痛如裂

用子製湯劑以水銃射膈中 子宮堅癖子宮腫瘍

子水煮作浴湯令婦人浴後取子粘滑液和以鴛脂

灌藏中 令諸腫瘍成熟用葉浸酒與油之中十五

日煮至酒氣盡絞去滓入胡盧巴末及蠟多少適宜

煎為膏用 [增]子並為粉者消解堅硬疏散凝結糊

膩劑及水銃劑用之以其有破氣驅風之功也其粘

滑液 所謂傑烈乙 能治天行眼疾

紅花

性功温少分疏消化

增子有下利之功

故下劑方中用之花染匠用之

鳧公英

性功清凉而燥在第二度味苦開發閉塞

滌刷陳滯

附方治寒熱病清淨血液莖葉三溢以

乳酪清百二十八分煮取三分之一頻服又絞取生

汁十六分和利母能舍利別利母能者仙頓服眼

中生翳取白汁點眼中日二三次新金瘡莖葉煮

湯洗患處

增全草及根為肝脾要藥治水腫黃疸

青腿牙疳尿閉外用治眼中生翳莖中白汁散疣目

類

蜀葵

性功温中等燥比尋常蜀葵更甚

此所主說者謂

蜀葵白花者就呼其他為尋常其花雜色者也柔和酷厲分疏鬱積除疼痛

和調酷厲液

附方結石腎痛葉一溢或根十六分

以酒百二十八分煮減半分二服冒寒傷冷毒及

其毒陷胷部者取蜀葵糖用砂糖製者一個口中含

嚙咳嗽不止根十二分以甘乳酪煮取百二十八

分服一酒盃日二次諸般堅硬寒腫根多少適宜

以酒煮柔於口中熟杵加猪脂少許如膏貼腫上

然其諸部
各有等差

增根及葉主下利及分。疏鬱積減諸液中酷屬發汗
消痛用根與肉桂水煎下胞衣淨產後瘀血用根搗
和以砂糖塗疣目類及其圻裂

菟藿

性功甚同接骨木

增主峻利其根浸用

者力殊強水煎則劣子用自一斗至二斗初生苞葉
其効柔凡要治其瞑眩以酒乃解

菱

性功清涼微帶收斂

附方尿血腎胞結石

痛諸般下利乾菱一斗細末酒服其砂石即自小便
出若得新生者以取露用亦得 **增**實破砂石治赤

利尿血暈痛葉入眼料用治齒斷及口中爛腫

夏枯草

性功溫而燥在第二度開發閉塞決壅

潰圓稀釋凝粘滌刷陳滯

附方腦之寒傷肝脾子

藏閉塞黃疸腎胞結石用水若酒作湯劑和以砂糖
若其舍利別服一酒盃日二三次凡用以為葶酒又

取蒸餾又花作昆設爾拂共能治前証 頭上創傷

擣葉貼上

驅除粘痰雷飲吐劑乾根二斗以蜜水

飲服

增花治頭腦諸患耳聽不聰耳鳴肺癰吐血

吐膿利小水驅除中毒

浮萍

〔性功〕潤燥生津清熱涼火在第二度 附

方 頭痛熱証諸腫浮萍多少從宜外貼患處頻々更

換 眼目熱赤肝藏熱腫取露頻々洗眼又蘸巾貼

右脇肝部位 痛風浮萍多少從宜於磁罐若鐵罐

內火上煖之出攤綿布如膏貼患處予施諸脚氣數

發者每得効 增治眼目赤痛或腫或破裂

萍蓬草

〔性功〕根子清涼而燥在第三度 花葉

清涼潤燥生津 附方 滑精月經過多下利不禁子

若根一冬以珍醪酒一頓飲服又花作昆設尔拂服

亦可 止諸出血青葉細搗如膏貼創上 熱病乾

咳諸藏熱腫白花萍蓬草莖花取露百二十八及又

作舍利別者十六及和調頻服 脾脹根八及以白

酒六十四及煮分再服 頭痛肝脾及腎熱腫閉塞白花

萍蓬草花露多少從宜蘸巾縛額上又貼右脇肝位

若左脇脾位若腰上腎位 增子消除淫欲清涼血

熱治滑精白帶下花露主清涼是以諸般清涼劑用

之

茵陳 〔性功〕燥溫第二度燥第三度苦味開發閉塞

决壅潰圍滌刷陳滯微收斂。[附方]因胃衰弱生雷
飲惡液及肝藏閉塞寒熱經久不癒茵陳昆設尔拂
一塊每朝服之又茵陳二溢以清水煮取百二十八
反和以其舍利別二十四反服一酒盃日二次又用
茵陳酒亦良服右葉之間取茵陳油塗腹上為妙
腹痛及蟲証茵陳花一溢國墨應子代用小茵
香可也二反
以酒煮取百二十八反服旁以其油塗脐中 黃疸
茵陳水煮服 杖癩搗葉和蜜貼 耳痛水煮以蒸
氣蒸耳中 子宮疼痛茵陳二溢以酒百二十八反煮

取三分之一頓服一盃 [增]治腸痛壯胃氣療黃

疸水腫寒熱病

薺 [性功]清涼而燥且收斂 [附方]尿血赤利諸

般下血薺半溢茅苜半溢以雨水六十四反煮取半
溢過和赤石脂一分再服 衄血葉破碎多少從

宜插入鼻中縛定腋下及項 金瘡出血葉搗如膏
貼上 黃疸葉搗熟貼足心縛定 [增]主收斂是以

有止洪閉塞之功為金瘡要葉以赤酒煮治諸般出
血

石長生

性功燥而在寒熱之間稀薄胃膈粘痰

稠飲有成熟化融之功 **附方**咳嗽諸藏閉塞腎胞

結石葉四溢以酒百九十二分煮取三分之一漉過

以其舍利別和調服一酒盃日二次 頭上濕惡瘡

葉多少從宜以灰汁煮洗瘡 **增**性在寒熱之間多

入治胸膈諸病湯中用即治呼吸不利咳嗽肺病脾

脹水腫療尿血殊治尿道凝血若砂石係結石腎痛

証者須加金燈籠兒及巴列爾沙度格祿和的員

蟹殼草 **性功**其燥著明微帶清涼有生肌斂口

之功 **附方**內外損傷酒煮或與他治瘡藥配服一

酒盃日二三次 湯泡火燒取生菜搗如膏貼上

吐血經水過多諸般下血葉四溢細剉以剛鐵水煮

取百二十八分漉過迷爾點爾斂失應舍利別十六分

槓植舍利別八分右件和調日再服 **增**葉治湯火

傷金創膿壞膿管腫 譯名 腎癰 譯名 肺癰入煎劑散

劑及罨貼劑內外用

佛甲草 **性功**清涼在第三度濃厚稀薄微帶收

斂 **附方**風眼熱赤及焮熱腫赤疱生汁頻々點眼

又蘸中貼腫處及瘡上 痛風因熱者大葉佛甲草
多少從宜細搗以大麥粉和番貼患處 熱病大葉
佛甲草生汁八分葛而儒カ鬱ル涅ベ實シ促ク蟄ク水十六分白
砂糖二分和調頻々服一匙 熱病大頭痛大葉佛
甲草汁十六分薔薇油八分薔薇醋二分合和蘸巾
貼額上 肝藏焮熱生汁酢和貼耳部位 湯泡火
燒生汁以薔薇油及蠟作軟膏塗患處 衄血生汁
清中以縛額上及顛顛鼻上 吐除粘痰及腐敗惡
液生汁二分用便宜液蝕服 **增**葉外用除疣目類

治咽喉膿腫眼目焮腫肝藏焮熱病謔妄療骨節
疼痛乳汁過多解醒

蕃椒 **性功**溫而燥在第四度強壯胃家驅逐體

中風氣 **附方**肝脹水腫蕃椒水煮作湯與服下利

水液而愈 痛風在脚蕃椒細搗多少從宜傅貼患

處發水疱多出惡液而愈 面部身上雀斑野豔蕃

椒細搗以蜜和調塗患處 令齒牙牢固葉燒灰真

珠毋燒灰各等分水飛令白以摩搯之 **增**主強胃

用造纏糖又用醋及蔣蘿製一方ト粿ト多ト沒ト列ト兒ト失ト名ト醫

用之治瘧疾

鬼燈籠

兒 [性功] 實及中子涼而燥在第二度開發

閉塞通利小水 [增] 肝藏閉塞黃疸結石腎痛石淋

實十顆搗碎以水九十六分煮去滓加砂糖與服

[增] 治腎膀胱損傷有大功通小水瀉結石療寒尿見詳

內科 撰要 膿淋止腰痛

芍藥 [性功] 溫而燥在第二度微帶收斂 [附方]

卒中痲症癩癩冒寒傷冷其他頭腦諸患取根和其

花舍利別令其甘美作煎湯日二三次服又莖根取

露頓服十六分又實十五六顆搗末以酒若蜜水若

他便用液飲服 催月經淨產婦子宮治腹痛根乾

末以酒若蜜水服 子藏衝逆 詳見內科 子宮疼痛

實十五顆以酒若蜜水服 小兒驚搐取生根繫諸

兒頸又以線貫聯其頸結其頸旁取其露二匙加

花舍利別令其甘美頻與服 肝藏塞塞水腫腎

痛膀胱痛 共見內科 撰要用根作湯服 疼痛因青腿牙疳

若徵毒發者用根作湯服 [增] 根葉及子並治頭

腦心藏及子宮治諸癩頭眩冒癩癩夢遺鬼交等

良根施諸小兒頭眩眩冒癰癩殊妙是以末兒叔尼
斯散中用之出和蘭局方主治癰癩驚癩搐搦掣搐
之神經諸疾摩急拘幸等遠西名物考
譯載

甘草 [性功]在溫涼之間是以潤燥生津和緩酷

厲 [附方]咳嗽喘急取甘草膏葉舖所貨
有舶來物若甘草含

利別稍々含嚙甚良 腎胞毒腫因發淋瀝小便頻

數甘草作湯服或以酒和調亦可 [增]治諸般胃膈

病咳嗽喘逆心中悞懷腰痛腎痛其汁熬乾作錠者

謂之獨鹿布即上甘草
膏是也 主治同

薑 [性功]大溫開達閉塞疏通鬱積稀釋凝粘

[附方]胃寒胃膈諸藏寒冷諸液腐壞以薑調和日常

食饌又加他方中服 [增]煖胃寒冷助飲食消化且

消化諸生粗未熟者治頭眩眩冒頭腦重疼因胃家

諸患而發者殊良外用療眼疾

大黃 [性功]主疏滌腐敗膽汁說見內科撰
要煩問篇其餘

惡液得效之後其下利自止是以諸般泄瀉下利等

必用之每良服量自一分至二分為一服槩若要火

便順利不至泄瀉即取五分若三分餘以使用液飲

服 [增] 驅除腐敗膽汁自餘惡液其下利不駁劇又有收斂之功是以赤利用之

山竒糧

[性功] 溫中適而燥在第二等利尿發汗

[附方] 徵瘡熱病經久痲症水腫痛風久頭痛黃疸

肝藏閉塞腎痛石淋煎湯服 [增] 大發汗治水腫瘡

惡瘡疥癬徵瘡骨節疼痛良

白兔藿

[性功] 溫一度而燥二度下痰飲及他水

液惡汁服量小兒三分錢之一大人一二分以為一

服之槩

[增] 主微利驅逐諸般惡液留飲水氣以其

無苦味淡口易服小兒下劑用之呼曰白大黃若夫

嬰兒須與六分錢之一二稍長者一分大人二分

鬼萊菔

[性功] 主下利然專以除水液為能取一

分若三分錢之一用便宜液飲服 [增] 主下利驅除

諸般粘液腐敗膽汁痰飲及他惡水服量細末自半

分至三分之二脂四分之一

款冬

[性功] 生草^溫涼中適而殊有強壯肺氣之功

而乾者性溫 [附方] 咳嗽喘急葉三溢以水百二升

八分煮和其葉舍利別調頻服 諸藏熱腫亮猛熱

病其露十六反若二十四反頓服 頭痛及陰器熱

腫取露蘸巾貼患處 湯泡火燒搗葉取汁塗患處

還將生菜罨貼 [增]全草主胸膈病肺諸疾治肺癆

乾咳心中悽悽肺痛 見內科勞証葉外用療燔腫熱

証瘡腫赤利腹中煩熱乳頭坼裂

玉蜀黍 [性功]實難消化然有溫燥之性 [附方]

熟成諸腫實搗碎以津液和貼上 風疹赤斑葉絞

汁蘸巾貼上

薏苡仁 [性功]世人所通知實治腎痛石淋甚良

延胡索 [性功]溫而燥在第二度消化堅硬滌刷

陳滯 [附方]疥癬延胡索月桂各等分搗為細末以

水液飲服一丸服後溫覆為妙 小兒患証細末三

分錢之一以甘乳酪清服 咽喉腫水煎頻令含嚙

蓖麻子 [性功]溫而燥在第二度滌刷陳滯消化

堅硬峻利水飲惡液腐敗膽汁等殊有奇功然稀內

服之 [附方]驅除留飲惡液腐敗膽汁等取子六顆

至十五顆微煨搗碎加桂若生薑以乳酪飲服 婦

人乳房結核葉搗細以麥粉和調如糊貼患處 頭

瘡子擦取油摩塗瘡上 [增]子仁主峻利吐下腐敗
膽汁然稀用之油治水腫諸蟲外用療痔瘡皮膚癩
痕黑斑及浸淫頭瘡

敗醬 [性功]溫而燥在第二度開發閉塞發汗利

尿 [附方]胸脇痛月經不利通小水不利根煮作湯服

氣急喘息根十六反甘草四反水煮取百二十八

反服一盃日二次 肝脾閉塞傳滌諸病黃疸眼精

衰弱根煮作湯服或乾根搗末以使用液飲服一反

頭瘡經久不治荖葉搗絞取汁塗上 [增]全草開

發開塞發汗利尿通月經淨產後瘀血解諸毒治黃

疸尿閉三日瘡傳染疫熱胃腸痛眼精衰弱外用壯

陽物強眼神

淫羊藿 [性功]根微燥而收斂其葉甚苦殆與葛

野刺亞同味

槐園按百工象言云根有收斂而燥之性葉味苦
搗細以油調貼婦人乳上令其不至長大若為末
服五反或煮服則令婦人無嗣根乾赤如煎麥酒
麥酒煎服令婦人不受胎此說與僅人諸說相及
但別錄久服令人無子一語正與此相合可疑學
者須質驗參審以歸至當耳

曼陀羅花 [性功]寒在第四度令人麻痺奪知覺

催昏睡 [附方] 止疼痛催睡眠取子八反粗剉以燒

六十四分浸液數日後絞去滓者減半服一匙 [增]

全草雖同功然其子殊有力催睡令人麻不知痛痒

解其毒底野迦赤石脂甘巴旦古油主之

細辛 [性功] 根葉溫而燥在第三度開發閉塞通

利小便逐留飲除腐敗膽汁驅諸惡液或由吐去或

由前後通出 [附方] 經久熱病痛風水腫黃疸乾根

杵末以使用液飲服一及又根三分以酒蜜水多少

適宜煮吞滓頓服又葉六箇至十箇於臼中熟搗加

酒再搗絞取汁頓服 乾婦人乳汁葉以酒熟研如

膏貼乳上 喘息氣急小便淋瀝乾根四分以酒六

十四分煮減半分再服 眼目矇昧或用生汁一味

或以製胡粉和滴眼中 [增] 下死胎利小便治子宮

痛瘡黃疸水腫番替熟見內科 胃膈及頭腦諸病通

經閉

薄荷 [性功] 溫而燥在第三度微帶收斂 [附方]

婦人白帶薄荷昆設爾拂豆大以其露飲服日二次

經久頭痛荃葉搗熟貼額上縛定及貼顛顛小

兒頭瘡新茶葉搗絞取汁塗瘡上 腹中諸蟲生汁
四反和酢八反頓服 惡心及肝脾腎閉塞薄荷露
四十反薄荷舍利別十五反調和頻服二匙又取
莖葉酒煮服旁外用其油各塗患處 小兒腹痛取
薄荷露與服 斷乳茶葉搗熟如膏貼乳上 耳痛
生汁蜜水等分溫滴耳中 [增]治胃及子宮諸病療
吞酸噯氣腹脹腸痛見內科頭眩眩冒頭痛白帶殺
蛇蟲
桔梗 [性功]未詳 [增]全草涼而燥且收斂水煎

核

含嗽治口中巴且杏核 旁挾懸壅如巴且杏者者啣
謂之巴且杏核以形名也
喉懸壅等腫瘍及爛腫 即漢人所
謂喉風類 有良効且療咽喉
壞膿及喉風根春初掘采可和茶蔬食

和柔醋方

百合 [性功]花溫而潤止疼痛消化堅硬根葉燥
滌刷陳滯消化堅硬和柔醋厲烹釀熟成 [附方]臨

產痛百合花露二十四反雜腹蘭肉桂各三分分之
一右三味合頓服旁取百合油塗小腹及陰門 咳
嗽氣急喘息花露多少從宜頻服二匙 湯泡火傷
葉搗熟貼患處又取根埋灰煨入薔薇露搗熟如膏

和乳糖

貼患處 癰瘡久不癒及創傷取百合汁以蜜及酢
銅罐中煮熬令稠厚貼患處又取葉酒煮外貼 柔
熟堅硬腫毒根火灸或水煮熟研和薔薇油或苦薏
油如膏貼瘡上 骨節閃挫葉搗熟貼患處且以其
油摩塗 令顏面清美悅澤取百合花露頻々塗之
增根有烹釀熟成清淨污滯分疏鬱積之功且生肌
起肉奕硬柔腫為必用是以柔和堅硬之劑中用之
花稀薄粘稠和熟生硬定疼痛外用治羅斯及翁管
私參金屈共見內科撰要療金瘡膿壞瘡久不愈並良花中

黃催產通經水花露治顏面赤泡妙

半夏 [性功]溫而燥在第三度開達閉塞稀薄粘

稠解釋凝結驅逐小便分疏鬱積 [附方]脚氣關節

痛根多少從宜搗末和以牛屎如膏貼患處 解諸

中毒半夏末一及底野如五分共合以酒飲服又葉

搗絞取汁一匙和酢二匙頓服 喘急咳嗽因痰飲

起者半夏一及乳糖二及右二味合分再服 通經

水半夏末二及酒服 水腫寒熱經久諸藏閉塞半

夏五分茵陳鹽酒石鹽各六分之一右三味合和

頓服 面^上野豨薟雀斑半夏乾末以薔薇露和調
曝乾如此三次後為細末摩搽患上又以薔薇露和
直塗上 **[增]**治胃病通小水解毒福兒^西扭斯^西醫
用以治咳嗽有散劑

龍葵龍珠 槐園案西昏此草花^實有赤黑黃三品
共為一種故併二為一但黃者未見

[性功]清涼在第二度有收斂之功 **[附方]**頭痛因
熾盛熱病起者荃葉搗熟繞頭貼之及貼足心共縛
定之 羅斯^瘡荃葉生汁二分酢一分蘸布帛貼患
處 微兒^瘡管吸胡兒^瘡名猶曰進火
謂其毒進來 浸淫腐蝕之記

生汁八分薔薇油四分定粉銀密陀各二分於鉛白
中共研細至如軟膏聽用 **[增]**荃葉及實外用治身

熱頭痛赤利腐爛耳中膿爛子宮蝦腫

胭脂草 **[性功]**溫而燥微帶走竄算得列於治創

陰中 **[附方]**治金創生汁溫滴創中花油殊良其効

速 經久寒熱乾末一分先發酒服 腎痛石淋吐

血關節痛子一分以酒若便用液飲服 腹裏損傷

花一溢以上好麥酒六十四分煮取三分之一漉過

加乳酪少許溫服 黃疸花葉以酒若水煮每朝服

一酒盃 [增]此為治創之良藥內服外用皆可又利
小水通石淋催月經治寒熱瘰癧男子陽事不舉或以
製治創拔尔撒謨

猪殃殃 [性功]温而燥中適 [附方]血葉搗熟

塞鼻孔 痛風葉多少從直浸薔薇油曝諸日令融

化以其油塗患處 疥癬荖葉水煮作湯灌洗患處

[增]外用治諸般出血令小兒身帶之若竊著諸衣
服裡令兒不啼泣煩擾

蛇含 [性功]燥在第三度不寒不熱有收斂之功

[附方]口中污穢生瘡荖葉煮湯含嗽 勞証吐血

尿血冒寒傷冷毒乾根一白搗末以使用液飲服

諸般下利根以甘乳酪煮頻々服 肌膚傷裂荖葉

搗貼患處也諸出血荖葉按熟貼上殊妙 腹痛取

荖葉生汁二匙頓服 干結兒 瘡名諸瘡及 取葉於

木臼內以木杵搗細入猪脂及酒少許和調如膏貼

瘡上 眼目焮腫荖葉生汁滴眼中 [增]治下利及

痔出血尿血勞証咳嗽膽汁變壞為醋厲者腹痛外

用療齒牙動搖齒斷腐爛及痛眼目熱痛全創

龍芽

[性功]溫而燥在第二度開發閉塞滌刷陳

滯微帶收斂 [附方]肝藏閉塞衰弱黃疸經久寒熱

尿血葉三溢以清水煮取百二十八分去滓加砂糖

調分再服 腎痛石淋通下砂石龍芽露二十四分

頓服又作煎湯用亦可 寒尿 見內科撰要 荖葉酒

煮取四十八分服 熱病葉一溢薔薇酢六十四分

右合煮取三分之一頻服一匙 骨節閉挫取葉

及糠多少適宜酒煮如糊乘煖貼之 [增]壯胃及肝

脾衰弱治諸病發渴咳嗽脚痛勞証尿血膿淋由傳

染者瘰癧人帶下漏瘡等入治創飲刮用大紗

白屈菜

[性功]溫而燥在第三度淨除滌刷之功

甚強 [附方]眼目矇昧及眼生翳膜生汁十六分

蜜四分右合煮一二沸掠去上沫頻滴目中 腹痛

子宮疼痛全草多少從宜或搗細或吹咀於熱鍋上

以苦薈花油和調如膏敷填臍中 黃疸及諸藏翻

塞葉細剉和雞子鋤上燒之令患人食又根作湯頻

々與服 新金創 荖葉絞取汁滴創上 治諸痔荖葉

搗熟貼肛上 除疣荖葉生汁頻摩指其上落甚速

增根治黃疸良莖葉生汁頻摩疣目疣目自消其
露治眼疾大妙

蓼 **性功**溫而燥在第三度消化堅硬分疏鬱積

附方皮上野豨以生汁摩指朝夕二次 指頭瘰

疽蓼並雞子殼內膜等分細研傅患處 痛風屈寒

者及寒腫製蓼油塗患處製蓼油方蓼獨活薺共取

生汁多少從宜黑蜻蛉五頭綠蝦蟆十五頭右件共

用三百八十四分油於拔尔涅和內煮熟至諸物軟

解為度以巾濾過收貯聽用 除物粵及祿乙斯

注鼻蟲也舊釋
犬虱恐未穩

取蓼置卧床

增莖葉及花作蜜劑

及膏治金創膿爛漏瘡歇乙傑烏搗登瘡名青斑腿

痛汁去耳中虫

獨活 **性功**溫而燥在第三度開發閉塞決壅潰

圍通利小水治諸中毒此物於治創隊中與居一焉

附方諸風脇胃痛經水不利胞衣不下子藏衝逆

氣急喘息肝脾閉塞黃疸乾獨活根若子一反細末

以酒飲服又取根葉子以酒若水作湯與服 治新

金創莖葉搗熟如膏貼上 **增**根及子治心腹膨脹

破氣驅風葉作浴湯通經水

防風 性功溫在第二度而燥在第一度稀釋凝

粘消化堅硬行氣驅風通利小便 附方腹痛並腎

痛石淋取子酒煮又製油又製露用 咳嗽胸中粘

痰子以火微炒細末和白砂糖若清淨蜂蜜頻服

難產腹痛茴香蔞子各五分細末酒服 增子

壯頭腦胸腹諸部煖冷散寒破氣驅風治小兒腹痛

雞冠花 性功涼而燥有收斂之功 附方諸般

下利吐血婦人白帶雞冠花一盞以酒若水百二十

八反者取三分之一服 增花作湯治泄瀉甚良根

合挾齒治齒痛子末酒服益乳汁

董冬菜 性功花莖葉並清涼潤燥生津和柔酷

厲強壯衰弱 附方胸脇痛熱病肺燥腫咽喉不利

聲啞不出肝腎燥腫及心氣衰弱令其強壯花製舍

利別服二三匙又莖葉作湯和花舍利別頻服

大麥水百二十八反董冬菜花舍利別二十四反加

膽礬精數滴令酸味可口為度以作由列布與服

由列布等即調上菜味者 喉風葉三盞以水百二

十八反者取三分之一去滓和其葉舍利別十六分
頻々含嚙 頭痛以其油摩額上及顛顛 腎痛石
淋子一分以水若酒飲服又子四分以一二便用液
浸候有如乳汁粘液出一頓服 [增]花主下利壯心
氣治胃膈諸病為必用療諸熱頭痛懊懣諸病諸部
閉塞子治熱病腎藏閉塞膀胱結石催生

薔薇

[性功]

諸種薔薇共主清涼其中赤花普祿

飲書薔薇條除腐敗膽汁惡液但赤薔薇一名撥萐
薔薇又之有收斂之功花中黃葉主澁閉 [附方]眼

目熱腫並疼痛薔薇露頻洗 諸藏內熱過度者及

和緩心藏薔薇露和以白砂糖葉局號曰薔薇飲用
配諸清涼劑及強壯心氣之方中 驅逐留飲粘痰

腐敗惡液解諸藏熱治熱病主清涼答末林度十六
分以大麥水煮取百二十八分加普祿飲書薔薇舍

利別二十八分調頻々服又普祿飲書薔薇昆設
爾拂用供燕羞寒臭 心中悸動諸般下利婦人崩

漏赤薔薇昆設爾拂肉豆蔻核大日二三次服 口
中膿瘡壞爛甚斷腫熱及穿穴取薔薇蜜服主滌刷

陳滯清淨汚穢而乾之 諸般熱腫湯泡火燒雞子

白一枚薔薇油多少適宜加薔薇露和調塗患處

婦人白帶經候不調男子淋瀝及滑精管實未熟者

與中子乾一及以釀赤酒及撒撒兒邊酒撒兒未詳備考考煮

服又赤薔薇實未熟者一溢以酒百二十八及煮服

熱症頭痛薔薇糕以薔薇醋焯開貼額上以帛卷

住又薔薇油十二及薔薇露八及薔薇醋四及右和

調蘸布帛卷額上 增薔薇種類不一大抵有清涼

之功赤薔薇花乾者主收溼生者主微利白花者主

收溼而強壯自餘諸種主治諸般下利熱病發渴良

花中黃乾者主收溼能療齒斷病是以口葉散中用

之

白芷 性功根溫在第三度燥在第二度開達開

塞稀釋凝粘發汗解諸中毒治傳染諸毒 附方諸

般中毒天行疫疾傳染諸証肝脾閉塞胃氣衰弱婦

人月經不利白芷一及以酒飲服又白芷五多底野迦五多

五一及用酒若一二露水便宜者少許調和頓服取汗

天行疫疾惡氣為疾白芷醋煮嗜納其氣又取一

根條或合或齧。散體中凝血末一以麥酒飲服。
氣急喘息癰癩婦人子宮衝逆黃疸白芷子一以
以使用液飲酒。風犬並蝮蛇咬傷其他毒蟲獸咬
傷葉一以若香搗以蜜和傳貼。耳中膿爛搗荃
葉絞取汁滴耳中。痛風在股荃葉生汁蘸巾貼患
處。增根通月經下胎及胞衣強壯胃氣疏通風氣
殺諸蟲治青腿牙疳乾咳寒嗽呼吸不利牙齦疼痛
能發汗是以傳染諸病天行疫疾有良功。
荃 **性功** 根葉溫而燥中通子則熱開發閉塞稀

釋凝粘滯刷陳滯通利小便。附方 肝脾膽腎及子
藏閉塞以荃雜調食膳頻用又作湯服最便又生汁
十六分酒和服。腎痛石淋子一以酒若便用他
液飲服。治難產痛令甚易產生汁十六分用醋絞
取加食鹽少許頓服。乳房結塊或斷乳汁生荃四
握剉細蒸餅中心多少從宜共合以水及酒若甘乳
酪煮作罨劑又取荃剉細以酪蒸之貼乳房。小兒
咳嗽甚者生汁四分人乳八分告默應子代用苗香可三
分錢之一者細末合和頓服。增治肝脾胃疾經閉

石淋難產美進飲食又宜合歡

葛苜 [性功] 涼而潤催睡眠 [附方] 治胃熱及腐

敗膽汁刺戟或生用或煮用從宜並可 催睡眠取

加加巴旦杏乳用又取子搗細和人乳及雞子白以

縛額上又取生汁和薔薇油沾巾縛額上 漏精子

一味若加他藥服 [增] 子催眠強胃止淫除夢療漏

精荃中作痛 精荃中作痛

蘭畝傲載卷三終

