



增補
訂

内科撰要

卷二

洋学文庫
文庫 8
C 27
2



補重訂內科撰要卷二

遠西王國溫斯頓我爾德

字田川古德爾

漢

文

加領 蘇 丹 方 一

補重訂內科撰要

卷二

...

增補重訂内科撰要卷二

遠西・玉函涅斯垓我爾德兒 著

宇田川玄隨 晉 譯

津山

男

玄真 麟

校註

加賀 藤井方亭 俊 增譯

萎黃病篇第二

羅甸名カセキシア
和蘭名オンゲダントヘイド

萎黃病ノ大較ヲ論ス

患者。顔面總身ノ皮膚。黦澹灰白ニシテ黄色ヲ帶ビ
神志樂マズ肢體倦重。懈惰。食進マズ。大抵熱少ク或ハ

第七章

增補重訂内科撰要

卷二

第十七章

丸六六二

央ノ後邊左腎ノ差右ニ在リ多クノ乳糜管ト下ハ多クテ
 長ク圓キ小ナル膜囊ヲ爲ス者ナリ故ニ此器ハ諸
 乳糜管連リ上ハ延長シテ一條ノ乳糜管トナル諸
 部ヨリ水脈連リ水液ヲ和シテ稀解熟シ乳糜管ニ上
 糜ヲ統會シ水液ヲ和シテ稀解熟シ乳糜管ニ上
 スルナリ又云乳糜管ハ乳糜囊ノ上口延長シテ一
 小膜管トナリ脊骨ノ左側ニ循テ上行シ腹部ヨリ胸
 部ヲ歷テ左鎖骨ノ下靜脈ニ連リ此處ニテ乳糜ヲ其
 血中ニ輸ス又腸間膜ノ説即チ乳糜ヲ血中ニ運輸スル
 ノ諸道ナリ又腸間膜ノ説即チ乳糜ヲ血中ニ運輸スル
 セ考フ是ニ於テ血ヲ環廻スル器ト呼吸ヲ橐籥ス
 ベシ肺トノ官能ニ因テ漸次ニ化シテ身體ノ營養ニ
 ル器トノ官能ニ因テ漸次ニ化シテ身體ノ營養ニ
 資給スル所ノ液ト爲スナリ無病平全ノ人皆然リ乳
 ハ血中ニ入ルト雖直ニ血ニ化セズ但血脈ヲ運行
 スル中間ノ橐籥ヲ以テ氣ヲ血中ニ含マシメ數廻
 周流循環スルニ因テ漸ク○若シ右ニ舉ル所ノ諸液
 化熟シテ血トナルナリ

或ハ諸器ノ中一モ其常性ヲ失ヒ官能ヲ善セザル
 アルカ或ハ飲食度過キ或ハ消化シ難キ物ヲ食ス
 レバ遂ニ生麤未熟ニシテ榮養ニ不利ナル液ヲ生シ
 是ヲ以テ自餘ノ良血液ト偕ニ全體ニ周流シ内外ニ
 循環シ終ニ顔面肢體ノ皮表ニ透見スル所ノ纖絡ノ
 梢末至微至細ノ處マデモ悉ク濫流普達スルガ故ニ
 其汚液ノ自家ノ微黃失常ノ色ヲ皮上ニ發見スルナ
 リ○然レバ此病ヲ發スルノ原由甚ダ多端ナルヲ知
 ルベシ何トナレバ右ノ如キ良血液ヲ製造スル機能
 ヲシテ減弊セシムルノ諸因ハ皆此疾ヲ發スル原因

增訂内科撰要

卷二

一厘學堂

第九章

由ニシテ。盡ク是ヲ枚舉スベカラザレバナリ

上章ノ餘義ヲ申明ス

若シ夫ノ良血液ヲ製造スルノ十分ニ成遂ズシテ
半生未熟ノ汚液ヲ生シ。顔面肢體悉ク色澤ヲ失テ萎
黃色ヲ現シ。身肢懈惰。動作ニカナキ等ノ症ヲ發スル
也ハ。是前說所ノ病因依然トノ體中ニ頑滯スト知ヘ
シ。夫レ生活ノ身體ニ於テハ。諸液ニ兩箇ノ常道アリ
テ互ニ相行ハレ。必ス是ニ從ハザルヲ得ズ。其常道
ト云ハ。一ニハ諸液皆。生氣ノ運行ニ順ヒ。ヨク製造ヲ
成シ遂テ。恒ニ百體ヲ維持保續シ。一ニハ諸液皆。生氣

ノ運行ヲ離レテ。自己ノ性ニ從テ腐壞スルナリ。順ヘ
バ則チ成リ。順ハザレバ則チ敗ル。此ヲ兩箇ノ常道ト
云。故ニ其半生未熟ノ液モ必ズ變壞スルノ道アルナ
リ。何トナレバ元運生氣甚ダ衰弱スル也ハ。半生未熟
ノ液モ生氣ノ運行ヲ離テ。必ズ自己ノ性ニ任セテ縱
ニ其腐壞ヲ逞スルヲ得ルナリ。○右ノ如ク竟ニ變
シテ壞液ト爲ル也ハ。是レ壞液病ノ張本。第
ノ半生未熟ノ液ニ比スレバ。已ダ惡厲ナリトス。何上
ナレバ半生未熟ノ液ニシテ。未ダ腐壞ニ至ラザレ間
ハ。若シ生氣ノ運行強壯ナルノ力ニ依頼テハ。廢

猶能ク再ヒ良液ニ復スベシ。然レ既ニ縱ニ變シテ腐壞セルニ及テハ。生氣ノ運行強壯ナルノ所爲ニ夫モ。再ビ良液ニ復スルヲ能ハザルナリ。故ニ此病ハ久キヲ經ルホド逾治シ難シトス。萎黃病ハ半生未熟ノ液ヲ因トス。是ヨリ一變シテ既ニ腐壞スルハ即チ壞液篇ニ論スル諸病トナル故ニ逾治シ難シトス。○諸液右ノ如ク。生氣ノ運行ヲ離レ。自己ノ性ニ任テ腐壞スルハ。其性ノ變化スルヲモ。亦一樣ナラズ。次ニ説ク所ニ變化ヲ云○唯其諸液。身體ヲ榮養シ。性命ヲ保全スルニ不利ナルハ一ナリ。然レ其性ニ酷厲ノ多キアリ。少キアリ。又ヨク變シテ稀涼液トナリ。モシ若クハ粘稠液トナリ。又此ニ酷

第二十章

厲ヲ兼ルアリ。或ハ是ナキモアリ○其諸液既ニ半生未熟ノ性ヲ離レ。逾縱ニ變壞スルニ至テハ。身體ニ發スル諸症モ千態萬狀。得テ記載スベカラザルガ故ニ。此ニ歷舉スルヲ能ハザルナリ。此諸症次ノ壞液篇ニ詳ナリ

萎黃病ノ治法ヲ論ス

胃。或ハ腸ニ蓄積セル物アレバ。吐下ノ劑ニテ能ク除去ルヲ得ベシト雖レ。其汚液既ニ血中ニ混淆シテ。血脉ノ末梢マデモ彌漫シ。色澤ヲ失フニ至テハ。預メ先ツ上ニ説ク如キ。製造ノ原ヲ強健ニシテ良液ヲ釀生シ。惡液ヲ分利排泄セシムルニ非レバ。其本性ヲ夫

ヘル汚液ヲ驅除スルヲ能ハザルナリ。故ニ此病ノ外ニ治シ易カラズトス。○何トナレバ胃ト腸トハ飲食ヲ化熟スル爲ノ器ニシテ體中ノ汚液ヲ泄除スル爲ノ器ニ非ルナリ。膀胱ノ小水ヲ受テ是ヲ泄スカ如クナラズ故ニ飲食ノ化熟スルヲ能ハザル者ハ直ニ是ヲ其部ヨリ擯出スレバ其已ニ血中ニ侵入セル惡液ヲ再ビ此器ニ受テ盡ク吐下シ排出スルヲ得ズ。其血中ヨリ受ル所ノ者ハ唯飲食ノ化熟ヲ助ル有用ノ液膽液脾液胃ノ液等ヲ云フナリ。是其已ニ血中ニ混淆シ全軀ニ蔓延セル惡液ハ吐下ノ劑ヲ以テ驅除スルヲ能ハザル所以ナリ。○然

凡先初メニ於テハ其汚液ノ胃及ビ腸ニ鬱聚セルヲ吐下ノ劑ニテ滌除スルヲニ意ヲ用ベシ。方ハ第十五章第十六章ニ見タリ。○又飲食ヲ節ニシテ消化シ易キ程ノ分量ニ越シメズ。其製造ノカヲシテ常ニ其任ニ勝テ餘裕アラシムベキナリ。又食饌モ擇テ消化シ易キ物ノミヲ用ベシ。○次ニ胃ノ官能ヲ强健ニシ稍大便ヲ通利スル健胃劑ヲ用ベシ。是ニ由テ其飲食ヲシテ腐敗スルヲナク。能ク化熟シテ良液ヲ製造セシメ。其剽汚滓穢ハ大便ニ通利シテ其未熟失性ノ汚液ヲシテ復新ニ生スルヲ無ラシムベキナリ。

健胃散ノ方

盧會 半錢

沒藥 一錢

山柰 二錢

薄荷油 三滴

亞爾鮮鹽 一匁

右件散劑トシ分テ十服トシ。一服ツ、用ル七日ニ
三次○若シ藥酒ト爲シ。或ハ麥酒ニ浸シテ用ント
欲セバ。次ノ方ヲ用ベシ

健胃酒ノ方

羌活 漢種者

水楊梅根 各一匁

良薑 四錢

薄荷葉

珊瑚里草 各一握

盧會 一錢

諳厄利斯瀉利鹽 三錢

右件勃的里斯ホツテリス量器ノニニッノ葡萄酒。或ハ麥酒ニ浸
シ。或ハ水ト葡萄酒等分ニシテ浸ス。モ亦可ナリ○
麥酒。或ハ水酒等分ニシテ浸ス。片ハ葡萄酒ヲ用ル

ヨリハ其液ノ分量ヲ多クスベシ○此藥酒ヲ以テ
爾茂兒苴ルノル苴ナリニ一盞ツ、日ニ三次服スベシ。麥酒ニ
浸シタルハ。小麥酒盞ニ一盞ツ、服スベシ○是
ヲ用ルノ間ニ宜ク意ヲ用テ其服量ヲ増減シ。患者
ヲシテ日ニ兩度ツ、例シテカハヤニ上ルホドニ至ラ
シムベシ

此藥ハ久ク用ベキカ故ニ。是ニ馴ル片ハ功ヲ奏スル
ト少クシテ止トヲ得ズ。時ニ藥劑ヲ變シテ用ルトア
リ。然ル片ハ次ニ出ス丸子ヲ用ベシ
健胃丸ノ方

沒藥 一錢

乳香

蘇甘沒スカムモ扭ニウ謨ム 各一錢

薄荷油 三滴

勿ヘ搦ナリ祭チ亞チ石ア鹼ア 二錢

右件細末トシ調勻シテ每一錢十五丸トシ。四九ツ
、用ルト日ニ三次

右ノ諸藥ヲ持久シテ用ルニ因テ。其半生未熟ノ液復
新ニ生スルモチトホスト無ガ故ニ。其間ニ以前既ニ漫延充溢セ
ル半生未熟ノ液モ。生氣ノ運行ニ因テ化熟シテ。小使

ヨリ通利シ。一ニハ表發ノ蒸氣ヨリ發出スルナリ。故
ニ此病ハ每次^{ツ子ニ}他術ヲ須^タズシテ。皆ヨク右ノ藥劑ニテ
治スルナリ。○此病ハ小便ヲ察スルヲ要タリ。其半生
未熟ノ液。多ク體中ニ有ル間ハ。小便白色ニシテ稠ク
且ツ^カ渣多シ。故ニ是ヲ惡徵トス。然レ漸ク清稀ニナ
リテ。終ニ平常ノ如クナルニ至テハ。多時ナラズシテ
回復スルノ候トス。是レ體中ノ諸液。既ニ半生未熟ノ
性ヲ免ルニ因テ。血中ノ^タ洩^イ乙^イモ其本色ニ復シテ小便
ニ通スレバナリ。凡ソ血中ヨリ諸液ヲ分利シタル殘
氣トナリ謝シ去ルナリ是ヲ洩乙ト
云此液清稀ニシテ水ノ如ク味鹹シ

壞液篇第三

第三章

夫レ體中ノ諸液ハ。常ニ必ズ變化ニ羅ルナリ。何トナ
レバ日ニ用ル所ノ飲食ヨリ諸良液ヲ生シテ百體ヲ
榮養シ。凡百ノ主用ニ資給シ。其各自ノ主用ヲ成^レ了^レ
バ。漸次ニ老シテ終ニ無用ノ廢液トナリ。出去ノ常道
ヨリ謝シ去リ。新陳相易^カリテ新良液ノ諸用ヲ爲スノ
道ヲ避ルナリ。此皆平全ノ人。生氣ノ運行ニ順テ變化
スル者ナリ。○然ルニ若シ生氣ノ運行太過強盛ナル

○羅甸名「ゴルル」ピナヲ和蘭名「ベデル」ヒンク
○腐敗熱内伏熱勞瘵膿壞液廢液是ヨ屬ス

力。或ハ次序ヲ失ヒ。常度ニ順ザルヲアルカハ。既ニ製
 造ヲ成。了リタル諸液液血モ。今新ニ養ヒノ爲ニ飲食シ
 タル諸液モ。皆同ク變壞ス。是レ一種ノ壞液ニシテ生
 氣運行ノ失常ヨリ生スル所ノ腐壞ナリ。生氣ノ運行
 ルヨリ生スル壞液ハ。即チ運行ノ太過ナルヨリ終ニ
 第二十五章ニ論スル熱壞液所謂ノ太過ナルヨリ終ニ
 云。即チ第二十二章ニ云。劇盛熱ノ如キハ。血液腐敗ニ
 至ル。即チ第二十二章ニ云。劇盛熱ノ如キハ。血液腐敗ニ
 脈強ニシテ。數身體大熱スル者ハ。其運行太過ナル
 候トス。斯ノ如キ症ハ。小便白濁トナリ。其運行太過ナル
 製スル。即チ第二十二章ニ云。劇盛熱ノ如キハ。血液腐敗ニ
 ルノミ。生能ハズ。唯敗血漿ト名ル。一種ノ腐敗液トナ
 即チ第二十二章ニ云。諸腸ノ搗掣并ニ其次序ヲ失ヒ。
 常度ニ順ザル運動ニ於テハ。腸中素ヨリ少モ壞液ナ
 スキ者ト雖モ。速ニ壞液ヲ生ス。凡ソ人身ノ諸液ハ。身體

ノ外。温煖ノ處ニ蓄レバ。必ず自ラ腐敗スルガ如ク。體
 中ニ存スル者ト雖モ。血ノ循環健輸ノ化ヲ離テ獨立
 スルカハ。必ず腐壞ヲ致スナリ。腫瘍或ハ打撲傷ニ生
 如キ。是レ諸液ノ自性ヨリ生スル所ノ一種ノ腐壞ナ
 ヲ云。然レ其腐壞スルノ一様ナラズ。或ハ速ナルアリ。或
 ハ遅キアリ。或ハ多キアリ。或ハ少キアリ。又其液ニ脂
 油多ケレバ。腐壞スルモ亦逾。惡厲ナリ。然レバ生氣ノ
 運行ヲ以テ右ノ如キ諸液。自性ノ變壞ヲ防護スルノ
 能ハザルカハ。則チ壞液ト名ル一種ノ病ヲ生スルナ
 リ。第二十五章ノ熱壞液。第二十六章ノ寒壞液。第二十
 七章ノ膿壞液。第二十八章ノ瘰癧液。腐壞。皆其自性

曾訂科補遺 卷二

三章

壞液ニ係屬ス。又此一節萎黃病編第十九章ノ説ト應照ス。併考フベシ。○或ハ體中管ヲ腐敗ヲナスノ起原ナシト雖モ。亦外物ノ入來テ腐敗ヲ作スヲアリ。即チ惡氣ニ傳染シ。或ハ腐敗ヲ作ス飲食ヲ用ルニ因テ疫癘及ビ各地一般流行ノ病ヲ發シテ腐敗ヲ作スガ如シ。是レ天行惡氣及ビ飲食ヨリ生スル所ニシテ。是ヲ第三種ノ腐壞トス。前ノ二種ニ次

トス。是レ天行惡氣。或ハ胃腸ノ腐敗液ヨリ生スル所ノ腐敗熱ヲ云。即チ下ノ第二十五章ノ熱壞液ナリ。又熱病篇第五章ニ云。胃或ハ腸中腐敗液アルヨリ發スル諸熱ハ定リタル次序ナシト。是亦腐敗熱ナリ。又胃腸腐敗毒アルヨリ發スル熱病第十五章第十六章ニ論ス。

壞液ノ病因ヲ論ス

夫レ壞液ノ繇テ生スル所三道アリ。○其一ハ生氣ノ運行太過強盛ナルト。或ハ次序ノ錯リ常順ヲ失フトニ因ル。是レ前章ニ云。第一種ノ腐壞。○其二ハ腐敗ヲ生スル物ノ血液ニ混淆スルニ因ル。前章ニ云。第三種ノ腐壞。○其三ハ生氣ノ運行ヲ以テ諸液ノ自性ヨリ生スル腐壞ヲ防護セザルニ因ル。前章ニ云。第二種ノ腐壞。○右ノ三道ヨリ諸液ニ腐敗ヲ生スルガ故ニ。其因甚タ多端ナリ。是ヲ例スルニ劇盛熱ノ如キハ血液腐敗ニ至ルヲ屢多シ。劇盛熱。羅旬名。ハ蘭名。ヘヒゲ。コルツ。ヘヒゲ。ハ劇盛。迴烈ノ義。コルツ。ハ熱病ナリ。又一ニヘヒゲケル。ペコルツト名ク。ヘヒゲ。ハ壯熱ノ義。シケル。ハ酷厲ノ義ナリ。即然。大ニ舉動。チ其熱劇盛酷烈ナル熱病ノ總稱ナリ。

醫學堂藏

卷二

第三章

十

醫學堂藏

勞カス。等ニテ太過強盛ノ運行ヲ生シ發熱スル
 アレ。是ヲ以テ腐敗ヲ作スナリ。此唯身體ノ勞動
 ノミヲ以テ發スル熱ナレバ。血液ヲシテ腐敗セシム
 ルホドニ淹留スルヲ能ハザレバナリ。是レ前章ノ第
 ニ此章ノ第一因ノ太過強盛 諸腸ノ搐掣。或ハ其次序
 ナル運行ヲ再釋スルナリ。腸中素ヨリ少
 ヲ失ヒ常度ニ順ハザル運動ニ於テハ。腸中素ヨリ少
 モ壞液ナキ者ト雖モ。速ニ壞液ヲ生スルヲ屢多シ。此
 節ハ前章第一種ノ生氣ノ運行常度ニ順ザルノ腐壞
 并ニ此章ノ第一因ノ生氣ノ運行ノ次序ヲ錯ル腐壞ノ因
 ヲ證シ説クナリ。○第五十八章ニ云。其胃ト腸トノ運
 動。常度ニ逆スル者。假令ハ婦人子宮衝逆病ノ如シ
 上又第百四十三章ニ云。稟賦脆弱ナル婦人ハ其初メ
 腹中ノ諸藏ニ於テ禁亂攪擾シテ次序ナキ運動ヲ爲

ス。トテ覺エ。是ヨリ漸ク增長シテ上部ニ衝逆ス。ト又
 神經液變壞シテ酷厲柿涼ノ液トナリ。搐掣及ビ子宮
 衝逆等ヲ發スル。一症。擧擗篇第百四十三章ニ出ツ。
 併考フベシ。○腸ヲ分テ六腸トス。故ニ諸腸ト云。名義
 第二章ニ註ス。○或ハ腐敗セル飲食ヲ用ヒ。或ハ傳染ス
 ベキ惡氣ヲ口鼻ヨリ吸引シテ惡厲ナル腐敗毒ヲ血
 液ニ生スル。日ニ多ク歷驗スル所ナリ。是レ此章ノ
 前章ニ云。第三種ノ腐壞ヲ釋ス。凡ソ邊境異地ニ客行
 シテ汚水ヲ飲ミ。鮮蔬良食ヲ欠キ。或ハ疫氣ヲ吸入ス
 レバ。多ク腐敗。○或ハ未ダ曾テ腐敗ノ飲食ヲ用ヒガ
 熱ヲ患ルヲ云。レ。此壞液多ク體中ニ鬱聚スルヲアリ。此症。衆人多ク
 怪ム所ナリ。然レ是レ生氣ノ運行。諸液ヲ保護維持ス
 ルニ足ラズシテ。諸液ノ自性ニ任セテ縱^{ホレシ}腐壞ス。

曾訂科撰要

卷二

廿

聖章

「ヲ察セザレバナリ。是ヲ以テ稟賦虚弱ノ人ハ一氣ノ運行微弱ナルヲ以テ諸液自性ヲ變壞ヲ防護スル能ハズ。自ラ壞液ノ病ニ羅ルヲ屢多シ。是レ此章ノ第三章并ニ前章第二種ノ腐壞ナリ。即チ下ノ第二十六章ノ寒壞液ノ病是ニ屬ス。○外表ヨリ温暖氣。或ハ濕氣ヲ受テ其自性ノ變壞ノ勢ヲ助長スル片ハ。其腐壞スルヲ甚夕迅速ナリ。是レ此章ノ第三章ノ餘義ヲ述ベ。又前章第二種ノ腐壞スルヲ或ハ速ナルアリト云ノ因ヲ述ブ。又下ノ第二十五章ノ熱壞液ノ論ト應照ス。○故ニ濕氣多ク。及ビ温暖ノ地ニ於テハ腐敗ヨリ生スル病。殊ニ多シトス。前章第二種ノ腐敗スルヲ或ハ多シト云ノ義ヲ述ブ。

上章ノ餘義ヲ申明ス

壞液ハ膿及ビ不成液。即チ萎黃病編ニ云。ト全ク其性ヲ異ニスル者ナリ。何トナレバ膿ハ自然良能ノ營爲ニテ。疾ヲ治セシガ爲ニ釀成シ設ル者ナルガ故ニ肺藏ノ主能ニ因リ。痰唾及ビ吐膿特ニ腎藏ノ機關ニ因テ便小然ニ其膿ヲ血中ヨリ分利シ出シテ驅除スルナリ。及肺腎ニテ膿ヲ分利スルヲ熱病篇第六章。咳嗽不成液篇第七十五章。胸脇痛篇第八十三章ニ出。不成液モ亦生氣ノ運行强健ナルニ依頼テハ。ヒツカハク庶幾ハ再ビ良液ニ復スベク。或ハ縦タテヒ十分ニ復スルヲ得ズトモ。無用ノ廢液トナリテ新陳相代リ除キ去ルヲ得ズシ。然ルニ壞液ニ至テハ曾テ良液ニ復スルヲナシ

且元運生氣ト雖モ亦自ラ其腐壞ヲ遁レ難シ。予々體
 中ニ於テ是ヲ良液ヨリ分利シ除クメ器ヲ得ルコト
 シ。故ニ腐壞ヨリ生スル諸病ハ危險ニシテ甚ダ治シ
 難シトス。○壞液。既ニ體中ニ生スルニ及ンテハ惡厲
 ノ勢。日ニ增長シ。漸次ニ殘害スベキ苛毒ノ性トナリ。
 自餘ノ良血液ト混淆シテ悉ク全身ノ衆器諸液ヲ腐
 壞ス。故ニ諸漏泄スル所ノ液痰唾汗尿下利失血惡臭
 稀涼ニシテ色モ亦變異シ。其性極テ惡厲ニシテ是ニ
 觸ルレバ侵蝕シ。其漏泄スルコト多シト雖モ其病毫モ
 寬解セズ。曾テ回復ノ期ナキニ至ル。是ヲ以テ其腐敗

第四章

ノ能ク速ニ增長スルコトヲ察スベシ

壞液ノ治法ヲ論ス

壞液ハ再ビ良液ニ復スベカラズ。又身體ニ於テ是ヲ
 良液中ヨリ分利シ除クノ器ナキガ故ニ。其治法唯壞
 液ヲシテ惡厲ニ進マシメズ。又其新ニ滋生スルヲ遏
 絶シ。勉テ是ヲ平常ノ道路表發ノ蒸氣ニ從テ。漸次ニ
 泄除セシムルノ藥劑ヲ用ルニ在リ。○予醫術ニ於テ
 研究歷試スルニ。壞液ノ首稱スベキ者。二種アルコトヲ
 發明セリ。其一ヲ熱壞液トス。壯熱及ビ熱病ノ諸病
 兼ヌ。其二ヲ寒壞液トス。惡寒シテ熱微ク。或ハ熱

ルナシ○疫疾及ヒ流行諸病ノ如キ其壞液ノ此各
 異ナリト雖モ皆熱壞液ニ他ナラザレバ爰ニ悉ク細
 別セズ唯此寒熱二種ノ壞液ノ治法及ビ藥劑ヲ示ス
 ノニ寒熱二種ノ治法藥劑ニ由テ統括シ治スベキヲ云

第五章

熱壞液ノ治ヲ論ス

是即チ腐敗熱ナリ。又此腐敗液ヲ一ニ腐敗
 膽液ト名ク。第二章二百四十五章ニ出。併考ベシ
 炎熱ノ國。卑濕ノ地。盛夏。或ハ雨濕多キ時候ニ於テハ
 一種ノ熱病ヲ患フ。其熱暫留シテ間歇セズ。時々増發
 スル。アリテ時ヲ定メズ。自汗シテ大ニ津液ヲ泄シ。
 或ハ下利シテ多ク汁液ヲ瀉スト雖モ病患。毫モ寛解

セズ。或ハ出血スル所アリ。或ハ刺絡シテ瀉血スルキ
 ハ初メハ輕快ヲ得ルガ如クナレ。爾後損害多キヲ
 覺エ。患者被覆スレバ汗大ニ淋漓シ。發揭シテ清涼ニ
 スレバ煩悶シ。食ヲ思フノ機衰へ。總テ食物ヲ嫌ヒ惡
 己ダ羸瘦シ。其熱ノ度ニ比スレバ衰弱スル。甚シ
 ○斯ノ如キ諸症候ヲ發スル者ハ。其血液腐敗シ。其性
 侵刺スベキ一種ノ酷厲毒トナリテ熱ヲ發スル者ナ
 リト知ルベシ是即チ熱壞液ナリ○右ノ患者ハ開豁セル乾淨
 ノ室ニ居シムベシ。否レバ濕氣ニ因テ表發ノ蒸氣ヲ
 壅遏シ其腐敗ヲシテ逾增長セシムレバナリ。然

氣ヲシテ閉塞セシムルホドニ寒涼ナラハムベカラズ。又其腐敗ヲシテ助長セシムルホドニ温蒸セシムベカラズ。唯頻々ニ鮮新清爽ノ氣ヲ迎へ引ヲ宜シトス。其傳染汚敗ノ氣ヲ以テ。更ニ逾^イ其腐壞ヲ益^イテ無ラシメンガ爲ナリ。又總テ肉ニテ製シタル飲食ヲ禁シ。唯麥粉ニテ製シタル者。或ハ苜蓿。蒿苳。酸模ノ類ニ少シノ脂類ヲ調和シ用ヒ。或ハヨク熟セル園蔬菜根ニテ作ル者ヲ佳トス。然シテ左ノ飲劑ヲ用ベシ

酸模清涼飲

熱壞液ヲ治スル清涼飲ノ方

玫瑰花

半握

酸模根

一多

精大麥

一多半

水

二十多

右件合シテ奄閉セル磁罐ニ入レ。煮テ麥熟スルニ至リ。毛篩ヲ用テ漉過シ滓ヲ去リ。枸櫞汁。或ハ栗^リ殼^ベ子ノ昆^コ設^セ爾^ル弗^フ ^名 少許ヲ調和スベシ。○其熱大ナル者ハ。消石少許加フベシ。大便壅滯スル者ハ。荅^タ末^マ林^リ度^ド少許加フベシ。○此飲劑ヲ稍^ヤ變^ヤセン^トヲ欲セバ。大麥ニ代ルニ雀麥ノ粗^コ碎^サ。或ハ蒸餅^シ ^名 ヲ用ベシ。○其熱并ニ衰弱悉ク復治シ其壞液。表發^ハ蒸氣^シヨリ

盡ク出去ルマデハ。右ノ飲劑ヲ通シテ用ベシ。不
寐ヲ兼ル者ハ右ノ飲劑ニ罌粟球一顆ヲ加ヘ煮テ
用ベシ。○其熱ヨリハ衰弱ノ症。太甚ナル者ハ右ノ
飲劑中ニ列^レ印^イ設^セ酒。少許ヲ加フベシ

右ノ治法ニテ熱壞液。所謂腐敗熱ノ初發。方ニ増進セ
ントスルヲ遏止シ。其兇猛ナル諸症ヲ抑制スルナリ
○亞墨利加^{アノリカ}地方ニ於テ多ク患ル所ノ專ラ門脉ノ血。
腐敗スル一種ノ腐敗熱アリ。此症ハ初ニ先ツ數下劑
ヲ用テ。其腐敗ノ汚物ヲ蕩滌驅除シ。然シテ清涼飲ヲ
用ベシ。是ヲ用ル^ル早キホド逾^ユ宜シ。方ハ共ニ第十二

章ニ見タリ。其候。初發。腰疼^ニ。胃ノ部ニ當テ苦悶。惡心。
精力虛脱。皮膚乾燥。小水少クシテ赤ク。脉數ニシテ弱
ナリ。上ニ論スル如キ炎熱ニシテ濕氣多キ地ニ於テ
ハ。其毒僅ニ一兩日モ體中ニ蘊蓄停住スレバ其腐敗
速ニ增長シテ氣息惡臭ヲ發シ。口苦ク或ハ綠色ナル
腐穢ノ物ヲ吐シ。齒牙舌上腐穢ノ粘液布著ス。終ニ冷
汗漏泄シ。手足冷テ顫振シ。或ハ黑物ヲ吐シ。或ハ欬咯
シテ出ル物皆黑色。或ハ欬シテ血ヲ吐キ。眩暈昏冒。譫
妄。搐掣等ヲ發シテ死ス。是レ腸間膜中ニ在ル所ノ門
脉ニ熱壞疽ヲ生シ。其腐敗セル黑色ノ液。及ビ許多

ノ如クシテ温飲シ。稱シテ香美ノ飲料トス。又大ニ胸
肺心胃ヲ強壯ニスル効アリ。其下利スル所ノ液腐敗
シテ黯赭色ナル。此飲液ニ似タル然。氏仍右ノ下劑
ヲ以テナリ。又肝崩篇ト併考フベシ。然。氏仍右ノ下劑
ヲ用テ其腐敗毒ヲ滌除スルヲ緊要トス。此ニ由テ猶
幸ニ救フ一有ベシ。若シ其毒體中ニ蘊蓄スレバ必ズ
死スレバナリ

第五章

寒壞液ノ症治ヲ論ス 内伏熱 勞瘵

壞液ノ名アリト雖モ。其治法ニ於テハ熱壞液ト相反
シテ。全ク同ジカ~~ラ~~ザル者ハ寒壞液ナリ。○其疾タル
増進スルニ漸ク以テシ。日甚^シ一日險重トナル。其人全
身瘦削シ。初ハ熱ノ發作ナク^{ヤモスレ}動輒汗出。振寒シテ虛羸

ス。終ニ頗ル熱アルヲ覺フ。是ヲ内伏熱<sup>和蘭名「スロイ
ア、コールツ」</sup>隱伏
内潜セル熱ノ義ナリ。伍^シ都^實函^ニ云^内ト名ク。此症
伏熱ハ日晡發熱シテ微惡寒ヲ兼ヌト<sup>和蘭名「テイ
リシグ」</sup>然。氏此
逾^リ增長シテ羸瘦^ルヲ勞瘵ト名ク<sup>和蘭名「テイ
リシグ」</sup>然。氏此
病ハ欬嗽ナキト。痰沫ヲ吐セザルト。ヲ異ナリトス<sup>此
症</sup>
欬^アレバ^是○此病ヲ發スル人ハ。元來生氣ノ運行微
弱ナルニ因テ飲食ヲ消化シ。良血液ヲ製造シテ維持
保護スルニ足ザルナリ。故ニ飲食ハ則チ不成液<sup>半生
未熟</sup>
液トナリ。良血液モ漸ク以テ其自性ニ任セテ渝變シ
壞液トナル。斯ノ如ク連綿トシテ止ザレバ。時日ヲ終
ルニ隨ヒ壞液漸ク增長シ。逾^ク平全ノ常性ヲ離^入終ニ

稀涼ノ壞液トナリ。身體ヲ榮養スルニ利アズシテ却テ散泄漏脱シ易キ者トナルナリ。稀痰自汗盜汗下利崩潰淡出等

○此病ニ於テ投スルニ清涼ノ劑ヲ以テスレバ患者差輕快ヲ覺ルガ如クナレト必ズ日ニ損害ヲ増ス。其故ハ是ニ由テ生氣ノ運行減損シテ其腐壞ヲ防クニ足ラズ。諸液ヲシテ逾イヨク其自性ニ任セテ變壞ノ勢ヲ縱ホシニセシムレバナリ。又温煖ノ劑ヲ與レバ是ヲ以テ其運行ヲ益シ。其壞液ヲ衝動シテ忽チ熱ヲ増發シ。諸症更ニ險惡ニ進メバナリ。故ニ患者モ亦此ニ方共ニ服スルニ堪ズシテ厭イヒ惡ムニ至ル。然レバ清涼ヲ以テ

スレト治セズ。温煖ヲ以テスレト亦治セズ。啻ニ治セザルノミナラズ。却テ劇ヲ増シ苦ヲ添ルガ故ニ。不學未熟ノ徒ハ術斯コ一窮リ。止トヲ得ズシテ苟且クニ患者ノ意ニ任セ。唯其劇ヲ増シ苦ヲ添ルトナクシテ治功ヲ奏スベシト見ユル藥劑ヲ處シテ日ヲ消カクリ。終ニ必ズ救レザルニ至ルナリ。○此壞液ノ病。世ニ稱シテ勞瘵トスル者。左ニ列スル療法ヲ以テ屢治驗ヲ得タリ。○其治法ハ温煖ニシテ腐壞ヲ遏止スル藥劑ヲ用ヒ。且ツ其熱ノ増發ヲ覺ルトナキホドニ服量ヲ小ニシ。積々ニ續テ用ル中ニ漸次ニ其量ヲ増加ルナリ。是ヲ經

驗スルニ其服量ヲ増テ。初ニ比スレバ三倍ノ量ニ及
 テ其熱増發スルコトナキ者ハ。則是一大佳事。以テ其
 功ヲ期望スベキナリ。○予ガ治法ノ標準トスル所ハ。
 樹脂類ノ藥ニ因テ諸液自性ノ腐壞ヲ遏止シ。生氣ノ
 運行ヲシテ稍々ニ増益シテ以テ良液ヲ製造セシム
 ルナリ

寒壞液ヲ治スル丸子ノ方

護謨回生丸

- 乳香
- 蘇合香各
- 安息香各一月

沒藥 一錢

瓦爾拔奴謨各 二錢

拔爾撒謨各 適宜

右件合シテ每一錢二十丸トシ。橙皮末ヲ衣トス。○
 初ハ一日ニ四次。一丸ツ、服シ。次ニ是ヲ益テ二丸
 ニ至リ。夫ヨリ次第ニ増テ三丸。或ハ四丸ツ、用フ。
 初メ一頓ニ多ク用レバ。其運行ヲ衝動シテ熱ヲ發
 スレバナナリ

膿壞液ノ症治ヲ論ス

夫レ膿ハ自然良能ノ所爲ニテ疾ヲ治スルガ爲ニ製

第七章

設スル_一明白ナリ膿ノ説第四然_一凡_一久_一體中_一鬱留
 滯止スル_一片_一ハ變_一シテ惡_一屬ナル液所謂敗血漿第二章
 トナルナリ○或ハ膿ニ惡_一屬ナル毒凡ソ體中ニ在ル
 ナル者所ノ病毒ノ惡屬混淆スル_一片_一ハ亦能ク變_一シテ腐壞スル_一他ノ
 諸液ノ如シ○然レバ膿ト雖モ腐壞スル_一ガ故ニ膿ハ
 是レ病ヲ治スルノ具ナリトシテ恬然トシテ其愈ル
 ヲ俟_一ヲ得ズ故ニ速ニ其腐壞ヲ過ル藥ヲ用テ是ヲ
 治スル_一最モ緊要タリ○左ノ方尤モ良効アリ
 膿壞液ヲ治スル飲劑ノ方

排膿祛壞湯

山蘿蔔草

龍牙草 各一握

牛蒡

舍謨^{セイム}字^イ黠^ウ謨^ハ根各一握

水 十六弓

白葡萄酒 八弓

右件合シテ奄閉セル罐ニテ煮麥酒盞ニ一盞ツ、
 温服スル_一日ニ數回

膿壞液ハ速ニ治療ヲ加フベシ。若シ延滯スル_一片_一ハ勞
 瘵ニ陷リ。或ハ肺瘍ヲ兼發スル_一ア_一レバナリ○此病
 ヲ歷試スル_一ニ其膿ヲ吐痰ニ因テ除クカ。或ハ小便ヨ

リ通泄スルヲ宜シトス。故ニ右ノ飲劑ヲ用ルノ間ニ
又痰ヲ吐セシメ。小水ヲ利スルノ丸藥。或ハ散劑ヲ兼
用スルヲ最モ緊要タリ

豁痰利尿丸ノ方

的列並底那名 四錢

右一味先ツ水少許加へ。煮テ丸スベキヲ候テ次ノ
諸品ヲ加フ

乳香

沒藥

琥珀 各一錢

豁痰利尿散ノ方

舍謨亭黜謨根名 適宜

右件調勻シ中等ノ大ニ丸シ。甘草ヲ衣トシ。三四丸
ツ、服スルヲ日ニ三次此ニ準 廿伍丸都寶函ニ云丸藥ハ大
此ニ準 スベシ 豆ノ如シト中等ノ大

乳香

琥珀

蘇合香 各半錢

舍謨亭黜謨根 末

鹿角灰 各一錢半

右件散劑トシ分テ十八服トシ。一服ツ、用ル七日
ニ三次

第三章

廢液腐壞ノ症治ヲ論ス

平全ノ人。身體ヲ榮養スルノ諸良液ト諸病ヲ生スル
惡液トノ外ニ。又一種ノ液アリ。是ヲ廢液ト謂フ。是レ
平全ノ時ニ在テハ生氣ノ運行ニ順テ善良ナル諸液
ヨリ生シ血液。全身ヲ養ヒ。諸液ヲ分利シ。其諸用ヲ濟
終リタル無用ノ廢液ハ諸竅ヨリ排泄ス。故
ニ善良ノ諸液ヨリ生スト云大小便。蒸氣等ヨリ排泄シ。新陳相代
老廢シ去ル者ナリ。○廢液ハ謝シ去ルヲ常トス。然ル
ニ大便壅滯。小便不利。表發ノ蒸氣壅遏等ニ因テ廢液

體中ニ鬱蓄スル片ハ。其一處ニ瀦留スルモ。或ハ周身
ニ運行スル者モ。皆同ク變壞シテ惡厲ノ性トナリ。遂
ニ諸病ヲ生スルナリ。故ニ是ヲ治スルノ法。唯其各自
ノ道路ニ從テ是ヲ驅除スルニ在リ。然レバ其諸道ノ
壅塞セルヲ察セバ。藥劑ヲ用テ各是ヲ開達シ治スベ
キナリ

瀉利飲ノ方

梅過瀉利飲

- 旃那葉 二錢
- 答末林度 一弓
- 諳厄利斯。瀉利鹽

過泥子アヲス 各一錢

右件合シテ水。半比ヲ用テ浸シ。藥氣ヲ出シ。漚過シ。テ一頓ニ服ス

利尿散ノ方

琥珀利尿散

琥珀 一錢

鹿角灰 二錢

杜松實油名 十滴

右件合シテ散劑トシ。分テ十服トシ。日ニ用ル。服

發汗糕ノ方

的里亞加發汗糕

的里亞加名

雜腹蘭

安質沒扭名 若波列名 各半月

白罌粟舍利別名 適宜

右件合シテ調勻シ。每夜服用ス

增補重訂内科撰要卷二終

增訂内科撰要

卷二

三

氏宗

