



增補  
重訂

内科撰要

卷四

洋学文庫  
文庫 8  
C 27  
4





京師書報

徽雅堂  
文金堂  
對玉堂

發食

重信

曾蘇

內林雜要

野園宇田山先生著



槐園宇田川先生著

增補  
重訂  
內科撰要

京攝書肆

種玉堂  
文金堂  
瑞錦堂  
發兌

增補重訂內科撰要

目錄

卷四

諸氣篇第八

風氣痞滯諸症  
風氣腹脹

腹鳴  
氣疝  
游走痛

黃疸篇第九

肝壅塞硬腫

膽液敗黑病篇第十

壞液鬱憂病





煩悶篇第十一

卷五

疝篇第十二 附 **增註**

水腫篇第十三

卷六

黴毒篇第十四 **增補**

**增註** 包皮焮衝

陰頭焮衝

淋疾 附 **增註**

便毒 附 **增註** **註** 狼倭屈

增補重訂内科撰要卷四



遠西 玉函涅斯垓我爾德兒 著

宇田川 玄 隨 晉 譯

津山

男

玄真 璘 按註

加賀 藤井 方亭 俊 增譯

諸氣篇第八

羅甸名「アラキ」和蘭名「ウーデン」○氣腫。風氣痞滯。子宮衝逆。風氣腹脹。腹鳴。氣痞。游走痛。是ニ屬ス

諸氣ノ大較ヲ論ス

身體何レノ部ニテモ腫脹スル處アリテ是ヲ按ス片

諸氣章

自丁子斗吳兵 卷目録 第五十五章



ハ陷塌<sup>シホム</sup>シ放テバ起脹シテ復故ノ如ク。宛モ氣ヲ囊ニ充テ外ヨリ切按スル如クナル片ハ風氣其中ニ在リト稱シテ是ヲ風氣ニ屬シ。或ハ噎氣<sup>モシ</sup>若クハ放屁ヨリシテ許多ノ氣ヲ發泄スル片ハ俱ニ風氣ノ患ナリト稱シテ是ヲ風氣ニ屬シ。或ハ腹中雷鳴スル片ハ輒チ風氣ノ致ス所ナリトシテ是ヲ風氣ニ屬シ。或ハ肉中及ビ肢節ニ痛アリテ走注游移スルヲモ亦風氣ノ所爲ナリトシテ是ヲ風氣ニ屬シ。或ハ風寒ヲ冒<sup>オカ</sup>シテ歩行シ若クハ賊風<sup>モシ</sup>アル處ニ坐臥シテ痛ヲ發スルモ亦是ヲ風氣ノ病トスルナリ。此諸證ヲ藥ノ風氣ノ所ナリトスルハ世上一

第七章

說ナリ然レハ各差別アリテ藥視スベカラザル義ヲ發明ノ詳ニ後ニ載ス。斯ニハ先其普通ノ說ニ從テ風氣トスル所ノ諸症ヲ舉ルナリ。

諸氣ノ病因ヲ論ス

凡ソ風氣ノ名アル病ノ類。甚ダ多キニ由テ其因。衆多ナルノミナラス治法モ亦大ニ差別アリ。故ニ唯一種ノ風氣ノミヲ標準トシ概シテ其他ヲ治セントスル片ハ錯誤ヲ致ス<sup>ズ</sup>ト多シトス。○是ヲ以テ予其風氣ニ屬スル諸病ニ就テ最モ彰著ニシテ必ズ識<sup>シ</sup>ベキ者ヲ左ニ舉テ其種類ヲ辨セシム。

風氣腫ノ症治ヲ論ス



凡ソ物ノ體質ニ於テ曾テ氣ヲ含蓄スルヲナキ者ト  
 雖モ諸般ノ腐敗或ハ泡釀或ハ煮沸スルヨリシテ必  
 ズ許多ノ風氣ヲ生スルナリ  
 他ノ果汁ニテモ泡釀セシメテ精氣ヲ出シ酒ト爲シ  
 或ハ乾固ノ物ハ水或ハ他ノ液ニ浸シ泡熟セシメテ  
 精氣ヲ出スノ類是ヲ總テ泡釀ト云ス如キ類ハ或  
 ハ火氣ヲ假リ或ハ大陽ヲ受テ浸シ置キ其物ニ含  
 メル鹽氣ト外ヨリ受ル温煖氣トニ因テ其物ノ體質  
 融化疏解シテ自由蒸氣ヲ升發シ此ニ就テ外氣其體  
 熱ニ滲入スルニ由テ其中ニ運動ヲ起シ漸次ニ泡釀化  
 ヲ含ムトナキ物ト雖モ右ノ氣出ルナリ然レバ曾テ氣  
 スルナリ諸般ノ腐敗及ビ煮沸ニ因テ氣ヲ生スルモ  
 是ニシテ體中ノ諸液ハ自己ノ性ヨリシテ腐壞シ是ヨ  
 リ能ク風氣ヲ生スルガ故ニ  
 諸液自性ヨリ腐壞スル  
 說第十九章第二十一

ツニ出 風氣腫ヲ發スル處ニ於テハ必ラズ腐壞液或ハ  
 其他ノ汚液アリト知ルベシ其腐壞ヲ假ズシテ直チ  
 ニ氣ニ因テ腫ヲ發スルハ唯胸部ノニ肺ハ氣ノ囊篇  
 ヲ含テ縮張ス凡ソ諸因アリテ胸膈ノ筋膜弛弱スル  
 處アルキハ肺ノ縮張ニ因テ胸腔内ノ氣其處ニ竄入  
 シテ能ク氣腫  
 故ニ其腐壞液ヲ除カズ其腐敗シ進  
 ム勢ヒヲ遏止スルコト能ハザル間ハ方法百計シテ  
 其腫ヲ治スト雖モ徒ニ勞シテ功ナキナリ○是ヲ療  
 スルノ法其腫既ニ潰口アル者ハ水銃ヲ用テ藥ヲ沃  
 ギ入レ其内ヲ淨滌スベシ其方燒酒ニ乳香ヲ調和シ  
 是ヲ沃ギ入テ甚キ痛ヲ發スルヲナク堪忍ブベキ程



ニ水ヲ加テ稀クスベシ○其腫ノ潰口ナキ者ハ是ヲ  
 截開テ亦前法ノ如ク療スベシ。又創口ヲ封合スベキ  
 ニ至ラバ寒涼ノ地ニ於テハ燒酒ニ乳香ヲ調和シテ  
 熨劑トシ施スベシ。熱國ニ於テハ醋ヲ以テ外敷スル  
 ヲ宜シトス。右ノ風氣腫ハ漫腫ニシテ頭ナク是ヲ按  
 囊ニ充テ按ガ如シ世  
 外科是ヲ流注ト云  
 風氣發泄ノ症治ヲ論ス

風氣發泄

曾患者ニ就テ異ムベキ一症ヲ目撃セリ。其症頃刻ノ  
 間ニ多ク嘔氣ヲ發シ或ハ直腸ヨリ多ク風氣ヲ發泄  
 ス。果實ノ屬或ハ粉麩ノ類ニテ製造セル食物ヲ喫ス

ル後ハ殊ニ甚ダシ○然レ是ヲ以テ奇異ナリトスル  
 者ハ是レ事物ヲ實驗ノ考徵スルノ精覈ナラザル  
 カリ。何トナレバ何ヲ以テ斯ノ如ク風氣ヲ生ズト云  
 フヲ推索シ。是ヲ事實ニ驗シテ考察スレバ膏ニ領解  
 シ易キノミナラズ治療ニ於テモ亦適當ノ法ヲ得ベ  
 キナリ○凡ソ果實若クハ粉麩ニテ製シタル食物ニ  
 津唾ヲ混和スル片ハ甚ダ速ニ泡釀シテ其中ニ許  
 ノ氣ヲ生スルヲ以テ微トスベキノミ。故ニ右ノ食饌  
 胃中ニ入テ風氣ヲ發泄スルヲアテバ輒チ其泡釀ヨ  
 リシテ是ヲ發スト知ルベシ。或ハ肉類ニテ製造シタ



ル食物ヲ喫シテ此症ヲ發スルハ。是レ腐敗ヨリシ  
 テ發スト知ルベシ此二症共ニ前章ノ腐敗ト泡釀ノ義ヲ述ブ○壯健無病  
 ノ人ハ右ノ如キ風氣ヲ生スル患ヒナシ。是レ胃及ビ  
 諸腸ノ元化元運生氣全フシテ健運シ其泡釀沸騰ノ動。腐  
 敗變壞ノ舉ヲ制止スレバナリ○故ニ右ノ如キ風氣  
 發泄ノ患アル人ハ胃ト腸トノ元化虛弱ニシテ其泡  
 釀ト腐壞トヲ制止スルヲ能ハザルノ致ス所ナリト  
 知ルベシ○是故ニ噎氣或ハ直腸ヨリ風氣ヲ發泄ス  
 ル患ヒニ罹リ或ハ腹中風氣鬱蓄膨脹スル症ハ是ヲ  
 治スルニ燒酒少許ヲ取テ橙皮若クハ枸櫞皮ヲ浸シ

或ハ自餘香料ノ藥品假令桂丁子肉豆蔻益智山奈迷迭香ノ如キヲ總稱ス此ナリ  
 ヲ浸シ與レバ咽ニ下リテ即チ風氣ノ逆散消亡スル  
 一ヲ知ルナリ。故ニ是ヲ破氣驅風ノ劑ト名ク。此藥特  
 ニ胃及ビ諸腸ノ運化ヲ强健ニシ。夫ノ泡釀沸騰ノ勢  
 ヲ遏止スルナリ○胃中ニ腐敗ノ物アルヨリ風氣ノ  
 症ヲ發スル者ハ枸櫞汁ニ列印列印設酒ヲ加ヘ用テ速ニ  
 治スルナリ○此論ヲ讀ム者。胃ト腸トノ風氣ハ概シ  
 テ皆夫ノ泡釀沸騰。或ハ腐敗變壞ニ因テ生スト思フ  
 コト勿レ。曾テ食物ニ因ラズシテ亦大ニ風氣ヲ發泄  
 スル症ヲ患ル者多ケレバナリ。此症ハ是レ胃及ビ腸



ノ自然ノ常調ニ逆戻スル運動ヨリ發スト知ルベシ  
○夫レ生人ノ身體ニ就テ歷試考究スルニ。生氣ノ運  
行調順ナレバ能ク風氣ヲ消散シ。逆戻スレバ忽チ風  
氣ヲ發現ス。其精詳ノ論ニ於テハ予ガ此略説ノ能ク  
悉ス所ニ非ルナリ○其胃ト腸トノ運動。自然ノ常調  
ニ逆戻スル者ハ假令ハ婦人。子宮衝逆ノ病和蘭名「ナ  
世ニ婦人ノ積聚衝逆ト稱スル症。皆此病ニ屬ス。ノ如  
第百四十三章ニ略其病症ヲ論ス併考フベシ  
キ。纒ニ心意ヲ鬱悶擾動スルハ胃腸ニ許多ノ風氣  
ヲ生シ或ハ是ヲ發泄スルナリ○治法ハ香料ノ藥品  
前ニ催睡藥第四十一  
注スニ少許ヲ加テ與レバ其胃腸ノ

自然ニ逆戻スル運動。速ニ靜止スルナリ。故ニ阿芙蓉  
劑ハ此症ニ用テ破氣驅風ノ一良藥トス○又左ノ方  
尤モ良驗アリ

破氣驅風劑ノ方

驅風飲

- 薄荷水 八勺
- 的里亞加 一錢半
- 沒藥丁幾去爾 二錢
- 橙皮油 五滴
- 阿芙蓉液 十五滴
- 急製礪砂精 一錢

製法第百十三章ニ出

製法第五十章ニ出



白罌粟舍利別 一

第五五章

右件合シテ調勻ス○先、橙皮油ニ砂糖少許ヲ研和  
スベシ然ラザレバ衆藥ト調和シ難シ○若シ沒藥  
ノ丁幾去爾ナキ片ハ是ニ代ルニ沒藥ノ末一錢ヲ  
加フベシ○若シ稍温暖ノ功アランコトヲ要セバ消  
疝露氣疝ヲ治スル二錢ヲ加フベシ○右ノ劑ヲ四  
分時或ハ半時毎ニ一匙宛服シ病差ルヲ度トス  
風氣腹鳴ノ症治ヲ論ス

腹鳴ハ風氣腹中ニ鬱蓄シテ運動スルノ症トスルコト  
世人一般ノ通論ナレトモ予ハ是ヲ淺陋ノ説トス。大抵  
衆人オモヘラ以爲ク氣ハ能ク運動スト。然レ氣ヲシテ胃及ビ  
腸ノ如キ密閉セル處ニ遮隔シテ充塞セシムル片ハ  
毫モ自ラ運動ヲ爲スカナキコトヲ察セザレバナリ○  
何トナレバ試ニ死體ノ胃腸ニ風氣ヲ充ルト雖モ運  
動セズ。腹鳴ヲ作スコトナシ。唯生活ノ身體ノミ特リ是  
ヲ發スレバナリ○故ニ腹鳴ハ胃ト腸トノ自然ノ常  
調ニ逆戾セル運動ヲ發シテ其中ニ在ル所ノ氣ヲシ  
テ腸ノ迂曲詰盤セル屈絡襍積ノ中ヲ回轉推盪セシ  
メテ其聲ヲ生スルナリ○斯ノ如ク自然ニ反スル運  
動。其氣ヲ推盪シテ腹鳴ヲ作スノミナラズ是ヨリ亦



能ク風氣ヲ生スルナリ。故ニ其運動頑固ニシテ休ガ  
レバ假令<sup>タトヒ</sup>許多ノ風氣ヲ外泄スト雖モ其腹痛ハ依然  
トシテ去ラザルナリ。然レ疝痛ト名ル腹痛<sup>胃疝ノ症</sup> 第百四  
二章<sup>出</sup>ハ風氣ヲ發泄スレバ其痛大ニ減スルナリ。是  
レ一ニハ胃及ビ腸ノ纖維ノ痙攣拘急自ラ能ク寛<sup>ユル</sup>縱<sup>ム</sup>  
ヲ爲ス候トシ。一ニハ其自然ニ反スル運動ヨリ作<sup>ユ</sup>リ  
タル風氣ノ發泄スルニ因テ其部ノ牽引急張スルモ  
亦減スレバナリ。○其治法前章ニ説ク如クシテ能ク  
治ス。是レ其自然ニ反スル運動ヲ靜止スレバ風氣自  
ラ散泄シ。痛自ラ休ミ。其餘ノ風氣ハ諸藏ノ自然常調

ノ運化ニ從テ消散シ治スレバナリ。○是ヲ以テ予胃  
疝。腸疝。此疝ノ諸症第百四十八  
章<sup>第百四十九章ニ出</sup>ト稱スル症ヲ療ス  
ルニ風氣ノ發泄ナク又下劑ヲ用ヒズシテ多クハ治  
スルナリ。○然レ若シ萎黃病ノ症候<sup>第十七章ニ出</sup>ツヲ發スル  
ニ因テ腸中壞液アリテ侵刺シ風氣及ビ疝症ヲ發ス  
ルト察セバ先ヅ其壞液ヲ滌除スルヲ緊要トス。便  
チ左ノ方ヲ用フベシ  
疝ヲ治スル下劑ノ方

梅馨治疝飲

梅那葉 二錢

葛縷子 〇



諸厄利斯瀉利鹽

橙皮 各一錢

右件合シテ水六斗ニ浸シ。藥氣ヲ出シ。漉過シテ左ノ藥ヲ加フ

白罌粟舍利別 一斗

右調和シ一頓ニ温服ス

白罌粟舍利別ハ予數諸篇ニ載セ且讀者ヲシテ自ラ製造セシムルヲ便利トスルガ故ニ。左ニ製法ヲ録ス。世ニ用ル尋常ノ製ヨリハ簡ニシテ精ナリ

白罌粟球。二十顆ヲ取り莖ト子ヲ去リ對ニ水ニ浸

第三章

ス。一夜煮テ脆熟スルニ至リ。絞テ滓ヲ去リ。砂糖一斗ヲ加テ調和シ。更ニ煮テ舍利別ノ稠ト爲ス。稠トナルヲ云。但シ是ヲ煮ル間ニ上面ノ浮沫ヲ抄ヒ去ルベシ。○右製法ノ舍利別ハ用ル。少許ニシテ罌粟一顆ヲ服スルヨリハ其効多シトス

風氣游歷ノ症治ヲ論ス

風氣ノ游歷走注スト云ノ說。第五十五章ニ云。肉中及游移スルヲモ風氣ノ所爲ナリトシテ是ヲ世ニ通シテ論スル所ナレ也。予カ前ニ說ク所ノ確證アルニ若ハナシ。傷冷毒篇第四十七章。痛風何トナレバ全身ノ



筋肉中ニハ必ズ風氣ノ游歴スベキ空隙無ク又風氣ノ游歴スト思ヘル部ニ於テ毫モ氣ノ充脹セル候ヲ見ハストナク唯<sup>タチ</sup>倏忽ノ間ニ處ヲ移易スル疼痛ヲ發スルノミ。然レバ是レ實ニ風氣ノ游歴セル徴ニアラズシテ唯酷厲液アリテ走注ヲ為ス症候トス○然レ衆人ニ在テハ其酷厲液何ヲ以テ斯ノ如ク速ニ流移游走スト云フ甚タ領解シ難キ所ナリ○夫レ神經線ハ寒熱痛痒凡百ノ感觸ヲ知覺スルヲ主リ且ツ皆數條會撮叢束ノ一箇ノ室中ニ在テ其所在ニ隨ヒ諸所ヨリ相分レテ全身ノ諸藏衆器ニ循行ス  
室ハ其叢束セル神

經線ノ外圍ヲ包裹セル膜ヲ云神經線神經室共ニ第四十六章第四十七章ニ出○神經線ハ其諸部ニ循行スル支別ニ於テ故ニ第四十七章ニ説ク如キ神經液モ皆此膜室アリ  
 中ニ酷厲毒アリテ其初メ唯一神經線ニ著<sup>ツ</sup>キ夫ヨリ稍轉移シテ其線ト近ク相接比スル他ノ神經線ニ著<sup>ツ</sup>ク片ハ其線各相分レテ循行スル所ヲ異ニスルガユエニ其毒モ亦コレニ循<sup>シテ</sup>ヒ相分レテ各部ニ流注スルナリ是ヲ以テ其疼痛モ亦速ニ甚タ遠ク相隔チタル部ニ轉移スルヲ領解スベクシテ毫モ疑怪スルヲ無ルベシ○然レバ茲ニ所謂ル風氣ノ症ハ傷冷毒  
第四十七章ニ出



治法モ亦各其門ニ從テ施スベキナリ

風氣游歴。寒冷ニ因ルノ症治ヲ論ス

人動モスレバ輒チ風氣ノ發動ヲ患フル性ナル者多

シ。假令タトヘバ屋外敞豁ノ地ニ居リ或ハ牖間戸隙ノ處ニ

坐シ或ハ風寒ヲ犯シテ往來シ或ハ纒ワツクニ冷地ヲ步履

スト雖モ忽チ風氣腹中ニ充テ所謂ル氣疝第二百四

風氣ニ因ル疝痛第十九章ノヲ云併考フベシヲ發スルノミナラズ。總身各部ニ風

氣ノ走注游移スルガ如キヲ覺ル等ナリ○是ニ於テ

患者自ラ以爲ヲク是レ外來ノ風寒。身體ニ襲入シ内蓄

シテ遍フミチク竅行游走スト。乃チ賊風スキマカゼヲ避サケンガ爲ニ風氣

ノ由リ來ル所ヲ屏障シ。身ニハ巾帽ヲ被リ。又巾ヲ以

テ其口ヲ蔽カホヒ風氣ヲシテ襲入スル所無ラシムベシ

ト○此皆不學未熟ニシテ其病原ヲ覈知セザルガ故

ナリ。何トナレバ其體中ニ覺ル風氣ハ是レ口鼻ヨリ

吸入シ或ハ皮膚ヨリ感受セル等ノ外來ノ風氣ニ非

ズ。唯寒涼ナル外氣ヲ以テ身體表發ノ蒸氣ヲ壅遏シ

テ其體中ニ滯止セル無用ノ老廢液并ニ其廢液ノ鬱

敗シテ酷厲液トナル者。即チ其風氣ノ游走セル如キ

疼痛ヲ發スルノ原由ナリ○其内鬱セル廢液。專ラ神

經液中ニ宿ヤドリ。腸間膜ノ神經ニ浸淫スルハ則チ其

痛ヲ發スルノ原由ナリ○其内鬱セル廢液。專ラ神

經液中ニ宿ヤドリ。腸間膜ノ神經ニ浸淫スルハ則チ其

痛ヲ發スルノ原由ナリ○其内鬱セル廢液。專ラ神

經液中ニ宿ヤドリ。腸間膜ノ神經ニ浸淫スルハ則チ其

痛ヲ發スルノ原由ナリ○其内鬱セル廢液。專ラ神

經液中ニ宿ヤドリ。腸間膜ノ神經ニ浸淫スルハ則チ其



部ニ疝痛ヲ發シ。又夫ノ自然ノ常調ニ逆戾スル運動  
 ヲ發シテ腸中ニ許多ノ風氣ヲ生シ。或ハ四肢ノ神經  
 ニ轉移スル片ハ歷節痛第五十一ヲ發スルナリ。○治  
 法ハ第四十九章ノ藥劑ヲ用テ其廢液ヲ皮表ニ發遣  
 シ是ヲ外洩シテ治スベキノ云

癰疽

黃疸篇第九

羅甸名「イクトルス」和蘭名「ゲール」云クト

附 肝藏壅塞硬腫

黃疸ノ大較ヲ論ス

膽液ハ常ニ肝膽ノ二藏ヨリ膽液管ニ流通シテ胃ノ  
 下口ニ連續スル所ノ十二指腸ニ輸イタシ注クナリ膽液管ハ  
 肝膽ヨリ膽液ヲ受テ十二指腸ニ注ク諸管ヲ總稱ス。  
 醫範提綱ニ所謂肝管膽管總管ヲ云諸腸ノ名義肝膽  
 諸管醫範提綱出○膽液ノ平人ニ於ル其色常ニ黃ナリ。然レ  
 腐敗スルニ至テハ變シテ一ナラズ。或ハ灰白或ハ綠  
 色或ハ鉛色或ハ黑色トナル。○唯其膽液ノ變スルト  
 變セザルトヲ問ハズ常例ノ如ク十二指腸ニ通泄セ  
 ガルニ因テ逆流シテ靜血脉ニ滲入シ血ニ混淆スル



片ハ膽液管閉塞スル片ハ膽液自ラ肝ニ逆流シ肝中  
 幹ノ静脈ニ入テ其血ニ混淆シ静脈幹ニ入り動脈  
 彌漫スルナリ膽液ノ自家ノ黄色總身ノ皮膚眼ノ  
 白膜及ビ小便ニ見ハレ。是ニ布帛若クハ紙ヲ浸セバ  
 其黄色ニ染漬スルヲ甚フシテ灌漑スレモ深雪スル  
 一能ハズ○大便モ亦黄色ナルヲ常トス然ルニ此症  
 ニ於テハ變シテ白色ヲ帶ビ或ハ灰色トナル。是レ膽  
 液平常ノ如ク腸中ニ輸シ來ラズシテ大便コレニ染  
 ルヲ無レバナリ○唯其黄色ノ皮表ニ發見スルヲ以  
 テ黄疸ト名ク。膽液腐敗シテ疾ヲ發スルガ如キハ更  
 ニ此病ト差別アリ前ニ云膽液ノ平人ニ於ル其色常ニ黄ナリ然レ腐敗スルニ至テハ

第三章

變シテ一ナラス。灰白。綠色。鉛色。黑色トナル。是  
 ナリ。次篇ノ膽液敗黑病ヲ參考シテ知ルベシ

黄疸ノ病因ヲ論ス

凡ソ膽液ノ十二指腸へ通泄スルヲ阻遏シ。膽液ヲシ  
 テ流通スル處ナク。自ラ逆流シテ静脈ニ濫入セシ  
 ムル所ノ諸因ハ皆黄疸ヲ發スル因ナリト知ルベシ。  
 然レバ其因一様ナラザルガ故ニ診法并ニ治法ニ於  
 テモ大ニ區別アリ○予左ニ其較著ナル諸因ヲ舉テ  
 各治方ヲ附スルナリ

第四章

黄疸。膽液管ニ小石結成スルニ因ル症治ヲ論ス  
 虞ラズ屢黄疸ヲ發シ。毎次治療ヲ俟ズシテ自然ニ愈



ル者アリ。其症種々ノ色アル大便ヲ通ス。然レ多クハ  
 白色或ハ灰色ニシテ粘稠。胸中ハ下ニ當テ數苦煩シ  
 全身黄色ヲ發ス。○此症ハ小石。膽液管中ニ生シテ梗  
 塞シ。膽液ノ十二指腸へ通泄スル道路ヲ遏絶スルヨ  
 リ發スト知ルベシ。然レ其小石自ラ其處ヲ閉開シテ  
 脱スル片ハ膽液常道ニ流通シテ此病漸ク愈ルナリ  
 ○右ノ如キ患者ノ死體ヲ解剖シテ觀ル片ハ膽及ビ  
 膽液管中ニ必ズ小石アリ。○若シ大便ニ一二ノ小石  
 ヲ通シ是ヲ取テ火ニ投スレバ焚燒シルハ膽液結成  
 スル微ニシテ膽液管ヨリ或ヒハ黄色ニシテ粘稠ナ  
 脱出セル結石ナルヲ證ス。

ル汚液ヲ下利スルハ此病治スルノ徵トス。○故ニ此  
 類ノ黃疸ハ其小石ヲ溶解消化シ且ツ大便ヲ通利ス  
 ル藥劑ヲ用フベシ  
 結石ヲ消化シ大便ヲ利スル丸子ノ方

銷石丸

- 瓦爾拔奴護 各二錢
- 勿搦祭亞石鹼 各二錢
- 酒石鹽 半錢
- 大黃 末 一錢
- 越栗失爾剥祿布利恒 適宜

右件合シテ調勻シ。每一錢十五丸トシ。四丸宛服ス



瘧疾

ルナ日ニ三四次○此患者ハ專ラ蔬菜ヲ食セシムルヲ佳トス。諸油膩粘稠ノ物ヲ禁スベシ

黄疸。瘧疾瘧疾ニ因ルノ症治ヲ論ス

瘧疾瘧疾急ヲ患ル人或ハ子宮衝逆ノ病アル者瘧疾ハ和蘭名ハトイフテキレグ第百三十八章ニ出子宮衝逆ハ和蘭名ヲステイギレク第百三十八章ニ出第百三十八章ノ註及ビ第百三十三章ニ或ハ心意ヲ勞苦シテ感觸擾動スル太甚キ片ハ速ニ黄疸ヲ發スル者數コレアリ。是其瘧疾急是皆内部諸藏ヲ以テ瘧液管ヲ瘧縮スルナリ其瘧疾急ナリテ瘧液已ナリ得ズ逆流シ靜血脉ニ滲入シテ血ニ混清シ總身ニ彌漫スレバナリ○故ニ其瘧液管ノ瘧

セル間ハ黄疸治スルナシ。唯其瘧縮ノ弛解スルニ從テ漸ク消散スルナリ。是レ其瘧液ノ混淆セル血ヲ肝藏ニ於テ復テ悉ク滲過泌列シ。瘧液ハ十二指腸へ通泄シ去リ。身體ノ血。是ニ於テ始テ純潔トナレバナリ○是ヲ以テ發歇往來アル黄疸ニ於テハ諸家ノ説ク如キ瘧中ニ小右アルノ確徵ヲ見スナシ往來アルノ結石ノ症ニ非スシテ此章ニ論スル○故ニ此症ハ瘧液管ノ瘧急ヨリ起ル症ナルヲ云尋常ノ黄疸ヲ治スル方法ヲ施スト雖モ曾テ功ヲ得ルナシ。唯第五十八章ニ舉ル瘧疾瘧疾急ヲ靜止スル藥劑ヲ用レハ必ス治スルナリ是レ自然ノ常調ニ反



劑ニシテ所謂ル破氣驅風劑ナリ。第五  
 十九章ノ白罌粟舍利別モ此ニ同シ。何トナレバ其  
 牽縮學急弛解スレバ膽液自ラ常道ニ循行シ是ニ從  
 テ肝藏モ亦能ク膽液ヲ血中ヨリ分利スレバナリ。便  
 チ顔面及ビ小便ノ黃色減スルヲ觀テ是ヲ徵スベシ  
 ○故ニ小便黃色ナルハ此病治スルノ徵ニ非ズ其色  
 ノ濃キホド逾險重ナリト知ルベシ

黃疸

黃疸。嘔吐ニ因ルノ症治ヲ論ス

劇ク嘔吐ヲ爲ス後卒ニ發黃スル者予屢見ルヲアリ。  
 是ヲ研究スルニ膽液ハ稍々ニ膽ヨリ膽液管是レ醫  
 二所謂膽管ナリ。膽ヨリ總管ニニ循行シテ漸次ニ十  
 連リ膽液ヲ十二指腸ニ注入ス

二指腸ニ注入スルヲ常トス故ニ膽中ニ膽液滿盈ス  
 ル時膽液盈虚アルノ說  
 第二百十四章ニ出適嘔吐ヲ發スル氏ハ是レヲ  
 以テ緊ク膽ヲ壓搾スト雖モ嘔吐スレバ胃腸大ニ學  
 急シテ膽ヲ壓下甚シ  
 其中ノ膽液ヲ一頓ニ多ク十二指腸ヘ傾瀉スルヲ能  
 ハズ且嘔吐スレバ腹筋緊攣絞急シ。十二指腸モ共ニ  
 絞急スルヲ殊ニ甚フシテ膽液ノ斯ニ注入スル管口  
 窒塞ス。是ニ因テ膽液劇ク壓搾セラレテ他ニ行ク處  
 ナク皆肝中ノ膽液管ニ逆行シ肝藏中ニ微細ノ膽液  
 管多シ此管ハ肝藏ニ  
 テ製造セル膽液ヲ受テハ輸是ニ連ル肝中ノ靜血  
 管ニ輸リ一ハ肝管ニ輸ル  
 脈ノ支別ニ濫入シ。血ニ混淆シテ黃疸ヲ發スルナリ



○但シ此症ハ長ク暫留セズ。且ツ藥セズシテ自ラ愈  
ユ。其故ハ嘔吐休ニ。胃腸ノ攣急弛緩スル片ハ肝藏ノ  
官能ヲ以テ復<sup>ス</sup>其膽液ノ混淆セル血ヲ盡ク分泌スレ  
バナリ。然<sup>レ</sup>通例是ニ治療ヲ加ヘ自然ノ治愈ヲ以テ  
藥劑ノ功トスルヲ多シ。○此症ハ後ニ載ル所ノ治法  
ヲ以テ 嘔吐篇第二  
百八章ニ出 其劇<sup>シ</sup>キ嘔吐ヲ治スルヲ肝要ナリ。  
是ニ由テ黃疸モ亦自ラ治スレバナリ

藥劑

黃疸熱病ニ因ルノ症治ヲ論ス

凡ソ熱病ニ黃疸ヲ發スル者其診法及ビ治法ニ於テ  
古今諸家ノ說大ニ紛錯ヲ致シテ一定ナラズ。故ニ

藥劑ヲ處スルモ甚ダ異同アリ。○爰ニ悉ク是ヲ舉レ  
バ甚ダ浩繁ニシテ此略冊子ノ能ク備フベキニ非ズ  
且、初學ノ輩ニ在テハ辨スルヲ能ハザルガ故ニ今其  
多岐ニ涉ラズシテ辨シ易キ二症ヲ舉テ左ニ示ス。○  
若シ人他病ヲ夾ムトナキ純一ナル暫留熱 第三章  
ニ出ツ 患ヒ。初發ヨリ第四日或ハ第七日頃ニ當テ其熱ニ因  
テ自然ノ常調ニ逆戻スル運動ヲ膽液管ニ發スル片  
ハ。膽液。腸ニ流通セズ逆流シテ自ラ膽中ニ聚リ。其失  
常ノ運動ニ因テ是ヲ肝ニ輸シ。肝中ノ膽液管ヨリ肝  
ノ靜血脉ニ驅逐シ血ト相混シテ黃疸ヲ發スルナリ



肝中ノ膽液管ハ前章ニ註ス○若シ身體自然ノ良能ニテ其熱病ノ毒ヲ剋制化熱シテ排泄スルガ爲ニ其失常ノ運動ヲ作ス者ナル片ハ其黃疸ハ一箇ノ善徵ニシテ。是ヨリ其病毒ヲ排泄スル通利大小便汗等ヲ云アリテ其熱減スルナリ○然レモ熱病ノ險惡ニ進ムヨリシテ其失常ノ運動ヲ作ス症ナル片ハ是ヨリ患者速ニ虛脱シ熱モ亦増劇ス。故ニ此發黃ハ惡徵トス○右ノ如キ熱病ニ兼發スル黃疸ハ別ニ藥劑ヲ變スルニ及バズ唯其熱病ノ諸症ニ從ヒ治法ヲ施シテ足リトス○或ハ熱病ニ於テ其毒殊ニ肝藏ヲ侵襲シテ肝ノ焮熱スル下

モ肝焮衝ノ如クナルニ因テ亦黃疸ヲ兼發スルニアリ。此症ハ刺絡ヲ施シ且ツ第十二章ニ舉ル清涼ノ下劑。并ニ清涼飲ヲ用テ其發熱太過ノ運動ヲ降鎮スベシ。是ニ由テ其熱解スレバ黃疸自ラ消散ス焮衝ハ一テ内外ノ別アリ其外部ニ發スル者ハ肢體各部所在ニ拘ラズ形狀大小ヲ論セズ一切焮熱腫痛シテ未ダ膿ヲ成サズ潰破セサル症ヲ惣テ外部ノ焮衝ト名ク故ニ其症狀ヲ以テ言フ片ハ焮腫及ビ焮痛ナリ其焮衝消散セズ膿ヲ成シ或ハ潰破スレバ是ヲ膿瘍潰瘍ト名ク○内部ノ焮衝ハ凡ソ内部諸器各藏ニ於テ酷厲性ノ血液留結シテ侵入スル處アレバ其部ニ於テ焮熱刺痛ヲ發スルヲ猶外部ノ焮衝ノ如シ是ヲ内部ノ焮衝ト名ク是ヲ焮衝熱ト名ク此症多クハ壯熱煩渴等凡ソ熱病ノ諸症ヲ兼テ是ヲ焮衝熱ト名ク焮衝ハ腦ノ焮衝ハ然レモ患部ニ從テ其症亦躁ヲ兼テ咽喉焮衝ハ咽喉焮腫疼痛シ肺焮衝ハ效劇

曾下斗異

卷四

七

風雲堂



ク呼吸不利促進ヲ兼子胸肋焮衝ハ胸肋刺痛呼吸ニ  
牽引スル等ナリ其他肝脾橫膈胃腸腎膀胱子宮等皆  
其部位ニ焮熱刺痛ヲ發スルト其兼症トニ就テ其處  
ノ焮衝タルヲ知ル此内部焮衝モ消散セザレバ終  
ニ膿ヲ成サズ變壞シテ壞疽トナル症アリ其症治皆内  
科諸書ニ  
詳ナリ

第六章

黃疸。肝ノ壅塞。硬腫ニ因ルノ症治ヲ論ス

肝藏ニ壅塞及ビ頑硬結腫ヲ生スル片ハ是ヲ以テ膽  
液ノ腸ニ通スル道路ヲ阻遏スルニ因テ最モ險惡ナ  
ル一種ノ黃疸ヲ發スルヲアリ○此症ハ先ツ其肝ノ  
壅塞ヲ疏通シ。膽液ノ道路ヲシテ障碍ナク通利セシ  
ムルニ非レバ黃疸モ亦治スルヲ能ハズ。然レ凡容

ニ是ヲ疏通スベカラザルガ故ニ此症最モ險惡ナル

所以ナリ○其症上腹鳩尾ヨリ其兩側短肋ノ下ニ於

テ痞脹硬滿シ。殊ニ右肋ノ下。肝藏ノ部位ニ於テ甚シ

○總テ肝藏壅塞スル片ハ悉ク黃疸ヲ發スト思フ

勿レ。唯其壅塞ニ就テ膽液ノ道路ヲ阻遏スル片ハ輒

チ黃疸ヲ發スルナリ○此肝藏ノ壅塞及ビ硬腫。長ク

替留シテ去ザレバ膽液モ久ク鬱滯シテ漸ク腐敗シ

宛モ諸般ノ液汁久ク鬱滯シ腐敗スルガ如ク是ニ因

テ黃疸モ漸次ニ險重ト爲リ。膽液モ終ニ變シテ黑色

ト爲ルナリ○此症ハ其鬱滯セル膽液ヲ通泄スル療



法ヲ施スト雖モ必ズ効ナク。又幾許イカホド黃色ノ小便ヲ通  
 スルヲ多シト雖モ曾テ治スルヲナクイヨク逾險重ナリト  
 知ルベシ。其故ハ腎ハ小便ヲ分利スル器ナレバ膽液  
 ヲ血中ヨリ分泌スルコト能ハズ。唯肝藏開通シテ膽  
 液ヲ分泌スルニ非レバ治セザレバナリ。○是故ニ意  
 ヲ用ヒカヲ竭シテ方藥ヲ處シ。其肝藏ノ壅塞ヲ開達  
 疏通スルヲ肝要ナリ。然凡其壅塞ノ因。一ナラザルガ  
 故ニ爰ニ盡ク歷舉スルヲ能ハズ。唯此症。通例粘稠液  
 ヲリ發スルヲ多キガ故ニ特ニ其方劑ヲ示スノニ其  
 他ハ其壅塞ノ因ニ從ヒ諸書ニ載ル所ノ各異ノ治法

ヲ考索シテ療スベシ

凝結ヲ疏解スル熨劑ノ方

**解凝熨方**

- 蒲里阿尼亞 一握
- 亞爾鮮葉 二握
- 接骨木花 一握
- 胡盧巴子 末 二握

右件水ト葡萄酒ト等分ヲ用テ煮テハツ布ト爲シ  
 温ニ乘シテ肝ノ部ニ貼ス。更換スルヲ日ニ二次。先  
 ツ的列竝底那油。少許ヲ用テ患處ニ摩擦シ。然シテ  
 貼スベシ



凝結ヲ疏解スル散劑ノ方

廬沒解凝散

廬會 半錢

沒藥 二錢

酒石鹽 各一月

乳香 各一月

右件散劑トシ。分テ十二服トシ。一服宛用フル。一日ニ兩三次

凝結ヲ疏解スル膏藥ノ方

石鹼解凝膏

謨失刺及尼蒲私膏 各一弓

石鹼膏 各一弓

右件合シテ調和シ。軟革ニ攤テ拔爾撒謨。字露ヲ適宜ニ塗リ患部ニ貼ス。○前ニ記ス熨劑ヲ施ス。能ハザル者ハ此膏ヲ貼スベシ。○若シ右ノ膏。兩種ヲ得ル。能ハザル者ハ其中ノ一種ノニ用テ可ナ



[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

膽液敗黑病篇第十

羅甸名メラレコリア和蘭名スワルトガルシキテ

附 壞液鬱憂病

膽液敗黑病ノ大較ヲ論ス

膽液敗黑病ハ患者故<sup>ユ</sup>ナクノ鬱憂悲悶シ又神志知覺  
 常ノ如ク爽明ナラズノ疑惑迷罔シ事ニ臨テ思慮錯  
 謬スル症ヲ發スルナリ是レ元來膽液腐敗シ變ノ黒  
 色トナルヨリ發スルガユエニ爾<sup>シカ</sup>ク命<sup>ナク</sup>クト雖モ他ノ  
 因ヨリノ右ノ症ヲ發スルヲモ亦概<sup>シテ</sup>ノ此名ヲ命スル  
 ナリ○此病今人通シテ依<sup>イ</sup>剥<sup>ホ</sup>昆<sup>コ</sup>埴<sup>シ</sup>兒<sup>ル</sup>ト稱ス然<sup>レ</sup>モ依<sup>イ</sup>剥<sup>ホ</sup>  
 昆<sup>コ</sup>埴<sup>シ</sup>兒<sup>ル</sup>ハ元來上腹病ト名クベキ者ニノ此病ノ名ニ

胆液



適當セザルナリ 短肋ノ下腹ノ上邊ノ部ヲ總テ依利  
困重ノ心思鬱憂セル 病ト異ナレハ依利昆垚兒ト名ク是レ其  
病因ハ膽液敗黒病ト 以テ今人通ノ此病 ○予意ニ敗黒セル膽液ノ病ハ多  
ノ名トスルヲ云 クハ鬱憂悲悶シテ神識知覺ノ差常ニ違ヘル症ヲ發  
スルヲ恰モ依利昆垚兒ノ病ノ如ク又短肋ノ軟骨下  
短肋ノ下端腹ニ向 フ處ハ皆軟骨ナリ所謂依利昆垚兒ノ部ニ當テ其  
諸症候ヲ發スルガ故ニ爾ク是ヲ依利昆垚兒ト名ル  
ナルベシ ○凡ソ神志知覺迷罔シテ鬱憂悲悶ヲ發ス  
ル病概シテ是ヲ膽液敗黒病ニ屬シ又コレニ依利昆  
垚兒ノ名ヲ命スルガユエニ治法ニ就テ大ニ紛亂ヲ

第七章

致スナリ。何トナレバ予。世ニ通シテ依利昆垚兒ト稱  
スル所ノ意思ノ常態ヲ變易セル病ヲ見ルニ。少シモ  
膽液敗黒ノ徵ナキ者數コレアリ。然レバ此症ニ膽液  
敗黒ノ治法ヲ施スハ逾險重ニ進ムナリ ○故ニ予。  
世ニ依利昆垚兒ト稱スル病ニ二種ノ區別アルヲ  
左ニ記ス。其二種ハ神志昏迷昏惑シ。多クハ熱ナク  
必ズ鬱憂悲悶ヲ兼ルナリ  
膽液敗黒病ノ因ヲ論ス  
夫レ人ノ事物ヲ辨知シ道理ヲ識別スル所以ノ者ハ  
皆ニ腦ノ機關。平全健康ナルノニナラズ。又其灌溉ス



ル所ノ精氣ノ常性ヲ爽ハガルニ因ル精氣ハ和蘭名  
活的ノ精氣ニシテ即チ醫範提綱ニ所謂靈液ナリ是レ生  
レ腦ニ生シ神經ニ流通シテ全身ニ灌漑普達シ寒熱  
痛痒ヲ知リ生氣活動ノ妙用ヲ主ル此中ニ靈妙ナル  
神氣ヲ含メリ故ニ神識知覺ノ用ヲ以テ言フ片ハ即チ  
精神ニシテ第四十六假令バ酒或ハ斯ノ如キ醞釀セ  
章ニ論スルガ如シ  
ル飲液或ハ性氣ノ慄悍ナル藥ヲ服スレバ精氣是ガ  
爲メニ變化セラレテ常性ヲ失ヒ其醜醜セル者ト平  
人ト思慮言動ノ同ジカラズシテ情態大ニ徑庭アル  
一。是レ其較著ニシテ領解シ易キ所ナリ○膽液敗黑  
病モ亦斯ノ如ク其敗黑ノ膽液腦中ニ運輸スル片ハ  
精氣是レニ變化セラレテ必ズ鬱憂悲悶ノ症ヲ發ス

第三章

ルナリ凡ソ酒ノ類慄悍ノ飲液ヲ服シテ血ニ入り上  
ノ性ニ從テ神識思想ノ常態ヲ變セシム敗黑膽液モ  
亦斯ノ如ク腦ニ運行シ靈液ニ混スレバ其敗黑液ノ  
自性ヲ以テ活潑爽明ナル精神ヲ○然レ虛弱ノ人ニ  
抑壓蔽塞シテ憂悶ヲ生スルナリ  
於テハ膽液敗黑ニ非スシテ唯壞液ヨリ此病ヲ發シ  
淹滯シテ經年治セザル者ヲ見ルコトアリ○右ノ二種  
ノ病治法ヲ一ニシテ治スベキ者ナラバ予豈敢テ研  
究覃思シテ差別ヲ爲サンヤ唯此差別治法ニ於テ工  
夫ヲ爲スノ一大綱要タレバナリ  
膽液敗黑病ノ症治ヲ論ス  
敗黑膽液ヲ生スル諸因ヲ悉ク舉シト欲スレバ甚ダ



冗長ナルガユエニ爰ニ只其症治ヲ示スノ云〇敗黒  
セル膽液ハ門脈中ニ鬱積シテ大抵上腹ノ部ニ在リ  
是レ依<sup>イ</sup>剥<sup>ハク</sup>昆<sup>コン</sup>埋<sup>デ</sup>里<sup>リ</sup>亞<sup>ア</sup>故ニ此部ニ當テ苦煩痞悶シテ冷  
ノ部ナリ前ニ註スル故ニ此部ニ當テ苦煩痞悶シテ冷  
ル等ノ症ヲ發ス若シ治セズシテ久ヲ經其敗黒液漸  
次ニ靜血脈大幹ニ入り。腦ニ上行スルハ其敗黒液  
肝中ノ門  
脈ヨリ肝ノ靜脈ニ入り夫ヨリ靜脈大幹ニ入り。神識  
心肺ヲ經テ動脈大幹ニ入り。腦ニ上行スルヲ云  
知覺始テ守操ヲ失テ痴疑迷罔シ。故ナクシテ鬱憂悲  
悶シ。間室無人ノ處ニ獨居スルヲ好ムナリ〇患者  
ノ皮色平常ニ比スレバ黯楮ニ見ユルヲ多シ〇此症  
ハ衆人以為ク刺絡シテ其意思ノ變動ヲ鎮定スベシ

ト。若シ果シテ刺絡スル片ハ必ス困篤ニ進ムナリ。是  
レ其敗黒液。虚ニ乘シテ逾多ク門脈ヨリ靜血脈大幹  
ニ濫入スルノ釁ヲ開ケバナリ〇是ヲ以テ此ヲ治ス  
ルニ唯其敗黒液ヲ大便ヨリ驅除スルヲ良法トス。是  
レ腸間膜ノ靜血脈ハ能ク其敗黒液ヲ門脈ヨリ腸中  
へ通泄スレバナリ。腸間膜ノ靜血脈ハ即チ門脈ノ支  
ノ敗黒液ヨク腸ニ通泄スルナリ。第百七十七章ニ  
云。屍ニ就テ試ニ水銃ヲ以テ蠟ヲ門脈ニ灌入スル片  
ハ亦其諸支ヨリ腸中ニ通泄スルナリト。故ニ能ク意ヲ用テ其敗黒液  
ヲ少シ宛漸次ニ泄除スベキガ爲ニ。數日ノ間。大便平  
常ヨリハ多ク通利セシムルヲ緊要トス〇此病ハ予。

增訂内科要略 卷四 風雲堂



甘乳清ニ瀉利塩。少許ヲ和シテ數日用ルナリ。若シ是  
ヲ用テ適意ニ通利セザルハ旃那葉ヲ加テ泡劑トシ  
用ベシ。若シ稍清凉ノ効ヲ増ント欲セバ答末林度少  
許ヲ加フベシ。○若シ乳清ノ缺ルニ遇バ稀キ大麥煮  
汁ニ右ノ藥ヲ加ヘ用ベシ

憂鬱

憂鬱病。壞液ニ因ルノ症治ヲ論ス

予屢見ルニ或ハ長病ノ後。或ハ衰弱虛損ノ後。或ハ大  
ニ失血シ。若クハ婦人産後等ニ於テ憂鬱悲悅シテ精  
神痴迷狂錯ノ症ヲ發スル者アリ。○予。是ヲ熟察スル  
ニ衰弱虛損。及ビ亡血。脱液ノ人ニ於テハ體中ノ諸

其自性ヨリ變壞シテ更ニ平全ノ常性ヲ違日遠キニ  
至リ。其變壞セル血液ヨリ精氣ヲ分泌シ出スヲ以テ  
精氣モ亦其常性ニ違フテ意思ノ變動ヲ致スナリ。○  
此症ニ刺絡ヲ施シ或ハ下劑ヲ用レバ逾日ニ困篤ニ  
進テ救ハレザルニ至ルヲ予屢目撃セリ。然ルニ予。前  
ニ著ス自性ノ壞液壞液篇ニ出ルニ於テ講明セル治  
法ヲ專一ニ施シ持モトホス久シテ變セズ用テ調養スル片ハ  
遂ニ全ク治スルナリ。○自性ノ壞液ハ甚ダ久ヲ經テ  
漸ク治スベキガ故ニ此依イ剥ホ昆コシ垤デ兒ルノ種類ハ速ニ治  
スベシト思フヲ勿レ



[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

第三章

煩悶篇第十一

羅甸名アレンキニタス  
和蘭名ベナウドヘイド

煩悶ノ大較ヲ論ス

煩悶ハ意識ノ疾ナリト釋スルノミニテ其症狀ヲ説  
キ示シ難ク或ハ次ニ説ク如キ内藏ニ係ル病ナリト  
云ノ外ニ復是ヲ説クコト能ハズ。然ル所以ハ患者煩  
悶スト雖正定テ何ノ症ヲ以テ何レノ處ニ發スト云  
フヲ自ラ言ガタケレバナリ。然正是レ大抵痛痒及ヒ  
斯ノ如キ觸覺ルヲアリテ發スルナリ。○然レバ凡ソ  
疾患ニ就テ其厭ヒ苦ム所ヲ覺エ。百般計較シテ自ラ  
其耐忍フベカラザル所ノ苦惱ヲ免ンフヲ營求スル



第五章

か故ニ其肢體ヲ動搖シテ須臾モ休ス。轉展反側シテ起臥安カラザル所。即チ是レ煩悶ナリト知ルベシ  
煩悶ノ所在ヲ論ス

夫レ煩悶ト四肢關節ニ發スル疼痛トハ各其所在ヲ異ニス。煩悶ハ唯内部ノ諸藏ノミニ在テ必ズ肢體外部ノ筋肉ニ在ル者ニ非レバナリ。故ニ疼痛ト煩悶トハ其患部ヲ異ニスト知ルベシ。○元運生氣ノ全身一般ニ公行シテ運營ヲ爲スノ外ニ更ニ又各自一箇ノ運營ヲ爲ス諸器ニ於テ此煩悶ヲ觸覺ルヲ發明セリコレ即チ肺。胃。子宮等ノ如シ。○故ニ其各自ノ運營ヲ

第五章

障碍セラレ、<sup>一</sup>アル片ハ必ズ煩悶ヲ發スト知ルベシ

煩悶ノ病因ヲ論ス

煩悶ノ諸因ヲ悉ク舉ント欲スレバ甚夕繁冗ナルカ故ニ爰ニ是ヲ略セリ。○若シ夫ノ外部四肢ノ疼痛。其所在ヲ轉移シテ内部ニ陷入スル片ハ輒チ煩悶ヲ發ス。故ニ諸疼痛ヲ發スル因ハ即チ煩悶ノ因ナリト知ルベシ。○疼痛ノ諸因ハ予ガ著ス所ノ瘍科精選ニ載ス

煩悶ノ治法ヲ論ス

若シ人。外部四肢等ニ疼痛ヲ患ル<sup>一</sup>有テ偶消散シ。或ハ皮上ニ發出セル瘡瘍。潜伏内陷シテ煩悶ヲ發スル

曾訂子牛異要 卷四 第五章 第七十七章 風雲堂



か如キハ第四十九章ニ出ス發汗劑ヲ用テ其毒ヲ復  
 外表ニ驅發スベシ○或ハ第十五章ニ説ク如キ腐敗  
 毒所謂ル腐敗ノ膽液夥ク胃中ニ鬱積シテ煩悶ヲ發  
 スル者ハ同章ニ出ス吐藥ヲ用テ湧泄シ是ヲ治スベ  
シ第十五章ニ云所ノ腐敗ノ汚物ハ即チ腐敗膽液十  
リ又腐敗膽液ノ説疝篇第二百四十五章霍亂篇第  
二百七十一章惡心篇第二  
百六章ニ詳ナリ併考ベシ  
 ○第十二章ニ論スル如キ  
 熱病ノ大過強盛ナル運行ニ因テ煩悶スル者ハ一次  
 刺絡シテ後清涼劑ヲ用テ是ヲ治スベシ方第十二  
章ニ出

增補重訂内科撰要卷四終



如... 第十九章... 外... 毒... 又... 第... 百... 無... 別... 增...

增補重訂内科撰要卷四終



