



増補
重訂

内科撰要

卷六

洋学文庫
文庫 8
C 27
6



增補重訂内科撰要卷六

微毒篇第十四

微毒ノ大較ヲ論ス

微毒ハ微毒アル人ト交接シテ發スル一症也傳染病ナリ
 ナリ大抵初發其毒ヲ感受セシ部ニ於テ其症候ヲ見ス
 見ス○和蘭紀元一千四百六十二年本邦宣化病始
 那波里國太里亞ノ和蘭傳染シて和蘭國ニ蔓延シ
 ○其初小瘡ヲ發シ潰瘍シテ紅色ノ汁中常ニ膿有リ
 ナリ其後瘡ハ深シ成ニ穴ニ成ル由テ不治ナリ

增補重訂内科撰要卷六

增補

徵瘡篇第十四

羅甸名「リス」ヘ子「ア」和蘭名「ベスマ」チングデルボッケン又「ス」パーンセボッケン又「ベニ」スシキテ「〇」包皮瘡衝陰頭瘡衝下疳、睪丸腫、淋疾、便毒、是ニ屬ス

第三章

徵毒ノ大較ヲ論ス

徵瘡ハ徵毒アル人ト交接シテ發スル一種ノ傳染病ナリ。大抵初發其毒ヲ感受セル部ニ於テ其症候ヲ發見ス。○和蘭紀元一千四百六十三年本邦寛正五年此病始テ那波里ナポリ國意太里亞ニ於テ傳染シ是ヨリ諸國ニ蔓延ス。○其初小瘡ヲ發シ潰膿シテ白色トナリ常ニ膿汁出テ甚ダ愈ヘ難シ或ハ淋疾白帶下等ヲ兼マ

癰毒ノ症候ヲ論ス

患者癰毒アル人ト交接シテ後。陰所ニ諸患症ヲ生ス
假令バ陰頭斑ヲ發シ或ハ堅硬。胎胎ノ如ク乾燥シ若
クハ圻裂シ或ハ疥癬ノ如キ小瘡ヲ生スル等ナリ或
ハ頭髮脫落或ハ骨痛等。骨ノ諸患ヲ發シ或ハ口中咽
喉腐爛シ鼻ニ潰瘍ヲ生スルガ如キ皆尋常藥劑ノ治
スベカラザル諸症ヲ發ス

癰毒ノ傳染ヲ論ス

凡ソ此病ハ癰毒アル人ニ觸交リテ傳染ス假令バ交
接或ハ口舌相接シテ津唾ヲ受ケ或ハ嚙乳小兒是ヲ

癰毒ノ性ヲ論ス

多シル^ヲ或ハ同床ニシテ睡リ或ハ日夜親ク此患者ヲ
看待シ或ハ父母ノ遺毒ニ因テ發スル等ナリ
癰毒ノ性タル揮散發越シテ速ニ消化シ去ルキ者ニ
非ズ假令ハ麻疹ノ毒ノ如キハ其性揮沈潜竄匿シテ
頑固滯著ス。故ニ生氣運行ノカト雖モ容易ニ是ヲ驅
除スル^ヲ能ハズシテ長ク體中ニ淹留シ良善ノ血液
モ漸ク是ニ化セラレテ惡厲ノ性トナリ。脂肪及ビ自
餘ノ良液ヲシテ變シテ粘稠酷厲ニシテ腐蝕スベク
嗽衝ヲ發スベキ質トナラシムルナリ

微毒ノ侵襲ヲ論ス

微毒ニ傳染スレバ陰具ノ液男子ハ尿道。婦人ハ腔皮ノ内外ノ滑液ヲ云腺ノ粘液。鼻膜ノ涕液。咽喉ノ滑液。關節液。腱液。靱帶液。或ハ神經液。脂肪。骨髓。乳糜。血等ニ混淆シテ懸留ス

上章ノ餘義ヲ申明ス

微毒右ノ如ク諸液ニ浸淫シテ體中諸部ニ滯著スルガ故ニ是ヨリ幾多ノ患症ヲ發ス。假令バ其毒陰莖尿道ニ著ク片ハ陰頭。小瘡潰瘍ヲ發シ或ハ包皮腫脹緊被シテ陰頭ヲ露ハスヲ能ハス或ハ包皮翻脹シテ短促シ陰頭ヲ被フヲ能ハズ或ハ陰莖水晶狀ノ腫ヲ生

シ或ハ鶏冠狀ノ息肉羅甸名「キリス」和蘭名「ハ」子カ贅ヲ生ノ鶏冠ノ如ク水棉ノ尿道中息肉ヲ生シ或ハ如ク蔓ノ如キ者皆此類ナリ淋疾。小便艱澀刺痛。小便閉ヲ發シ或ハ莖中ノ腱。彊急攣痛シ或ハ嬌精永嗣ノ用ヲ廢ス○睪丸ニ著ク片ハ睪丸焮熱腫痛。若クハ硬結シ或ハ精系モ共ニ硬腫スレバ恰モ肉貌バ癭屈ノ如シ精系和蘭名「サ」ドストレンル所ノ精動脈。精靜脈ニ神經。水脈。輸精管。筋等ヲ錯綜シ膜ヲ以テ包圍ス一系ヲ成シ睪丸ニ繫著スル者ナリ此精系及ビ睪丸ニ硬腫スル者肉貌癭屈ト其狀相似ヲタル○婦人陰所ニ著ク片ハ亦同ク小瘡潰瘍ヲ生シテ粘液膿汁流泄ス但男子ニ比スレバ尿道ニ關ル諸

患ヲ生スル^{スナ}鮮シト雖モ腔子宮卵巢等ニ著^{ツキ}テ白帶
下ヲ發ス○腹腿合縫ノ部ノ腺ニ著^ツク^クハ便毒ヲ發
シ唇舌斷^ア過滿^ニ堙^ニ兒^ル堙^ニ垂^ノ兩側^ニ在^ル腺ナリ過滿^ニ
似タルヲ以咽喉ニ著^ツク^クハ其部ニ腫瘍潰瘍ヲ生シ
或ハ齒牙浮動口^{ウハ}益腐蝕口裏ノ皮膜潰爛聲嘶^ハ嘔涕膜
ニ著^ツク^クハ鼻中臭穢ノ潰瘍ヲ生シ遂ニ侵蝕シテ鼻
梁陷凹崩壞ス○皮上ニ在^テハ汚斑小瘡潰瘍疣贅ヲ
生シ或ハ毛髮脫落疥癬肉瘤或ハ肌膚青白或ハ^ハ疥裂
或ハ乾癬ヲ生ス乾癬羅旬名「イムベチ」細疱粟起皮
屑粗糙白屑揭起レ搔痒ニ堪ヘズ漢
人所謂○骨ニ著^ツク^クハ骨脆弱腐蝕破碎シ易ク或ハ
乾癬也

癰疽

骨塊腫盈長シ或ハ骨端相連著シテ屈伸シ難ク或ハ
骨痛堪^タ忍ビ難シ其毒骨膜ニ著^テ痛ム也○徵毒總身ニ滋蔓スレ
バ身體衰弱虛損シ或ハ萎黃病ヲ發シ或ハ毎夜各部
劇痛シ或ハ消耗熱^熱癯瘦骨立或ハ肢體困倦動作
ニ^モ懶^ク或ハ勞瘵ニ陷ルナリ
徵毒ノ察法ヲ論ス
老人小兒此病ニ罹^カレバ是ヲ壯年ノ人ニ比スレバ治
シ難シ○虛人或ハ長病劇疾ヲ患ヒタル人或ハ口中
潰爛或ハ頸ノ腺ノ潰瘍或ハ顛癰アル人ハ水銀劑ノ
吐涎法ニ堪ル^ヲ能ハス○孕婦此病ヲ患レバ動^ヤモス

第九十章

レバ墮胎スルヲアリ○乳母此疾アレバ其兒ニ傳染ス○婦人ハ男子ニ比スレバ此諸症ヲ發スルヲ少シ

微毒ノ防護法ヲ論ス

此病ハ微毒アル人ニ觸交リテ傳染スルユエニ預メ是ヲ防キ仔細ニ戒慎シテ其人ニ觸交ルヲ禁シ若シ是ニ觸ルヲアラバ速ニ其部ヲ洗滌シテ淨潔ニスベシ○其傳染ヲ避ル方法多シト雖モ皆効驗ナシ

第九十一章

微毒ノ治法ヲ論ス

凡ソ微毒ハ水銀劑ヲ用テ吐涎セシムルニ非レバ切實ノ功ヲ奏シ難シ○其毒肢體彼此ニ滯著シテ發ス

ル諸症ハ水銀劑ヲ外敷シテ治スベシ

註拔龍漢斯微旬

バロン。シ。ス。ウ。テ。シ。人。名。

多年微毒諸症ニ經驗ノ奇効ヲ

奏シ少モ害ヲ貽サズ全功ヲ收ル一方アリ左記ス

斯微旬藥酒方

什永

名

一月

燒酒

四十

右件研和ス○大人ハ朝夕一匙宛用フ。多ク與ルモ

每服二匙ニ過ベカラズ。是ヲ服スル間ハ大麥煎或

ハ緩和ノ煎劑

葵根。甘草。土茯苓等煎湯ノ如キヲ云

ヲ饒多ニ兼用ス

ベシ○右ノ藥。毎日法ノ如ク連服ノ其殘毒餘孽盡

ク除治スルニ至ルベシ○此劑ヲ用ル間ハ油膩脂

膏ノ食物鹽藏炮炙ノ肉類ヲ禁シ唯輕キ肉羹汁蒸
煮ノ蔬菜ヲ用フベシ○格謨緬立百私醫名第五條
ニ云ス斯微旬此方ヲ微毒ノ諸症ニ用テ曾テ吐涎ス
ルヲナク悉ク全治スト云ト雖モ或ハ吐涎スル者
アリト然レ是レ稀ニアルヲニノ大抵吐涎スル者
鮮ナシ即チ華安^ハ人^スノ書中ニ論載スルカ如シ

增註遠西名醫傑泄兒ノ瘍科書並ニ遠西微瘡袖珍
方所載微毒ノ症治ヲ採摘ノ左ニ略舉ス

包皮焮衝此症ハ陰莖ノ包皮焮熱腫痛ノ緊脹シ或
ハ陰頭ヲ包被シテ小便ノ通利ヲ妨ゲ又多クハ下

疳或ハ淋疾ヲ兼又治法疏滌永劑ヲ用テ數瀉下シ

適宜ノ永劑ニ排毒劑ノ煎湯ヲ兼用シ又蒸湯永劑

ヲ患部ニ施スベシ疏滌永劑ハ後ノ下疳ノ條ニ列

舍利別等ヲ云或ハ其症ニ從ヒ永升永甘永白降永

ノ如キ永劑ヲ以テ盧會蘇甘沒扭謨約刺巴大黃消

石瀉利鹽等ノ湯下ノ品ニ加ヘ丸藥ト微刺用ルモ亦

良右規吉甘永等ヲ云ニ載ス○永劑ハ蘆散弗刺斯或ハ

土茯苓^テ葵根^ヲ甘草^ヲ加^ル煎劑^ニ等^シ蘆散^ヲ云^フ○蒸湯^ニ永劑^ヲ

ハ溫湯^ニ乳汁^ヲ或ハ亞刺^ヲ比亞^ヲ煎劑^ニ等^シ蘆散^ヲ云^フ○蒸湯^ニ永劑^ヲ

許ヲ和^シ是^レヲ以^テ蒸湯^{スル}比亞^ヲ煎劑^ニ等^シ蘆散^ヲ云^フ○蒸湯^ニ永劑^ヲ

品皆散^ニ出^ツ其陰頭ヲ緊被シテ小便閉ヲ爲シ

或ハ包皮ノ裏面若クハ陰頭潰爛メ下疳トナリ或

ハ壞疽トナルベキ症ハ鉸刀ヲ以テ縱ニ包皮ヲ斷

開シ陰頭ヲ露ハシ療スベシ○包皮炊衝ハ内外療法ヲ施メ其炊衝ヲ治スベシ患者壯年ニ多血ナル片ハ刺絡ヲ施シ左ノ劑ヲ用フベシ

消石散 消石精製者一錢

右分テ十二服トシ半時ニ一服宛用フ或ハ里没奈リモナ垤デ飲液ノノ沙糖ト橙汁ヲ以テ製スル者ニテ散劑ヲ送下メ尤良其炊衝消散スルマデ毎日用フベシ
○甘乳清○葡萄酒ト水ヲ和シ微溫ニ頻リニ患部ヲ蒸湯スベシ其炊腫寧急速ニ寛解ス○包皮膨腫ノ陰頭ヲ包被スル症ハ其腫減スルニ隨ヒ餘

ニ包皮ヲ剥脱シテ陰頭ヲ露ハシ右ノ蒸湯法ヲ施メ其膿穢ヲ淨刷シ赤汞膏或ハ加烏斯膏ヲ貼スベシ共ニ次ノ下○右ノ治法ヲ施メ捷効ナク包皮陰頭ヲ緊被メ炊腫増劇スル者ハ縱ニ包皮ヲ截斷メ陰頭ヲ露ハシ前法ノ如ク療スベシ否ザレバ其潰瘍深ク侵蝕メ陰頭崩壞ス○

陰頭炊衝 此症ハ陰頭炊熱腫痛シ多クハ包皮翻脹メ陰頭ヲ箝窄ス**治法** 刺絡ヲ施シ清涼下劑清涼稀釋劑前條ノ消石散或ハ熱ヲ用ヒ綏和蒸湯劑或ハ綏和綏和蒸湯劑或ハ蒸湯劑或ハ溫湯

ニ乳汁或ハ亞刺比亞蕪藥ヲ溶化シ蒸湯劑トシ或ハ乳汁ニ亞麻子末カ糊祭亞石鹼ヲ加ヘ溶化シ蒸湯劑トス或ハ緩子葵根葵葉蜜菓大麥嬰粟球甘草等ノ煎劑ノ如シ○緩和芭布ハ右ノ緩和ノ効アル或ハ乳汁ニ亞麻子粉カ糊祭亞石鹼ヲ加溶化シ其煮テ糊ノ如ク貼スルモ亦緩和ノ良効アリ其焮腫減シ包皮陰頭ヲ箝箝セザルニ至テ永劑ヲ内服外敷ノ全治ニ至ルベシ包皮焮衝ノ條ニ出ツ○陰頭焮衝消散セス膿潰ノ下疳トナル者ハ永劑ヲ内服シ蒸湯永劑ヲ患部ニ施スベシ共ニ包皮焮衝ノ條ニ出ツ○
下疳淋疾或ハ包皮焮衝ニ因リ或ハ不潔ノ交媾ニ因テ男子ハ陰頭婦人ハ脰唇等ニ小泡ヲ生シ潰破

スレバ稀汁出漸ク滋蔓侵蝕ノ潰爛シ酷厲ノ膿汁流泄シ焮熱腫痛ヲ兼子或ハ黦澹色ニノ痛マズ腐蝕ス此ヲ下疳トス○此症其他總テ微毒ノ諸症ハ一切辛熱香實油膩脂膏鹽藏ノ品獸肉魚類葷酒及ビ消化シ難キ物ヲ禁シ淡薄ノ食物ヲ與フベシ此症ハ嚴ニ飲食ヲ慎フ治法ノ一大緊要トス**治法**患部焮熱腫痛シ或ハ多血ノ者ハ先ヅ包皮焮衝ノ方前ニ出ツヲ施シ其焮衝解散ノ後左ニ記ス數方ヲ選用シ日ニ三四次下瀉下セシムベシ

龍永散

大黃

錢一

甘永

三

龍腦

氏二

右各別細末シテ調和シ分テ六服トシ一時ニ一服宛水ヲ以テ送下ス

龍汞丸

大黃 一錢

甘汞 各二

龍腦

各二

蒲公英根越幾斯劑 二錢

右調和ノ四十丸トシ半時毎ニ三丸ヲ服ス

梅黃飲

梅那葉

半錢

大黃 末一錢

甘汞 三

氏

右梅那ト大黃ヲ沸湯ニ浸スヲ半時。瀝テ六ヲ取甘汞ヲ調和シ毎朝小茶碗ニ二個或ハ三個ヲ服ス

滿黃舍利別

虛人小兒ハ此方ニ宜シ

滿那 二錢

大黃舍利別 一錢

甘汞

二

右調和シ卵匙ニ二抄或ハ三抄ヲ用フ

○患部ニ左ノ軟膏ヲ貼スベシ

赤汞膏

赤降汞 一錢

家猪脂

一弓或一弓半

右研和シ棉撒絲ニ塗リ日ニ兩次換貼スベシ○左ノ軟膏亦妙

加烏斯膏

刺必斯加烏斯蟄屈斯 六氏

薔薇露 六錢

玫瑰蜜 二錢

右研和シ棉撒絲ニ蘸シ換貼スルヲ日ニ三次○又右ノ膏或ハ阿利襪油ヲ以テ患部ノ邊圍ニ塗擦スベシ治スルヲ逾速ナリ○微温湯六ヲ醋

或ハ甘乳清一ろヲ加ヘ巾ニ蘸^シ頻^ニリニ其潰瘍ノ傍側ヲ蒸^ス湯スベシ能ク其焮痛ヲ消散ス○此症ハ其毒ノ多少ト患者ノ強弱ニ隨テ治スルヲ遲速アリ○此潰瘍ハ一切酷烈腐蝕ノ外敷藥ヲ禁ス^袖

畢丸腫治法畢丸焮熱腫痛シ發熱腰痛等ヲ兼ル症

ハ疎滌汞劑^{包皮焮衝}包皮焮衝^ハヲ内服シ消散蒸^ス湯劑^{兒變水}兒變水^ハ

出^グニ規^シ吉斯麗^モ謨^モヲ加ヘ外敷ノ消散スベシ○

其焮腫消散セズ膿ヲ成^サントスル症ハ瀉下劑ヲ禁

シ緩^シ和^シ毳布^ハ陰^ハ頭^ハ焮^ハヲ貼シ膿ヲ成スニ及テ鉋^シ鉋^シヲ

以テ刺破シ膿ヲ泄スベシ此症腐藥ヲ禁ス其潰瘍

ハ輕キ技^ハ爾^ハ撒^ハ謨^ハ質ノ愈創劑ヲ外敷シ^若把^ハ兒^ハ淋^ハ膏^ハ

或ハ的^ハ列^ハ並^ハ底^ハ那^ハヲ加^ル其毒深キ者ハ是ニ汞^ハ劑^ハ

麗^ハ謨^ハ等^ハヲ加^テ外敷シ又汞劑及ヒ排毒劑ヲ内

服スベシ^{前ニ出}○畢丸腫ハ徽毒淋下疳ヨリ發

シ或ハ是ヲ早ク愈シ其毒内鬱スルヨリ發スルヲ

多シ然^ハ疳^ハ淋疾下疳甚ダ險惡ナラザルハ法ノ如ク

治療ヲ施シ清涼性ノ淡薄ナル飲食ヲ用レバ畢丸

腫ヲ發スルヲナシ○淋疾下疳ヲ患ルヲナク直ニ

畢丸焮腫シ或ハ焮熱ナクノ唯腫起スル者アリ其

腫或ハ消散シ或ハ膿潰シ或ハ頑硬結腫メ痛ナキ

者アリ治法 畢丸炊熱腫痛或ハ發熱スル者ハ消石
散包皮嫩或ハ龍永散或ハ滿黃舍利別共ニ下ヲ用
ヒ或ハ左ノ清涼下劑滿那ヲ内服シ又外敷藥ヲ施
セバ大抵其腫速ニ消散ス

滿那糕

滿那

答末林度

各三

消石

大黃

各二

右調和シ半時或ハ一時毎ニ肉豆蔻大ヲ服ス○乳
清名或ハ里沒那名茶湯等適意ニ日常ノ飲料ト
スベシ○又左ノ軟膏ヲ以テ患處ニ塗擦スベシ

礪永膏

礪砂精

四錢

阿利機油

一弓半

右硝子蠟ニ入レ振蕩メ混和セシメ此液一弓ニ規
吉撒爾弗名一弓ヲ研和シ毎日肉豆蔻大ヲ取テ其
腫及ビ傍側ニ塗擦スベシ此膏微毒一切腫瘍ヲ消
散スルニ甚ダ驗アリ○又蒸餅心ニ醅餘名ヲ研和
シ琶布布名ヲ作り微温ニメ其腫ニ塗タル軟膏上ニ
貼シ更換スルヲ日ニ四次ド毎朝温湯ニテ是ヲ洗ヒ
去ルベシ○右ノ如ク療スレバ其炊赤腫痛大抵三
四日ノ間ニ減スベシ○患者ヲシテ肢體ヲ勞動セ
シムルヲ勿レ○畢丸腫ハ消散スル者多シ然レ腫
ヲ成ス者アリ其候患者惡寒ノ内熱ヲ覺エ其炊痛

減ノ腫増長シ是ヲ按ニ軟ニ搏動アリ或ハ膿ノ移動スルヲ覺ユ或ハ凸起スル處アル等ナリ。斯ノ如キ候アレバ刺破ノ膿ヲ排泄シ治スベシ○罌丸腫。初ノヨリ炊衝ノ候ナク痛ナキ症ハ右ノ如キ炊衝ノ治法ヲ施サズ唯左ニ記ス軟膏ヲ塗テ消散セシムベシ此腫動モスレバ頑硬ニメ久ク治セサル者アリ是ニ峻攻ノ藥ヲ施メ刺戟スレバ惡屬ノ潰瘍トナル者少ナカラズ

礪鹼膏

礪汞膏 上ニ出ツ 龍腦 末 一錢
勿擲祭亞石鹼 水適宜ニ加ヘ溶ス者

右研和ノ軟膏トシ毎日肉豆蔻大ヲ取リ大約四分時ノ間徐々ニ患部ニ塗擦シ瓦爾技奴謨膏名ヲ擲テ是ヲ益ヒ貼シ。數日怠ラズ是ヲ施スベシ○又左ノ下劑ヲ兼用スベシ

黃鹽丸

大黃 二錢 酒石鹽 名ニ 薄荷油 滴十

右調和ノ六十丸トシ金箔ヲ衣トス。每服五丸。日ニ四次。但シ通利ノ多少ニ隨テ服量ヲ加減シ大抵日ニ四次通スルヲ度トス

黴毒治法括套

凡ソ黴毒凝流ニ體ニ潜伏頑滯スレバ諸險症ヲ發スルヲ勝テ算ヘ難シ。然レ左ノ劑ヲ

長服ノ血液中心ニ浸染セル毒ヲ排除淨刷スレバ諸
症自ラ回復ス

金龍丸

加羅蔑兒カローメル甘甘或或

金硫黃金

各一錢

右硝子硝子曰ニ入レ搗テ細末シ徐々ニ左ノ品ヲ和ス

亞刺比亞アサビア越越謨謨

六六月

龍腦

十十分

越越更更失爾シル剥剥祿布利ル怛怛

適宜

右捏和ノ四十八丸トシ甘草末ヲ衣トシ朝夕一丸
宛左ノ煎劑ヲ以テ送下ス

土茯苓煎

土茯苓

牛蒡根

各二二寸

右判水五百錢許ヲ以テ煮テ半ヲ減シ滓ヲ去リ服

ス○肢體各部疼痛ヲ患ル者ハ礪鹼膏ヲ以テ法ノ
如ク患處ニ擦ノ捷効アリ此膏及擦法上ノ其疼退
ク片ハ速ニ此膏ヲ休休ベシ○齒浮搖斷腫痛出血等
ノ吐涎ノ候現ス片ハ速ニ内外ノ汞劑ヲ休休ノ清
涼緩和ノ下劑滿那糕ヲ用ヒ又水ニ醋四分ノ一ヲ
加ヘ漱藥トスベシ其吐涎ノ候盡ク治メ後前方ノ
加羅蔑兒ノ量三分一或ハ半ヲ減シ復用フベシ○
患者常ニ厚被シ溫煖ニ保護メ表發ノ蒸氣ヲ發セ
シメ濕冷氣夜氣ヲ避ル尤モ肝要ナリ補
淋疾ヲ論ス

淋疾ハ常ニ尿道ヨリ粘液第九十二章ニ説陰具ノ液ヲ云ノ良性ナル者或ハ其腐敗セル者ヲ漏泄スル病ナリ

第九章

淋疾ノ分別ヲ論ス

睪丸ニ於テ製造スル所ノ精液是レ交媾ノ出ル漏泄スルヲ真ノ淋疾ト曰フ漢説ノ遺精滑攝護格烏百兒腺栗多列腺尿道ノ脂胞陰頭後ノ脂胞等ヨリ出ル液ノ漏泄スルヲ假淋疾ト曰フ攝護ハ尿道中ノ腺ノ名兒腺ハ尿道中ニアルニ個ノ腺ナリ是ヨリ滑液ヲ滲出ノ常ニ尿道ニ灌漑シ尿ノ腺ナリ是ヨリ滑液ヲ滲ガラシム○栗多列腺ハ細小ノ腺ニ滑液ヲ滲道等ノ裏面ニ周布シ是ヨリ常ニ滑液ヲ滲出シ尿ノ腺ナリ是ヨリ滑液ヲ滲慄悍氣ヲ防護シム其微毒傳染ヨリ來ルヲ惡性淋ト曰侵刺セガラシム

フ。陰具諸部ノ疾患ヨリ來ラズノ全身ニ關ル病ヨリ

發スルヲ夾他疾淋ト名ク。陰莖緊脹攣シテ攣痛ス

ルヲ急弦淋ト名ク。徵家ト交媾シテ惡性淋ノ諸症ヲ

發シ尿道焮腫尿道ヨリ汚液ヲ漏泄スルナキ者是

ヲ乾淋ト名ク○芫菁或ハ利尿藥ヲ過用シ或ハ騎馬

房勞過度或ハ輸泄管上ニ云諸部ノ腺ニ在テ其液ノヲ輸泄スル微細ノ管ヲ云

弛弱セルヨリ發スル淋疾ヲ總テ善性淋ト名ク

惡性淋ノ大較ヲ論ス

惡性淋ハ徵家ト交媾シテ後。稀薄ニシテ酷厲ナル液ヲ尿道ヨリ漏泄シ。尿道微痒侵刺。小便淋瀝。尿道口焮

赤。其液漸々粘稠ニシテ尿道口ニ膠著ス。爾後稍粘稠ナル精樣ノ液漏滴シテ休ズ。陰莖腫痛。小便艱澁不利。尿道中。侵刺焮痛ス。此症増劇スレバ種々異色ノ臭氣アル酷厲液ヲ漏泄シ尿道是ニ觸テ逾焮腫劇痛シ會陰ニ當テ疼ニ陰莖緊脹攣急ス。此症他ノ病毒ヲ夾ムヲナキ片ハ其侵刺劇痛。漸々以テ減除シ終ニ精樣ノ液細線ノ如ク通泄ノ全治スルナリ。其液粘リ凝テ絲ヲ牽ガ如キヲ云

淋疾ノ防護法ヲ論ス

善性淋ハ其病因トナルベキ諸件ヲ避ケ。飲食起居攝生法ヲ慎守ノ預メ是ヲ防グベシ。○若シ微家ト交リ

淋疾

淋疾

觸ルヲアラバ能ク其部ヲ洗淨シテ傳染ヲ避クベシ

淋疾ノ治法ヲ論ス

惡性淋ノ未ダ日ヲ經ザル者ハ疏滌汞劑ニ投爾撒謨質ノ劑ヲ兼用シ終ニ適宜ノ收斂劑ニ白糖名ヲ加ヘ用レバ速ニ治ス。○既ニ經久頑滯スル者ハ數日水銀劑ヲ内服外敷シ稍吐涎スルニ至テ其服量ヲ減シ。下劑ヲ用テ吐涎ヲ抑制シ輕ク吐涎セシムルヲ二三週ニシテ終ニ投爾撒謨質ノ劑收斂劑ヲ用テ全治ニ至ルベシ。疏滌汞劑ハ包皮焮衝ノ條ニ出。○投爾撒謨質並玫瑰飲桂黃的列並糕格碌丸等ナリ。内服外敷。收斂劑ハ後ノ増註ノ默他兒珊瑚散等ナリ。

皮嫩衝ノ○利尿劑ヲ過用シテ發スル症ハ速ニ其劑
ヲ休テ潤灌劑ヲ用フベシ。輸泄管出ツ弛弱シテ發ス
ル症ハ強壯劑ヲ外敷シ或ハ是ヲ尿道ニ灌入スベシ
潤灌劑ハ和蘭名「アプスプーレ」デ是總テ緩和性ノ飲
液ヲ多ク服ノ體中ノ酷厲液ヲ潤灌稀釋シ滌除スル
ヲ謂フ即チ前ノ陰頭軟衝ニ舉ル緩和蒸溺劑ノ藥品
尿劑ハ後ノ酷厲毒ヲ潤灌緩和ノ滌除シ治スルナリ○強
壯劑ハ後ノ増註ノ治淋技爾撒漢飲桂黃的列茲飲石
灰水銃法等ヲ擇テ蒸溺劑トシ或ハ水銃ニテ尿道ニ灌入スベシ

増註尿道ノ膜尿道ハ一條ノニハ通ク細腺ヲ布置
シ陰頭後ヨリ橫骨ノ部ニ至ル間ハ其腺殊ニ居多
每腺一個ノ輸泄管一名粘ヲ具ヘテ尿道ノ水棉體

ニ連リ其管口ヲ尿道ノ腺ニ開キ日常粘滑液ヲ水
棉體ニ受ケ適宜ニ尿道ニ滲出ノ是ヲ滑利シ以テ
小便ノ酷厲氣ヲ防護シ尿道ヲ刺戟セザラシム是
ヲ無病平全ノ常トス水棉體ハ陰莖中ニ在テ尿道
ノ如シ常ニ滑液ヲ含テ輸泄管ヨリ尿道腺ニ通泄ス○若シ微毒ヲ尿道腺及
ビ輸泄管ニ感受スルハ直チニ水棉體ニ浸淫ノ
潜滯シ是ヨリ其汚液ヲ輸泄ノ絶ザルヲ宛モ冒寒
傷冷毒鼻中ノ涕膜腺ノ輸泄管ニ浸淫ノ刺戟シ涕
洩夥ク流泄スルガ如シ是ヲ惡性淋或ハ微毒淋ト
名ク○是ヲ分テ三等トス第一等ノ症ハ不潔ノ婦

人ト交媾ノ直チニ淋疾ヲ發シ或ハ四五日或ハ十日或ハ半月許ニノ發シ。陰莖腫起セズ唯小便ノ通利スル片尿道搔痒焮熱攪刺スルヲ覺エ。尿道微腫焮赤。湯乙章第二十二ノ如キ稀液ヲ淋瀝ス。**治法**嚴ニ飲食調護ヲ戒慎シ滋潤緩和ノ劑。消石樣ノ藥ヲ用テ其毒ノ刺戟ヲ抑制シ勉テ其淋泄ノ液ヲ進輸シ其毒ヲ排泄スルヲ肝要ナリ。滋潤緩和ノ劑ハ陰頭ノ藥品ヲ煎劑トシ用ルナリ。消石劑ハ包皮焮衝ノ條ニ舉ル消石散ヲ用フベシ。又溶汞劑ヲ用フベシ其方水銀ヲ消石精ニ溶化シ此液二滴或ハ三滴ヲ過爾託亞根ノ煎湯四勺或ハ六勺ニ加

ヘ毎日用フベシ。消石精ニ強弱アレハ是ニ水銀ヲ加テ煉化シ澄清ノ液トナルヲ度トス其製法服量等固水銀ノ條又水銃ヲ以テ粘滑斯微旬藥酒方主治ノ下ニ出ツ。又水銃ヲ以テ粘滑緩和ノ藥液ヲ尿道ニ注入スベシナリ陰頭焮衝ノ汁出ツ○第二等ノ症ハ小便通スル片尿道焮熱刺痛灼ガ如ク。陰頭包皮焮赤。陰莖腫脹勃起攣痛シ夜分殊ニ甚シ或ハ時々會陰ニ牽テ痛ミ淋瀝ノ液漸ク粘稠ニノ酷厲トナリ灰色或ハ黃綠色トナリ或ハ血ヲ交ヘ臭氣アリ。此症大抵一週或ハ二三週モ暫留ス治法其焮腫刺痛ノ劇キ者ハ刺絡ヲ施シ下劑ヲ用ヒ。熱病篇第二章果仁乳ニ白罌粟舍利別ヲ加テ毎

日飲料トシ果仁乳ハ扁桃乳。罌粟子乳。清涼性ノ淡
薄ナル飲食ヲ用ヒ麥及ビ蔬其炊熱刺痛減スルニ
至テ第一等ノ症ニ説ク所ノ溶汞劑及ビ水銃法ヲ
施シ或ハ毎日規グキ吉キ斯ス麗レイ謨ムヨ尿道ニ注入ノ尤良
○第三等ノ症ハ尿道ノ炊熱腫痛攣急等。漸ク減シ
淋瀝ノ液粘稠白色トナリ數週或ハ數月淹留ス○
此病ハ初メヨリ適當ノ療法ヲ施シ飲食攝養差誤
ナキ片ハ他症ヲ發セズノ治スベシ。然ル療法調護
其宜ヲ失ヘバ便毒。畢丸腫。尿道ノ狹窄潰瘍。會陰ノ
炊腫瘻瘡。攝護ノ腫脹。潰瘍。小便艱澁或ハ頑固ノ炊

腫眼。其他險症ヲ發スルヲ希ナラズ○第三等ノ症
ハ動モスレバ荏苒トメ治セズ或ハ尿道ノ諸患ヲ
生シ小便通利ヲ妨ルヲ多シ若シ其候アル片ハ速
ニ瘰癧子ヲ尿道ニ挿テ膀胱マデ内ルベシ是ヲ以
テ遍ク平等ニ尿道ノ裏面周圍ニ襯著シ尿道ノ腺。
輸泄管ノ弛弱セルヲ強壯ニスルヲ以テ尿道ノ息
肉。腺ノ突起。潰瘍ノ癰痕等ニテ小便通利ヲ障碍ス
ル患ヲ貽スヲナシ此瘰癧子ハ數試用シ實功ヲ得ル
所ニヌク諸般ノ技爾撒謨劑或ハ收斂劑。強壯劑
ヲ施メ寸効ナキ症ニ大効アリ。右ノ症ハ凡ソ衰弱

ヲ強壯ニスル藥劑ヲ内服ノ適當ナレ_レ此捻子ニ
比スレバ其効劣レリ

瘰癧子造法

へ子スカラクチへカールシイ蘭

金密陀

一

鉛粉

二

阿利襪油

北半

右密陀ト鉛粉ヲ極細末トシ是ニ油ヲ加テ攪和シ
文火ニ上セ煮テ黑色稠粘硬膏ノ如クナルヲ度ト
ス或ハ其症ニ從テ右ノ膏四錢ニ黃蠟四_マ赤降汞
ノ極細末十五_匁ヨリ加テ一_匁或ハ半錢ニ至ル右
ノ膏ヲ取り微火ニ上セ_{トキ}燐シ_タ綴布長一尺許_{トキ}潤一_指指或ハ一_指指半橫徑許ナルヲ取テ其膏中ニ投シ

篋_ハヲ以テ押入_{カシ}テヨク_シ浹_シ洽_シセシメ其端ヲ把_{トリ}テ疾ク
引出シ其膏ヲ淋滴セシメ_シ冷_シテ後其把_{トリ}タル端ヲ上
部トシ斜_ナメニ漸ク狹ク其邊ヲ剪_{キリ}テ下端ニ至リ全
形ヲ長キ三稜ト爲ス是レ下部ハ其膏溜住スル_ト
多クメ自ラ厚ケレバナリ又其下端ヲ截_タテ_{ナキナタナリ}偃月形
ト爲スベシ此布條ヲ取テ上端ヨリ捻_{ヒキ}リ卷_マテ下端
ニ至リ是ヲ平滑ナル板ニ夾テ旋轉_{カク}シ固_{カク}メ一條ノ
捻子ト爲スナリ○多血ノ患者ハ刺絡ヲ施シ數_ク下
劑ヲ用ヒ胃腸ヲ淨刷メ後此捻子ヲ_{サス}押_スベシ但此病
アレ_レ疝_レ結石尿道ニ梗塞シ或ハ其他ノ諸因ニテ小

便閉シテ急迫ナル症ハ此捻子ノ治スベキニ非ズ
先、瀉下ノ劑ヲ用ヒ其急迫ヲ解ノ後各其因ニ從テ
治ヲ施スベシ○捻子ノ太サハ患者ノ尿道ノ潤狹
ニ應シ且其通スル小便ノ巨細ト同等ニシ是ヲ挿
ニ臨テ甘和性ノ油甘扁桃油阿利是ニ塗テ滑ニ
シ患者ノ意ニ聽セテ或ハ跪坐セシメ或ハ側臥セ
シメ醫ノ左指ヲ以テ陰莖ヲ持チ右手ヲ以テ捻子
ノ中程ヲ把テ徐々ニ尿道ニ挿シ陰莖ヲ拽伸シ輸
内ルベシ斯ノ如クスレバ唯捻子ヲ推送ヨリハ入
易シ捻子ノ端陰莖ノ根ニ至バ陰莖ヲ揚テ陰頭ト

小腹ト離ル一吋五六分許ニメ其屈曲ノ處ヲ徐
々ニ推送リ左手ノ一指頭ヲ會陰ニ當テ捻子ノ下
端ヲ押シ扶テ患者ノ觸覺エザル許ニ徐々ニ内テ
膀胱中ニ至ルベシ○是ヲ挿了テ脱出セザルガ爲ニ
蠟ヲ塗タル線長四尺許ナル者三四條ヲ取其正中
ノ處ヲ以テ捻子ノ上端ニ固ク結著ケ其左右ノ線
ヲ併セテ陰頭ニ載セ陰頭ヲ過ル處ニテ合セ結ビ
再ビ其線ヲ左右ニ分テ是ヲ陰莖ニ纏ヒ結ヒ止置
ベシ○捻子ヲ尿道ニ留置ク時刻ノ長短ハ每人一様
ナラズ患者ノ稟賦感動シ易クノ尿道ノ知覺敏ナ

ルカ或ハ膀胱攣急ノ甚キ者ハ日ニ兩回ド。イフモ每次一時
或ハ一時半ヨリ長ク挿サシ置ツフ能ハズ。但知覺ノ鈍
ナル者ハ一晝夜ニ三時或ハ四五時モ留置ツベシ。是
ヲ留ルツ久キホド逾其効速ナリ小便通スルキハ
毎イッモ次捻子ヲ拔去レベシ。○是ヲ施ス間ハ飲食ヲ慎ミ
守リ消化シ難キ物。酒。辛熱香竈ノ飲料ヲ禁シ且閨
房ヲ戒ルツ殊ニ肝要トス。蔬葉菜根等。總テ清涼性
ノ品ヲ用フベシ。○此病ハ利尿ノ藥劑。總テ害アリ
○尿道狹窄或ハ息肉。腺腫。癰痕等ヲ尿道ニ生ノ小
便通利ヲ妨碍スル症ハ排捻子ヲ尿道ニ挿サシテ潤開

シ治スベシ。此症多クハ徽毒ヲ兼ヌ或ハ失シケル兒陪ボイ
苦。其他酷厲毒アルヨリモ發ス。故ニ各其病毒ヲ驅
除スル藥劑飲食ヲ用ヒテ其捻子ノ功ヲ扶ルツ一
大專務タリ排捻子ハ右ノ諸症ニ試用ノ驗ヲ得ル
ヲ勝カクテ數ヘ難シ。又是ヲ挿サスニ尿道ヲ侵刺セズ且
柔ニノ患者殆ト是ヲ覺エザルガ故ニ瘳捻子ニ比
スレバ長ク尿道ニ留ルツヲ得ルナリ。○尿道狹窄
或ハ息肉アルニ由テ是ヲ挿サト雖モ支障梗阻ツカヘルノ勝
脱ニ届イタルマデニ數日ヲ經ル者アリ。此症ハ患者ツカヘル醫
者共ニ厭倦シ半途ニ廢スル者多シ。然レモ毎イッモ次

其梗阻スル處マデ挿入レ勉強ノ稍々ニ是ヲ進メ
輸リ。竟ニ膀胱中ニ達シ全功ヲ收ムベシ。但尿道ノ
潤開スルニ隨テ捻子モ亦漸ク太ク製スベシ

排捻子造法

フルミイデンドカルシイ蘭

精好ノ軟革。甚ダ薄ク兩面平等ニ製シタル者ヲ取
リ。長一尺許。潤一二寸。大抵患者ノ尿道ノ巨細ニ適
ハシメ。是ヲ銜ミ咀ヲ以テ兩面ヲ濕シ。其端ヨリ斜
ニ捻リ卷テ一條ノ捻子ト爲シ。仍數回捻リ固メテ
竟ニ乾クニ至ル又牛ノ盲腸ヲ取り。水ニ投シ水中
ニテ其層ヲ剥取テ是ヲ幘ニ張テ曝乾シ。縱ニ裁テ

潤一二分許ノ條ト爲シ。是ヲ以テ右ノ捻子ノ外面
ヲ纏ヒ被フ。初ニ三纏ハ環匝シ。夫ヨリ斜ニ半バ重
子捲テ其端ニ至ル。又其端ニハ蠟ノ如キ膠粘ノ物
ヲ塗テ圓滑ニス。是レ尿道ヲ毀傷セザルガ爲ナリ
○其挿ス法及ビ挿留ル時限。脫出ノ防護。飲食藥劑
等。總テ瘳捻子ト同シ

○微毒淋ハ其淋瀝ノ液。初メ稀ク後漸ク稠クノ膿
ノ如シ。然レ是レ膿ニ非ズ。一種ノ酷厲液ナリ。冒寒
病ノ清涕モ其毒熱スレバ變ノ粘稠或ハ黃綠ニシ
膿ノ如クナルト同シ。此液男子ハ尿道。婦人ハ腔。其

他陰處ノ細腺ヨリ滲出ス○其酷厲液。男子ハ包皮陰頭。婦人ハ膺唇。其他陰處ニ浸淫メ焮衝ヲ發シ。遂ニ下疳トナルヲアル故ニ。預メ是ヲ防クニ微温湯十弓ニ醋一弓ヲ加^ニ頻^ニ患部ヲ洗淨スベシ^{治法}初發。陰具焮熱腫起。小便通スルハ劇痛スル者ハ先焮衝ノ治法ヲ施シ焮衝解ノ後淋疾ノ治法ヲ施スベシ。即^チ患者壯年ニノ多血ナル者ハ刺絡ヲ施シ。然メ消石散^{包皮焮衝ノ條}ヲ用^{ベシ}酪餘^{或ハ乳清}或ハ水ニ醋少許^ス加^フ微温ニノ患部ヲ蒸濕シ。若クハ布片ニ蘸^{ヒタ}シ常ニ浸潤セシムベシ。能ク其焮痛寧^ム

ヲ緩解ス。婦人ハ是ヲ膺ニ灌入スルモ良○其焮痛劇者ハ乳汁一匕。沸湯ニ比調和シ微温ニノ頻^ニ服スベシ其痛速ニ解ス○陰莖攣急甚^キ者ハ微温乳汁ニ阿芙蓉少許ヲ溶^{トカ}シ。此液一小茶碗ヲ水銃ニテ尿道ニ注入シ又是ヲ以テ數^{タガ}痛處ヲ蒸濕スベシ○此症モ亦下疳條ニ説^ツ如ク嚴ニ飲食ヲ慎^ミ守ルヲ緊要ナリ。其焮衝消散シ或ハ著^{イナシ}ク減スルハ左ニ載ル淋疾ノ治法ヲ施スベシ○熱性酷烈ノ下劑ハ其痛ヲ增劇シ隨テ其淋瀝ヲ増發ス。但^{シテ}清凉下劑ハ啻ニ瀉下スルノミナラズ。尿道ノ輸泄管ヲ緩弛メ淋

泄ノ汚液ヲ進輸シ病毒ヲ排除ス。故ニ此症ハ下痢ノ條ニ列スル龍永散。龍永丸。旃黃飲。滿黃舍利別。畢丸腫ノ條ニ舉ル滿那糕。等ヲ擇ミ用フベシ。但下劑ノ功。每人一様ナラズ。故ニ右ノ劑ヲ用テ大便日ニ四回通スルヲ度トシ是ヨリ多キハ服量ヲ減シ或ハ兩三日ニ一回用フベシ。○又永膏ヲ患部ニ外敷ノ良効アリ是レ又其傳染毒ヲ患部ノ嚙收管ヨリ吸收ノ血中ニ混淆スルヲ防止ス。左ノ軟膏尤妙

龍永膏

水銀

一錢。蒸餾醋ヲ以テ洗フ者

龍腦

沙糖

各一錢

家猪脂

新著

右研和ノ水銀ノ星ナキニ至リ。此膏二錢ヲ取。四分時ノ間。患部及ビ其傍側ニ擦リ。終ニ是ヲ洗ヒ去ルベシ。是ヲ四日ニ一回施スベシ。○新製ノ阿利襪油或ハ甘扁桃油ヲ取り水銃ヲ以テ尿道ハ婦人ニ注入スル。其症ノ輕重ニ從テ日ニ二次ヨリ六次ニ至ル。乃チ其淋痛速ニ減ス。○右ノ如ク療法ヲ施ス。十日ヨリ二十日許ニ至レバ。焮痛淋瀝大ニ減シ其液ノ綠色漸ク黃色及ビ白色トナリ。終ニ粘絲ヲ牽ガ如クナリテ治ス。○斯ノ如ク回復スルニ隨テ漸ク下劑ヲ減シ終ニ三日ニ一次用フベシ。○微毒

根治スルヲ極テ難シ。假令一滴ノ毒ト雖モ血液中ニ遺留スレハ身體生運ノ元カト血液活潑充灌ノ勢ニ因テ日ヲ經ルニ隨ヒ漸ク滋息シ終ニ全身ニ彌滿シ峻効ノ藥劑ト雖モ治シ難キニ至ル。故ニ大抵回復スト雖モ右ノ下劑ヲ怠ラズ用フベシ。是由テ治スレバ其毒遺滯スルヲナシ○或ハ其毒消スレヒ久ク下劑ヲ服スル等ニ因テ男子ハ尿道婦人ハ膈其他陰所諸部ノ輸泄管弛弱虛衰シ粘稠ノ白液滲漏ノ止ザル者アリ。此症ハ三日ニ一次下劑ヲ與ヘ其間ニ左ノ數方ヲ擇ミ用フベシ

治淋拔爾撒謨飲

拔爾撒謨字露

阿利襪油

各四錢

右調和シ每服三十滴ヨリ六十滴マデ日四次用フ

的列拉玫瑰飲

勿搦祭亞的列拉底那

扁挑油

玫瑰昆設爾弗

各一

右調和シ每服一卵匙日四次或ハ六次用フ

桂黃的列拉糕

勿搦祭亞的列拉底那

桂末 各二

大黃 末六錢

勿搦祭亞石鹼

滿那

沙糖 各二錢

右調和シ十片ヲ一個トシ。甘草末ヲ衣トシ。朝夕六個宛用フ

格磔波丸

格磔波尼亞名 一多

右二片ヲ一丸トシ每服六丸或ハ八丸。日ニ六次用フ。○右ノ劑ヲ用テ功ナキ者ハ左ノ劑ヲ用フベシ

格磔屈私珊瑚散

石梅 琥珀 烏賊骨 各二錢

收瀉格磔屈私末爾扶斯名 一錢半

右研和シ分テ十四服トシ一服宛用ル一日ニ兩次

○右ノ劑ヲ用テ小便通利ニ劇痛シ若ハ血ヲ交者ハ速ニ其劑ヲ休テ乳汁ヲ微温ニシ多ク飲シムベシ。是ヲ用テ兩三日ニシテ其症仍治セザル片ハ乳汁ニ阿芙蓉少許加テ用ヒ。其症治メ後復前方ヲ用ベシ。○右ノ諸劑ヲ用レテ此症痊愈トシ減セザル者ハ男子ハ尿道。婦人ハ腔ニ左ノ劑ヲ注入スベシ

列印水銃法

列印設酒名 一多 水 六多

右調和シ初ハ微温ニシ施シ。漸次ニ冷シ且其酒ヲ

增加シ一晝夜ニ十二次施スベシ○是ヲ施スル日ニモ仍効ナキ者ハ左ノ水銃法ヲ施スベシ

石灰水銃法

石灰水名 六分

玫瑰蜜名 二錢

右調和シ冷メ前法ノ如ク注入スル一日ニ六次

○右ノ療法ヲ施シ殆ト治セザル者ナシ。然レ尿道或ハ腔ニ潰瘍アルハ是ヲ愈スニ非レバ此病モ亦治スベカラズ。此症ハ二三日ニ一次下劑ヲ用ヒ。左ノ水銃法ヲ施スル十四日許ニシテ治スベシ

汞油水銃法

汞油水銃法

水銀錢 二

的列並底那

錢四

阿利襪油ニ

右水銀ト的列並ヲ硝子臼ニ入レ。研和ノ星ナキニ至リ。油ヲ和シ。水銃ヲ以テ患處ニ注入スル一日ニ六次○此症仍頑固ニシテ全治シ難キ者ハ右ノ水銃法ニ左ノ劑ヲ兼用スベシ

治淋幾那飲

幾那細末 三

血竭

四錢

橙皮舍利別名

桂舍利別名

各一

右幾那ヲ水二十四分ニ煮テ半ヲ減シ。漚テ滓ヲ去

リ餘藥ヲ調和ス。每服一碗晝夜ニ六次用フ○此症ハ陰處ヲ冷水ニ浴ノ甚ダ効アリ○右ノ劑ヲ用ル症ハ良性ノ肉羹汁。炙肉等。滋養ノ飲食。醇厚ノ葡萄酒ヲ適宜ニ與フベシ

○淋疾治ノ後數週或ハ數月ヲ隔テ屢發シ竟ニ宿疾トナル者アリ此症種々ノ淋疾ヨリ發スレハ微毒淋ヨリ發スルヲ殊ニ多シ。毎次連綿シテ休ズ灰白或ハ黃綠或ハ清稀ノ汚液ヲ淋泄シ。小便通スルニ痛少ク灼ガ如キ熾熱ヲ兼ルヲ稀ナリ。然レ輕忽ニノ治療ヲ加ヘズ或ハ誤治スレバ甚ダ久ニ彌テ

治セズ終ニ險重トナル○此症ハ尿道腺ノ弛緩衰弊ニ因リ或ハ尿道潰瘍ヲ生メ愈サルニ因ル。是亦瘰捻子ヲ施メ患部ヲ強壯ニスレバ必ズ治ス○此症ハ其病因ニ蹤蹟ノ治ヲ施スヲ肝要ナリ或ハ房勞過度或ハ微毒等種々ノ因ニテ陰具諸器大ニ衰弱シ發スルヲ多シ。斯ノ如キハ強壯劑前說ノ治淋ニ至ル諸劑ヲ云ニ各自對症ノ藥劑ヲ兼用シ又其病因トナル諸件ヲ嚴ニ戒慎シ滋補培養ノ飲食ヲ用フベシ○淋疾治ノ後數月ヲ經テ屢發シ或ハ毎年發メ宿疾トナル者アリ然レ其淋痛劇シカラ

ズ炊衝ナシ。此症ハ患者天質黴毒ニ感スルヲ少ク
或ハ其毒ニ傳染スルヲ必キニ因ル。治法總テ前件
ノ如シ。唯炊衝ノ治法ヲ措テ施サバルノミ。故ニ下
疳ノ條ニ説ク所ノ下劑ヲ擇ミ用フベシ。

○婦人黴毒淋モ男子ノ如シ但其毒尿道腔腔唇其
他陰所諸部ノ腺ニ著テ其輸泄管ヨリ洩^ヌルノ如キ
汚液流泄シ腔唇等腫起ノ搔痒ヲ覺エ其後小便通
スル^ヤ片刺痛灼^ヤガ如ク小便艱澁淋瀝シ其痛暫留ノ
休マズ。陰處益腫起シ交媾ヲ妨ゲ尿道ノ水棉體漸
腫起シ淋泄ノ液黃色或ハ綠色ニメ臭氣アリ右ノ

諸症男子淋疾ノ第一等。第二等。第三等ト全同シ。但
第三等ニ所謂粘白液淋泄ノ歇^ヤズ荏苒タル症ハ婦
人ニ在テハ白帶下ノ如シ。是ヲ分法。其連綿タル漏
泄ノ液。月經ノ期ニ於テモ止ザルハ淋疾トシ否ル
ハ帶下トス。然^レ氏經閉ノ者ハ是ヲ以テ分難キ故ニヨ
ク其體質ヲ察シ諸症ヲ較^ハリテ是ヲ決^スベシ又淋疾
ハ腔唇及陰處ノ外部ノミ腫起シ腔中ハ必^シモ其
患症ナシ。或ハ手指ヲ以テ診ニ腔ノ外部ノミ腫痛
アリ或ハ酸^ム末ノ液ヲ沃^ソニ其外部ノミ刺痛ヲ覺エ
腔中ハ必^シモ疼^ムヲ無シ或ハ小便通スル^キニ灼^ヤガ如

シ易シ。其經久頑固ノ微毒ヨリ是ヲ發スルハ盡ク全
身ニ彌漫セル毒ヲ驅除スルニ非レバ治セザルナリ
○凡、微毒ノ腫瘍ハ規吉撒爾弗イキサルヲ外敷ノ良効アリ
増註便毒ノ消散スベクノ化膿スベカラザル症ハ
刺絡イキサルヲ施シ疏滌汞劑包皮焮ヲ用ヒ規吉撒爾弗イキサルヲ
外敷シ其腫ヲ消散セシムベシ化膿スベキ症ハ緩
和蒸溺劑陰焮或ハ緩和陰焮布陰焮及ビ拔實栗膏名ヲ
貼シ膿熟スレバ腐蝕藥ヲ施シ潰破セシムベシ。鉗
鉗ヲ用テ刺破スル片ハ創唇縫縮ノ收口ニ妨アリ
其潰瘍ハ排膿ノ膏藥ヲ貼シ盡ク其膿ヲ排除シ且

汞劑ヲ内服ノ全治ニ至ルベシ腐蝕藥ハ刺必ス印
必斯加カ斯屈ヲ用フベシ歌兒那栗斯或ハ刺
出ツ○汞劑ハ包皮焮陰焮ノ條ニ出ツ傑○便毒ノ
治法、羣丸腫ト同シ故ニ其消散スベキ症ハ羣丸腫
ノ消散法ヲ施シ化膿スベキ症ハ軟化蒸溺劑及ビ
芭布イヲ外敷シ膿熟スレバ其膿ヲ排泄シ治スベシ
軟化蒸溺劑及ビ芭布イハ陰頭焮陰焮ノ條ニ
記ス所ノ緩和蒸溺劑及ビ芭布イナリ袖

增補重訂內科撰要卷六終

（Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and ghosting.)



書賈

江戸淺草茅町三丁目

須原屋伊八

浪華心齋橋通北久太郎町

河内屋儀助

同心齋橋通唐物町

河内屋太助

京三條寺町西入町

丸屋善兵衛



