



增補
訂

科撰要

卷十

洋学文庫
文庫 8
C 27
10



槐園宇田川先生著

增補 重訂 內科撰要

京攝書肆

種玉堂 文金堂 發兌 瑞錦堂

增補重訂內科撰要

目錄

卷十

病屬頸項

喉風篇第二十四

咳嗽篇第二十五

吐血篇第二十六

卷十一

胸脇痛篇第二十七

肋膜焮衝 傷冷毒痛 羅斯痛

熱毒註 胸內傷 咽喉羅斯焮
衝症治 粘液腫 瘰癧症
熱毒效 胃寒效 壯熱乾燥效
蒸氣鬱過 效 滑液失常效
肺瘍效 效
胃效 效
註 血脉說



肺痛篇第二十八

喘急篇第二十九

病屬腹肚

嘔血篇第三十

卷十二

惡心乾嘔篇第三十一

嘔吐篇第三十二

不食篇第三十三

善饑異嗜篇第三十四

嘈雜篇第三十五

粘液喘 肺虛喘 癆急喘
血液不熱喘 多血喘

血脉破綻 血脉開哆

食傷 體動 感觸
腐敗毒 羅斯炊衝

胃虛症

胃中粘液 腐敗液

酸敗毒 壞液
胃感觸

增補重訂內科撰要卷十

遠西 玉函涅斯垓我爾德兒 著

宇田川玄隨 晉 譯

津山

男 玄真 璘 校註

加賀 藤井方亭 俊 增譯

病屬頸項

喉風篇第二十四

羅甸名アンギナ
和蘭名ブルイニ

喉風ノ大較ヲ論ス

世ニ咽喉炊衝ヲ以テ安及那即チニ充ツ然レ咽喉炊

醫全章

喉風ノ分別ヲ論ス

衝ハ安及那ノ一種ニシテ安及那ノ全義ヲ盡スニ足
 ラズ。夫レ羅甸ニ安及那ト稱スル者ハ醫家多ク羅甸辭ヲ用フ
 蘭ニ蒲律印ト名クル病ト其義全ク同ノ其因或喉ニ
 在リ或咽ニ在リ或齊ク咽喉ニ在テ患者呼吸ヲ妨害
 シ或飲食ノ嚥下ヲ障碍シ或呼吸嚥下共ニ妨碍スル
 數症ヲ統括シテ是ヲ稱スルナリ故ニ予其名義稱呼
 ノ馴正ニ妥當ナラントヲ要シ安及那ヲ以テ此篇
 ニ題セリ按ニ喉風ノ名義固ヨリ安及那ニ允當セス然レモ他ニ漢說ノ是ニ充ツベキ病名ナキ故
安及那ノ釋義ニ就テ其症ヲ領スベシ
 喉風ノ分別ヲ論ス

夫呼吸ヲ通シ飲食ヲ下ス兩箇ノ營爲ヲ妨碍スルニ
 許多ノ原由アリ。又咽喉中此患ヲ發スル處モ一ナラ
 ザルガ爲ニ少年未熟ノ輩ハ此病ヲ的識明辨シ難ク
 且如何カ是ヲ救療スベキト云テ知リ難キニ困ム
 ナリ○又其症候ニ就テ許多ノ紛亂眩惑ヲ作スア
 リ即肺病モ能呼吸ヲ妨害シ胃管ノ病モ爾夕嚥下ヲ
 障碍スレモ是ヲ喉風ニ屬スルナシ或喉頭及咽喉
 中ニ係ル病ニシテ呼吸若クハ嚥下ヲ妨碍スト雖モ
 亦喉風ニ屬セザル者アリ即鼻塞ノ浸長シテ咽喉内
 ニ懸垂スル者或魚骨鯁若クハ自餘何ニテモ咽喉中

ニ梗塞スル者或、喉頭ニ係ル所ノ諸筋、痺シテ不遂シ
 患者聲音嘶啞スル者或、喉頭筋、痙攣掣急シテ患者呼
 吸殆ト壅塞スルヲ假令バ子宮衝逆第五十八章及第
百四十三章ニ出
 ニ於ルガ如キ者或、胃管ノ諸筋、痺シテ不遂シ飲食嚥
 下ヲ障碍スル者ノ如シ自餘斯ノ如キ類勝テ數フベ
 カラズト雖モ亦是ヲ喉風ニ係ザルヲ準シテ知ルベ
 シ○加之撰述家或ハ頸内咽喉部或、頸外ニ發スル腫起
 ノ有無ヲ察シ或、其腫、胃管ニ在リ或、喉頭ニ在リ或、其
 兩部共ニ在ルヲ以テ曲ニ許多ノ區別ヲ作スナリ。是
 畢竟其治術ノ蹇難ナルガ爲、ニ自ラ許多ノ名目ヲ工

夫シ出シ來ルナリ○唯其中ニ就テ徵トシ取ルベキハ
 凡、喉風ノ諸種、外ヨリ觀ツベキ腫脹ノ候ナキハ險重
 トス。是トツ一來ハ其外ニ發セザルガ故ニ必、内ニ腫ル
 ヲ知ル。是ヲ以テ險ナリトス。二來ハ視察シテ其病原
 ヲ診候スベカラザルガ故ニ其對症ノ治法ヲ處置ス
 ルト能ハザレバナリ
 喉風熱毒ニ因ルノ症治ヲ論ス
 熱病ノ毒ニ因テ發スル喉風二種アリ○第一種ハ呼
 吸並ニ飲食ヲ嚥下スルニ妨礙疼痛ス。多クハ初夏ノ
 頃暴卒ニ是ヲ發ス。初發、惡寒振慄スルヲ熱病ノ如ク

ニシテ忽^チ喉風ヲ發シ。咽喉内。或頸腫起ス。或初二腫ナ
キ者アリ。凡^ソ此症ハ熱病ノ毒^ノ多分頸部咽喉ノ諸脉管
ニ鬱結滯著スル者ナリ。是ヲ真ノ喉風ト云フ。斯ノ如
キ熱病ノ種類ハ其初咽喉腫脹スル^ト必^シト雖モ爾^レ
後漸次ニ增長シ熱病ノ未ダ劇盛ノ極ニ至ラザルニ
早^ハ不早^ヤ咽喉狭窄ニシテ促進シ。呼吸飲食共ニ全ク阻
絶セン^トヲ恐ルナリ。○是ヲ以テ此症ハ先^ニ刺絡シテ
瀉血シ。其熱病ノ增劇滋長ノ勢ヲ減スベシ。若^モ一^イ次ニ
テ適意ニ輕快ヲ得スバ遲延セズ再^ニ刺絡ヲ施スベシ。
若^モシ^カ必^ズク濡滯シテ時日ヲ經レバ咽喉窒塞スレバナ

リ○是ニ次テ清涼ナル吉利詞^キ參兒^リヲ施シ或^ハ患者嚙
下スル^トヲ得バ清涼ノ下劑ヲ與^フベシ。方ハ共ニ第十
二章ニ出ツ○又含漱劑ヲ作り漱^クク^クナク唯口中ニ
含テ咽喉ヲ濡潤セシムベシ

玫瑰含漱方

玫瑰花 各半握
接骨木花 各半握
水 十斗
右件合シ。文火上ニ置テ藥氣ヲ泡出シ滓ヲ去リ次
ノ藥ヲ加フ。

硫黃精 名 適宜

蜂蜜 一多

右件調和ス。但、硫黃精ハ此劑ノ酸味トナルホドニ加ベシ。○若、硫黃精ヲ得ザル片ハ枸櫞汁或、栗殼子名汁ヲ代用スベシ。若、此二品共ニ闕ルニ値バ醋ヲ以テ代用スベシ。

外用ノ藥ハ蒸餅母名或、酪餘名ト亞麻子トヲ以テ名布ヲ造リ頸ヲ匝シテ貼スベシ。若、酪餘ヲ得ザレバ醋ト水ヲ以テ代用スベシ。○患者嚥下スルコトヲ得ル者ハ大麥或、雀麥ノ粗碎ニ水ヲ加、煮テ枸櫞汁ト消石錠

少許ヲ加、飲劑トシ與フベシ。伍多 伍多イ都醫學實函ニ曰、喉風、咽喉腫ヲ治シ、聲啞シテ出ザルヲ取テ煮服、嗽ヲ療ス、熱病ニ於テ殊ニ必用タリ、又舍利別ニ製シ、疝痛ヲ治スト、第二十五章、熱壞液方中、雀麥ヲ以テ大麥ニ代ル説アリ、熱病ニ効アルコト知ルベシ。○第二種ハ直ニ熱病ヨリ發スル所ノ喉風ニシテ熱毒ノ咽喉ニ轉移スル者ナリ。然、凡多クハ是ヲ發スルコト遲シ。殊ニ熱病ノ末ニ於テ發シ。是ニ由テ患者大抵ハ救ハレザルニ至ル。是、咽喉ノ部ハ狹隘ナルヲ以テ其膿トナルベキ許多ノ熱毒ヲ悉ク斯ニ受容シテ化膿シ排泄スルニ足ラザレバナリ。縱、幸ニシテ死セザル者モ多ハ肺瘍、若、ハ胸内瘍トナルナリ。胸内瘍ハ和蘭名エソテルボ

喉風

ルスト是肺瘍ノ膿或胸肋腫瘍ノ膿漏泄シテ胸腔内
横膈上ニ滯留シ諸惡症ヲ發シ終ニ勞瘵トナルナリ

喉風羅斯及焮衝ノ因ルシ症治ヲ論ス

羅斯第百三十二章ニ註ス ト焮衝トハ固ヨリ二病ナレモ是ヲ

咽喉ニ發スレバ皆焮赤疼痛腫起シ多クハ是ニ次テ

發熱スルカ故ニ其症候彼此相混シテ分別シ難キ者

ナリ○此症ハ通例焮衝ヨリ發スト雖モ其治法ニ於

テハ予多クハ羅斯トシ是ヲ療スルナリ其故ハ羅斯

ニ收斂劑ヲ用ルニ焮衝ヨリハ每ニ能良効ヲ奏シ又

凡喉風ハ收斂劑ヲ用テ能ク治驗ヲ得レバナリ○羅

斯或焮衝頸ノ外部ニ發見シ或咽喉内ト雖モ口中ヨ

リ見ツベキ諸部ニ發スルハ危險ナラス但頸外ニ見

ハレズ或咽喉内ニ在テ外ヨリ必モ見ルヲ能ハザル

者ハ危險トス○此種類ノ症ハ前章説ク所ノ熱病毒

ヨリ發スル喉風ノ治法ニ從テ療スベシ○若其腫膿

瘍トナル者ハ大抵第七日頃ニ膿ヲ成スナリ是ニ至

テハ予ガ著ス所ノ瘍科精選ニ記載セル諸膿瘍ノ治

法ヲ施シテ療スベシ達未得漢條設兒著ス瘍科書

シ咽或喉或亞滿堙兒口益等焮赤腫痛シ飲食或呼吸

ヲ妨碍ス此皆通例焮腫ヲ消散スル飲劑漱劑刺絡等

ヲ施スベシ患者口ヲ開テ其腫ノ見ツベキ症ハ

是亞滿堙兒口益或喉頭ノ上部ニ在ルナリ此症多ハ

膿ヲ成ス既ニ膿ヲ成ス乳汁ニ煮テ口中ニ含ミ漱クベ

用ベシ其方無花果ヲ成ス乳汁ニ煮テ口中ニ含ミ漱クベ

曾丁月科撰要

卷十

第百六十五章

風雲堂

喉風

其膿十分熟スレバ自然ニ潰破シ或、鍼シテ膿ヲ泄
 シ其後右ノ漱劑其他斯ノ如キ類ヲ施シテ其餘殘ノ
 膿ヲ熟スベシ○患者口ヲ開テ其喉腫ノ部見エザル
 ハ是喉頭或、喉頭ノ下部ニ在ルナリ此症劇キ者ハ呼
 吸窒塞シテ死スルヲアリ是ハ截喉術ヲ施スヨリ他
 ナシ○羅斯様ノ症ハ咽喉亞滿埤兒口益等ノ被膜黃
 赤色其痛刺ガ如ク患者肢體懈惰勞倦戰慄脈數ニシ
 テ小ナリ此症ハ初發數刺絡ヲ施セバ多クハ治ス又
 清涼下劑發散劑漱劑即、接骨木花ノ煎劑浸劑消石桑
 甚合利別ニ醋ト水ヲ加ヘ或、接骨木花ノ醋劑ヲ加等
 ニテ製シ用ベシ此症ハ初ヨリ對症ノ治法ヲ施セバ
 治シ易シ然レモ治療ヲ怠リ或、誤治スレバ壞疽トナ
 菜花ノ舍利別玫瑰蜜等ヲ外用シテ治スベシ
 喉風粘液腫ニ因ルノ症治ヲ論ス
 凡、頸内咽喉ノ諸部ハ其質水綿ノ如ク甚ダ鬆疏虚軟
 ニシテ許多ノ粘津滑液ヲ滲出シ以テ咽喉通利ノ道

路ニ灌溉浸潤シ常ニ燥涸セスシテ滑澤順溜ナラシ
 ム是故ニ若^モ其津液常性ヲ失テ分利滲泌セザルヲア
 ル片ハ亦能ク其部ニ壅滯シテ腫脹ヲ發スルナリ是
 ヲ粘液腫ト謂フ即、亞滿埤兒^{ノ懸壅垂ノ兩側ニ在ル腺}
 或、口蓋ノ後部或、胃管裏面ノ膜或、喉頭裏面ノ膜腫脹
 スルヲ以テ呼吸ヲ妨ケ或、飲食ヲ阻シ或、呼吸飲食共
 ニ妨碍スルニ至ルナリ○其症頸ノ外部或、咽喉ヲ見
 ルニ寒慘ニシテ黯澹色ノ腫ヲ發シ患者呼吸及、嚥下
 ニ苦悶シ發熱ナク唯呼吸ノ將ニ窒塞セントスル危
 殆アルノニ○此症ハ刺絡ヲ施ス丁無ク唯芫菁膏ヲ

貼シ頸項等又燕窩名ニ加カ密シ列花。少許ヲ加テ琶布ニ作リ頸ヲ匝カシテ貼ス火シ。又蠟ニ乳香ヲ和シテ錠子ト作シ是ヲ患者ニ嚼カシメテ許多ノ膠粘トル涎唾ヲシテ口中ヨリ湧泄セシムベシ

喉風

喉風。痙攣ニ因ルノ症治ヲ論ス

假令トバ第百三十八章ニ論スル痙攣ニ因テ身體ノ諸筋。我意ニ逆テ掣急牽縮シ。肢體是ガ爲ニ運轉舉動スルト能ハザルガ如ク若モ痙攣ノ病アリテ遂ニ胃管若ハ喉頭ノ諸筋ニ侵襲スル片ハ咽喉忽チ緊窄牽縮シテ閉塞スル症ヲ發スルナリ子宮衝逆或ハ癩ニ於テ發スル症ヲ云其症急

卒ニシテ且頻々ニ發スト雖モ解散スルト亦速ナリ

○若モ其痙攣ニ由テ頸靜脈ヲ壓止スル片ハ患者ノ顔面盡ク青色トナルナリ。是其頭部ニ循行スル血ヲ阻遏シテ還リ降ルト得ザラシムルガ故ナリ○此症ハ右ニ説ク如ク患者咽喉壅塞シ呼吸絶スルガ如クニシテ將マニ死セントスル狀ヲ現スト雖モ必シモ吐下等ノ排泄スル者ナクシテ忽チ復蘇甦シ故ニ復スルト更ニ奇異ナリトス喘急篇第百九十五章曰肺藏ヲ異ニスルガ故ニ自家ノ運動アリテ持リ其政ニ交涉セスシテ獨リ一箇ノ痙攣ヲ發シ是ヲ以テ自ラ其運動ヲ障碍シテ暴喘ヲ發シ必シモ痰飲ヲ吐クトナシ此症ハ發作甚ダ暴卒ニノ解散スルトモ亦甚速ナリ

リ。是故ニ患者モ亦甚。是ヲ奇異ナリトシ。以テ爲ク是レ
 肺ニ粘痰有テ充塞ス。然ルニ今倏忽トシテ解散シ。俄
 頃ニシテ差復シ。脱然トシテ故ノ如ク。是以テ人^ハ以爲
 ク。氣息ニ妨患ナキヲ得タリト。是ヲ以テ人^ハ以爲
 夕咽喉中悉ク粘液充塞シ。或他ノ汚物有テ壅滯シテ
 發スル者ナリト。然レ是レ粘痰汚液ノ壅塞スルニ非ズ
 シテ唯痙攣ノ發動ニ因テ咽喉牽縮スルノ致ス所ナ
 ル。自ラ明ナリ。其故ハ此痙攣ヲ發スル^ト甚シテ諸
 筋ニ灌入スル所ノ精氣遏止シ。患者昏冒スルニ至レ
 バ其痙攣ノ症。忽チ靜止シ。咽喉ノ^{ヒキシメ}拊^ヒモ亦速ニ弛解シ
 テ患者故ニ復スル^ト夫ノ痙攣ヨリ發スル卒厥ノ如
 クナル^トヲ推究思索スル^ル片ハ則チ此症モ亦甚ダ領解

シ易シトス。卒厥篇第百十九章ニ曰ク痙攣ヨリ發ス
 非レバ死スル^ル卒厥ハ頻ニ數發シテ患者疲極スルニ
 諸筋ノ神經ニ於テ精氣ノ灌入スル^ト大過強甚ニシ
 テ常調ヲ失ヒ。激迫衝動スル^ルヨリ發スル^ルガ故ニ痙攣
 甚フシテ患者昏厥シ。生^ル活^スル^ル元運遏止スル^ルニ至レハ
 其精氣^ノ灌入^ス強甚ナル^ルモ亦從テ遏止スル^ルヲ以テ痙
 攣自ラ弛解^ス散^ス精氣^ノ漸ク復流^ス○此症ハ其痙攣ヲ寬解
 通シテ患者省復スレバナリ。此症ハ其痙攣ヲ寬解
 スル^ルカ爲ニ刺絡スル^ルヲ宜シトス。然レ其症解散ノ後
 ハ刺絡ハ害アリ。唯宜ク數再發スル^ルヲ豫メ防グカ爲
 ニ第百四十三章ノ痙攣ニ舉ル藥劑ヲ擇^ク用^フヘシ

病屬胸脇

欬嗽篇第二十五 羅甸名「オ」ツシス 和蘭名「オ」リス 附 肺瘍胃欬

醫學章

欬嗽ノ大較ヲ論ス

凡、身體ヲ侵刺衝動スルニ因テ我意ニ逆テ發スル運動 痙攣 數種アリ。其中ニ就テ欬嗽ヲ稱首トス。何トナレバ喉頭ヲ侵刺衝動スル者アル片ハ身體自然ノ良能ニテ是ヲ排泄驅除センガ爲ニ管ニ肺管ノ諸纖維ノミナラス腹部ノ諸筋及自餘常ニ我意ニ隨ヒ運動スル諸筋 口舌咽喉頭胸肋橫膈腹部等ノ諸筋ノ如キルテ呼吸ニ就テ運動スル筋ヲ云ニ至マデ皆悉クカヲ戮テ其排泄ヲ助ケ。更ニ我意ニ逆フ

運動 欬嗽 ヲ發スレバナリ。然バ則チ自然ノ良能。其侵襲

刺戟ヲ被ル所ノ患害ヲ免ンガ爲ニ自ラ人爲ノ得テ

及ブベカラザル所ノ運動 痙攣 ヲ發シテ已コヲ得ズ

我意ニ逆フ營爲 欬嗽 ヲ致ス。實ニ造物主ノ奇巧全能

懇到周悉ニシテ至ラザル所ナキコヲ觀ルニ足ル。

欬嗽ハ其症狀ヲ説クヲ待ズシテ衆人及患者モ亦能

是ヲ知ルニ足ル。唯其自然良能ノ標準タル所ハ畢

竟其喉頭ノ裏面ニ著テ侵刺襲戟スル所ノ者ヲ排除

センガ爲ニシテ此症ヲ發スルコ自ラ彰然タリ

欬嗽ノ病因ヲ論ス

醫學章

凡喉頭ノ裏面ノ膜ニ於テ疼痛ヲ爲シ。若ハ侵刺衝動
 スル諸因アレバ皆必ク嗽ヲ發スルナリ。○其一ハ
 諸酷厲ノ物。氣中ニ混シ呼吸ニ隨テ吸納シ喉頭ノ裏
 膜ニ懸留スルキハ嗽ヲ發シ。或ハ飲液ヲ送下スルニ
 誤テ氣管ニ陥入スレバ縱へ其液酷厲ナラズト雖モ
 嗽ヲ發スルナリ。症治次章 ○其二ハ體中ニ有ル所ノ
 酷厲液。喉頭ニ著ク片ハ嗽ヲ發ス。即諸熱病及冒寒ノ
 病ニ是ヲ發スルガ如シ。症治第百七十一章ヨリ ○其
 三八喉頭ノ裏膜。大ニ乾燥ノ嗽ヲ發ス。即諸壯熱病ニ
 是ヲ發スルガ如シ。症治第百七十章ニ論ス ○其四ハ膿有テ肺

若クハ胸内ニ鬱聚スル片ハ嗽ヲ發ス。症治第百七十
 五章ニ論ス ○其五ハ物有テ喉頭内ニ聚ル片ハ嗽ヲ發ス。症治第
 百七十章ニ論ス ○其六ハ喉頭ノ内膜ニ羅斯若クハ
 嗽衝ヲ發スレバ嗽ヲ發ス。喉風篇ニ論ス ○其七ハ胃中消化ノ官能ヲ
 失テ半生未熟ノ液ヲ生シ終ニ是ヲ喉頭ニ運輸スル
 片ハ嗽ヲ發ス。症治第百七十章ニ論ス 自餘起因多シト雖モ右
 説ク所ノ諸因ニ就テ是ヲ類推スルキハ其他ハ自ラ
 能ク知ルベキガ故ニ復爰ニ贅セズ
 嗽。外物ヲ吸納スルニ因ルノ症治ヲ論ス
 夫嗽ノ外物ニ係ルヲ假令バ氣息ニ隨テ諸酷厲ナ

第七章

ル氣烟氣蒸氣濕氣瘴ヲ吸納シ或ハ飲食スルノ際失
咽シテ氣管ニ誤リ落テ咳ヲ發スルガ如キハ大抵其
入タル所ノ者ヲ咯出シ除クナリ。是レ一時偶然ノ事ニ
シテ是ヲ病ト稱スルニ足ザルヲ人々常ニ知ル所ナ
リ○然レ其酷厲ノ氣若クハ飲液ノ類。喉頭ノ裏面ノ
粘津ニ繫著スル片ハ咳嗽ヲ發シテ其推盪漂去ノ氣
ニ因テ是ヲ驅逐シ出サント欲スレト容易ニ驅除ス
ルヲ能ハズシテ其效。連綿暫留シテ歇ヤマザル者アリ。此
症ハ沸湯ヲ取テ其蒸氣ヲ吸納シテ最モ的當トス其
蒸露ノ津潤ヲ以テ膠著セル酷厲液ヲ融解疏釋シテ

第三章

咯出シ易カラシムルガ爲ナリ○此症妄ニ粘滑ノ劑
ヲ與ルハ無益トス。是ヲ飲服スト雖モ沸湯ノ如キ蒸
氣トナリテ喉中ヲ浸潤スルヲ能ハズ。直ニ胃管ニ下
去ヲ以テ氣管ニ於テハ毫モ其澤ヲ被ラザレバナリ
效嗽熱病ノ毒ニ因ルノ症治ヲ論ス
諸熱病ニ效嗽ヲ發スルヲ多シ。是レ熱毒。喉頭ノ液喉頭
ニハ許多ノ腺アリテ此ヨリ津液ヲ滲出シ常ニ其部
ヲ滋潤ス。故ニ呼吸ノ氣ニ因テ乾燥スルヲ無シ。是所
謂ル天資固有ノ滑液ナル者ニ混淆シテ其裏面ノ膜
ナリ。第百九十二章ニ詳ナリ。ニ混淆シテ其裏面ノ膜
ヲ侵刺スレバナリ○若熱毒ノ排出スルヲ他ノ部ヨ
リハ殊ニ喉頭ニ過多ナル片ハ困重ナル效ヲ發ス。但

其侵刺シテ休ヤガルニ因テ終ニ斯ニ膿ヲ釀シ是ヲ以テ其毒ヲ包攝シテ白痰ノ形ト爲シ咯出スルニ非レバ其效必ズ緩解セズ且、治スルナシ○此症ハ第七章ニ論スル熱病ノ通例ノ治法ヲ施シ且、和胸劑ヲ用ベシ

和胸湯ノ方

和胸湯

黥失刺左ッシラゴ薺葉名

錢葵葉 各一錢

遏爾託亞根名

甘草 各一弓

水 三十弓

右件合シ煮テ漉過シ滓ヲ去リ。麥酒盞ニ一盞宛熱服スルヲ日ニ數次是ヲ冷飲スルヨリハ熱服シテ大ニ利益アルヲ屢、歴驗スル所ナリ

傷寒

欬嗽。胃寒ニ因ルノ症治ヲ論ス

第四十四章ニ論スル傷冷毒。夫ノ氣管ノ裏面ニ灌溉スル所ノ天資固有ノ滑液ト混淆スルギハ荏苒トシテ瘰イエガレ欬嗽ヲ發ス是高年ノ人ハ甚ダ治シ難シトス○治法。唯其傷冷毒ニ從テ是ヲ療シ殊ニ發汗劑ヲ用テ其酷厲毒ヲ皮表ニ驅發スベシ

發汗劑ノ方

安質沒扭發汗糕

的里亞加 一錢

安質沒扭若波列 一月

雜腹蘭 半刀

蘇合香 五片

右件合シテ調勻シ。毎夜是ヲ服ス。○此劑ニ葡萄酒
 少許ヲ加服スルモ亦良。○此劑ニ甘葡萄酒一種甘
 或哮喘喘ヲ調和シ焯解シテ其量ヲ増シ匙ニ抄テ
 頻々ニ服スルモ亦佳ナリ。○若是ヲ匙漿ニ造用テ
 利益多カラント思ハ方中ノ的里亞加ヲ去テ白

第三章

罌粟ノ舍利別ヲ代用スベシ舍利別ニ代レバ此劑
 效嗽。蒸氣鬱遏ニ因ルノ症治ヲ論ス差稀クナレバナリ

無病平全ノ人。常ニ多ク效嗽ニ嬰ルハ是寒冷濕氣ニ
 胃觸シ或風ノ隧道闕ニ枕シ。窓隙ニ當リ。虛邪賊風ニ
 表發ノ蒸氣ヲ抑遏セラレテ内鬱シ其鬱遏セル所ノ
 毒。肺藏ニ將來リ其中ノ天資固有ノ滑液ニ混淆シ其
 感冒セル冷氣ニ由テ凝結シテ硬固トナリ是ヲ以テ
 肺中ヲ侵刺衝動シテ效嗽ヲ發スルナリ。故ニ其毒痰
 唾トナリテ吐泄スルカ若クハ皮表ニ發越セザル間
 ハ其效連綿シテ治セザルナリ。○斯ノ如キ種類ノ效

ハ皆前章説ク所ノ法方ニ依テ能治スベキガ故ニ爰ニ復新方ヲ贅セズ。

第百七十章

欬嗽。壯熱ノ乾燥ニ因ルノ症治ヲ論ス

熾盛熱第百十八章ニ註スニ於テハ啞ダニ皮膚乾燥シ口舌津潤ヲ失フノミナラズ。氣管裏面ノ膜モ亦一同ニ燥涸シ。熱氣奔騰シテ喉ノド内ヲ刺戟シ欬嗽ヲ發スルナリ。故ニ此症ハ其因自ラ彰著ニシテ診知シ易シトス。此症ハ第十二章ニ論スル壯熱病ノ尋常ノ治法ヲ施シ。第百七十章ニ論スル沸湯ノ蒸氣ヲ吸納セシメ。且第百七十一章ノ和胸湯ヲ用テ氣管ノ裏面及肺

中ヲ潤霑スベシ。是ニ由テ其連絲シテ休ザル乾效自ラ靜止シ。粘液稀釋シ。痰トナリテ能咯出シ。尋テ大ニ輕差ヲ得ベキナリ

第百七十一章

欬嗽。胸肺ノ膿ニ因ルノ症治ヲ論ス

凡吐血シテ後。欬嗽ヲ發シ連絲シテ休ザル者ハ是肺藏ニ膿瘍アリテ其膿酷厲ノ性トナリ。是ヲ以テ刺戟シテ效ヲ發スルナリ。○此症ハ其肺瘍バ彌腐敗シテ膿潰スルヲ防止シ。且其膿ヲシテ一ニハ吐痰ニ由リ一ニハ小便ヨリシテ排泄シ易カラシムルノ策ヲ爲ベシ。左ノ方是ヲ主ル吐血篇第百八十一章ト參考スベシ

方 蘇合拔爾撒謨丸

拔爾撒謨格拜霍名 煮テ稠厚トナ
者 四錢

拔爾撒謨字露 半錢

斯百兒末攝的名 二月

蘇合香 一月

甘草末 適宜

右件合勻シ。每一錢十五丸ト作シ。半時毎ニ一丸ヲ服ス

少年ノ輩。吐血後漸、欬嗽ヲ發シ。胸中稍温熱シ。口舌甘味ヲ覺ル者ハ刺絡シテ瀉血スルヲ良トス。是其再吐

蘇合章

血スルヲ豫メ防ガ爲ナリ。○若胸脇痛或肺欬衝即第百八
十七章ノ肺痛ヲ患テ後、欬嗽ヲ發スルト甚キ者ハ其既ニ釀
成セル膿。肺藏ニ瀦留シ或胸腔内ニ漏泄シテ滯著ス
ル症タルノ恐アリ。此症ハ前説ノ治法ヲ施シテ其膿
ヲ泄除スルト緊要タリ。又多ク飲液ヲ與ルヲ佳トス。
即第百七十一章ノ和胸湯ヲ兼用スベシ。○然レ其熱
太甚ナル者ハ其丸子ヲ除テ和胸湯ノミヲ用フベシ。
欬嗽喉頭ノ滑液失常ニ因ルノ症治ヲ論ス
假令バ亞滿埵兒第百六十六 及咽喉ニ於テ常ニ滲出
スル所ノ粘滑ナル液。酷厲ノ性トナリ或粘結シテ凝

固スルヲアルカ如ク。喉頭ノ裏面ニ於テ居ツキニ恒製造セ
ル天資固有ノ滑液モ亦能ク其常性ヲ變シテ酷厲ト
ナリ或凝固スルヲアリ○患者效シテ稀涼ノ液ヲ咯
出シ。喉中刺戟シテ痒起スルヲ覺ルハ是、喉頭中ノ液。
稀涼ニシテ酷厲ナル候トス。此症ハ第四十九章ノ傷
冷毒ノ治法ニ從ヒ。又第百七十一章ノ和胸湯ヲ用テ
甚驗アリ○其痰甚膠粘ニ容易ニ咯出シ難キ者ハ
其液粘稠ニ酷厲ナル候トス。此症ハ殊ニ凝結ヲ疏
解スル藥ヲ用テ妙トス。即甘草膏〇蜂蜜〇水絲糖〇無
花果等ノ如シ。是皆其粘液ヲシテ稀薄ノ液ト能相和

シテ換釋流通セシムルカ故ニ氣管中ニ膠著セル粘
痰自ラ能ク稀豁鬆解シテ容易ニ咯出スルナリ○其
液上ニ云天資固有ノ滑液極テ膠粘ナル片ハ硬固ノ凝塊ヲ成シ。
喉頭内ノ諸空隙ニ繫著シテ常ニ其部ヲ刺戟ス。故ニ
少モ痰ヲ吐ハナクノ乾效ヲ發ス。然レ其效ノ劇シキニ
隨テ終ニ硬固ノ小塊ヲ咯出スルヲアリ但、其繫著セ
ル空隙ノ廣狹ニ隨テ其塊モ亦大小アリ○人其吐泄
スル所ヲ見テ或、以爲オモヘラク是、肺中ノ腺ヲ吐出スル者ナ
リト西洋ノ俗醫家ニ非ト雖モ猶此腺アル其甚キニ至
テハ肺管中ノ天資固有ノ滑液甚粘稠ニナリ其管ノ

增訂內科摘要 卷十 十六 一風雲堂藏

形ニ象シテ凝結シ吐泄スルアリ肺管ノ大小支別
俗或是ヲ見テ以爲クオモヘラ是全然トノ肺藏ノ碎片ヲ效シ
出ス者ナリト○右ノ如ク天資固有ノ滑液凝聚シテ
是ヲ吐泄シ除カ故ニ其跡必ズ剥喪シテ裸露シ其處
ニ來ル諸液皆侵襲刺戟ス是ヲ以テ患者其痰塊ヲ吐
スル前後ニ必ズ效嗽ヲ發スルナリ前ニ於テスル者ハ是痰塊ノ刺戟スル者後ニ於テスル者ハ即諸液ノ侵襲スル者前後互ニ因テ相爲スナリ效嗽ト吐痰ト相須テ發スル大抵○治法其粘結セル凝塊ヲシテ吐泄シ易カラシ
ムルカ爲ニ温湯ノ蒸氣ヲ吸納セシメ第百七十一章
ノ和胸湯ヲ與ベシ是ニ由テ其痰能吐出スル片ハ仍

第百七十五章

右ノ法ヲ用テ其部ヲシテ常ニ津潤ヲ保タシメ又兼
テ薰法ヲ施ベシ其法乳香ヲ把トリテ熾炭ニ投シ其烟氣
ヲ吸納シ又第百七十五章ニ載ル丸子ヲ用ベシ
效嗽胃ノ化熟ヲ失フニ因ルノ症治ヲ論ス
胃ノ飲食ヲ消化スル官能ヲ失フニ因テ食後ニ效嗽
ヲ發スル症予屢々歴驗シ且小兒ニ於テ多ク見ル所ナ
リ其效劇クシテ頻ニ數發スレ疝痰ヲ吐トシ少ク或毫
モ吐痰ナシ故ニ是ヲ乾效ト曰フ○效嗽長ク連綿シ
テ絶セサレバ小兒或大人ト雖モ遂ニ嘔吐スルニ至ル
是ニ因テ飲食或自餘ホカ何ニテモ胃中ニ在物ヲ吐シ除

テ後ハ其效自靜止スルナリ○此症ニ諸般ノ和胸劑
和胸湯ノ類其他胸肺ヲ投スレバ逾其效ヲシテ頑固
ヲ緩和スル劑ヲ云ナラシメ且胃ノ飲食消化ノ機力ヲシテ彌益衰敗セ
シムルナリ○唯是ヲ治スルニ健胃ノ藥ヲ以テスレ
ハ大抵愈ザルナシ。即左ノ方ヲ與ベシ

方 盧沒健胃露

薄荷水 六勺

盧會 半錢

沒藥

酒石鹽

良薑 各二勺 一種小者
右件合シテ調勻シ。每服一匙。日ニ四次若クハ其餘
ニ至ル○小兒ハ少ク砂糖ヲ加ヘ甘味ヲ添テ口ニ
可ナラシメ。且服量ヲ減シテ與ベシ○大人ニシテ
丸子ヲ吞嚥スベキ者ハ次ニ出ス丸藥ヲ與ベシ

方 石鹼健胃丸

勿搦祭亞石鹼 一錢半

拔爾撒謨亭露

盧會 各一勺

沒藥 一錢

酒石鹽 一月

良薑末 適宜

薄荷油 五滴

右件合シテ每一錢十五丸ト作シ。橙皮末ヲ衣トシ
二丸宛服スルヲ日ニ二三

吐血篇第二十六

羅旬名ハモフテイシス
和蘭名アルドス
漢醫ノ所謂吐血
シテ口ヨリシテ
嘔血篇第三

附 肺瘍

漢醫ノ所謂吐血
シテ口ヨリシテ
嘔血篇第三
吐血ノ大較ヲ論ス

凡、口ヨリ血ヲ吐出スル症。是ヲ吐血ト曰フ。然レ其出

所ノ一ナラザルヲ假令バ鼻ヨリ出ルアリ。咽喉ヨリ
出ルアリ。口内ヨリ出ルアリ。胃或、肺ヨリ出ル等ノ差
別アルガ故ニ其症險易アリ。且、是ヲ治スルモ亦各、其
法ヲ異ニス。但、其肺ヨリ出ル者ハ自餘ノ吐血ト自ラ
相混スベカラザル自家ノ徵候アルガ故ニ職トシテ
是ヲ吐血ト曰フ。○其肺血ノ候タル第一ニ必ズ效ヲ
兼、或、以前ヨリ效嗽ヲ患テ後ニ血ヲ吐スルナリ。何ト
ナレバ肺管ハ其質軟骨ニシテ恒ニ洞開スルガ故ニ
肺管ノ血脉 肺管ニハ肺動脈、肺靜脈、循行シ又肺管ノ
自家ノ動靜二脈アリテ肺管ヲ纏絡シ肺

ヲ營養ス。第百八十八章ニ註ス。坼裂シテ其溢出ノ血。肺管中ニ陷入スル片ハ血ノ質重クシテ降沈下流スルヲ以テ欬嗽ノ勢ニ乘シテ是ヲ鼓橐スルニ非レバ喉中ニ上湧スルヲ能ハズ。然ル所以ノ者ハ一ニハ欬嗽ノ氣其血脉ノ坼裂セル處ノ下部ヨリ噴發シ來ルガ故ニ能其血ヲ上湧シテ喉中ニ驅泄スルヲ得。一ニハ欬嗽ニ因テ肺管ノ纖維。攣急牽縮シ其肺管ニ陷入スル血ヲ推盪激迫シテ能喉中ニ上輸セシムレバナリ。○第二ハ則其吐スル所ノ血必ズ泡沫ヲ爲ス。即依ト加刺得斯ノ撰著セル醫術編。第二百六條ニ論スルガ如シ。是呼

吸及欬嗽ノ氣ヲ以テ其粘稠ノ血ヲ鼓橐沸騰シテ泡沫トナレバナリ。○右兩件ノ徵候ト云ナキ吐血ハ是肺血ノ危難ヲ顧慮スルニ及バズ。何者其血唯痰唾ト共ニ咯出シテ泡沫ナキハ是頸内咽喉ノ部ヨリ出ル者ニシテ危險ナラズトシ或鼻ヨリ出テ咽喉ニ下リ口ニ出ル者ナレバナリ。○欬及痰ナクシテ唯血ヲ吐スルハ是口内後邊諸部ノ細血絡破開シ若クハ齒齦ヨリ出ル者ナリト知ルベシ。○吐血ノ胃中ヨリ來ルハ其症候後ノ嘔血篇ニ詳説ス

吐血ノ病因ヲ論ス

夫血ハ皆動靜二血脉中ニ在テ一身百體ヲ周流循環
ス。然レ其尿管ノ端末ニ至テハ極テ微細ニ其細血
球流通スルノ無シト動靜二脈ノ諸管ハ心藏ヲ以テ根
ヲ岐チ枝又小朶ヲ分チ小朶又細細ヲ布キ本末轉枝
シ巨細相稱ヒ一身百體表裏上下絲分縷折シテ其絡
セザル所ナク條達蔓延シテ被及セザル所ナク其血
由テ行テ全體諸末ニ至ルマデ周流遍滿シテ皆中ニ
ヲ授受シ常ニ運廻循行スルニ微細ノ端ナキ如シ或
其未抄相連ラザル者ハ甚細ノ諸部ノ腺或諸器
= 連リ皆赤血通セズシテ唯他ノ諸液ヲ出シ或咽氣
管動尿管胃腸等ノ液ヲ滲出スルカ如シ靜脈ノ末抄ハ
即諸部ノ管中ニ收管ノ如シ察スルニ其體皆極微細ヲ以
テ赤色ノ圓球ニ行テ相接續シテ運行スルニ從テ其珠
ヲ貫ク如シ其動脈支末ノ逐次ニ細別スルニ從テ其

血球モ再三漸次ニ分析シ其分析スルニ從テ其般赤
ナル色モ亦漸次ニ殺減シ終ニ清稀白色ノ諸液トナ
ルニ至ル乃是ヲ熟觀スルニ其初般赤ナル一球分レ
テ六個ノ者ニ黄色ノ球トナル一球分レテ六個ノ者ニ
テ六個ノ者ニ透亮水様ノ球トナル一球分レテ六個ノ者
ニ循行スル細血絡ノ一處或數處破綻圻裂スルカ或
其血絡ノ末抄血ノ透漏スル如ニ潤開スル片ハ輒チ
吐血ヲ發スルナリ漢醫ノ所說其肺ヨリ出ル症モ尚
血ト曰或吐血ト曰其因ヲ說モ素ヨリ實据ナシ只其
衆說ノ中偶爾ク僅ニ合スル所アルモ微スル所有テ
然ルニアラズ只是偶中○其血絡ノ末抄潤開シテ透
漏シ發スル症ハ效略スル所ノ痰中數條ノ血線紅縷
ヲ帶ルノ之夫ノ夥ク赤沫泡起セル血ヲ吐シテ較著

曾丁内科撰要 卷十

吐血ノ症ト稱スベキ者ト自ラ異ナリ○其細血絡ノ破綻圻裂シ發スル症ハ其溢出シテ肺管中ニ陥入スル血呼吸ノ氣ニ隨ヒ鼓索沸騰セラレテ泡沫トナリ終ニ喉頭ニ上湧シテ刺戟スル片ハ忍效嗽ヲ發シ其溢出シテ肺管中ニ蓄積スル所ノ血皆效ニ乘シテ漸次ニ聚來テ暫時ニ吐出スルナリ○斯ノ如ク肺管ノ細血絡ヲシテ破裂シテ吐血ヲ生セシムル所以ノ諸因甚ダ多シ。假令バ效嗽スルニ因リ疾言厲語スルニ因リカヲ極テ叫喚スルニ因リ歌曲ヲ高唱スルニ因リ或血液ノ運行ヲシテ太過強盛ナニシムル諸件。

即大ニ身體ヲ勞動シ或慄悍銳烈ノ酒醬ヲ過飲シ或諸般ノ熱病或大氣ノ極テ輕薄ナル等ニ因ル是皆血液ヲシテ沸騰擾動シテ太過ノ運行ヲ發セシムル者ナリ土地ノ高下氣候ノ變更ニ因テ大氣ノ輕重不同ナリ凡大氣ニ水氣ヲ含テ多ケレバ重ク少ケレバ輕シ此水氣ハ即烟硝質ノ氣ニシテ能萬物ヲ壓搾ス人モ亦此氣ニ由テ此氣ヲ肺ニ吸入シ夫ヨリ血中ニ入テ常ニ血ヲ壓搾推盪ノ能流動健運セシム即氣ハ血ノ母タリト云者是ナリ故ニ氣中ニ水氣ヲ含テ甚ダ多ケレバ大氣輕揚飛竄シテ萬物ヲ壓搾収固スル微シ是ニ因テ血液モ亦大ニ沸騰泡起ノ細血絡破裂スルナリ其說蒲蘭○凡右ノ諸因アル片ハ必ズ加兒都解剖書ニ詳載ス○凡右ノ諸因アル片ハ必ズ吐血ニ罹ルベキ人アリ○凡右ノ諸因アル片ハ必ズ小ナル者即偃僕ノ人ノ如シ或胸狹小ニシテ扁平ナ

ル者或喉頭ノ通竅。窄小ニシテ氣ノ出入寛裕ナラザ
 ル者。喻ルニ聲。婦人ノ如ク。說話歌唱清高。纖急ナル等
 ナリ。或、父母吐血ノ病アリテ其子成長シ血液充盛シ
 テ運行強盛ナル頃ニ至レバ亦此患ニ嬰ルコトアリ。或、
 以前既ニ吐血ヲ患ル者ハ動輒再發シ易ク。較著ノ病
 因ナクシテ亦此症ヲ發スルコトアリ。故ニ斯ノ如キ類
 ノ人ハ其他ノ體稟強健壯實ナル者ニ在テハ吐血ニ
 罹ルコトナキ。諸因ト雖モ特ニ自ラ省察シ豫メ能ク戒
 慎シテ是ヲ避クベキナリ

上章ノ餘義ヲ申明ス

吐血ノ症。其初ハ人は是ヲ忽ニシテ戒慎スルコト必シ。何
 トナレバ衄血或、金刃創ノ如キハ出血ノ多キコト是ヲ
 吐血ニ比スレバ十倍ナレ。且更ニ惡症ヲ發スルコト無
 ク。又一ハ吐血ニ罹ル人。其初ハ起居情態。平素ニ異ナ
 ルコト無ク。疼痛ナク。發熱モナキ。故ニ恬然トシテ意ヲ錯
 ガレバナリ。然レテ數、吐血ヲ發スルニ至テハ漸、勞瘵ニ
 陷リ少年ニシテ夭札ヲ致ス者多キヲ見テ始テ是ヲ畏
 者亦是アルナリ。○然レテ斯ニ一大蹇難ノ事アリ。其故
 ハ人。此症ニ罹レバ醫必直ニ課戒ヲ設テ飲酒ヲ禁シ。
 夜中ノ勤業ヲ戒メ。強テ寢ニ就シメ且、味ノ厭惡ベク

シテ口ニ可ナラザル藥劑ヲ與ルナリ。斯ノ如キ禁戒
 若^モ其痛患スル所アリテ自ラ疾苦ニ堪ザル際ニ是ヲ
 持セシメバ儘能^マ厭惡^ヒベキ事無ルベシト雖モ上ニ説
 如ク此病ノ初ハ患者自ラ覺ル^{コトナ}平常ニ異^{コトナ}ラズ。日常
 情ヲ暢^クベ悶^クヲ遣^ヤリ歡^クヲ取^テ日ヲ消^クルニ職^{モト}トシ由^ル所
 ノ飲酒舞蹈歌曲ヲ唱ヘ。擊劔ヲ講シ。秉燭ノ遊。間燕ノ
 樂。今俄ニ是ヲ抑制スルカ故ニ是ヲ以テ其^ノ寒難ナ
 リ○此病大凡衆人ニ在テハ深ク省察セズ。且右件ノ
 禁戒素勉強スル所ナレバ是ヲ守持スルカ如キモ情
 實ヨリシテ禁絶スル^{コト}能ハズ。荏苒トシテ時月ヲ消^ク

リ遂ニ漸^ク膿ヲ吐シ。肢體羸瘦シ。食後發熱シ。且數吐血
 ヲ發スルニ至ルナリ。斯ノ如キ輕率ニモ思慮ナキ患
 者ハ病爾^カク危險ニ至レ^ルモ猶多時ナラズノ回復セン
 コトヲ希望ス。嗚呼是既ニ遲^ク了^キノミ。何^トナレバ吐血以
 後膿ヲ吐スル者。少年輩ニ於テハ治スル^{コト}稀ナリ。即^チ
 依^イト^ホ加^カ刺^ラ得^テ斯^ノ醫術編第三百四十條ニ明説スルカ
 如シ○予此症ニ於テハ皆其然ル所以ヲ辨晰セン^{コト}
 ヲ要シ且治療ニ就テ大ニ發明スル所アルガ爲ニ茲
 ニ其要領ヲ撮シ簡易ニ其義ヲ釋メ左ニ記ス○夫^カ垢
 裂セル一二ノ血絡ヨリ滴々ト夕流滴シタル血皆恒

ニ其洞開セル肺管ニ陥入ノ肺中ノ衆小囊ニ入充ル
 ナリ。然レ其ハ肺中ノ小囊常ニ虚ニシテ大氣ヲ包容ス
 ベキ者。今血是ニ代テ充實シ。其血始ハ唯其處ニ滯止
 シテ凝固スルノミナレ。凡久ヲ經テ漸腐壞スルニ從
 ヒ酷厲ノ性トナリ。是ヲ以テ逾侵蝕腐壞ノ遂ニ其處
 ニ膿瘍ヲ作ニ至ル。然レ時々復其圻裂セル血絡ヨリ
 血ノ溢出スルヲ絶ズノ彌益肺管中ニ充盈スルガ故
 ニ其血必肺管ノ諸支別ニ濫流シ入ザルヲ得ズ。且
 其支別中ニハ尚氣ノ充盈スルガ故ニ其血是ニ鼓索セ
 ラレテ即其泡沫ヲ成ナリ。○然レ其前ニ陥入セル所

ノ血。既腐壞シ且酷厲トナリテ肺ヲ刺戟シ誘シテ咳
 嗽ヲ起發スルガ故ニ唯其後ニ陥入シタル泡沫ノ血
 ノミヲ吐出シ。其前ニ充塞セル者ハ居然トノ恒ニ肺
 囊中ニ底著シ。逾酷厲ノ性ヲ逞メ終ニ全肺瘍ヲ成。是
 ヲリ不治ノ勞瘵ト爲ニ至ル。○既斯如クナルニ至テ
 ハ夫危暴ニノ戒慎セザル患者モ其災ノ生命ニ及ブ
 一ヲ醒悟シ。此病ノ大ニ危殆ニシテ遂ニ救フベカラ
 ガル一ヲ顧慮スルニ至ルナリ

吐血ノ治法ヲ論ス

若吐血ニ於テ或悉其溢出ノ血ヲ除去一ヲ得胃ヨリ
出ル

血ノ如或外ヨリ壓定ノ血絡ノ破裂ヲ封合スルヲ
 キヲ云或止血ノ劑ヲ敷貼スルヲ得_レ口_中斷頸
 得_ル如_キ血ノ或止血ノ劑ヲ敷貼スルヲ得_レ等_ノ出血ノ
 如_キ他ノ出血ノ如ナル片ハ是ヲ治スルモ亦甚難シト
 ヲ云○或血液ヲノ凝固セシムル藥_{性甚收瀰ノ血ヲ}
 凝固セシメテ出
 血ヲ止ルヲ與テ吐血ヲ止ト欲スルモ亦衆人ノ思へ
 ル如クニ容易ク治ザルナリ何トナレバ其藥力ヲ以
 テ血ヲノ破裂セル血絡ヨリ流泄スベカラザルホド
 ニ稠固凝結セシムレバ其血モ亦肺中ノ動脈支末ヨ
 リ其靜脈ニ運輸スル_レ能ハズノ血ノ循環是ガ爲ニ
 絶止シ其人少選_ニモ生活スル_レ能ハザレバナリ○故

予其治法他ナシ唯力所及_{ナリ}血ノ肺藏ニ輻輳スル勢ヲ
 殺_サ減シ是ニ因テ其破裂セル血絡ヲ自_レ收縮ノ復_ス血
 ノ溢出セザル_如ニ狭窄ナラシムルナリ○是ニ由テ
 先_ッ患者ヲノ前ニ歷舉スル所ノ吐血ノ諸因ヲ犯_スナ
 ク禁止セシメ刺絡ヲ施シ其血ヲ減_メ諸血脉ニ充張
 スル_レ無ラシムベシ凡_ッ一身ニ環廻スル諸血ハ皆必
 肺藏ヲ通行セザル者ナキガ故ニ先_ッ刺絡ノ瀉血スル
 ニ非レバ其肺ニ輻輳スル血モ亦減シ除_レ能_ハザレバ
 ナリ○刺絡ハ一月或_ハ兩月ニ一回宛_ッ施スベシ少年輩
 及_ハ夏月ニ於テハ殊ニ利益アリ是其血ノ漸_レ滋益充盈

增言内科撰要

卷十

風雲堂藏

シテ復吐血スルヲ制止スルガ爲ナリ○其間ニ宜ク
 血ノ運行ヲ緩慢ニシ諸血脉ノ收縮ヲ扶ケ且能肺ノ
 諸脉ニ届リ達スベキ清涼ニメ收斂スル劑ヲ用ベシ。
 諸土質ノ藥品 石脂代赭石ノ類總テ土質ニ
 屬シテ收瀰ノ性アル品ヲ云 ヲ調製セ
 ル諸方ハ是ヲ内服シテ乳糜脉ニ通行スルヲ能ハザ
 ルヲ以テ効ヲ奏スルヲ歎シ。是ニ因テ左ニ記ス飲劑
 甚ダ良効アリ 土質ノ品ハ乳糜脉ニ通スルヲ能ハザル
 故ニ肺ノ諸脉ニモ届リ達セザルヲ云
 方

舍麥玫瑰湯 精大麥 各一匁
 舍護字點護根 水 二十匁
 玫瑰花 一握

右件合ノ罐ニ入。封閉シ煮テ漉過シ滓ヲ去リ。可
 碗ヲ以テ一碗宛用。日數次温服シ或冷飲セシム
 可割ハ木實ノ名。西人常ニ微炒細末ニシ湯ニ煎シ
 常服スルヲ猶本邦ノ茶湯ヲ喫スルカ如シ。可割
 枕ハ可喜ヲ服スル飲器ニシ
 テ尋常通用ノ茶碗ノ如シ
 若咽喉中癢起シテ効ヲ發シ。胸中温熱シ。口中苦味ヲ
 覺ル。アラバ吐血セズト雖モ速ニ再刺絡シ復前說
 ノ藥劑ヲ用ル。宛モ既ニ吐血アル者ノ如クスベシ。
 右ノ諸症ハ無幾吐血ヲ發スル前兆ナレバナリ○若
 數回吐血ヲ發シ。又膿ノ微ヲ見ル。アラバ則肺中膿
 瘍アリト知ルベシ○肺中膿瘍アル者モ前ニ說如キ

吐血ノ將ニ發セントスル症候ナキヤト豫メ鑒察ス
 ベシ。此時モ亦能ク吐血ヲ發スレバナリ。○既ニ肺ノ膿
 瘍トナルニ及テハ刺絡ハ利益ナシト雖モ若シ吐血ノ
 將ニ發セントスル後アラバ豫メ是ヲ禦クガ爲ニ刺
 絡ヲ施スベシ。若シ吐血スル片ハ是ヨリ彌大ナル惡症
 ヲ發スレバナリ。此症ハ第二十七章。膿壞液ヲ治スル
 藥ヲ用ベシ。○凡、膿ハ水ヨリ重ク痰ハ水ヨリ輕キガ
 故ニ是ヲ水中ニ略片ハ膿ハ沈ミ痰ハ浮ムヲ以テ其
 膿ノ有無自ラ辨スベシ。效救篇第百七十五章ト參考スベシ

増補重訂内科撰要卷十終

The left page is a blank, aged, light brown paper cover or endpaper, showing signs of wear, including creases and discoloration. It is bound on the left side with a dark, textured material, possibly leather or cloth, which is visible at the top and bottom edges.

The right page is a single sheet of aged, yellowish paper with a faint rectangular border. It contains several columns of extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 10 vertical columns. There are some small stains and a dark mark at the top center of the page.

