



增補  
重訂

内科撰要

卷十二

洋学文庫  
文庫 8  
C 27  
12



增補重訂内科撰要卷十二

遠州 玉曲麻痺 我德兒 著

澤山 宇田川 玄隨 著

加賀 藤井 方平 後 校注

增補

慈心院 喉着 第三十一 和蘭名 抄 一 卷 乙

慈心院 大教 抄 乙

平倉 石人 抄 乙 天 下 醫 術 秘 傳 十 卷 堀 田 氏 藏 本

二 山 藏 本 抄 乙 堀 田 氏 藏 本 一 卷 堀 田 氏 藏 本 一 卷 堀 田 氏 藏 本 一 卷

增補重訂内科撰要卷十二

遠西 玉函涅斯垓我爾德兒 著

津山 宇田川 玄隨 晉 譯

加賀 藤井 方亭 俊 校註

惡心乾嘔篇第三十一 羅甸名「ナウセア」和蘭名「ワルギン」

第百一十章

平全ノ人ハ胃ニ於テ居恒間斷ナク蝟蝟トシテ蠕動スル機轉アリ  
蠕動機轉ハ胃ニ於テ常ニ蟲ノ這ハク蠕動伸縮スル運動アルナリ其說醫範

第百一十章



提綱腸ノ條 是ヲ以テ飲食ヲ消磨化熟シ。且推盪轉輸  
 = 詳ナリ 是ヲ以テ飲食ヲ消磨化熟シ。且推盪轉輸  
 ス。是胃管ニ始リ漸ク以テ逐次ニ下行シ。胃ノ下口。腸  
 ノ初ニ至ル。然レ其蠕動スルノ人自ラ是ヲ知覺スル  
 一ナク又意ヲ以テ是ヲ遲速進退セシムルヲ能ハズ  
 ○然レ其蠕動機轉常ニ反シテ下ヨリ上ニ逆行スル  
 片ハ其人忽厭ヒ惡ムベキ意思感觸ヲ覺ルナリ。是ヲ  
 惡心ト謂フ○惡心ニ因テ一切食ヲ欲スル意ヲ失フ  
 症。是ヲ發斯ハス蟄ナ需ダ謨ムテ惡心スル症ナリ。一切食ヲ嫌ヒ食ヲ見  
 スワルト名ク或胃中ニ在ル所ノ物ヲ吐シ除ント欲  
 シテ惡心スルアリ。或然ラズシテ是ヲ發スルアリ。

惡心

惡心ノ病因ヲ論ス。胃ニ於テ常ニ反スル逆行ノ蠕動ヲ起ス。其因多シ。  
 内因ヨリ來ル者ハ殊ニ明ニ察シ難シ。然レ其猶宜ク其  
 因ヲ尋索シテ治法ヲ施シ勉テ的實ナランヲ要ス  
 ベシ○此症動輒効驗ナキ無益ノ藥ヲ投シ或彼ニハ  
 端的ニ効ヲ奏スル方劑モ此ニハ曾テ寸効ナキアリ。  
 然レハ尋常通用ノ治法及一定ノ藥劑ト稱シテ概シ  
 テ斯ニ歷示スルヲ能ハズ○予斯ニ稱擧スベキ一二  
 ノ原由ヲ援引シ。此ニ據テ治法ヲ研習シテ其他ノ較  
 著ノ諸症ヲ療スル基趾タラシム。

惡心。飲食ニ因ルノ症治ヲ論ス。

凡、飲食スル所ノ者。身體ニ害アルカ。或、其分量過多ニシテ是ヲ受容消化スルニ耐ザレバ、ク輒チ惡心ヲ發スルナリ。○是ニ於テ天爲ノ妙用。造物ノ機巧。懇到周悉至ラザル所ナキヲ見ル。何トナレバ身體ノ諸器。死廢スルニ至テハ復タ其天造自然ノ運動ニ從テ右ノ如ク其身體ニ不利ナル害ヲ誘導シ除クヲ能ハズ唯生活セル身體ノミ千緒萬端盡ク其良能當然ノ常道ニ順テ毫モ廢弛スルヲ無レバナリ。○是ニ據テ察スレバ諸毒ヲ服シ或、吐藥及、下劑ヲ多ク用テ惡心ヲ發ス

ルハ皆右ノ理ヨリ來ルヲ明ナリ。又飲食ハ人ノ必ズ須テ生存スル所ニシテ闕ベカラザル者タリ。然ルニ是ヲ過用スレバ亦必ズ惡心ヲ發スルヲ以テ見ツベキノミ。○右ノ諸因ハ皆外ヨリ來ル故ニ自ラ知リ易シ。其治法自ラ吐スルヲ能ハザル片ハ是ヲ吐セシメ出除クベシ。飲食ノ過多ナルヨリ發スル者ハ咽中ヲ探テ吐セシムレバ即治ス。然レ中毒或、腐敗セル物ヲ服シテ惡心ヲ發シ。是ヲ吐シ除ンガ爲ニ緩和ノ飲液及、脂油ノ類ヲ與フト雖モ意ノ如ク吐出セザル者ハ第十五章ニ舉ル吐劑ヲ用ヒ且、多ク液汁ヲ飲シメ是

三章

ヲ扶テ吐シ易カラシムベシ  
 惡心。身體ノ運動ニ因ルノ症治ヲ論ス  
 未ダ嘗テ航海ニ習ハサル人。開帆シテ風浪ノ飄搖ヲ  
 被<sup>カ</sup>レバ必ず舩暈ヲ發シテ惡心乾嘔ヲ患ヒ若<sup>モ</sup>ハ吐ス  
 ルニ至ル。或、頻ニ身體ヲ旋廻運轉シ若クハ遽ニ擾動  
 シ或、車ニ乘リ其蕩搖ニ耐スシテ亦此症ヲ發スル者  
 アリ。然レバ元來胃ノ運動ハ甚ダ感觸ニ敏ニシテ些少  
 ノ因アリト雖モ非常ノ運動ヲ作シテ惡心ヲ生スル  
 一以テ知ルベキノミ○此症ハ吐シ除クベキ物有テ  
 發スルニ非レバ唯是ヲ發スル諸因ヲ避レバ自ラ治

三章

スルナリ○既ニ其諸因ヲ避クト雖モ其胃ノ非常ノ  
 運動仍<sup>ホ</sup>鎮定セズ。餘勢ノ攪擾スル所。速ニ休<sup>ヤ</sup>サル者ハ  
 先<sup>レ</sup>列<sup>レ</sup>印<sup>セ</sup>設酒少許ヲ取り。水ヲ加<sup>テ</sup>緩和シ。又別ニ枸櫞  
 汁ニ阿芙蓉液<sup>一</sup>一二滴或、白罌粟舍利別少許ヲ加ヘ  
 此液少許ヲ取テ右ノ列<sup>レ</sup>印<sup>セ</sup>設酒ニ調和シ稍々ニ與<sup>フ</sup>ベ  
 シ。一<sup>イ</sup>頻ニ多ク用レバ胃ヲ觸動スル一アレバナリ  
 惡心。意思ノ感觸ニ因ルノ症治ヲ論ス  
 前章論スル如キ身體ノ非常ノ運動ヲ爲スニ因テ胃  
 ノ運動ヲ攪擾シテ惡心ヲ發スルノミナラズ凡<sup>ソ</sup>物ノ  
 旋轉運回スルヲ見。或、元ヨリ嫌<sup>ヒ</sup>惡ム飲食若<sup>モ</sup>ハ嘗テ

嘔吐シタル物ヲ見ルト雖モ亦能ク惡心ヲ發スル者アリ。然レバ胃ノ運動感觸ニ敏ニシテ些少ノ因ト雖モ其常ヲ失ヒ擾動スルヲ以テ知ルベキノミ。○此症ハ藥劑ヲ用ルヲ稀ナリ。然レモ若シ藥ヲ用テ治セント欲セバ前章説ク所ノ方ヲ用ベシ

惡心

胃中ノ腐敗毒ニ因ルノ症治ヲ論ス

第二百三章ニ論スル所ノ腐敗セル物ヲ飲食スレバ則チ惡心ヲ發スルガ如ク是レ外因ニ屬ス若シ體中各部ニ腐敗液有テ胃中ニ轉輸シ或、諸液胃中ニ於テ腐敗スル是レ内因ニ屬ス○其胃中ニ於テハ亦能ク惡心ヲ發スルナリ

腐敗ヲ爲ス液ハ即チ胃液。脾液。膽液ナリ。其體中諸部ヨリ胃中ニ轉輸スル者ハ即チ神經。動脈。門脈ヨリ腐敗液ヲ胃中ニ滲出スルナリ或、其滲出スル液。良性ナル者モ胃中ニ滯止鬱積スルモ亦腐敗ヲ致シ是ヲ以テ胃ニ非常ノ運動ヲ起シテ惡心ヲ生スルナリ。○右ノ諸因各、同ジカラザレバ常人ニ在テハ是ヲ知ルヲ能ハスト雖モ醫家ニ於テハ皆何レノ原由ヨリ發シ來ルト云フヲ思索スルモハ大抵是ヲ知ルニ足ルベキナリ。○若シ粘液。膽液或、其他ノ汚物ヲ吐スルニ由テ其症。輕快ヲ覺ユレモ其後復惡心シテ食ヲ欲セス胃

ノ部ニ當テ苦悶痞脹シ。嘔シテ多ク風氣ヲ泄シ或口  
 中苦クシテ腐穢ノ味ヲ覺ル等ノ症ヲ兼ルハ是胃中  
 ニ腐敗液アル候トス。治法先第十五章ニ舉ル吐劑ヲ  
 用テ其腐敗液ヲ吐シ除クヲ最捷徑ノ良法トス。其毒  
 既ニ去テ後ハ宜ク第二十章ノ健胃劑ヲ用ベシ。若シ  
 大便通利セザル者ハ下劑ヲ兼用ノ日常適宜ニ順利  
 セシムルヲ緊要トス。○若シ胸間焮熱シテ苦悶シ總  
 身熱ヲ兼ルハ酷厲ナル膽液鬱積シテ惡心ヲ發スト  
 知ルベシ。此症ハ殊ニ意ヲ用ヒ勉テ其膽液ヲ驅除ス  
 ベシ吐劑ヲ用。若シ速ニ驅除セズシテ長ク鬱蓄スル

片ハ其毒胃ヨリ腸ニ下流シ變シテ痛痢トナリ或其  
 毒血中ニ混淆スレバ輒壯熱和蘭名「ヘ」ヲ發シテ治シ  
 易カラザルナリ。詳ニ第二十五章ニ見タリ熱壞液即腐敗熱ナリ  
 ○或熱病ノ毒胃ニ轉輸シ自然ニ胃ヨリ是ヲ出シ  
 除クガ爲ニ惡心ヲ發スル者アリ此症ハ惡心シテ粘  
 液或腐敗ノ膽液ヲ吐ス。此嘔吐ハ淡薄ノ液ヲ多ク飲  
 シメ是ヲ助テ益吐セシメ胃中ノ敗液汚物ヲ滌除ス  
 ベシ。○右ノ如ク吐シテ後惡心尚休ザル者或特熱病  
 ノ攪擾ニ因テ惡心ヲ發スル者ハ宜ク左ノ方ヲ用テ  
 其失常ノ運動ヲ鎮定スベシ。



惡心ヲ治スル飲劑ノ方

大醒胃飲

精大麥

酸模根 各一匁

玫瑰花 半握

水 二十五匁

右件合シテ罐ニ入レ。密閉シ煮テ麥熟スルニ至リ。滓ヲ去テ次ノ藥ヲ和調ス

枸橼汁 一匁

列印設酒 二匁

白罌粟舍利別 一匁

右飲劑トシ。少許ヲ取テ服スル。一日ニ數次

胃中ノ粘液既ニ吐泄シ其熱勢ヨリハ衰弱ノ候多キ者ハ左ノ方ヲ用ベシ

惡心ヲ治スル小飲劑ノ方 **小醒胃飲**

枸橼汁 一匁

酒石鹽 一錢

右件合和スレバ自ラ沸騰ス。終ニ少シモ泡起セザル

ニ至テ次ノ藥ヲ和調ス

薄荷水 六匁

右飲劑トシ一匙宛服スル。一日ニ數次。○若シ薄荷水

第三章

無キ片ハ薄荷油一滴ヨリ三滴マデヲ取テ砂糖少許ニ研和シ大麥水六多ニ加テ代用スベシ

悪心ロリス羅斯及ロリス焮衝ニ因ルノ症治ヲ論ス

胃中ニ物有テ悪心ヲ發スルハ便吐藥ヲ用テ胃ヲ海

掃スルヲ最緊要トス。然レモ若シ胃及其近傍ノ部ニ焮衝

或ロリス羅斯焮衝ハ第六十七章ニ註ス。羅斯焮衝ハ第三百三十二

ニ註ス。生スルニ因テ悪心ヲ發スル者ニ吐劑ヲ與レ

ハ其症逾劇クシテ必ズ其死ヲ免レズ。何トナレバ胃

中少モ吐スベキ物ナク。吐劑ノ攪擾ニ因テ徒ニ吐ヲ

催シ竟ニ死ニ至ルマデ止ザレバナリ。○是故ニ悪心

ニ熱ヲ兼ル症ハ診察幽菴ニシテ妄ニ吐劑ヲ投スル

ト勿レ。何トナレバ悪心シテ煩悶苦惱極テ甚ク。胃ノ

部ニ當テ焮熱疼痛鼓動シ飲食ヲ嚥下スレバ大ニ痛

テ胃中宛モ焚カ如ク且暫留セル壯熱ヲ兼ルハ此胃

中或胃ノ傍邊ニ羅斯焮衝若クハ焮衝ヲ生スル候ナレバ

ナリ。此病ハ予カ著ス所ノ瘍科精選中。羅斯ト焮衝ト

ノ治法ニ從テ是ヲ療スベシ胃ノ焮衝羅斯ノ症治第

ニベ。○又其悪心ヲ鎮止センガ爲ニ前章載ル所ノ飲劑

ヲ用ヒ且琵琶布ヲ胃ノ部ニ外敷スベシ。其方玫瑰花ト

接骨木花ニ醋ヲ調和シ琵琶布ニ作ルナリニ味ニ醋ヲ和シ搗テ糊

ノ如クシ。胃ノ部ニ貼スルナリ

嘔吐篇第三十二 羅甸名「ホ」ニ云ハシ 和蘭名「ブ」ラキング

嘔吐ノ大較ヲ論ス

飲食。胃ニ下レバ胃ノ纖維ノ運動ヲ以テ是ヲ消磨シ  
漸次ニ推盪順下シテ腸ニ傳送ス。是平全ノ常機ナリ  
胃ノ纖維ノ運動ハ即、惡心篇第二章ノ蠕動機轉ナリ然レニ胃ノ纖維ノ運動。其  
常ニ反シテ下ヨリ上ヘ逆行スルハ胃中ニ在ル所  
ノ者ヲ以テ胃管ニ上湧驅逐スルヲ宛モ惡心ニ於ル  
カ如シ。是ニ從テ腹筋モ亦拘攣シテ其逆行ヲ扶ケ胃

嘔吐

嘔吐ノ病因ヲ論ス

中ニ在ル所ノ者ヲ胃管ニ托出シテ口ニ湧泄ス。是ヲ  
名ツケテ嘔吐ト曰フ。○若モ胃中ニ於テ吐出スベキ物  
ナキハ唯乾嘔ヲ發スルノニ。然レモ數頻ニ乾嘔シテ  
休ガルニ從ヒ遂ニ些少ノ膽液並ニ胃中ニ賦與セル  
天資固有ノ滑液ヲ併テ吐出スルニ至ルナリ。○若モ嘔  
吐スル時ニ當テ偶胃ノ上口閉塞シテ其物ヲ吐出ス  
ルヲ能ザレバ患者是ガ爲ニ大ニ煩悶ヲ發スルナリ  
嘔吐ト惡心ト其因。幾ント同ジ。唯其因。差大ナレバ嘔  
吐ヲ發スルノニ。故ニ此症ハ總テ惡心篇ニ講明セル

嘔吐

諸因ヲ參考シテ知ルベシ

嘔吐。胃ノ衰弱ニ因ルヲ論ス

胃ノ運動衰弱ナルヨリ嘔吐ヲ發スルヲ多シ。其故ハ是ニ因テ胃中ニ流灌スル諸液胃液、胆汁等並ニ受容セル飲食モ常度ノ如ク運化シテ轉輸セズ。新陳更代スルヲ得ズシテ胃中ニ鬱滯シ漸次ニ堆積類聚シ。胃其滯蓄ニ困ニ重積ニ任ヘズシテ自ラ嘔吐ヲ發シ或ハ吐セズシテ久ク鬱著停止スレバ變シテ粘液留飲モシクハ腐敗ノ汚物トナリ。是ニ於テ又惡心ヲ催シ次テ嘔吐ヲ發スルナリ。○右ノ如ク胃中ニ在所ノ者ヲ吐泄ス

嘔吐

ト雖モ其後復屢許多ノ粘液及腐敗液ヲ吐シテ歇ザルナリ。故ニ患者何ノ處ヨリ斯ノ如ク多ク其液ヲ將出シ來ルト云フヲ自ラ辨知スルヲナシ。然レ是胃ノ虚弱ニシテ運化セザルガ爲ニ諸液常ニ其中ニ停止鬱著シ逐次ニ自腐壞シテ數是ヲ吐出スルナリ

嘔吐ノ治法ヲ論ス

胃中ニ多ク吐スベキ物有テ嘔吐ヲ發スル症ハ先第十五章ノ吐劑ヲ用テ是ヲ吐除クヲ良法トス。○然レ既ニ吐シ了リタル者ニ於テハ復無益トス。宜ク第十六章ニ出ス下劑ヲ用テ下利セシメテ其腸中ニ轉移

セル汚物ヲ驅除スベシ○其後ハ患者ヲシテ過食縱  
 飲ヲ戒ル<sub>レ</sub>切要タリ。是<sub>レ</sub>胃ノ力ヲシテ罷倦勞弊セズ  
 ヨク其任ニ勝<sub>タ</sub>テ餘裕アラシムルガ爲<sub>ニ</sub>ナリ。故ニ亦厚  
 脂多油ノ食並ニ消化シ難キ物ヲ禁スベシ○右ノ如  
 ク調護スル間ニ第二十章ノ健胃劑ヲ用<sub>ヒ</sub>テ其連綿シ  
 テ休ザル嘔吐ヲ故ニ復スベシ○或<sub>ハ</sub>常ニ酒及<sub>ヒ</sub>慄悍酷  
 烈ノ飲料ヲ過服スルヨリ胃ノ衰弱ヲ致シ嘔吐ヲ發  
 スル者アリ。此症ハ胃虛冷シテ粘液留飲過多ナリ。是  
 ヲ故ニ復スル<sub>レ</sub>一大難支タリ。何<sub>ト</sub>ナレバ俄ニ其慄  
 悍ノ諸飲ヲ禁スレバ胃ノ運化愈<sub>ニ</sub>少減損シ飲食幾<sub>ホ</sub>

ント皆胃中ニ停滯シテ腐敗シ遂ニ變壞セル粘液ト  
 ナレバナリ。然<sub>レ</sub>バ胃ヲ强健ナラシメンガ爲<sub>ニ</sub>藥氣ノ  
 醇精ニシテ熱氣ヲ發動スル劑ヲ與<sub>レ</sub>バ胃ノ纖維ノ  
 力殆<sub>ト</sub>弊盡セル者ヲシテ益<sub>ク</sub>虧損シ或<sub>ハ</sub>其運動ヲシテ  
 全ク廢絶セシムルニ至レバナリ。此其一大難支タル  
 所以ナリ。故ニ此症ハ漸<sub>ク</sub>以テ稍々ニ其慄悍ノ諸飲  
 ヲ禁止シ。其間ニ第二十章ノ健胃劑ヲ用<sub>ヒ</sub>テ胃ノ力ヲ  
 强健ニシ諸液ノ鬱滯停止スル原由ヲ治スベキナリ。  
 其他嘔吐ノ諸症多シト雖モ皆惡心篇ニ論スル所ト  
 一般ナレバ治法モ亦惡心篇ニ就テ施スベシ

第三章

不食篇第三十三

羅旬名 アノレシ、和蘭名 アルローレンポトリスト

不食ノ大較ヲ論ス

夫人身ノ生存スル天造ノ機ヲ究メ尋ルニ凡身體自  
 然ノ運營ニ因テ凝體ノ諸器ハ日ニ費耗弊盡シ流體  
 ノ諸液ハ老廢變化シテ漸次ニ身體ヲ謝シ去ル凝體ハ諸  
 藏筋脉膜骨爪牙皮毛等ノ一切形質ノ凝固結成セル  
 諸物ヲ云流體ハ血靈液水液膽液津唾汗尿脂膏等總  
 テ流動ノ然<sub>レ</sub>凡其弊盡ト老廢トノ轍跡ヲ見ハス丁テ  
 諸液ヲ云然<sub>レ</sub>凡其弊盡ト老廢トノ轍跡ヲ見ハス丁テ  
 キ所以ノ者ハ其日用ノ飲食此ニ資養シ彼ニ更續シ  
 テ夫ノ凝流二體ノ弊盡老廢ノ後ヲ承ケ陳新相易リ。

出納相計リ以テ匱乏ヲ完補シ虚竭ヲ滋益スルノ一  
 日モ闕ナケレバナリ○斯ノ如キ一大緊要タル飲  
 食ヲ用ルガ爲ニ又造物者ノ周密ナル斯ニ一箇ノ知  
 覺ヲ與ヘテ飲食ヲ思欲セシム是ヲ饑ト云又食欲ト  
 謂フ是ヲ以テ體中飲食ノ資養匱乏虚竭スル片ハ忽  
 是ヲ知覺シ曲ニ其多寡遲速ヲ告訴シ過不及ノ失ナ  
 ク暗ニ其宜ニ適フテ供給更續スルヲ得セシム此  
 亦其一大緊要タル者ニ非ズヤ○然ニ若<sub>モ</sub>食スベキ時  
 節ヲ過テ飲食ヲ供セザレバ必ズ其資養ノ匱乏ヲ知  
 覺シ饑テ食ヲ思フベキニ尚其思欲ノ萌起セズ饑食

ノ知覺ヲ現ス<sup>ル</sup>ナキ者是ヲ名ケテ食ヲ思フノ機ヲ喪亡スル病ト云ナリ

不食ノ病因ヲ論ス

平全ノ人。食ヲ思フノ欲。自ラ萌起スル所以ノ原由ハ飲食。胃中ニ缺乏スルト。資養ノ遍體ニ消化シテ新ニ供給ヲ仰クトナリ。○然レ其飲食缺乏ノ知覺ト其知覺ヲ爲ス所ノ器ト。其ニ障碍ナク健全ナルニ非レバ亦其食欲ヲ萌起スルヲ能ハザルナリ。飲食缺乏ヲ知覺スル器ハ即胃ナリ。是ヲ知覺スル者ハ其神經ナリ。○其飲食缺乏ノ知覺及<sup>ハ</sup>饑ル機能ヲ妨害スル所ノ病因一ナラズ。今其較著ノ者ヲ左ニ

援引シ是ニ各自ノ治法ヲ辨説ス

不食。胃中ノ粘液ニ因ルノ症治ヲ論ス

凡人。饑ル時ニ方テハ飲食ノ資養既ニ百體ニ給シ終テ幾ト<sup>テ</sup>費耗消盡スルノミナラズ。胃モ亦空虚ニシテ膽ニ<sup>ニ</sup>膽液滿盈スト知ルベシ。消化スベキ食物ナキハ膽液ヲ膽ヨリ十二指腸ニ注ガス。故ニ滿盈ス。其義醫範提綱ニ見タリ。其故ハ肝ニ於テ常ニ膽液ヲ製造シ是ヲ輸ルト雖モ既ニ膽中ニ盈滿スルニ至テハ是ヲ納ルノ地ナキ故ニ肝ヨリ徑ニ十二指腸ニ流泄シ。旁ラ胃中ニ浸滲シテ滲透シ其饑テ食ヲ思フ知覺ヲ萌發セシムルナリ。○然レ若<sup>モ</sup>胃中ニ粘液過

多ナル片ハ膽液是肝ヨリ徑テ十二指腸ニ流泄並ニ  
 脾液ノ胃中ニ浸滲シテ抵リ觸ルヲ阻隔シテ透徹セ  
 シメズ。是ヲ以テ其饑テ食ヲ思フ知覺ヲ萌發セガラ  
 シム。故其症胃ノ部ニ當テ痞脹苦滿シ。飲食セズト雖  
 モ飽滿シテ食ヲ思ハズ。噯シテ風氣ヲ洩シ。身體惡寒  
 シテ倦重ヲ覺エ。多ク粘液ヲ吐スレバ患症稍輕快ヲ  
 致スナリ。○其治法。第十五章ノ吐劑ヲ用テ胃中ノ粘  
 液ヲ吐シ除クヲ切要トス。然レ是其從來鬱滯セル粘  
 液ヲ滌除スルノニテ又其新ニ生スルヲ防<sub>キ</sub>治スル  
 一能ハズ。故能其穢物ヲ吐シ除テ後ハ次ニ出<sub>ス</sub>所ノ

粘液ヲ稀釋スル健胃劑ヲ用テ是ヲ治スベシ

解凝健胃酒ノ方 解凝健胃酒

葛爾儒別涅實屈室草カールダイトベ子ヂクナ 葛爾儒別涅實屈室草

亞爾鮮葉アールセム 亞爾鮮葉 各二握

盧會

酒石鹽 各二錢

右件合シテ白葡萄酒三十弓ニ浸シ滓ヲ去リ其藥  
 酒ヲ取テ小茶碗コチヤワンニ一碗宛空心ニ服スル一日ニ  
 三次○若シ是ヲ用テ下利多キ者ハ方中ノ盧會ヲ  
 減スベシ○或次ニ出<sub>ス</sub>丁幾去爾二十滴。若クハ其

增訂內科撰要 卷十二 風雲堂藏



餘ヲ取り。葡萄酒或他ノ飲液ニ加用ベシ

解結健胃ノ丁幾去爾ノ方

健胃丁幾去爾

越栗失爾剥祿布利怛

四錢

酒石液 一錢

薄荷油 五滴

右件調勻シ。丁幾去爾ト爲ス

不食。膽液腐敗ニ因ルノ症治ヲ論ス

前章論スル如ク膽液。胃中ノ膜ニ浸淫シ觸ルヲ阻隔  
スル者アレバ不食ノ症ヲ發スルヲ固ヨリ論ナシ。然  
ニ必モ是ヲ阻隔スル者ナシト雖モ若シ膽液ノ性。渝

前章

變シテ其石鹼質ノ性カヲ失フキハ必ズ不食ノ症ヲ

發スルナリ。何トナレバ膽液ノ石鹼質ノ性功

是膽液ノ能ク

疑結ヲ疏解スル性カナリ。ヲ失フガ故ニ胃中ニ觸

ルト雖モ夫ノ平常胃中ニ賦與セル天造ノ粘滑液ヲ

稀解スルヲ能ハズ。是ヲ以テ前章ノ粘液。胃中ニ過多

ナル因ト途ヲ殊ニシテ歸ヲ同フシ。共ニ不食ノ症ヲ

發スルナリ。其治法亦前章ト

一般ナルヲ云

然レモ若シ膽液腐敗スル

片ハ其候。胃ノ部ニ當テ焚カ如ク焮熱シ。噯氣シテ辛

熱悍苦ノ液或臭穢ノ汁ヲ嘔逆シ。又食ヲ見テ惡心ヲ

發シ且食スルヲ能ハズ。此症惡心篇第二章ニ載

ル所ノ發斯蟄需謨ノ症ナリ

論

此症ハ酸味ノ藥劑。假令バ拘椽汁ニ水ヲ和スル等ヲ用テ其食機ヲシテ進起セシムベシ○但其腐敗セル膽液甚ダ過多ナルヲ察セハ甘乳清（圖）ニ純精酒石（圖）ヲ和シ用テ其膽液ヲ稀釋渙解シ大便ヨリ瀉下シ除クベシ○或膽液甚ダ稀涼ニシテ酷厲ナルヲ診シ得ルニ因テ初發ニ吐劑或下劑ノ的當ナラザルヲ知ル片ハ惡心篇第二百六章ニ舉ル飲劑中ノ白礬粟舍利別ヲ去テ是ヲ用ベシ膽液甚ダ稀涼ニシテ酷厲ナル片ハ患者自ラ膽液質ノ稀液ヲ下利シ或吐ス即霍亂吐瀉ノ病因ト同シ故ニ吐下ノ劑的當ナラザルナリ

不食腐敗ノ諸液胃ニ轉移スルニ因ルノ症治ヲ

論

凡、病毒動輒胃中ニ浸淫轉移シ來テ食ヲ思フノ機ヲ妨奪スルヲアリ。其中ニ就テ尤甚キハ腐敗ヨリ來ル諸病ト。腐敗液ヲ生スル諸病ナリ。假令バ腐敗熱（第二章）癆瘵（第二十六章）内部ノ膿瘍ノ如シ。若右ノ如キ腐敗毒ヲ胃中ニ受ル片ハ忽食ヲ思フノ機ヲ失フヲ數アル所ナリ○此病ニ臨テハ徒ニ其不食ノミヲ治セントスレバ許多ノ功ヲ費スト雖モ勞シテ驗ナク全然トシテ應セザル者ナリ。是其原彼ニ在テ此ニ在ザルガ故ニ必ズ其原ノ在ル所ニ就テ其本ヲ治スレ

第二章

ハ其標症ノ不食ハ治ヲ俟ズシテ自ラ愈ベク。或尋常健胃ノ劑ヲ與フト雖モ亦能ク治スベキナリ

善饑異嗜篇第三十四

羅甸名「アッペチ」トスアリヌス。和蘭名「アルケル」トス。

附牛饑。狗饑。惡阻。處女饑。處女病。

善饑異嗜ノ大較ヲ論ス

夫食欲ハ一種ノ感觸知覺ニシテ其理猶眼ノ光彩ニ應シテ觀察シ。耳ノ聲音ニ隨テ采聽スルガ如シ。飲食ノ缺乏ヲ胃中ニ知覺シテ饑ヲ發スル。前篇ニ説ク如クナレバ。其ノ光彩聲音ノ眼耳ニ觸テ視聽ヲ爲ス。ト其理同一般ニシテ皆各其器ニ然ル。若其感觸知覺感觸ノ識領スルニ非ルハナシ。

ヲ主ル器ニ於テ異常ノ起因アリテ感觸スル。片ハ亦能常ニ反スル詭異ナル嗜好ヲ生スルナリ。此猶其他ノ感觸知覺ヲ主ル器眼耳鼻等ニ於テモ亦コレアルガ如シ。頭痛篇第一百五十七章ニ云。熱毒頭中ニ升輸シ且。如シ滯住スル。片ハ其熱増劇スル。片ニ至テ更ニ頭痛ヲ發シ。頭部及顛顛ノ動脈跳動シ。耳ニ蟬鳴ヲ聞キ。面ヲ赤フ。頭盈脹シ。患者自頻ニ小蛇ノ如キ赤條及火光ノ飛逆シテ眼中ヨリ閃發スルガ如キヲ見ル。アリト云。類又頭眩胃篇第一百二十章ニ云。患者ノ視所ノ物象。毫モ旋轉スル。アアルニ非ズ。又外ヨリ其眼目ヲ觸動スル。アアルニ非ズ。自其視ル所ノ物皆異狀ニ旋轉スルガ如ク覺ル。症ト云。非類ノ香臭ヲ覺ル。アアルノ類ヲ觸ル者。ナクシテ自非常ノ香臭ヲ覺ル。アアルノ類ヲ○或食ヲ缺。了無ク且胃中充滿スト雖モ尚饑ヲ發シ。食ヲ欲シテ歇ザル症アリ。此亦食欲ノ常ニ反ス

ル一種ニノ是ヲ牛饑ト名ク○或饑テ食スレバ即吐  
 シ。吐シ訖レバ復忽饑ユ。隨テ吐シ隨テ饑ル症是ヲ狗  
 饑ト名ク○但右ニ説ク如キ説異ナル知覺ヲ胃中ニ  
 發シ。異常ノ食品ヲ喫センコトヲ好ミ。又食品ニ非ル物  
 ヲ嗜ミ食フ症。是孕婦ニ在テハ懷孕ノ一症トシ漢醫所謂  
 阻惡又顔面黧澹。肌膚色澤ヲ失フ處女ニ在テハ是ヲ處  
 女饑ト曰フ後ノ第二百二十章ニ論ス

善饑異嗜ノ病因ヲ論ス

善饑異嗜ノ症タル食欲甚詭異ニノ名狀スベカラス  
 然レ其盡ク是ヲ列舉ノ查考センヨリハ其異嗜ヲ發ス

善饑

ル所以ノ原由ヲ蹤跡シテ徑ニ其治ヲ處置スルニ若  
 ス。是治療ノ一大專務タリ○其發スル所ノ症狀多端  
 ナレ其大抵是ヲ要スルニ其饑ヲ發スル所ノ器胃ニ  
 異常ノ感觸アリテ異常ノ食欲ヲ發シ。啻ニ非常ノ食  
 物ノミナラズ食品ニ非ル物ト雖モ自ラ其意ニ適シ  
 テ嗜好スルニ至ルコト以テ察スベキノミ

善饑異嗜。胃中ノ酸敗毒ニ因ルノ症治ヲ論ス

小兒ニ於テ大ニ饑テ食ヲ欲シ。食シ訖レバ復頻ニ饑  
 テ飽シムベカラザル症多シ。是多食スト雖モ身體肥  
 盈長育セスノ却テ羸瘦シ或數心腹痛ヲ患ヒ。大便消

化セズ。酸臭アリテ多ク通利ス。○若<sup>モ</sup>嘔吐スレバ其吐  
 スル物亦酸臭アリ。乳養ノ兒ハ其吐スル所ノ乳モ亦  
 酸臭有<sup>リ</sup>テ凝結ス。○右ノ諸候アル者ハ皆酸敗液夥ク  
 鬱蓄ノ胃中ヲ侵刺衝動シ是ヲ以テ其異嗜及<sup>ヒ</sup>大ニ饑  
 テ食ヲ欲スル症ヲ發スト知ルベシ。○凡<sup>レ</sup>食物ノ類温  
 煖ノ處ニ蓄レバ酸敗スル者多シ故ニ酸敗液アル小  
 兒ト雖モ右ノ如キ食物ヲシテ悉ク禁絶セシムル  
 能ハズ。凡<sup>レ</sup>穀類蔬菜ノ食物ヲ温煖ノ處ニ貯フレバ大抵酸敗ス 設使是ヲ禁スル  
 一ヲ得テ唯肉類ニテ製造セル者ノ之與<sup>ト</sup>雖モ仍<sup>モ</sup>未<sup>ダ</sup>  
 其宜ヲ得タリトセズ。凡<sup>レ</sup>肉類腐敗スレバ味辛辣酷烈ニシテ酸敗スル者ナシ 何

トナレバ凡<sup>レ</sup>酸敗液ヲ生スルハ胃ト腸トノ官能衰弱  
 スルニ因リ。又飲食ヲ消化シ乳糜ヲ製造スルニ必ズ  
 需<sup>マ</sup>所ノ諸液。胃液腸液膽液脾液ヲ云 其性カヲ失テ無賴不利ノ物  
 トナルニ因ルガ故ニ。胃ト腸トノ官能ヲ强健ニシ其  
 諸液ヲ故ニ復シテ乃<sup>チ</sup>其宜ヲ得タリトスレバナリ。○  
 斯ノ如ク胃腸ノ官能衰弱シ其諸液ノ性カヲ失フガ  
 故ニ縱<sup>ト</sup>ヒ他ノ食物ヲ與<sup>ト</sup>雖モ亦他ノ種類ノ腐敗液  
 ヲ生スベシ。故ニ唯其從來ノ食物ヲ與ルヲ宜シトス  
 ○治療ノ法。其腹ヲ切按スルニ硬滿膨脹スル者ハ是  
 酸敗ノ汚物夥ク腹中ニ滯積スル一ヲ察シテ第十六

章ニ出ス所ノ常用ノ下劑ヲ以テ是ヲ驅除スベシ。但  
 小兒ハ其服量法ノ如ク用ルニ堪ザル故ニ半時若シハ  
 一時ニ一匙宛與ヘ。大便通利スルヲ度トスベシ。是尤  
 切實ニメ危懼ナシトス。○是ニ次テ胃及腸ヲ強壯ニ  
 シ酸敗液ヲ尅制シ且大便ヲメ常ニ壅滯ナク通利セ  
 シムル藥ヲ用ベシ

方

制酸健胃飲

越栗失爾剝祿布利怛 二錢

酒石鹽 一錢

沒藥

良薑 各二片  
 一種小ナル者

薄荷水 四勺

右件調勻シ一匙宛與ル一日四五次○若大便適意  
 ニ通利セザル片ハ是ニ大黃舍利別ヲ加ベシ○  
 若下利過多ナル片ハ方中ノ越栗失爾ヲ減ベシ○  
 若小兒散劑ニテ服シ易キアラバ左方ヲ用ベシ

制酸健胃散

沒藥 一錢

蘇甘沒扭護 半片

酒石鹽 半錢

鹿角灰

良薑 各一錢  
一種小ナル者

薄荷油 三滴

右件合シテ散劑トシ。每服兌イ杓ト百四十四章ニ註スニ鈔クテ落ザルヲ取り服スル。日三四次。○年長セル者ハ服量ヲ增加フベシ。

善饑異嗜。自性ノ壞液ニ因ルノ症治ヲ論ス

少年ノ處女。月經未調順ナラザル時ニ於テ顔面總身。黯澹灰白ナル症ヲ發スル。多シ。是ヲ處女病ト謂フ。和蘭名「ブレイ」此病動輒善饑異嗜ヲ兼發ノ砂礫スッ切灰。

第三章

白堊等ノ食品ニ非ル物ヲ喫スルコトアリ。此患者ハ月

經適宜ニ通利セザルヲ以テ萎黃病第十七章ニ出トナリ。次

テ漸ホドヨク增長ノ遂ニ自性ノ壞液病第二十一章ニ出トナリ。其壞

液。胃中ニ將マシ來レバ其饑ヲ發スル所ノ器胃ニ詭異非

常ノ感觸ヲ生スルガ故ニ患者甚イカ麼ナル品類ヲ嗜好

スベキト云フ。得テ名狀記載スベカラズ。○其症狀多

端ニノ記載スベカラズト雖モ其病原ハ一ナルガ故

ニ徒症ニ從ヒ標ヲ認テ治法ヲ擬議スルハ益ナシト

ス。右ノ如キ患婦ハ皆第二十章ノ萎黃病ヲ療スル健

胃劑ヲ用レバ諸般ノ善饑異嗜。其種類ヲ分々ズシテ

增訂内科摘要 卷十三 第二十章

治スルナリ。○此症酸敗液ノ過多ナル徵ヲ診シ得バ  
前章ノ藥劑ヲ用ベシ。○其後ハ對症適宜ノ藥劑ヲ用  
テ月經ヲノ常ニ能ク調順セシムルヲ緊要トス。經閉ノ症  
治第三百三十五章ニ出

第三百三十五章

善饑異嗜。胃ノ感觸ニ因ルノ症治ヲ論ス  
妊娠ノ婦人。其胎漸長スル時ニ方テ種々ノ異嗜ヲ發  
スル者ハ自餘ノ患者ニ發スル異嗜ト全異ナリ。是レ孕  
婦ハ壯健ナリト雖モ異味異物ヲ嗜シ或、飲食ヲ阻妨  
シテ惡心嘔吐ヲ發スルト皆其定候トスレバナリ。然  
ル所以ハ既ニ胎ヲ受ルニ及テハ子宮漸ク盈脹シテ

是レニ一種ノ運動ヲ生スルガ故ニ胃是レニ感觸ノ此症  
ヲ發スルト。第二百四章ニ論スル身體非常ノ運動並  
第二百五章ニ舉ル意思ノ運動ヲ胃ニ感觸ノ共ニ惡  
心ヲ發スル者ト同一般ナリト知ベシ。○故斯ノ如キ  
異嗜ハ皆第二百四章ニ論スル如ク治スルヲ宜トス

曹雜篇第三十五 羅甸名ソイダ  
和蘭名ソイデ

曹雜ノ大較ヲ論ス

曹雜ニ二般アリ。其一ハ大抵橫膈及胃ノ上口ノ部ニ  
當テ熱シテ火ノ如ク。稍惡心ヲ兼テ噫氣ヲ發セント

第三百三十五章



ス。其一ハ噫氣ヲ發シテ味ノ悍苦辛烈ナル液ヲ湧泄シ。咽中焚カ如ク熱シ。是ヲ火中ニ吐キハ燃テ炎ヲ發ス。是其液ニ脂油アル徵ナリ

嘈雜ノ病因ヲ論ス

嘈雜ハ如何ナル物アリテ發スト云フ復許多ノ議論ヲ須ズメ知ベシ。何トナレバ或胃ノ上口ニ當テ熱ノ焚ガ如ク或胃中ニ在ル所ノ液上湧シテ口中ニ出レバ味苦クメ熱シ或是ヲ火中ニ吐ケバ燃ユ。是皆脂油ノ腐敗シ變メ酷厲トナル明徵ナレハナリ。○或飲食攝養ノ宜ヲ失ヨリ亦此症ヲ發スルヲアリ。飲食ヲ

ニメ節ナク常ニ油膩脂膏ノ食饌ニ飽者ハ多。此症ニ罹ルナリ。夫貪饗ノ人ノ如キハ常ニ屢空キニ慣ヒ。素ヲ以テ饑ヲ救ガ故ニ此患ニ罹ルナシ。○或多ク油膩脂膏ノ食物ヲ用サル人モ亦此症ヲ發スルヲアリ。是何ノ故ニメ然ルト更ニ異ムベキカ如シト雖モ凡、飲食ノ美味甘脆ニメ滋養ノ多キ者ハ皆其中ニ許多ノ脂油ヲ含有スト云フヲ察セサルナリ。若膽液及其他ノ諸液ニ含有セル所ノ稠粘ヲ稀釋シ凝結ヲ疏解スル石鹼ノ如キ性力。腐損スル片ハ夫、飲食中ノ脂油ト雖モ是ヲ稀釋シテ水液ト混合和調セシムルヲ

能ハズ。是ニ於テ其脂油ハ自<sub>レ</sub>水液ト相離<sub>レ</sub>。其質水ヨ  
 リ輕キガ故ニ胃中ニ在テ自<sub>レ</sub>上ニ浮越スルナリ。○右  
 ノ如ク水液ト混和セザル所ノ脂油。胃中ノ温煖ニ因  
 テ速ニ腐敗シ其性熱シテ酷厲トナル。ト宛モ諸脂油  
 ノ腐敗シ變シテ辛熱酷烈ノ毒トナルガ如シ。故ニ其  
 敗液。胃ノ上口ニ在ル片ハ即<sub>チ</sub>前説ノ諸症ヲ發見ス。○  
 其酷厲毒ノ厭<sub>レ</sub>ヒ惡ムベキ侵刺ヲ爲スニ因テ胃ノ運  
 動ヲシテ其常ヲ失ハシムレバ則<sub>チ</sub>第二百二章ニ論ス  
 ル所ノ惡心ヲ發スルナリ。○右ノ如ク胃ノ運動。其常  
 ヲ失ヒ且<sub>チ</sub>胃中ノ諸液腐敗ヲ爲スニ因テ自<sub>レ</sub>風氣ヲ生

シ其輕屈浮越シテ上騰スル勢ニ乘シテ夫<sub>レ</sub>胃管<sub>上</sub>ノ  
 ニ在ル所ノ腐敗ノ脂油ヲ激盪シ咽門ニ發賜シテ口  
 中ニ上湧ス。故ニ咽ニハ熱シテ焚カ如ク。口舌ニハ苦  
 クノ臭穢ノ味ヲ覺ルナリ。其口中ニ上湧セル汚液ヲ  
 火中ニ吐<sub>キ</sub>ハ能ク焚燒スルヲ以テ即<sub>チ</sub>脂油タルヲ知  
 ベシ。○又飲食ノ脂油ノミナラズ膽液腐敗シテ粘脂  
 質キ質トナル片ハ亦能ク右ノ諸症ヲ發スルナリ。○  
 ハ蘇<sub>レ</sub>脂油ヲ含メリ。故ニ腐敗シテ其石鹼質ノ性カヲ  
 失フ片ハ又其粘稠ヲ稀釋スル性カヲ失ヒ逾<sub>レ</sub>粘結メ  
 ナルナリ。○其腐敗ノ脂油ヲ生スル。ト人常ニ油膩  
 脂膏ノ飲食ヲ用ルヨリ甚キハナシ。其故ハ是ニ因テ

膽液虧損シ其石鹼質ノ性力罷弊スルヲ以テ脂油ノ  
 類ヲ消化スルニ足ラズ膽液ハ石鹼質ノ性力アリテ  
飲食ノ油膩脂膏ヲ稀解ノ消  
化スルヲ宛モ石鹼ノ脂油ヲ滌除スルガ如シ然  
氏常ニ多油膩脂膏ノ飲食ヲ用レバ其石鹼質ノ性力  
雖モ是ニ膠ズノ漸衰弊シ其脂油  
然トノ消化セズ腐敗スルナリ  
又其膽液虧損ス  
 ルニ因テ胃中ニ酷厲ナル酸敗液ヲ生シ是ヲ以テ逾  
 膽液ノ石鹼質ノ性力ヲ奪除スル故ニ脂油ノ類皆胃  
 中ニ在ル所ノ水液ト混和セズ鬱蓄ノ腐敗ヲ致シ又  
 其人胃中ノ酸敗液ノ諸症ヲ患ルナリ膽液ノ性力虧  
損スルハ脂  
油ノ類ヲ稀釋ノ消化スルヲ能ハズ故ニ胃中ノ  
水液ト混和セズ其脂油停滯ノ鬱敗スルナリ  
 上章ノ餘義ヲ申明ス

上章

飲食スル所ノ脂油ノ類ハ元來身體ヲ滋養スベキ者  
 ナレ氏今腐敗シ或能ク消化セザルハ其飲食シタ  
 ル分量ホドニ身體ヲ滋養スルヲ能ハズ又此症暫留  
 シテ瘥ガレバ其腐敗液漸ク全身ニ滋蔓ノ終ニ萎黃  
 病第十七章ニ出トナルナリ

嘈雜ノ治法ヲ論ス

此症ハ上章論スル如クナル故ニ是ヲ治スルヲ早キ  
 ホド逾宜トス○其治法衆人ハ差別ナク大抵吐劑ヲ  
 用テ其胃中ニ鬱蓄セル汚物ヲ吐除ナリ予ハ但其汚  
 物ノ胃中ニ鬱聚スルヲ太甚ナル者並ニ吐ノ後患者

增訂内科摘要 卷十二 第十四 風雲堂藏

自過食ヲ戒メ油膩脂膏ノ食餌ヲ禁絶スル者ニ非レ  
 バ吐劑ヲ與<sup>レ</sup>ナシ。若<sup>モ</sup>吐ノ後食禁ヲ慎<sup>ミ</sup>ガレバ是ヲ吐  
 スレ<sup>レ</sup>其病治セザレバナリ○但其汚物尚去ザル片  
 復<sup>タ</sup>吐劑ヲ用ヒ毎日ト雖モ吐セシムベシ○故ニ此  
 症ハ淡薄ナル飲食ヲ與ヘ。叢ニ油膩脂膏ノ品ヲ禁シ。  
 次ニ出ス散劑ヲ以テ數日連服セシムベシ

嘈雜ヲ治スル散劑ノ方

**鎮嘈散**

鹿角灰<sup>名</sup> 二錢

沒藥

酒石鹽

各一錢

右件合シテ散劑トシ。分テ十六服トシ。一服宛用<sup>ル</sup>  
 一日ニ四次

若<sup>モ</sup>シ其嘈雜上湧ノ汚液甚ダ熱シテ焚ガ如キヲ覺<sup>ル</sup>  
 者ハ次ノ方ヲ用<sup>フ</sup>ベシ

又方 **涼解鎮嘈散**

沒藥 一錢

純精酒石 三錢

右件合シテ散劑トシ。用<sup>ル</sup>ル<sup>ル</sup>前方ノ如シ  
 又左ノ方良驗アリ。宜ク一匙宛數服スベシ  
 嘈雜ヲ治スル飲劑ノ方

**鎮嘈飲**

大麥水 六勺

枸橼汁 一勺

酒石鹽 一錢

一 右件調勻ス

結麗土<sup>ケレト</sup>或、喇帖石ヲ嘈雜ニ用テ胃中ノ酸敗液ヲ制  
伏シ治スル<sup>ト</sup>アリ。然レ予數<sup>ク</sup>是ヲ用ルニ効驗ナシ。其  
故ハ石鹼質ノ性功アリテ能ク其油膩脂膏ヲ稀解メ  
水液ト混和セシムル藥ニ非レバ効ナシ。然レニ右ノ二  
品ハ絶テ其性功有<sup>ラ</sup>ザレバナリ

增補重訂内科撰要卷十二終



江戸淺草茅町三丁目

須原屋伊八

浪華心齋橋通北久太郎町

河内屋儀助

同心齋橋通唐物町

河内屋太助

京三條寺町西入町

丸屋善兵衛

# 書賈

書賈

京三精寺西門  
大星善共識

同公齋蘇蘇項  
何內星太姐

馬筆心齋蘇蘇其  
何內星太姐

玉齋蘇蘇其  
何內星太姐



