


增補
訂

内科撰要

卷十三

洋学文庫
文庫8
C 27
13



京報書輯

謝正堂 奕文

重信

曾蘇

內探錄要

蘇園字田山表坐卷

長

槐園宇田川先生著

增補重訂內科撰要

京攝書肆

種玉堂
文金堂
瑞錦堂
發兌

增補重訂內科撰要目錄

卷十三

心腹痛篇第三十六

發渴篇第三十七

食不消化篇第三十八

疝篇第三十九
附 腸。腸間膜。焮衝

卷十四

口中轉屎篇第四十

大便秘結篇第四十一

乳糜利篇第四十二

增訂內科撰要 卷十三 目錄

霍亂篇第四十三

下利篇第四十四

肝崩篇第四十五

赤利篇第四十六

卷十五

痛利篇第四十七

重墜努責篇第四十八

諸蟲篇第四十九

鼓脹篇第五十

病屬尿道

腎痛篇第五十一

增補重訂內科撰要卷十三



遠西 玉函涅斯垓我爾德兒 著

津山 宇田川 玄隨 晉 譯

加賀 藤井 方亭 俊 增譯

心腹痛篇第三十六

羅甸名「カルデア」ルチア
和蘭名「ベイン・ホル・ヘット・ハルト」

心腹痛ノ大較ヲ論ス

胃ノ上口即胃管ノ下端ノ處ハ神經殊ニ多キ故ニ斯ニ能ク劇痛ヲ發スルナリ。其部ハ則胸骨脊腹ノ中行

三十五

上際ニ當ル處ナリ○其痛ハ胃ニ在リト雖モ今皆擬
シテ是ヲ心腹痛ト謂フ

心腹痛ノ病因ヲ論ス

其症固ヨリ能知リ易シト雖モ是ヲ治スルニ至テハ
亦容易ナラス。是其由テ來ル所ノ原由ヲ確知シ難ク
且各種ノ痛迥ニ其因ヲ異ニスルカ故ニ。彼ト此ト性
功相反スル藥劑ヲ以テ治スルヲ多ケレハナリ。然ハ
此ニハ効驗ヲ奏セル良劑モ。彼ニハ徒ニ効驗ナキノ
ミナラス又其劑ヲ益シ苦ヲ添テ。患者ヲシテ死地ニ
至ラシム○是ヲ以テ予其尤稱舉スヘキ症ヲ援引シ

テ是ヲ左ニ示ス

凡毒アル物及酷烈峻攻ノ藥ヲ服スルニ因テ劇キ心
腹痛ヲ發スルヲ明ニ知ルキハ。是ヲ吐シ除クヲ最
良トス。即淡稀ノ飲液ニ脂油ノ類ヲ加テ多ク飲シメ
是ヲ吐セシムヘシ。是其酷烈ナル毒ヲ包攝シテ吐泄
シ易カラシムルカ爲ナリ○右ノ如クシテ仍吐セサ
ル者ハ第十五章ニ舉ル吐劑ヲ用テ吐セシムヘシ○
其痛過食或過飲ヨリ發シ患者自然ニ吐スルヲ能ハ
サルハ徑ニ其咽ヲ探テ吐スルヲ佳トス○飲食シテ

後其痛頓ニ發シ來ル者ハ。是レ飲食ニ因ル所ニシテ上ニ說所ノ如シト雖モ。或胃ノ病アルニ因テ其痛ヲ發スルコトアリ。宜ク審ニ察スヘシ。若胃ノ病ノミニ因テ心腹痛ヲ發スル片ハ飲食諸毒ノ吐スヘキ者ナシ。然レ是ヲ吐セシメ或ハ吐劑ヲ與レハ大ニ害アレハナリ。○凡其用ル所ノ飲食。皆常供平和ノ品ニシテ心腹痛ヲ發シ或ハ何ニテモ飲食スル片ハ輒チ痛ヲ發スル者ハ。是レ胃ノ病ニ因ル者ニシテ曾テ飲食ノ所爲ニ非ルナリ。故ニ此症ハ是ヲ吐セシメテ容易ニ治スヘキニ非スト知ルヘシ

心腹痛

心腹痛。胃中酷厲液ニ因ルノ症治ヲ論ス。凡ソ飲食ニ因ラス。嚥下スル物ナクシテ發スル心腹痛ハ。毎ツチニ次甚辨識シ難シ。其故ハ胃中ニ惡液若ハ蟲アルニ因テ是ヲ驅除シテ治スヘキ症タルカ。或其因胃ノ體質若ハ其近傍ノ部及其諸液等ニ在ルヲ以テ是ヲ驅除スヘカラサル症タルカ。或ハ嘔吐シ或ハ吐劑ヲ用レハ其痛逾増劇スル症タルカト云テ確知シ難ケレハナリ。○右ノ如クナルヲ以テ診察幾許精密ヲ盡スト雖モ動輒病原明哲ナラスシテ。確實對當ノ方法ヲ處シ易カラサルコトアリ。○平素飲食攝養ヲ慎

一サ人。偶、噯氣ニ乗シテ腐敗ノ液ヲ嘔シ。胃中漸ク
空虚ナルニ從テ心腹痛ヲ發シ。若シ酷厲ナル腐敗液
ヲ吐スレハ。患者更ニ輕快ヲ覺ルノミナラス。其痛モ
亦暫ク休ム者ハ。是胃中ニ酷厲腐敗ノ液有テ其痛ヲ
發スト知ルヘシ。此症ハ吐劑ヲ用テ其汚物ヲ驅除シ。
然シテ第二十章ノ健胃劑ヲ用テ其再發ヲ防禦スヘ
シ。又患者自ラ戒慎シテ過食セス且消化シ難キ物ヲ
禁シ。或、飲液度ニ過テ胃ヲシテ充滿セシムルヲ無キ
ヲ緊要トス

心腹痛。胃膜ノ病ニ因ルノ症治ヲ論ス

第百十章

胃ノ諸膜胃ノ體質ヲ成ス諸膜ヲ云 焮衝。羅斯。膿瘍。其他凡、疼痛ヲ
發スル病ヲ生スレハ心腹痛ヲ發スルナリ。此症ハ吐
劑及總テ胃ヲ擾動スル諸藥ヲ禁スヘシ。若シ是ヲ用
レハ其痛大ニ増劇シテ遂ニ死症トナレハナリ○此
種類ノ痛ハ連綿シテ休止ノ時ナク。胃ノ充實セル時。
或、空虚ノ時モ亦歇止テシ。然レ胃ノ充實セル時ニハ
其痛更ニ一層ノ劇ヲ益シ。或、患者吐ヲ催シ強テ吐セ
ントスレハ其痛劇クシテ昏冒スルニ至ルナリ。凡ソ
他ノ部ニ於テモ。疼痛極テ劇キ片ハ昏冒スルヲアレ
氏胃ノ痛ニ於テハ因ヨリ當ニ然ルヘキ所ニシテ是

ヲ發スルノ殊ニ多シトス 胃ノ焮衝羅斯ノ症候第二
 ○予茲ニ悉ク其症治ヲ列舉セス。是予カ著ス所ノ瘍
 科精選ニ載ル症治ヲ取テ是ニ照合參驗シテ治セシ
 ムヘキカ爲ナリ ○右ノ諸說ヲ以テ觀レハ。醫家此病
 ニ臨テハ特ニ幾多ノ周悉懇到ヲ盡シ仔細ニ戒慎ヲ
 加テ藥劑ヲ處スヘク。且各種ノ因症ニ從テ各異ニ是
 ヲ療スヘシ。或人皆某ノ方。心腹痛ニ良驗ヲ得タリト
 曰フト雖モ。苟且ニ其言ニ耳食シ忽卒ニ是ヲ施用ス
 ルノ無ルヘシ 此章胃ノ焮衝羅斯ノ治法ヲ載ルカ爲ニ
 等ノ諸說ヲ參考シテ其症治ヲ略載ス ○胃及腸焮衝
 衛羅斯其症狀治法同一般ナリ 症候胃及腸焮衝ノ候

ハ胃或腸ノ部位ニ當テ焮熱硬滿シテ劇痛スルノ暫
 モ休時ナク是ヲ按シ或飲食ヲ用ヒ或少ク動搖スト
 雖モ其痛ヲ増シ身體劇キ蓄留熱ヲ發シ脈弦ニシテ
 數面赤煩渴惡心或嘔吐ヲ兼呼吸不利苦悶不寐或譫
 語小便赤熱短少腹痞脹大便秘閉或水瀉スルノアリ
 ○凡ソ此病ハ危險トス故ニ諸症劇キ者ハ初ヨリ法
 ノ如ク治療ヲ施サレハ治シ難シ若シ右ノ諸症極テ
 劇盛ニシテ患者速ニ虛脫シ捕擲昏胃冷汗出飲食咽
 ニ下レハ嘔逆シ或劇痛止ム外四肢冷テ序ナキ
 シハ死期近キニ在リ 治法 初發速ニ尺澤ニ刺絡シテ
 者ハ死期近キニ在リ 治法 初發速ニ尺澤ニ刺絡シテ
 多ク瀉血スル者ハ再ハ緊要トス 其後痛減セス或減スレテ
 復發スル者ハ再ハ緊要トス 其後痛減セス或減スレテ
 下利スル者ハ再ハ緊要トス 其後痛減セス或減スレテ
 大便ヲ導泄スヘシ 其方 亞密列花一弓半 葵根
 葵葉各三弓 取リ水煎スルヲ四分時滓ヲ去リ其汁十
 テ二弓ヲ取リ水煎スルヲ四分時滓ヲ去リ其汁十
 二亞麻油或阿利機油ニ弓ヲ加フ或蜜ヲ去リ其汁十
 蒸漏劑ヲ以テ頻ニ腹取リ水煎スルヲ四分時滓ヲ去
 利詞兒ノ劑三弓ヲ取リ水煎スルヲ四分時滓ヲ去

施アヲ時波ニ各ノヲ乳シニ子温ノ片ノ花浸リ
セリ施毎扭ニ四諸散劑ム消二服煨煨部或シ其汁
氏テスニ若大錢焮劑ハシヘ石錢セ衡ニ接温シ
大ヘ一液麥龍龍若和シ一錢右ム良頻ニ貼骨ノ四
便便シ匙列汁龍龍ハシ○錢蜜水ヘ效ニ頻又花腹百
通通○ヲ消ヲ徐二腦液ヘ龍三手ス其方○ヲ腹加ヲ部錢
利利脉服石各一ニ大殊効ヘ凡ヲ清如フ四葵飲劑ス龍獸胞方乳二
セス動齊○或錢沙糖通爛一其方驗ア煨ハ劑散大去葵根分時部諸
サルハヒ其發泡膏解ヲ患ニ絞ア煨ハ劑散大去葵根分時部諸
症善痛泡膏解ヲ患ニ絞ア煨ハ劑散大去葵根分時部諸
ニ微緩解ヲ患ニ絞ア煨ハ劑散大去葵根分時部諸
烟トス解ヲ患ニ絞ア煨ハ劑散大去葵根分時部諸
ノ○シ患ニ絞ア煨ハ劑散大去葵根分時部諸
ヲ數吉部如テ右甜瓜仁胃腸及及消仁服百錢
吉利詞參兒ノ脚湯分質白仁部石ノセ錢麻宛藏布
兒ヲ功湯分質白仁部石ノセ錢麻宛藏布

ト多服セシテ奇効アリ○飲料ハ大麥煎汁ノ少温ニ
テ多服セシテ奇効アリ○飲料ハ大麥煎汁ノ少温ニ
食料ハ稀キ羹汁ノ消化ニ與ノ一頓ニ過飲セシハ
數日淡薄ニシテ其消化ニ與ノ一頓ニ過飲セシハ
漸レハ復スルニ輕キ下劑ヲ加ヘ或ハ純精酒ハ
用ヒ或ハ是ニ消石一劑ヲ加ヘ或ハ純精酒ハ
加ヘ乳清一盞ヲ以テ送下スルニ或ハ純精酒ハ
却テ其焮劑ヲ初動シ此病ヲ退カク適當ノ藥ヲ
紫スハ漸治ス○此病初發ヨリ速ニ退カク適當ノ藥ヲ
セハ漸治ス○此病初發ヨリ速ニ退カク適當ノ藥ヲ
壞疽ナシハ初發ヨリ三四月ヲ經テ其病治カク適當ノ藥ヲ
既ニ初發ヨリ三四月ヲ經テ其病治カク適當ノ藥ヲ
慢緩ナル鈍痛ヲ作シ苦煩安カク復スルニ其腹發
常ノ困重ヲ覺テ惡寒戰慄精カク復スルニ其腹發
變シテ膿ヲ覺テ惡寒戰慄精カク復スルニ其腹發
漏劑ヲ腹破ニ施スル者ハ膿ヲ○腹發ニ其膿發
片ハ速ニ刺破ニ施スル者ハ膿ヲ○腹發ニ其膿發
溢ハ速ニ刺破ニ施スル者ハ膿ヲ○腹發ニ其膿發
ニ非レハ治スル者ハ膿ヲ○腹發ニ其膿發

患者精力既ニ虚脱スル者ハ不治トス。或速ニ其術ヲ
 施ント欲ムレバ其膿既ニ腹腔内ニ溢泄スルヲ診
 察シ難ク且其膿瀦留スレバ腹著ク腫脹セサル者ハ
 殊ニ辨知シ難シ。○若其膿腸中ニ溢泄シテ大便ニ通
 スルハ最善徵トス。○上ニ説ク候ヲ以テ既ニ膿ヲ
 成スルヲ察セハ前ニ記ス吉利詞參兒ヲ敷施シテ腸
 ヲ緩和シ其膿ヲ導下スヘシ是ヲ以テ膿ヲ下ス者ハ
 左ノ緩劑ニ蜜ヲ加テ甘美トシ多ク服セシメ又毎日
 三度次ノ散劑ヲ兼用スヘシ。泡劑ノ方服セシメ又毎日
 牙草連錢草乙切草右各等分沸湯ニ泡シ服。龍
 散劑ノ方波藥十五氏蚶站石半錢ノ類ヲ細研シ合
 シテ一服トス。○食料ハ肉羹汁ニ蔬菜ノ類ヲ加ヘ煮
 テ與フヘシ。是ニ由テ
 大便硬結スル患ナシ
 心腹痛熱病及痙攣等。自餘諸病ニ因ルノ症治ヲ

論ス

熱病ノ運動及熱毒ノ胃中ニ轉移スルニ因テ耐忍フ

ヘカラサル心腹痛ヲ發スルヲ屢コレアリ。其痛必ス
 熱ノ往來ニ從テ増減ス。此症施療百方スレバ毫モ効
 ヲ奏スルヲナク。吐劑ヲ與レバ亦治セス。唯第七章ヨ
 リ第十三章ニ舉ル所ノ熱病ノ治方ヲ用レハ輒チ愈
 ルナリ。但是レ熱病ヨリ生スル旁症ナルガ故ニ其熱
 毒除カサレハ藥劑ヲ與ト雖モ其痛増劇スルヲアリ。
 或數嘔氣ヲ催スコアリ故ニ其藥モ亦稍クニ服セシ
 メ。且是ニ阿芙蓉液或罌粟舍利別少許ヲ加用テ其胃
 ノ擾動ヲ靜止スヘシ。○第百三十八章ニ論スル痙攣
 搦掣ノ運動ヲ置諸發シテ劇キ心腹痛ヲ發スルコアリ

リ。婦人及體稟虛弱ノ人此症ニ罹レハ久ヲ經テ治セ
ス。或増長スレハ些少ノ飲食ト雖モ胃中ニ受ルテ能
ハス。平和ノ藥品ト雖モ一匙ヲ服スルテ能ハス。熱性
ノ藥ハ殊ニ甚シ。此種類ノ症ハ第百三十八章ノ痙攣
搐掣ニ發スル諸症候アルヲ以テ察スヘシ。其中第百
四十三章ニ論スル神經纖維ノ感動シ易キ者。此病ノ
起因トナルヲ屢多^シ第百二十七章胃ニ布蔓スル^シ其治
法ハ通例此症ニ用ル劑ヲ以テ療スヘシ^{第百四十三}
テ先ツ其痛ヲ^然氏仔細ニ意ヲ用テ服量ヲ些少ニシ
治スルナリ。大抵常例服量ノ四分一ヲ取テ一服ト
頻クニ與ヘシ。

シ半時ニ四服宛用ヒ其痛ノ瘥ルヲ度トスヘシ。其後
ハ痙攣搐掣ヲ治スル諸劑ヲ用ヘシ^{痙攣ヲ治シテ後}
ルノ劑ナリ。同^{第百}四十三章ニ出ツ。○第四十二章ニ論スル傷冷毒。第
五十一章ニ論スル痛風。第五十五章ニ論スル諸氣。其
他凡ソ疼痛ヲ發スル諸病ニ因テ。心腹痛ヲ生スル者
モ亦熱病及痙攣ヨリ發スル症ノ如ク。各其本病ニ從
ヒ症候ヲ詳ニシテ是ヲ治スヘシ

發渴篇第三十七 羅甸名「シチス」ニミテ
和蘭名「アルケル」ド「ルスト」
發渴ノ大較ヲ論ス

夫渴ハ身體ヲ津潤滋養スルカ爲ニ自然ニ飲液ヲ引、
所ノ一個ノ知覺タリ。此猶饑ハ其身ヲ滋毓保全スル
カ爲ニ自然ニ食ヲ欲スル所ノ一個ノ知覺タルカ如
シ○此飲ト食トノ兩欲アリテ又味ノ知覺ヲ副ルカ
故ニ饑テハ食ヲ欲シ渴シテハ飲ヲ欲スルノミナラ
ス。居恒是ヲ用テ甚喜ヒ愛スヘキ一個ノ大欲ヲ成ス
ニ至ル。故ニ人ノ飲食ヲ爲ハ性命ヲ保全シ身體ヲ滋
養スルニ闕クハカラサル一大要務タルノミナラス、
是ヲ以テ神思ヲ愉悅シ此欲ヲ遂ケ意ニ滿テ人世ノ
一樂事トスルニ至ル者ナリ○凡ソ疾病ニ在テハ饑

醫言三章

ト渴ト其情相似テ自ラ差別アリ。諸病ニ於テ食ヲ思
フノ欲ヲ失フ者ハ屢コレアリ。然レ在飲ヲ引ノ機ヲ失
テ飲ヲ能サル者ハ鮮矣。却テ大渴引飲ノ症ヲ發スル
者往々アレハ大食ヲ爲ス者ハ殆ト稀ナリ

發渴、水液竭涸ニ因ルノ症治ヲ論ス

夫渴ヲ發スル所以ノ者ハ、天性自然ニ水様ノ諸液ノ
身體中ニ匱乏スルヲ告訴スルカ爲ナリ。是ヲ以テ多
ク表發ノ蒸氣ヲ泄シ。或多ク汗ヲ發シ。或多ク小便ヲ
利シ。或多ク水瀉漉泄シ。或大ニ動作勞碌ヲ爲シ。或壯
熱乾燥ノ病アル人ハ、皆必ス渴ヲ發スルナリ○但、壯

發渴

熱病ニ於テ渴スル一ナキハ一箇ノ惡徵トス。是津液
 竭涸シテ乾燥スト雖モ天性自然ニ是ヲ告訴スルノ
 機力虧損スル徵ナレハナリ。○右ニ歷舉スル所ノ渴
 ハ皆飲液ヲ與テ治スヘシ。然レ冷飲セシムヘカラス。
 否サレハ其寒冷ノ液暴卒ニシテ其熱セル體中ニ入
 ル故ニ血液甚稠厚ナル者ハ其冷氣ニ因テ遂ニ凝固
 シ。復、渙釋ノ解散スル一能ハサレハナリ。又一ニハ少
 許宛頻々ニ與ヘシ。是胃ニ充滿シテ停滯セサルカ爲
 ナリ。第十二章煩渴ニ用ル飲
 液ノ方アリ參考スヘシ

發渴。水腫ニ因ルノ症治ヲ論ス

水腫ニ於テ大渴ヲ發スル一屢コレアリ。此症二種ア
 リ。其一ハ水液身體ノ諸腔内頭胸腹ノ三或、脂膜中膜脂
ハ皮ト肉トノ間ニ在ニ滯止ノ瀦留スル一甚。是カ爲
 ニ全身ニ循環周流スル血中ニ水液匱乏竭涸シ諸部
 ヲ浸潤滋養スルニ足ラスシテ渴ヲ發スルナリ。此症
 ハ前章論スル水液燥涸ノ症ノ如クニ飲液ヲ與テ治
 スル一能ハス。飲液ヲ與レハ水腫ヲシテ逾、增長セシ
 ムレハナリ。故ニ此症ハ水ニ列列印印施酒。少許ヲ加ヘ是
 ヲ以テ頻リニ含漱セシムヘシ。或、拘攣汁ヲ以テスル
 モ亦佳ナリ。○其二ハ水腫ノ液。漸々腐敗スル症ナリ。

是渴シテ燒カ如ク煩熱シ。且身體壯熱ヲ發シ。食ヲ惡
シ。苦煩シテ安カラサル等ノ症ヲ發スルヲ以テ是ヲ
知ル。此症モ亦多ク飲液ヲ與フベキカ如ク見レ。凡予
ハ其水腫ヲ増カ故ニ是ヲ禁ス。然ハ此モ亦前症ノ如
ク含漱セシメテ其渴ヲ霑潤スヘシ。又粟ミ薳ミ子ミ名桑甚。
櫻實等ノ傑烈ハ名或拘櫟ノ切片ニ砂糖ヲ摻ケタル
等ヲ口中ニ含テ其渴ヲ霑ネスヘシ。然シテ第二十五章
ニ舉ル壞液ノ方ヲ以テ少許宛與ハシ

發渴

發渴。食饌ニ因ルヲ論ス

凡ノ乾腊枯燥ノ食饌ヲ喫シテ渴スルハ是通例當然

ノ因トス。然レ未夕害アリトスルニ足ラス。但多ク海
鹽及腐敗シテ焚熱酷厲ノ性トナリタル油膩脂膏ノ
類ヲ喫スレハ輒チ非常ノ煩渴ヲ發スルナリ。故ニ右
等ノ食饌ハ水腫及壯熱病ニハ殊ニ禁スヘシ。其焚熱
腐壞ノ脂膏類ハ熱病ヲシテ大ニ增長セシメ且其脂
膏及海鹽ヲ水腫ニ用レハ大渴ヲ發シテ甚夕損害ア
レハナリ

發渴

發渴。壞液ニ因ルノ症治ヲ論ス

腐敗セル油膩脂膏ヲ用レハ必ス渴ヲ發スルカ如ク。
若シ内因ヨリシテ身體中ニ壞液ヲ生スルハ亦同

ク渴ヲ發ス。即腐敗熱第二十五章 勞瘵第二十六章 及經久

頑滯セル諸病ノ如シ和蘭名スレーペンデ・シキテシ 是

痲痛失尙兒陪苦痛但斯ノ如キ患者ハ渴シテ能ク飲

ト雖モ其味ヲ失テ口ニ佳ナラス。是體中ノ壞液ニ因

テ嘔氣惡心ヲ生スレハナリ。○第二十五章ニ論スル

熱壞液ニ因テ發スル者ハ。即其章ノ清涼飲ヲ用ヒ。又

扁桃乳ヲ造テ與ヘシ。

扁桃乳ノ方

大麥煮汁ヲ取り稍煮テ白中ニ入レ是ニ扁桃數個

ヲ入レ熟研シテ白汁ト成ルヲ候ヒ枸櫞汁少許ヲ

加是ニ少シノ砂糖ヲ調和ス

或蒸餅一個若ハ三個ヲ取り。水ニ煮テ漉過シ其液ニ

栗麩子昆設爾弗名或淨潔ナル答末林度名或列印設酒

少許ヲ加ヘ與ルモ亦良。斯ノ如ク多ク調和ノ藥品

ヲ舉ル所以ハ。患者渴スト雖モ飲液ノ味ヲ嫌ヒ惡ム

トアル故ニ。其味ノ口ニ適フ者ヲ擇テ飲服セシムヘ

キカ爲ナリ。○第二十六章ノ寒壞液ニ因テ渴ヲ發ス

ル者ハ亦同ク其口ニ適フ飲液ヲ得易カラス。又多ク

飲液ヲ與テ其渴ヲ鎮ルハ患者ニ不利ナルカ故ニ。唯

是ヲ其口ニ合テ數漱カシムルヲ佳トス。○寒壞液或

膿壞液ヨリシテ渴ヲ發スルヲ切實ニ診シ得ハ宜
ク第二十六章ノ寒壞液第二十七章ノ膿壞液ニ記ス
藥劑ヲ用テ是ヲ治スヘシ

食不消化篇第三十八

羅甸名^{ロウヂン}デイスベグシ
和蘭名^{ワラン}マスワールレイキスベイ
スフルテリン

食不消化ノ大較ヲ論ス

飲食ヲ嚥下スレハ胃及腸ノ運化ト其消化ヲ扶ル諸
液胃液、腸液、膽液、脾液ノ良性ニシテ。多少適宜ニ飲食ニ調
スルトニ因テ是ヲ消磨化醸シ乳糜ヲ製造ス。乳糜

ニ於テ乳糜脈ニ運輸シテ舊血液ト相混和シ漸ク化
シテ新血液ト爲リ。以テ百體ヲ榮養シ性命ヲ保全ス
乳糜諸道并ニ乳糜ノ血ニ化スル說第十八章ニ註ス ○若其二藏ノ官能衰弊シ
或其調和スル所ノ諸液。即胃液、脾液、膽液。缺乏或過多
或其性渝變スルハ隨^テ即其飲食ヲ消磨シテ乳糜ヲ
醸製シ難ク。或絶^シテ消化スルヲ能ハス。是ニ於テ其飲
食。化醸ヲ經スシテ胃中ニ停滯シ。或是ヲ嘔吐シ或消
化セスシテ溏泄スルナリ。此症ヲ食難化或食不化ノ
病ト曰フ。只此患ノ輕重ニ由テ是ヲ分ツノミ
食不消化。飲食ニ因ルノ症治ヲ論ス

此症ニ臨テハ先其原由ニ本ヒテ。或其飲食スル所ノ者ニ係ルカ。或胃若ハ腸ニ停滯スル者アルガ爲カ。或其調和スル所ノ諸液ノ常性ヲ失フニ在ルカ。或胃腸ノ官能其常ヲ失フニ因ルカト云フヲ尋思スヘキナリ。○胃腸及其調和スル諸液ハ共ニ能ク飲食ノ消化ヲ爲スト雖モ消化ノ力大抵定リタル分限アリ。是ヲ以テ飲食ノ多少モ亦定リタル分量アリテ其力ノ任ルホドハ能ク釀製化熟ヲ爲スナリ。夫ノ暴食縱飲スル人ノ如キハ能ク消化シテ口腹ノ欲ヲ逞スルノ常ニ多ク見ル所ナレド。常人ニシテ斯ノ如キ過多ノ飲食ヲ用

レハ。胃腸常度ニ越テ消化ノ力ヲ益コ能ハサルカ故ニ。必ス是ヲ化熟スルヲ得ス。○右ノ如ク暴食過飲ニ因テ消磨化熟セス停滯スト雖モ。未タ久ク鬱積シテ盡ク腐敗ヲ爲ニ至ラサル者ハ。其飲食ヲ節減スレハ自ラ治ス。○若モ其消化セサル飲食。胃中ニ停滯充滿スルヲ察セハ。第十五章ノ吐劑ヲ用ヒ。或其鬱積多ク腸中ニ在ラテ辨セハ。第十六章ノ下劑ヲ用テ是ヲ滌除シ。鬱積停滯既ニ滌除スルキハ胃家ノ消化自ラ故ニ復スヘシ。○或消化シ難キ食餌。喩ハ諸油膩脂膏ノ物ヲ鹽藏トシ。若ハ炮炙シテ用ヒ。或膠粘ナル粉麩

類ノ食物ヲ喫シテ後。此患ニ罹ル者ハ其食物消化セ
 スシテ胃中ニ鬱滯シ且腐敗セルニ因テ。自後次テ喫
 スル飲食ノ釀熟消化ヲ妨碍シ此症ヲ發スル者ナリ
 ト知ルヘシ。故ニ此症ハ自後淡薄ニシテ消化シ易キ食
 物ヲ擇テ稍々ニ用フヘシ。此ニ由テ其消化ノ機自ラ故
 ニ復スヘシ。然シテ其症仍治セサル者ハ胃及腸中ニ
 腐敗ノ汚物遺留シ或胃腸ノ運化及調和ノ諸液其消
 化シ難キ食物ニ阻遏セラレテ損敗スルノ致ス所ナ
 リト知ルヘシ。斯ノ如キ症ハ先吐劑若ハ下劑ヲ用テ
 其遺滯セル汚物ヲ滌除シ。然シテ次ニ説ク所ノ治法

ニ從テ其損敗セルヲ故ニ復スヘシ 其治法此章ヨリ
 第二百四十一章
 二論

醫言平九章

食不消化胃腸停滯ニ因ルノ症治ヲ論ス
 凡食物能ク消化シテ壅滯ノ患ナキ所以ノ者ハ營ニ
 胃ノ能ク飲食ヲ轉送スルニ因ルノミナラス。又胃ノ
 空虚ナル時ニ至テハ膽液及脾液胃中ニ旁流シテ浸
 濡シ其石鹼ノ如キ質ヲ以テ能新ニ喫スル食物ヲ融
 釋烱解スレハナリ 不食篇第二百四十四章ニ云膽液肝
 ヲリ徑ニ十二指腸ニ流泄シ旁ラ
 胃中ニ浸濡シテ滲透シ其饑テ食ヲ思フ知覺ヲ萌發
 セシム。然ニ若シ胃中ニ粘液過多ナルハ膽液并脾液
 ノ胃中ニ浸濡シテ攪リ觸ルヲ阻隔シテ透徹セシム
 ス。是ヲ以テ其饑テ食ヲ思フ知覺ヲ萌發セラシム

醫言平九章 第二章

故ニ暴食スルカ或消化シ難キ食物ヲ用レハ右ノ二液ノ滲出スルヲ殊ニ多シトス○若右ノ如キ平全ノ常調ヲ失テ其前ニ喫シタル食物塊然トシテ胃中ニ停滯シ或遂ニ腐敗スルハ其新ニ喫スル食物モ亦消化シ難ク且速ニ變シテ壞液トナルナリ○故ニ此症ハ吐下ノ劑ヲ與テ胃及腸ニ鬱積セル汚穢敗物ヲ滌除シ然シテ數時食物ヲ禁シ自後稍クニ消化シ易キ物ヲ用ルヲ緊要トス胃腸ヲシテ斯ノ如ク空虚ナラシムレハ膽脾ノ二液是ニ乘シテ復滲出シ飲食ヨク消化シテ停滯ノ患ナキニ至ルナリ

食不消化調和ノ諸液ニ因ルノ症治ヲ論ス
若人以前曾テ較著ナル起因ナクシテ卒然トシテ食消化シ難キ症ヲ患ル者ハ其因一ナラスト雖モ先ヅ其飲食ノ消化ヲ扶ル所ノ諸液ニ在ルヲ察スヘシ○凡津唾質ノ諸液即津唾胃液脾液等ハ皆石鹼ノ如キ性カアリテ能物ヲ稀釋烱解ス然ルニ今其性カヲ失ヒ或其分利スルヲ甚ク少キハ飲食中ニ含ム所ノ油膩粘脂ヲ稀釋烱解スルヲ能ハスシテ喫スル所ノ物皆盡ク全然トシテ消化セサルナリ此症ハ舌苔アリテ乾キ且粘液布著シ胃膨脹シテ多ク粘液ヲ吐出

是其石鹼質ノ諸液缺乏スルニ因テ常ニ胃ノ裏面ニ賦與セル天資固有ノ粘液ヲ稀解スルヲ能ハス。其諸液モ亦石鹼質ヲ失脱スルニ由テ自ラ散渙流動スルヲ能ハス共ニ變シテ粘液留飲トナリ。是ニ於テ食ヲ喫スレハ其粘液留飲ヲ以テ是ヲ圍繞包裹スル故ニ稀解シ消化スルヲ能ハサルナリ。○是故ニ治法。其粘液痰飲。多ク胃中ニ鬱聚スル者ハ。先吐劑ヲ用テ是ヲ吐泄シ。次テ第十六章ノ下劑ヲ用ヒ。大便ヨリシテ驅除スルヲ良トス。○自後ハ微大便ヲ通スル所ノ石鹼質ノ性功アル健胃劑。第二十章及第二百十四章ノ

方ヲ用テ其粘液留飲ノ復新ニ生スルヲ制止シ。且粘液多キ食物ヲ禁スヘシ。○若膽液。性カヲ失フキハ大低微黃ノ舌苔ヲ現シ。口苦ク大便平常ノ色ヲ失フト多シ。是ニ由テ食消化シ難ク。胃ノ部冷テ痞重苦満ノ症ヲ兼ルハ。第二十章及第二百十九章ニ舉ル温煖ノ健胃劑ヲ用フヘシ。但此症ニ於テ胃ノ部及咽喉ニ熱ヲ覺ルハ。清涼ノ健胃劑ヲ用フヘシ。即純精酒石名 孕礬名 石名 及嘈雜篇第二百二十五章ノ飲劑ヲ用フヘシ。食不消化。胃ノ運化衰弱ニ因ルノ症治ヲ論ス。夫體中ノ諸液ハ皆各自ノ器械有テ各異ニ是ヲ製造

スルノミナラス其器モ亦各自ノ運動主用アリ。喻ハ
婦人ノ乳房ノ如キ。其子ヲ懷孕スル時ヨリシテ稍々
ニ乳汁ヲ製設シ。分娩ノ後ニ至テ大ニ盈漲シ。其兒ノ
養ニ給シテ缺乏ナカラシメ。乳養ノ兒ナキニ至テハ
復此器房ニ於テ乳ヲ製造セサルカ如シ。胃ト腸トニ
於テモ亦此ノ如ク飲食ヲ消化シテ乳糜ヲ製造スル
ニ一大緊要タル運動主用ヲ具ルカ故ニ特ニ其運動
虚罷スル片ハ。其他身體諸器ノ官能皆能强健ナリト
雖モ必ス飲食ヲ消化スルヲ能ハス。○胃腸ノ運動衰弱
ノ候ハ。胃或腸ノ部ニ當テ痞悶困重シテ安カラス。飲

食腹ニ入レハ一塊石ノ胃中ニ落タルカ如ク。或其部
冷ルヲ覺ルナリ。○胃腸ヲシテ衰弱セシムル諸因甚
衆多ニシテ勝テ算ヘ難シ。○小兒及虚弱ノ婦人ハ素
ヨリ此患ニ罹ルヘキ所ナリ。○連綿シテ思慮ヲ勞シ
或讀書勤學ニ耽リ。或暴食貪飲スル等多クハ此症ニ嬰
ルナリ。故ニ酒客ハ胃寒冷ニシテ虚弱ナル諸症ヲ因
ム。一常ニ多シトス。總テ荏苒タル病ヲ患テ後ハ胃腸
ノ運動衰弱ノ症ニ罹ルヲ多シ。○凡胃腸ノ運化ヲシ
テ衰弱セシムル諸因ハ皆其病ニ就テ推索シテ知り
易キカ故ニ。若此症ヲ發スヘキ病アル片ハ先初メニ

曾了内科要
卷十三

勉テ是ヲ療スヘシ○胃及腸ニ驅除スヘキ汚物ノ滯著スルヲナキ者ハ速ニ其胃ノ運動ヲ強健スヘシ。即健胃膏良驗アリ

健胃膏ノ方

拔爾撒謨健胃膏

雜腹蘭膏

二考

右件柔革ニ攤開シ大サ上腹ヲ覆フヘカヲシメ是ニ塗ニ下ニ列スル藥ヲ以テス

拔爾撒謨字露非亞泥

府利油 榨取者 各一匁

丁香油 六滴

右胃ノ部ニ外敷シ。更換スルヲ日ニ四次○又一方アリ左ニ記ス

扶胃枕子ノ方

薄荷葉

茉沃刺那葉 各二握

丁香

桂 各四錢

右件剉テ粗末ト爲シ。斑枝花少許ヲ取テ是ヲ混糅シ。布ニテ造ル小枕子ニ充テ胃ノ部ニ襯貼ス

右ノ方ヲ用ル間ニ第二十章ノ健胃散或健胃酒ヲ存

服セシムヘシ。但患者大便秘硬セサル者ハ方中ノ瀉
 藥ヲ去ヘシ。盧會瀉利鹽ヲ斥ル。○此症ハ薑及橙皮ノ糖料。或桂
 橙皮。府利。其他斯ノ如キ氣味芳烈ノ品ヲ赤葡萄酒ニ
 浸シ用テ亦良トス。○精烈慄悍ノ飲料ニ習フ人ハ右
 ノ諸品ヲ燒酒ニ浸シ用。或。其品ヲ蒸餾シテ精ヲ取リ。
 葡萄酒少許ニ加ヘ服スヘシ。○凡藥品。散劑或昆設爾
 弗(名)ト爲シ用レハ其効尤モ多シ。諸液ヲ以テ浸出ス
 者ハ是ニ次ク。其露ヲ取用レハ効最劣レリ。然ル所以ハ
 浸出シ及蒸餾スル者ハ揮發走竄ヲ事トシ。滲透刺戟
 フ主トスル諸藥ノ的當スル疾ニ臨テハ特ニ捷効ノ

奏スレ。專ラ衰弱ヲシテ強壯ナラシムルヲ要スル
 病ニ於テハ其功。迥ニ劣ルヲアレハナリ

疝篇第三十九

羅句名「ゴリカ、ダシ」
和蘭名「コレイキ」
又「ニボイクベイン」
是、腹痛ノ義ナリ。和漢古今病ノ名狀甚タ紛錯ニ
シテ曲ニ對シ悉ク合シ難シ。唯說文ニ疝ハ腹痛
ナリト云ニ本テ今此病ヲ
疝ニ充ツ(附)腸腸間膜、焮衝
疝ノ大較ヲ論ス

第百五章

凡、腹痛結腸ノ部ニ當テ發スル者。是ヲ真疝ト謂フ。醫
提綱云腸ハ胃ノ下口ニ始リ肛門ニ終ル。因ヨリ一條
ノ腸ナレ。氏形狀主用ノ同シカラサルニ因テ是ヲ六
腸ニ分ツ。即十二指腸、空腸、廻腸、盲腸、結腸、直腸ナリ。前
ノ三腸ハ其管薄フシテ窄小。故ニ小腸ト謂ノ後ノ三

第二十章

腸ハ其管厚フシテ潤大故ニ大腸ト謂フ又云腎腸ノ
 端ヨリ上行シテ肝膽ニ傍ヒ上腹ノ右邊ニ至リ曲テ
 胃底ニ沿ヒ上腹ノ左邊ニ行キ脾左腎ニ傍ヒ復曲テ
 下行シ小腹下邊ノ左側ニ至リ此ヨリ復臍下ニ上ル
 斯ノ如ク廻曲スルヲ凡ソ八九掌此ヲ結腸ト云然レ小
 云糟粕此ニ至テ專ラ結成ス故ニ此名アリ
 腸ノ部及臍部ニ在ル腹痛モ亦通シテ是ヲ疝ニ屬シ
 或其痛上部ニ及テ第二百二十六章ニ論スル心腹痛
 ノ如キモ是ヲ名ケテ胃疝ト曰フ胃疝羅甸名コリ
 疝ノ病因ヲ論ス
 疝痛モ亦心腹痛ノ如ク其因極テ多端ニシテ勝テ記
 シ難シ故ニ治法モ亦甚タ衆多ナリ是ヲ以テ一定ノ
 方劑ヲ施シ一般ノ治法ヲ用テ差別ナク一切ノ疝痛

第二十章

ヲ療スルヲ能ハス○唯其治法ヲシテ差誤ナク切實
 ニ從事セシメンカ爲ニ斯ニ一二ノ種類ヲ舉ケ且疝
 治ヲ述フ其餘ハ此術ニ從事スル者ヲシテ自ラ思索
 シテ其治ヲ辨セシメンテ要スルノミ
 疝大便燥結ニ因ルノ疝治ヲ論ス
 大便秘閉シテ數日通セス或通スレト甚少ナリ且堅硬
 燥結シ按腹スルニ腹ノ外邊周圍即結腸ノ部位ナリ上ニ註ス殊ニ
 起脹シテ輪環ノ如キ者アリ此疝殊ニ小兒ニ多シ斯
 ノ如クニシテ腹痛ヲ發スルハ是大便秘硬シテ酷厲
 ノ性トナリ結腸ニ鬱結シテ其痛ヲ發スル者ナリト

知ルヘシ。又患者大便通利スレハ隨卽其痛靜止スルヲ以テ。此症タルノ自ラ明白ナリ。○故ニ治法ハ緩和ノ吉利詞參兒ヲ施シテ其燥屎ヲ軟化シ。又導テ是ヲ通泄スルヲ宜シトス

精大麥 一弓

過爾託亞草 一握

旃那葉 四錢

水 十六弓

右件合シ煮テ十弓ヲ取り。次ノ二品ヲ加フ

海鹽 二錢

蜂蜜 一弓

右温ナルヲ水銃ニテ肛門ヨリ注輸シ。其藥液ヲシテ腸内ニ住テ洩サシメサルノ半時許。以テ其結腸ニ滯著セル燥屎ヲシテ。浸潤軟化シ通利セシムルナリ。○小兒ハ右ノ劑ヲ三分或四分ニシ。其一分ヲ取テ施スヘシ

今世ニ吉利詞參兒。所謂刺發緬篤浣腸法ノ義ヲ施セ凡衆人甚夕煩勞ナリトシ。唯喜テ坐藥ヲ用フ。但是ヲ以テ其燥屎ヲ融解スルノ能ハサル故ニ通利ニ臨テ痛ヲ

發スルアリ。然レ用ルニ便ナルカ爲ニ爰ニ其方ヲ
舉ク

坐藥ノ方 潤腸蜜導方

- 蜂蜜 一弓
- 海鹽 一錢

右件合シテ煮。凝固シテ錠ト作スヘキヲ候ヒ。手捻
シテ大_ヤ小指ノ如クシ。油少許ヲ塗リ。蘇甘_カ沒_モ扭_ト謨_ノ
極細末ヲ衣トシ。肛中ニ納ル。是ヲ留ル_ト半時或_ハ四
分時ノ三ニシテ大抵通利スルナリ。○小兒ハ其錠
ヲ小ニシ施スヘシ。或_ハ勿_ト擲_ナ祭_ア石_ノ鹼_ヲ切テ小錠子

第二十五

ニ作り施スモ亦可ナリ
右ノ如クシテ燥屎脫除スル片ハ腹痛忽_チ靜止ス。其後
大便ノ通利ヲシテ度ニ適シテ鬱滯無ラシムル_ト大
便秘結篇ニ説ク如_クスヘシ。是其燥屎ニ因テ復_レ疝痛ヲ
發スル_ト無ラシメンカ爲ナリ

疝。酷厲ナル膽液ニ因ルノ症治ヲ論ス

凡、身體中ノ諸液ヲ熟察スルニ。腐敗ニ因テ酷烈苛厲
ノ性トナル_ト膽液ヨリ已_チ甚_クキハナシ。故ニ腐敗セル
諸液。假_ト令_トハ第二十五章ニ舉ル熱壞液。或_ハ體中ノ脂膏
腐敗シ。因テ羅斯_ヲ發スル所ノ液。及_テ飲食ノ油膩脂膏

ノ腐敗セル者等。皆是ヲ腐敗膽液ト名ク。○夫攝生ヲ善セスシテ油膩脂膏ノ食饌ヲ喫シ。熱性慄悍ノ酒漿ヲ飲ミ。芳烈香竄ノ品ヲ調和セル飲食ヲ用ルル人ニ於テ。口中苦ク惡心ヲ發シ飲食ヲ思ハス。噉シテ熱セル苦味ノ穢汁ヲ出シ。胃中熱シテ刺カ如ク疼ム等ノ症ヲ發スル。特ニ壯實ニシテ熱性ノ人及ヒ夏月炎熱ノ候ニ於テ發スルハ。所謂腐敗ノ膽液即腐敗ノ脂膏。夥ク腸中ニ鬱聚シ。是ヨリ疝痛ヲ誘發スト知ルヘシ。此症多クハ熱ヲ兼ヌ。治法先第十二章ノ清涼下劑ヲ與テ其腐敗膽液ヲ滌除シ。且同章ニ出ス適宜ノ清涼飲

醫言上章

ヲ擇ミ用テ其壯熱ヲ減スル。尤緊要トス。○其痛ヲ靜止スル爲ニ醫要一類或ニ類ヲ右ノ飲劑ニ加テ煮或阿芙蓉液第百十三二十滴ヲ加ヘ用ルヲ良トス。○若速ニ右ノ腐敗液ヲ十分ニ疏滌セサレハ其毒動輒血中ニ濫流シテ黃疸ヲ發シ。是ニ熱病ヲ兼ルナリ。斯ニ至テハ復治シ易カラストヌ。但其腐敗ノ膽液盡ク滌除スルキハ疝痛自ラ能愈ルナリ。疝。酸敗液ニ因ルノ症治ヲ論ス。凡食物ヲ溫暖ノ處ニ鬱閉シ貯レハ皆必ス酸敗ス。是故ニ胃及腸ノ虛弱ナル人ハ飲食速ニ消磨化熱スル

醫言上章

一能ハス堆然トシテ體中溫暖ノ處ニ鬱積スル故ニ
 飲食ノ自性ヨリシテ腐敗シ諸液自性ノ腐敗。萎黃病
 篇第十九章。壞液篇第二
 十二章 變シテ酸澁ノ液トナルヲ猶未熟ノ果實ノ酸
 ニ出ツ烈發澁ナルカ如シ。故ニ是ヲ以テ刺戟シテ腹痛ヲ發
 スルナリ。○是ニハ其酸澁ハ酷厲ナルヲ以テ腸ニ
 侵刺シテ痛ヲ起シ。ニハ其發澁ナルヲ以テ腸ノ纖
 維ヲ收斂牽縮スルヲ甚シテ。腸ノ通道ヲシテ閉塞セ
 シムルニ因ル。○又其自性ノ腐敗ニ因テ風氣ヲ生ス
 ルヲ猶腸ノ失常ノ運動ニ因テ風氣ヲ生スルカ如シ
 自性ノ腐敗ヨリ風氣ヲ生スル說并ニ腸ノ失
 常ノ運動ヨリ風氣ヲ生スル說諸氣篇ニ出 ○右ノ

種類ハ患者困難ナル腹痛ヲ苦ミ。且多クハ冷痛シ。腹
 部拘攣掣急ヲ覺エ。又風氣多ク鬱蓄スレバ散泄スル
 一能ハス。熱ヲ發スルヲ稀ニシテ但膚色黧澹灰白ヲ
 見ハシ。冷汗自ラ出ツ。若嘔氣シテ稍液汁ヲ嘔出スレ
 ハ未熟ノ果汁ノ如キ酸烈發澁ノ味ヲ咽口ニ覺エ。大
 便スレハ其色綠ナリ。○斯ノ如キ症ハ香竄ノ諸品香益智。華菱。良姜
 等ノ香氣アル品及溫暖ナラシムル種子。即格墨因子
 名過泥子名葛縷子名等ヲ燒酒ニ浸シ用テ効驗アリ
 ○此症ハ下劑ヲ用テ其酸敗液ヲ驅除スル一能ハス。
 是一二ハ其酸澁液ヲ以テ下劑ノ効力ヲ減シ。ニハ

腸ノ纖維牽縮急シテ腸中壅塞スルカ故ニ是ヲ通利シ易カラサレハナリ故ニ下劑ヲ投スレハ當ニ通利ナキノミナラス更ニ煩悶苦惱ヲ増シ逾風氣及疼痛ヲ發スルナリ○然レ若其毒結腸ニ在リテ診シ得ハ第二百四十四章ノ緩和吉利詞參兒ヲ施シテ是ヲ驅除スヘシ○又勉テ其酸敗發溢ノ毒ヲ制挫シ且徐々ニ驅除スヘシ乃チ後方ニ宜シ

治疝飲ノ方 **定痛治疝飲**

- 薄荷水 各三勺
- 茴香水 各三勺

越粟失爾剝祿布利怛 **名**

沒藥

酒石液 **名** 各一錢

葛縷子油 **名** 五滴

白罌粟舍利別 **名** 一勺

右件調勻シ半時毎ニ一匙ヲ服ス

若其痛劇シキ者ハ右ノ飲劑ニ阿芙蓉液一滴ヨリニ十滴マテ其症ニ從ヒ加ヘシ○患者居常慄悍飲液ニ慣ルキハ右ノ飲劑ニ枸櫞皮精或橙皮精 **名** 或過泥子精 **名** 或消疝露 **名** 四錢ヲ加ヘシ○其痛止ムト雖モ大便

適宜ニ通セサル者ハ、定痛瀉利ノ劑ヲ與ヘシ。酸澁ノ敗液ヲ驅除スルニハ、鎮痛藥ヲ加ルニ非ハ、容易ニ其功ヲ奏スルヲ能サレハナリ。上ニ論スル如ク腸ノ纖維ニ鎮痛藥ヲ加テ其學急ヲ弛緩シテ腸閉塞スル故ニシ以下劑ノ功ヲ收ルナリ

定痛瀉利飲

旃那葉

三錢

酒石鹽

二刀

暹泥子

二錢

薄荷水

八勺

右件合シ藥氣ヲ出シ。更ニ煮テ一二沸。滓ヲ去リ左

ノ劑ヲ加フ

白罌粟舍利別

一勺

右ノ劑ヲ取テ半時毎ニ一小茶碗ヲ温服シ大便通
スルヲ度トス。○爾後數日尚前ニ記ス所ノ治症飲
ヲ用テ其酸澁液ノ復生スルヲ防クヘシ

疝。腸及腸間膜ノ焮衝ニ因ルノ症治ヲ論ス

腸ノ衣膜腸ノ衣膜ハ即腸ノ全體或腸間膜ニ焮衝。羅斯

焮衝ハ第六十七章ニ註ス。羅斯ハ第三百三十二章ニ傷

冷毒第四十二章痛風第一章等ノ如キ疼痛ヲ爲ス病ヲ

發スル片ハ必ス下劑ヲ禁スヘシ。否ラサレハ是ニ因テ

腸ノ運動増劇シテ逾其痛ヲ誘發シ其病毒亦通利ス
 ルヲ能ハサレハナリ○其治法唯右ニ列スル所ノ原
 病ニ本^{モト}テ各是ヲ療スヘシ故ニ其中ニ就テ唯其燠衝
 ヨリ發スル症ヲ舉ク其候腹痛甚シテ堪忍ニ難ク其
 痛住留シテ處ヲ變セス身體大熱乾燥シ熱蓄留シテ
 休^ヤトナク且煩渴シ脉弦ニシテ數又多ハ臍部ノ邊動
 脉跳動ス○治法ハ速ニ刺絡ヲ施シ腹部ニ^ギ布^名ヲ
 貼スルヲ通例燠衝ヲ治スル如クシ又大麥水ニ少ク
 消石ト蜂蜜或答末^ト林度^トヲ加テ吉利詞^ト多兒^トトシ施ス
 ヘシ但尋常ノ疝痛ニ用ルカ如キ諸熱藥及下劑ハ嚴

第二章

ニ禁スヘシ

疝。痙攣搐掣ニ因ルノ症治ヲ論ス

腸及腸間膜。痙攣ノ運動ヲ發スルニ因テ疝痛ヲ患ル
 一多シ是第二章三十一章ノ痙攣ヨリ發スル心腹痛
 ト異ナルヲナシ。此症ハ其痛忽發シ忽休^ト。且遷移シ
 テ一處ニ住留セス。或驚怖シ或總テ神思ノ勞苦感動
 ニ因テ發シ。又第百三十八章ニ論スル所ノ痙攣ヲ發
 シ易キ人ハ殊ニ此症ヲ患ル一多シ○第百四十三章
 ノ通例痙攣ヲ治スル藥劑ノミナラス。又次ノ方ヲ用
 ヘシ。良驗アリ

方 鎮痙定痛飲

- 薄荷水 各三勺
- 茴香水 各三勺
- 急製礪砂精 二錢
第五十章二出
- 橙皮精 四錢
- 阿芙蓉液 十五滴
- 沒藥 一錢
- 白罌粟舍利別 一勺

右件調勻シ。半時毎ニ一匙ヲ服シ。其痛止ラ度トス
 若シ大便ヲシテ通利セシメントラ要セハ。第二百四十

痙症

六章ノ定痛瀉利飲ヲ用ヘシ

痙。風氣ニ因ルノ症治ヲ論ス
 痙ノ病タル。世人大抵第五十五章ニ論スル所ノ風氣
 ノ所爲トス。其故ハ患者多クハ風寒ニ觸テ是ヲ發シ。
 或腹中多ク風氣鬱蓄セル症ヲ見ハシ。或風氣ヲ放洩
 スレハ其症解散スルト多クレハナリ。○風氣ノ諸症
 及風氣ヨリ痙ヲ發スルト。第五十五章ヨリ第六十一
 章ノ諸說ヲ熟讀シテ知ヘシ。○但其風氣ヲ放洩シテ
 大ニ輕快ヲ得ル所以ハ其氣ノ散泄スルニ從テ緊脹
 セル腸。漸ク緩弛シ。是ニテ其痛モ亦減スレハナリ。此

即腸ノ痙攣運動漸ク解散スル微トス○或許多ノ風
 氣ヲ放泄スト雖モ輕快ヲ得サル者アリ。是腸中ニ酷
 厲液有テ其痛并ニ腸ノ失常ノ運動拘攣ヲ發スト知
 ルヘシ○治法ニ於テハ通例風氣ノ諸症ニ施ス所ト
 差異ナシ。諸氣篇ニ舉ル所ノ症但其痛ヲ治スルニ温
 石或瓦磚ノ類ヲ温テ腹部ニ貼熨スルキハ其腸ノ痙
 攣ノ運動解散シテ大抵皆輕差ヲ得ルナリ○然ハ其
 痛ハ痙急ニ因テ發スル所ニシテ曾テ風氣ノ所爲ニ
 非ルナリ。若風氣ノ所爲ナルキハ右ノ如キ熨法ノ熱
 氣ニ由テ風氣逾沸騰膨脹シテ其痛逾増發スヘキト

リ。是ヲ以テ予是ヲ痙攣ニ屬シテ治法ヲ施スノミ
 疝。熱病ニ因ルノ症治ヲ論ス
 凡熱病ノ毒ヨリシテ疼痛及其他諸症ヲ發スルヲ勝
 テ記スヘカラス。其一ニヲ略舉スレハ第三百三十一章
 ノ精神錯亂。第四百十七章ノ頭痛。第四百六十四章ノ喉
 風。第四百七十一章ノ欬嗽。第四百八十五章ノ胸脇痛。其他
 斯ノ如キ一箇ノ病ヲ發スルカ如シ。是故ニ衆人一ノ疾
 患ル所ノ天行病ニ於テハ種々幾多ノ病ヲ發見スト
 雖モ皆殆ト一樣ノ療法ヲ以テ治スヘキ者ナリ○熱
 病ノ毒ニ因テ疝痛ヲ發スル者モ亦第十二章ノ運動

大過ノ熱病。及第二十五章ノ熱壞液ノ方ヲ以テ是ヲ
 治スヘシ。此疝ノ種類ハ尋常治疝ノ藥劑ノ能治スヘ
 キニ非ス。唯其時行ニ得ル所ノ熱病ノ種類ニ屬シテ
 治スヘシ。○其痛ハ必ス熱ノ發歇往來ニ從テ増減ス。
 他ノ疝ニ於テハ此症アルナシ。第二百三十一章ノ
 熱病ニ因ル心腹痛
 ノ症治ト同シ
 併考フヘシ

腎痛

疝腎痛ニ因ルノ症治ヲ論ス
 腎中ニ小石ヲ結フニ因テ腰痛ヲ發スルヲ多シ。又是
 ニ次テ疝痛ヲ發スルヲアリ。故ニ若腰腹一時ニ疼痛
 ヲ患ルハ腎中結石ノ症トシ。是ヲ驅出シ治スル瘻

法ヲ施スナリ。是ヲ腎痛疝ト名ク。○予此種類ノ疝ヲ
 歴驗シテ熟察スルニ。腎ト腸間膜トノ神經ハ元ヨリ
 親ク相連交スルヲ以テ其痛ヲ腸間膜ニ施及シテ是
 ヲ發スルナリ。故ニ其治法亦腎痛ニ從テ治スヘキナ
 リ。腎痛第三百
 二章ニ出 ○或右ノ如ク腰腹一齊ニ痛ヲ作ス症
 ニシテ腎中毫モ小石ヲ結タル候無キ者アリ。是即第
 四十七章ニ論スル神經液中ニ酷厲毒アル症トス。其
 其症候ニ就テ治法ヲ確知セリ。即第二十六章ノ寒壞
 液。第五十二章ノ痛風。第六十章ノ諸氣等ニ論スル所
 ノ神經液中ノ酷厲液ヲ除治スル藥劑ヲ用ルハ其

腰腹二部ノ痛一齊ニ愈ルナリ

痲瘋ノ症治ヲ論ス

痲ニ許多ノ種類アル故ニ亦各異ノ治法ヲ施サルヲ得ス。然レ今盡ク是ヲ歴舉スルニ遑アラズ。唯其中ニ就テ今世ニ多ク考究シテ治ヲ施ス所ノ痲瘋ト名クル一種ノ痲ヲ舉ク。是レ他ノ痲ト異ナル所以ハ其症先、痲痛ヲ發シ。次テ手臂ニ痲ヲ發シテ痿弱シ。或足脚モ亦痲シテ舉動スルヲ能ハス。右ノ外尚他ノ諸症ヲ兼ル者亦屢目撃シ。且是ヲ治スルヲアリ○此症ハ予唯其神經節ニ在ル所ノ神經液中ニ酷厲毒アルニ別

元。其痛ヲ發スト云フヲ覈知セリ

神經節第八章何トナ

レハ神經液中ニ酷厲毒有テ刺戟シ痛ヲ發スル者。其毒稍解散スルニ隨ヒ其痛亦減シ。其液遂ニ膠粘ノ液トナリ。是ヲ以テ手足諸筋ノ運轉舉動ニ資用スル神經線諸筋中ニ間錯シテヲ壓塞スルニ因テ其部活動ノ機轉ヲ失テ痲ヲ發スルナリ。故ニ其痛ノ退クニ從テ漸ク痲ヲ發スルヲ自ラ領解シ易シトス○多ク停カ施療セル患者ニ於テハ其痛困難ニシテ少間モ歇シハヲナク是ニ破氣驅風ノ諸劑ヲ用レテ治セス。催睡藥ヲ與テ是ヲ鎮止セント要スレテ應セス。患者熱ヲ兼

發セリ。予是ヲ察スルニ其熱ハ熱毒ニテ發スルヨリ
 ハ其痛ヨリ發スルヲ居多^{オホシ}。患者終ニ痲ヲ發シ肢體大
 ニ痿弱セリ。○予左ニ記ス方ヲ用テ遂ニ是ヲ治スル
 一ヲ得タリ。是神經病ヲ治シ且粘稠液ヲ稀釋スル
 甚タ的當セリ

痲症丸

蘧謨安沒尼亞幾 二錢

拔爾撒謨字露非亞泥

酒石鹽 各半錢

迷迭油 六滴

山柰根

末適宜

右件合シテ每一錢十五丸トシ。每服四丸。日ニ四次。
 敷臈^{イタリ}是ヲ連服ス。○予又是ニ琥珀乳香ヲ加用ナリ
 外敷スルニ第八章ノ摩油ヲ以テ兩肩胛ノ中間ニ
 直ル處ノ脊椎ト腰骨膠骨ノ部トニ摩擦シ。以テ其頭
 凝滯著セル神經液ヲシテ渙發流動シテ消散セシム。
 此方屢用テ多ク良驗ヲ得タリ

增訂六科摘要

此書之目次
 外科撰要卷十三
 增補重訂外科撰要卷十三終

增補重訂外科撰要卷十三終



