

重訂 增補

内科撰要

卷十四

洋学文庫
文庫8
C 27
14



增補重訂各科綱要卷十四

建西 玉函派斯城夜商樓兒

津山 宇田川玄

加賀 藤井方

口中地厚萬葉

口中地厚八丈

此類中第百四十二

於本



增補重訂外科撰要卷十四

遠西 玉函涅斯垓我爾德兒 著

津山 宇田川玄隨 晉 譯

加賀 藤井方亭 俊 校註 增譯

口中轉尿篇第四十

羅甸名「ホルヒリス」
和蘭名「レキフラーケ」

口中轉尿ノ大較ヲ論ス

此病ハ第二百四十二章ニ論スル疝痛ノ劇盛ナル症
ニ於テ嘔吐シテ止ス。胃中ノ物盡テ遂ニ小腸ニ在ル

醫書



所ノ諸液。或結腸中ノ屎モ其勢ニ乘シテ逆行シ。胃中ニ轉移シテ吐出スルニ至ル。是ヲ真ノ吐糞病ト曰ス。
羅旬^シイセ但其嘔吐ヲ兼^ルニ由テ是ヲ疝ト別ツナリ

口中轉尿ノ病因ヲ論ス

夫上ハ口ヨリシテ下ハ肛門ニ至ルマテ開通セル一條ノ道路ナレハ若腸中ノ閉括ヲ失テ蔽遮スル處ナキハ輒結腸以下ニ成ル所ノ尿ヲ吐シ。或腸中空塞スル處アリテ順下傳送ノ道路ヲ阻隔スルハ其以上ニ蓄ル物ヲ吐スルナリ。故ニ若小腸ニ貌^グ儻^ト窟^クヲ生スルハ其緊攢スル處。窒塞スル故ニ必^ス其以上ニ行

第百二章

ル所ノ物ハ吐スレハ尿ハ吐スルナシ 狗傷窟ハ病名第百二章

ニ註 何トナレハ飲食小腸ニ於テ消化シ。其糟粕ハ漸ク結腸ニ下テ始テ尿ヲ結成スルカ故ニ。其尿ハ貌^グ儻^ト窟^クニ阻遏セラレテ吐セサレハナリ。○是ヲ以テ口中

轉移ノ症。是ヲ二種ニ分ツ。○其一ハ諸腸及胃ニ於テ暴烈ナル逆行ノ運動ヲ發シ。是カ爲ニ小腸ト大腸トノ際ニ在ル障膜ノ狭窄ナル通孔洞開シテ。遂ニ其尿ヲシテ結腸ヨリ小腸ニ逆行シ胃ニ驅出シテ。是ヲ吐セシムルナリ。或說ニ其甚ニ至テハ尿直腸ヨリ逆行シ。小腸ヲ經テ胃中ニ轉移シ吐スル症ヲ見ルナリ

シ。小腸ヲ經テ胃中ニ轉移シ吐スル症ヲ見ルナリ

ト云 此病ノ症治次章ニ論ス。○障膜ハ靜脈水脈心藏
 =云フ所ノ障膜ハ小腸ト大腸トノ接際ノ内環ニ環
 匝シテ其形圓ク輪ノ如シ是ヲ以テ其道路ヲ關括シ
 却行ニ大腸ニ入タル尿ヲ障遮シテ再小腸ニ返流
 二、諸腸ノ各處ニ焮衝或頑硬腫ヲ生シ。或小腸ニ貌
 傳窟^{上ニ}注ス。ヲ生シテ其傳送順下ノ道路ヲ阻遏スル片
 ハ。亦能小腸ニ在ル所ノ物ヲ吐スルナリ。然レ必尿ヲ
 吐スルヲ無シ。是其腸ノ閉塞セル處ヨリシテ以上ノ
 物ハ吐スヘシト雖モ。其以下ニ在ル所ノ尿ハ上行ス
 へカラサレハナリ。此症治次ノ第二章ニ論ス。即頭領下
 名^ノ註ス。又第二章二百四十七章ニ論ス。○頑硬腫ハ和蘭
 名^ノ註ス。又第二章二百四十七章ニ論ス。○頑硬腫ハ和蘭

發スル者ハ初小ニ大ナリ。如ク其腫硬固ニ痛
 ナク。色變セス。或上面粗糙昂低アリ。或是ニ觸テ知覺
 ナシ。是ハ外ヲ論セス。腺及腋多キ部ニ發ス。即頭領下
 耳下腺唇舌扁桃腺乳房腋腹股合縫處。睪丸等ニ生
 スルカ如シ。是甚タ膠粘ニシテ。惡液腺ニ壅塞シ。生
 凝結シ。發ス。其善性ノ者ハ療法ヲ施シ。消散シ。否ナハ
 者モ増長セシ。生涯依然トシ。患害ナキ者アリ。然レ惡
 性ナル者ハ酷厲毒血液ニ彌漫シ。發ス。故ニ其腫漸
 次ニ増長シ。或青黑若ハ鉛色ヲ帶ヒ。根脚傍圍ニ滋蔓シ
 焮熱劇痛シ。或變ノ癌瘡トナリ。或壞疽トナル。其内部
 ニ發スル者ハ肺ニ硬腫ヲ生ス。或ハ腎臓ノ腫大ニシテ
 リ。肝ニ生ス。ハ險重ノ依。剝ハ。勞瘵。或喘急トナ
 フ。發シ。脾ニ在テハ。脾病ヲ發シ。腸間膜ノ腺硬腫ノ間
 塞ス。レハ。乳糜水液皆腸間膜中ニ壅滯ノ腹肚硬滿。膜
 脛^レ營養液運輸セス。ノ肢體羸瘦ス。此症小兒ニ多。或
 尙^レ病ヲ發ス。又第八章二十三章。第二章二百六十六章ニ注ス。
 口中轉尿腸運動失常ニ因ルノ症治ヲ論ス
 凡^レ尿。大腸ヨリ小腸ニ出テ胃ニ逆行シ口中ニ轉出ス

癰疽

增訂本草綱目

ル症ハ甚々險重ニシテ且危篤トス。其故ハ此病當ニ劇痛ヲ發スルノミナラス。諸腸及胃ニ於テ右ノ如キ失常逆行ノ運動ヲ作ス如^ホノ太甚ナル起因アレハナリ。是故ニ精氣亦其劇キ運動ヲ作スカ爲ニ常ニ多ク諸神經ニ灌注スルヲ以テ自ラ費耗スルヲ少カラス。又嘔吐ノ過多ナルニ由テ當ニ惡液ノミナラス良液モ併^ヒテ多ク脱泄スルナリ。○是ヲ以テ此病治セシテ暫ク擔^ヒ閣^スルキハ全身ノ諸液大ニ虧損シテ患者精力虛脱シ。必ス救^フレサルニ至ル。此症諸腸及腸間膜ニ寒壞疽^ニ壞液篇第二十^ニ章ニ註ス。フ生スル者ニ多ク見ルヲア

リ○第二百五十章ニ論スル熱病ノ毒ニ因テ右ノ如キ暴劇ナル逆行ノ運動ヲ發スルヲアリ。此症ハ其熱毒過多ニシテ大ニ酷厲ナルニ因テ患者ノ精力是ヲ抑制シテ驅除スルヲ能ハル候トス。是ニ於テ諸吐下ノ劑ヲ投スレハ忽患者ヲシテ斃レシム。是其暴烈ノ運動ヲシテ逾更ニ大甚ナラシムレハナリ。又是ニ催睡藥ヲ與^レハ徒ニ是ヲ吐出シ。或吐セサレハ是ヲ以テ其酷厲ナル熱毒ヲ腸中ニ鬱住セシメテ其症逾靜止セス。然ハ諸藥劑皆口ヨリシテ腸中ニ達セシムルヲ能ハサルカ故ニ唯下劑ニ非ル吉利詞^キ參兒^スヲ施シ

テ是ヲ治スルヲ尤宜シトス

吉利詞參兒ノ方 清涼定痛吉利詞參兒

酸模根

大麥 各一弓

白罌粟球 二個

水 十六弓

右件煮テ滓ヲ去リ次ノ藥ヲ和調ス

蜂蜜 一弓

消石錠 名 一錢半

右吉利詞參兒ト作シ。其半ヲ温テ一回ニ灌射シ半

時或一時半毎ニ施スヘシ

自餘ノ療法ハ第二百五十五章ノ熱病ノ毒ヨリ發スル
疝痛ノ如クスヘシ○右ノ如キ熱病ノ毒ニ非スシテ
他ノ因ヨリ來ル疝痛ハ吐糞ノ症ヲ發スル程ノ險重
ニ至ル者稀ナリ

醫心方

口中轉屎。腸ノ閉塞ニ因ルノ症治ヲ論ス
小腸ノ貌儂窟或諸腸ノ焮衝ニ因テ重キ痛ヲ發シ煩
悶苦惱ヲ作シ。尋テ嘔吐ヲ發スルヲ屢コレアリ。然レ
此症ハ屎ヲ吐スルヲナシ。是前ニ説ク如ク大腸ヨリ
胃ニ至ルノ道路閉塞スル所アレハナリ○小腸ノ貌

瘰癧ヨリ發スル者ハ先其突出セル腸ヲ故ニ復スル
ニ非レハ治スルヲ能ハス。是ヲ復スル術予カ著ス所
ノ瘍科精選ニ詳ナリ○其嘔吐諸腸及腸間膜ノ熾衝
ニ因テ發スル者ハ第二百四十七章ニ論スル疝ノ治
法ニ從テ是ヲ療スヘシ○但腸間膜ノ熾衝ニ因テ嘔
吐スル者ハ尿ヲ吐スルヲアリ。是其腸緊切ニ閉塞セ
サレハナリ腸ノ病ニ非レハ腸閉塞セス唯腸間膜ノ
病ニ因テ腸ニ逆行ノ運動ヲ發スレハナ
リ治法亦前ニ舉ル吉利詞參兒ヲ施シ兼テ第二百四
十七章ノ疝ノ方劑ヲ用ヘシ

大便秘結篇第四十一

羅甸名「アルヒス、コンスチパタ
和蘭名「バルドレイヒ、フヘイド」

夫飲食ヲ消化シテ乳糜ト爲シ其乳糜ト爲ス當カラ
サル剩穢并乳糜ヲ製造スルニ資用セル諸液膽液脾
液胃液腸液等ノ殘餘ハ常ニ上カハミ圍シテ出奔ルト是平
全人定則ニシテ闕ヘカラサル緊要トス○凡大便秘結
腸ニ聚リ直腸ニ下テ一日ニ一回宛通利シ其質軟柔
ニシテ多少モ大抵飲食スル所ト相稱カフ者此ヲ無病
平全人通利トス○然ニ大便二日或三日或四五日以
上ニ一回通シ或其屎甚硬結ニテ落々タル塊碎ヲ成

醫事章

大便秘結ノ所因ヲ論ス

夫腸ニ於テ其屎ヲ推盪順下スルニハ必ス需ソ所ノ緊要ナル諸件アリ。即諸腸ノ纖維自ラ蠕動機第二章ニスヲ作シ。居恒蠕トシテ蠕動シテ休ス。是以テ徐々ニ其屎ヲ推盪前行シテ通利セシメ。且腹筋亦壓搾攝持シテ其傳送ヲ扶ルナリ。○又諸腸ノ裏面ニ於テ天造自然ニ周ク粘滑ナル液ヲ塗布シ。是ヲ以テ其屎ヲ滑利シテ推盪傳送シ易カラシム。此亦其緊要ナル者ナリ。○其屎亦甚燥硬ナラサランニテ要ス。否ラレハ

醫事章

其屎。腸中ノ潤狹ニ隨ヒ推盪循行スルニ便ナラスシテ自ラ滯著ス。是腸中清稀ノ液。多ク脫除スルノ致ス所ナリト知ルヘシ。○右ニ論スル所ノ緊要ナル諸件ノ中。一事或數件ノ缺損アルキハ必ス大便秘結ヲ患ルカ故ニ今其缺損スル所ノ病因。并ニ病患ノ較著ナル者ヲ舉テ左ニ説明ス。此致ニ因ルハ必ス大便秘結ニ全人若ク久々大便秘硬シテ通セサレハ其屎特ニ結腸ニ充滿スル下久シテ。結腸是カ爲ニ甚弛潤シ小腸ヨリ來ル者皆斯ニ堆積シテ傳送順下スルヲ能サルナリ

○此症ハ下劑ヲ用テ其滯積ヲ滌除スト雖モ其疾
 然トシテ愈ルコトナシ。是其弛瀉セル腸。仍縮收セサル
 ヲ以テ尿復故ノ如ク滯積スレハナリ。故ニ其人甚是
 ヲ患テ數下劑ヲ用レテ隨テ除ケハ隨テ聚リ。竟ニ全
 功ヲ收ルコトナシ。○此症ニ臨テハ先一次下劑ヲ用テ
 其鬱積ヲ滌除シ。自後續テ下劑ヲ長服シテ一月若ハ
 其餘モ毎日大便一次通スルヲ以テ度トシ復鬱積ス
 ルヲ禦クヘシ。斯ノ如ク毎日通利スル片ハ弛瀉ノ腸
 漸ヲ以テ自ラ縮收シ。平全ノ度ニ復スルナリ。○茲ニ
 予其藥方ヲ載ルコトヲ須ス。唯其便宜ニ隨テ輕キ下劑

ヲ擇ニ大便日ニ一次通スルヲ度トシ。服量ヲ増減シ
 用ヘシ。○然レ左ニ一方ヲ記シテ其例ヲ示ス

護謨宣腸丸

瓦爾拔奴謨 一錢

沒藥

蘇甘沒扭謨

酒石鹽 各一匁

右件合シテ每一錢二十九ト爲シ。橙皮末ヲ衣トシ
 日ニ八九ヲ服ス。若通利足サル片ハ其數ヲ増ヘシ
 其後大抵三四丸ヲ用テ能通利スルナリ

或腸ニ貌^グ儻^ク窟^クヲ生シテ其閉塞スル所ノ上部ニ屎鬱積シ。其處弛潤シテ亦同ク大便秘結ヲ患ル^ルアリ。此症ハ先其貌^グ儻^ク窟^クヲ故ニ復シテ後。前法ノ如ク療スヘシ。○産婦分娩ノ後。或水腫ノ患者其腹ヨリ多ク水ヲ瀉泄シテ後。腹筋俄ニ縱弛スルニ因テ。諸腸平常ノ如ク腹筋ニ依據シテ其屎ヲ推盪轉輸スル^ル能^ハサルヨリ亦大便秘結ヲ患ル^ル多シ。此症ハ特ニ前説ノ治法ヲ施スノミナラス。手中或哆羅絨若^ハ自^ク餘^カ取用ニ便ナル帶ヲ以テ全腹ヲ繃縛シ。是ヲ以テ諸腸ヲシテ適宜ニ依據シテ其屎ヲ推盪轉輸セシムヘキナリ

大便秘結。腸ノ運動衰弱ニ因ルノ症治ヲ論ス。諸腸ノ運動ヲ作ス^ル一様ナラス。何^トナレハ飲食ヲ消化シ乳糜ヲ乳糜脉ニ運輸スルカ爲^スノ運動アリ。若^シ此運動衰損スル^ルハ則^チ乳糜利ヲ發^ス。○^{第二}吾輩幸ニ各其運動或^ハ諸腸ニ在所ノ者ヲ傳送スル運動アリ。若^シ運動衰損スル^ルハ輒^チ大便秘結ヲ患フ。○吾輩幸ニ各其運動ヲ增益スル藥劑アリ。是^レ他ナシ諸般ノ下劑ノミ。○若^シ諸腸寒冷ヲ覺エ大便化熟セス。腹中困重不快ナルヲ以テ諸腸ノ運動衰弱シテ便秘ヲ作スト云^フヲ察セハ。第二十章ニ載所ノ強壯ニシテ溫暖ナラシムル健

胃劑ヲ以テ下劑ニ加ヘ。其服量大便ヲシテ日ニ一次。通セシムル許ニ加減シ用フヘシ

大便秘結。津液枯燥ニ因ルノ症治ヲ論ス

身體熱シテ枯燥セル者。及熾盛熱第百十八ニ於テハ

其燥熱ヲ以テ體中清稀ノ津液ヲ吸收シテ銷耗スル

多シ。是ニ由テ結腸ニ在所ノ尿。大ニ硬結シ鬱積シ

テ推盪轉輸スルヲ能サルナリ。此症ニ臨テハ吉利詞

爹兒ヲ施シ。第十二章ノ清涼下劑ヲ與ヘシ○其熱既

ニ去ギハ下劑ハ益ナキ故ニ唯暫ク第三十五章ニ出

ス清涼解凝ノ劑ヲ用テ其乾燥ノ身體ヲシテ大便塞

滯スルヲナク常ニ開通順利セシムヘシ

乳糜利篇第四十二

羅甸名「リインテリア」和蘭名「スペイス」ロープ一名「グアイルロープ」

乳糜利ノ大較ヲ論ス

夫飲食スル所ノ者。胃腸ノ官能ト其調和スル所ノ諸

液津唾胃液腸液トニ因テ是ヲ製造シテ乳糜ト成シ

諸腸ノ運化ニ因テ是ヲ乳糜脈ニ運輸シ。其餘滓ハ化

シテ尿トナリ。終ニ大便ニ出去ルナリ乳糜道及津唾

考フヘシ章ニ註ス併○若其通利スル所ノ者。糟粕ニ非スシテ

已ニ多少ノ製造ヲ經テ微白色ヲ帶ルハ是ヲ名ケテ
乳糜利ト曰フ。其色灰白ナルヲ以テ一ニ是ヲ灰白利
ト曰フ。○凡、消化烹釀ノ微甚多少アルニ從テ其名ヲ
分ト雖モ必是ニ拘ラサルナリ

乳糜利ノ病因ヲ論ス

此病ハ飲食消化シテ既ニ乳糜トナリタル者ヲ下利
スルカ故ニ胃ト腸トノ飲食ヲ化熟スル官能ニ妨碍
アルニ非ス。又斯ニ調和スル諸液ノ性力ヲ失ニモ非
ス。唯其乳糜ヲ乳糜脈ニ嚙收セズシテ腸中ニ鬱積ス
ルニ因テ是ヲ泄利スルヲ自ラ彰明ナリ

乳糜利

乳糜利。粘稠液ニ因ルノ症治ヲ論ス
若、粘稠液有テ乳糜脈ノ細口ニ粘著スル片ハ。其脈口
閉塞シテ乳糜ヲシテ是ニ運行スルヲ得サラシム
乳糜脈ハ小腸ニ起リ。腸間膜ニ循行スル故ニ小
腸ノ裏面ニハ遍ク其脈口アリ。第十八章ニ註ス。其候、
口舌ヲ見ルニ粘稠液有テ布著シ。其腹ヲ診ニ多、滿實ス。
此症殊ニ小兒ニ多シ。○治法ハ粘稠ヲ稀解スル下劑
ヲ用テ其粘液ヲ稀釋シ除ケハ乳糜脈口自ラ開通ス
ルナリ

方

越粟失爾解疑飲

越粟失爾。剝祿布利。恒

三錢

酒石鹽

沒藥 各一錢

白葡萄酒 五勺

右件調勻シ飲劑トス○此劑小兒ヲシテ日ニ數回
一小匙宛服セシム。是ヲ以テ其灰白利。漸ク減シ腹
脹亦寛解シテ故ニ復スルナリ

乳糜利。腸ノ運動衰弱ニ因ルノ症治ヲ論ス

第二百六十章ニ論スル如キ腸ノ運動衰弱ヨリ亦乳
糜利ヲ發スルニアリ是乳糜ハ腸ノ運動ニ因テ乳糜
脈ニ運行スレハナリ○故ニ若其運動甚衰弱ナルハ

ハ乳糜ヲ運輸スルヲ能ハスニテ自ラ腸中ニ鬱蓄シ下
利スルナリ○其症臍部ニ當テ困難ニシテ安カラス。
且冷ルヲ覺ユ○此症ハ第二十章ノ健胃劑ヲ用テ胃
腸ノ運化ヲ滋益スルヲ緊要トス

乳糜利。乳糜諸道ノ閉塞ニ因ルノ症治ヲ論ス

乳糜道ノ閉塞スルニ因テ乳糜利ヲ發スルニアリ。譬
ハ腸間膜ノ諸腺硬結シテ壅塞スルハ乳糜ノ乳糜
脈ヲ經テ血ニ入ル道路ヲ阻隔スルニ因テ乳糜。腸中
ニ滯留シ亦乳糜利ヲ發スルナリ。此症甚治シ難ク大
抵終ニ救レサルニ至ル乳糜ノ乳糜脈ヲ經テ血ニ入
ル諸道第十八章ニ註ス○醫

範提綱ニ云腸間膜ハ厚シテ重復ノ膜ナリ此重復
 膜ノ間ニ大小ノ腺多シ又乳糜輸ル故ニ腺ニ水脈モ亦腹内諸
 テ其許多ノ腺ニ連リ水液ヲ輸ル稀ク解シテ水脈ヨリ
 部ヨリ其腺ニ連リ水液ヲ調和シ乳糜ヲ起リ悉ク乳糜囊ニ
 注ク所ノ水液ヲ復多ク乳糜脈會合シテ長ク圓キ小ナル膜
 多ク腺ヨリ復多ク乳糜脈起リ悉ク乳糜囊ニ輻湊ス
 乳糜囊ハ幾多ノ乳糜脈會合シテ長ク圓キ小ナル膜
 囊ヲ爲ス者ナリ其囊ノ上部延長シテ一條ノ乳糜管
 トナリ上行シテ左ノ鎖骨下靜脈ニ連リ此處ニ乳
 糜ヲ其血中ニ輸ル血ニ鎖骨下靜脈ニ連リ此處ニ乳
 糜脈ヲ經テ血ニ輸ル血ニ鎖骨下靜脈ニ連リ此處ニ乳
 テ閉塞スルキハ其道路阻隔シテ乳糜運行セサル所
 リナ何トナレハ乳糜ハ能乳糜脈ニ運行スト雖モ腸
 間膜腺ノ壅塞セル處ニ至テ滯止スルカ故ニ腸ヨリ
 其腺ニ至ルマテノ乳糜脈ニハ乳糜留滯シ充塞スル
 ヲ以テ内服セル藥液モ是ニ通行スルヲ得ス其藥

カヲシテ硬結セル諸腺ニ至リ達セシムルヲ能ハサ
 レハナリ○是ヲ以テ治法第八十章ニ載ル摩油ヲ用
 テ其腹ニ摩擦シ勉テ其壅結セル腺ヲ疏開スベシ○
 腸間膜ノ腺閉塞セル者ハ他ノ徵候ナク唯此病荏苒
 トシテ替留シ唾腺唾腺ハ耳下及下顎ニ在テ是コリ
 津唾ヲ分利シ唾管ニ送リテ口中
 二通及至其他ノ諸腺ノ硬腫スルヲ以テ知ルヘシ
 泄スハ漢醫ノ所謂瘰癧ナリ腹腿合縫ノ處ノ腺硬腫ス
 ルハ所謂便毒ナリ其他乳房腋等ノ腺硬結スルハ
 多シ腸間膜ノ腺モ亦斯ノ如ク硬塞スルハ乳糜水
 液皆此ニ滯留シテ腸間膜中ニ滯積シ腹肚硬滿膨脹
 ノ症ヲ見ハシ乳糜常ニ血中ニ入ルナリ又第二百五
 二註故ニ肢體漸ク羸瘦スルナリ又第二百五十四章

霍亂篇第四十三 羅甸名「コレラ」和蘭名「ボルト」

霍亂ノ大較ヲ論ス

夫乳糜ヲ製造スル諸器ニハ各自家ノ運動ヲ備ルカ故ニ若賊害スル者アリテ是ニ抵リ觸ルルハ必其運動ヲ増發シテ賊害スル者ヲ出除ナリ。即第二百八章ノ嘔吐。第二百五十三章ノ口中轉尿ノ如キ。胃腸相共ニカヲ戮テ其有ル所ノ物ヲ盡ク嘔吐シ除クヲ觀テ是ヲ察スヘシ。○今。丹因ヨリシテ吐利齊ク發シ。胃ハ上湧ノ運動ヲ起シ。腸ハ下注ノ運動ヲ作シ。胃腸上下

カヲ戮テ其賊害スル者ヲ出シ除ク症。是ヲ名ケテ霍亂ト曰フ。其吐下スル所ノ者多ハ黃色ナル酷厲腐敗ノ液ナリ。或偶吐利スル物ナクシテ只上下ヨリ許多ノ風氣ヲ發泄スルヲアリ。○此病ハ胃及諸腸ノ運動暴劇ニシテ身體大ニ攪擾スルカ故ニ大抵煩躁苦悶。大渴。壯熱。肢體拘攣。昏冒。人事ヲ省セサル等ノ諸症ヲ發ス。然ル所以ハ其胃腸ノ劇キ運動。諸部ニ連及シテ交感スルニ因リ。或其吐下脫泄ノ大甚ナルニ因リ。或此病ヲ起ス所ノ諸因ヨリシテ是ヲ發スレハナリ。○是ヲ以テ諸症多シテ劇盛ナルホド逾危險ナリトス

霍亂ノ病因ヲ論ス
 霍亂ノ病因ハ胃ト腸トノ攪擾ノ運動ナリ。但其攪擾
 ヲ起ス諸因多端ナルカ故ニ此病悉ク皆危篤ナルニ
 非ス。予其通例多ク發スル所ノ一二ノ因症ヲ舉テ
 是ヲ左ニ示ス

霍亂。飲食ニ因ルノ症治ヲ論ス

人若胃腸ノ能消化スヘキ分量ニ越テ頻ニ大食過飲
 シ。特ニ油膩脂膏ノ類ヲ多ク喫スルハ其溫暖ノ處
 ニ停滯シテ消化セサルヲ以テ忽腐敗シ。變シテ酷厲
 毒トナルナリ。○其腐敗スルヲ甚シテ終ニ酷烈苛厲

ノ極ニ至ルハ其毒忽胃腸ヲ刺戟シ大ニ攪擾シテ烈ク
 是ヲ吐利スルナリ。然レ是ニ由テ其毒ヲ吐利シ盡セ
 ハ大抵此病全愈シ。唯其暴烈ナル擾動ニ因テ身體大
 ニ罷勞ヲ爲スノミ。○右ノ如キ飲食ニ因ル症タルト
 ヲ辨知セハ。唯多ク淡薄ノ飲液ヲ與テ逾其吐利ヲ誘
 發シテ盡ク其毒ヲ泄除セシムヘシ。○或其毒ヲ吐下
 シ盡スト雖モ尚乾嘔及下利セントスル意止サルハ
 ハ惡心篇。第二百六章ノ藥劑ヲ用テ是ヲ治スヘシ

乾霍亂ノ症治ヲ論ス

第四百十三章ニ論スル所ノ纖維ノ感動シ易キ人ニ

於テ上下兩竅ヨリ多ク風氣ヲ發泄シテ劇キ腹痛ヲ兼ル症。予屢見ルヲアリ。此ヲ乾霍亂ト曰フ○其上下ヨリ發泄スル所ノ風氣。何レノ處ヨリ來ルト云フ。衆人は是ヲ領會スルヲ能ハス。然レ是第五十九章ニ論スル胃腸失常ノ運動ヨリシテ幾多ノ風氣ヲ生スルヲ思ハサレハナリ○此種類ノ症ハ第五十七章ヨリ第六十一章マテ説ク所ノ風氣ノ治法ニ從テ是ヲ療スヘキナリ

霍亂

腐敗毒ニ因ルノ症治ヲ論ス

炎暑ノ候。六七月ノ頃ニ於テ門脉ノ血。鬱滯シテ變壞

シ。是ヨリ酷厲腐敗ノ膽液ヲ生スルキハ是ヲ以テ其部ヲ刺戟シテ疼痛苦悶ヲ發シ。其傍邊ノ諸部モ亦其毒ノ侵刺ニ堪スシテ大ニ擾動シ。一ハ是ヲ肝藏中ノ靜血脉ニ送輸シ大幹靜血脉ニ入テ全身ノ血中ニ混淆スルキハ乃腐敗熱ヲ發シ。一ハ膽液管醫範提綱所謂總管ナリ及門脉ノ支末ヨリ是ヲ腸中ニ注泄スルキハ乃胃腸ヲ侵刺シテ暴劇ナル運動ヲ起シ。劇キ腹痛苦悶壯熱ヲ發シテ膽液并ニ其他ノ腐敗液ヲ吐下スルナリ○腐敗膽液ノ毒極テ酷厲ナルヲ以テ其觸ル所ノ者ヲ殘害シテ腐壞セシムルナリ。故ニ其毒身體ノ良血液

ニ浸淫シテ是ヲ腐敗スル片ハ其崩壞ノ液。夥クシテ吐利^{吐瀉}存ニ發シ。患者其劇キ脱泄ニ堪スシテ動輒十二時中ニ死ス。○治法。第十二章或第二十五章ノ清涼飲ニ鎮痛劑即催聽藥ナリ第四章ノ註スヲ調和シ用ヘシ疝篇第二章ニ曰凡身體中ノ諸液ヲ熟察スルニ腐敗ニ因テ酷厲苛烈ノ性トナル。膽液ヨリ己甚キハナシ又曰夫攝生ヲ善セシテ油膩脂膏ノ食饌ヲ喫シ熱性慄悍ノ酒漿ヲ飲ミ芳烈香竄ノ品ヲ調和セル飲食ヲ用ル人ニ於テ口中苦烈惡心ヲ發シ飲食ヲ思ハス噉シテ熱セル苦味ノ穢汁ヲ出シ胃中熱シテ刺カ如ク疼ム等ノ症ヲ發スル。特ニ壯實ニシテ熱性ノ人及夏月炎熱ノ候ニ於テハ是所謂腐敗膽液。即腐敗ノ脂膏。夥ク腸中ニ鬱聚シ是ヨリ疝痛ヲ誘發スト知ヘシ。此症多クハ熱ヲ兼シ治法先第十二章ノ清涼下劑ヲ與テ其腐敗膽液ヲ滌除シ且同章ニ出ス適宜ノ清涼飲ヲ擇ミ用テ其壯熱ヲ減スル。尤緊要トス又其

ヲ靜止スルカ爲ニ罌粟一顆或二顆ヲ右ノ飲劑ニ加テ煮。或阿芙蓉液二十滴ヲ如ヘ用ルヲ良トス。○但此病前ニ論スルカ如ク差別多キヲ以テ諸種ノ霍亂皆悉ク危篤ナルニ非ス。或果瓜ノ類ヲ食スルヨリ發シ。并ニ胃腸ニ停滯スル者アリテ發スルカ如キハ則自然良能ノ其物ヲ吐下シ除ク所ノ運營ヲ助テ是ヲ治スヘキナリ吐下ノ劑ヲ用ルヲ云

下利篇第四十四

羅甸名「ヂヤルル」
和蘭名「ボイクローブ」

下利ノ大較ヲ論ス

凡將因ヨリシテ自ラ稀薄ナル大便ヲ多ク下利シ且

頻數ニシテ止サル症。是ヲ名ケテ下利ト曰フ○但下劑ヲ用テ下利スルハ是ヲ丹因ニ係ス。藥ノ瞑眩ニ屬スルナリ○其下利過度ナラサル者は是ヲ軟便ト曰フ○乳糜ヲ下利スルハ則乳糜利ナリ○下利ニ嘔吐ヲ兼ルハ即霍亂ナリ以上ノ病前ニ出○下利シテ腹痛甚キヲ痛利ト曰フ○下利ニ從テ多ク血ヲ瀉スルハ即赤利ノ痛ナキ者ナリ○肝藏ノ腐壞セルカ如キ黧赭色ノ稀キ汚物ヲ瀉下スルハ是ヲ肝崩ト曰フ以上ノ病斯後ニ出ノ如キ種類ハ皆其瀉下スル物ト其兼症トニ隨テ其名ヲ分ツト知ルヘシ○予其通例多ク患ル所ノ者ヲ舉テ

下利

左ニ示ス
下利ノ病因ヲ論ス
腸中ノ諸液ハ必ス兩道ヨリシテ是ヲ將來ルナリ。其一ハ飲食ヨリシテ來リ。其二ハ體中ノ諸器ヨリ各種ノ諸管ヲ以テ胃ト腸トニ將來ルナリ○其飲食ヨリ來ル諸液ハ此病ニ關ルヲナシ。其故ハ少モ飲食セスト雖モ下利連綿シテ止サレハナリ。然所以ハ諸腸ノ纖維ニ於テ非常ノ大ナル運動ヲ起シ。是ヲ以テ凡腸中ニ有ル所ノ者ハ皆悉ク下ニ向テ推盪シ驅逐シテ少モ是ヲ乳糜脈ニ運輸セサレハナリ○其體中ノ諸

器ヨリ來ル所以ハ腸中ニ病毒惡液アリテ常ニ腸ヲ刺戟シ。是ヲ以テ誘起シテ諸器ヨリ幾多ノ液ヲ腸中ニ湧出セシメ。一ハ常ニ諸液ヲ腸ニ送ル所ノ諸管ヨリシテ各其液ヲ多ク腸中ニ驅泄スレハナリ。此症熱病ニ於テ屢多シ。胃腸ノ裏面ニ通ク細腺アリ。是ニ微細ノ管アリテ常ニ胃液腸液ヲ滲出ス。又膽液管。尿管。門脈ノ末端ノ如キ各種ノ管ヨリ各諸液ヲ腸ニ滲出ス。是諸器ヨリ來ル者ナリ。又第二章八十四章ノ註ニ出

下利遷延經久ノ症治ヲ論ス

天稟虛弱ノ人ニ於テハ動輒ヤ、モ、ス、ル在苜經久ノ下利ヲ患ルヲアリ。此症ハ第二百六十二章ノ乳糜利ト差別少ナ

シ。是唯乳糜ヲ利セスシテ腐敗液ヲ瀉スルノミ。元來此症モ亦乳糜ヲ利スト雖モ恐クハ腸中ニテ其腐敗液ニ化セラレ。相混シテ利スルヲ以テ較著ニ見ヘカラサルナリ。○此下利ハ乳糜利ノ諸因ト一般ナルカ故ニ是ヲ治スルモ亦其法ニ從ヒ又第二十五章。第二十六章ニ論スル自性ノ壞液ヲ治スル劑ヲ兼用シテ其下利ト壞液ト共ニ齊ク治スヘキナリ。○諸液ノ大ニ稀涼ナルニ因テ亦遷延經久ニシテ熱ナキ下利ヲ發スルヲアリ。此症ハ患者大ニ羸瘦シテ正ニ勞瘵ト稱スヘキニ至ルナリ。若此病。第二十五章ノ熱壞液或

第二十六章ノ寒壞液ニ因テ諸液甚タ稀涼ニナリテ
 發スル者ハ甚危険ニシテ治シ難シ。何トナレハ其下
 利ニ任セ置キ或其壞液ヲ驅除センカ爲ニ下劑ヲ用
 レハ。患者ノ死ニ至レテ下利止サレハナリ。是ニ於テ
 鞅ヲ改テ是ニ閉澁ノ劑ヲ與レハ其壞液ヲシテ體中
 ニ鬱蓄セシメ。漸クニ類ヲ敗リ良ヲ化シ。腐壞ヲ逞フ
 シテ止ス終ニ惡厲ノ性トナレハナリ。是故ニ治法唯
 勉テ其自性ノ腐壞ヲ治シテ。其下利ヲシテ徐クニ靜
 止セシムルノ外復他ノ術ナシトス。○若其下利第十
 七章ノ萎黃病ニ發スル者ハ大抵利アリトス。是ニ因

下利

テ其病毒ヲ泄除スレハ下利自止ハナリ。○若表發ノ
 蒸氣ヲ抑遏シ或居常皮表ニ發出シタル病毒ノ内鬱
 スルヨリ荏苒タル下利ヲ發スル者ハ皆害アリ。此症
 ハ第四十九章ニ出ス發汗劑ヲ用テ其腸ニ轉移セル
 所ノ病毒ヲシテ復其素ヨリ排泄セル本然ノ道路ニ
 發出セシムルヲ良法トス

下利。熱病ニ因ルノ症治ヲ論ス
 純粹ノ稽留熱或往來熱即チ間歇熱ナリニ於テ其病
 毒腸ニ轉移シ下利ヲ發スルアリ。此症予未タ曾テ
 利益アルヲ見ス。然レ惡液過多及腐敗膽液ニ由テ來

ル熱病ニ於テ下利ヲ發スルハ其惡液及腐敗膽液ノ
 通泄スルヲ以テ大ニ利アリトス○故ニ熱病ニ下利
 ヲ兼ル症ニ臨テハ宜ク審診熟察シテ其胃腸ニ腐敗
 膽液若ハ其他腐敗ノ汚物鬱積スルニ因テ其熱ヲ發
 シ且自其毒ヲ腸ヨリ泄除スルカ爲ニ發スル下利夕
 ルカ或唯熱病ニ傍發スル標症ノ下利タルカト云
 ヲ分別スヘキナリ○何ヲ以テ是ヲ別ツトナレハ若
 胃ニ腐敗毒ノ鬱蓄セルヨリ發スル熱ナルハ其下
 利ニ從テ諸症輕快ヲ覺エ其熱次第ニ減シ下利モ亦
 漸ク減スルナリ是第十四章ニ論スル假熱ノ症ナ
 リ症治第十五章第十六章ニ出

ニ徒熱病ニ傍發スル症ナルハ其下利ニ從テ逾煩
 悶苦惱ヲ益シ其熱亦減セス諸症更ニ増劇ス此下利
 ハ第十章ニ論スル治法ニ從テ勉テ其熱病ヲ治スヘ
 キナリ

醫書

肝崩篇第四十五

羅向名「アミキ」ニスヘバチキス
和蘭名「コロフル」ト

肝崩ノ大較ヲ論ス

蓋醫書ニ載ル所ヲ見ニ唯洩血中ノ稀薄ナル賦
液第二十章ニ註ス
 如ク稀薄ニシテ腐敗セル血ノ如キ液ヲ下利シ痛ク
 ク或微痛スル症ヲ以テ肝崩ノ病トシ是ヲ以テ尋常

下利ト分別ヲ爲スナリ○予按スルニ右ノ症ニテハ正ク肝崩ノ名ニ適當シ難シ。但其下利スル所ハ物、肝藏ノ腐壞セルヲ將出シ來ルカ如ク黯赭色ニシテ稍濃稠ナルヲ宛モ第二十五章ニ載タル炎熱ノ地方ニ多ク患ル叔格利亞度ノ病ニ於テ下利スル者ノ如クナル是肝崩ト名クルナリ

肝崩ノ病因ヲ論ス

古ノ撰述家皆以爲ク其稀薄ニシテ絶淡ナル血ヲ下利スル肝崩ハ肝藏ニテ血ヲ製造スルノ衰弱シタルヨリ起ルト然レ今時ハ能ク其原由ヲ詳シテ此説ヲ

排斥スルニ足リ○此症ハ生氣運行ノ力微弱ナルニ因テ十分ニ血ヲ釀製化熟スルヲ能ハスシテ自ラ稀薄ノ血トナリ。夫ヨリ漸ク自性ノ腐壞ヲ爲テ差其常性ヲ變スル片ハ其血自ラ腸間膜ノ動血脉諸支ノ端末ヨリ容易ニ腸中ニ漏泄スルナリ○屍ニ就テ試ニ水銃ヲ以テ蠟ヲ腸間膜ノ動血脉ニ灌入スレハ容易ニ腸中ニ達スルヲ見テ知ヘシ○血ノ質。右ニ説ク如ク稀薄ニシテ赤色微ナク。且動血脉ノ端末ハ赤色ノ血球血ノ球ヲ爲ス説第百七十九章ニ註スヨリハ洩出ニ通行シ易キニ因テ其瀉スル所ノ液宛モ肉ヲ煮タル汁ノ如シ○若

門脉ニ滯止セル血。腐敗シテ漸ク門脉諸支ノ端末ヨ
リ腸中ニ漏出スル片ハ宛モ肝藏ノ腐壞セルカ如キ
物ヲ下利スルナリ是作者ノ所謂ル肝崩黯滯ノ血屍
ニ就テ試ニ水銃ヲ以テ蠟ヲ門脉ニ灌入スル片ハ亦
其諸支ヨリ腸中ニ通泄スルナリ諸腸ノ靜血脉ハ即
門脉ノ支別ナレハ

肝崩ノ治法ヲ論ス

門脉ノ血。腐壞シ腸中ニ漏泄シテ肝崩ヲ發スル症ハ
第二十五章ノ治法ニ從テ是ヲ治スヘシ○夫ノ古ニ
所謂肝崩ノ症ハ其治法。玫瑰花ノ昆設爾弗昆
設爾弗ニ大黃

ヲ加用テ甚効アリ。是既ニ腸ニ漏出セル液ヲ滌除シ
テ滯滯セシムルヲナク。又腸中ノ動血脉支末ノ細口
ヲシテ封合セシムルカ爲ナリ大黃ヲ以テ疏滌シ。玫
瑰花ヲ以テ動脉口ヲ
封合 又是ニ第二十六章ノ寒壞液ノ方ヲ兼用スル片
ハ殊ニ良効ヲ奏ス。此症若發熱過多ナル片ハ第二十
七章ノ膿壞液ノ方ヲ用テ宜トス

赤利篇第四十六 羅甸名アルヒ。フリユキシス。クムエン
左ス。和蘭名ロロテロロブ

赤利ノ大較ヲ論ス

痛利ノ症動輒血ヲ下シテ大ニ危殆ニ至ルカ故ニ。每

人は是ヲ危懼シテ唯血ヲ下ス症アレハ輒病ノ區別ヲ論セズ概シテ此ヲ赤利ト稱スルナリ

第百九十章

赤利ノ區別ヲ論ス

凡腸中ヨリ出血シテ大便ニ下ス類。通例是ヲ赤利ニ屬ス○其第一種ハ痔ノ下血ナリ。其候。先下血シテ後尿ヲ通シ。或血ヲ以テ尿ヲ圍繞スルナリ。是予カ著ス所ノ瘍科精選ニ論載ス○第二種ハ大腸或小腸中ノ血絡破壊シテ其流出セル血ヲ下利スルナリ。是ヲ真ノ赤利ト曰フ。然レ是ニ疼痛ヲ兼ルナシ○第三種ハ前症ノ如ク血ヲ下シテ重キ疼痛及熱病ヲ兼ス。

第百九十章

赤利ノ治法ヲ論ス

此ヲ痛利ト曰フ。治法次篇ニ説明ス

赤利ノ治法。第百九十九章。第二百零一章ノ嘔血ト差別少ナシ。何トナレハ唯其腸ヲ觸動セサラント主トシ。是カ爲ニ過食及堅硬ノ物ヲ喫スルヲ止メ。殊ニ諸ノ下劑ヲ禁スレハナリ○若腹中築動攪擾シ或疼痛スルハ腹ノ外邊周圍。即結腸ノ部位ニ在ラ以テ諸腸位。第。二。百。四。十。二。章。ニ。註。ス。結腸中ノ細血絡。破壊シテ出血スルヲ察セハ其中ノ屎ヲシテ漸次ニ其血ト混淆スルヲ無ラシメンカ爲ニ。少ク收斂シテ痛ヲ止ル吉利詞參

曾訂内科撰要 卷一四

兒ヲ施スヘシ。但其分量一弓ヨリ四弓ニ至ルヲ度ト
スヘシ。一頓ニ多ク注入スレハ腸ヲシテ充脹セシメ
或觸動スレハナリ

收欽定痛ノ吉利詞參兒ノ方

收欽定痛吉利詞參兒

玫瑰花 一握

舍謨字黠謨根

酸模根 各一弓



白罌粟球 二顆

水 二十弓

右件合シ煮テ其液四弓許ヲ取リ。微温ニシテ水

ヲ以テ肛門ニ注入スル。一日ニ一次ヨリ三次ニ至
ル

增補重訂内科撰要卷十四 終



増訂 和抄要

卷

七

