



洋学文庫
文庫 8
C 28
2



增補重訂内科撰要卷二

遠西 玉函涅斯垓我爾德兒 著

宇田川玄隨 晉 譯

津山

男

玄真 璘

校註

加賀 藤井 方亭 俊 增譯

萎黃病篇第二

羅甸名カセキシア
和蘭名カングダントヘイド

萎黃病ノ大較ヲ論ス

患者。顔面總身ノ皮膚。黦澹灰白ニシテ黃色ヲ帶ビ
神志樂マズ肢體倦重。懈惰。食進マズ。太抵熱少ク或ハ

第十七章

增訂内科撰要

卷二

第十七章

風雲堂藏

晴保氏藏書

晴保氏藏書

熱ナシ。是ヲ翁傑達安篤歇意度皮膚色澤ヲ失ヒ或
 ハ挂獨傑蘇得爾突竭意度ト云挂獨ハ惡ナリ。傑蘇得
 補ノ謂ナリ。身體ヲ榮養シ。性命ヲ資給スルノ機
 變惡シテ常ヲ失フヨリ生スル病ト云ノ義ナリ。又一
 二挂獨薩必弗竭意度ト云。皮膚黧澹萎黃ヲ見ス病ノ義
 一ニ挂獨吉須窟突ト云。皮膚黧澹萎黃ヲ見ス病ノ義
 リナ

第十章

萎黃病ノ因ヲ論ス

食ノ口ニ入ル。是ヲ咀嚼スルノ際津唾漸ヲ以テ潮溢
 シ。其咀嚼スル所ノ者ト和糅シテ嚥下シ。胃ニ入テハ
 胃液ヲ加ヘ。腸ニ於テハ臍液ト膽液ヲ加ヘ。又胃ト諸
 腸トノ各自ノ官能ヲ以テ是ヲ消磨化釀シテ乳糜ト

爲シ。夫ヨリ乳糜諸道ヲ經テ血中ニ運輸ス醫範提綱

裏面ノ膜ヨリ常ニ津唾ノ如キ稀液ヲ滲出ス。此ヲ胃
 液ト謂フ。此液飲食ニ混和シ。能ク釀熟スルノ性アリ
 テ津唾ト同シ。夫レ津唾ハ稀クシテ味淡ナレバ。其
 質徒ニ水ニ非ズ。其中揮發透竄ノ氣ヲ含ミ。能ク物
 ニ滲透シ。必ズ和解シテ化熟ヲ扶ク。若シ唾液不足
 スル毎ニ。必ズ和シテ化熟ヲ扶ク。若シ唾液不足
 ハ稠粘ニナリ。テ飲食ニ和セザレバ。其味難シ。凡
 シテ食先ヅ口ナク。且ツ胃中ニ下レ。稍化熟ヲ難シ。凡
 飲セバ。胃管ノ液ヲ加ヘ。至テハ胃液ヲ加テ。イヨ
 下セバ。胃管ノ液ヲ加ヘ。至テハ胃液ヲ加テ。イヨ
 範提綱ニ載ス。○臍液加ヘ。胃液ヲ加テ。イヨ
 云。醫範提綱ニ載ス。○臍液加ヘ。胃液ヲ加テ。イヨ
 ノ液ナリ。腸ヨリ乳糜諸道ヲ消化シ。成ル純白精粹
 血ニ入リ。心肺ヲ運リ。動脈ニ流注ス。左ノ鎖骨下靜脈ノ
 シテ。血トナリ。肺ヨリ。又云。乳糜ヲ受テ。悉ク腸間膜
 遍ク。小腸ニ起リ。白色ナリ。又云。乳糜ヲ受テ。悉ク腸
 二乳糜透見シテ。起リ。白色ナリ。又云。乳糜ヲ受テ。悉ク腸

央ノ後邊左腎ノ差右ニ在リ多クノ乳糜脈會合シテ
 長ク圓キ小ナル膜囊ヲ爲ス者ナリ故ニ下ハ多クノ
 乳糜脈連リ上ハ延長シテ一條ノ乳糜管トナル又諸
 部ヨリ水脈連リ水液ヲ和シテ稀解醸熟シ乳糜管ニ上輸
 糜ヲ統會シ水液ヲ和シテ稀解醸熟シ乳糜管ニ上輸
 スルナリ又云乳糜管ハ乳糜囊ノ上口延長シテ一
 小膜管トナリ脊骨ノ左側ニ循テ上行シ腹部ヨリ胸
 部ヲ歷テ左ノ鎖骨下靜脈ニ連リ此處ニテ乳糜ヲ其
 血中ニ輸ス又腸間膜ノ說即チ乳糜ヲ血中ニ運輸スル
 ノ諸道ナリ又腸間膜ノ說即チ乳糜ヲ血中ニ運輸スル
 セ考フ是ニ於テ血ヲ環廻スル器ト呼吸ヲ索齋ス
 ベシ
 器トノ官能ニ因テ漸次ニ化シテ身體ノ營養ニ
 資給スル所ノ液ト爲スナリ無病平全ノ人皆然リ
 ハ血中ニ入ルト雖モ直ニ血ニ化セズ但血脉ヲ運行
 スルノ間肺ノ索齋ヲ以テ氣ヲ血中ニ含マシメ數廻
 周流循環スルニ因テ漸ク
 化熟シテ血トナルナリ
 ○若シ右ニ舉ル所ノ諸液

或ハ諸器ノ中一モ其常性ヲ失ヒ官能ヲ善セザル
 アルカ或ハ飲食度ニ過キ或ハ消化シ難キ物ヲ食ス
 レバ遂ニ生麤未熟ニシテ榮養ニ不利ナル液ヲ生シ
 是ヲ以テ自餘ノ良血液ト偕ニ全體ニ周流シ内外ニ
 循環シ終ニ顔面肢體ノ皮表ニ透見スル所ノ纖絡ノ
 梢末至微至細ノ處マデモ悉ク濫流普達スルカ故ニ
 其汚液ノ自家ノ微黃失常ノ色ヲ皮上ニ發見スルナ
 リ○然レバ此病ヲ發スルノ原由甚ダ多端ナルヲ知
 ルベシ何トナレバ右ノ如キ良血液ヲ製造スル機能
 ヲシテ減弊セシムルノ諸因ハ皆此疾ヲ發スルノ原

第九章

由ニシテ。盡ク是ヲ枚舉スベカラザレバナリ

上章ノ餘義ヲ申明ス

若シ夫ノ良血液ヲ製造スルノ十分ニ成遂ズシテ。半生未熟ノ汚液ヲ生シ。顔面肢體悉ク色澤ヲ失テ萎黄色ヲ現シ。身肢懈惰。動作ニカナキ等ノ症ヲ發スル。凡ハ早不^ハ早^ヤ前ニ説ク所ノ病因。既ニ體中ニ生スルナリ。夫レ生活ノ身體ニ於テハ。諸液ニ兩箇ノ常道アリテ互ニ相行ハレ。必ス是ニ從ハザルヲ得ズ。其常道ト云ハ。一ニハ諸液。皆生氣ノ運行ニ順ヒ。ヨク製造ヲ成シ遂テ。恒ニ百體ヲ維持保續シ。一ニハ諸液。皆生氣

ノ運行ヲ離レテ。自己ノ性ニ從テ腐壞スルナリ。順ヘバ則チ成リ。順ハザレバ則チ敗ル。此ヲ兩箇ノ常道ト云。故ニ其半生未熟ノ液モ必ズ變壞スルノ道アルナリ。何トナレバ元運生氣甚ダ衰弱スル凡ハ。半生未熟ノ液モ生氣ノ運行ヲ離テ。必ズ自己ノ性ニ任セテ縱ニ其腐壞ヲ逞スルヲ得ルナリ。○右ノ如ク竟ニ變シテ壞液ト爲ル凡ハ。是レ壞液病ノ張本^第。是ヲ以前ノ半生未熟ノ液ニ比スレバ。已^大ダ惡厲ナリトス。何トナレバ半生未熟ノ液ニシテ。未ダ腐壞ニ至ラザル間ハ。若シ生氣ノ運行強壯ナルノ力ニ依^ヨ賴テハ。廢^{コト}幾^{カク}ハ

猶能夕再ヒ良液ニ復スベシ。然在既ニ縱ニ變シテ腐
壞セルニ及テハ。生氣ノ運行強壯ナルノ所爲ニテモ。
再ビ良液ニ復スルヲ能ハザルナリ。故ニ此病ハ久キ
ヲ經ルホド逾治シ難シトス。萎黃病ハ半生未熟ノ液
テ既ニ腐壞スル片ハ即チ壞液篇ニ論ス。是ヨリ一變シ
スル諸病トナル故ニ逾治シ難シトス。○諸液右ノ如
ク。生氣ノ運行ヲ離レ。自己ノ性ニ任テ腐壞スル片ハ。
其性ノ變化スルヲモ。亦一樣ナラズ。次ニ説ク所。○唯
其諸液。身體ヲ榮養シ。性命ヲ保全スルニ不利ナルハ
一ナリ。然在其性ニ酷厲ノ多キアリ。少キアリ。又ヨク
變シテ稀涼液トナリ。若クハ粘稠液トナリ。又此ニ酷

第十章

厲ヲ兼ルアリ。或ハ是ナキモアリ。○其諸液既ニ半生
未熟ノ性ヲ離レ。逾縱ニ變壞スルニ至テハ。身體ニ發
スル諸症モ千態萬狀。得テ記載スベカラザルガ故ニ。
此ニ歷舉スルヲ能ハザルナリ。此諸症。次ノ壞
液篇ニ詳ナリ。

萎黃病ノ治法ヲ論ス

胃。或ハ腸ニ蓄積セル物アレバ。吐下ノ劑ニテ能ク除
去ルヲ得ベシト雖在。其汚液既ニ血中ニ混淆シテ。
血脉ノ末梢マデモ彌漫シ。色澤ヲ失フニ至テハ。預メ
先ツ上ニ説ク如キ。製造ノ原ヲ強健ニシテ良液ヲ釀
生シ。惡液ヲ分利排泄セシムルニ非レバ。其本性ヲ失

ヘル汚液ヲ驅除スルヲ能ハザルナリ。故ニ此病ハ思
ノ外ニ治シ易カラズトス。○何トナレバ胃ト腸トハ
飲食ヲ化熟シテ乳糜ヲ製造シ。其製造スベカラザル
物粗滓并ニ無用ノ汚液等ハ洩除スルガ爲ノ機器ナレバ。身體ヲ
榮養スルニ無益ナル液ハ泄除シ。唯其飲食ヲ消化シ。
乳糜ヲ製造スルニ用フベキ。良性ノ液ノミヲ受ルヲ
常トス。是ヲ以テ吐下ノ劑ノ如キ。身體ヲ榮養スルニ
無益ノ者ハ。直ニ泄除シテ乳糜ニ和スルヲ少シ。故ニ
其血中ニ混淆シテ。滿肢體ノ細血絡。萬支別ニ漫延セ
ル惡液ハ。吐下ノ劑ニテ驅除スベカラザルナリ。○然

凡先初メニ於テハ。其汚液ノ胃。及ビ腸ニ鬱聚セルヲ。
吐下ノ劑ニテ滌除スルヲニ意ヲ用ベシ。方ハ第十五
章。第十六章ニ見タリ。○又飲食ヲ節ニシテ消化シ易
キ程ノ分量ニ越シメズ。其製造ノカヲシテ。常ニ其任
ニ勝テ餘裕アラシムベキナリ。又食饌モ擇テ消化シ
易キ物ノミヲ用ベシ。○次ニ胃ノ官能ヲ強健ニシ。稍
大便ヲ通利スル健胃劑ヲ用ベシ。是ニ由テ其飲食ヲ
シテ腐敗スルヲナク。能ク化熟シテ良液ヲ製造セシ
メ。其剩汚滓穢ハ大便ニ通利シテ。其未熟失性ノ汚液
ヲシテ。復新ニ生スルヲ無ラシムベキナリ

健胃散ノ方

盧會 半錢

沒藥 一錢

山柰 二錢

薄荷油 三滴

亞爾鮮鹽 一月

右件散劑トシ分テ十服トシ。一服ツ、用ル一日ニ
三次。○若シ藥酒ト爲シ。或ハ麥酒ニ浸シテ用ント
欲セバ。次ノ方ヲ用ベシ。○意モ用ルハ。麥酒十五
健胃酒ノ方

羌活 漢種者

水楊梅根 各一弓

良薑 四錢

薄荷葉

珊篤里草 各一握

盧會 一錢

諳厄利斯。瀉利鹽 三錢

右件勃的里斯ホツテリス量器ノニ二ノ葡萄酒。或ハ麥酒ニ浸
シ。或ハ水ト葡萄酒。等分ニシテ浸スモ亦可ナリ。○
麥酒。或ハ水酒等分ニシテ浸ス片ハ。葡萄酒ヲ用ル

ヨリハ其液ノ分量ヲ多クスベシ○此藥酒ヲ以テ。
爾茂兒苴ルノルナ 圖ニ一盞ツ、日ニ三次服スベシ。麥酒ニ
浸シタルハ。小麥酒盞ニ 圖ニ一盞ツ、服スベシ○是
ヲ用ルノ間ニ宜ク意ヲ用テ其服量ヲ増減シ。患者
ヲシテ日ニ兩度ツ、例シテ圖ニ上ルホドニ至ラ
シムベシ

此藥ハ久ク用ベキカ故ニ。是ニ馴ル片ハ功ヲ奏スル
ト少クシテ止カレト得ズ。時ニ藥劑ヲ變シテ用ルトア
リ。然ル片ハ次ニ出ス丸子ヲ用ベシ
健胃丸ノ方

沒藥 一錢

乳香

蘇甘沒スカムモ 扭護ニウム 各一兩

薄荷油 三滴

勿ヘ擲チ祭チ亞ア石鹼ア 二錢

右件細末トシ調勻シテ每一錢十五丸トシ。四丸ツ
、用ルト日ニ三次

右ノ諸藥ヲ持久シテ用ルニ因テ。其半生未熟ノ液復マタ
新ニ生スルモトホスト無カ故ニ。其間ニ以前既ニ漫延充溢セ
ル半生未熟ノ液モ。生氣ノ運行ニ因テ化熟シテ。小便

ヨリ通利シ。一ニハ表發ノ蒸氣ヨリ發出スルナリ。故
 ニ此病ハ每次ツキニ他術ヲ須マタズシテ。皆ヨク右ノ藥劑ニテ
 治スルナリ。○此病ハ小便ヲ察スルヲ要タリ。其半生
 未熟ノ液。多ク體中ニ有ル間ハ。小便白色ニシテ稠ク
 且ツ渣オシ多シ。故ニ是ヲ惡徵トス。然レ漸ク清稀ニナ
 リテ。終ニ平常ノ如クナルニ至テハ。多時ナラズシテ
 回復スルノ候トス。是レ體中ノ諸液。既ニ半生未熟ノ
 性ヲ免ルニ因テ。血中ノ液ネハモ其本色ニ復シテ小便
 ニ通スレバナリ。凡ソ血中ヨリ諸液ヲ分利シタル殘
氣トナリ謝シ去ルナリ是ヲ液ハ皆老廢シテ小便汗蒸
云此液清稀ニシテ水ノ如ク味鹹シ

第三章

壞液篇第三

羅甸名ゴルルピチヲ和蘭名ベデルヒング
 ○腐敗熱内伏熱勞瘵膿壞液廢液是ニ屬ス
 壞液ノ大較ヲ論ス

夫レ體中ノ諸液ハ。常ニ必ズ變化ニ羅ルナリ。何トナ
 レバ日ニ用ル所ノ飲食ヨリ諸良液ヲ生シテ百體ヲ
 榮養シ。凡百ノ主用ニ資給シ。其各自ノ主用ヲ成了レ
 バ。漸次ニ老シテ終ニ無用ノ廢液トナリ。出去ノ常道
 ヨリ謝シ去リ。新陳相易リテ新良液ノ諸用ヲ爲スノ
 道ヲ避ルナリ。此皆平全ノ人。生氣ノ運行ニ順テ變化
 スル者ナリ。○然ルニ若シ生氣ノ運行太過強盛ナル

力。或ハ次序ヲ失ヒ。常度ニ順ガルヲアルカハ。既ニ製
 造ヲ成リタル諸液_{液血}モ。今新ニ養ヒノ爲ニ飲食シ
 タル諸液モ。皆同ク變壞ス。是レ一種ノ壞液ニシテ。生
 氣運行ノ失常ヨリ生スル所ノ腐壞ナリ。_{生氣ノ運行}
 ルヨリ生スル壞液ハ。即チ運行ノ太過強盛ナ
 第ニヨリ生スル論スル熱壞液。所謂ル腐敗熱トナリ。終ニ
 云。即チ第五章ニ論スル熱壞液。劇盛熱ノ如キハ。血液腐敗ニ
 至ル。即チ第二章ニ云。熱病篇第六章ニ云。諸眞熱ニ於テ
 脈強ニシテ。數身體大熱スル者ハ。其運行太過ナルノ
 候トス。斯ノ如キ症ハ。小便白。其運行太過ナルノ
 製スル。即チ第二章ニ云。運行次序ヲ失フヨリ生スル壞液トナ
 ル。即チ第二章ニ云。運行次序ヲ失フヨリ生スル壞液トナ
 常度ニ順ガル運動ニ於テハ。腸中糞ヨリ少モ壞液ナ
 スキ者ト雖モ。速ニ壞液ヲ生シ。凡ソ人身ノ諸液ハ。身體

ノ外。温暖ノ處ニ蓄_{タカフ}レバ。必ず自ラ腐敗スルガ如ク。體
 中ニ存スル者ト雖モ。血ノ循環健輸ノ化ヲ離テ獨立
 スルカハ。必ず腐壞ヲ致スナリ。_{腫瘍或ハ打撲傷ニ生}
 如キ是レ諸液ノ自性ヨリ生スル所ノ一種ノ腐壞ナ
 リ。然レ其腐壞スルノ一様ナラズ。或ハ速ナルアリ。或
 ハ遅キアリ。或ハ多キアリ。或ハ少キアリ。又其液ニ脂
 油多ケレバ。腐壞スルモ亦逾惡厲ナリ。然レバ生氣ノ
 運行ヲ以テ右ノ如キ諸液。自性ノ變壞ヲ防護スル
 能ハザルカハ。則チ壞液ト名ル一種ノ病ヲ生スルナ
 リ。_{第二章ノ膿壞液。第二十八章ノ廢液腐壞。皆其自性ノ}

增訂和撰要 卷二 七 風雲堂藏

第三章

壞液ニ係屬ス。又此一節萎黃病編第十九章ノ説ト應照ス。併考フベシ。○或ハ體中曾テ腐敗ヲナスノ起原ナシト雖モ。亦外物ノ入來テ腐敗ヲ作スヲアリ。即チ惡氣ニ傳染シ。或ハ腐敗ヲ作ス飲食ヲ用ルニ因テ疫疾及ビ各地一般流行ノ病ヲ發シテ腐敗ヲ作スガ如シ。是レ天行惡氣及ビ飲食ヨリ生スル所ニシテ。是ヲ第三種ノ腐壞トス。前ノ二種ニ次トス。是レ天行惡氣或ハ胃腸ノ腐敗液ヨリ生スル所ノ腐敗熱ヲ云。即チ下ノ第二十五章ノ熱壞液ナリ。又熱病篇第五章ニ云。胃或ハ腸中腐敗液アルヨリ發スル諸熱ハ定リタル次序ナシト是亦腐敗熱ナリ。又胃腸腐敗毒アルヨリ發スル熱病第十五章第十六章ニ論ス。壞液ノ病因ヲ論ス。

夫レ壞液ノ繇テ生スル所三道アリ。○其一ハ生氣ノ運行太過強盛ナルト。或ハ次序ノ錯リ常順ヲ失フトニ因ル。是レ前章ニ云。○其二ハ腐敗ヲ生スル物ノ血液ニ混淆スルニ因ル。前章ニ云。第○其三ハ生氣ノ運行ヲ以テ諸液ノ自性ヨリ生スル腐壞ヲ防護セザルニ因ル。前章ニ云。第○右ノ三道ヨリ諸液ニ腐敗ヲ生スルガ故ニ。其因甚タ多端ナリ。是ヲ例スルニ劇盛熱ノ如キハ血液腐敗ニ至ルヲ屢多シ。劇盛熱。羅旬名ハ蘭名ヘヒゲ。コルツヘヒゲハ劇盛過烈ノ義。コルツハ熱病ナリ。又一ニヘテシケルベ。コルツト名クヘテハ壯熱ノ義シケルハ酷厲ノ義ナリ。即然。凡大ニ舉動チ其熱劇盛酷烈ナル熱病ノ總稱ナリ。

增訂和撰要 卷二 第三章 七 風雲堂藏

勞カスル等ニテ太過強盛ノ運行ヲ生シ發熱スル
 アレ也。是ヲ以テ腐敗ヲ作スナシ。此唯身體ノ勞動
 ノミヲ以テ發スル熱ナレバ。血液ヲシテ腐敗セシム
 ルホドニ淹留スルヲ能ハザレバナリ。是レ前章ノ第
 ニ此章ノ第一因ノ太過強盛
 ナル運行ヲ再釋スルナリ。諸腸ノ搐掣。或ハ其次序
 ヲ失ヒ常度ニ順ハザル運動ニ於テハ。腸中素ヨリ少
 モ壞液ナキ者ト雖モ。速ニ壞液ヲ生スルヲ屢多シ。此
 節ハ前章第一種ノ生氣ノ運行常度ニ順ザルノ腐壞
 并ニ此章ノ第一因ノ生氣運行ノ次序ヲ錯ル腐壞ノ因
 ヲ證シ説クナリ。○第五十八章ニ云。其胃ト腸トノ運
 動。常度ニ逆戾スル者。假令ハ婦人子宮衝逆病ノ如シ
 ト又第百四十三章ニ云。稟賦脆弱ナル婦人ハ其初メ
 腹中ノ諸藏ニ於テ繁亂攪擾シテ次序ナキ運動ヲ爲

ス。トヲ覺エ。是ヨリ漸ク增長シテ上部ニ衝逆スト又
 神經液變壞シテ酷厲稀涼ノ液トナリ。搐掣及ビ子宮
 衝逆等ヲ發スルヲ痙攣搐掣篇第百四十三章ニ出ツ。
 併考フベシ。○腸ヲ分テ六腸トス故ニ諸腸ト云。名義
 第二章ニ註ス。○或ハ腐敗セル飲食ヲ用ヒ。或ハ傳染ス
 ベキ惡氣ヲ口鼻ヨリ吸引シテ惡厲ナル腐敗毒ヲ血
 液ニ生スルヲ日ニ多ク歷驗スル所ナリ。是レ此章ノ
 前章ニ云。第三種ノ腐壞ヲ釋ス。凡ソ邊境異地ニ客行
 シテ汚水ヲ飲ミ。鮮蔬良食ヲ欠キ。或ハ疫氣ヲ吸入ス
 レバ。多ク腐敗。○或ハ未ダ曾テ腐敗ノ飲食ヲ用ヒザ
 熱ヲ患ルヲ云。レ疝壞液多ク體中ニ鬱聚スルヲアリ。此症。衆人多ク
 怪ム所ナリ。然レ是レ生氣ノ運行。諸液ヲ保護維持ス
 ルニ足ラズシテ。諸液ノ自性ニ任セテ縱ニ腐壞スル

一ヲ察セザレバナリ。是ヲ以テ稟賦虛弱ノ人ハ生氣
 ノ運行微弱ナルヲ以テ諸液自性ノ變壞ヲ防護スル
 一能ハズ。自ラ壞液ノ病ニ羅ル一屢多シ。是レ此章ノ
第三因并ニ
前章第二種ノ腐壞ナリ。即チ下ノ第
二十六章ノ寒壞液ノ病是ニ屬ス。○外表ヨリ温煖
 氣。或ハ濕氣ヲ受テ其自性ノ變壞ノ勢ヲ助長スル片
 ハ。其腐壞スル一甚夕迅速ナリ。是レ此章ノ第三因ノ
餘義ヲ述べ。又前章第
二因ノ腐壞スル一。或ハ速ナルアリト云ノ因ヲ
述べ。又下ノ第二十五章ノ熱壞液ノ論ト應照ス。○故
 ニ濕氣多ク。及ビ温熱ノ地ニ於テハ腐敗ヨリ生スル
 病。殊ニ多シトス。前章第二因ノ腐敗スル一
或ハ多シト云ノ義ヲ述べ

上章ノ餘義ヲ申明ス

第五十章

壞液ハ膿及ビ不成液。即チ萎黃病編ニ云。
半生未熟液ナリ。ト全ク其性
 ヲ異ニスル者ナリ。何トナレバ膿ハ自然良能ノ營爲
 ニテ。疾ヲ治セシガ爲ニ釀成シ設ル者ナルガ故ニ肺
 藏ノ主能ニ因リ。痰唾及ビ
吐膿。特ニ腎藏ノ機關ニ因テ。小便
便自
 然ニ其膿ヲ血中ヨリ分利シ出シテ驅除スルナリ。及肺
及
腎ニテ膿ヲ分利スル一熱病篇第六章。欬嗽
不成液
篇第七十五章。胸脇痛篇第八十三章ニ出不成液
 モ亦生氣ノ運行强健ナルニ依賴テハ。三ノハク
度幾ハ再ビ良
 液ニ復スベク。或ハ縱ヒ十分ニ復スル一ヲ得ズトモ。
 無用ノ廢液トナリテ新陳相代リ除キ去ル一ヲ得ベ
 シ。然ルニ壞液ニ至テハ曾テ良液ニ復スル一ナク。尚

且元運生氣ト雖モ亦自ラ其腐壞ヲ遁レ難シ。予亦體中ニ於テ是ヲ良液ヨリ分利シ除クノ器ヲ得ルヲナシ。故ニ腐壞ヨリ生スル諸病ハ。危險ニシテ甚ダ治シ難シトス。○壞液。既ニ體中ニ生スルニ及ンテハ惡厲ノ勢。日ニ增長シ。漸次ニ殘害スベキ苛毒ノ性トナリ。自餘ノ良血液ト混淆シテ悉ク全身ノ衆器諸液ヲ腐壞ス。故ニ諸漏泄スル所ノ液痰唾汗尿下利失血瘡瘍敗膿等ヲ云惡臭。稀涼ニシテ色モ亦變異シ。其性極テ惡厲ニシテ是ニ觸ルレバ侵蝕シ。其漏泄スルヲ多シト雖モ其病毫モ寬解セズ。曾テ回復ノ期ナキニ至ル。是ヲ以テ其腐敗

第四章

ノ能ク速ニ增長スルヲ察スベシ
壞液ノ治法ヲ論ス
壞液ハ再ビ良液ニ復スベカラズ。又身體ニ於テ是ヲ良液中ヨリ分利シ除クノ器ナキガ故ニ。其治法唯壞液ヲシテ惡厲ニ進マシメズ。又其新ニ滋生スルヲ遏絶シ。勉テ是ヲ平常ノ道路表發ノ蒸氣汗大小便等ニ從テ。漸次ニ泄除セシムルノ藥劑ヲ用ルニ在リ。○予醫術ニ於テ研究歷試スルニ。壞液ノ首稱スベキ者。二種アルヲ發明セリ。其一ヲ熱壞液トス。壯熱及ビ熱病ノ諸症ヲ兼ヌ。其二ヲ寒壞液トス。惡寒シテ熱微ク。或ハ熱ヲ兼

ルナシ○疫疾及ヒ流行諸病ノ如キ其壞液ノ性各異ナリト雖モ皆熱壞液ニ他ナラザレバ爰ニ悉ク細別セズ唯此寒熱二種ノ壞液ノ治法及ビ藥劑ヲ示スノニ寒熱二種ノ治法藥劑ニ由テ統括シ治スベキヲ云

熱壞液ノ症治ヲ論ス

是即チ腐敗熱ナリ。又此腐敗液ヲ一ニ腐敗膽液ト名ク。第二百四十五章ニ出。併考ベシ

炎熱ノ國。卑濕ノ地。盛夏。或ハ雨濕多キ時候ニ於テハ一種ノ熱病ヲ患フ。其熱替留シテ間歇セズ。時々増發スルナリテ時ヲ定メズ。自汗シテ大ニ津液ヲ泄シ。或ハ下利シテ多ク汁液ヲ瀉スト雖モ病患。毫モ寛解

セズ或ハ出血スル所アリ。或ハ刺絡シテ瀉血スルヲハ初メハ輕快ヲ得ルガ如クナレ。爾後損害多キヲ覺エ。患者被覆スレバ汗大ニ淋漓シ。發揭シテ清涼ニスレバ煩悶シ。食ヲ思フノ機衰へ。總テ食物ヲ嫌ヒ惡云己ダ羸瘦シ。其熱ノ度ニ比スレバ衰弱スルナリ甚シ○斯ノ如キ諸症候ヲ發スル者ハ。其血液腐敗シ。其性侵刺スベキ一種ノ酷厲毒トナリテ熱ヲ發スル者ナリト知ルベシ是即チ熱壞液ナリ○右ノ患者ハ開豁セル乾淨ノ室ニ居シムベシ。否レバ濕氣ニ因テ表發ノ蒸氣ヲ壅遏シ其腐敗ヲシテ逾增長セシムレバナリ。然レ蒸

增訂内科要 卷二 十五

氣ヲシテ閉塞セシムルホドニ寒涼ナラシムベカラズ。又其腐敗ヲシテ助長セシムルホドニ温蒸セシムベカラズ。唯頻々ニ鮮新清爽ノ氣ヲ迎へ引ヲ宜シトス。其傳染汚敗ノ氣ヲ以テ。更ニ逾其腐壞ヲ益テ無ラシメンカ爲ナリ。又總テ肉ニテ製シタル飲食ヲ禁シ。唯麥粉ニテ製シタル者。或ハ菘菜。蒿苣。酸模ノ類ニ少シノ脂類ヲ調和シ用ヒ。或ハヨク熟セル園蔬菜根ニテ作ル者ヲ佳トス。然シテ左ノ飲劑ヲ用ベシ
熱壞液ヲ治スル清涼飲ノ方

酸模清涼飲

玫瑰花 半握

酸模根 一多

精大麥 一多半

水 二十多

右件合シテ奄閉セル磁罐ニ入レ。煮テ麥熟スルニ至リ。毛篩ヲ用テ濾過シ滓ヲ去リ。枸橛汁。或ハ栗殼子ノ昆設爾弗名少許ヲ調和スベシ。○其熱大ナル者ハ。消石少許加フベシ。大便壅滯スル者ハ。答末林度少許加フベシ。○此飲劑ヲ稍變センコトヲ欲セバ。大麥ニ代ルニ雀麥ノ粗碎。或ハ蒸餅名ヲ用ベシ。○其熱并ニ衰弱悉ク復治シ其壞液。表發ノ蒸氣ヨリ

增訂内科要 卷二 十六 風雲堂藏

盡ク出去ルマデハ。右ノ飲劑ヲ通シテ用ベシ。○不寐ヲ兼ル者ハ右ノ飲劑ニ罌粟球一顆ヲ加ヘ煮テ用ベシ。○其熱ヨリハ衰弱ノ症。太甚ナル者ハ右ノ飲劑中ニ列印イ設酒セ少許ヲ加フベシ。

右ノ治法ニテ熱壞液。所謂腐敗熱ノ初發。方ニ増進セントスルヲ遏止シ。其兇猛ナル諸症ヲ抑制スルナリ。○亞墨利加地方ニ於テ多ク患ル所ノ專ラ門脉ノ血腐敗スル一種ノ腐敗熱アリ。此症ハ初ニ先ツ數下劑ヲ用テ。其腐敗ノ汚物ヲ蕩滌驅除シ。然シテ清涼飲ヲ用ベシ。是ヲ用ルル早キホド逾宜シ。方ハ共ニ第十二

章ニ見タリ。其候初發。腰疼。胃ノ部ニ當テ苦悶。惡心。精力屈脱。皮膚乾燥。小水少クシテ赤ク。脉數ニシテ弱ナリ。上ニ論スル如キ炎熱ニシテ濕氣多キ地ニ於テハ。其毒僅ニ一兩日モ體中ニ蘊蓄停住スレバ其腐敗速ニ增長シテ氣息惡臭ヲ發シ。口苦ク或ハ綠色ナル腐穢ノ物ヲ吐シ。齒牙舌上腐穢ノ粘液布著ス。終ニ冷汗漏泄シ。手足冷テ顫振シ。或ハ黒物ヲ吐シ。或ハ效略シテ出ル物皆黑色。或ハ效シテ血ヲ吐キ。眩暈昏冒。謔妄。搐掣等ヲ發シテ死ス。是レ腸間膜中ニ在ル所ノ門脉ニ熱壞疽ヲ生シ。其腐敗セル黑色ノ液。及ビ許多ノ

ノ如クシテ温飲シ。稱シテ香美ノ飲料トス。又大ニ胸
 肺心胃ヲ強壯ニスル効アリ。其下利スル所ノ液腐敗
 シテ黯黯色ナリ。此飲液ニ似タル然_ナ仍_ナ右ノ下劑
 ヲ以テナリ。又肝崩篇ト併考フベシ。然_ナ仍_ナ右ノ下劑
 ヲ用テ其腐敗毒ヲ滌除スルヲ緊要トス。此ニ由テ猶
 幸ニ救フ_レ有ベシ。若シ其毒體中ニ蘊蓄スレバ必ズ
 死スレバナリ

第三章

寒壞液ノ症治ヲ論ス

内伏熱 勞瘵

壞液ノ名アリト雖モ。其治法ニ於テハ熱壞液ト相反
 シテ。全ク同ジカラザル者ハ寒壞液ナリ。○其疾タル
 増進スルニ漸ク以テシ。日甚_シ一日險重トナル。其人全
 身瘦削シ。初ハ熱ノ發作ナク_{ヤモスレハ}動輒汗出。振寒シテ虛羸

ス。終ニ頗ル熱アルヲ覺フ。是ヲ内伏熱<sub>和蘭名「スロイ
 プ」コールツ「隱伏</sub>
 内潜セル熱ノ義ナリ。伍_ニ都_ニ實函_ニ云。内_ト名_ク。此症
 伏熱ハ日晡發熱シテ微惡寒ヲ兼_又ト。和蘭名_「然_」此
 逾_レ增長シテ羸瘦スルヲ勞瘵ト名_ク。和蘭名_「然_」此
 病ハ欬嗽ナキト。痰沫ヲ吐セザルト。ヲ異ナリトス。症_此
 欬_アレバ是_ニ○此病ヲ發スル人ハ。元來生氣ノ運行微
 ヲ肺瘍トス。弱ナルニ因テ飲食ヲ消化シ。良血液ヲ製造シテ維持
 保護スルニ足ザルナリ。故ニ飲食ハ則チ不成液<sub>半生
 未熟</sub>
 液トナリ。良血液モ漸ク以テ其自性ニ任_セテ渝變シ。
 壞液トナル。斯ノ如ク連綿トシテ止ザレバ。時日ヲ經
 ルニ隨ヒ壞液漸ク增長シ。逾_レ平全ノ常性ヲ離テ。終ニ

稀涼ノ壞液トナリ。身體ヲ榮養スルニ利アラズシテ。却テ散泄漏脱シ易キ者トナルナリ。稀痰自汗盗汗下利尿管崩潰出等

○此病ニ於テ投スルニ清涼ノ劑ヲ以テスレバ患者差輕快ヲ覺ルガ如クナレ。凡必ズ日ニ損害ヲ増ス。其故ハ是ニ由テ生氣ノ運行減損シテ其腐壞ヲ防クニ足ラズ。諸液ヲシテ逾イヨク其自性ニ任セテ變壞ノ勢ヲ縱ホシマニセシムレバナリ。又温煖ノ劑ヲ與レバ是ヲ以テ其運行ヲ益シ。其壞液ヲ衝動シテ忽チ熱ヲ増發シ。諸症更ニ險惡ニ進メバナリ。故ニ患者モ亦此ニ方共ニ服スルニ堪ズシテ厭イトヒ惡ムニ至ル。然レバ清涼ヲ以テ

スレ。凡治セズ。温煖ヲ以テスレ。凡亦治セズ。啻ニ治セザルノニナラズ。却テ劇ヲ増シ苦ヲ添ルガ故ニ。不學未熟ノ徒ハ術斯ニ窮リ。止ヲ得ズシテ苟且患者ノ意ニ任セ。唯其劇ヲ増シ苦ヲ添ルヲナクシテ治功ヲ奏スベシト見ユル藥劑ヲ處シテ日ヲ消カクリ。終ニ必ズ救レザルニ至ルナリ。○此壞液ノ病。世ニ稱シテ勞瘵トスル者。左ニ列スル療法ヲ以テ屢治驗ヲ得タリ。○其治法ハ温煖ニシテ腐壞ヲ遏止スル藥劑ヲ用ヒ。且ツ其熱ノ増發ヲ覺ルヲナキホドニ服量ヲ小ニシ。稍々ニ續テ用ル中ニ漸次ニ其量ヲ増加ルナリ。是ヲ經

驗スルニ其服量ヲ増フ。初ニ比スレバ三倍ノ量ニ及
 テ其熱増發スルヲナキ者ハ。則是一大佳事。以テ其全
 功ヲ期望スベキナリ。○予ガ治法ノ標準トスル所ハ。
 樹脂類ノ藥ニ因テ諸液自性ノ腐壞ヲ遏止シ。生氣ノ
 運行ヲシテ稍々ニ増益シテ以テ良液ヲ製造セシム
 ルナリ

寒壞液ヲ治スル丸子ノ方

護謨回生丸

- 乳香
- 蘇合香各一錢
- 安息香各一月

第七章

沒藥 一錢

瓦爾拔奴謨二錢

拔爾撒謨字露 適宜

右件合シテ每一錢二十九トシ。橙皮末ヲ衣トス。○
 初ハ一日ニ四次。一丸ツ、服シ。次ニ是ヲ益テ二丸
 ニ至リ。夫ヨリ次第ニ増テ三丸。或ハ四丸ツ、用フ。
 初メ一頓ニ多ク用レバ。其運行ヲ衝動シテ熱ヲ發
 スレバナリ

膿壞液ノ症治ヲ論ス

夫レ膿ハ自然良能ノ所爲ニテ疾ヲ治スルガ爲ニ製

設スルノ明白ナリ膿ノ説第四然レ久ク體中ニ鬱留
章ニ出ツ滯止スル片ハ變シテ惡厲ナル液所謂敗血漿
第六章ニ註ストナルナリ○或ハ膿ニ惡厲ナル毒凡ソ體中ニ在ル
所ノ病毒ノ惡厲ナル者ヲ云混淆スル片ハ亦能ク變シテ腐壞スルト他ノ
諸液ノ如シ○然レバ膿ト雖モ腐壞スルガ故ニ膿ハ
是レ病ヲ治スルノ具ナリトシテ恬然トシテ其愈ル
ヲ俟ツヲ得ズ故ニ速ニ其腐壞ヲ過ル藥ヲ用テ是ヲ
治スルト最モ緊要タリ○左ノ方尤モ良効アリ
膿壞液ヲ治スル飲劑ノ方
排膿祛壞湯

山蘿蔔草

龍牙草

各一握

牛蒡

舍謨モイムベイ字クハ黥謨根ハ

各一弓

水

十六弓

白葡萄酒

八弓

右件合シテ奄閉セル罐ニテ煮。麥酒盞ニ一盞ツ、
温服スルト日ニ數回スド

膿壞液ハ速ニ治療ヲ加フベシ。若シ延滯スル片ハ勞
瘵ニ陷リ。或ハ肺瘍ヲ兼發スルトアレバナリ○此病
ヲ歷試スルニ其膿ヲ吐痰ニ因テ除クカ。或ハ小便ヨ

リ通泄スルヲ宜シトス。故ニ右ノ飲劑ヲ用ルノ間ニ
又痰ヲ吐セシメ。小水ヲ利スルノ丸藥。或ハ散劑ヲ兼
用スルヲ最モ緊要タリ

豁痰利尿丸ノ方

的列並底那名 四錢

右一味。先ツ水少許加へ。煮テ丸スベキヲ候テ次ノ
諸品ヲ加フ

- 乳香
- 沒藥
- 琥珀 各一錢

舍謨亭點謨根名 適宜

右件調勻シ中等ノ大ニ丸シ。甘草ヲ衣トシ。三四丸
ツ、服スルヲ日ニ三次此ニ準 苧豆ノ如シト中等ノ大

豁痰利尿散ノ方

- 乳香
- 琥珀
- 蘇合香 各半錢
- 舍謨亭點謨根 末
- 鹿角灰 各一錢半

第五章

右件散劑トシ分テ十八服トシ。一服ツ、用ル七日ニ三次

廢液腐壞ノ症治ヲ論ス

平全ノ人。身體ヲ榮養スルノ諸良液ト諸病ヲ生スル惡液トノ外ニ。又一種ノ液アリ。是ヲ廢液ト謂フ。是レ平全ノ時ニ在テハ生氣ノ運行ニ順テ善良ナル諸液ヨリ生シ血液。全身ヲ養ヒ。諸液ヲ分利シ。其諸用ヲ濟終リタル無用ノ廢液ハ諸竅ヨリ排泄ス。故ニ善良ノ諸液ヨリ生スト云大小便。蒸氣等ヨリ排泄シ。新陳相代テ老廢シ去ル者ナリ。○廢液ハ謝シ去ルヲ常トス。然ルニ大便壅滯。小便不利。表發ノ蒸氣壅遏等ニ因テ廢液。

體中ニ鬱蓄スル片ハ。其一處ニ瀦留スルモ。或ハ周身ニ運行スル者モ。皆同ク變壞シテ惡厲ノ性トナリ。遂ニ諸病ヲ生スルナリ。故ニ是ヲ治スルノ法。唯其各自ノ道路ニ從テ是ヲ驅除スルニ在リ。然レバ其諸道ノ壅塞セルヲ察セバ。藥劑ヲ用テ各是ヲ開達シ治スベキナリ

瀉利飲ノ方

梅過瀉利飲

梅那葉

二錢

答末林度

一弓

諸厄利斯。瀉利鹽

過泥子アチス 各一錢

右件合シテ水。半比ヲ用テ浸シ。藥氣ヲ出シ。漉過シテ一頓ニ服ス

利尿散ノ方

琥珀利尿散

琥珀 一錢

鹿角灰 二錢

杜松實油名 十滴

右件合シテ散劑トシ。分テ十服トシ。日ニ用ルルニ服

發汗糕ノ方

的里亞加發汗糕

的里亞加名

雜腹蘭

安質沒扭名 若波烈名 各半月

白罌粟舍利別 適宜

右件合シテ調勻シ。每夜服用ス

增補重訂内科撰要卷二終

