



洋学文庫
文庫8
C 28
3



增補重訂内科撰要卷三

遠西玉函涅斯垓我爾德兒著

津山

宇田川

玄隨

晉

譯

男

玄真

麟

校註

加賀

藤井

方亭

俊

增譯

失苟兒陪苦篇第四 シケウニルボイシク 羅甸名「スコル」

失苟兒陪苦ノ大較ヲ論ス

夫レ草木ノ品類蕃庶ナルモ其種相亂レズ。各自其族ヲ以テ區ニシテ別形ヲ爲シ。生々シテ其種ヲ爽ヘズ。

第二十九章



必ズ其初ニ象シテ肖ザルノ植物ナク。莖。葉。花。實。根。莖。ニ至ルマデ。盡ク其族ヲ以テセズト云フナシ。是誰カ爲ス所ゾ。一ニ皆造物者ノ全能ニシテ人其如何ニシテ斯ノ如ク諸種ノ形ヲ造ト云フヲ思議スルヲ能ハズ。然^ニ要^{スルニ}之^ニ只得テ其實ノ形ヲ以テ其族ヲ分チ。其葉ノ區ナルニ因テ其種ヲ辨別スルノミ。人身ノ疾病有テ多端ナルヲ。猶草木ノ品類蕃庶ニシテ^ニ卒^ニ名^ニ狀^スベカラザルガ如ク。其各自ノ諸症ヲ現スルヲ。何ヲ以テ其然ト云所以ヲ知ルヲ能ハズト雖モ。各其種族アリテ是ヲ現スルヲ。亦猶草木ノ莖。葉。花。實ヲ現スルガ

如ク。此ヲ以テ是ヲ推サバ。諸病人種族得テ知ルベキノミ。○失^シ苟^ル兒^ル陪^ル苦^クノ疾タル。自性ノ壞液^{前篇}ト其族ヲ同フシテ其種ヲ異ニスル者ナリ。故ニ固^{モト}ヨリ壞液ノ諸症ヲ具フト雖モ又別ニ一種ノ諸症候ヲ兼發スルガ故ニ此ヲ壞液ノ一種トシテ更ニ失^シ苟^ル兒^ル陪^ル苦^クト名ルナリ。是ヲ以テヨク其症候ヲ認得テ此ニ相類似セル諸症ト混スルヲナキヤウニ辨別センヲ要スルノミ。○若シ自性ノ壞液病ヲ患ルト上ニ記ス如クニシテ又身體非同小可^{ツ子ナラザル}懈惰勞倦ヲ覺エ。臆股ニ於テ殊ニ甚ク或ハ齒搖キ黧黑色ヲ帶ビ或ハ齒斷^{ウレミ}黪澹ニ

第三章

シテ平常ノ色ヲ失ヒ。若クハ腐爛シ。是ニ觸テ出血シ
 易ク或ハ口氣臭穢或ハ打撲外傷アラズシテ身體各
 處青色ニシテ赤ヲ帶ビ或ハ黯楮ノ斑ヲ發スル片ハ
 則是レ失^シ苟^{ケル}兒^ル陪^{ボイ}苦^クノ病ニ罹^カルノ人ト謂ベキナリ醫宗
金鑑ニ載ル青腿牙疳ハ即此病ノ一種ナリ
 失^シ苟^{ケル}兒^ル陪^{ボイ}苦^クノ分別ヲ論ス
 此疾ハ壞液ノ一種ナレ^レ其諸症候皆悉ク自性ノ壞
 液病ニ發見スルニ非レバ別ニ一種ノ病原有テ此ニ
 兼夾シ來ルト知ルベシ。然レバ是レ一種ノ症候ヲ見
 ハス失^シ苟^{ケル}兒^ル陪^{ボイ}苦^クノ毒ト云ノ外ニ是ヲ言^フ能ハザル

第三章

ノミ ○然^レ其毒寒壞液或ハ熱壞液ニ副^シテ發シ。或ハ
 稀涼或ハ粘稠ナル壞液ニ混シテ發スル片ハ啻^ダニ其
 症候ノ大ニ異^トナルノミナラズ其治法モ亦同ジカラ
 ス。且ツ其毒ノ多少ト其體中ニ滯止スルノ新久トニ
 從テ亦其症ヲ異ニスルガ故ニ此病ハ甚ダ紛錯シテ
 疑似決シ難キ如^クノ症候ヲ發スル^ルアリ。是ニ由テ未
 熟ノ徒ハ其症候ノ辨別シ易カラザルガ爲ニ大ニ困
 難ヲ致ス^ル鮮少ナラズ
 失^シ苟^{ケル}兒^ル陪^{ボイ}苦^クノ病因ヲ論ス
 諸液ヲシテ其自性ヨリ腐壞セシムルノ諸因ハ即チ

失苟兒陪苦ノ因トス。假令ハ久ク消化シ難キ食物ヲ用ヒ或ハ怠惰シテ動作セズ。因テ生氣健運セズシテ良血液ヲ製造スルヲナク或ハ身體虛衰シテ久ク常ニ復セザルヲアリ或ハ卑濕ノ地ニ住シテ筋膜ノ維結。肉脬ノ衛固總テ纖維ノ收固弛弱縱解スル等ノ如括約ノ精カヲ云シ。右ノ諸因多少相會シ能ク諸液ヲシテ腐壞セシメ以テ此病ヲ發スレト是ヲ壞液性ノ失苟兒陪苦ト名クベシ。眞ノ失苟兒陪苦トハ名ケザルナリ○但右ノ諸因アリテ是ニ加ルニ其住處ニ一種ノ腐敗ノ氣アリテ日常吸引シ感觸スル片ハ其血液ニ於テ更ニ一

第三章

種ノ腐壞ヲ生シ。通例ノ壞液病ト異ナル一種ノ症候ヲ發ス。故ニ是ヲ眞ノ失苟兒陪苦ト名ルナリ○若シ生氣ノ運行強健ニシテ能ク諸液ヲ衛護シ。自性ノ腐敗ニ至ラシメザル片ハ右ノ感觸ヨリ來ル所ノ眞ノ失苟兒陪苦ノ腐壞モ亦生スルヲナシ

上章ノ餘義ヲ申明ス

失苟兒陪苦ニ於テハ必ず兩箇ノ病原ヲ併合ス。即チ諸液ノ自性ノ腐壞ト。一箇ノ失苟兒陪苦ノ毒トナリ。故ニ此病ハ先ツ其兩箇ノ症候アルヲ察スベシ。是レ一ニハ其腐壞增長スレバ第二十三章ニ舉ル所ノ

第三章

諸候ヲ發シ。一ニハ失苟兒陪苦ノ毒漸ク滋益シ逾酷厲ニ至レバ壞液ニ發スル諸症ノ外ニ更ニ又幾多ノ惡症ヲ發スルナリ。○失苟兒陪苦ノ毒ニ稀涼ナル壞液或ハ粘稠ナル壞液ヲ兼子或ハ第二十五章。第二十六章ノ熱壞液或ハ寒壞液ヲ兼ルガ如キハ其症候并ニ治法モ大ニ異ナリト知ルベシ。

失苟兒陪苦粘稠ナル壞液ニ混シ發スルノ症治ヲ論ス。

上ニ説ク所ノ失苟兒陪苦ノ自家ノ症候ヲ發見シ。是ニ加ルニ肢節膨然トシテ浮腫シ。冷テ疼痛シ。其痛鈍

ニシテ深キ者ハ是レ失苟兒陪苦ノ毒粘稠ナル壞液ニ混淆スルノ候トス。其治法。患者ヲシテ徐々ニ身體ヲ舉動セシメ。且ツ其肢體ヲヨク摩擦撫循シ。移シテ乾淨ノ地。温暖ノ處ニ住セシメ。又温暖ニシテ凝結ヲ解ノ失苟兒陪苦劑ヲ用ルヲ緊要トス。

温暖解凝ノ失苟兒陪苦ヲ治スル方 **解凝山萸菜酒**

山萸菜葉

生鮮者 三握

沙蘿蔔根

生鮮者 一弓

橙皮

生鮮者 半弓

右件硝子蠶ニ入レ。

勃的利斯

ニニッノ白葡萄酒ヲ

加テ密閉シ。浸シテ藥氣ヲ泡出シ。爾默兒^ル苴^チ 一
盞ツ、服スル^モ日ニ一次若クハ三次

右ノ藥品ハ必ス生鮮ナルヲ用ベシ然^レ凡^レ是ヲ得ベカ
ラザル片ハ。左ノ方ヲ用ベシ

香竈解凝露

又方

山^ワ菴^カ菜^ビ精^名 二^勺

迷迭^名香精^名 一^勺

橙皮油^名 十^滴

沒藥^名 丁^名幾^名去^名爾^名 二^錢

右件調勻シテ。硝子壘ニ入レ。四十滴許ツ、葡萄酒

第三章

少許ニ加テ服スル^日ニ數度○初メハ分量少許
ツ、服スベシ。一頓ニ多ク用レバ暴^ニ其凝滯セル
血液ヲ驅逐シ。蕩激シテ害アレバナリ
失^シ苟^ク兒^ル陪^ボ苦^ク。稀涼ナル寒壞液ニ混シ發スルノ症
治ヲ論ス

患者羸瘦シ。稀涼ニシテ酷厲ナル液ヲ多ク漏泄シ。肢
節寒痛シテ游走スルハ是レ失^シ苟^ク兒^ル陪^ボ苦^クノ毒。稀涼ナ
ル寒壞液ニ相混シテ發スト知ルベシ。治法宜ク強壯
ニスル失^シ苟^ク兒^ル陪^ボ苦^ク劑ヲ用ヒ。其液ヲシテ大ニ漏泄ス
ル^日無ラシムルヲ緊要トス

強壯ニシテ失苟兒陪苦ヲ治スルノ方 **壯元睡菜酒**

睡菜草 三握

枸橼皮

良薑 各一弓

右件勃的利斯（名）ニニツノ葡萄酒ニ浸シ藥氣ヲ泡出

シ。初ハ決爾幾（名）ニ半盞ツ、服スル一日ニ三次。爾

後ハ稍増シ服スベシ

失苟兒陪苦粘稠ナル熱壞液ト混シ發スルノ症

治ヲ論ス

夏暑炎熱シテ雨濕多キ候。或ハ熱國ニ於テ失苟兒陪

第三章

苦ノ症候ヲ見ハシ。甚タ惡臭アリテ粘稠ナル腐穢ノ物ヲ通利シ。口中齒牙ニ膠粘ノ汚液多ク布著シ。身體大ニ虛脱シ。壯熱燒ガ如クナルノ症ヲ兼ルハ是レ失苟兒陪苦ノ毒。粘稠ナル熱壞液ニ混淆シテ發スト知ルベシ。此症ハ清涼ニシテ粘稠ヲ稀解スル失苟兒陪苦劑ヲ用ベシ

清涼解凝ノ失苟兒陪苦ヲ治スル方

涼解乳清飲

乳清 （名） 十六弓

答末林度 （名） 半弓

純精酒石 （名） 一錢

右件調勻シテ飲劑トシ。日ニ一劑ヲ用フ。但シ是ヲ用テ下利過多ナル者ハ左ノ方ヲ用ベシ

又方 **清爽酸枸湯**

酸模葉 生鮮者 四握

枸椽 二個

右件合シテ磁罐ニ入レ大約。勃的利斯ニ二ツノ水ヲ加ヘ。煮テ瀘過シ。砂糖少許ヲ加テ味ヲ美ニシ。酒盞ニ一盞ツ、用ル日ニ數次○患者大ニ虛脱スル片ハ方中ニ列印設酒名少許ヲ加フベシ○若シ乳清或ハ生酸模ナキ片ハ栗リ蹙子ベス名桑椹。櫻實。等ニテ

墨主章

製シタル昆コ設爾弗ル名ヲ適宜ノ飲液ニ和シ用テ其

闕ヲ補ベシ

失シ苟兒陪苦ル。稀涼ナル熱壞液ト混シ發スルノ症

治ヲ論ス

失苟兒陪苦ノ酷厲ナル毒。稀涼ナル熱壞液ニ混淆スル片ハ一種ノ内伏熱ヲ發シ。熱セル酷厲液ヲ漏泄スルナリ。此症ハ收斂シテ清涼ニスル劑ヲ用ベシ
收斂清涼ノ失シ苟兒陪苦ルヲ治スル方 **清斂酸柳湯**

酸模根

羊蹄根

各二弓

玫瑰花 一握

御柳皮 二錢

右件合シテ勃的利斯ボツテリスニニツノ水ヲ加テ煮ル爾默兒

苴ケニ一盞ツ、服スルケ日ニ數度〇是ヲ用テ其

稀涼ナル液ノ漏泄スルヲ俄頃ニ閉止スルニハカナキ

ヤウニ意ヲ用テ將息スベシ〇或ハ右ノ劑ヲ用テ

清涼ニ過ルケアラバ方中ニ赤葡萄酒少許ヲ加フ

ベシ

增補

胃寒篇第五 羅甸名コレイサ和蘭名ブルコウドヘイド

第五章

胃寒ノ病タル多ク稀涼ニ酷厲ナル鼻涕ヲ漏泄ス

胃寒ノ清涕鼻中ノ膜ヲ侵刺スレバ嚏ヲ發シ肺氣管

ニ觸レバ效ヲ發シ腦膜ヲ刺戟スレバ頭痛ヲ發スル

等皆涕液ノ酷厲ナルノ徵ナリ或ハ稠濁トナルケアリ〇大抵鼻中

頭部肢體皆困重ニシテ少シク發熱ス

第三章

胃寒ノ病因ヲ論ス

日常表發ノ蒸氣トナリテ發泄スル液壅塞シテ内鬱

シ鼻中ノ膜ヨリ分利シ夫ノ稀涼酷厲ナル涕液トナ

リ夥ク漏泄ス故ニ蒸氣ヲシテ壅塞セシムルノ諸因

ハ。皆胃寒ノ因ナリト知ルベシ。然レ温熱ノ氣ヲ被リ。或ハ大ニ身體ヲ勞動シテ蒸氣ノ酷厲ナル時血液熱ナリ。其中ノ鹽氣煎熬セラレテ悍酷厲トニ分遠ニ冷氣ナリ。其蒸發氣モ更ニ酷厲ニシテ過多ナリ。二胃觸シテ其蒸氣ヲ壅遏スルガハ。此病ヲ發スル。殊ニ多シトス。故ニ或ハ四時非常ノ氣候。風氣ノ變更ニ値。或ハ保體ニシテ冷氣ヲ受ルガハ。此病ニ罹ル。屢多シトス。蒸發氣。壅塞スルガハ。皆此病ニ罹ルヲ云。○老人ノ涕膜涕液ヲ吸出スル鼻底衰弱シテ涕多ク滲泄シ。或ハ多ク寒氣ヲ吸入シテ清涕聚テ淋漓スルモ。亦此病ノ類ニ屬スルナリ。○或ハ嚏藥ヲ過用シテ亦此症ヲ發スル者アリ。

第三章

胃寒ノ看法ヲ論ス

鼻涕。稀クシテ熱シ。過多ニシテ歇ギガル等ノ甚キホド此病逾險重ナリ。○較著ナル非常ノ氣候。風氣ノ變更アラズシテ。此病一般流行スル時ハ皆險重トス。○涕膜衰弱セルヨリ涕多ク漏洩スル症ハ。速ニ治セズト知ベシ。

第四章

胃寒ノ諸症ヲ論ス

胃寒ノ症タル。涕多ク漏泄シ。鼻塞テ氣息通セズ。香臭ヲ聞キカズ。頰ヨリ頭ノ前部ニ當テ困重痠痛シ。頭壓ガ如ク痛云。或ハ耳聽エ難ク。或ハ睡ルト多シ。○其毒逾酷

厲トナル片ハ鼻中ヲ刺戟シテ嚏ヲ發シ肺氣管ニ觸テ欬ヲ發シ鼻邊ノ皮膚ニ觸テ赤爛シ腦膜ヲ侵刺シテ劇ク頭痛ヲ發シ眼赤ク淚ヲ流シ或ハ鼻中惡臭ノ瘡瘍鼻痔等ヲ生スルアリ○或ハ其酷厲液胃ニ下レバ食進マズ且消化シ難シ○或ハ總身ニ漫延スレバ熱病或ハ萎黃病等ヲ發スルアリ

第四章

胃寒ノ治法ヲ論ス

治法ハ蒸氣及ビ汗ヲ發スル劑ヲ用テ其壅塞セル廢液ヲ發泄スベシ便チ次ノ傷冷毒篇ニ載ル治方ヲ用ベシ○外敷藥ヲ施ント欲セバ其漏泄スル液ノ性ニ

從テ或ハ乾燥ヲ滋潤シ或ハ酷厲ヲ鈍和シ或ハ温煖ニシ或ハ腐壞ヲ遏止スル劑ヲ撰用スベシ○又其酷厲液ノ化熟シテ排泄スルヲ助ケンガ爲ニ催睡藥ヲ用ベシ每ニ良効アリ催睡藥ハ阿芙蓉液或ハ白罌粟舍利別ヲ云製法第五十九章

第一百十三章ニ出的里亞加モ亦催睡劑ナリ

傷冷毒篇第六 羅甸名「カタル」和蘭名「シンキンゲン」
漢醫所謂風濕中濕ナル者是ニ屬ス
傷冷毒ハ一種ノ疼痛アリテ大抵頭ニ始リ漸次ニ卑
ニ下リテ鼻齒牙咽喉胸肺ニ至リ是ニ於テ欬嗽ヲ發
シ且ツ其疼痛スル毒變シテ稀涼ナル酪厲液トナリ
眼鼻口咽喉等ニ漏泄スル痰唾ノ病ナリト知ベシ此
病幾多ノ症ヲ發スト雖モ其疼痛ト漏泄トニ副テ發
スルガ故ニ此二症ニ就テ是ヲ察スレバ其徵ヲ失ハ
ザルナリ

第廿五章

第廿六章

傷冷毒篇第六 羅甸名「カタル」和蘭名「シンキンゲン」
漢醫所謂風濕中濕ナル者是ニ屬ス
傷冷毒ハ一種ノ疼痛アリテ大抵頭ニ始リ漸次ニ卑
ニ下リテ鼻齒牙咽喉胸肺ニ至リ是ニ於テ欬嗽ヲ發
シ且ツ其疼痛スル毒變シテ稀涼ナル酪厲液トナリ
眼鼻口咽喉等ニ漏泄スル痰唾ノ病ナリト知ベシ此
病幾多ノ症ヲ發スト雖モ其疼痛ト漏泄トニ副テ發
スルガ故ニ此二症ニ就テ是ヲ察スレバ其徵ヲ失ハ
ザルナリ

此病多クハ虚弱ノ人。婦人。小兒。高年ノ輩。或ハ平常其
身ヲ保スルコト温暖ナル者其常ヲ變シ。温暖ヲ離テ
風寒ヲ冒ス等ニ因テ發スルナリ。○又多クハ冬時寒
冷ノ候。或ハ殊ニ夏暑秋炎ノ後。新涼早寒ヲ承テ是ヲ
發シ。或ハ寒氣ニ馴ナサル人。窓間戸隙等ニ坐臥シテ風
寒ニ感スルニ因テ發スルナリ

傷冷毒ヲ論ス

此病ノ疼痛及ビ漏泄スル毒ハ何如ナル者ゾト尋ル
ニ。則チ上ニ論スル所ノ病因ニ就テ求レバ領解シ易
シ。此即チ日常自ラ覺エズシテ。身體ヨリ發越スル所

第百章

ノ蒸氣ノ壅遏セラレテ内鬱セル者是ナリ。○其蒸氣
ノ發泄ニ因テ。二般ノ液ヲ驅除スルナリ。便ヲチ其一ハ
無用ノ老廢液ニシテ 第二十一章ニ出 平常間斷ナキ生氣ノ
健運ニ因テ。是ヲ製シテ排泄スル者ナリ。其二ハ疾病
ニ屬スル所ノ壞液ニシテ。蒸氣ニ從テ排泄スベキ如ク
ニ稀涼ナル者ナリ。此二般ノ液ハ斯ノ如ク排泄セシ
ガ爲ニ。自然ニ水様液中ニ運輸ス 此水様液中ノ游ヒニシテ常
ニ蒸氣汗尿トナリ 排出スル液ナリ。○其無用ノ廢液ト壞液トハ。表發
ノ蒸氣ヨリシテ排泄スルヲ常トス。然レ他ノ諸器ヨ
リモ少シク泄除スルナリ。此猶小便ハ腎ヨリ分利シ

此言不... 卷三... 風雲堂藏

テ泄除スルヲ常トスレ_レ。其液汗及ビ大便ヨリモ少
シク泄除スルガ如シ○此病ハ虚弱ノ人。婦人並ニ高
年ノ輩。患ヒ易ク。殊ニ前ニ説ク如キ氣候ノ變更ニ因
リ。或ハ窓間戸隙ニ坐臥シテ風寒ニ冒觸スルヨリ發
スルガ故ニ。此病原ハ必ス蒸發氣ノ壅塞スルニ在リ
トス。然レバ其無用ノ廢液並ニ壞液ノ發泄セズシテ。
體中ニ鬱蓄セル者即チ此病ノ毒ナリ

第三章

傷冷毒ノ所在ヲ論ス
此病ノ酷厲ナル毒ハ。全身ニ運行循環スルガ故ニ。必
ズ諸血液ニ混淆スベキ所ナリ。然_レ血血液ニ混淆スル

ヨリ其疼痛ト漏泄トヲ發スル_レ甚ダ疑フベシ。其故
ハ總テ血ハ動脈ヲ以テ運輸ス。動脈ノ裏面ニハ周ク
天造自然ノ滑液ヲ密布シ。以テ其運行スル血液ノ侵
刺滲透スルヲ防護シテ。其害ヲ受サラシムル_レ凡_レノ
質ニハ鹽氣酸液等ノ甚ダ猶輸尿管_ニ兩腎ヨリ各膀胱
侵刺滲透スルモノアリ。テ小水ヲ腎ニ受テ膀胱ニ輸ス_ル裏面ニ周ク滑液有
テ。小水ノ悍厲氣ヲ受サラシムルガ如シ_ニ是説第三百
出併考_ス是故ニ假令酷厲ナル毒アリテ。血ニ混淆シ動
脈ヲ循行スト雖モ。侵刺スル_レハナキ道理ナレバ此
痛ヲ發スベシトハ思ハレヌナリ○然ルニ此毒ハ動

醫方內科要 卷三 第四十五章 風雲堂藏

地言... 卷三... 風雲堂藏

脉ノ循行ニ從ハズシテ。特^ズ神經ノ循行ニ從フ者ナリ
○是ヲ以テ考レバ。其毒ハ所謂ル神經液ノ中ニ滯著
スル者ナリ 病毒ノ性。同シカラサル。熱病編
第四章ノ註ニ見タリ。併考ベシ

第四章

神經液ヲ論ス

此病毒ノ所在ハ。既ニ前章ニ辨スト雖モ。所謂ル神經
液ナル者ノ名物ヲ預メ曉知シ。是ヨリ生スル所ノ諸
病ヲ參審シテ。明ニ辨スルニ非レバ。此病モ亦領解シ
難キガ故ニ。斯^ニ其小説ヲ附シテ是ヲ識シメントス
○夫レ神經ノ中ニハ二種ノ液アリ。其一ヲ精神ト名
ク。是レ大小ノ二腦 前腦 後腦ニ於テ製造泌別シ。神經線ト

名ル纖小ノ管中ニ循行シテ全身諸部ニ運輸普達シ

以テ寒熱痛痒ヲ主リ一切ノ知覺活動ノ運用ニ資給

ス 腦ハ動脈ノ血ヲ受ケ泌別シテ靈液ヲ製造シ神經
ニ流通ス。是レ知覺活動ノ用ヲ以テ言フ。片ハ是ヲ

精神ト稱ス。榮養滋潤ノ用ヲ以テ言フ。片ハ是ヲ神經

液ト名ク。故ニ此章ニ分テ稱シテ二液トス。是レ皆一

靈液ナリ。或ハ一ニ精氣ト名ク。第七章ニ出。併考ベ

シ。靈液並ニ神經循行ノ部位主用等醫範提綱ニ載ス

其神經線ハ暴露シテ單行スル者ニ非ズ皆一條ニ會

撮シテ一箇ノ膜ヲ以テ包裹シ全身ニ循行ス。然^レ凡精

神ノ運用ヲ司ル諸器ニ循行スル者ハ皆其器ニ入ル

處ヨリ微細ニ分レテ其中ニ彌蔓スルガ故ニ其會撮
シテ包裹セル神經條ノ形ヲ成ス。ナシ 精神ノ運用
ヲ司ル器ハ

增訂内科綱要 卷三 第四十六章 風雲堂藏

眼耳鼻口。皮膚筋腱等ノ如キ全身内外ノ知覺運動ヲ
主ル諸器ヲ云。斯ノ如キ諸器ニ於テハ神經微細ニ分
テ其體質ニ間錯混合シ各器ニ用ヲ爲ス故ニ神經線ノ
全形見ルベカラズ然レ其器ニ入ル處マデハ神經條
ノ全形ヲ以テ循行シ其大小ニ從^レ○其一ヲ神經液ト
ヒ膜ヲ以テ外圍ヲ包裹スルナリ
名ク。是レ其神經線ヲ包裹セル膜中ニ在テ其外膜ト
ノ間ニ常ニ神經線ニ灌溉シテ其滋潤ヲ失ハザラシ
在^レ云
ム○此神經液ハ神經ト共ニ皮表ニ循行シテ亦能ク
蒸氣ニ相混シテ謝シ去ルナリ是レ詳ニ予ガ羅甸文
ノ醫書ニ於テ論著セル故ニ爰ニ只其略ヲ示スノニ
傷冷毒。神經液ニ在^レ論ス
諸液其主用ヲ爲シ終レバ皆老廢シテ謝シ去ルガ故

第七章

ニ神經液ト雖モ亦漸次ニ老廢シテ無用ノ物トナリ
多分ハ蒸發氣ヨリシテ謝シ去ルナリ○故ニ上ニ論
スル諸因ニ由テ蒸氣ヲ壅遏シ殊ニ此ニ由テ其鬱敗
セル壞液。神經液中ニ滯住スル片ハ即チ其諸竅ニ漏
泄スベキ酷厲ナル液。體中ニ鬱蓄ス○其酷厲液直チ
ニ神經線ニ觸ルガ故ニ疼痛ヲ發シ且其液。神經室^前
ニ說ク所ノ神經線ノ中ニ鬱蓄スルヲ以テ其痛必ズ
ヲ包裹スル膜ヲ云
神經ノ循行ニ從フナリ○其液乃チ上ニ說ク所ノ諸
部ノ洩出管^{涕淚津唾等ヲ常ニ洩出ニ運輸セララル、}
片ハ則チ夫^カノ酷厲ナル傷冷毒ノ液ヲ夥ク漏泄スル

ナリ○此等ノ事廣ク説キ詳ニ論スルニ非レバ能ク其義ニ通曉セシムルヲ得ザレ^レ厄姑^ク且其一端ヲ舉テ是ヲ示スノミ

第四章

上章ノ餘義ヲ申明ス

此病毒ハ無用ノ廢液或ハ壞液ナルガ故ニ體中ニ鬱蓄スル片ハ生氣運行ノカト雖モ復^マ良液ト作^レ能ハサルニ由テ唯是ヲ驅逐シテ排泄スルヲ緊要トス若シ鬱滯シテ去ザレバ其酷厲ノ性漸^クヲ以テ滋^ク甚ク日ニ平全ノ良質ヲ離レ尚又漸^ク次ニ良善ナル神經液ニ混淆シテ終ニ併テ是ヲ腐壞スルニ至ルナリ○右ノ

第四章

如ク良善ナル神經液モ共ニ腐壞シ。病毒^レ增長滋蔓スルヲ以テ從^レ來未^レダ此患ナキ諸部ニ於テモ亦此症ヲ發スルナリ

傷冷毒ノ治法ヲ論ス

身體自然ノ良能ハ其蒸氣ノ壅塞シテ體中ニ鬱蓄セル毒ヲ以テヨク皮表ニ驅發スルノ機力アルガ故ニ更ニ發汗劑ヲ用ヒズシテ自ラ能ク是ヲ發泄スルナリ○然^レ厄其毒滯止シテ去ラズ既ニ諸液ニ混淆スルニ至テハ其良能ノ力ノミニテ速ニ驅除スルヲ能ハサルガ故ニ更ニ醫藥ヲ以テ是ヲ助ルナリ

神經液ニ滯著スル

ノミナラズ。自餘ノ血液ニ混淆スルハ傷
冷熱ヲ發スルガ故ニ治シ易カラザルヲ云
試シテ良法トスル所ハ患者ヲシテ平常ヨリハ多ク
被覆セシメ。是ニ與ルニ蒸氣ヲ發散シ。兼テ睡ヲ催ス
ノ藥ヲ以テスルナリ。假令バ的里亞加一錢ヲ取テ用
ルガ如シ。或ハ後方ヲ用ベシ

蒸氣ヲ發散スル劑ノ方

罌蘭發汗糕

白罌粟。舍利別 一弓

雜腹蘭 半月

安質沒扭若波列 一弓

右件合シテ調勻シ夜臨臥ニ温ナル葡萄酒少許ヲ

用テ送下ス

又方 傑列シ發汗糕

接骨木子傑列シ 一弓

雜腹蘭 半月

阿芙蓉液 十滴

右件合シテ調勻シ其醋厲液。悉ク蒸發氣ニ從テ泄
除スルマデハ毎夜一劑ツ、服スベシ

或ハ其毒止神經ノ一二ノ支別ニ滯著シテ各部ニ疼
痛ヲ發スル者ハ外敷藥ヲ施スベシ

傷冷毒ノ鎮痛熨劑ノ方

鎮痛熨法

増訂丹方集要 卷三 第五十章 風雲堂藏

的列並底那油 テレシイナ 二錢

燒酒 半勺

急製礮砂精 一錢

右件合シテ調勻シ。一箇ノ小綿布ヲ把テ疊重シテ
三襲或ハ四襲トシ此藥ヲ蘸シテ患處ニ敷貼ス。其
部稍赤色ヲ發スレバ其痛消散ス

急製礮砂精ノ製法ヲ論ス

急製礮砂精 製法

礮砂ト剥ボツ篤ト亞斯アスヲ取テ各別ニ器ニ内レ。各水少
許ヲ加テ溶化シ各漉紙ニ注テ透漏セシメテ其汚

第五章

滓塗濁ヲ淨盡シ兩件ノ藥液ヲ取テ等分ニ合シ能
ク調和セシムル片ハ忽チ銳烈ナル香氣ヲ揮發ス
ルナリ宜ク是ヲ硝子蠟ニ内レ密封シ貯フベシ

增訂丹方集要 卷三 第五十章 風雲堂藏

リ此小冊子ノ能スル所ニ非ルガ故ノニ○痛風ハ疼
痛ヲ以テ病トス。大率是ヲ四肢關節ニ患ヒ。其痛漸ヲ
以テ増進シ。關節ヨリハ關節ノ間ニ多ク發シ。患處ヲ
察スルニ皮膚ニ於テ少モ常ニ異ナルヲナク。按切ス
ルニ少モ痛ヲ増ヲナク。歷節痛及ビ脚痛ニ於ルガ如
シ。然レ患部漸々ニ瘦削シ起居乏弱ヲ覺エ。大抵其痛
久ク一處ニ留ルナリ然レ或ハ能ク彼此ニ走注游移
シテ往來スルヲアリ或ハ瘡^イルト雖モ寒冷ノ候ト濕
蒸ノ節トニ再發スルヲ多シ○此病ハ熱ヲ發スルヲ
稀ナリ然レ久ク經テ治セズ其毒增長スルニ及デハ

第三章

終ニ内藏ニ施及潛攻スルヲアリ
痛風ノ病因ヲ論ス
此病ノ外因ハ第三十八章ニ説ク所ノ傷冷毒ノ因ト
殆ト一般ニシテ共ニ神經液ニ著ト雖モ此病ノ毒ハ
肉及ビ膜ニ行ル^カ神經ノ液ニ著テ漸次ニ一箇ノ痛風
ノ酷厲毒ヲ生スルナリ。但シ傷冷毒ハ總テ漏泄スベ
キ諸部ニ行ル^カ神經ノ液ニ著テ其症ヲ發スルヲ異ナ
リトス○又按スルニ其壅塞セル蒸氣ノ鬱滯シテ壞
液ヲ生スルノミナラズ神經液ト雖モ亦能ク自性ヨ
リ腐敗ヲ生シテ壞液トナリ患部ノ神經中ニ滯著ス

曾下月斗異原 卷三 第五二章 風雲堂藏 入不

ル下明カナリ○其壞液ノ性イカヤウ甚麼様ナル者タル予
預メ明白ニ記載スル下能ハズ唯其發見スル症候ニ
就テ是ヲ徵シ其既ニ現スル所ノ患狀ニ從テ直ニ辨
識スベキノ云○他ノ酷厲ナル諸液ニ於テモ右ノ如
ク説示スノ外ニ更ニ他術ナキヲ以テ學者自ラ類推
思索シテ識ルベキナリ○衆人通例知ル所ノ酸敗液
ト雖モ尚其發見セル症候ニ徵シテ辨スルニ非レバ
知ル下能ハズ矧ヤ是ガ爲ニ徒ニ懸想臆度ヲ以テ許
多ノ議論ヲ費スハ祇ニ無益ニ屬スルノ云

第五章

上章ノ餘義ヲ申明ス

痛風ノ酷厲毒生シテ既ニ各處ニ著ツククハ更ニ異アヤシムベ
キ下アリ其故ハ凡ソ病毒身體ニ著クハ所謂ル自然
ノ良能ニテ生氣ノ運行ヲ増發スルト膿ヲ釀成スル
トノ兩箇ノ常道ヲ以テ其毒ヲ導泄シテ驅除スルナ
リ兩箇ノ常道ノ説熱病篇第四章第六
章又痘瘡篇第三百八十二章ニ出然ルニ此病ニ
於テハ曾テ是ヲ見ル下ナシ何トナレバ其痛斯ノ如
ク久ク留テ差ヒザルニ自若トシテ更ニ熱ノ發動ナク
又終ニ膿ノ見レ來ル下ナシ此其異アヤシムベキニ非ズヤ
○然レ予是ヲ熟察スルニ凡ソ病毒アリテ動脈ヲ侵
刺スレバ熱ヲ生シ或ハ創傷及ビ竹木刺ノ皮肉ニ在

ル輒チ膿ヲ釀成ス。然ルニ神經ニ於テハ酷厲液ヲ以テ侵刺スト雖モ竟ニ運動ヲ増發スルコトナシ。予荏苒經久ノ寒痛ニ於テ是ヲ徵シ。又打撲箝迫等ニ因テ神經ヲ暗傷スル者ヲ見ルニ曾テ膿ヲ成コトナク。只一箇ノ稀涼液ヲ漏泄スルノミ。是故ニ痛風ノ酷厲毒ハ少シモ生氣ノ運行ヲ増發セズ又膿ヲ成ノ舉ナキコト能ク知ルベキ所ナリ。○右ノ如ク運行ヲ増發セズ膿ヲ成サズト雖モ其毒滯止シテ久ヲ經ルニ隨ヒ逾增長滋益スルガ故ニ治療モ亦功ヲ成シ難ク。危殆是ニ從フナリ。是レ其毒能ク沈潛緣施シテ内藏ニ侵入シ。患

第百四章

者ヲシテ死地ニ輸サシムルコトアレバナナリ

痛風ノ治法ヲ論ス

痛風ハ必ず許多ノ時月ヲ消スルニ非レバ治スルコト能ハズ。何トナレバ神經液ノ自性ヨリ腐敗シ進ムヲ遏止シ又其壞液ヲシテ蒸發氣ヨリ漸次ニ驅逐シテ泄除セシムルコト時日ノ久ヲ俟ニ非レバ能ク其績ヲ成サレバナナリ即チ次ニ舉ル方最モ驗アリ

定痛排毒丸

痛風ヲ治スル丸子ノ方
的列並底那
勿擗祭亞石
各二錢

曾丁子斗異
三三
丸

乳香

蘇合香 各二刀

良薑 一種小者末 一錢

拔爾撒謨字露 一月

右件合シテ每一錢十五丸トス。先ツ的列並底那ニ石鹼ヲ加ヘ少シク煮テ稠固ナルヲ候テ諸末藥ト拔爾撒謨ヲ下シ調勻ス。若シ稠固ナラズシテ丸ト爲スノ宜ニ適セスハ是ニ少ク鹿角灰ヲ加フベシ○右ノ劑ニ薩撒弗刺斯ノ油數滴ヲ加ヘ橙皮末ヲ衣トシ用レバ殊ニ良効アリ○此丸子ヲ以テ

三四丸ツ、用ル7日ニ三次。是ヲ連服シテ長ク渝カヘザルヲ妙トス。是ニ因テ其痛漸ク消散シ。更ニ強健ナルヲ得ベシ○其痛全ク差ルトモ仍舊半年許ハ毎朝三四丸ツ、長將スルヲ良トス。若シ其病毒ヲ根治シ盡サレバ殘剩餘藥復タ萌起シテ再發スレバナリ

增補重訂内科撰要卷三終

