


泥蘭度州木畧

洋学文庫

文庫 8

C 30



目錄

蕃椒

酸醬

挾竹桃

天竺桂

芍藥

甘州

生姜

大黃

山奇糧

白兔藿

鬼茉莉

款冬

山查子

接骨木

大棗

櫻

胡桃

玉蜀黍

薏苡仁

延胡索

草麻子

敗醬

淫羊藿

曼

羅花

肉桂

秦皮

桃

細辛

薄荷

桔梗

百合

半夏

龍蚤

胭脂草

猪殃

蛇含

龍

牙白屈菜

二色柏

杜松

ホツクスハ  
ル

卜 唐人芋 蓼 独活 真防風 茴香 雞冠  
 花 董夕菜 棟 香綠 無花果 桑 栗 巴  
 且 歪 厂 翅 栢 椏 薔薇 小檠 白芷 芹  
 蒿 苴 瞿麥 樓斗菜 燕子花 馬鞭 雜腹蘭

右五十五種

目錄

水仙 山慈姑 金盞花 大葉標 菩提樹 楊  
 桺 梨 榎 植 柳 榛 尸スヘルニニス  
 酸醬 蚕体 水楊梅 紫參 萎蕤 狗脊 骨  
 碎補 兔葵 烏頭 地榆 藿葉 馬藜 廿夕  
 芍 艸 絡石 石葦 白微 桃朱術 同前黃花  
 者 錦荔枝 鳳仙花 羅勒 芸香 大蒜 葱  
 瓜 藿香 紫蘂 胡蘆巴 紅花 蒲公英 蜀

葵 蒟蒻 瀆ヒルカラ 菱 夏枯草 浮萍  
 萍葶草 茵陳 芥 石長生 蟹殼草 佛甲草  
 右五十三種

目錄

益母 蘭 大麻 擔不飯 胡椒 白頭翁 草  
 葵 蒲 葡萄 連錢草 麻黃 羊蹄 天南星  
 樹衣 小麥 大麥 阿魏 盧會 番木鱉 蓑  
 荷 丁子 アカリコス 其松 金剛刺 良姜  
 藜合香 麒麟血 乳香 樟腦 安息香 沒藥  
 肉豆蔻 白檀 沉香 萊菔 蔓菁 瓠瓜 胡  
 瓜 芥子 蒔蘿 牛扁 罌粟 苦蕒 錦葵

蜀葵 石龍芮 墨記艸 泥菖 玉髓 麗春花  
 忍冬 黃楊 山茱萸 牡荊 狗骨 金雀花  
 常春藤 牛房附蒼耳 車前子 マニ子ニロ  
 落花生 馬兜鈴 マコノ手 ツクバ子サウ  
 右六十三品

泥蘭度艸木略卷之一

信陽木村秀茂輯



槐園先生譯 門人

水戸伊藤雲慶校

蕃椒 フライシリペイブル

性功温ニシテ燥ス  
 第四度胃ノ府ヲ強壯ニシ  
 身體中ノ風氣ヲ驅逐スルノ功アリ

附方 肝ノ病及ヒ水腫ヲ治スルニ水ヲ以テ煮テ  
湯トナシ與ヘ服セシム水液ヲ大便ヨリ下シテ  
愈ユ○痛風ノ足ニアル者ヲ治スルニハ蕃椒ヲ取  
テ擣キ細ニシ多少宜ニ從ヒ患處ニ傅貼ス且其  
葉ヲ以テ水ニ浸シ飲シム多ク患液ヲ泻下ス○  
面部及ヒ身體ノ雀斑黥黯ヲ治スルニ蕃椒ヲ擣  
キ細ニシ蜜ヲ以テ調シテ此ヲ患處ニ塗ル○齒  
ヲシテ堅固ナラシムルニ葉ヲ以テ燒キ灰ニシテ

真珠母等分燒キ灰ニシテ白末トナルニ至ラシ  
ム以テ其齒ニ摩措ス

増補 胃ヲ強クスコニヘイトニ造リスハ醋及ヒ  
蔞蘿ヲ以テ製造ス正トモルル此ヲ用テ瘡熱  
ヲ治ス

酸醬キリケニラフルセ

性功実及ヒ子性涼ニシテ燥ス下第二度ニ繫ル  
開達及ヒ利尿ノ功アリ

附方肝ノ閉塞黃疸及ヒ腎中石ヲ生スル症石淋  
ヲ治スルニ実十顆ヲ取り擣キ碎キ水九十六錢  
ニテ煮漉シテ滓ヲ去リ砂糖少許ヲ加ヘ与ヘ服  
セシム

増補腎及ヒ膀胱ノ損傷ニ大功アリ小便ヲ通シ  
結石ヲ泄シ寒尿及ヒ膿淋ヲ治ス且腰痛ヲ療ス

挾竹桃シレアントルホム

性功温第三度燥ス第一度内服ニ用ルナシ

但外用シテ諸ノ腫ヲ散シ且分疏スルノ功アリ

増補葉諸獸ニ毒大然レドモ人類ニ於テ蛇咬中

毒ヲ解ス生汁ヲ以テ矢鏃ニ塗り以テ射レバ其

創危篤ニ至ル

天竺桂ヲウリールホム

性功葉ハ温メ而燥ス第一共ニ第三度実ハ強ク温  
メ且燥ス第二葉ニ過ク

附方腰痛腰痛及ヒ水腫ニ葉一握ヲ取り百二十

八錢ノ酒ヲ以テ煮日ニ兩度服ス○耳聾及ヒ耳  
鳴葉半握ヲヘニテルフ。此ノム。三指撮酒ヲ以テ  
煮漏斗様ノモノヲ以テ耳中ヲ熏ス○喘息及ヒ  
胸中粘痰実ニ錢ヲ取リ搗キ細ニシ蜜ヲ以テ和  
シ朝夕之ヲ服ス○子宮脱々葉或ハ実一錢ヲ取  
リ赤酒ヲ以テ服ス○子宮寒冷及ヒ月経ヲシテ  
順通セシム葉ニ握実八錢酒ヲ以テ煮蒸氣ヲ以  
テ之ヲ蒸ス○手足不遂及ヒ神經寒冷葉ノ油ヲ  
以テ患處ヲ摩シ櫟火ヲ以テ之ヲ烘ス

増補其仁峻烈芳香油多ク藥味アリ骨節ヲ強ク  
シ破氣驅風小水ヲ通シ月経ヲ利シ死胎ヲ下ス

芍藥ヒヲニ一

性功温ニシテ燥カスヲ二度ニ繫ル少ク收斂ヲ  
帶フ

附方卒中痲症癩癩ニキンク及ヒ其他腦ノ諸  
症根ヲ取リ其花ノ舍利別ヲ加テ甘味ヲ添ヘ煎



湯トナシ日ニ二三之ヲ服ス又ハ蒸露罐ヲ以  
 テ露水ヲ製シ十六錢ヲ取り頓ニ服ス又ハ其  
 十五六顆ヲ取り擣テ末トナシ酒或ハ蜜水若ハ  
 他ノ使用ナル汁液ヲ以テ之ヲ服ス○月水ヲ催  
 シ産婦ノ子宮ヲ淨清シ及ヒ腹痛ヲ治ス干芍藥  
 ノ根ヲ取り細末ニ酒或ハ蜜水ヲ以テ服ス○子  
 宮衝逆ノ症漢人説サ及ヒ子宮ノ痛実十五顆ヲ取  
 リ酒或ハ蜜水ヲ以テ服ス○小兒驚搐芍藥ノ生  
 根ヲ取り其兒ノ頸ニ繫ク又方其実ヲ貫クニ線  
 ヲ以テシ之ヲ頸ニ固結ス其間芍藥露水ニ七ヲ  
 取り其花ヲ以テ造レル舍利別ヲ以テ和調シ甘  
 カラシメ頻ニ二与ヘ服セシム○肝蔵ノ閉塞水  
 腫及ヒ腎痛漢人説サ若ハ膀胱痛漢人説サ根ヲ以  
 テ煎湯ヲ製シ服ス○シケウルホイクヨリ痛ヲ  
 癸シ又ハ徵毒ノ餘毒ニ因テ疼痛ヲ癸スル者其  
 根ヲ取り煎湯ヲ作り頻ニ服ス

增補根葉及ヒ子共ニ頭脳心藏及ヒ子宮ヲ強ク  
シ諸痼症頭眩冒癰痼夢遺鬼交等ニ良ナリ其  
根頭旋眩冒癰痼ノ小兒ニ發スル者ニ妙ニ是ヲ  
以テ「マル」ヨニス 散小兒驚痼ヲニ之ヲ用ユ  
治スル妙劑

甘州スウトホウト

性功温メ且涼ニス此ヲ以テ潤沢ヲ生シ且緩メ  
和スルノ功アリ

附方咳嗽及ヒ喘急甘州膏世ニ所謂ツボ又ハ甘

州舍利別ヲ取リ少シツ、含嚥ス甚多良ニ○腎  
及ヒ膀胱ノ毒腫ニ因テ淋瀝ヲ發シ小便頻數ナ  
ルニ以テ煎湯ニ作り服ス或ハ酒ヲ以テ和調ス  
ルモ亦可ナリ

增補根諸胸膈ノ病咳嗽呃逆懊懣腰痛腎痛ヲ治  
ス其汁熬乾シテ錠トナスモ「ラ」ド「ロツ」プト云  
功同ニ

生姜ケンブル

性力大温開達ニ鬱塞ヲ疏通ニ粘凝ヲ解釈シテ  
稀淡ナラシム

附方胃及ヒ胸腹ノ諸藏ノ寒冷及ヒ諸液ノ腐壞

ヲ治スルニ常用ノ食饌ニ調和シ又ハ他ノ方中

ニ加ヘ服ス

增補胃ノ寒冷ヲ温メ飲食ノ消化ヲ助ケ又諸ノ

生粗ニシテ熟セサル者ヲ消化ス頭眩眩冒及ヒ

頭腦重疼ノ胃中ノ病ニ因テ發スル者ニ必用夕

リ外用シテ眼疾ヲ治ス

### 大黃ヲバルベル

性功カル其説別ニ詳ニス腐敗膽汁ト譯ス其他惡液ヲ疏滌スル

ヲ主ル然レトモ其後下利自ラ止ム是ヲ以テ諸

般ノ泄瀉下利等ニ必此ヲ用ニ其服度一錢或ハ

二錢ヲ以テ一服ノ概トス若便ヲシテ順利ニシ

テ泄瀉ニ至ラザラシメント要スル時ハ五分或

ハ三分錢ノ一ヲ取り他ノ便用ナル汁液ニテ服

増補膽汁他ノ惡液ヲ逐ヒ微利セシム又収斂ノ  
工カアリ是ヲ以テ赤利ニ之ヲ用ユ

山竒糧シナウラルテル

性功温暖中等ニ属ス而燥カス一ハ第二度ニ繫  
ル小便ヲ開通シ而シテ汗ヲ登ス

附方微瘡及ヒ瞽留シテ長ク愈サル寒熱痲症水  
腫凡毒久頭痛黃疸肝藏ノ閉塞石淋腎痛煎湯ニ  
作り服ス

増補甚メ汗ヲ登シ水腫ヲ治シ惡瘡疥癬及ヒ微  
瘡ヲ療ス及ヒ骨節疼痛ニ必用タリ

白免藿メコアカニ

性功一度ノ温二度ノ燥疹飲及ヒ其他ノ水液惡  
汁ヲ下ス又以テ小兒ニ与ルニハ三分錢ノ一ヲ  
以テ大人ハ一錢或ハ二錢ヲ以テ一頓ノ服度外  
ス

増補微利ヲ主リ諸般ノ惡液留飲及ヒ水氣ヲ驅

逐ス小兒下劑ニ之ヲ用ニ苦味無フシテ服シ易  
キヲ以テナリ呼テ白大黃トス嬰兒ニハ六分錢  
ノ一二ヲ与フ稍長セル者ハ一錢大人ハ二錢

鬼茉莉ヤラツバ

性功下利スルヲ主ル然レ疝專ラ水液ヲ下ス  
ヲ以テ能トス一錢或ハ三分錢ノ一ヲ取テ使用  
ナル汁液ヲ以テ飲服ス

増補下利ヲ主リ諸般ノ粘痰腐敗膽汁水氣及ヒ

他ノ惡液ヲ除ク其服度細末ハ五分ヨリ三分錢  
ノ二ニ至ル其脂ハ六十分錢ノ十五

欵冬ウーフフラト

性功生州ハ中等ノ涼及ヒ燥スノ功アリ肺蔵ヲ  
強壯ニスルノカ殊ニ勝ル乾ケル者ハ温ヲ主ル  
附方咳嗽及ヒ喘急葉三溢ヲ取り百二十八錢ノ  
水ヲ以テ煮欵冬葉ノ舍利別ヲ以テ甘味ヲ添ヘ  
頻ニ服ス○諸藏ノ熱腫及ヒ吐熱病蒸露籬ヲ以

テ露水ニ造リ十六錢或ハ二十四錢ヲ取テ頓服  
ス○頭痛及ヒ陰器ノ熱腫露水ヲ取リ中ニ蘸シ  
テ患處ニ貼ス○湯火傷ニ葉ヲ搗テ生汁ヲ取リ  
患處ニ塗り還テ生葉ヲ以テ罨ヒ貼ス  
增補全草胸膈及ヒ肺ノ諸疾ヲ主リ肺癰乾咳心  
中懊懣肺痛癆瘵ヲ治ス葉外用シテ焮腫熱症ノ  
瘡腫赤利腹中煩熱乳頭坼裂ヲ治ス

山查子ハ一ゲトールニ

性功燥スヲ主ル収瀉スルノ功アリ

附方腹痛經水過多一錢ヲ取リ赤酒ヲ以テ服ス

○腎痛石淋細末五分酒或ハ他ノ諸飲ヲ以テ服

ス○竹木刺及ヒ鐵鍼等ノ肉中ニ有テ抜ク根ヲ

取リ搗キ細ニ膏ヲ貼スルカ如ク患處ニ敷ク

增補子粘稠ヲ稀薄ニスルノ功アリ内熱ヲ去リ

大渴ヲ愈シ吐血赤利ヲ療ス第二皮鸞口瘡齒

根腐爛齒牙動搖ニ并ニ良ナリ

接骨木フリールボーム

性功葉及ヒ莖并ニ木皮第一度ノ燥第二度ノ温  
下利ヲ功アリ諸般ノ水液ヲ吐利ス花消化シ堅  
ヲ和ケ汗ヲ発シ痛ヲ止ム寒汗ヲ催シ傳染ノ惡  
氣ヲ除ク木耳収斂及ヒ燥スノ功アリ

**附方**水飲及ヒ腐敗液ヲ下ス葉ノ初生一溢水ヲ

以テ煮油或ハ醋及ヒ鹽ヲ以テ調和シテ食ス木  
ノ青皮宜キ程ヲ取り絞テ汁ヲ取り八錢ヲ服ス

又ハ其餘モ一二汁液ヲ以テ飲服ス又ハ其種ヲ  
取り酒ニ浸シ搾シテ油ヲ取り麥酒ヲ以テ一錢

ヲ飲服ス亦以テ吐劑トナス○脾藏ノ閉塞葉ヲ  
以テ酒或油ニテ煮煎熬スルニ至リ以テ左脇ニ

塗ル○乾咳及久咳葉半溢花一溢合シテ百九十  
二錢ノ酒ヲ以テ煮飲服ス○水腫木ノ青皮露水

ヲ製シ毎服一三ユツ量ノ日ニ兩度服ス食前一  
時ヲ隔ツベシ頭痛熱ヨリ発スル者及ヒ眼目

熱疹花ノ露水ヲ取り用ユ○熱病及ヒ傳染諸病  
能ク熱セル実ヲ取り煮テ濃汁ヲ取り四錢鹿角  
五分右合シテコニセルフニ製シ用ユハコニセルフ  
類○頭項ノ腫ヲ治ス木耳半溢麥酒ニテ煮含燕  
ス

增補新生莖蔬トナシテ食スレハ微利ヲ主ル或  
ハ吐ヲ催スフアリ葉下利ヲ主リ汗ヲ発シ月経  
ヲ順調ニ痛ヲ和ケ乳汁ヲ多クシ赤利痘瘡斑疹  
等ヲ治ス外用皮膚火熱丹毒疔氣及ヒ齒痛ヲ療  
ス木耳咽喉膿腫及ヒ眼病水腫ヲ治ス

大棗ユーベンボーム

性功葉及ヒ木皮中等ノ温淨刷ノ功最モ著シ

附方新金瘡ヲ愈ス葉ヲ取り搗キ細ニ患處ニ  
敷ク○疥癬惡症ヲ治ス葉宜キ程ヲ取り臼中ニ  
於テ杵キ米醋少許リヲ加ヘ絞テ汁ヲ取り頻々  
ニ之ヲ塗ル



増補葉收斂ヲ主リ吐血ヲ療ス外用シテ脚気疼  
痛ヲ治ス根水ニテ煮外貼シ湯火傷ヲ治シ癩痕  
ヲ滅ス

櫻ケルスホーム

性功寒ニシテ潤ス此ヲ以テ諸藏ヲ潤スヲ著明

ニ

附方癩癩及ヒ搗搗能ク熟セル里子ヲ取り碎テ

蒸露罐テ以テ露水ヲ製シ八錢ヲ頓服ス諸般

ノ皮班木脂ヲ取り醋ヲ以テ溶化シ其上ニ摩指

ス○腎痛石淋上ニ言所ノ子ヲ取り便ニ随テ服

ス

増補其酸ナル者熱病発渴及ヒ身體ノ熱ヲ治ス

其甘キ者中凡痲症ヲ療ス其露水登痲卒中痲症

ニ最モ良ナリ仁ノ露水小便ヲ利シ石淋ヲ解ク

胡桃ヲツケルノト

性功実新キ者一度ノ温乾ケル者二度ノ温而シ

テ乾ケル者ハ温ニシテ燥スノ力多シ共ニ消化  
シ難ク咳嗽ヲ催シ頭痛ヲ登シ腐敗液ヲ益ス然  
レトモ甚夕能ク毒ヲ解シ且疫疾ヲ治スルヲ妙  
ナリ外皮燥シ且収斂スルヲ強シ葉収斂ス

**附方** 諸毒及ヒ疫疾ヲ治ス核二顆無花果三顆芸

香葉二十コルレルツ一ツ右合シテ擣キ酒

少許リヲ加ヘ毎朝肉豆蔻ノ大サヲ服ス○凡犬

咬傷乾胡桃二顆白礬四錢鹽五分蜂蜜宜ニ適シ

熟髮後

合シテ擣キ調シ瘡上ニ貼ス○三日瘡未熟胡桃

ヲ取り露水ヲ製シルノ小飲器ニ一杯

未發ニ先テ服ス服後温覆シテ汗ヲ求ムベシ此

ノ物甚夕能ク體中ノ凝血ヲ稀散ス○子宮衝逆

ノ症疝痛及ヒ腎痛乾ケル花一錢擣テ細末トナ

シ白酒ヲ以テ服ス○杖瘡癩痕ヲ滅ス榨シテ油

ヲ取り其處ニ摩揩ス○諸般ノ熱病熱氣ヲ除ク

根皮ヲ取り醋ニ浸シ以テ寸口ヲ包縛ス水泡ヲ

発スルヲ以テ度トス其水泡ヲ刺シ去ルベシ

増補青葉外用シテ乳汁ヲ通シ金瘡虫ヲ生スル  
ヲ去ル根汁強ク下利スルノ功アリ実糖製スル  
者不食ヲ治シ飲食ヲ消化シ胃ヲ健ニシ胎ヲ吐  
ニシ小産ヲ防ク其濃煮汁口中炊腫喉凡巴且杏  
核腫及喘息気急ヲ治スルニ発泡術ニ用ユ

玉蜀黍トルコスコール

性功実性消化シ難シ然レ厄温メ且燥スノ性アリ

リ

附方腫ヲ熟ス実ヲ擣キ碎キ津液ヲ以テ調シ患  
處ニ貼ス○凡疹及ヒ赤班葉ヲ絞テ汁ヲ取り巾  
ニ蘸シテ患處ニ貼ス

薏苡仁シニトヨーフスタラー子ニ

性功性人ノ知ル所ナリ実石淋及ヒ腎痛ヲ治ス  
ルニ甚タ良ナリ

延胡索ホルウラテル

性功温メ且燥カス下第二度消化ヲ主リ淨刷ス  
ルノ功アリ

附方 疥癬延胡索バツケラール各等分擣テ細末  
トナシ一錢ヲ取り水液ヲ以テ飲服ス服シテ後  
温覆スベシ○小児ノ虫症細末三分錢ノ一ヲ取  
リ甘乳酪清ヲ以テ服ス○咽喉腫ニ水ヲ以テ煮  
頻ニ含燕ス

麻子ウタンドルホーム

性功燥カシ且温ル下第二度清滌シ及ヒ消化ス  
ル下ヲ主ル水飲悪液及ヒ腐敗膽汁等ヲ強ク下  
利スル下殊異ノ功アリ然レドモ之ヲ内服ニ用  
ル下稀ナリ

附方 留飲悪液腐敗膽汁等ヲ下利ス実六顆ヨリ  
十五顆ニ至ルマテヲ取り少ク煨シ擣キ碎キ桂  
或ハ生姜ヲ加ヘ乳酪ヲ以テ服ス○婦人乳房ノ  
鬱塊ヲ治スルニ葉ヲ取り擣キ細ニ調スルニ

麥粉ヲ以テ糊ノ如ニシテ患處ニ貼ス○頭瘡  
ヲ治ス実搾シテ油ヲ取り瘡上ニ摩リ塗ル

**増補**子及ヒ仁強ク下利ニ腐敗膽汁ヲ吐下ス然

レトモ用ルヲ稀ナリ油水肿諸虫ヲ治ス外用シ  
テ疣痣皮膚黒班癍痕及ヒ頭瘡浸淫スルヲ治ス

敗漿スペールコロイト

性功温メ且燥カスヲ第二度開達ニ汗ヲ發シル  
水ヲ利

**附方**胸脇痛及ヒ月經不利ヲ利シ小水ヲ通スル

ニ根ヲ煮テ湯ヲ作り飲服○氣急喘息ヲ活スル

ニ敗漿根十六錢甘艸四錢水ヲ以テ煮テ百二十

八錢ニ至リ毎服一杯日ニ二次○肝及ヒ脾藏ノ

閉塞傳染諸病黃疸及ヒ眼精衰弱根ヲ煮テ湯ヲ

作り飲服ス或ハ乾ケル者ヲ取り擣キ細ニシ一

錢ヲ取り用ルニ便ナル水液ヲ取テ服ス○久ク

愈サル頭瘡ヲ治ス莖葉ヲ擣キ生汁ヲ以テ其上

二滴ス

**増補** 全州開達ニ汗ヲ発シ小便ヲ利シ月経ヲ通  
シ産後瘀血ヲ清シ諸毒ヲ解シ黄疸小便閉三日  
熱傳染疫熱胸痛眼神衰弱ヲ治ス外用陽物ヲ強  
クシ眼神ヲ壯ニス

淫羊藿 五ヒメチウム

牲功其根少ク燥カス且収斂ノ性アリ但其葉ハ  
甚ク苦シ

曼陀羅花 トールニアツペル

牲功性寒第四度麻痺セシメ知覺ヲ奪ヘ人ヲシ  
テ眠ラシム

**附方** 痛ヲ止メ且眠リヲ催ス実八錢ヲ取り粗ク  
剉シ燒酒六十四錢ヲ以テ浸シ柔和セシムル  
數日尔後絞テ滓ヲ去リ煮テ半ヲ減シ一匙ヲ飲  
服ス通用ノ七四錢  
ヲ以テ準トス

**増補** 全州就中其实睡寐ヲ催シ人ヲシテ麻シテ

痛痒ヲ知テサテシム其毒ヲ解スルニ底野如及  
度ホリユスアルメニカ<sub>赤石甘巴且杏油之ヲ主</sub>  
ル

肉桂カ子ール

性功温ル<sub>一</sub>第三度燥カス<sub>一</sub>第二度頗ル収斂ノ  
性アリ截断消化分疏及ヒ強壯ニスルノ力アリ

附方諸藏ノ闭塞胃ノ衰弱シテ官能ノ瘳惰スル

ノ症水腫體氣ノ臭穢腹痛寒尿<sub>別譯名月經不通腦</sub>

ノ寒冷ニ感傷シテ生スル所ノ諸病ヲ治シ及ヒ

心藏ヲ強壯ニス諸ノ食饌ニ和調シ或ハ酒ヲ以

テ飲服ス蒸露釀ヲ以テ露水ヲ製シ用ユ

増補<sub>生氣</sub>ヲ壯ニシ胃ヲ健ニシ及ヒ子宮其ノ他

ノ諸藏ヲ強クス是ヲ以テ鬱冒心中動悸胃中懊

懷ヲ治ス就中子宮ノ諸病胎養壯ナラザル者常

ニ之ヲ用テ良ナリ又経閉ヲ通シ産ヲ催シ胞衣

ヲ下ス故ニ産科ニ此ヲ以テ要藥トス第一ニ血

暈及ヒ鬱冒ニ必ス用ユ此物又頭ノ諸疾ヲ治ス  
ルニ必用タリ即チ中等ノ如キ是ナリ其中其  
病胃ニ本ツク者ニ最モ妙ナリ

秦皮ト子リロ

性功燥カスヲ最モ著シ

附方熱症諸腫及ヒ膿腫新キ葉ヲ取リ臼中ニ於  
テ杵キ患處ニ貼ス○腎及ヒ膀胱ノ諸石ニ樹ニ  
就テ尻ヲ穿テ淋漓シテ聚ル所ノ液ヲ取リ毎服

二錢

桃ペルシキボーム

性功実寒ニシテ潤スヲ第二度胃ニ入り速ニ腐  
壞セシム若シ食饌ト共ニ此ヲ食スル時ハ速ニ  
消化セシムルノ功アリ且飲食ヲシテ速ニ下ニ  
向テ傳導セシム其仁温メ且燥ス其苦ニ因テ閉  
閉シ諸ノ閉塞ヲ通シ腹ヲ和シ便ヲ通ス是ヲ以  
テ留飲粘痰腐敗惡液ヲ下ス桃膠咳嗽及ヒ癆瘦

二十



ヲ患ルノ人ニ甚夕良ナリ

**附方**言語蹇澁桃仁八錢白中ニ於テ杵キ「ノウ」  
イノ水ヲ加ヘ絞テ液ヲ取り頻ニ口中ニ灌シ暫  
ク含テ口中ニ在シメ再ヒ之ヲ新ニス○頭中桃  
仁四錢白中ニ於テ杵キ「イセル」コロイトノ水  
ヲ加ヘ絞テ液ヲ取り小巾蘸シ額及ヒ顛顛ニ貼  
ス仁ノ油ヲ取り腎痛石淋ニ因テ發スル者ニ用  
テ甚夕良ニ用テ以テ腰上ニ塗ル○面上ノ赤痣

桃仁三十二錢瓠瓜仁十六錢榨シテ油ヲ取り其  
上ニ摩措ス○神意鬱悶子宮衝逆ノ症及ヒ虫症  
桃花ノ舍利別十六錢空心ニ服ス○小兒諸虫桃  
葉一溢擣キ細ニ臍上ニ於テ帛ヲ以テ繃縛ス  
或ハ乾ケル葉ヲ取り細末ニ汁液ヲ以テ三分錢  
ノ一ヲ服ス○吐血桃膠二錢車前或ハ馬齒莧ノ  
液ヲ以テ溶化シ用ユ○咳嗽及ヒ短氣桃膠二錢  
蜜水二錢或ハ款冬ノ煎湯ヲ以テ溶化シ空心ニ

服ス

増補花體ヲ和柔ニシ水気ヲ逐フ実下利ヲ主ル  
然レトモ體ニ於テ腐壞シ易シ是ヲ以テ寒熱ヲ  
動ニ泄瀉ヲ催ス仁ノ油及ヒ花ノ油ハルセムニ  
和シ疝痛ヲ治スルニ甚妙ナリ外用シテ耳聾ナ  
ラサルヲ治スルニ亦妙ナリ樹上ニ生スル小虫  
痔腫ヲ治ス

細辛マンスラレシニハセルラルテ

性功葉及ヒ根温メ且燥カス第三度鬱塞ヲ開  
達シ小便ヲ利シ雷飲及ヒ腐敗胆汁諸ノ惡液ヲ  
逐ヒ或ハ上ヨリシ或ハ下ヨリシテ之ヲ除ク

附方熱病鬱留セル者痛風水腫黃疸乾キタル根

ヲ取リ搗キ細ニシ一錢使用ノ液ヲ以テ飲服ス  
或ハ三錢ヲ取リ酒蜜水宜キ程ヲ以テ之ヲ煮滓  
ヲ去リ頓服ス又ハ葉六箇ヨリ十箇ニ至ルマテ  
ヲ取リ臼中ニ於テ熟研シ此ニ酒ヲ加ヘ絞テ汁

ヲ取り頓服ス○婦人ノ乳汁ヲ断ス葉ヲ取り酒  
ヲ以テ熟研シ膏ノ如シテ乳上ニ貼ス○喘息  
氣急及ヒ小便淋瀝乾ケル根四錢酒六十四錢ヲ  
以テ煮半ヲ取り分テ再服ス○眼目蒙昧ヲ治ス  
或ハ生汁ヲ取り又ハ製セル胡粉ヲ和シ此ヲ目  
中ニ滴ル

**増補**死胎ヲ下シ小便ヲ利シ子宮ノ痛ヲ治シ黃  
疸及ヒ水腫番替熱渴頭ノ諸疾ヲ治シ経閉ヲ通  
ス

薄荷メンタ フリュイニヘイリヘ

性功温メ且燥カス第三度少ク収斂ノカアリ

**附方**婦人ノ白帶下薄荷ヲ以テ製セル「**コ**ンセル」

藥劑名砂糖豆ノ大サ薄荷露ヲ以テ飲服スル

日ニ二度○頭痛久ク愈サル者莖葉ヲ取り擣キ

額上ニ貼シテ此ヲ縛ス又此ヲ顙顙ニ貼ス○小

兒頭瘡新莖葉ヲ採リ絞テ生汁ヲ取り瘡上ニ摩

指ス○諸虫ヲ治ス薄荷生汁四錢ヲ取リ米醋八  
錢ヲ和シ一頓ニ飲服ス○惡心肝脾及ヒ腎ノ閉  
塞薄荷露四十錢薄荷ノ舍利別十二錢二味相調  
和シ頻ニ二匙ヲ服ス又ハ莖葉ヲ採リ酒ヲ以テ  
煮テ湯トナシ飲服ス其内兼テ外用ニ薄荷油ヲ  
以テ患處ニ塗ル○小兒ノ腹痛薄荷露ヲ以テ与  
ヘ服セシム○乳汁ヲ断ス莖葉ヲ採リ擣キ熟シ  
膏ノ如クニシテ乳上ニ貼ス○耳痛薄荷生汁蜜水  
等分温テ耳中ニ滴ス

**増補**胃及ヒ子宮ノ諸病ヲ治シ吞酸嘔吐噯氣腹  
脹腸痛頭眩冒頭痛白帶下ヲ治シ虻虫ヲ殺ス

桔梗コロクスケニス○ペルヘテ

性功詳ラカナラス

**増補**全州清涼乾燥且収斂ス水煮シテ以テ含嗽  
スレハ口中已且杏核旁懸ヲ挾テ已且咽喉懸  
壅ノ腫瘍及ヒ焮腫ヲ治スルニ必用之及ヒ咽喉

膿壞及口喉凡ヲ療ス根春初ニ於テ掘リ採リ菜  
蔬ニ和シテ食フベシ

百合ウイツテレリイニ

性功花温メ且潤ス痛ヲ止メ消化ニ堅ヲ柔ニス  
根及口葉燥カニ淨刷シ消化ニ堅ヲ柔ケ物ヲ熟  
ス

**附方**臨産痛百合花露二十四銭雜膜蘭肉桂各三

分錢一一右三味相和シ頓ニ与ヘ服セシム而シ

テ百合油ヲ取リ少腹及口隙門ニ塗ル○咳嗽及  
口喘息氣急百合花露多少宜ニ隨ヒ冰糖ヲ以テ

和シ頻ニ二匙ヲ服ス○湯火傷葉ヲ擣キ熟ニ患

處ニ貼ス又ハ葉ヲ取リ酒ヲ以テ煮外貼ス○堅

硬腫毒ヲ熟シ柔ク根ヲ取リ灸リ或ハ煮熟研シ

薔薇油或ハ苦薏油ヲ和シ膏ノ如ニシテ瘡上ニ

貼ス○骨節門挫葉ヲ取リ擣キ柔ケ患處ニ貼シ

且其油ヲ以テ摩揩ス○顔面ヲシテ清美悅沢ナ

夏根ヲ取リ  
灰埋メテ世  
ヲ煨シ薔薇油  
ト共擣キ熟  
シ膏如シテ  
患處ニ貼○頭  
瘡久ク愈カ  
者及口創傷  
百合汁ヲ取リ  
密及口瘡ヲ以テ  
銅錐中ニ於テ  
擣キ者熱シテ  
濃厚ナルニ至リ

ラシム百合花露ヲ以テ頻ニ塗リ灌ク

**増補**根物ヲ熟シ陳穢ヲ清淨ニシ分疏スルノ功

アリ且肉ヲ生シ堅硬腫ヲ柔クルニ必用タリ是

ヲ以テ堅硬ヲ柔和スルノ劑中ニ入レ用ユ花粘

稠ヲ稀薄ニシ生硬ヲ柔熟ニ痛ヲ定ム外用シテ

羅斯見タリ瘍醫新唇ニ「フントステイキンニ上同金瘡及

ニ濃壞瘡久ク愈ヤルニ良ニ花中黃産ヲ催シ月

經ヲ通ス露水顔面赤泡ヲ治スル妙ナリ

半夏カルフスフート

性功温メ且燥カスヲ第三度閉達ニ稠粘ヲ稀薄

ニシ凝結ヲ解釈シ小水ヲ驅逐ス且分疏スルノ

功アリ

**附方**脚氣及閉節痛生根ヲ取り多少宜ニ從ヒ擣

キ細ニ和スルニ牛糞ヲ以テ膏ノ如ニシテ患

處ニ貼ス○諸般ノ虫毒半夏末一錢底野迦五分

二味合和シ酒ヲ以テ飲服ス又方葉ヲ取り擣キ

絞汁ヲ取り一匙四錢米醋二匙八錢右二味合和シ  
頓服ス○喘息氣急及ヒ咳嗽痰飲ヨリ生スル者  
半夏一錢乳糖二錢右二味合和シ分テ再服ス○  
經水ヲ通ス半夏末二錢酒ヲ以テ飲服ス○水腫  
及ヒ寒熱久ク愈サル者并ニ諸藏ノ閉塞半夏五  
分茵陳鹽酒石鹽酒中ニ生スル石鹼ナリ惡各六  
分芫ノ一右合和シ一頓ニ服ス○面上ノ黥斑ヲ  
治ス半夏ノ乾ケル根擣キ細ニシ薔薇露ヲ以テ  
和調シ再ヒ日ニ曝シ乾シ如此スルヲ三次而シ  
テ後細末ニ患上ヲ摩揩ス又ハ薔薇露ヲ以テ和

調シ直ニ患上ニ塗ル

**増補** 胃ノ病ヲ治シ小便ヲ通シ中毒ヲ解スホル

ニウス名医之ヲ用テ咳嗽ヲ治ス散劑アリ方略

龍葵ナクトニカテ

性功清涼ニスルヲ第二度且収斂ノ功アリ

**附方** 頭痛陽症ノ熱病ニ發スル者莖葉ヲ取り擣

キ熟シ以テ頭ヲ続縛シ且足底ヲ続縛ス○羅斯

ラウレニヘイステル曰諸腫起ノ病其因多端ト

雖モ寒熱ノ二者是ヲ統領スルニ過キス其此ヲ

名ツクルノ諸名モ又義ト所ト義所同稱トノ三

者是ヲ冠胃スルニ外ナラ耳而シテ其熱ニ

統領スル者大軽重浅深ノ別アリ而シテ其重

クシテ大ニ且深者ヘイテスウエルラニトス

テイキニグイニフラニマチイ等ノ名アリテ共

ニ熱燔灼スルガ如キノ義ニ其輕クシテ小ナル

者ブルウドスウエルテボイレニボイス但

ニ等ノ名アリ又其毒諸部ノ深キ處ニアラズ但

皮下ニ在テヨク肌表ニ蔓延スル者ヲ呼テ羅斯

トナス

莖葉ヲ取り擣キ絞テ汁ヲ取り二分醋一分布帛

ニ蘸シテ患處ニ貼ス○糜爛腐蝕生汁ハ莖薔薇

油四錢定粉銀蜜陀各二錢共ニ鉛白ノ中ニ於テ

細ニ研リ軟膏ノ如クナルヲ度トス以テ聽用ス

増補莖葉及ヒ子外用シテ身熱頭痛赤利腐爛耳

中膿爛子宮ノ蝦腫ヲ治ス

胭脂中ニトヤンスコロイト

性功温メ且燥カス走竈ニ属ス治創ノ藥ニ之ヲ

算フ



附方 全瘡ヲ愈ス生汁ヲ取り温テ瘡中ニ滴ス其  
花油功殊ニ速ニ○寒熱久ク愈ヘズ乾ケル者一  
匙將登スルニ先テ酒ニテ服ス○腎痛石淋吐血  
關節痛子一匙酒或ハ使用ノ液ヲ以テ飲服ス○  
腹内損傷花一溢上好ノ麥酒六十四錢ヲ以テ煮  
三分ノ一ヲ取り漉過シ乳酪少許リヲ加ヘ温服  
ス○黄疽葉及ヒ花ヲ取り酒或ハ水ヲ以テ煮每  
朝ルーメルチイニ一杯ヲ服ス小飲器ノ名

増補 此治創ノ良薬内服外用共ニ可ナリ又小便  
ヲ利シ石淋ヲ通シ月経ヲ催シ寒熱ヲ治シ陟事  
不牽ヲ治ス或ハ用テ治瘡ノハルサハニ作ル  
方  
ス

猪殃ニワルストロ

性功 温メ且燥カス下中等

附方 衄血葉ヲ取り搗キ熟シ鼻竅ヲ塞ク○痛  
凡葉ヲ取り多少宜ニ從ヒ蓄薇油ニ浸シ此ヲ日

ニ晒シ以テ患處ニ塗ル○疥癬莖葉ヲ以テ煎湯  
ヲ製シ患處ヲ灌洗ス

増補外用シテ諸般ノ少血ヲ治シ此ヲ小兒ノ身  
ニ帶ハシメ或ハ竊ニ此ヲ衣裏ニ著クレバ兒ヲ  
シテ煩擾啼泣セザラシム

蛇含ヘイフヒニケルコロイト

性功燥カスヲ第三度而シテ寒熱ノ中収斂ノ功  
アリ

附方口中汚穢ヨリ生スルノ瘡ヲ治ス莖葉ヲ煮

テ湯ト作シ以テ含嗽ス○勞瘵吐血尿血及ヒ堅

京健症撰要ニ見乾ケル根一錢ヲ取り擣テ細末

トナシ使用ノ汁液ヲ以テ飲服ス○諸般ノ下利

甘乳酪砂糖ヲ以テ加ルニヲ漉過シテ加ルニ以テ煮頻ニ

飲服ス○肌膚傷裂莖葉ヲ擣キ患處ニ貼ス○出

血ヲ止ム莖葉ヲ取り按ニ熟シ此ヲ貼ス至テ妙

ナリ○腹痛莖葉ノ生汁ニ匙頓ニ服ス○カニケ

ル 翻花瘡及ヒ諸葉ヲ取り木臼ノ内ニ於テ木杵  
ヲ以テ細ニ搗キ猪脂及ヒ酒少許リヲ加ヘ和調  
シテ膏ノ如クシ瘡上ニ貼ス○眼目焮腫莖葉ノ  
生汁ヲ取り眼中ニ滴ル

**増補**根下利及ヒ痔ノ出血尿<sup>血</sup>勞瘵咳嗽膽汁変シ

テ酷厉ヲナス者腹痛等ヲ治シ外用齒牙動搖齒  
齧腐爛及ヒ痛眼目熱痛及ヒ金瘡ヲ療ス

龍芽アキリモヤ

性功温メ且燥カス<sup>一</sup>第二度開建シ淨刷シ及ヒ  
少ク収斂スルノ功アリ

**附方**肝藏ノ閉塞及ヒ衰弱黃疸熱病久ク愈サル

者及ヒ尿血葉三溢清水ヲ以テ煮百二十八莖ニ

至リ漉過シテ滓ヲ去リ砂糖ヲ加テ味ヲ添ヘ分

テ再服ス○腎痛石淋ニ砂石ヲ下ス蒸露罐ヲ以

テ露水ヲ製シ二十四莖ヲ取り頓服ス又煎湯ト

ナシ用ルモ亦可之○寒尿<sup>水</sup>名平全無病ノ人小  
童<sup>童</sup>胞中

＝充滿スル＝至ル毎＝必ス此ヲ泻ニ去ラント  
謂ノ意催スノ三ニテ心ニ任セテ泻ニ去ルモ忍  
ヒ耐ルモ自由ナルニ其小水終ニ胞中ニ瀦ルヤ  
否ヤ輒チ其意ヲ催スル有ル此ヲ名テ寒尿ト云  
茎葉ヲ以テ酒ニテ煮四十八棧ヲ取り飲服ス○  
火症ノ熱病葉一溢薔薇醋別製法六十四棧ヲ以テ  
煮煎ニ三分ノ一ヲ取り毎服一匙頻ニ用ユ○骨  
節肉挫葉及ヒ糠多少宜ニ随ヒ酒ヲ以テ煮テ糊  
ノ如クニ熱ニ趁テ此ヲ貼ス

**增補** 胃及ヒ肝脾ノ衰弱ヲ治シ諸病癸渴嗽嗽肺  
病勞瘵尿血膿淋傳染ニ係ル者白帶下漏瘡等ヲ  
治シ治創ノ飲劑ニ用テ大ニ妙ナリ

白屈菜スチニケンテコウウエ

性功温メ且燥カス下第三度淨刷スル下甚夕強  
ニ

眼目蒙昧及ヒ眼翳膜ヲ生ス生汁十六棧蜂蜜四  
棧右二味合シテ此ヲ煮ル下一二沸上沫ヲ掠シ  
去リ頻ニ目中ニ滴ル○腹中及ヒ子宮疼痛全

叶ヲ取り多少宜ニ洗ヒ或ハ擣キ細ニシ或ハ咬  
咀シ苦薏花油ヲ以テ熱鍋上ニ於テ和調シテ膏  
ノ如クシ臍中ニ填メ敷ク○黄疽及ヒ諸藏ノ閉  
塞葉ヲ取り細ニ剉ミ雞子ニ和シテ鍋上ニ於テ  
此ヲ焼キ患人ヲシテ此ヲ食ハシム又方根ヲ取  
リ湯ニ作頻ニ与ヒ服セシム○新金瘡生汁ヲ  
取り瘡上ニ滴ル○諸痔ヲ治ス莖葉ヲ取り擣キ  
熱シ臍上ニ貼ス○疣ヲ除ク莖葉ノ生汁ヲ取り

頻ニ摩措ス其落ルル甚ク速ナリ

**増補**根黄疽ヲ治スルニ良ナリ莖葉ノ生汁ヲ取

リ頻ニ疣目ヲ摩スレバ自ラ消ス露水眼疾ヲ治  
スルニ大ニ妙ナリ

二色栢セイヘンボーム

性功葉温メ且燥カスヲ第三度開達ニ稠濁ヲ稀  
清ニシ滲透穿入ノ功アリ

**附方**胞衣ヲ下シ死胎ヲ下スセーヘンボーム半

溢六十四钱ノ酒ヲ以テ煮半ヲ取り頓服ス○經  
水閉塞ヲ治スセーヘンホームノ生汁酒ヲ以テ  
絞リ出シ十六钱雜腹蘭六十分钱ノ四ホートワ  
ートル十六钱右三味調和シ分テ再服ス○小便  
閉塞セーヘンホーム一溢酒百二十八钱ヲ以テ  
煮三分ノ一ヲ取リルーメルチイ器小飲ヲ以テ頻  
ニ服ス其小水ヲ逐フテ至テ強シ○喘息气急セ  
ーヘンホーム一钱ヲ取り擣キ細ニシ蜂蜜ヲ以  
テ和シ服ス○小兒頭瘡セーホーム多少宜ニ從  
ヒ擣キ細ニシ乳酪ノ凝レル者ヲ以テ相和シ瘡  
上ニ塗ル○疣目及ヒ其他ノ隙中ニ生スル息肉  
瘡癩ヲナス者セーヘンホーム二溢雨水ヲ以テ  
煮以テ患處ヲ蒸シ還テ擣キ細ニセルセーヘン  
ホームヲ其上ニ粉ス

**增補**葉強ク小便ヲ通シ又能ク月經ヲ利シ胎ヲ  
下ス是ヲ以テ尿閉咽喉不利声嘎シテ出ス不及ヒ

胸中懊懷ヲ治スルニ必用タリ外用子宮ノ諸疾  
經閉頭瘡膿腫蝕爛冒寒傷冷毒及口譫妄ヲ治ス  
灰羅斯ヲ治ス灰ヲ以テ露トナシ顔面ノ黥黥ヲ  
治ス

杜松セ子イフルボーム

性功温メ且燥カス一第三度其實ハ温ル一第三  
度ニシテ燥カス一第二度汗ヲ登シ諸中毒ヲ治  
シ諸閉塞ヲ開キ粘痰凝液ヲ稀釈シ小水ヲ驅逐  
ス

**附方**咳嗽久ク愈サル者ヲ治シ胸膈ノ粘痰ヲ清  
滌ス杜松子四錢大麥水ヲ以テ煮テ六十四錢ニ  
至リ漉過シテ滓ヲ去リ和スルニ乳糖ヲ以テシ  
テ味ヲ添ヘ分テ三四次ニ服ス○聖京健毒眼目  
ニ陷ルヲ防キ又齒痛ヲ和ス杜松子半溢ヲヘシ  
テルフルーム名草三指撮共ニ米醋ヲ以テ煮涼ニ  
シテ口中ニ含嗽○石淋腎痛腰痛子宮ノ諸患經

水閉塞喘息氣急咳嗽頭眩暈耳聾體氣臭穢水腫癆瘵顛掉視物無力天行疫熱及七傳染諸病杜松子新精ナル者臼中ニ於テ熟研シ而シテ後水ヲ以テ煮絞テ汁ヲ取り再ヒ煮テ稠厚蜜ノ如キヲ以テ度トス朝夕一匙ヲ服ス右ニ列奉スル所ノ諸病ヲ治スルニ杜松子露亦甚良ニ○疥癬惡瘡杜松樹皮燒テ灰トナシ水ヲ以テ和調シ瘡上ヲ摩ス○天行疫氣及七傳染ノ惡氣ヲ淨クス杜松子ヲ取り炭火ノ内ニ加ヘ以テ室中ヲ熏ス○天行疫疾ヲ治ス杜松子代赭石各四錢蜜ヲ以テ調和シ大サ肉豆蔻核ノ如キヲ取テ蜜水ヲ以テ飲服ス

**增補**木温暖ニシ燥カスノ功アリ小水ヲ利シ汗ヲ発スコアヤコム及ヒサツサフラスニ代用ス子結石ヲ治スルニ良ナルヲ人ノ知ル所ナリ  
ホツクスパールト



性功清涼或ハアツテルコロイドト功ヲ用スル  
ノ説アリ

**附方** 肝及ヒ腎ノ腫瘍胸脇痛及ヒ傳染諸病根ヲ  
取り水ヲ以テ湯ニ製シ飲服ス又ハ莖葉ヲ以テ  
露ニ製二十四莪ヲ取り頓服ス○金瘡及ヒ諸損  
傷ヲ淨刷シ且此ヲ以テ愈シム全艸ノ生汁ヲ取  
リ布帛ニ蘸シテ瘡上ヲ奄フ

**増補根肝** ノ「ラントステーキ」ク胸膈諸病胃病  
及ヒ腎病ヲ治シ勞瘵石淋尿管諸氣ヲ治ス又蔬  
トナシテ用テ可ナリ

唐人芋アルトノ一テニ  
性功温ルヲ中等且燥カス此ヲ以テ収斂スルノ  
功アリ

蓼ワトトルペール

性功温メ且燥カスヲ第三度消化シ分疏スルノ  
功アリ

附方皮上ノ黥黥生汁ヲ取り此ヲ摩スル一朝兩  
時ニ於ス○癰疽及ヒ雞卵ノ白膜等分共ニ細  
研シ患處ニ傳ク○痛凡寒ニ属スル者及ヒ寒腫  
蓼油ヲ製シ患處ニ塗ル方蓼独活芥多少宜ニ從  
ヒ黑蜻蛉五頭綠蝦蟆十五頭右相共ニ三百八十  
四戈ノ油ヲ以テバル子ヲノ内ニ於テ煮熟シ軟  
クテ以テ度トス巾ヲ以テ漉過シ収メ貯テ聽用  
ス○犬虱ヲ治ス全艸ヲ取り卧牀ニ置ク

增補花ト共ニ用テ糊劑及ヒ膏トナシ全瘡膿爛  
漏瘡ヘイケウラツテニ病青班及ヒ股痛ヲ治ス  
汁耳虫ヲ去ル

独活ヲハス

性功温メ且燥カス一第三度開達ニ通截シ小便  
ヲ通利シ諸ノ中毒ヲ治ス此物全瘡ヲ治スルノ  
藥中ニ具テ一ニ居ル

附方諸凡及ヒ腸胃ノ痛經水不利胞衣不下子宮

衝逆ノ症喘息気急肝脾ノ閉塞及ヒ黄疸乾独活  
根或ハ子一棧細末トナシ酒ヲ次テ飲服ス又方  
根葉子ヲ取り酒或ハ水ヲ以テ煎湯ヲ製シ与ヘ  
服セシム○新金瘡ヲ治ス莖葉ヲ取り搗キ熟シ  
膏ノ如シテ患上ニ貼ス

**増補**根及ヒ子心腹膨脹破気駆風葉ヲ以テ浴湯  
トナシ經水ヲ通ス

真防凡カトルウエ

性功第一ニ子ヲ用ユ温メ且燥カスヲ第三度開  
達シ粘糊ヲ稀薄ニシ凡ヲ駆リ氣ヲ行シ且小便  
ヲ通利ス其切茴香及ヒ蔞蘿ト同シ

**増補**子胃ヲ強クシ腦ヲ壯ニシハヲシテ強記ナ  
ラシメ破気駆風疝痛子宮病諸般ノ腹痛ヲ治シ  
小水ヲ通シ石淋疼痛ヲ和ス

茴香ア子イシ

性功温ルヲ第二度燥カスヲ第一度粘稠ヲ稀薄

消化之凡ヲ驅リ尿ヲ利ス

附方腹痛及口腎痛石淋子ヲ取リ酒ヲ以テ煮又

ハ油ニ製シ又ハ露水ニ製シ用ユ○咳嗽及口胸

中粘痰火ニテ微炒シ細末トナシ白砂糖ヲ以テ

和シ又ハ清潔ナル蜂蜜ヲ以テ和シ頻ニ服ス

○難産腹痛茴香蔞蘿各五分細末トナシ酒ヲ以

テ飲服ス

増補子頭腦胸腹ノ諸部ヲ吐ニシ且温メ風氣ヲ

驅リ小僞腹痛ヲ治ス

雞冠花ヲリユウユルブルトム

性功清涼ニシ且燥カス及口収斂スルノ功アリ

附方諸般ノ下利吐血及口婦人白帶雞冠花一溢

酒或ハ水百二十八莪ヲ以テ煮三分ノ一ヲ取リ

飲服ス

増補花ヲ以テ湯ニ作り泄瀉ヲ治スルニ甚夕良

ナリ根齒ニ含挾スレハ齒痛ヲ治ス子末トナシ

酒服スレバ乳汁ヲ益ス

董々菜ヒテル

性功花及荃葉共ニ清涼ニシ燥ヲ潤ニ和柔ニシ  
且衰弱ヲ強壯ニスルノ功アリ

**附方**胸脇痛熱癰肺ノ熱腫咽喉不利声啞ニテ出

テス肝腎ノ熱腫并ニ心気ヲシテ強壯ナラシム

花ヲ取テ舍利別ト作シ二三匙ヲ服ス又ハ荃葉

ヲ以テ湯ニ作り右舍利別ヲ以テ味ヲ添ヘ頻ニ

ニ服ス又ハ大麥水百二十八匙右ノ舍利別二十

四匙膽礬精一二滴ヲ加ヘ一匙ヲ服ス○喉凡葉

三溢水百二十八匙ヲ以テ煮三分ノ一ヲ取り漉

過シテ滓ヲ去リ葉ヲ造レル舍利別十六匙ヲ加

ヘ頻ニニ含嚥ス○頭痛董々油ヲ以テ額上及ヒ

顛顛ヲ摩ス○腎痛石淋子一匙ヲ取り水或ハ酒

ヲ以テ飲服ス又ハ子四匙一二ノ使用ナル汁液

ヲ以テ浸シ乳液ノ如キ者ヲシテサシメ一頓ニ

服ス

増補花下利ヲ主リ心ヲ吐ニ胸膈ノ諸病ニ必  
用タリ諸熱頭痛煩悩諸病諸部ノ閉塞ヲ治ス子  
熱病腎ノ閉塞膀胱結石ヲ療シ産ヲ催ス

棟アセタラク

性功花温ルヲ第三度燥カスヲ一度ノ終リ二度  
ノ初ニ在リ閉塞ヲ閉達シ第一ニ頭腦ニ功アリ  
附方髪ヲ黒クシ虱ヲ殺ス花ヲ以テ露トナシ酒  
等分以テ頭ヲ洗フ

香椽ニツトル

性功皮温ルヲ第一度燥カスヲ第二度諸ノ中毒  
及ヒ傳染ヲ治ス其他ハ温メ且燥カスヲ第三度  
果中ノ酸汁清涼ヲ主リ且燥カスノ性アリ且之  
ニ加ルニ滲透ノ功アリ其種子温メ且燥カスヲ

第二度

附方胃ノ寒冷及ヒ體氣臭穢糖醃セル香椽或ハ

橙皮一匁ヲ取り毎朝此ヲ服ス○火症ノ熱病及  
ト傳染諸熱又ハ腐敗忠液胃中ニ滯鬱セル者生  
汁ヲ取り飲食ニ調和シ服ス又ハ次ニ記スル所  
ノ清涼飲ヲ製シ服ス方大麥水百二十八匁香椽  
十六匁上好白砂糖多少宜ニ從ヒ右三味和調シ  
頻ニニ飲服ス○忠症ノ熱病香椽実皮ヲ去リ數  
個ヲ服ス而シテ香椽皮ノ油ヲ以テ動脈及ヒ心  
窩ヲ摩ス○小兒虫症油ヲ以テ神闕ニ塗ル○腎  
痛石淋生汁十六匁肉豆蔻半個刺蝟石五分乳糖  
四匁リニセ酒半升トニ合ル右和調シ頓服ス○  
疥癬及ヒ面上ノ小瘡生汁ヲ以テ瘡上ヲ摩ス○  
寒疝腹痛橙皮細末一匁右煖麥酒又ハ酒ヲ以テ  
飲服ス

**增補** 実諸中毒ヲ解シ青腿牙疳及ヒ腐敗等ヲ治  
ス皮温メ且芳香藥味アリ汁ハ酸クシテ清涼ニ  
ス仁ハ苦クシテ虫ヲ殺ス共ニ心胃ヲ強壯ニス

無花果へーケボーム

性功熟セル子ヲ取り乾カセル者温ル第一度  
少ク潤ス性アリ或ハ曰温ル第一度潤ス  
第二度汗ヲ登シ胸膈ヲ清浄ニシ諸腫ヲ和ケ瘡  
ヲ熟ス

**附方**小兒痘瘡及ヒ麻疹ヲシテ能ク宣發セシム

麥酒ヲ以テ煮頻ニ与へ服セシム○腎痛石淋  
多ク此ヲ食へバ其砂石及ヒ石塊ヲシテ解カシ

テ小水ト共ニ去ラシム○咳嗽ノ重症無花果ヲ  
取り選揀シテ細ニ剉ミ上好ノ燒酒ニ浸シ一匙

ヲ取り頻ニ飲服ス又方無花果十二枚へイソ  
ルフ葉ニ溢大麥水ニテ煮百二十八戈ニ至リ砂

糖ヲ加テ甘カラシメル一酒杯ヲ服  
スル一曰ニ三四度○臨産催生トイツラントノ

婦人常トシテ無花果ヲ炮リ食フ以テ生ヲ催ス

○高ヨリ墜下シ或ハ打撲ニ因テ瘀血凝滯スル



者ヲ除ク選揀セル無花果ヲ取り水ニテ煮漉過  
シテ滓ヲ去リ頻々ニ飲服ス○水腫ヲ消ス選揀  
無花果大麥粉多少宜ニ從ヒ茵陳ニ溢酒ヲ以テ  
煉リ餅ノ如シ患上ニ塗ル罨フ○瘰癧無花果  
四枚石榴皮一枚細末トナシ患上ニ貼ス○諸般  
ノ疣目午程躓及ヒ其他皮膚ノ不潔ヲ除ク葉ヲ  
取り揉ミ患上ヲ摩ス

增補治胎ノ劑ニ作り用ユ小水ヲ通シ胎ヲ下シ  
又痘瘡ヲ驅逐ス火ニ炮シテ齒齧ノ腫癰ニ貼ス  
レハ惡毒ヲ拔除ス

桑ムールペリンボム

性功葉或ハ収斂シ或ハ淨刷ス甚未熟ノ者清涼  
ニシ及ヒ燥カスヲ第三度世ニ如ルニ甚夕収瀉  
スルノ功アリ其熟セル者ハ清涼ニシ及ヒ少ク  
収瀉スルノ功アリ根皮温メ且燥カシ淨刷シ開  
達シ腹中ヲ和柔ス

**附方** 齒痛根皮一钱葉半溢米醋ヲ以テ煮温メテ  
 口中ニ含ム○諸般ノ下利及ヒ月經過多乾ケル  
 未熟ノ莖一钱細ニ擣キ赤酒ヲ以テ飲服ス○口  
 中及ヒ咽喉熱腫桑甚ノ舍利別ヲ取り或ハ舐シ  
 或ハ含燕ス○肝及ヒ脾ノ閉塞ヲ治シ并ニ諸虫  
 ヲ驅ル根皮四钱水ニテ煮湯一升一合ヲ取り頓服  
 ス必ス下利セシム且口中ニ含メバ齒痛ヲ治ス  
**増補** 葉或ハ單ニ用ヒ或ハ皮ト共ニ煮テ齒痛ヲ  
 治ス甚未熟ノ煮收斂ノ功アリ下利或ハ便血月  
 經過多及ヒ吐血ヲ止ム熟セル者食ヲ美進シ渴  
 ヲ解ス

栗カス夕ニ一ポーム

性功温メ且燥カス第一度カレニユス名入其他  
 ハ寒ニシテ燥カス第二度トス然レドモ彼甘  
 味アリテ寒煖ノ中ニ在リ而シテ收瀉ノ功アリ  
 ト、子  
 ウス

附方吐血粟子粉多少宜從清潔ノ蜂蜜ニテ  
和之頻ニ服ス○乳腫粟子粉大麥粉各等分醋ヲ  
以テ和之糊ノ如ニ腫上ニ塗ル○下利及ヒ吐  
血粟子皮半溢水ニテ煮六十四棧ニ至リ滓ヲ去  
リ砂糖ヲ和ニテ甘カラシメ兩度ニ服ス○婦人  
白帶下及ヒ諸般ノ赤利粟子膜象牙霜各一棧搗  
キテ細末トナシ汁液ヲ以テ兩度ニ服ス  
增補諸般ノ下利ニ必用タリ惡心嘔吐ヲ治シ吐  
血ヲ止メ精ヲ補フ且房中ノ藥ニ用ユ

巴且杏アマニテレン

性功甘巴且杏温メ且潤ス下中等ニ屬ス甚タ能  
ク養ニ供スルニ堪タリ諸液ノ酷房ナル者ヲ和  
柔ス苦巴且杏ハ温メ且燥カス下第二度閉達ニ  
分疏ニ淨刷スルノ功アリ腎肺肝脾及ヒ諸藏ノ  
閉塞ヲ開通ス

附方下利ヲ治ス甘巴且杏ハ棧石臼中ニ於テ搗

キ大麥水六十四錢ヲ加ヘ剛鐵ヲ燒キ赤クシ其  
中ニ淬スルヲ數々布巾ヲ以テ漉過シテ滓ヲ去  
リ薔薇露四錢砂糖少許リヲ加ヘ調ヒ頻々ニ服  
ス○諸症石淋腎痛胞脇痛及ヒ少婦産後腹痛甘  
巴旦杏ノ油八錢或ハ十二錢ヲ取リ一二ノ汁液  
ヲ以テ飲服ス○初生腹痛甘巴旦杏ノ油二錢白  
砂糖ヨキ程ヲ加ヘ頓腹ス○寒尿苦巴旦杏五六  
顆ヲ取リ空腹ニ服ス○頭痛苦巴旦杏多少宜ニ  
從ヒ醋及ヒ薔薇油ト共ニ搗テ糊ノ如クシ額及  
ヒ顙顙ニ貼ス○子宮衝逆ノ症苦巴旦杏ノ油ヲ  
以テ臍中塗ル○腎痛石淋寒尿及ヒ腰痛苦巴  
旦杏ノ油ヲ取リ腰中及ヒ臍中ニ塗ル○耳鳴苦  
巴旦杏ノ油一匙ヲ取リ温メ別ニ條子ヲ取リ水  
綿ヲ以テ小圓ヲ作テ其端ニ繫ク油ヲ蘸シテ耳  
中ニ挿ム○顔面ノ黒班巴旦杏樹ノ根一溢水及  
及ヒ酒ヲ以テ煮以テ洗フ

増補 苦キ者胃ヲ強クシ小水ヲ通シ人ヲシテ醉  
ハザラシム油耳ノ諸患ニ必用タリ皮ノ堅硬ナ  
ルヲ柔ク甘キ者胎ヲ強クシ男子ノ精氣ヲ補益  
シ勞瘵ニ必用タリ油初生ノ児ニ或單用シ或ハ  
下劑ト共ニ与ヘレバ胎糞ヲシテ停滯無カラシ  
ム大人ニ用テ石症ノ疼痛ヲ和シ腎及ヒ膀胱中  
ノ砂石ヲ除キ疝痛ヲ治ス胸脇痛及ヒ咳嗽ニ用  
テ多ク粘痰ヲ吐シテ愈ユヒールヘウ此曰巴且  
杏九十六莪ヲ榨シテ油四十八莪ヲ得

雁翅栢ホームテスレイヘニス

性功温メ且燥カス少ク香竈ヲ帶フ消化シ及ヒ  
浄刷スルノ功アリ

附方 痛風葉ヲ取り露水ヲ製シ以テ巾ニ蘸シ患  
處ヲ罨ヒ卷ク又ハ油ヲ取り患處ニ塗ル

増補 葉ノ露水及ヒ油外用シテ痛風ヲ治スルニ  
良ナリ

樅子ボム

性功木皮及口葉燥カニ且収斂ス脂外用シテ消  
化ニ堅キヲ柔ケ凝ヲ解キ分疏ニ淨刷ニ而シテ

新金瘡ヲ治ス内服ニテ腸胃ヲ潤シ小水ヲ利ス

附方赤利乾葉一棧細末ニ赤酒ヲ以テ飲服ス○

滑精乾葉一棧雞子新キ者以テ少ク煮テ服ス○

レハルニユクト肝病ト認ス葉一棧故キ上好

ノ蜜水ヲ以テ服ス○齒痛葉ヨキ程醋ヲ以テ煮

熱セシメテ口中ニ含ム○喘急痛凡腎痛石淋及

口滑精へ子チヤタルペンテイニ四棧雞子黄一

枚煮雞湯多少宜ニ從ヒ一頓ニ服ス○脫肛樹ヲ

以テ板トナシ火ニ炒テ熱セシメ其上ニ坐セシ

○熱病及口青腿牙疴木皮薄屑八棧橙皮二棧布

袋ニ盛リ二百五十六棧ノリニセウエイニ酒ノ

ニ浸シ空腹ニ服ス

增補子麥酒ニテ煮青腿牙疴ヲ治スルニ甚夕良

夕良ナリ脱肛ヲ収ルニ此木ヲ以テ板ヲ作り以テ之ヲ推シ入ル脂膏トナシテ骨節削瘦ヲ治ス脂自ラ流レザル者藥局ニテ勿<sup>ハ</sup>搨<sup>子</sup>祭<sup>チ</sup>亞<sup>エ</sup>テレピンテイニニ代用ス且乾ケル者又ウイーロークニ代用ス

蓄薇ローセンボーム

性功諸種ノ蓄薇清涼其中フロロヒンレローローセン胆汁腐敗悪液ヲ滌除スローロ<sup>テ</sup>ロ<sup>ト</sup>センハ此ニ反ス収斂ノ性アリ中黄<sup>謂</sup>ナル者ハ閉塞ヲ主ル

附方眼目熱腫及ヒ痛蓄薇露ヲ取り頻々洗フ○

諸藏ノ熱過度ナル者及ヒ心藏ヲ和緩ニス蓄薇露ヲ取り和スルニ白砂糖ヲ以テ藥局ニ此ヲユラビユムロ<sup>サ</sup>リユムト号ス用テ諸ノ清涼劑及ヒ心氣ヲ強壯ニスルノ方中ニ加フ○留飲粘痰及ヒ腐敗悪液ヲ驅逐シ及ヒ諸藏ノ熱火症ノ

熱病ヲ解シ及ヒ清涼ニスタマリンド十六戈大  
麥水ヲ以テ煮百二十八戈ニ至リフロヒニシ  
ロセニノ舍利別ニ十八戈ヲ加ヘ和調シ頻  
ニ飲服ス又フロヒニシロセニテ取り糖製  
ニシ諸レヲ燕蓋寒臭ニ充ツベシ○心悸諸般ノ  
下利及ヒ婦人崩漏ロロセニノ糖製ヲ取  
諸大牙肉豆蔻核ノ如キヲ取り服ス日々ニ二三  
次○口中ヲ小瘡ヲ瘡シ齒齦腫熱薔薇蜜ヲ取り  
服ス此ヨク淨刷シ清滌シ及ヒ此ヲ乾カス○諸  
熱腫及ヒ湯火傷雞子白一個薔薇油多少宜ニ從  
ヒ此ニ薔薇露ヲ加ヘ和シ患處ニ塗ル○婦人白  
帶經候不調男子淋瀝及ヒ滑精宮寒未熟ノ者子  
ト共ニ乾カシ一戈赤酒又ハロロセニ  
寒未熟ノ者一溢酒百三十八戈ヲ以テ煮飲服ス  
○熱症頭痛薔薇糕薔薇醋ヲ以テ煖解シ額上ニ貼  
シ帛ヲ以テ卷ク又方薔薇油十二戈薔薇露八戈



薔薇醋四支右相和調シ布帛ニ蘸シテ額ヲ巻ク  
薔薇家生野生ノ二種ニ別ツ家生ハウイツテロ  
ーセン單アリ千葉アリローテプロヒンロー  
ーセンフリユウエーローセン又單アリ千葉  
アリカ子ーローセンゲーレローセン野生ハ  
ホンドローセンジュインロースケニス及ヒエ  
セラニチーロ諸種ノローセンホノ如クニシテ  
其枝蔓ニ似テ鋭刺アリ第一ニ野生ノ者ニ多シ  
其葉周圍鋸齒アリ六七葉相攢リ附ク對生ナリ  
枝端ニ綠苞ヲ生ス綠ニシテ尖レル鱗甲ノ如キ  
者ヲ生ス其中ニツハ糙澁ニシテ其外ノニツハ  
平易ニシテ滑ニシテ兀ケタルカ如シ其第五ハ  
一方糙澁ニシテ其他ハ兀ナリ斯ニ花ヲ發ス其  
大小色彩及ヒ香臭ヲ以テ諸ノ種類ヲ別ツ其花  
ノ中央ニ紙ノ如キ線葉ヲ藏ス其末ニ小ナル黃  
珠子ヲ持ツ花謝ニテ後実ヲ結ブ小ク長ク圓カ

ナリ其子絮ノ如キ細毛相糝ル熟スレバ鮮紅爰  
スベシ諸種ノ中ニ於テ唯野生ノミ多クノ紅毛  
刺アリテ常ニ物ニ刺戟ス其根土中ニ蔓延ス  
増補大抵清涼ノ功アリ赤花乾ケル者収斂シ生  
ナル者下利ス殊ニ頭腦ヲ壯ニス肉色ノ者下利  
ス白キ者収斂シ且強壯ヲ主ル總テ諸般ノ下利  
熱病發渴ニ必用タリ黄ナル者乾ケバ収斂シ齒  
齦ノ病ニ必用タリ是ヲ以テ齒牙散劑ニ入レ用  
ユ

小檗サウセポーム

性功葉及ヒ子寒涼ニシテ燥カス下第二度閉截  
シ及ヒ収斂スルノ功アリ

附方諸藏ノ熱及ヒ火症熱症ヲ清涼ニシ肝心并

ニ胃中悪心スルヲ治シ又諸般ノ血等ヲ止ム

大麥水百二十八錢小檗ノ舍利別二十四錢相和

シ頻ニ飲服ス○齒齦腫爛及ヒ血并ニ咽喉熱

腫新キ子一溢又ハ乾ケル者水百二十八钱ヲ以テ煮三分ノ一ヲ取り桑甚ノ舍利別十六钱ヲ加ヘ含嗽ス○眼眇淚多シ子熟セル者ノ生汁四钱薔薇露半升相和シ頻々ニ目中ニ滴リ洗フ

**増補**子粘稠ヲ稀薄ニスルノ功アリ内藏ノ熱ヲ解シ大渴ヲ止メ吐血赤利ヲ治ス樹ノ黄皮戴口瘡齒齦ノ腐爛ヲ治シ齒牙ヲ定ム

白芷アインケリカ

性功其根温ル一第三度燥カス一第二度閉達シ凝粘ヲ稀薄ニシ汗ヲ發シ及ヒ諸ノ中毒ヲ解シ又傳染ノ諸毒ヲ治ス○諸般ノ中毒天行疫熱若クハ傳染諸疾肝及ヒ脾ノ閉塞胃ノ衰弱等ヲ治シ婦人ノ月経ヲ通ス白芷一钱ヲ取り酒ヲ飲服ス又方白芷底野朮各五分酒又ハ二三ノ露水用ルニ便ナル者少許リヲ以テ調和シ一頓ニ服シ汗ヲ發ス○天行疫熱及ヒ惡氣病ヲナス醋ヲ以

テ煮其氣ヲ嚙納ス又方白芷一茎牝ヲ嚙之或ハ  
含ム○體中ノ凝結ヲ散ス白芷末一錢麥酒ヒ  
ルヲ以テ飲服ス○喘息氣急癩癩婦人子宮衝逆  
ノ症及ヒ黃疽白芷子一錢用ルニ液ヲ以テ飲服  
ス○凡犬咬傷蝮蛇咬傷及ヒ其他毒虫毒獸ノ咬  
傷白芷葉一錢又ハ芸香搗キ密ヲ以テ和シ傳貼  
ス○耳中膿爛莖葉ヲ搗キ絞テ汁ヲ取リ耳中ニ  
滴入ス○凡毒脚痛莖葉ノ生汁ヲ取リ巾ニ蘸シ  
テ患上ニ貼ス

**增補**根月經ヲ通シ胎及ヒ胞衣ヲ下シ胃ヲ強ク  
シ凡氣ヲ疏通シ諸虫ヲ殺シ青腿牙疳乾咳寒嗽  
呼吸不利齒痛ヲ治シ能ク汗ヲ發ス是ヲ以テ傳  
染諸病天行疫疾ニ必用タリ

芹ヒールトルセリ

性功根及ヒ葉温メ且燥カス下中適其子ハ則チ  
熱閉達シ凝粘ヲ稀薄ニシ淨刷シ及ヒ小水ヲ通

利ス

附方 肝脾膽腎及子宮ノ閉塞芥ヲ以テ他ノ飲

食ニ和調シテ頻ニ用ユ又方同ク湯ニ煎シテ飲

服ス最モ便ナリ又方生汁十六棧酒ニ和シテ飲

服ス(○)腎痛石淋子一棧酒又ハ他ノ用ルニ便ナ

ル液ヲ以テ飲服ス(○)難産痛ヲ治シテ産ニ安カ

ラシム醋ヲ以テ和シテ生汁ヲ取リ十六棧食鹽

少許リヲ加ヘ頓服ス(○)乳房ノ凝塊及ヒ乳汁ヲ

乾カス生芥ヲ取リ四握細ニ判ニ蒸餅蘭名ノ餡

多少宜ニ從ヒ共ニ合ニ水及ヒ酒或ハ甘乳酪酪乳

砂糖ヲ以テスル者ヲ以テ煮テ罨劑ト為ス又方

細ニ判メル芥ヲ取リ酪ヲ以テ蒸シ乳房ニ貼ス

○小兒咳嗽甚キ者生汁四棧人乳八棧コメイニ

子蒿香ヲ三分棧ノ一細末ニ右合シ一頓ニ服ス

増補 肝脾及ヒ胃ノ病ヲ治シ婦人經閉石淋及ヒ

難産ヲ療シ飲食ヲ美進シ合歡ニ宜シ

蒿苴サラード

性功涼ニシテ潤眠リヲ催スノ功アリ

**附方**胃熱及ヒ腐敗膽汁ノ刺卓スルヲ治ス蒿苴

或ハ生ニテ用ヒ或ハ煮用ユ宜ニ從フ○眠リヲ

催ス子ヲ取リ巴且杏乳ニ加ヘ用ユ又方子ヲ取

リ持キ細ニシ人乳ニ和シ及ヒ雞子白ミヲ以テ

和シ用テ額上ヲ縛ス又方生汁ヲ取リ薑薇油ヲ

和シ巾ニ蘸シ以テ額上ヲ縛ス○滑精子一味ヲ

取リ又ハ他藥ニ加ヘ飲服ス

**增補**子睡リヲ催シ胃ヲ強クシ淫念ヲ止メ夢ヲ

除キ滑精及ヒ莖中痛ヲ為スヲ治ス

瞿麥アニセリール

性功温メ且燥カスヲ中等心氣ヲ強壯ニスルノ

功アリ

**附方**天行疫熱及ヒ傳染諸病花ヲ以テ造レルコ

ニセルフ大豆ノ大サノ如キヲ取リ毎朝空心ニ

之ヲ服ス別ニ醋一匙ヲ取り花ヲ以テ浸シ玲琅  
硝ニ蘸シテ頻ニ之ヲ嚙ク茎葉ノ生汁三十二  
支ヲ取り一頓ニ服スレバ甚夕能ク疫疾ヲ辟ク  
○心悸頭眩胃癆瘕及ヒ搐搦花ヲ以テ造レル  
コンセルフ或ハ舍利別又ハ花ノ乾ケル者一支  
ペトニ一水又ハマリヨレイニ水ヲ以テ飲服ス  
○婦人難産花ヲ以テ湯ヲ製シ飲服ス○瘡瘍及  
ヒ頭瘡ヲ治ス茎葉ノ生汁ヲ以テ洗ヒ乾ケル花  
ノ細末ヲ以テ之ニ抹ス○頭痛花ヲ浸セシ醋一  
分薔薇露二分中ニ蘸シテ額上ヲ縛ス  
**増補**頭腦ヲ強クシ神經ヲ補ヒ心ヲ壯ニシ胃ヲ  
健ニシ肝ヲ益ス諸中毒ヲ解シ心痛動悸子宮疼  
痛及ヒ經閉ヲ治スルニ甚夕良ナリ

樓斗菜アツケレイ

**附方**肝ノ閉塞及ヒ黃疸子一支細末ニ雜腹蘭六  
分支ノ一酒ヲ以テ飲服シ以テ其汗ヲ発ス○天

行疫熱及ヒ麻疹瘡子ヲ取リ与ヘ服セシム小  
児ハ三分棧ノ一大人ハ一棧○腎痛石淋毎朝空  
心ニ根一箇ヲ取リ直ニ之ヲ嚙ニ而シテ之ヲ嚥  
ム○婦人難産子一棧酒ヲ以テ飲服ス○喘息氣  
急水腫根十六棧酒百二十八棧ヲ以テ煮三分ノ  
一ヲ取リルルメルチイニ一盃ヲ服ス○金瘡ヲ  
愈ス全艸ヲ絞テ生汁ヲ取リ瘡中ニ滴入ス○疥  
癬生汁或ハ根ヲ取リ煎シタル酒ヲ以テ瘡上ヲ  
洗フ○口中疳蝕并ニ鼻竅ノ膿爛生汁ヲ以テ口  
中ヲ洗フ又鼻中ニ灌入ス

**增補**子癸散ノ功アリ故ニ瘡瘡麻疹諸熱傳染諸  
病ニ之ヲ用ヒ就中黃疸ニ於テ殊ニ妙ナリ花ヲ  
以テチニキチユトルトナシ共ニ癸散ノ功アリ  
菖艸ノ腐爛ヲ治ス

燕子花イレアス○リス  
性功温メ且燥カスヲ第三度淨刷シ柔和シ水飲



ヲ下スノ功アリ

附方水腫及口黃疽根ヲ持キ汁ヲ取リ十二朮甘  
乳酪清ヲ以テ飲服ス或ハ亦雞子黃ヲ和スルモ  
可ナリ○氣急喘息及ヒ久咳嗽根ヲ取リ持キ細  
ニシ上好ノ蜜ヲ加ヘコニセルフノ如ニシ肉豆

蔻大ヲ取テ日々ニ再ヒ服ス○腎痛石淋諸虫及  
ヒ月経ヲ催ス根ヲ以湯ヲ製シ酒ヲ加ヘ調シ飲

服ス○子宮堅癖根ヲ以テ水ニテ煮婦人ヲシテ

毎日暫ノ間藏中ニ納レシム又ハ蒸藥ト作シ用

ルモ可ナリ○漏瘡根ノ細末ヲ以テ漏中ニ抹シ

入ル又ハ蜜ヲ以テ和シ維ニ塗テ之ニ挿ム○腹

痛根一錢蜜水ヲ以テ飲服ス○頭痛根ノ生汁ヲ

取リ鼻中ニ灌キ而シテ根ノ細末ニ朮蓄薇醋十

二朮蓄薇油四朮合和シ以テ額上ヲ縛ス

增補新根持キ汁水ヲ逐フヲ甚夕強シ水腫ニ於

テ之ヲ用ユ服度八朮ヨリ二十四朮ニ至ル純粹

液ハ二錢舍利別ハ十六棧細末ハ三分棧ノ四ヲ以テ度トス

馬鞭草 丑イセルコロイド

性功温メ且燥カス味苦シ少ク収斂ノ功アリ

**附方** 黃疸茎葉乾ケル者一棧ウイローク五分

末ト為シ故キ酒ヲ以テ飲服ス○頭痛茎葉宜ニ

適ニ搗キ細ニシ蓄薇油及ヒ醋少許リヲ加ヘ額

上ヲ縛ス○齒痛齒牙動搖及ヒ口中腫爛水或ハ

酒ヲ以テ茎葉ヲ煮テ湯ト作シ以テ口中ヲ嗽シ

苦クハ洗フ○腎痛石淋癩痢肝脾ノ閉塞及ヒ癩

疾茎葉ヲ榨シテ生汁ヲ取リ八棧ヲ服ス或ハ酒

ヲ以テ湯ニ製シ服スルモ亦可ナリ○勞瘵細末

一棧ヲ取リ用ルニ便ナル汁液ヲ以テ飲服ス○

肝ノ痛葉一棧搗キ細ニシ酒ヲ以テ飲服ス○新

旧瘡傷茎葉ヲ搗キ牛酪ヲ以テ和シ膏ノ如ニシ

テ之ヲ貼ス

増補頭脳胸膈肝脾ノ病ノ必用タリ又眼疾ヲ療  
シ諸熱天行疫砂石ノ症疥癬及ヒ淫念妄動スル  
ヲ治シ咽喉腫頭痛ヲ療ス

雜腹蘭

性温ル下第二度燥カス下第一度閉達シ消化シ  
柔軟ニシ痛ヲ和シ心ヲ強壯ニス

附方温精神疲倦ヲ強クシ胸膈ヲ開達喘息胸脇  
痛黃疸難産月經閉ヲ通シ胞衣ヲ下シ睡ヲ催ス

○痘内攻ヲ發ス○眼目疼痛ハ乳汁ニ和シ滴ス

増補殊ニ功痛ヲ和クル下バルサムノ如シ肺臟

ノ靈藥トス

泥蘭度艸木略卷之二

槐園先生譯

門人

信陽木村秀茂輯

水戸伊藤雲慶校

水仙ナルニツセシ

性功根温メ且燥カスヲ第二度淨刷シ及ヒ収斂

ス

**附方** 諸般ノ瘡傷及ヒ疥癬根持キ熟シ膏ノ如シ  
シテ貼ス或ハ花宜キ程ヲ取り油ノ中ニ浸シ此  
ヲ日ノ照ス所ニ置クテ數日其後蒸露罐ヲ以テ  
油ヲ取り用ユ○湯泡火燒及ヒ擦壞根持キ細ニ  
シ密ヲ和シ膏ノ如シテ貼ス

**增補** 根豆粉ト和シ外貼スレバ竹木刺ヲ吸拔  
及ヒ硬腫ヲ柔ク

山慈姑テイテローセン  
和名トウロウ花

性功温メ且燥カス其功水仙ト相似タリ

**附方** 諸般ノ粘稠液痰飲惡液ヲ大便ヨリシテ滌  
除ス根ニ芫蒿香子或ハ蒔蘿子少許リト共ニ  
酒或ハ水ヲ以テ煮テ飲服ス

金盞花コウドブルム

性功花温メ且燥カシ閉達ニ消化シ汗ヲ發シ傳  
染ノ惡氣ヲ治ス

**附方** 傳染諸病心中動悸花ヲ以テコニセルフト

ナレ肉豆蔻大ヲ取り毎朝空心ニ服ス○天行疫  
熱莖葉ノ生汁十六匁ヲ取り頓服ス後温覆ニテ  
汗ヲ取ル又方底野迦全盞花醋ニ和ニ服ス○黄  
疸生汁八匁製乾蚯蚓一匁合和ニ頓服ス○月経  
閉塞莖葉花酒ヲ以テ煮服ス又方生汁八匁空腹  
ニ服ス○胞衣ヲ下ニ及ト死胎ヲ下ス乾ケル莖  
葉ヲ取り熾炭ノ中ニ加ヘ煙リヲ以テ下ヨリニ  
此ヲ熏ス○齒痛葉ノ生汁ヲ取り含ム○瘡傷莖  
葉ヲ持キ膏人如ニシテ貼ス○寒熱病久ク愈カ  
ル者子七顆酒二十四匁ニ浸シ和ケ熱發セント  
スル先夕ツテ四半時ニ服ス○眼目赤腫全盞花  
露頻々ニ目中ニ滴ス

**増補**花心及ヒ肝ヲ強壯ニシ経閉ヲ通ス

大葉標エイケニホーム

性功葉皮子頗ル清凉ニシ及ヒ強ク収斂ニ燥カ  
ス下第三度其子没食子ト功ヲ同ス

附方 經水過多吐血尿血及諸下血葉二握子毳  
及皮各四錢水及赤酒各百二十八錢ヲ以テ  
煮四分ノ一ヲ取り日々ニ再服ス嫩葉ヲ取り露  
ヲ製シ用レバ殊ニ功アリ此露結石腎痛ニ用テ  
其石ヲ利下スルヲ甚夕良ナリ且肝ヲ清涼ニ  
且此ヲ強壯ニス ○齒痛及ヒ齒齦蝕爛嫩葉多少  
宜ニ從ヒ酒ヲ以テ煮口中ニ含嚥ス其他口中ノ  
諸病ニ皆良ナリ此ヲ嗽ス ○新創及ヒ出血ヲ止  
ム葉搗キ細ニシ湯ニ煎シ以テ創上ヲ洗フ ○新  
旧疥癬樹上ノ水ヲ取り瘡上ニ點ス

增補 葉齒齦ノ腐敗ヲ治シ胃寒傷冷毒ヲ療ス水  
及ヒ薄片水ニ煮テ服スレバ足腫水腫及ヒ癩毒  
ヲ治ス子石淋及ヒ尿血ノ班猫ヲ服スルニ因テ  
發スル者ヲ治ス此樹春ニ當テ根下ノ土中ニ於  
テ一物ヲ生ス形葡萄ノ如ク攢テ一處ニ在リ外  
赤シテ内白ク白液アリ此ヲ樹葡萄ト云諸般ノ

下利ヲ治ス最モ赤利ニ良ナリ末ト為レ用ユト  
用ニ痛凡ニ塗ル櫟耳血ヲ止ム

菩提樹リンデシホム

性功葉及ヒ皮中等ノ温及ヒ収斂シ少ク燥カレ  
及ヒ涌発ノ功アリ花温メ且燥カス少ク走竅ス  
腦ノ諸損寒ヨリ発スル者ヲ治スルニ殊ニ功アリ

附方骨腫葉多少宜ニ從ヒ水ニテ煮餅ト為レ患

上ニ貼ス○口中小瘡及ヒ聾口瘡葉清浄ナル兩  
水ヲ以テ煮牝ヲ嗽ス○頭旋發痼卒中及ヒ生ヲ  
催ス花ヲ取り露ト為レ或ハコンセルフト為レ  
用ユ○毛髮脱落木ヲ刻レテ液ヲ取り頭上ニ塗  
ル○血血子細ニ搗キ鼻中ニ入ル○凝血ヲ散ス  
木ヲ取り燒キ醋ヲ以テ牝ニ灌テ炭ト為レ搗キ  
細ニレ一棧ヲ取り一二ノ液ヲ以テ飲服ス

增補花頭腦ヲ強クシ頭旋眩冒卒中及ヒ癩痼ニ



必ス用タリ子諸般ノ下利ヲ止ム葉小水及七月  
經ヲ逐フ皮萎黃病ヲ治スルニ殊ニ妙ナリ春ニ  
当テ樹皮ヲ刻シ流シ滴ル所ノ液癩癧ヲ治ス又  
毛髮脱落ヲ治シ更ニ生セシム

楊柳ウイルケニホーム

性功葉及ヒ皮寒ニシテ燥カス少ク収斂ノ功アリ

附方吐血嘔血下血月經過多諸般ノ帶下葉三溢

酒九十二葉ヲ以テ煮三分ノ一ヲ取リル  
チイニ一盃ヲ服スルヲ日ニ二三回  
○疣目及ヒ牛蹄躑皮燒キ灰ニシ醋ヲ以テ和シ上ニ貼ス  
レバ則チ落ツ○疝痛葉半溢胡椒六顆酒六十四  
葉ヲ以テ煮半ヲ減シ与ヘ服セシム○耳痛葉及  
ヒ皮絞テ汁ヲ取リ各四葉薔薇油十二葉石榴皮  
中ニ納テ此ヲ煮温ニシテ耳中ニ滴ス

增補葉眠リヲ催シ月經過多ヲ治シ吐血及ヒ下

利ヲ療ス外用シテ不寐瘧熱鼻衄及ヒ耳痛生汁  
ヲ取テ耳中ニ滴ス

梨ペールボーム

性功寒燥カレ少ク収斂ス瀉ニシテ酸ナル者燥  
カレ且閉ツ甚タ収斂ス其甘キ者ハ収斂ニ閉塞  
ニ燥カレ又能ク清涼スルヲナシ其葉ハ収斂ニ  
燥カレ且清涼ニスルノ功アリ

附方膽汁敗液ヲ嘔吐スルニ水ヲ以テ蒸爛シ熟

研シ胃ノ部位ニ貼ス○新創ニ葉ヲ取り搗キ細  
ニシ用ユ○子宮脱出葉ヲ布テ牀ト為シ患婦ヲ  
シテ其上ニ坐セシムルヲ數時

榎楂多 丑ボーム

性功寒第一度燥カスヲ第二度収斂ニ清涼ニ  
シ燥ヲ潤ス

附方胃ノ衰弱及ヒ蒸気ノ腦ニ熏蒸スルヲ防ク

ニ実ヲ蒸シ燒キ或ハ但実ノ肉ヲ用ヒマルメラ

テニ造り用ユ世物諸般ノ出血ヲ止メ且嘔吐大  
過ナルヲ止ム○脱肛及ヒ子宮脱出黄ナル皮ヲ  
取り多少宜ニ從ヒ水ヲ以テ煮患處ヲ蒸ス○眼  
目熱腫乳頭坼裂湯火傷舌上糜爛子ヲ取り多少  
宜ニ從ヒ薔薇露ニ浸シ柔ナラシメ粘液ノ生ス  
ルニ至テ度トス患處ニ塗ル○ガルヒユニケル  
毒瘡其毛ヲ取り多少宜ニ從ヒ酒ヲ以テ煮瘡上  
ニ貼ス

**増補** 子胃ノ衰弱ヲ強壯ニス収斂スルノ功アリ  
是ヲ以テ諸般ノ下利嘔吐等ヲ治シ多ク奏效ア  
リ子中ノ粘液和柔消化ノ功アリ眼目熱腫及ヒ  
目物ニ撞ル者疣目及ヒ唇ノ破裂ヲ治ス薔薇  
露時蘿露又ハ車前露ニ和シ用ユ

柳ニスベルボム

性功実摘採テ堅シテ且新キ者寒ニシテ燥カス  
又斂ノ力甚タ強シ其葉ノ性功殆ド実ト同シ

附方 諸般ノ下利及ヒ嘔吐大過実ヲ取り搗キ細  
ニシ膏ノ如ニシテ腹上ニ貼ス ○腰痛及ヒ石淋  
子一棗搗キ細ニシ酒ヲ以テ飲服ス ○喉凡葉ヲ  
以テ湯ト作シ含嗽ス ○月經過多葉ヲ煮テ浴湯  
ト為シ其人ヲシテ其中ニ坐セシムルヲ数時

榛ハセラールノ一テニポーム

性功寒熱ノ中其中ニ収斂ヲ帶フ胃中快カラズ  
及ヒ肝藏ニ用テ良ナリ花寒ニシテ燥カレ且収  
斂ス諸般ノ出血ヲ止住スルヲ以テ知ルベシ

附方 諸般ノ出血ヲ止メ腰痛ヲ和シ茎中断カ如

ク痛ヲ治ス榛子良善ナル者ヲ取り臼中ニ於テ  
搗キリンセヘ乳汁ノ如キ液出ルヲ候テ砂糖ヲ  
以テ味ヲ添ヘ日々ニ二三之ヲ服ス ○咳嗽久  
ク愈ヘズ及ヒ肺藏ノ閉塞榛子皮殼ヲ去リ乾葡  
萄等分共ニ臼中ニ於テ搗キ和シ胡桃大ヲ取テ  
密水ヲ以テ頻ニ服ス ○婦人白帶及ヒ泄瀉其子

ノ皮木ノ如キ處ヲ取りニ芫細木ト為シ赤酒ヲ  
以テ飲服ス○腰痛榛子ノ油ヲ取り痛處ニ塗ル  
増補油ニ三大功アリ一ニ癩癧ヲ治シ二ニ痛ヲ  
和シ三ニ諸虫ヲ殺ス服度六滴ヨリ十滴ニ至ル  
アスベルレインス

性功温ニシテ燥中適ニ屬ス一説ニ温ニシテ湿  
開達ニ淨刷ニ且利尿ノ功アリ根開達ヲ主ル五  
種ノ中ニアリ其子温ニシテ燥第二度ニアリ

附方 肝脾腎肺ノ閉塞黃疸腰痛及ヒ石淋飲食ニ  
調ニテ常用ス或ハ湯ト作シ服スルモ可ニ

増補根小水ヲ利シ石淋ヲ破リ肝腎及ヒ膀胱ヲ  
潤ク外用含嗽劑ト作シ齒痛齒牙動揺スルヲ治  
シ陰精ヲ益ス

酸漿クークークスフロート

性功寒ニシテ燥カス功ハ酸模ト同ニ

附方 口中不淨ノ瘡腫生汁或ハ煎湯ト作シ含嗽

ス○鬱冒肝熱及ヒ火症ノ熱病露水百二十八莖  
生汁ヲ以テ造レル舍利別二十四莖和調シ頻ニ  
服ス

**増補**葉及ヒ花肺脹及ヒ白帶ヲ治シ外用シテ眼  
疾ヲ治ス

蚕休トルメンチルレ

性功燥カスヲ第三度毫モ知ルベキノ熱味無シ  
又飲シ汗ヲ發シ中毒傳染ヲ愈スノ功アリ

**附方**

傳染諸病月經過多吐血尿血ヲ治シ及ヒ體

内ノ諸ノ創傷ヲ治ス乾根末ト為シ一莖莖葉ノ

露水及ヒ酒ヲ以テ飲服ス○口中諸惡瘡根ヲ以

テ湯ニ製シ含嗽ス○諸漏瘡根ヲ取り末ト為シ

患處ニ抹ス○小産ヒスル夕根末一莖蚕休水

十六莖与へ飲マシム其間新キ根及ヒ莖葉多少

宜ニ從ヒ持キ細ニ膏ノ如ニシテ腰上ニ貼ス

**増補**根汗ヲ發シ中毒ヲ療シ心ヲ強クシ天行疫

疾ヲ治ス性収斂ス故ニ諸般ノ下利出血ヲ治ス  
ルニ用ユ全艸外用シテ蝮蛇及ヒ諸蛇咬傷ヲ治  
ス

水楊梅カレイヲツピルヲ夕

性功温メ且燥カス一第二度強壯ニシ少ク収斂  
スルノ功アリ此口中藥ノ筭ニ入ル

附方胸脇痛胃痛腦及ヒ心肝ノ衰弱根十六朶葉

二溢共ニ水及ヒ酒ヲ以テ煮百二十八朶ニ至リ

日々二二三服ス○新創傷根及ヒ葉酒ヲ以

テ煎シ創ヲ洗フ

增補根男女陰部ヲ強クス是ヲ以テ人ヲシテ子

有ラシム酒或ハ麥酒ニ調シ用ユ

紫參ハルツトシク 一名牡蒙 和名チクノハクサ

性功寒ニシテ燥カス一第三度強ク収斂ス汗ヲ

発シ傳染ヲ愈スノ功アリ

附方月經過多下利嘔吐及ヒ小産ヲ防ク乾根末

并五

ト為レ一棧赤酒車前水ヲ以テ飲服ス又方根ヲ  
取リ酒又ハ水ヲ以テ煎シ頻ニ服ス○齒齦出血  
及ヒ齒牙固ラス根葉ヲ絞テ汁ヲ取リ含洗ス○  
天行疫疾及ヒ傳染諸病根末ト為レ創上ニ抹ス  
增補根汗ヲ癸シ中毒ヲ解シ金瘡ヲ療シ赤利嘔  
吐及ヒ諸虫ヲ治スルニ甚タ良ナリ

萎蕤サラモンスセイケル

性功温メ且燥カシ淨刷シ少ク収斂スルノ功アリ

附方面上黠黠新キ根ヲ取リ搗キ爛シ上ニ揩ス

又方根ヲ以テ露ト為レ面上ヲ洗フ○損傷ヲ愈

ス新キ根搗キ爛シ膏ノ如ニシテ創上ニ貼ス○

粘稠液及ヒ水飲水飲惡液ヲ淨クス子十二十三

十四又ハ十五顆ヲ取リ服ス上吐シ下下シテ愈

ユ○葉ニ取リ湯ニ煎シ或ハ末ト為レ一棧ヲ服

スレバ又煎症ヲ治ス○結石腎痛凝血及ヒ經閉



根 露水十六支頓服ス

増補根 白帶下ヲ治シ外用シテ足膝ノ痛腫脚氣  
癍痕諸瘡顔面黒痣小兒疥癬等ヲ治ス露水アセ  
モヲ治シ顔色ヲ美ニス

狗脊ハ一レニ

性功根温メ且燥カス閉達シ少ク収斂スルノ功  
アリ

附方肝及ヒ子宮ノ閉塞根十六支裂キ破リ細ニ  
切リ酒ヲ以テ煮百二十八支ニ至リ日ニ再服  
ス腹中ノ虻虫根ヲ取り水ニテ煮蜜ヲ和シ服ス

○湯泡火焼根ヲ取り多少旦ニ從ヒ臼中ニ於テ  
搗キ熟シ薑薇露少許リヲ加ヘ絞テ汁ヲ取り患  
上ニ塗ル

増補根脾及ヒ子宮等諸藏ノ閉塞ヲ治シ諸虫ヲ  
殺ス

骨碎補ホ一ムハ一レニ

性カ燥カス閉達ニ微利ニ腐敗悪液及ヒ痰飲ヲ  
下スノ功アリ

附方胸中痰塞瘧疾久ク愈エズ諸藏ノ閉塞十六

芎藭乾葡萄五分共ニ大麥水ヲ以テ煮百二十八芎

ニ至リ日ニニ再服ス

增補根微利スルノ功アリ諸藏ノ閉塞ヲ開発シ

青眼牙疳及ヒ他ノ血中ノ不淨ニ生スルノ病ニ

必用タリ生テ催シ死胎ヲ下スバルサムト和シ

熟研シテ膏ト為シ能ク失鐵肉ニ入テ抜ク

兔葵ア子モ子

性功甚ク熱ニシテ燥カス引出シ淨刷シ諸脉ノ

創傷ヲ開クノ功アリ但彼が大ニ峻烈ナルガ為

ニ内服スルヲ無ク外用ニ供ス

附方不淨ノ瘡腫露ト為シ頻ニ洗フ○諸瘡瘡及

ヒ腫中腫瘍生葉ヲ取り持テ患處ニ貼ス○齒痛

及ヒ齒牙不固醋ヲ以テ全中ヲ煮含嗽ス

烏頭

ウヲルフスウヲルテル

性カ温メ且燥カス一第四度人物及ヒ諸獸ニ甚  
夕害アリ以テ死セシムルニ足ル

増補全州以テ物ヲ毒スベシ然レドモ諸癩ヲ治  
スルニ良ナリ烏頭ノ毒ニ中ル者ハ鮓谷底野迦

麝香龍涎香酒麥酒并ニ之ヲ解ス

地榆ヒンピ子ルラ

性功温メ且燥カス一第二度潤達淨利及ヒ少ク  
収斂スルノ功アリ

附方心痛動悸腎痛石淋惡心生葉ヲ取り酒ノ中

ニ浸シ時ニル一メルチイニ一盃ヲ服ス又露ト

為シ酒ニ和シ服スルモ良ナリ○諸創ヲ愈シ及

ヒ出血ヲ止ム莖葉一味ヲ取り煎湯ト作シ或ハ

他ノ治創ノ藥ヲ加ヘ服ス其間莖葉ヲ掃テ創上

ニ貼ス○天行疫疾及ヒ諸熱絞テ汁ヲ取り八朮

ヲ服ス

增補根葉及ヒ子汗ヲ発シ小水ヲ通シ月経ヲ催  
シ石淋ヲ破リ中毒及ヒ水銀毒ヲ療シ又諸般ノ  
全瘡ヲ治スルニ良ナリ外用シテ顔面ノ黥黧全  
瘡日ヲ経ル者及ヒ膿壞諸腫小瘡蝦腫齒痛ヲ治  
シ乳汁ヲ益ス

藿菜カツ テニコロイド

性功温メ且燥カス一第三度走竈ノ属閉達ニ粘  
疑ヲ稀釋スルノ功アリ

附方月経ヲ催シ婦人ヲシテ子有ラシム露ト丸  
シ二十四枚ヲ取り頓服ス且莖葉ヲ以テ浴湯ヲ  
作り患人ヲシテ浴セシム○内部ノ損傷生汁八  
枚ヲ取り酒ニ和シテ服ス

馬蘭ステルレコロイド

性功寒熱ノ中少ク燥カシ消化ニ分利スルノ功  
アリ

附方胃及ヒ眼目ノ熱腫莖葉ヲ取り持キ熟シ膏  
八十

ノ如ニシテ貼ス ○凡犬咬傷花ヲ取り持キ故キ  
猪脂ヲ取り創上ニ貼ス

サクラヤサスレウテルブルム

性功温ル下中適然レトモ燥カス下第三度痛ヲ  
止メ少ク淨刷レ及ヒ収斂スルノ功アリ

**附方**卒中痲症痛凡壞液病或ハ熱腫ノ血ニ属ス

ル者清水ヲ以テ此草ヲ煮服ス又ハ生汁一盞ヲ  
取り服ス ○腎及ヒ膀胱ノ結石ヲ治ス根ヲ取り

酒ヲ以テ漉過シル一メルチイニ一杯ヲ服ス ○

諸創及ヒ損傷生草ヲ取り持テ膏ノ如ニシテ貼

ス ○齒痛根ヲ取り醋ニ漬ケ柔ケ少許リヲ以テ

鼻中ニ灌ク

**増補**花及ヒ葉ヲ柔ケ骨節疼痛ニ必用夕リ并ニ

水腫頭腦ノ病第一ニ卒中痲症身體顛掉癩癩腎

及ヒ膀胱砂石閉塞ヲ療ス根諸虫齒痛ヲ治ス

絡石ニクテパルム

性功中等ノ温燥カス<sub>一</sub>ハ則チ多シ而シテ収斂  
ノ功アリ等シテ治創ノ藥中ニ入ル

附方諸般ノ下利及ヒ出血<sub>中</sub>ヲ取り酒ヲ以テ湯  
ニ煎シ服ス○諸毒虫獸咬傷ヲ治スルニ<sub>中</sub>ヲ搗  
干患處ニ貼ス○婦人白帶ニ給石三溢酒百二十  
八<sub>支</sub>ヲ以テ煮三分ノ一ヲ取りル<sub>一</sub>メルチイニ  
一杯ヲ服ス○耳痛ニ生汁ヲ取り温テ耳中ニ滴

ス

増補葉収斂ノ功アリ諸般ノ下利出血帶下ニ必  
用タリ乳汁ヲ益シ求嗣ニ良ナリ月經過多ナル  
ヲ調ス

石葦 ヘルツトング

性功温ル<sub>一</sub>第一度燥カス<sub>一</sub>第二度或ハ曰ク寒  
ニシテ燥カス閑達ニ凝粘ヲ稀釈シ少ク収斂ス  
ルノ功アリ

附方脾藏鬱脹及ヒ久瘡葉二溢酒百二十八<sub>支</sub>ヲ

八十二

以テ煮三分ノ一ヲ取リル<sub>一</sub>メルチイニ一杯ヲ  
服スル<sub>一</sub>日ニニ次○諸般ノ下利及ヒ吐血石

韋ヲ以テ湯ト為シ砂糖少許リヲ加ヘ服ス

増補葉脾及ヒ肝ノ損傷ニ必用タリ下利及ヒ下  
血ヲ治シ外用シテ創傷膿腫齒痛ヲ治ス

白微 スワルウエウヲルトル

性功温ニシテ燥カス<sub>一</sub>第一度潤達ニ疑粘ヲ稀

釈シ汗ヲ発スルノ功アリ

附方疝痛ヲ治シ月経ヲ催ス根ヲ取リ末ト為シ

一棗酒ヲ以テ飲服ス○諸毒虫獸及ヒ凡犬等ノ

咬傷ニ根ヲ取リ末ト為シ酒ヲ以テ服スル<sub>一</sub>数

日○疫疾及ヒ傳染諸病根ヲ取リ細ニ搗キ一棗

五分カルチユスヘ子チクトス<sub>類</sub> 酸模ト共ニ

服シ温覆シテ汗ヲ取ル○水腫及ヒ黄疽根ヲ以

テ酒ニ浸シ柔ケ又ハ煮テル<sub>一</sub>メルチイニ一杯

ヲ服スル<sub>一</sub>日ニニ次○諸虫ニ根ヲ取リ末ト

為レ小兒ハ三分一大入ハ一一莖葉ヲ以テ製スル所ノ露水ヲ用テ飲服ス○體中ノ凝血ヲ散ス根一莖醋ヲ以テ飲服ス○癰疽根二三莖ヲ取り芍藥子三分一末ト為レ使用ノ液ヲ以テ飲服ス○不淨ノ膿瘡根ノ細末ヲ取り上ニ抹ス

增補根砂石ヲ逐ヒ小水ヲ通レ月經ヲ利レ諸中毒ヲ愈レ天行疫疾毒虫獸ノ咬傷ヲ治レ諸疝諸虫鬱冒心痛動悸ヲ治ス

桃朱術ノイヘケルヘル

性功清涼ニシ且少ク燥カス味苦ク潤達レ淨刷レ腐敗惡液ヲ滌除スルノ功アリ

附方諸藏ノ閉塞黃疸青腿牙疳久瘡及ヒ疥癬ニ全州四溢二百五十六莖ノ乳酪清ヲ以テ煮テ三分一ヲ取り數日之ヲ服ス○眼目朦昧生汁ヲ取り目中ニ滴ス



同前黃花ノ者ケイルアールドローク

性功味苦ク性及ヒ功桃朱術ト同ニ但其水液ヲ  
尊達ニテ小水ヨリ利スルヲ殊ニカアリトスル

ノ三

**増補**全艸及ヒ花腐敗膽汁及ヒ水気ヲ下シ血液

ヲ清淨ニシ閉塞ヲ開発スルノ功アリ

錦荔枝ハルセムアツペルマン子ケン

性功寒熱ノ中ニアリ然レトモ燥カスヲ主ル  
是ヲ以テ収斂シ且創ヲ愈スノ功アリ

**附方**新全瘡及ヒ患膿瘡葉ヲ取り搗キ熟シ上ニ

貼ス又方油ヲ取り其实ヲ以テ漬ケ柔ケ且此ヲ

煮テ綿ニ蘸シテ之ニ貼ス○腰痛ニ葉ヲ取り酒

ヲ以テ煮服ス○乳房糜爛痔疾及ヒ湯火傷実ヲ

以テ油ヲ製シ之ニ塗ル○婦人難産上ニ説ク所

ノ油ヲ以テ腹ニ塗ル○肌肉坼裂葉ヲ取り搗キ

細ニシ一棗小兒ハ五分酒ヲ以テ飲服シ外用ニ

実ニヲ製スル所ノ油ヲ以テ之ニ塗ル

増補 此草甚タバルサムノ功アリ茎葉及ヒ根又

内服ニ堪タリ外用ハ諸般ノ創傷ヲ治ス油ニ製

シ諸般ノ創傷ヲ治ス油ニ製シ諸般ノ新金瘡ヲ

治スルニ焮腫ヲ發セス数日ヲ出スレテ愈ユ最

モ能ク口中破裂ヲ治ス及ヒ乳房陰處亦同シ

鳳仙花バルセムアッペルウエフケン

性カ錦荔枝ト功ヲ同ス一説ニペルシキコロイ  
トト功ヲ同ス

羅勒パシリコム

性功温ルヲ第二度消化分疏スルニ用ユ

附方 頭目旋暈及ヒ朦昧生汁ヲ取り目中ニ滴ル

○氣急喘息子一棧蜜水ヲ以テ飲服ス○小水ヲ

利シ月経ヲ通ス酒ヲ以テ茎葉ヲ煮服ス

増補 此草肺ヲ清淨ニシ月経ヲ催ス然レドモ用

ルヲ稀ナリ

芸香 ウレインロイド

性功温ニシテ燥カス<sup>1</sup>第三度走竈透截ニ粘  
凝ヲ稀釈シ及ヒ傳染ヲ治スルノ功アリ

附方 月経ヲ通シ胞衣ヲ下ス湯ト作シ服ス又ハ  
生汁ヲ取り酒ニ和シテ服ス ○中毒ヲ治ス子一

及ヒ天行疫疾ニ胡桃子ニ顆無花果ニ顆芸香ニ  
十葉食鹽少許リ右共ニ合シテ搗キコンセルス

ノ如クニシ毎朝豆ノ大サヲ取り服ス此ノ方頤  
メ防クノ術ニ於テ殊ニ驗アリ ○惡症ノ熱病芸

香多少宜ニ從ヒ食鹽及ヒ醋少許リヲ加ヘ共ニ  
持キ和シ以テ動脈ヲ縛ス ○水腫芸香ニ溢百ニ

十八棧ノ酒ヲ以テ煮半ヲ減シ分テ四服ス ○眼  
目蒙昧芸香一味若クハ蔞蘿汁ヲ和シ目中ニ滴

ル ○耳聾耳痛及ヒ耳鳴生汁若クハ油ヲ以テ耳  
中ニ滴ス ○脾藏ノ鬱脹油ヲ取り左脇脾ノ部位

ニ塗ル ○昏睡病及ヒ癩瘡生汁一匙ヲ服シ且醋  
ヲ和シ鼻中ニ灌ク ○滑精芸香子一匁細末ト为  
レ一二ノ液ヲ以テ服ス ○凡大咬傷生汁十六匁  
酒ヲ以テ飲服シ且葉ヲ取り持キ食鹽及ヒ蜜ヲ  
和シ咬傷ノ處ニ貼ス

増補 荃葉及ヒ子小便ヲ利シ月経ヲ通シ生ヲ催  
ス頭ノ諸疾ニ必用タリ神經及ヒ眼目ヲ治シ諸  
中毒及ヒ青腿疔疳ヲ治ス卒中昏睡病癩瘡ヲ治  
ス眼目衰弱及ヒ眵淚多キヲ治ス

大蒜 ロ—ク

性功 大熱ニシテ燥カス 第四度臭気強ク味辛  
烈 閉達ニ壅ヲ決シ圍ヲ漬ヤシ消化ニ傳染及ヒ  
中毒ヲ治スルノ功アリ葱ト功用ヲ同シテ更ニ  
強シ

附方 諸般ノ寒毒大蒜ヲ以テ飲飯ニ調シ用ユ又  
ハ酒ニ浸シ用ユ ○小兒諸虫甘乳酪ヲ以テ煮与

へ服セシム其間大蒜ヲ持キ新鮮ナル牛酪ヲ以  
テ和シ鳩尾ニ塗ル○頭上ノ患瘡生汁蜜ヲ以テ  
和シ塗ル○咳嗽久ク愈サルニ生汁和スルニ猪  
脂ヲ以テシ足心及ヒ動脈ノ上ニ塗ル○天行疫  
疾大蒜一顆芸香白屈菜各十葉共ニ臼中ニ於テ  
持キ白酒及ヒ燒酒ヲ加ヘ汁ヲ取り服ス○齒痛  
醋ヲ以テ煎シ口中ニ含ム或ハ灰中ニ煨シ温ニ  
兼シテ痛ム齒ニ貼ス

増補諸疝腸痛咳嗽呼吸不利肺病黃疸腎痛石淋  
ヲ治シ細ニ判ニ燒酒ヲ以テ服シ結石ノ症ニ最  
モ良ナリ露ト為シ諸般ノ中毒ヲ解ス

葱 アユイニ

性功温メ且燥カス丁第四度然レトモ大蒜ニ比  
スレハ甚々熱ナラス閉塞ヲ開発シ凝粘ヲ稀釈  
シ壅ヲ決シ圍ヲ潰ヤシ陳滯ヲ滌刷スルノ功アリ

附方痔疾壅滯ヲ治スルニ生汁ヲ取り綿ニ蘸シ  
テ肚中ニ入ル○小便ヲ通シ凡氣ヲ分疏シ月経  
ヲ催ス飲食ニ調シテ用ユ○天行疫疾葱根ノ心  
抜キ去リ充ルニ底野迦ヲ以テニ佛手柑汁ヲ以  
テ和シ其孔ヲ密封シ熱灰中ニ燉シ絞テ汁ヲ取  
リ傾服シ温霞シテ汗ヲ取ル○産後痛酒ヲ以テ  
煮ホルトカル油ヲ和シ搗キ膏ノ如クニシテ臍  
中ニ貼ス○凡犬咬傷葱芸香蜜及ヒ食鹽多少宜

ニ適シ共ニ合シテ熟研シ創上ニ貼ス○眼中  
點及ヒ眼目朦昧生汁蜜ヲ以テ和シ眼中ニ點ス  
○腦中痰液多キヲ清淨ニス生汁鼻中ニ灌ク○  
血生汁醋ヲ和シ鼻中ニ灌ク○聾耳生汁温テ  
耳中ニ滴ス○耳聾及ヒ耳鳴葱根心ヲ抜キコメ  
インサード即チ伊吹防ノ末ヲ充チ熱灰中ニ燉  
シ絞テ汁ヲ取り耳中ニ滴ス○湯泡火燒皮膚剥  
脱セル者生汁雞脂ヲ和シ塗ル○毛髮脱落及ヒ

髮ヲ生ス生汁ヲ取り塗ル

**増補** 小水ヲ利シ汗ヲ発シ肺中ノ粘液ヲ緩ム蜜

= 煮テ用レバ諸石及ヒ諸虫ヲ駆ル醋 = 浸シテ

用レバ月経ヲ通ス外用シテ瘡腫ヲ熟シ及ヒ開

発スルノ功アリ是ヲ以テ癰腫及ヒペストポイ

レニ疥癩熱発スルヲ開発スル = 用ユ又狂犬咬傷

= 用ユ

瓜  
メ  
ル  
子

性功寒第一度燥ヲ潤シ津ヲ生スルヲ第三度胃

熱ヲ治スル = 甚タ良ナリ然レドモ諸疝青腿牙

疝或ハ脾病 = 利ナラス瓜子性功胡瓜子ト同シ

共 = 四種ノ大寒子ノ中 = 在リ

**附方** 頭痛熱 = 因ル者穰ヲ取り切リ額上ヲ縛ス

○ 顔面ノ班點生汁及ヒ子蚕豆粉ヲ以テ和シ餅

ト為シ日 = 乾シ酒 = 和シ班上 = 搗シ塗ル ○ 頭

上ノ疥癬根ヲ取り乾シ末シ蜜ヲ以テ和シ塗ル

○吐リト為ニ根ヲ取り乾シ末シ一棗蜜水ヲ以テ服ス○腎痛石淋肝藏ノ熱及ヒ諸藏ノ熱シテ燒カ如キ其熟セル者ヲ以テ露水ヲ取り三十二

貼ス

増補熱火ヲ消シ及ヒ白虫ヲ殺ス然レドモ若シ

之ヲ調スルニ胡椒及ヒ上好酒ヲ以テスルニ非カレバ善ク寒熱及ヒ下利ヲ發ス

藿香 メリスサ

性功温メ且燥カス一第二度衰弱ヲ強壯ニスルノ功アリ

附方胃中ニ水湿アリ寒冷シ及ヒ心中動悸腦中

閉塞并ニ腰痛酒ヲ以テ煮テ湯ト為シ服ス又其

コニセルフ蚕豆大ヲ取り其露水ヲ以テ飲服ス

○氣急喘息生汁ヲ以テ舍利別ヲ製シ頻ニ舐

服ス○諸般ノ全瘡生汁ヲ取り患處ニ灌ク○經



水不利子宮衝逆及ヒ子宮疼痛酒ヲ以テ煮テ湯  
ヲ製シ服ス且藿香苦薏花共ニ多少置ニ從ヒ一  
袋ヲ以テ此ヲ盛り水ヲ以テ煮温ニ乘シテ腹上

ニ貼ス

増補頭眩暈冒卒中痲症ヲ治シ最モ能ク心腹暴  
脹及ヒ陰吹ヲ治シ月經ヲ通シ胞衣ヲ下ス外用  
坐湯ニ作り馬蠅及ヒ蜂螫毒ヲ治ス

紫薊サリ

性功温メ且燥カス一第三度少ク収斂スルノ功  
アリ

附方諸般ノ寒ニ因テ頭腦及ヒ神經ヲ傷スル者

花ヲ以テ製スルユニセルフ蚕豆大ヲ取り其露  
水ヲ以テ空心ニ飲服ス又ハ酒ヲ以テ湯ト作シ服  
ス○諸創不淨ノ諸瘡葉ヲ持キ膏ノ如ニシテ患  
處ニ貼ス○齒齦不淨酒ヲ以テ煮合嗽ス○中毒  
葉三個ヲ取り鹽少許リヲ和シ服ス○腎痛石淋

酒ヲ以テ湯ヲ製シル一メルチイニ一杯ヲ服ス  
○耳後ノ腫ルニ紫蘚葉子イテニ等分細ニ  
持キ膏ノ如ニシテ貼ス○預メ小産ヲ防ク孕婦  
ヲシテ常ニ紫蘇葉ヲ食ハシム

**増補**花小便ヲ利シ胎ヲ通シ月経ヲ催シ胞衣ヲ

下ス胃子宮ノ病ニ必用タリ頭眩冒顫掉拘攣  
不孕ノ症天行疫疾咳嗽肺病等ヲ治ス葉功同シ  
外用出血齒齦臭爛ヲ治スルニ以テ齒及ヒ齒齦  
ヲ揩ス乳房ニ貼スレバ乳汁ヲ減ス酒或ハ麥酒  
ニ浸シ用ユレバ水腫三日一癉ノ瘡熱等ヲ治ス

胡芦巴フニカヲキ

性功温ル一第二度燥カス一第一度酷厉ヲ柔熟  
ス堅硬ヲ消化シ腫ヲ釀和シ痛ヲ定ルノ功アリ  
**附方**諸般ノ腫瘍胡芦巴末ヲ取リ多少宜ニ從ヒ  
蜜水ヲ和シテ餅ト為シ貼ス○脾藏ノ鬱腫末多  
少宜ニ從ヒ消石四莖醋ヲ以テ和シテ餅ト為シ

毒

左脇ニ貼ス○腸痛裂カ如ニ子ヲ以テ湯ヲ製シ  
水銃ヲ以テ腸中ニ入ル○子宮堅癖及ヒ子宮腫  
瘍水ヲ以テ子ヲ煮婦人ヲシテ其中ニ浴セシム  
其後子ヨリ粘滑液ヲ取り蠶脂ヲ和シ藏中ニ灌  
ク○諸般ノ腫瘍ヲ熟ス葉ヲ取り酒及ヒ油ノ中  
ニ浸ス一十五日煮テ酒気尽ルニ至リ其後絞テ  
滓ヲ去リ胡芦巴朮及ヒ蠟多少宜ニ適シ煎膏ト

為ニ用ユ

増補子及ヒ粉ト為セル者堅硬ヲ消熟ニ凝結ヲ  
疏散スルノ糊劑及ヒ水銃劑ニ用ユ其破氣驅凡  
ノ功アルヲ以テニ其液ヲムキ能ク天行眼疾ヲ療  
ス

紅花 ウィルトバスタールトサフターニ

性功燥カシ少ク分疏シ消化スルノ功アリ

増補子下利ノ功アリ故ニ下劑中ニ之ヲ用ユ花

ハ染家ニ之ヲ用ユ

蒲公英

ハ一ヘニコロイト

性功 清涼ニシ燥カス一第二度味苦ク開達ニ及  
ヒ淨刷スルノ功アリ

附方 寒熱病ヲ治シ血ヲ清淨ニスルニ莖葉三溢  
乳酪清百二十八莪ヲ以テ煮三分ノ一ヲ取り頻

ニ之ヲ服ス又方葉ヲ絞リ生汁ヲ取り十六莪  
リム一子ニメ舍利別ハ莪合和シ頓服ス○眼

中點ヲ生スルニ乳ノ如キ汁ヲ取り眼中ニ點ス  
ル一七日ニニ三次○新金瘡ニ莖葉ヲ以テ湯ニ作  
リ患處ヲ洗フ

増補 全州及ヒ根此脾及ヒ肝ノ要藥水腫及ヒ黃  
疸青腿牙疳尿閉ヲ治ス外用目ニ點ヲ生スルヲ

治ス莖ヨリ出ル汁疣目ノ類ヲ散ス  
蜀葵 一ムストウアルテル

性功 中等ノ温但燥カス一常ノ葵ヨリニ強ニ苦  
烈ヲ柔熟ニ分疏破裂ニ疼痛ヲ除キ止メ且酷裂

液ヲ和調スルノ功アリ

**附方** 結石腎痛ニ葉二溢又ハ根十六錢酒百二十

八棧ヲ以テ煮半ヲ減シ分テ二服ス○胃寒傷冷

毒及ヒ其毒胸部ニ陷ルニ蜀葵糖沙糖ヲ以テ一

個ヲ以テ口中ニ含シ化シ嚥ム○咳嗽愈サルニ

根十二棧甘乳酪ヲ以テ煮百二十八棧ヲ取リル

一メルチイニ一杯ヲ服スル一日ニ二次○

諸般ノ堅硬寒腫ヲ治スルニ根多宜ニ適シ酒ヲ

以テ煮柔ケ臼中ニ於テ杵キ熟シ猪脂少許リヲ

加ヘ膏ノ如シテ腫上ニ貼ス

**增補** 根葉下利及ヒ分疏スルノ功アリ諸液中ノ

酷厉ヲ減シ汗ヲ發シ痛ヲ消ス根肉桂ト共ニ水

煮シテ胞衣ヲ下シ産後ノ瘀血ヲ淨クス根搗テ

砂糖ヲ以テ和シ疣目ノ類ニ塗リ及ヒ其破裂ス

ルヲ治ス

薊藟 ハーシキ

性功并ニ接骨木ト甚々同之

**増補**強ク下利スルノ功アリ然レドモ根浸シ出

シテ用ユレバ其力殊ニ強シ但水煮スレバ稍弱

シ子用ル一棧ヨリ二棧ニ至ル其芽萌ノ葉甚

力弱ナリ其瞑眩ヲ治スルニ酒ヲテ之ヲ解ス

瀕ヒルガヲセイウインテ

性功温メ且燥カス一第三度水飲ヲ駆逐シテ此

ヲ下利スル一甚々峻駛ナリ

**附方**水腫肝病及ヒ青腿牙疳葉一棧大黃一棧五

分肉桂干姜各六分棧ノ一共ニ合シ清水ニ浸シ

一宿而シテ火ニ上セテ一二沸漉過シ白砂糖

少許リヲ加ヘ頓服ス強人ハ之ヲ服シテ黃水ヲ

下利ス又方葉ヲ取リ末シ一棧口一スマリイ

シ又ハ紫蘇ノコンセルフニ棧合和シ頓服ス

**増補**葉新キ者下利ノ功アリ故ニ水腫方中ニ入

ル水ニ浸ス者四棧ニ至リ末シ用ユル者一棧ヨ

リニ棧ニ至ル

菱 一トールノ一テン

性功清涼ニシ少ク収斂スルノ功アリ

附方尿血腎膀結石痛及ヒ諸般ノ下利ニ乾ケル

菱一棧細末シ酒ヲ以テ飲服ス如世スレバ其砂

石小便ヨリ空ツ或ハ新キ者ヲ得ハ露水ニ作り

服スルモ亦得

増補実砂石ヲ破リ赤利尿血服痛ヲ治ス葉眼藥

ニ用ヒ齒銀及ヒ口中ノ炊腫ヲ治ス

夏枯艸 フリュイ子ペトニイ

性功温メ且燥カス第二度閉塞ヲ閉塞ニ壅ヲ

決ニ圍ヲ潰シ凝粘ヲ稀釈シ陳滯ヲ滌刷スルノ

功アリ

附方腦ノ寒傷肝脾及ヒ子宮ノ閉塞黃疸腎膀結

石ニ氷或ハ酒ヲ以テ湯ヲ作り砂糖或ハ世中ノ

舍利別ヲ和調シル一メルチイニ一盃ヲ服ス

ル日二三度此叶ヲ以テ酒劑ト爲シ又亦  
露水ト爲シ又ハ花ヲ以テコンセルフト爲ス者  
共ニ能ク前症ヲ治ス○頭上ノ創傷葉ヲ搗キ上  
ニ貼ス○留飲ヲ吐スルニ于ケル根ニ芫蜜水ヲ  
以テ飲服ス

增補花頭腦ノ諸患ヲ治ス即チ耳聞チ不聰耳鳴  
肺ノ膿腫吐血及ヒ吐膿ヲ治シ小便ヲ利ス中毒  
ヲ驅除ス

浮萍ワトトルリンセン

性功燥ヲ潤シ津ヲ生シ清涼ニスルチ第二度

附方頭痛熱症諸腫浮萍多少宜ニ從ヒ患處ニ外

貼ニ頻ニニ更換ス○眼目熱赤或ハ肝藏ノ熱腫

露水ヲ以テ頻ニ洗フ肝藏ノ熱腫ニハ巾ニ蘸シ

テ右眼肝部位ニ貼ス○痛風ニ多少宜ニ從ヒ磁

罐或ハ鐵罐ヲ以テ温メ綿布ニ攤シ膏ノ如ク脚

上ニ貼ス余此ヲ脚氣敷発スルニ用テ毎ニ功ア



増補眼目赤痛及ヒ腫又破裂スルヲ治ス

萍葦艸 フロムペン

性功根及ヒ子清涼ニシ燥ス第三度花及ヒ葉  
清涼ニシ燥ヲ潤シ津ヲ生スルノ性功アリ

防方滑精月経不止及ヒ下利不禁子或ハ根一朶

チンタ酒ヲ以テ一頓ニ飲服ス又方花ヲ以テコ

ンセルフヲ造リ服ス○諸出血ヲ止ム青葉細ニ

搗キ膏ノ如ニシテ倉上ニ貼ス○火症ノ熱病乾

咳嗽諸藏ノ熱腫白花萍蓬ノ花ヲ以テ露水ヲ製

シ百二十八朶同ク舍利別ニ作ス者十六朶相合

シ頻ニ服ス○脾痛根八朶白酒六十四朶ヲ以テ

煮分テ再服ス○頭痛及ヒ肝脾又ハ腎ノ熱腫白

花萍蓬ノ花ヲ以テ露水ヲ製シ多少宜ニ從ヒ巾

ヲ以テ此ニ浸シ以テ額上ヲ縛ス又ハ右眼肝ノ

部位若ハ左眼脾ノ部位若ハ腰上ニ貼ス

増補子淫慾ヲ消シ血熱ヲ清涼ニシ滑精及ヒ白  
帶ヲ治ス花露清涼ヲ主ル是ヲ以テ諸清涼劑ニ  
之ヲ用ユ

茵陳 アルセム

性功温ル一第二度燥ス一第三度味苦ク閉塞ヲ  
開発シ壅ヲ決シ圍ヲ潰シ陳滯ヲ滌刷シ少ク収  
斂スルノ功アリ

附方胃ノ衰弱シテ惡液留飲ヲ生シ及ヒ肝藏ノ

閉塞寒熱久ク愈サルニ此ヲ以テ製シタルコソ  
セルフ一塊ヲ取り毎朝之ヲ服ス又ハ二溢清水  
ヲ以テ煮百二十八莖ヲ取り此ノ舍利別二十四  
莖ヲ加ヘル一メルチイニ一杯ヲ服スル一曰  
一ニ二次又茵陳酒前症ニ用テ良ナリ右等ノ藥  
ヲ服スルノ間茵陳油ヲ以テ腹上ニ塗ルベシ○  
腹痛及ヒ虫症茵陳花一溢コメイニサリ一ト小  
香ヲ代用 二莖酒ヲ以テ煮百二十八莖ヲ取り服  
スベシ

ス且其油ヲ以テ臍中ニ塗ル○黃疸卅艸ヲ以湯  
ニ製シ服ス○杖癩ニ葉ヲ持キ蜜ヲ和シ貼ス○  
耳痛水ヲ以テ煮蒸氣ヲ以テ耳中ニ蒸ス○子宮  
疼痛茵陳二溢酒百二十朶ヲ以テ煮三分ノ一ヲ  
取リル——メルチイニ一杯ヲ頓服ス

**増補**腸痛ヲ治シ胃氣ヲ強壯ニシ黃疸水腫寒熱  
病ヲ治ス

薺 テスケンスコロイド

性功清涼ニシ燥カ且収斂スルノ功アリ

**附方**尿血赤利及ヒ諸般ノ下血卅艸一溢車前半

兩水六十四朶ヲ以テ煮半ヲ取リ漉過シ口——

テホリス一朶ヲ和シ分テ再服ス○衄血葉ヲ取

リ裂キ碎キ多少宜ニ適シ鼻中ニ挿入シ腋下及

項ヲ縛ス○金瘡出血葉ヲ持キ膏ノ如ニシテ貼

ス○黃疸葉ヲ持キ熟シ足心ニ貼シ縛定ス

**増補**収斂ス卅ヨリシテ閉塞スルノ功アリ故ニ

金瘡ノ良薬タリ赤酒ヲ以テ煮諸ノ出血ヲ治ス

石長生 ステー—ニコロイト

性功寒熱ノ中燥スノ性アリ胸中ノ粘痰稠飲ヲ  
稀薄ニシ成熟スルノ功アリ

附方咳嗽諸藏ノ閉塞腎膀胱結石葉四溢百九十五

我ノ酒ヲ以テ煮三分ノ一ヲ取り漉過シ此汁ノ

舍利別ヲ加ヘル—メルチイニ一盃ヲ飲服ス

ル一日ニ二次○頭上ノ濕患瘡葉多少宜ニ適

シ灰汁ヲ以テ煮以テ瘡ヲ洗フ

増補性寒熱ノ中多ク治胸ノ湯中ニ之ヲ用ユ即

チ呼吸不利咳嗽肺病脾病水腫尿血ヲ治シ殊ニ

尿道ノ凝血ヲ治ス若シ沙石有テ腎痛ノ症ニ属

スル者ハヨウテシナルセニ及ヒバ—レルサ

—ドヲ加フベシ

蟹殼汁 ウィンテルゲル—

性功燥スヲ著明ニシテ少ク清涼ニスルノ性収

飲レ創ヲ愈スノ功アリ

附方内外損傷ニ此草ヲ以テ酒ヲ以テ煎シ又ハ  
他ノ治創ノ藥ニ調和シル一メルチイニ一杯  
ヲ服スル一日ニ二三次○湯泡火焼生葉ヲ取  
リ持キ膏ノ如シテ貼○吐血經水過多及口諸  
般ノ下血葉四溢細ニ剉ミテスタールトワ  
トル別ヲ以テ煮百二十八枚ヲ取り漉過シミル  
ドペレインノ舍利別十六枚クウインハ枚ヲ和調  
シ日ニニ再服ス

増補

葉湯火傷全瘡膿壞ペイブスウー  
ル管膿

腎ノ膿壞肺癰ヲ治ス煎湯ニ入レ又ハ散劑或ハ  
菴劑中ニ入レ内外用ス

佛甲草 トンドルパー  
ルト和名イハレシゲ

性功清涼ニスル第三度稀涼ヲ濃厚ニシ少ク  
又飲スルノ功アリ

附方眼目凡赤ニ及口焮腫赤班生汁ヲ取り頻々

二之ニ點ス又ハ巾ニ漬シテ之ニ貼ス痛凡熱ニ  
因ル者大葉ノ佛甲艸ヲ取リ多少宜ニ適ニ持キ  
細ニシ大麥粉ヲ以テ和シ膏ノ如ニシテ貼ス○  
火症ノ熱病大葉佛甲艸ノ生汁ハ戈カハ十  
スベ子シクチ水十六戈白砂糖二戈和調シ頻  
ニ一匙ヲ服ス○熱病大頭痛ニ大葉佛甲艸汁十  
六戈薔薇油八戈薔薇醋二戈合和シ巾ニ蘸シテ  
額上ニ貼ス○肝藏ノ熱腫生汁醋ヲ和シ貼ス○  
湯泡火燒生汁薔薇油及ヒ蠅ヲ以テ軟膏ヲ作り  
患處ニ塗ル○血生汁宜ニ適シ巾ニ漬シテ額  
上及ヒ顛顛鼻上ヲ縛ス○粘疼及ヒ腐敗惡液ヲ  
吐除ス生汁二戈便用ノ液ヲ以テ飲服ス  
增補葉外用シテ疣目ノ類咽喉膿腫眼目焮腫肝  
ノ焮腫熱病譫妄ヲ發スル者骨節痛乳汁過多ヲ  
治シ又酔ヲ醒ス

泥蘭度艸本略卷之三

信陽木村秀茂輯

槐園先生譯

門人

水戸伊藤雲慶校

益母 ヘルツゲスバン

目八シキ

性功温ル一第二度燥カス一第三度陳滯ヲ滌刷  
シ少ク収斂シ小水ヲ通利スルノ功アリ

附方諸藏ノ閉塞婦人難産小水ヲ通利シ月経ヲ  
催スニ乾ケル葉末ト為シ一匁酒ヲ以テ飲服ス  
○骨節間錯州州ヲ以テ浴湯ト為シ患處ヲ浴ス  
○腹痛及ヒ子宮疼痛州州多少宜ニ從ヒ酪ヲ以  
テ煮膏ノ如ニシテ腹ニ貼ス○腹中有虫葉一溢  
苗陳油ヲ以テ煮脂中ニ敷キ上ヲ縛ス○損傷ヲ  
愈シ出血ヲ止ム葉ヲ取り搗キ熟シ創上ニ貼ス  
増補諸ノ閉塞痼瘕瘰癧急ニ用ユ

蘭 フー ルケンスコロイト フレハカ

性功温メ且燥ス下第二度味苦ク閉塞ヲ開発シ  
壅ヲ決シ圍ヲ潰シ少ク収斂シ血液ヲ清浄ニス  
ルノ功アリ治創ノ藥中ニ等フ

附方肝脾及ヒ膽ノ閉塞葉三溢水百二十八匁ヲ  
以テ煮三分ノ一ヲ取り漉過シ調スルニ砂糖ヲ  
以シル一メルチイニ一杯ヲ服スル七日ニ二  
次○虬虫ニ葉ノ生汁四匁故キ蜜水八匁和調シ

原和調シ



頓服ス○三日瘧及ヒ月經不通葉二溢酒百二  
十八棧ヲ以テ煮四十八棧ヲ取り其半ヲ未発ニ  
先テ服ス月經ヲ治スルニハ夕ニ於テ服ス○金  
瘡及ヒ損傷水ヲ以テ湯ヲ作り日ニ二三服ス  
増補花葉金瘡皮膚ノ不潔及ヒ經閉ヲ治スルニ  
良ニ

大麻 へん子ッア

アサ

性功清涼ニ燥スノ性アリ麻子ハ少ク温メ且  
燥ス又一説ニ寒ニシテ燥ストス

附方黃疸肝藏ノ閉塞冒寒傷冷毒及ヒ内藏ノ痛  
麻子四溢臼中ニ於テ持キ細ニ薑薇ノコニセ  
ルフ八棧甘乳酪清百二十八棧ヲ以テ煮レイン  
セウエイン少許ヲ加ヘ凝結スルニ至リ漉過シル  
—メルチイニ一杯ヲ服スル日ニ二三回○  
滑精及ヒ胸脇痛麻子一棧臼中ニ於テ持キ細ニ  
之大麥水六十四棧及ヒ酪漿ニ浸シ出シ和スル

砂糖ヲ以テ分テ再服ス○堅硬腫毒麻子油  
ヲ以テ塗ル○耳痛生汁ヲ取り耳中ニ滴ス  
増補子陽事ヲ減ス是ヲ以テ滑精ヲ止ム脇痛及  
脇ノ刺痛諸虫咳嗽黃疸ヲ治ス

擔不婦 夕ハツコ

性功温メ且燥カスノ性アリ陳滯ヲ滌刷シ壅ヲ  
決シ圍ヲ潰シ感觸ヲ奪ヒ惡物ヲ泻下スル

ノ功アリ

附方

腦中ノ惡液多キヲ除キ且齒痛ヲ治スルニ

細末ト爲シ少許ヲ取テ鼻ニ入ル又方齒痛ニハ

管ヲ以テ煙吸ヒ陳ヲ吐キ新ヲ納ル此ヲ擔不婦

ヲ飲ト名ク甚々妙ニ○寒熱病ニ露服木(六)莪將

ニ發セントスルニ先テ服ス○虫症生汁砂糖ヲ

和シテ舍利別ヲ作り一匙ヲ服シ生葉ヲ取り臍

中ニ貼ス○湯泡火燒生葉傷處ニ貼ス○水腫青

莖葉ノ生汁一匙使用ノ液ヲ以テ飲服 上吐ニ

厚

下利之ヲ愈ユ○新舊金瘡青葉ヲ絞リ汁ヲ以テ

瘡中ニ滴リ葉ヲ以テ上ニ貼ス○氣急喘息及ヒ

胸中疼塞舍利別一匙ヲ服ス○腹中及ヒ子宮痛

葉ヲ持キ温テ腑中ニ貼ス

**増補** 燥カニ眠ヲ催スノ功アリ胸中ノ粘痰ヲ消

シ湿症ニ用テ可ナリ

胡椒 ペイブル

性功熱ニシテ燥ス下第三度又生ハ第四度壅チ

決シ圍ヲ潰シ凝粘ヲ稀釈シ閉塞ヲ開発スルノ

功アリ **附方** 胃ノ寒冷及ヒ湿ニ感スルニ胡椒五六顆ヲ

取リ食前半時ヲ以テ吞服ス○腹痛中毒眼目蒙

昧及ヒ他水飲過多并ニ凡氣ニ因テ生スルノ諸

患胡椒ヲ以テ他ノ諸方中ニ加ヘ服ス

**増補** 人此ヲ用テ寒性ノ飲食ヲ助ク調スルノミ

ニアラス医薬ニ用テ胃ノ衰弱ヲ強壯ニシ食欲

ヲ催之破氣驅風ニ充ツ常ニ七枚ヨリ十枚ニ至  
テテヲ取テ搗キ碎キ寒熱病ヲ治ス又油ヲ以テ  
心窩或ハ脊椎ヲ摩スルモ亦可ニ

白頭翁 ケウケンシケツレ

性功熱ニシテ燥ス一第三度壅ヲ決シ圍ヲ潰シ  
凝粘ヲ稀釈シ堅ヲ消シ硬ヲ化シ汗穢ヲ清淨ニ  
ニシ物ヲ蝕スルノ功アリ是ヲ以テ人宜ク内服  
スル一無ルベシ

增補根中毒ヲ解シ汗ヲ發シ疫熱及ヒ其他ノ有

毒諸病ニ用テ大功アリ然レドモ葉及ヒ花ハ腐  
蝕スルノ功アリ是ヲ以テ疣因汗斑或ハ瓜ヲ除  
クノ劑ニ用ユ

中菘 ランケペイブル

性功温メ且燥ス一第二度少ク酷厉ノ氣及ヒ収  
斂スルノ功アリ

蒲 リストワテ

性功此水詳其性功或ハ此ヲ涼暖ノ中ニ論ス  
且頗ル燥カスノ性アリトス

葡萄 ウヰインカー丨ルト

性功葉及ヒ鬚蔓清涼ニスルノ性アリ強ク収斂  
スルノ功アリ未熟ノ葡萄清涼ニ燥シ又斂ス  
熟スレバ則チ温メ燥ヲ潤シ津ヲ生スルヲ第一  
度然レ厄多ク食ハ凡チ動ニ泄瀉ヲ催ス

附方頭痛執ニ因ル者葉及ヒ鬚蔓各一溢搗キ細

ニシ大麥粉多少宜ニ從フチ取り煉テ膏ノ如ク  
巾ニ包テ額上チ縛ス又方水ヲ以テ葉チ煮足チ  
浸ス此方能ク頭執ヲ下ニ且眠ヲ催ス○口中執  
腫及ヒ喉痺葉ニ溢細ニ剉ニ水ヲ以テ煮テ六十  
四戈チ取り薑薇蜜八戈チ加ヘ含嗽ス○吐血及  
ヒ諸般ノ下利葉及ヒ鬚蔓ノ生汁八戈使用ノ液  
ニ和シテ飲服ス○眼目赤ク及ヒ蒙昧莖チ力リ  
滴リ出ル所ノ液チ取り目中ニ點スル下一二滴

○腎痛及ヒ石淋前ノ液ヲ取り四粳故キ蜜水十  
六粳合和之一頓ニ服ス○火症ノ熱病飲食ヲ思  
ハサル者及心下利未熟葡萄汁ヲ取り飲食ニ調  
和ニ用ユ或ハ舍利別ニ作り藥舗ニ於テ嚙ク者  
ヲ用ルモ可ニ○脚氣葡萄子及ヒ酒ニ造ル所ノ  
残滓用テ膏ノ如ク之温テ脚上ニ貼ス○痔疾蔓  
莖燒キ灰ニ醋ヲ和ニテ膏ノ如ク之患處ニ貼  
ス○疥癬蔓莖燒キ灰ニ多少宜ニ從ヒ灰汁ニ  
淋シ以テ瘡ヲ洗フ

附乾葡萄

性功諸液ノ酷厉ヲ和柔ニシテ能ク人ヲ養フ  
附方勞症ニ係ルノ症及ヒ肺ノ諸症ヲ用ルニ堪  
タリ○能ク堅硬ヲ和柔ニス  
和胃ノ飲劑ニ作ル  
ベシ○春初其莖蔓ヲ伐リ流レ出ル所ノ液砂石  
ヲ治シ眼目赤腫及ヒ多眵淚ニ良ナリ○莖皮外  
用シテ痛風ヲ治スルニ良ナリ

連錢艸 ナンドルバーへ

性功熱ニシテ燥スノ性アリ味若ク閉塞ヲ開発  
シ陳滯ヲ滌除スルノ功アリ

附方黃疸及ヒ痛凡乾葉一匁使用ノ液ヲ以テ敷

目ノ間州ヲ服ス○耳聾及ヒ耳痛生汁ヲ取り温

メ綿ニ蘸シテ耳中ニ入ル○腦ノ寒傷生汁鼻竅

ニ灌ク如州スレハ腦中ヨリ毒液ヲ泻シテ愈ユ

○結石腎痛肝脾及ヒ子宮ノ閉塞水及ヒ酒ヲ以

テ湯ニ煎シ服ス又方州ノ露水或ハ花ヲ以テ

造レルコンセルフヲ用ルモ亦可ナリ或ハ花多

少宜ニ從ヒ燒酒ニ浸シ空腹ニ一二匙ヲ服ス○

咽喉ノ惡瘡水又ハ酒ヲ以テ湯ニ煎シ含嚥ス○

腹内ノ損傷水ヲ以テ湯ニ煎シ薔薇蜜ヲ和シ三

十二匁ヲ取り頓服ス○脾藏ノ痛及ヒ腫脹葉ヲ

取り醋ヲ以テ煮熱ニ乘シテ左脇ニ貼ス

增補 莖葉及ヒ花胸ノ諸病ニ良ナリ且治創ノ一

藥タリ月経ヲ通シ諸虫ヲ駆リ黃疸ヲ治シ下利  
及ヒ赤利ヲ止ム

麻黄 ハ | ルテスタ | ルト

性功寒ニシテ燥ス下第二度及ヒ収斂スルノ功  
アリ

**附方** 腎膀胱及ヒ諸腸ノ膿腫 廣黃三溢酒百二十

八 芩大麥水六十四 芩煮テ三分ノ一ヲ取リ三匙  
ヲ服スル下日ニ四次 ○吐血尿血下利月經過多

久咳及ヒ喘息氣急乾葉末ト為シ一芩酒或ハ壯

艸ノ露水ヲ以テ飲服ス又方生汁二十四 芩赤酒

十六 芩和調シ頻ニニ匙ヲ服ス ○衄血艸ヲ搗

キ碎キ鼻中ニ挿シ且額上ヲ縛ス ○陰莖ノ赤疱

露水三十二 芩薑椒醋ハ芩巾ニ蘸シテ頻ニニ瘡

上ニ貼ス

**増補** 是金瘡ヲ治シ及ヒ水氣ヲ逐フニ良シ又乾

咳及ヒ久嗽ヲ治シ鼻血他ノ諸出血 金瘡瘡腫ヲ



療ス

羊蹄 ハナク

性功葉及根寒ニシテ燥カスノ性アリ且腹ヲ攪援スルノ功アリ子ハ強ク収斂スルノ功アリ

附方 下利ヲ催スニ葉又ハ赤羊蹄他ノ菜蔬中ニ

和ニテ此ヲ煮服ス一説ニ根大黃ヲ用ルカ如ク

服ス○疥癬根醋ヲ以テ煮瘡上ニ塗ル○黃疸根

酒ヲ以テ煎ニ服ス○瘡三日ニ一度發スル者根

擦リ碎キ白酒ニ浸ス一時半又ハ二時漉過シ

發スルニ先ダツ一小時ニ服ス○月經過多及ヒ

諸般ノ下利子一棧ケスタ一ルトウ一トル

ヲ以テ飲服ス

増補青眼牙疳黃疽三日瘡ヲ治ス外用ニテ齒痛

ヲ治ス水煮シテ小瘡疥癬ノ類ヲ洗フ

天南星 アツテルストニケ

性功寒ニシテ燥ス一第二度又三度ニ屬ス全瘡

厚七

ヲ治スルノ藥中ニ等フ

**附方**腸傷吐血及ヒ吐血乾葉持キ末ニ一匁廣

黃水十六匁合シテ頓服ス○火症ノ熱病肝藏ノ

熱腫及ヒ諸般ノ内熱葉四溢大麥水ヲ以テ煮百

二十八匁ヲ取り紫花地下ノ舍利別二十四匁ヲ

加ヘ頻ニ服ス○月經過多葉末ト為シ一匁大葉

標葉ノ露水ヲ以テ飲服ス○新金瘡惡症ノ膿腫

葉多少宜ニ從ヒ膽八樹油ニ暫ク浸シテレヒニ

テインノ油少許リヲ加ヘ用ヒ愈ルヲ以テ度ト

ス○眼目多淚葉一溢酒六十匁ヲ以テ煮眼ヲ

洗フ

**増補**葉諸ノ損傷吐血赤利月經過多白帶ヲ治シ

肝ノ焮腫大熱病ヲ治ス外用シテ金瘡膿瘡久ヲ

経ル者頸腫湯火傷眼目多淚ヲ治ス

樹衣 ホームモス

性功清涼ニ燥スノ性収斂スルノ功アリ

附方 赤利吐血 月經不調 大葉櫟ノ樹衣一匁 赤酒ヲ以テ飲服ス ○婦人白帶樹衣多少宜ニ從ヒ水ヲ以テ湯ニ作り日ニニ卅ニ浴ス ○衄血及ヒ金瘡出血ヲ止ム 大葉櫟樹衣或ハ野梅語樹衣ヲ取リ鼻中ニ入ル又持キ未ニ瘡上ニ抹ス

增補 燥ニ且少ク收斂スルノ功アリ是ヲ以テ肺病ヲ治スルニ治胸劑ニ作り内服ス外用ハ諸出血ヲ止ム持キ未ニ用ユ

小麥 タルウ

性功 温ル 中等 酷厉ヲ和柔ニシ 烹醸熟成ニ及ヒ分疏スルノ功アリ 身體ヲ養ニ於テ甚々功アリ

附方 痛凡細末ト為ニ囊ヲ以テ卅ヲ盛リ卅ヲ患處ニ襯ス 惡症ノ疥癬 小麥ノ糠ヲ取り醋ヲ以テ煮卅ヲ洗フ

大麥 ケルスト

性功性寒ニシテ燥ス第一度陳滯ヲ滌刷シ閉  
塞ヲ開発シ及ヒ烹醸孰成スルノ功アリ又曰津  
液ヲ生シ清涼ヲ主ルノ功アリ是ヲ以テ諸ノ熱  
症ニ用テ清涼劑ニ充テ大ニ益アルヲ人ノ知ル

所ニ

**附方** 諸般ノ瘡腫ヲ散疏ス大麥粉多少宜ニ從ヒ

此ヲ煎餅母ニ加ヘ且蜜水ヲ以テ調シテ膏ト為

シ用ユ○骨節内挫大麥粉醋及ヒ乳酪共ニ和シ

テ膏ノ如クシ温ニ乘テ患處ニ貼ス○頭痛熱ニ

因テ発スル者大麥粉多少宜ニ從ヒ玫瑰花紅ニ

坐リニ半溢合シテ袋中ニ盛リ少ク醋ヲ灌キ頭上

ヲ縛ス○冒寒傷冷毒眼ヲ犯ス者大麥ノ青葉ヲ

取リ露ト為シ頻々ニ目中ニ滴ル

**阿魏** アッサー フーチタ

性功温ル第一度閉塞ヲ開発シ壅ヲ決シ圍ヲ

澹シ凝粘ヲ稀釈スルノ功アリ

附方子宮ノ閉塞及衝逆六分棧ノ一ヨリ一棧ニ  
至一テヲ服ス今世婦人多此ノ症ヲ患ル者有動  
スレハ輒危篤ニ至此物此ヲ治ス○脾藏ノ脹腫  
此物ヲ以テ治脾ノ膏藥中ニ加貼フ○瘰癧未ト  
為雞子白ニ調シテ塗ル

增補子宮ノ諸病ヲ治ス

盧會 ア口也

性功温ル一第一度或ハ大抵二度ニ属ス燥一第  
三度味甚苦ク閉塞ヲ開發シ衰弱ヲ強壯ニシ汚  
穢ヲ清淨ニシ收斂封合創ヲ愈スノ功アリ是ヲ  
以テ腐敗液痰飲惡液ヲ驅逐シテ此ヲ下利ニ導  
キ且腐壞ヲ治ス

附方人ヲシテ微利セシムルニ三分棧ノ一或ハ  
二ヲ以テ夕ニ食前ニ服スレハ其明必微利ス此  
方黃疸及ヒ胃虛弱ニシテ虫ノ患ヲ生ズルニ用  
テ良ナリ然レ疔痔ヲ患ルノ人ノ如ハ宜ク此ヲ

戒ムベシ○眼目赤腫盧會ヲ以テ治眼ノ藥水中  
ニ和シ用ユ○金瘡久瘡愈ヘズ及ヒ膿腫細末ヲ  
以テ上ニ抹ス○口中及ヒ齒齦ノ膿腫酒及ヒ蜜  
ニ和シテ患處ニ塗ル○小兒虬虫牛膽及ヒ醋ヲ  
以テ和調シ胡桃殼片ニ充テ以テ脐中ヲ罨フ  
**増補**ニ性アリ其一ハ脂ノ如キ者収斂ヲ主ル其  
二ハ膠液ノ如キ者潤達ヲ主ル其一ハ腐敗ヲ治  
シ胃ヲ強シ諸虫ヲ殺ス其二ハ下利ヲ主ル腐敗  
液痰飲ヲ逐ヒ腸胃ヲ清滌ス是ヲ以テ下劑ニ必  
ス此ヲ用ユ

番木鱉 カラアンチーカ

性功此物甚強ク吐セシム而テ多ク腐敗液及ヒ  
痰飲ヲ刷除スルニ末ト為シ二錢ヲ飲服ス此ヲ  
他ノ毒藥ヲ調スル方劑中ニ和シテ与ヘシ大及  
ヒ鹿ニ毒スルニ必死ニ至ル

**増補**此ヲ服スル下二錢ナレハ人ヲ殺ス若シ少

ク用ハ吐ヲ催ス

藜荷 アモミユム

性力温<sup>ク</sup>且燥スノ性アリ是ヲ以テユツペヘニ  
胡椒ノ鉄<sup>ク</sup>ニ充テ此ヲ代用ス  
如キ者

丁子 ユロイドナーケレン

性功温<sup>ク</sup>且燥ス<sup>ル</sup>第三度衰弱ヲ強壯ニシ閉塞  
ヲ開<sup>ク</sup>発<sup>ス</sup>之壅<sup>ク</sup>ヲ決<sup>ス</sup>之圍<sup>ク</sup>ヲ潰<sup>ス</sup>之滲<sup>ス</sup>透<sup>ス</sup>融<sup>ス</sup>達<sup>ス</sup>凝<sup>ス</sup>粘<sup>ス</sup>ヲ稀  
釈スルノ功アリ且収<sup>ク</sup>瀉<sup>ス</sup>ノ功アリテ此ニ雜ル

附方 頭腦及ヒ心胃寒冷ニ傷スルヲ治ス以テ飲  
食中ニ調テ此ヲ用ヒ又ハ他ノ藥劑中ニ和シテ  
服ス且内服外敷共ニ宜シ○傳染及ヒ不淨ノ氣  
ヲ治ス疫氣流行ノ時ニ當テ此ヲ啗ハ人ヲシテ  
傳染感汚セサラシム

增補 頭腦心胃及ヒ神經ヲ強ス是ヲ以テ鬱<sup>ク</sup>冒<sup>ス</sup>胃  
寒傷頭旋ヲ治シ齒痛ノ冒寒傷冷毒ニ出テ止メ  
冒寒傷冷毒ヲ治ス

アカリユス

イフリコ

性功温メル第一度燥ス第二度閉塞ヲ閉発  
壅ヲ決シ圍ヲ潰シ凝粘ヲ稀釈シ陳滯ヲ滌刷シ  
惡液留飲ヲ泄利スルノ功アリ

附方肝脾腎并ニ子宮ノ閉塞及ヒ喘急黃疸痛凡

發痲右ノ諸症ヲ治スルニ宜ク世物ヲ以テ體中

ヲ淨刷スベシ即チ一棧ヨリ二棧ニ至ルマテヲ

以テ酒或ハ蜜或醋ヲ以テ飲服ス又ハ二棧ヨリ

五棧ニ至ルマテヲ以テ一二ノ使用ノ液ニ和シ

絞テ汁ヲ取り服ス

増補下利ノ功有ニ因テ粘痰及ヒ留飲惡液ヲ除

キ腸胃ヲ淨シ虫ヲ殺シ月経ヲ利ス然レモ世ヲ

服シテ腹痛ヲ催カ為ニ藥局和スルニ干姜ヲ以

テシテ錠ト為シ用ユ

甘松 スヒカナルシ

性功温ル第一度燥ス第二度壅ヲ決シ圍ヲ



潰之凝粘ヲ稀釈之小水ヲ通利スルノ功アリ

附方 腹中鬱氣 月経閉塞 胃痛 黃疸 酒ニ煮服ス一

ニケレインニ注見ヲ以テ他ノ方藥ニ和シ服ス

増補 胃ヲ吐ニ之凡ヲ破リ小水ヲ利シ月経ヲ通

ス油痰癥及ヒ痲ヲ療スルニ妙ナリ

金剛刺 サルサハリルラ

性功中等ノ温然レ厄燥ス下甚シ小水ヲ通利シ

汗ヲ發スルノ功アリ

附方 癰瘡疥癬痛凡胃寒傷冷毒根ヲ以テ湯ヲ製

スル下山竒糧ヲ用ルカ如ニシテ服ス汗ヲ取テ

少トス

増補 根ヲ發シ下利ス瘡瘍久ク愈サル者ヲ治ス

又癰瘡ヲ治スルニ湯ト作シ日ニニ服ス

良姜 カリカア

性功温メ且燥ス下第三度閉塞ヲ開發シ壅ヲ決

シ圍ヲ潰スルノ功アリ

**附方** 諸氣患ヲ為シ胃氣不和頭眩暈子宮閉塞  
腹痛心中動悸五分ヨリ一錢ニ至ルニテ取末  
ト為シ酒ニテ服ス

**增補** 温暖ニスルノ功アリ諸胃ノ衰弱ニ用テ飲  
食ヲ羨シ進ム消化ヲ健ニス

藜合香 ス夕ラクスカラシメ

性功 温メ燥シ且酷厉ヲ和柔スルノ功アリ

**附方** 咳嗽冒寒傷冷毒声嘎シテ出ス頭痛經閉他

ノ方劑ニ加ヘ用ユ

**增補** 頭腦及ヒ神經ヲ強シ酷厉ナル冒寒傷冷毒  
ヲ驅散シ咳嗽及ヒ失音ニ必用タリ外用健胃ノ  
諸膏及ヒ諸般ノ香料ニ充ツ

麒麟血 タラーケニブルト

性功 清涼ニスルノ中等然レ多ク燥スノ性アリ  
強ク収斂シテリユツケテレヘニテ功アリ

**附方** 諸般ノ滯下下利及ヒ吐血麒麟血五分末ト

为ニ使用ノ液ヲ以テ飲服ス○出血ヲ止メ新金

瘡ヲ療ス他ノ方劑ニ和ニ用ユ

増補清涼ニ燥シ且収斂スルノ功アリ是ヲ以

テ使血吐血及ヒ内藏ノ出血強キ者ヲ治ス且外

用ニテ創傷ニ必需タリ

乳香 一、スチキス

性功温メ且燥カス一第ニ度少ク収斂ニ酷厉ヲ

和柔ニシ胃ヲ強クスルノ功アリ

附方 下利乳香四钱二百五十六钱ノ水ヲ以テ煮

連綿ニテ繞テ卅ヲ服ス○胃中ノ蒸気腦ヲ熏ス

ルニ乳香一二ケレイニ毎食後ニ卅ヲ服ス○吐

血及ヒ咳嗽愈ス乳香ヲ以テ清淨ノ蜜ニ和ニ或

ハ使用ノ舍利別ニ和ニ服ス○腦中水湿及ヒ牙

齒不固乳香ヲ噉ニ惡液ヲ出ニテ愈ユ○胃气

衰弱乳香ヲ以テ胃ヲ治スル膏中ニ和ニ用ユ○

手及ヒ唇ノ皸坼スルニ雞子白ニ和ニテ患上ニ

塗ル

増補

燥之且収斂スルヲ強ナラス。柔ナラス。胃

衰弱ヲ強之。嘔吐及ヒ下利ヲ治ス。外用嚼嚙之テ

齒痛ヲ治シ。齒牙動搖ヲ固ス。又膏ト作之テ其顛

ニ貼之テ可ナリ

樟腦 カムヘル

性功其説各異ナリ。一ニ曰寒ニシテ燥カス。一第

三度一ニ曰温。第三度然レ其諸部ニ因テ性少ク

異ニ其走竄潜搜或ハ精悍ヲ主ル者ハ温ニ属シ

而シテ其他ハ寒ニ属ス。諸ノ腐敗ヲ愈シ。中毒ヲ

治ス。或曰其功陽事ヲ壯ニシ。房薬ニ充ツ

附方眼目焮腫金瘡諸瘡頭痛湯泡火燒他ノ方中

ニ加テ内服外用ス。○子宮衝逆別症候一塊ヲ以テ

火ヲ點シコニシリ。水二十四錢ヲ取リ其中

ニ淬シ頻ニ服ス。○滑精他ノ方中ニ加テ服シ且

腰部ニ塗ル。○天行疫疾及鼻血樟腦ヲ以テ丸ヲ

製之頻々ニ此ヲ嗅ク

**増補** 汗ヲ発シ諸中毒ヲ驅散シ熱病発班発疹

熱眼目熱腫ヲ治ス

安息香 ベニリイニ

性功温メ且燥ス下第二度芳香爰スヘシ壅ヲ決

シ圍ヲ潰シ凝粘ヲ稀釈スルノ功アリ諸香糧方

中ニ入

**附方** 咳嗽氣急喘息及冒寒傷冷毒ノ肺ヲ侵ス者

ニ安息香精花ヲ取六十分莪ノ三ヨリ六十分莪

ノ一ニ至ヲ取頓服ス

**増補** 酷厉ナル冒寒傷冷毒ヲ和スルニ殊功アリ

肺藏ノ腐敗及气管ノ腐敗ヲ治シ咳嗽呃逆汚療

肺ノ諸病ヲ療ス外用冒傷冷毒諸部ノ寒傷等ヲ

治ス又一方ニ製シテ此ヲユツフルメルクト云フ

犹貴妃乳ト意太里亚ニ於テ甚多ク此ヲ用ニ其

方安息香蘇合香等分燒酒右合テ暖處ニ安キ血

色ヲ為ニ至リ聽用ス

沒藥 ニルラ

性功温<sup>ノ</sup>且燥ス<sup>ノ</sup>第二度閉塞ヲ開<sup>テ</sup>發<sup>シ</sup>之少ク収  
斂<sup>シ</sup>之陳滯ヲ滌<sup>リ</sup>刷<sup>シ</sup>之凝粘ヲ稀<sup>ク</sup>之酷<sup>ク</sup>厲<sup>ク</sup>ヲ和柔<sup>シ</sup>  
鬱積ヲ分<sup>リ</sup>疏<sup>ク</sup>之堅硬ヲ消<sup>ス</sup>化スル<sup>ノ</sup>功アリ且腐敗  
ヲ愈ス

附方咳嗽氣急喘息腹痛下利虫症及經水閉塞三  
分<sup>ノ</sup>一又八五分ヲ取一二<sup>ノ</sup>液ヲ以テ飲服ス

○口氣臭穢及傳染惡氣口中ニ唾嚼<sup>シ</sup>之稍<sup>シ</sup>ニ<sup>シ</sup>嚥

○齒齕腐壞及牙齒不固酸酒ヲ以テ焯解<sup>シ</sup>之含

嗽ス○新<sup>レ</sup>旧<sup>レ</sup>金瘡及瘡瘍末<sup>ト</sup>為<sup>シ</sup>之患上ニ抹ス○

皮上ノ斑痣及癩痕雞子ヲ取<sup>テ</sup>煮<sup>テ</sup>黃<sup>ク</sup>ヲ去<sup>リ</sup>白<sup>ク</sup>ヲ

留<sup>メ</sup>沒藥末ヲ充<sup>テ</sup>壺<sup>内</sup>ニ於<sup>テ</sup>焯<sup>シ</sup>之液ヲ取<sup>患</sup>

上ヲ摩<sup>揩</sup>ス

增補温<sup>メ</sup>疏散<sup>シ</sup>之中毒ヲ驅<sup>散</sup>之諸ノ清<sup>良</sup>ナ<sup>ラ</sup>カ

者ノ子宮ニ在<sup>テ</sup>驅<sup>逐</sup>之經閉ヲ通<sup>シ</sup>之生<sup>ヲ</sup>催<sup>シ</sup>胞

衣ヲ下ス

肉豆蔻

ノ——トムスカ——

性功温<sub>メ</sub>且燥ス<sub>一</sub>第二度少ク収斂<sub>ニ</sub>小水ヲ通  
利<sub>ニ</sub>破气<sub>ニ</sub>驅凡ノ功アリ其核膜蘭名ノハ核ト功  
ヲ同ス然<sub>レ</sub>厄<sub>レ</sub>走竈<sub>ニ</sub>潜搜ヲ主リ渗透<sub>ニ</sub>融達<sub>ニ</sub>其功更  
ニ強<sub>ニ</sub>○胃痛心悸<sub>ニ</sub>鬱冒<sub>ニ</sub>眩ノ寒傷肉豆蔻半顆ヲ  
取<sub>ニ</sub>搗キ<sub>ニ</sub>末<sub>ニ</sub>酒ヲ以テ飲服○腹痛及寒尿肉豆蔻  
一顆ヲ取口中<sub>ニ</sub>啣嚼<sub>ニ</sub>稍<sub>レ</sub>ニ<sub>ニ</sub>嚙服ス或ハ搾<sub>ニ</sub>

取<sub>ニ</sub>所<sub>ノ</sub>油少許<sub>リ</sub>或ハ核膜油蒸露<sub>ニ</sub>罐ヲ以テ取温  
酒ヲ以テ飲服ス○胃ヲ吐<sub>ニ</sub>ス油ヲ搾<sub>ニ</sub>取<sub>ニ</sub>心窩  
又胃口ノ部位ヲ摩揩ス或ハ蒸露<sub>ニ</sub>罐ヲ以テ核膜  
油ヲ取用モ亦可ナリ○頭痛久ク愈サル<sub>ニ</sub>肉豆  
蔻一二顆粗碎<sub>ニ</sub>鍋中<sub>ニ</sub>於テ炒<sub>リ</sub>紙ヲ以テ包<sub>ニ</sub>  
頭上及顛顛ヲ摩揩<sub>ニ</sub>油氣ヲ<sub>ニ</sub>テ渗透<sub>セ</sub>シムル  
ニ取<sub>ニ</sub>下利及滑精肉豆蔻一顆鍋中<sub>ニ</sub>於テ炒<sub>リ</sub>赤  
酒ヲ以テ飲服ス○小兒腹痛肉豆蔻油<sub>ニ</sub>脣中<sub>ニ</sub>塗

ル○神經ノ寒傷肉豆蔻油ヲ以テ他ノ温暖ヲ主  
ル膏中ニ加ヘ外用ス

増補 神經頭腦ヲ強壯ニシ子宮及諸藏ヲ補ヒ胃  
ヲ健ニス孕婦ニ与テ胎ヲ壯ニシ而シテ患害無  
カラシム且諸疝ノ凡氣ヲ疏散ス

白檀 サニテルホウト

性功寒第三度燥ス下第三度閉塞ヲ開發シ肝及  
心ヲ強壯ニス

増補 肝藏ヲ清涼ニスルニ用テ殊ニ良ニ或ハ肺  
病ヲ治ス

沈香 アルイスホウト

性功温メ且燥ス下第三度心及頭腦并ニ子宮ヲ  
強壯ニスルノ功アリ且腹中ノ虫ヲ驅ル

増補 元氣ノ衰弱ヲ壯ニシ及自餘ノ虚弱ヲ補ヒ  
胃ヲ壯ニシ記憶ヲ強シ外用シテ火ニ焚テ此ヲ

董ス



菘菴 ラテイス

性功温ル<sub>1</sub>第三度燥ス<sub>1</sub>第二度閉塞ヲ開発<sub>1</sub>  
凝粘ヲ稀釈<sub>1</sub>陳滯ヲ滌刷<sub>1</sub>小水ヲ通利ス

附方結石腎痛菘菴煮汁每朝空心ニ服ス菘菴根

皮ヲ擦<sub>1</sub>酒ニ浸ス<sub>1</sub>少時朝夕ル<sub>1</sub>メルチイ

ニ一杯ヲ服ス又ハ生汁十六匁芎藭生汁ヲ和<sub>1</sub>

頓服ス○胸中粘痰咳嗽久ク愈サルニ水ヲ以テ

湯ニ製<sub>1</sub>砂糖ヲ加<sub>1</sub>調<sub>1</sub>服ス○水腫肝脾子宮

ノ閉塞菘菴根用ニ聽ス或ハ菘菴子一匁一二ノ

液ヲ以テ飲服ス○吐劑ニ作ニ菘菴子一匁一二

テ飲服ス○天行疫疾菘菴子酒ニ煮每朝空心

ニ服ス○面上ノ黧黧生汁ヲ以テ摩揩ス

增補小水ヲ利<sub>1</sub>砂石ヲ通<sub>1</sub>月經ヲ順<sub>1</sub>ニ諸中

毒ヲ治<sub>1</sub>肺中ノ粘痰ヲ緩<sub>1</sub>咳嗽ヲ治<sub>1</sub>醉ヲ防

夕外用眼目赤腫齒牙動搖齒齦腐爛ヲ治ス

蔓菁 ラーペン

性功温ル<sub>1</sub>第二度潤ス<sub>1</sub>第一度然<sub>1</sub>其子<sub>1</sub>温  
×且燥<sub>1</sub>之闭塞<sub>1</sub>ヲ開<sub>1</sub>登<sub>1</sub>之陳滯<sub>1</sub>ヲ滌<sub>1</sub>刷<sub>1</sub>之堅硬<sub>1</sub>ヲ消  
化ス

附方 結石腎痛小水ヲ通利ス蔓菁ノ初生ヲ取煮  
熟<sub>1</sub>之食用<sub>1</sub>ニス ○咳嗽及声啞不出蔓菁ヲ以テ湯  
ヲ製<sub>1</sub>之又ハ蔓菁ヲ煮絞テ汁ヲ取砂糖ヲ和調<sub>1</sub>之  
毎タル<sub>1</sub>一<sub>1</sub>メルチイ<sub>1</sub>ニ一杯ヲ服ス ○凍瘡蔓菁  
湯<sub>1</sub>ニ煮テ足ヲ其中<sub>1</sub>ニ浸ス又ハ煮タル蔓菁ヲ以

テ直<sub>1</sub>ニ其上<sub>1</sub>ニ調ス又ハ蔓菁ヲ取中ヲ剉<sub>1</sub>リ充ル  
ニ薑薇油ヲ以テ熱灰中<sub>1</sub>ニ煨<sub>1</sub>之以テ患上ヲ摩ス

○瘡腫及咽喉瘡蔓菁ヲ煮絞テ汁ヲ取含嗽ス ○

小兒虫症蔓菁油ヲ取服ス ○疱瘡及麻疹蔓菁子

五分便用ノ液ヲ以テ飲服ス

增補 乾蔓菁ノ汁咽喉失音咳嗽及腐敗膽汁ニ良

之外用 四未ノ凍寒ヲ防<sub>1</sub>ニ最<sub>1</sub>ニ良<sub>1</sub>之花露短氣ヲ

治スル良<sub>1</sub>之

瓠瓜 カウー ルテン

性功瓜中ノ穰寒ニシ潤ス下第二度其子四種ノ  
大寒子中ニ入ル但其葉婦人乳房上ニ貼スレハ  
乳汁ヲシテ乾シム

增補仁胡瓜仁ト功ヲ同ス葉ヲ以テ乳上ニ貼ス  
レハ其ヲシテ流レ登セシム

胡瓜 コムコムメレン

和キウリ

性功寒ニシテ潤ス下第二度而シテ其性不良善  
卅ヲ食ハ熱毒ヲ醸ス其子四種ノ大寒子中ニ入  
ル清涼ニスル下第一度閉塞ヲ開登シ陳滯ヲ滌  
除シ小水ヲ通利ス

附方熱病舌乾燥シテ黑胎ヲ為ニ胡瓜皮ヲ去リ

切テ薄片ト為冷水ニ浸シ舌上ニ安ク○膀胱損  
傷又ハ壞爛ニ小水ヲ通利ス胡瓜子皮ヲ去リ一  
匙甘乳酪又ハ酒ヲ以テ飲服ス○結石腎痛胸腹  
痛勞症咳嗽火症ノ熱病胡瓜子ハ去大麥皮ヲ去

リ煮テ花登スルニ至リ十六棧白嬰粟子四共  
ニ石臼中ニ於テ杵キ大麦水百二十八棧ヲ灌キ  
乳汁ノ如シ白砂糖宜ニ從テ加ヘルトメルヲ  
イニ一杯ヲ服スルノ数度

**増補** 仁潤達スルノ功アリ小水ヲ通利脇痛肺病  
勞瘵ニ用ユ

芥子 モスタールト

性功温メ且燥スノ第四度壅ヲ決シ圍ヲ潰シ凝  
粘ヲ稀釈シ毒ヲ呼ヒ赤色ヲ登ス且飲食ヲ消化  
スルノヲ助ク

**附** 方面上ノ小瘡黧黧ノ類ヲ治ス芥子持キ細ニ

之醋ヲ以テ瘡上ニ塗ル○昏睡病痛凡髀ニ在者  
及脾脹芥子及無花果共ニ臼中ニテ持キ膏ノ如  
ニ之ヲ頭上ニ貼シ髀上及左脇ニ貼ス赤色ヲ登  
之ヲ乃愈○頭腦ヲ清浄ニス芥子ヲ以テ口中ニ  
含嚙之又ハ鼻中ニ吹ク如世スレハ許多久粘液

ヲ頭中ヨリ下ニ忝ル○齒齦腐爛及肢體骨節削  
壞スル者ヲニテ再ヒ新ニ生セシム花及莖葉ヲ  
取露水ヲ製シ口中ニ含嗽ス又ハ熱ニ乘シテ中  
ニ蘸シテ骨節ニ貼ス○乾咳嗽及氣痺腫脹芥子  
二枚上好蜜四枚醋一升三ツチイ共ニ和シ含嚥  
ス○結石腎痛月經ヲ通利ス芥子酒ニテ煮ル  
メルチイニ一杯ヲ服ス○神經寒傷芥子油ヲ以  
テ患上ニ塗ル○水腫芥子多少宜ニ從ヒ搗キ細  
ニシ童便ニ和シ腹上ニ塗ル○寒熱久ク愈サ  
ルニ白芥子一棗癸スル日未癸ニ先テ使用ノ液ヲ  
以テ飲服ス

**増補** 白芥子癸胞術ニ用テ赤色ヲ癸ニ嚏ヲ癸ニ

頭腦ヲ清シ小水及月經ヲ通シ中毒ヲ愈シ胃ノ  
病ニ用テ良ニ且青腿牙疳頭旋眩冒卒中及砂石  
ノ症ヲ治ス外用ニテ諸腫ヲ熟シ且潤キ皮上ノ  
穢ヲ忝リ汗瘡ヲ治ス

蔞蘿 二ルレ

和名イノニト

性功温ル下第三度ニ近シ燥ス下第二度堅硬ヲ  
消化シ酷厉ヲ和柔ニシ痛ヲ止ム

附方腹痛噎逆婦人ノ乳汁ヲ益ス其艸顛稍ヲ摘

ニ清水ヲ以テ煮服ス又外表ヨリ蒸熨スルニ用

ヘシ○子宮衝逆水ヲ以テ煮蒸氣ヲ以テ下部ヲ

蒸ス○疣目肛門陰處ノ湿瘡久ヲ経テ愈サルニ

蔞蘿子焼キ灰ニシ以テ瘡上ニ抹ス○咽喉閉塞

声出サル者右ノ灰ヲ以テ喉中ニ吹ク○結石腎

痛以テ初生ノ雞子殼ニ調和シ食饌ト為シ用ユ

増補葉花及根痛ヲ和シ眠ヲ催シ淫慾ヲ除ク中

毒ヲ治シ腸間膜ノ痛ヲ減ス  
牛扁 ヲイハルスヘキ  
和名タチマチクヤ

性功温

附方子宮壅腫根一棗酒ヲ以テ飲服ス○勞瘵根

一棗酒十ハ棗ヲ以テ飲服スル下日ニ二度

増補葉金瘡ヲ愈ニ外表ノ血ヲ止メ及膿腫ノ見サル所ニ生スルヲ療ニ乳ノ硬腫及熱痛ヲ治シ又乳癌ヲ治ス

鑿栗 マニコツフ

性功清涼ニ燥ヲ潤ス第一度痛ヲ止メ眠ヲ催ス

附方冒寒傷令毒酷厉ナル者咳嗽勞瘵下利鑿栗殼二三顆細ニ剉ミ水ヲ以テ煮百二十八莪ヲ取

漉過シシヤコシコムノ舍利別十六莪ヲ加ヘル

一メルチイニ一杯ヲ頓服ス○眠ヲ催ニ前ニ

出ス所湯ヲ服シ鑿栗ヲ煮タル湯ヲ以テ足ヲ浴

シテ良ニ其間鑿栗子ノ油ヲ以テ顛顛ニ塗ル

増補花及子眠ヲ催シ肺病咳嗽失音下利赤利ヲ

治ス

苦薏ムトトルコロイト

性功温ル第一度燥ス第二度閑塞ヲ開發シ

陳滯ヲ滌除ス

附方 結石腎痛子宮衝逆經閉胞衣不下苦蕒三溢

細 = 坐之酒ヲ以テ煮百二十八莪ヲ取ル | | x

ルチイ = 一杯ヲ服ス又此ヲ以テ熨莖スルモ亦

可之 ○頭痛寒 = 因テ発スル者青苦蕒持キ熟之

頭項 = 貼ス ○婦人乳房硬腫莖葉持キ熟之膏ノ

如 = 之テ貼ス

增補 莖葉及花分疏之清浄 = 之潤達之消導之月

經ヲ通之胞衣死胎ヲ下之頭眩眩冒ヲ防キ発熱

ヲ除 = 良之

錦葵 コルハ

性功 中分ノ熱 = 之テ潤之鬱積ヲ疏散之堅硬ヲ

消化之酷厉ヲ和柔ス

附方 咳嗽声啞之テ出ス勞症根ハ莪葉ニ溢子ニ

莪廿乳酪ヲ以テ煮百二十八莪ヲ取日 = 兩度服

之テ醉 = 至ル ○毒虫螫蜘蛛咬蜂螫葉ヲ取細 =



持半貼ス ○耳痛葉ヲ取汁ヲ絞リ温メ耳中ニ滴  
ス ○腸膀胱及腎痛葉ニ溢苦薏花一溢百二十八  
莪ノ麥酒ヲ以テ煮服ス ○硬腫ヲ柔和ス葉多少  
宜ニ從ヒ清水ヲ以テ煮熟スルニ至リ菴劑ノ如  
ク此ヲ貼ス

**增補**花葉醋厉ヲ和柔ニシ膏釀熟成スルノ功アリ  
又能下利ニ疼痛ヲ和シ諸疝及砂石ノ症ヲ治ス  
外用硬腫湯火傷瘡ヲ為者及蜂螫等ヲ治ス

蜀葵 アルテヤ

性功中等ノ温燥ス下錦葵ヨリ多シ堅硬ヲ消化  
シ鬱積ヲ疏散シ痛ヲ止メ酷厉ヲ柔和ス

**附方**腎痛石淋葉ニ溢又ハ根十六莪百二十八莪  
ノ酒ヲ以テ煮半ヲ減シ再服ス ○冒寒傷冷毒ノ  
胸部ニ及テ治スルニ蜀葵糖劑ノ一塊ヲ取頻ニ  
ニ含化ス此ニ因テ咽喉窒塞ヲ免ル ○咳嗽難治  
根十二莪廿乳酪ヲ以テ煮百二十八莪ヲ取ル

メルチイ一杯ヲ服スル一日ニ二度○諸般ノ堅硬寒腫根多少宜ニ從ヒ酒ヲ以テ煮熟シ白中ニ於テ孰研シ猪脂ヲ加ヘ膏ノ如ニシテ腫上ニ貼ス

増補根及葉下利及鬱積ヲ分疏スルノ力アリ液中ノ酷厉ヲ減シ汗ヲ發シ疼痛ヲ和ス根ヲ以テ肉桂ト共ニ水ニテ煮与レハ胞衣ヲ下シ産後ノ瘀血ヲ淨除ス根搗キ砂糖ヲ和シ疣目ニ點ス又其破裂スルヲ治ス

石龍芮 ハー子ニフート

性功熱ニシテ燥ス第一度皮ヲ刮キ燒灼シ是ヲ以テ内服ニ用ルル無シ

附方疣目及機里尔頑痺多少宜ニ從ヒ搗キ患上

ニ貼ス○腦中ヲ清クスル發嚏方根ヲ取乾シ搗キ細ニシ少許ヲ取鼻中ニ吹入ル○齒痛根ヲ取痛ム所ノ齒ニ挿ム

增補根 辛烈ニシテ蝕スルノ功アリ外用ニテ熱  
病及痛凡股ニ在者ヲ治シ生津疣目ヲ除キ耳中  
ノ腫毒ニ用テ其丹ニテ熟成セシム根細ニ搗キ  
ペストホイレニ熱燻ヲ熟ス

墨記 州ヘルセニコロイト

性功 清涼ニシテ少ク燥ス諸ノ金瘡及瘡腫ノ熱ヲ  
防ニ外用ス

增補 莖葉及花糊劑ト作シ膏ト作シ金瘡ヲ治ス

ルニ利アリ諸ノ膿腫漏瘡ヘイケウラツテニ瘡  
名小ニテ硬キ瘡子官ノ青痣痛凡股ニ在者ヲ  
口肛門及直腸中ニ生ス 治ス又生津耳中ノ虫ヲ除ク

泥菖 カルニユス

性功 温メ燥ス下第三度香竅閉塞ヲ開發シ凝粘  
ヲ稀釈シ小水ヲ分利ス

附方 腹痛胃中痰飲脾藏腫脹寒尿青腿牙疳支節  
不伸月經ヲ通ス根水又ハ酒ヲ以テ湯ト作シ服

ス又ハ細ニ剉ニ燒酒ニ漬ケ柔ニシ毎朝少許ヲ  
服ス又ハ乾根持キ末ニ便用ノ液ヲ以テ一棧ヲ  
飲服ス○胸中粘痰及寒飲細末多少宜ニ從ヒ上  
好ノ蜜ヲ加ヘ頻々ニ舐リ服ス○天行疫疾及傳  
染惡氣根ヲ取糖製ニシ毎朝空心ニ一塊ヲ食ス  
此方胃氣虛弱ナル者ニ用テ亦良ニ

增補胃ヲ温メ胃ヲ壯ニシ食慾ヲ催シ凡ヲ驅リ  
氣ヲ行シ腹中暴脹ヲ除ク

玉髓 之カヒチヤ

性功温燥ス一第二度壅ヲ決シ圍ヲ潰シ鬱積ヲ  
疏散シ汗ヲ発シ傳染ヲ治ス

附方 咳嗽喘急及胸痛莖葉四溢泉水ヲ以テ煮百

二十八棧ヲ取砂糖ヲ加テ味ヲ添ヒ頻々ニ服ス○

天行疫熱及傳染諸病葉ヲ取汁ヲ絞リ十六棧底

野迦一棧共ニ和シ一頓ニ服シ被覆シテ汗ヲ取

○痔疾莖葉ヲ取酒ニテ煮吐ニ向テ此ヲ熏ス○

頭上ノ惡瘡葉ヲ取灰水ヲ以テ煮瘡ヲ洗フ○疥癬乾根未ト為レ一棧ヲ取毎日野羊乳ヲ以テ飲服ニ莖葉ヲ絞リ汁ヲ取醋ヲ和レテ煮瘡上ニ塗ル

**増補**根及花葉汗ヲ登レ胸膈及肺ノ諸病ニ必用

夕リ諸中毒ヲ治シ咳嗽胸膈不快胸脇支痛等ニ

良ナリ外用顔面ノ癩瘡汗斑夕ウタルム癬ノム

トトルルフフララツツケケニニ小小兒兒上上ニニ在在所所ノノ青青班班多多

等ヲ治ス人此根ヲ取頭ニ縛定ニ云此痘毒ノ目

ニ入ヲ免ト

鹿春花 ウエルテヘソル

性功甚清涼ニス眠ヲ催シ痛ヲ止ム

**附方**頭痛莖葉搗キ熟シ醋少許ヲ加ヘ額上ニ貼

之巾ヲ以テ之ヲ縛ス○火症ノ熱病及内熱燒カ

如ニ花ノ露水百二十八棧花ノ舍利別ニ十四棧

合和シル——メルチイニ一杯ヲ服ス○脇痛花

一溢水ヲ以テ煮百二十八莪ヲ取漉過ニ砂糖ヲ  
加ヘ調ニ頻ニ服ス又ハチケル花五分硝石鹽製  
蝨蝨石各六分莪ノ一細末ニ頓服ス○咳嗽不治  
者花ノコニセルフヲ取肉豆蔻核大ヲ服ス○熱  
症ノ膿腫莖葉多少宜ニ從ヒ上ニ貼ス

忍冬 ケイテニフラート

性功大ニ温メ且燥スノ性壅ヲ決ニ圍ヲ潰ス  
ルノ亦強ニ

附方脾藏ノ閉塞子一莪挿キ末ニ數日ノ間酒ヲ  
以テ飲服ス世物強ク小水ヲ通スルノ功アリ○  
難産ヲヘニテルノ子一莪金銀花露十六莪合ニ  
テ一頓ニ服ス○咳嗽喘急金銀花露多少宜ニ從  
ヒ乳糖ヲ以テ甘ニ三四匙ヲ服スルノ日々ニ二  
次○不淨ノ瘡腫及久創葉水ニテ煮患處ヲ洗フ  
○頭上ノ創傷莖葉ヲ絞リ汁ヲ取用ル所ノ軟膏  
ニ和調ニ用ユ

増補花ヲ以テ油劑ニ作り又子ヲ以テ治創ノハ  
ルサム創ヲ治スルノ用ニ充ツ

黄楊ハルホーム

性功燥ニ収斂スルノ功アリ木及葉水ニテ煮ル  
下ホツクホウトノ如クニ汗ヲ登スル下強ニ如  
此ニシテ音厄利斯ノ一婦人黴瘡ヲ患ル者因テ  
以テ治スル下ヲ得タリ或ハ灰汁ヲ以テ煮髪ヲ  
シテ黄ナラシム

増補葉酪ヲ以テ煮黄疽ヲ治ス油癩癩及齒痛ヲ  
治スルニ最モ妙ニ

山茱萸 コルヌーリニホーム

性功子清涼ニ燥ニ収斂スルノ功アリ

附方下利及赤利チケル子一棗持キ末ニ一二ノ  
液ヲ以テ飲服ス ○月經過多花ノコニセルフニ  
棗空腹ニ服ス ○金瘡血ヲ止ム葉多少宜ニ從  
ヒ持テ瘡上ニ貼ス

增補子安血赤利月經過多葉煮之湯ト作之又細

未ト作之同症ヲ治ス

牡荊 コイハホー

性功温メ且燥ス丁第三度凡氣ヲ疏通之月経ヲ

催之肝脾ノ閉塞ヲ開塞ス

附方肝脾ノ閉塞水腫腸胃ノ鬱氣及子宮ノ凡氣

ヲ疏通ス子一棧酒服ス○經閉滑精婦人ノ乳汁

ヲ益ス子前方ノ如ニ之ヲ用テ良ナリ○子

宮ノ閉塞堅癖及膿腫子并ニ煮多少宜ニ從ヒ水

ニテ煮浴湯ト作之用ユ○陰莖膿腫葉及葡萄葉

各ニ溢新乳酪ヲ以テ蒸ニ持キ熟ニ膏ノ如ニ

テ貼ス○寒尿管二溢水酒ヲ以テ煮百二十八棧

ヲ取服ス增補温暖ノ功アリ男子ノ方元ヲ温メ

狗骨 ヒユルスト

性功其子温メ且燥ス開達スルノ功アリ

附方腹痛及腹中絞痛実ナ及十二顆ヲ取持キ細

百零八



二之服ス卅 = 因テ腹中緩鬆其毒惡液ト為テ  
下利ニテ愈ユ ○皮膚痲折根皮ヲ取持キ細ニ  
膏ノ如ニニテ患處ニ貼ス ○水腫又小水ヲ通ス  
狗骨木燒灰ニシテ十六棗酒百二十八棗ニ浸シ暖  
處ニ置テ一宿漉過シテ肉桂水八棗ヲ加ヘル  
メルチイニ一盃ヲ飲服スル日ニ二度

增補葉湯ニ製シ咳嗽及胸脇支痛ニ良ニ

金雀花 丑ニス夕

性功温メ且燥ス下第二度開シニ凝血ヲ稀散シ  
淨刷シ惡液留飲ヲ下利ニ且小水ヲ通ス

附方水腫葉ニ溢酒百二十八棗ヲ以テ煮三分ノ

一ヲ取漉過シルメルチイニ一杯ヲ取空腹

ニ飲服ス又方子一棗酒ヲ以テ飲服ス又方刺ヲ

取燒キ灰ニシテ十六棗レイニセウ丑イニ百二十

八棗ヲ以テ灰汁ヲ製シ澄清セル者ヲ取一頓ニ

服スル下十六棗或ハ二十四棗 ○肝脾及腎ノ例

百四九

塞以テサラー卜薤ノ二製油及醋ヲ加入食  
前或ハ食後ニ用ユ痛凡肝ヨリ生スル者膽ハ  
香ノ油ヲ取花ヲ浸シ以テ痛處ニ貼ス腎及膀  
脱痛石淋以テ細ニ坐ミレイニセウ百二  
十八戈ヲ以テ煮三分一ヲ取ルメルチイ  
ニ一杯ヲ取空心ニ飲服ス  
増補花砂石ヲ馭リ子頭ノ腫瘍ヲ散ス花未夕閑  
カサル者ヲ摘ミ鹽及酢ヲ以テ淹シ肝脾及腎ノ  
閉塞ヲ治ス

常春藤

キリムラツプ

性功温メ且燥ス其青者清涼ヲ主リ且収斂ノ功  
アリ

附方脾藏ノ閉塞葉ヲ取醋ニテ煮以テ左脇ニ貼  
ス脳中ノ粘液及不熟ノ液ヲ清滌ス葉ヲ取汁  
ヲ絞リ鼻中ニ漱ク因テ嚏ヲ發シテ惡液ヲ出ス  
○瘡瘍久ク愈サル者及耳痛葉ノ生汁又ハ油ニ

テ者耳中ニ滴ス○赤利葉ヲ取乾シ三指撮酒ヲ  
以テ飲服ス○腎痛石淋及水腫子ヲ取細末ニ一  
匙酒ヲ以テ飲服ス○齧齒空ヲ為者ヲ去実ノ生  
汁ヲ以テ其空ニ滴ル但其外ノ齒ニ及リテ禁ス  
其法蠟ヲ以テ其外ノ齒ヲ包ミ圍ムベシ

牛房 コロートキリツセン

性功温メ且燥ス下中等其性汗ヲ發シ小水ヲ催  
ス

**附方**喘急痛凡吐血吐膿根ヲ取多少宜ニ從ヒ水  
ヲ以テ煮砂糖ヲ加ヘ服ス又方根ノ生汁十六匙  
酒半升頓服ス○腎痛及百淋根ヲ取煎服ス且子  
一匙ヲ取故キ蜜水ヲ以テ飲服ス○曰創傷及骨  
節肉挫脱白葉ヲ取細ニ持キ患上ニ貼ス○湯泡  
火燒生葉ニ取持キ雞子白ヲ以テ和シ貼ス  
**增補**根サルサハリルヲト功ヲ同ス代用スベシ  
胸膈諸病ニ用ヒ小水ヲ利シ汗ヲ發シ諸中毒脾

藏ノ閉塞諸熱及痛凡ヲ治ス

附蒼耳

机里示腫乃堅腫葉ヲ取細ニ持キ膏ノ如ニ之ヲ

貼ス

増補根皮上ノ病ニ用ヒハイルウヲルム名癬ノ等

ヲ治ス外用糊劑ト作シ堅硬腫毒ニ用ユ

車前 ウヰキフレ

性功清涼ニシテ燥ス下第二度淨刷シ收歛ス

附方下利吐血溺血月經過多腎及膀胱ノ膿腫根

葉四溢ヲ取清淨ナル大麥水及酒ニテ煮百二十

八戈ニ至砂糖少許ヲ加ヘ味ヲ添ヘ日ニ二三次

之ヲ服ス又方車前子一戈細末ニ酒ヲ以テ飲服

ス○痛凡熱ニ因テ生ルニ葉多少宜ニ從ヒ白中

ニ於テ持キ膏ノ如ニシテ患處ニ貼ス○眼目熱

腫莖葉ノ生汁或ハ露水頻ニ煎中ニ搗ル○腹中

有虫生汁一匙故キ蜜水ヲ以テ飲服ス且持燻セ

ル葉ヲ以テ脣中ニ敷ク○葉銀之血根葉一溢赤  
酒六十四莪ヲ以テ煮半ヲ減之生汁ハ莪消石鹽  
五分ヲ加ヘ以テ含嗽ス○腎中結石ハ——トル  
ウエキフレ——三溢清浄水ヲ以テ煮日ニ二三  
次之ヲ服ス

増補子泄瀉及月經過多ヲ治ス根熱病ヲ治シ生  
汁瘡ヲ愈スノ功アリ是ヲ以テ金瘡吐血子宮冷  
血ヲ治ス舍利別ニ作り尿血ヲ治シテ殊ニ妙ニ

マニ子ニロー      ローセマレイニ

性功温メ且燥スノ第二度腦ヲ強シ神經ヲ壯ニ  
ニ記憶ヲ強シ精神ヲ益シ脾病及黃疸ヲ治シ肝  
ノ閉塞ヲ開キ婦人白帶ヲ治シ諸般ノ寒湿ノ氣  
多ク神經ヲ部ニ於テスルヲ治シ常ニ飲食ニ調  
ニ用テ亦可ニ

増補葉及花頭腦心藏子宮ヲ強壯ニニ胃寒傷冷  
毒眼神衰弱頭眩冒卒中昏冒昏睡病肝脾子宮

ノ閉塞黃疸白帶下子宮衝逆婦人不孕胃ノ膨脹  
ヲ治ス外用冒寒傷冷毒天行痰熱耳聾不聽ヲ治  
ス燒キ灰ニシテ指齒劑ト爲シテ齒齲ノ腐爛ヲ治  
ス

落花生

イニシヤニセケルツセ

性功櫻子ニ同シ故ニ名ク

增補性他種ノ櫻ニ同シ食饌ニ之ヲ用ユ

馬兜鈴

ヲストルルニイ

性功其根温メ且燥ス下第三度粘相ヲ稀薄ニ同  
達ニ及淨劑ス

附方喘急脾藏閉塞月經不來腹痛心腹傳染諸

病乾根ノ細末一匁酒ヲ以テ飲服ス又方酒ヲ以

テ煎服ス○齒齲腐爛末ト爲シ患處ニ搗ス○月工

腸脱出酒ニ以テ煮テ之ヲ蒸ス

增補治創ノ功アリ外用シテ患部ノツラキルカ

一ノ附骨疽久キヲ經ル者ヲ治シ又疥癬ヲ

療生ヲ催シ産後瘀血ヲ浄ス

マコノテ

クニ子ガリウ

性功大熱ニシテ燥スノ性アリト子ウスノ説

ニ因テ第四度ニ属ス鬱積ヲ分テ凝結ヲ稀紀

シ陳滞ヲ滌刷スルノ功アリ

附方鬱冒怔忡世中乾ケル者一溢上好ノ焼酒六

十四钱ニ浸シ置キ一二匙ヲ取頓服ス○勞症天

行疫熱及癩癩露水十六钱ヲ取服ス又葉上ニ在

ル所ノ露水甚タ良ニ

增補喘急砂石癩癩疫熱及金瘡ヲ治ス外用齒痛

及譫妄ヲ治ス露水及チニクテル名劑ニ製シ又

上ノ諸病ヲ治ス

ツクハ子リウ

ナルトスベシ

性功葉及実寒ニシテ燥スノ性アリ諸中毒ヲ解

シ傳染諸病ヲ治スルヲ妙ニ

附方譫妄此州半匙便用ノ液ヲ取テ二十日ノ間

空腹 = 飲服ス ○ 諸中毒即チ砒

并 = 傳染諸病子又ハ葉五分頓服

增補子 諸中毒即チ砒霜毒ノ如キチ

熱癩痲譫妄鬼魅憑依ニテ譫妄

ノ後癡迷ヲ發ル者ヲ治ス其外用ニテ地一属

スル諸腫焮腫陰處ニ生スル者へストホイル

ニ癰疽カヒユニケレニ病膿腫久ク経ル者

治ス

長病 扱



