


洋学文庫  
文庫 8  
C 244  
5



ブ  
ー  
ル  
ハ  
ー  
ン  
セ





蒲尔花歌内病論第一 斯微句註

論哥兒賞之虚僣下

坪井信道訳稿廿三

第六百六十三章

○自性粘液及焦熬粘液之為血行不利者虚僣

由自第六十九章至第七十四章所說諸證知之

斯微句曰ク膠粘液ニ二種有り一ハ運行ノ乏  
弱ナルヨリ来ルコレヲ自性粘液ト謂フ自性  
粘液ノ人ハ四末冷ハ易ク皮膚ノ色淡白肌肉  
肥實スルニ非スメ膨然トメ虚僣腫ナル者ノ



如レニハ運行過盛ナルニ由テ血液漸ク稠厚  
ト為リ管末微細ノ処ニ至テ流利スルヲ能ハサ  
ル者ナリコレヲ焦熬粘液ト謂フコレヲ患フル  
人身躰灼熱シ皮膚赤色ヲ現ハス是レ其微ナリ  
○自性粘液ハ既ニ上ノ自性粘液病篇本文引ク  
所ノ諸章ニ詳説ス哥兒賞中祭スル所ノ虚憊ハ  
自性粘液ニ由テ来ル者無シ何者自性粘液質ノ  
人ハ其躰中粘稠液充溢スルユハニ其人哥兒賞  
ヲ祭スルヲ希ナリ劇盛熱ノ如キハ殊ニ鮮シト

○且ツ其人哥兒賞ヲ祭スル寸ハ血液ノ運行コ  
レニ由テ増進スルユハニ其寒性ノ粘液速ニ溶  
解シ諸管ノ閉塞自ラ開通シ躰質却テ固シキ  
ヲ得レハナリ○焦熬粘液ニ由テ祭スル虚憊ハ哥  
兒賞ニ在テ尤モ多シトス哥兒賞ヲ祭スル以前  
躰中既ニ焦熬液有ル者ハ哥兒賞ヲ得テ益々  
増進シ哥兒賞ヲ祭スル以前焦熬液無キ者ハ哥  
兒賞ニ由テ必スコレヲ得第百九章ノ註参考  
シハ焦熬粘液ニ由テ血行不利ヲ為ス者ハ第百三

兩腦ハ大  
腦小腦ヲ

○虚僊由兩腦有兩被強壓者第<sub>三</sub>因以其共癈

第<sub>六</sub>百<sub>六</sub>十<sub>五</sub>章

ノ諸章ニ詳説ス就テ考フヘシ

斯微旬曰ク諸管閉塞ノ原曰證治本文引ク所

四十四章所説知之

○諸管之閉塞ニ虚僊<sub>ニ</sub>由自第一<sub>百</sub>七<sub>章</sub>至第一<sub>百</sub>

第<sub>六</sub>百<sub>六</sub>十<sub>四</sub>章

クル所ノ諸證ニ由テコレヲ察スルヲ得ヘシ

百八十二章第<sub>三</sub>百八十四章第<sub>三</sub>百八十五章第<sub>三</sub>

言フニ前  
腦後腦ト  
名ク

諸症之係在於兩腦之機能有兩癈弛知之謹妄  
嗜眠振掉頭旋耳鳴等是也

斯微旬曰ク大脳<sub>ヲ</sub>前腦<sub>ヲ</sub>小脳<sub>ヲ</sub>後腦<sub>ニ</sub>較フレハ殊

ニ軟脆ナリ故ニ凡ソ物ノ腦質ヲ強壓スヘキ

者ハ大脳ヲ強壓スル<sub>ト</sub>小脳ヲ強壓スル<sub>ト</sub>ヨリ速ニ

メ且ツ甚シトス<sub>一</sub>第<sub>六</sub>百<sub>六</sub>十<sub>五</sub>章ノ註參考故ニ小脳強壓セラ

レテ活機<sub>原</sub>名<sub>コ</sub>レ<sub>フ</sub>ヘ<sub>ン</sub>デ<sub>ウ</sub>エ<sub>ル</sub>キ<sub>ン</sub>ゲ<sub>ン</sub>ニ<sub>係</sub>在<sub>ス</sub>癈弛スル所口有ル

寸ハ必スコレニ先テ大脳強壓セラレテ魂機<sub>原</sub>名<sub>コ</sub>レ<sub>フ</sub>ヘ<sub>ン</sub>デ<sub>ウ</sub>エ<sub>ル</sub>キ<sub>ン</sub>ゲ<sub>ン</sub>ニ<sub>係</sub>在<sub>ス</sub>

先ツ癈弛スル所口無キヲ得

其機能大脳ニ係在ス

ス○小腦ハ壺ニ大腦ヨリ較ク硬強ナルノコトナ  
ラス腦ニ四竇有テ靈液ヲ泌別セル剩餘ノ液ヲ以テ常ニ其中ニ滿ツ然レ此四竇  
一モ小腦ノ其部位ニ在テ液汁此ニ滯留シ特  
ニ在ラス  
リ小腦ノミツ強壓スル者無し但シ第四ノ腦竇  
小腦ノ下部ニ在レ凡其中ノ液汁常ニ甚ク滿ツル  
ト無キユヘニ小腦ヲ強壓スルニ至ラス若シ此  
中液汁充盈メ小腦ヲ強壓スルニ至ル寸ハ延髓  
モ亦強壓セラレサルヲ得ス延髓ハ大小兩腦  
ノ白髓腦底ニテ會湊延長メ成ル野口ノ著ナル

故延髓強壓セララル、寸ハ大腦ノ機能必ス先ツ  
阻遏セララル○腦中ノ血管盈脹スルニ由テ延髓  
ヲ強壓スル者ハ能ク兩腦共ニ強壓ス然レ大腦  
ヲ強壓スルト尤モ甚シトス○虚僊腦髓ノ強壓セ  
ラル、ヨリ奈スル者ヲ知ルノ徴ハ大腦中ノ諸  
症ヲ標的トスルニ若クハ無し何者大腦中強壓  
セララル、ト無クメ靈液ノ我意ニ從フ諸筋ニ灌  
注スル者強壓セララル、ト有ラサレハナリ第六  
百六十一章ノ註ニ記スル一婦人徴ニ目上ヲ挫

傷シ青癥消散セル後虚憊ヲ發シ喜忘シ微ニ譫  
語セシ者死後汚液滞留セシ症其理ヲ  
觀ルニ是レリ

○然レ血管大ニ虚之スルニ由テ亦能ク前腦即  
腦ノ機能ヲ攪擾スル者有知ラサル可カラサル  
ナリ故ニ人若シ刺絡ノ血ヲ浮スルヲ甚ク多キ  
寸ハ先ツ振掉耳鳴或旋眼睛等ヲ發シ次テ昏倒  
スルニ至ル浮血ノミテラス諸般ノ強キ漏泄病  
即チ強キ下利等ニ由テ亦右ノ諸症ヲ發スルヲ

常時多ク見ル所ナリ○故ニ若シ諸般ノ漏泄ノ  
症無クメ諸般ノ漏泄具ナリニ身六  
百六十二章ニ説示ス 虚憊ヲ發スル  
者ハ是レ其因腦中ニ在リト知ルヘシ其因腦中  
ニ在ル者トハ多血腦中ノ諸管ニ憤滿スルト粗  
凝ノ血ノ腦中ノ細管ヲ流利スルヲ能ハスメ細  
管ヲ流利スルヲ能ハスメ細管閉塞スル者ト是  
ナリ此兩症何レモ能ク腦髓ヲ強壓ス○患者甚  
ク夕眠ヲ嗜ミ昏トメ覺メ難キハ腦髓強壓セラ  
ル、ト蓋シ甚シクメ漸ク昏絶セントスルノ候

ナリ○頭痛頭痛有テ全軀虚憊シ振掉スル者ハ  
浮血メ即チ治ス○頭旋ハ身二百六十七章ノ註  
ニ説ク如ク腦中ノ諸病ノ輕症ニメ諸般ノ腦病  
其初メ多クハ先ツ頭旋ス其諸病ノ既ニ治スル  
時モ亦必ス頭旋ノ一症ヲ餘ス○頭旋ノ輕易ナ  
ル症ハ唯々物象ノ眼ニ映メ旋運スルヲ見ルコ  
レ腦質ノ方サニ始テ壓迫セララル、候ナリ其症  
漸ク増進メ眼睛昏暗シ其最モ甚シキニ至テ終  
ニ暈絶平倒ス是レ全軀ノ筋力盡ク脱スレハ

ナリ又癩痼卒中ヲ發スル者其初メ必ス先ツ大  
ニ頭旋ス○依ト加刺得私么ク頭旋ノ眼暗ヲ兼  
ヌル者其初メ鼻衄ヲ得レハ即チ治ス是レ頭旋  
ノ多血ヨリ來ル者ヲ言フナリ○頭旋多クハ耳  
鳴ヲ兼ヌ是レ又腦ノ強壓セララル、候ナリ頭旋  
セスメ耳鳴スル者有リ是レ耳ノ聽器ニ循行セ  
ル動脈其部ノ神至ヲ強壓スル者ナリ又動脈ノ  
強腦膜ニ循行スル者ノ一大枝聽神經ノ石骨ニ  
入ル処ニ延行スルユヘニ若シ其中血ヲ滿ウル



ト過多ナル寸ハ則チ聴神経ヲ強壓シ又能ク耳  
鳴ヲ發ス○依ト加刺得私云ク熾盛孰ニ於ニ耳  
鳴眼暗ツフルレバミチチウス鼻塞ツフルレバミチチウスヲ發スル者鼻衄ヲ得サレハ則チ神  
識朦迷ス又云ク劇盛病耳鳴ヲ患フル者速ニ  
鼻衄或ハ自ラ發シ或ハヲ得テ腦ノ壓迫セララル、  
術ヲ以テ催發ス  
者輕寛スルニ非サレハ危篤トス

第六百六十六章

○虚憊由心藏衰弱發者以血行遲細知之  
斯微旬日ク一身血液ノ運行ハ一ニ心藏ノ機能

ニ係在ス故ニ其既ニ諸部ヲ一周スルノ血静脈  
ニ由テ再ヒ心藏ニ還ルニ非サレハ復タ部部ニ  
運行スルヲ能ハス然レ心藏ハ全幹唯ニ筋ヲ以  
テ成ル者ナルユヘニ其機能ヲ為サントスル寸  
ハ必ス靈液其筋中ニ注入スルニ非サレハ能ハス  
然ルニ靈液ノ絶ヘス心ノ諸筋ニ注入スル所  
以ハ一ニ心ノ機能ノ致メトメ血ヲ腦中ノ動脈  
ニ上輸メ靈液ノ原醅ヲメ缺乏スルヲ無カラシ  
ムルニ在リ故ニ心藏ノ衰弱ハ一ニ血行ノ遲細

ナルヲ以テコレヲ知ル心藏ノ機能ハ血ヲ其室  
中ヨリ駆出スルノ外用フル所口有ラサレハ十  
リ然氏心藏ノ血ヲ駆出スル機能他部ノ原曰  
ヨリノ衰弱スルヲ有リ假令ハハ小腦若クハ小腦  
ヨリ出デ、心藏ニ循行スル神経ノ阻壓セラル  
、処口有ルカ如キ是ナリハ小腦ハ解中我意ニ從  
ハナル運動ヲ主トスレ  
ハナ然リト雖氏今此章ニ於テ説ク所心藏  
衰弱ナル者ハ唯々其曰心藏中ニ在テ他部ノ曰ヨ  
リ来ル者ニ非サル者ヲ言フ此症具サニ第百六

六十一章ノ註ニ記ス就テ考フベシ○故ニ其曰  
心藏ニ在ラスメ心藏ノ機能衰弱スル者有ル  
知ルヘシ第百六十二章ヨリ第百六十五章  
ニ至ルマテ説ク所ノ諸曰共ニ能ク心藏ノ機能  
ヲメ衰弱セシム○右ノ如ク心藏ノ衰弱或ハ心  
ノ自家ノ因ニ由テ来リ或ハ他部ノ疾患ヨリメ  
来ル者アリト雖氏其發スル所ノ症ハ一ナリ何  
レモ血行遲細ヲ為サルヲ無シ故ニコレヲ弁  
別スルヲ甚タ難シト曰ク第百六十二章ヨリ

第六百六十五章ニ至ルコトヲ説ク所ノ原因ノ  
察スヘキ者下クメ血行遲細ナル者ヲ以テ眞ノ  
心藏ノ衰弱原因心藏ニ在ト為スヘキナリ

第六百六十七章

治法

○由血液脱泄諸管虚之症虚憊者即虚憊以并復  
之以食料當與其實可流動其性齊於血煮之以法  
濃厚膠稠氣味緩柔者以畜肉植類作之以酒及辛  
芳之品和之為宜與之須數服之須少輕手摩擦  
皮膚以使其所服之食液徐充於四末若作之以其性

與病毒之性相反者最為良

斯微句曰ク此章以下虚憊ノ治法ヲ説ク其同

ノ異ナルニ随テ治法モ亦各々異ナリ今マ此章ニ

於テ説ク所ノ者ハ血液脱泄レ諸管虚之ナルニ

由テ發スル所ノ者ナリ」○依ト加刺得私云ク病

血液過多ナルニ由テ發スル者ハ宜レクコレヲ

治スルニ疎導ノ法ヲ以テスヘシ病血液虚之十

ルニ由テ發スル者ハ宜レク補充スルノ法ヲ以

テ之レヲ治スヘシ」ト故ニ今マ此症ヲ治スルモ

亦直シクコレヲ補充スルノ法ヲ以テスヘキナリ  
然ルニ補充スルノ法ヲ尤モ難シトス○人能ク  
飲食ヲ以テ虚之セレ血液ヲ補充スルヲ知  
ル然レ其身躰諸器ノカラヲ以テ其服スル所ノ飲  
食ヲ消化シ良血液ト為サシムルヲ知ラス今  
コ服スル所ノ飲食ヲメ消化メ良血液ト為ラシ  
メントスル寸ハ必ス躰中ノ諸管ト諸器ノ機能  
ヲ以テコレヲ剋制シコレニ加フルニ從前既ニ  
躰中ニ存スル所ノ多量ノ良液コレニ和スル者

有ルニ非サレハ其功ヲ遂クルヲ能ハス尚且ツ  
飲食スルヲ稍々多メ未成ノ液ノ血中ニ混スル  
ヲサシク其度ニ過クルヲ有ル寸ハ則チ速ニ化  
成スルヲ得スメ動々モスレハ惡液ヲ生スル  
ニ至ル辨ヲ二十五章辨一條○今コ此章説ク所ノ  
虚憊ノ症ハ患者ノ躰中良液甚々乏シク且其  
諸管諸器ノ機能モ大ニ衰弊シ其飲食スル所ノ  
者ヲ能ク剋制化熟メ其レヲメ良血液ト為ラシ  
ムルヲ甚難シ故ニ此ノ如キ患者ノ血液ヲ補充

セント欲セハ其衰弊セル諸器ノ機能ト其缺乏セル良液トヲ以テ剋制化熟ス可キ飲食ヲ撰用セサル可カラサルナリ世人或ハ以爲ヘラク虚憊甚シキ身軀ヲ補充スルニハ必ス厚滋ノ食物ヲ以テセサル可カラス<sup>ト</sup>大ニ非ナリセルレユスニク化<sup>リ</sup>食スル所ノ物愈<sup>シ</sup>厚滋ナレハ愈<sup>シ</sup>消化<sup>シ</sup>難シ若シ能ク消化スル寸ハ滋養ノ功甚ク多シ故ニ患者ニ食ヲ其フルノ法軀力ノ強弱ヲ計テ厚薄<sup>宜</sup>レキニ適シ多少度ニ過キサラシム

ヘキナリ○虚憊甚シキ患者ニ食物ヲ其ヘント欲セハ必ス其流動質ナラシ<sup>コ</sup>ヲ要ス何者胃腸ニ屬スル諸器ノ食物ヲ剋化スル機能ハ一ニ其レヲメ乳糜ト爲シ流動質ナラシメント欲スルニ止マレハナリ其性ノ血ニ齎シカラシ<sup>コ</sup>ヲ要スル所以ニハツレヲメ速ニ血ト成ラシメント<sup>コ</sup>ヲ欲スレハナリ其性血ニ齎シキ者トハ其質中多ク血状ノ物ヲ含蓄セル者ヲ言フ<sup>第ニ十八章 第一條 参考スル</sup>  
○其血此ニ撰用スヘキ諸品ハ牛羊雞等ノ肉ヲ

煎煮セル液汁ナリ然レコレヲ煮ル<sub>ト</sub>甚タ濃厚  
ナラサルヲ佳トス又宜レク盡ク其油脂ノ質ヲ  
淨除スヘシ若シ然ラスメ甚タ濃厚ニ過キ若  
クハ油脂ノ質多キ寸ハ其衰弊セル胃腸コレヲ  
消化スル<sub>ト</sub>能ハス其部ニ停滯メ動モスレハ酸  
房腐敗ノ性ト為ル○右ノ煮肉汁ニ加フルニ鹽  
若クハ枸橼汁少許ヲ以テスルヲ良トスコレニ  
由テ一ハ其味ヲ美ニレ一ハ其腐敗ヲ防ク諸肉  
ノ性ハ動スレハ腐敗レ易ケレハナリ○煮肉汁

ノ虚憊ニ大効アル<sub>ト</sub>コウエ<sub>ル</sub>ノ經驗ニ由テ胎  
ミタリコウエ<sub>ル</sub>曾テ一少年ノ大ニ失血セル者ニ  
煮肉汁ヲ多服セシムコレニ由テ竟ニ故ニ復ス  
ル<sub>ト</sub>得タリ房ニ百三十四章房四  
條ニ詳説ス参考スベシ○乳汁ヲ以  
テ製セル食物及ヒ血ヲ煎煮セル者及ヒ雞子白  
ヲ以テ製セル者モ亦此症ニ用ヒテ良ナリ○又  
コレニ加フルニ些ニ辛<sub>ク</sub>芳ノ品些ノ酒ヲ以テメ  
害アル<sub>ト</sub>無シコレニ由テ能ク其虚憊セル精力  
ヲ杜ニシ諸藏及ヒ諸管ノ食物ヲ消化スル機能

ヲ補助ス○然凡大ニ失血セル患者ハ其創口未タ  
緊閉セス再発ノ患レ有ルノ間タハ刺戟衝動ノ  
性アル諸品ハ共ニコレヲ共フルコトヲ禁ス唯  
當サニ單ナル煮肉汁ヲ共フヘレ假令ハ孕婦  
ノ墮胎セル者ノ如キ是ナリ此症ハ子宮ヨリ逆  
出スルノ血殊ニ甚シクメ患者大ニ衰弊レ殆ン  
ト昏絶スルニ至ラサレハ其血止ムコト無し其既  
ニ休止スルノ後ト虫氏若シコレニ共フルニ酒  
若クハ辛芳ノ諸品ヲ以テスル寸ハ其未タ全ク

緊閉セサル管口ヨリ鮮中ニ留殘スル所ノ許  
ノ血ヲ搾出レ竟ニ休止スルコト能ハサルニ至ル  
此ノ如キ症ト虫氏唯ニ單ナル煮肉汁ヲ以テコ  
レヲ養フ寸ハ亦能ク其脱泄セル者ヲ補充スル  
コトヲ得ヘキナリ○病人久シキヲ經テ治セザル  
ニ由リ若クハ漏汗ニ由テ若クハ下利ニ由リ血  
液虚乏セル者ハ酒及ヒ辛芳ノ品ヲ加ヘ與フト  
雖氏固ヨリ後害有ルコト無し然氏コレヲ加フル  
コト須ラク些少ナルヘシ稍ニ其度ニ過クレハ即

千害アリ何者此ニ説ク所ノ虚億ハ哥兒贊ノ一  
症ナレハナリ○又從令ヒコレニ加フルニ酒及ヒ  
辛芳ノ品等ヲ以テセスメ唯ニ煮肉汁ヲ軍用  
スト蚕氏コレヲ服スルヲ甚タ多キ寸ハ必ス害  
有り是レ其躰中ニ存スル所ノ良血甚タ寡サナ  
ルニ今マ暴カニ多ク未成不熟ノ新液ヲ以テ其  
中ニ混スルユハニ其未タ全ク化成セサルノ前  
キ自己ノ性ニ從テ腐敗シ易ク且ツ心藏動脈及  
ヒ其他ノ諸管ノ機能衰弊セルカユハニ其新ニ

生スル所ノ過多ノ液ヲ催進驅逐スルヲ能ハス  
其液躰中大小ノ諸窩ニ留滞メ竟ニ水腫ヲ發  
スルノ患レアレハナリ

○此症ニ在テハ血管ノ機力大ニ衰損スルユハ  
ニ今ニ食物ニ由テ新ニ血液ヲ生スト蚕氏コレ  
ヲ催進驅逐メ微細ノ管未ニ送輸スルヲ能ハス  
故ニ輕手ヲ以テ其皮膚ヲ摩擦シコレニ由テ諸  
管ノ機力ヲ催發シ新血ヲメ四末ノ細管ニ流達  
セシムルヲ佳トス 第ニ十八章 第ニ條ノ註ニ見ユ 然氏劇レキ失



血ノ後血管ノ創口未々緊閉セサル者ニハ摩擦  
ノ法ヲ施コスコトヲ禁ス動モスレハコレニ由テ  
再ヒ失血ヲ發ス失血後ノ症ニ非サル者モコレ  
ヲ摩擦スルコト必ス輕手ナランコトヲ欲ス若シ然  
ラサル寸ハ血行コレカ為メニ過度ニ増進シ其  
生スル所ノ新血蒸散消耗メ肌肉ヲ補充スルニ  
是ラサレハナリ

○以上諸法ニ由テ其脱泄スル所ノ血液ヲ補充  
スルコトヲ得ヘシ然レ尚一個ノ説明セサル可カ

ラサル事アリ其典フル所ノ食物其病毒ノ性ト  
相及スル者ヲ撰用スヘシ假令ハ劇シキ熾盛  
熱ヲ患フル人血ニ由テ大ニ其血ヲ一身虚儘  
スル者ハコレニ典フルニ蒸餅ノ煎熬セル者ニ  
拘椽汁若クハ橙汁及ヒレインセイウエイン酒ヲ加ヘ  
タル者ヲ以テメ良ナリ是レ熾盛熱ニ在テハ病  
毒ノ性甚々腐敗シ易ケレハナリ若シ薄弱ナル  
婦人ノ随胎ニ由テ大ニ失血スル者ナル寸ハコ  
レヲ補充スルニ煮肉汁ヲ以テスルヲ最良ノ法

ト又

第六百六十八章

○由血行不利 癸虛備者 即癸者 以第七十五章  
及自第一百三十二章至一百三十七章所說之  
療法治之

斯微句曰ク第六百六十三章ニ説ク如ク膠ヲ粘液  
ニ二種ノ區別有リ自性粘液ト焦熬粘液ト是  
ナリコレヲ治スルノ法何レモ其レヲメ溶解  
利シ易カラシムルニ在リ○自性ノ粘液ノ治法

ハ第七十五章説ク所ニ由テ明ナリ○焦熬粘液  
ノ治法ハ第一百三十二章已下説ク所ニ就テ考  
フヘシ又三百九十八章ニ説ク所ハ燉衝ノ治法  
モ亦此症ニ用ヒテ良効有リ○哥兒賞ノ癸スル  
ハ自然ノ良能ナルユヘニ若シ其運行太夕過盛  
ナルヲ無ク攪動ノ勢其回シキニ適スル寸ハコ  
レニ由テ殊ニ能ク躰中膠粘ノ液ヲ解散ス知ラ  
サルナリ第六百九十章ヨリ第六百十六章ニ至ル  
コトヲ註スル所ハ参考スヘシ以上説ク所ニ由テ

コレヲ觀レハ膠粘液ノ療法每症甚々區別アリ  
リ或ハ彼此全ク相及ス細思セサル可カラサルナ  
リ

第六百六十九章

○諸管閉塞者第六百六十  
四章所說以自第一百二十四章  
至第一百四十四章所說治之

斯微由曰ク諸管ノ閉塞ヲ治セント欲セハ先ツ  
其原因ヲ詳ニシ而后本文引ク所ノ諸章說ク  
所口ニ由テコレヲ療スヘシ

第六百七十章

第六百六十  
五章参考

○由兩腦腦後有所被強壓發虛憊者即以第  
三以解凝凝血之壅塞於腦中者轉病勢之所衝撞向  
他路治之其法以蒸溺劑之有寬和之功者濡潤口鼻  
頭面頰項并貼轉引方於足端為良

斯微由曰ク兩腦ノ質強壓セラレ、所以ニハ粗  
凝ノ血液其部ノ細管ニ冒入シ其管孔ヲ壅塞  
シ其後ヨリ絶ヘス進輸シ来ル所口ノ血ニテ其管  
漸ク盈滿膨脹シ以テ其迂回ヲ強壓スル者ナ

リ故ニ若シコレヲ治セント欲スル寸ハ其血液ノ粗凝  
セル者ヲ解釈シ其管ヲ開通スル劑ヲ與フ  
ルヲ緊要トスルヲ知ルヘキナリ○人ノ人タル  
所以ニ及ヒ性命ノ起原一ニ腦ノ機能ニ係在ス  
然ルニ今コレ<sup>此</sup>症ニ在テハ其病ノ起因スル所  
腦中ニ在ルカユヘニ其尤モ危劇ノ症トスヘキ  
ヲ論セスメ明ナリ其千萬枝ヲ盡クメコレヲ救  
ハサル可カラサルヲモ亦知ルヘキナリ中就其  
劇シキ血行ノ方サニ腦中ニ向フ者ヲ轉メ他路

ニ向ハシムルヲ尤モ良トス若シ其血行益ニ腦  
中ヲ衝撞メ体ヲサル寸ハ其壅塞愈々甚シク諸  
患愈々増進ス○血行ノ一部ニ衝撞スル者ヲ轉  
メ他路ニ向ハシムルノ法第<sup>三</sup>百九十六章ノ第  
四條<sup>燧</sup>衝ノ治法ヲ説ク処口ニ論載ス就テ考フ  
ヘシ轉引<sup>テレキミツテ</sup>方及ヒ其他ノ誘導<sup>イフレイテシラ</sup>法モ亦其條下ニ詳  
説ス○轉引方ヲ此症ニ施サント欲セハ足端ニ  
貼スルニ若クハ無シ是レ足端ハ腦ヲ去ルヲ尤  
モ遠ケレハナリ○凡ソ血行ノ躰中一個ノ部分

ニ於テ劇勢ヲ為ス者ハ其他ノ部分ニ於テ血ノ  
行クヲ自由ナラサル者ナリ血ノ行クヲ自由  
ナラサルハ必ス其部ノ管中血液充塞スルト其  
脈管ノ質ノ甚々緊急ナルトニ由テ故ニ其管中  
ニ充塞スル血減却シ其脈管ノ緊急ナル者弛緩  
スル寸ハ則チ血行ノ幹中一部ニ向テ劇勢ヲ為  
ス者自ラ愈ユルヲ得○患者ノ動脈ノ大支別  
ノ他ニ循行セル部分ニ於テ誘導法ヲ施シ患部  
ニ激流セル血ヲ其部ニ引接スル寸ハ最モ捷効

有リ故ニ其血獨リ腦中ニ激流スル症ニ在テハ  
寛和ノ効アル藥汁ヲ以テ口鼻内ヲ濡ホシ又寛  
和蒸劑ヲ以テ頭面頰項等ヲ蒸濕シ其部ノ脈  
管ノ纖維ヲ弛緩シ表部ニ循行セル頰動脈ノ  
諸支別シメ血ヲ受クル寸多カラシムル寸ハ内部ニ  
循行セル頰動脈ニ激流スル血勢自ラ減衰シ復  
々多ク腦中ヲ衝撞スル寸無ク其細管ノ閉塞モ  
稍ヤク自ラ開通シ腦質強壓セラレ、寸無ク靈  
液流通シ虚憊随テ治ス故ニ依ト加刺得私云ク

腦ノ燄衝ニ於テハ温湯ノ蒸氣ヲ以テ頻ニ頭上  
ヲ蒸溺スヘシト又セイテニハム云ク腦燄衝ノ患者  
ハ宜シク頭髮ヲ剃去シ小帽子ヲ以テ其頭ヲ纏  
ハシムヘシコレニ由テ頭部ノ蒸氣饒多ニ發泄  
メ血液ノ運行多ク皮表ニ誘導セラレ腦中ノ衝  
撞スル勢ヒ大ニ減衰シ患者即チ輕快ヲ覺テ○  
此理冒寒ニ於テ明ナリ若シ人冒寒病ニ罹ル寸ハ  
鼻ノ内面ニ展布スル皮膜微ニ燄衝レテ腫起シ  
鼻孔塞窒レテ平生ノ如ク氣ヲ喟入スルヲ能ハ

サルニ至ル是レ頭面ノ外部ニ循行スル動脈血  
行自由ナラス血漸ク充塞スル者ナリ此故ニ其  
内部ニ循行スル動脈ニ血ノ上行スルヲ過多ナ  
ラサルヲ得ス故ニ冒寒ノ初發ハ頭重ク視聽  
嗅味共ニ其常ヲ失ヒ睡間夢多ク一身諸筋ノ攣  
轉甚ク重倦ヲ覺テ若シ此時ニ於テ温湯ノ蒸氣  
ヲ以テ鼻内ヲ薰蒸シ其部ヲ濡潤スル寸ハ諸症  
即チ輕快ヲ得是レ鼻内ノ皮膜ニ蔓延セル動脈  
ノ諸管ノ緊急セル者温湯ノ蒸氣ヲ得テ漸ク弛

緩レ其血平常ノ如ク流通スルヲ得ルコトニ  
其腦中ニ激流スルモノ自ラ減衰メ諸症解散ス  
ルナリ

頭部熾盛

病トハ腦熾  
衝ノ如キ是  
ナリ

○頭部ノ熾盛病ハ其病勢既ニ退キ頗ル時日ヲ  
歷其哥兒貨モ亦全ク解メ餘遺アルコト無シト雖  
氏虛憊荏苒トメ故ニ復セサル者有リ是レ腦ノ  
淡黑髓中ニ循行セル動脈管ハ他部ノ動脈管  
ノ如キ厚強ナル衣膜ヲ被ムルコト無キコトニ頭部  
ノ熾盛病ニ由テ稠血多ク其管中ニ激行レ其管

ノ質ヲメ大ニ潤弛延セシムルコトハ病勢既ニ  
退キ復タ血ノ多ク其管中ニ激行スル者無シト  
雖氏其管質速ニ收縮メ故ニ復スルコト能ハサル  
ナリ○セイテハム云ク予曾テ屢々右ノ如キ症  
ニ數回刺絡シ奈泡藥ヲ貼シ角術ヲ施シ「キリス」  
ルヲ行ヒ枝ヲ彈クメコレヲ療シ竟ニ其治ヲ得  
サル者有リ故ニ予其後此ノ如キ症ニ逢フ毎ト  
ニ多ク枝術ヲ費ヤスコト無ク唯々其初奈ニ於テ  
一回刺絡シ二三次キリス「キリス」  
以テ作ル者

施コレ其血ノ腦中ニ激行スル者ヲ靜止スルノ  
後ハ患者ヲメ自ラ肉類及ヒ多精ノ飲料ヲ避ケ  
シムルノコトニメ復々他術ヲ施サス其自ラ愈ユ  
ルヲ俟ツ是レ甚タ悠ニタルカ如シト雖凡コレ  
ニ由テ誤リヲ取ル<sub>1</sub>無シ○故ニ右ノ如キ症ニ  
在テ病勢退クノ後虚僊尚留遺スル<sub>1</sub>アリトモ  
慎シテ血液ヲ損亡スルノ術ヲ施コス<sub>1</sub>無ク其  
全計ヲ良能ニ委任スヘキナリ予常ニコレヲ以  
テ良効ヲ得

第六百七十一章

○虚僊由心藏衰弱者即得治甚難矣唯須緩  
慢救之耳第六百六十七章以下所說諸法共有  
効驗

斯微旬曰ク心藏ノ衰弱他部ニ起曰有テ来ル者  
ハ各々其他部ノ疾患ヲ治スレハ随テ治ス假令  
ハハ血液漏泄スル<sub>1</sub>過度ニメ心藏全軀ト共ニ  
衰弱スル者及ヒ病ニ後腦ニ在テ心ノ神經ノ起  
原ヲ強壓シ靈液ノ心ノ諸筋ニ注ク者缺乏シ



曰テ心藏衰弱スル者ノ如キ是ナリコレヲ治スル  
方法既ニ上ニ詳説ス○然ルニ心家ノ疾患ニ由  
テ衰弱スル者コレヲ檢索スルコト固ヨリ難シ  
今ヒコレヲ認メ得ト雖モ其治ヲ施スコト尤モ為  
シ難シトス何者心藏一個ノ疾患有テ機カ稍  
衰弱スルコト有ル寸ハ即チ十分收縮メ其血ヲ動  
脈ニ驅出スルコト能ハス若シ然ル寸ハ其室中ノ  
血必ス漸ク鬱滿シ諸筋必ス漸ク弛延シ機カ  
ノ衰弱ニ益コト加ハル此時ニ方テ唯ニ一個ノ療

法有リ血行ヲメ緩徐ナラシムルニ若クハ無シ  
唯ニ其レヲメ性命ヲ續クニ足ラシムルコト以テ  
良トスコレニ由テ心ノ諸筋纖維多ク機カヲ勞  
スルコト無ク此ノ間ニ方テ其後前損亡セル機カ  
漸ク故ニ復スルコトヲ得ヘキナリ然レコレニ由  
テ治ヲ得ル者亦幾シト希ナリ○通常ハ心薬ト  
稱スル者ハ全驅ノ血液脱泄メ諸管虚乏スル者  
ヲ充張スルノ諸薬ト血行ノ緩弱ナル者ヲ催進  
スルノ諸薬ト是ナリ是レ共ニ心室ヲ刺戟シ其

收縮ノ勢ヲ急疾ナラシムル者ナリ此諸品ヲ用  
ヒテ効ヲ養ヌヘキ心藏ノ衰弱ハ其起因心藏ニ  
在ラスメ他部ノ疾患ヨリ来ル者ナリ若シ心藏  
自家ノ疾患ニ由テ衰弱スル症ニコレヲ用フ  
レハ固ヨリ効ヲ養スルヲ無ク心藏ヲ益シ衰弊  
セシムルノミナリ

第六百七十二章

○由以上所説觀之言自第六百六十七章劇盛病行  
壯心藥之法尤難知而虛僣之於身兒贊者時

有不可治之症可知矣

斯微旬曰ク凡ソ平常壯心藥ト稱スル諸藥ハ其  
功效幾何ク敏峻ナル者ト雖氏劇盛熱ニ在テハ  
決メコレヲ以テ壯心補力ノ藥ト稱スルヲ無シ  
何者ヲメ却テ大ニ疲弊虚僣セシムレハナリ○  
劇盛熱ノ初發患者速ニ虚僣スルヲ有ル者ハ必  
ス過多ノ血ノ身兒贊ニ逢テ其質膨起レ尿管ヲ  
起脹シ或ハ血ノ運行不利ニメ細管壅塞スルニ  
由ル者ナリ故ニ此時ニ方テ真人壯心藥ト稱ス

へキ者ハ過多ノ血ヲ疎泄シ過盛ノ運行ヲ鎮靜  
シ不利ノ血ノ壅塞セル細管ヲ後部ヨリ強ク  
衝撞スルヲ無カラシムル諸法ナリ是ヲ以テ劇盛  
熱ノ初發虚僊スル者ハ刺絡メ大ニ其精カヲ回  
復スル者多シ若シコレニ興フルニ運行ヲ催進  
スル諸藥ヲ以テスル寸ハ虚僊益々加ハル若  
シ病ノ未際ニ至テ虚僊スル者ハ療法全ク此ニ  
及ス○津液過度ノ漏泄ヲ為ス者ニ非サレハ患  
者虚僊スト雖凡血液ヲ補充スル諸品ヲ興フル

一ヲ禁ス興フレハ必ス害アリ○劇盛病ニ在テ  
ハ諸症既ニ退キ病勢靜止スルノ後ト雖凡刺戟  
衝動ノ功有ル壯心藥ヲ用フルコトヲ禁ヌ是レ病  
ニ搶上ノ性有ルヲ以テ若シコレニ興フルニ稍  
々辛芳ノ品ヲ以テスル寸ハ患者虚僊甚シト虫  
凡病勢動モスレハ再ヒ上腔ヲ衝撞スレハナリ  
唯々須ラク多ク時日ヲ経過メ精カ自ラ故ニ復  
スルヲ待ツヘキナリ 此說既ニ第六  
百七十章ニ見ユ ○故ニ医者  
劇盛熱ニ於テ壯心藥ヲ施サント歌セハ當サニ

何等ノ藥術ヲ施メ其虚僣ヲ復スヘキカ潜心  
思メ後始メテ誤ヲ取ラサルヲ得ヘキナリ故  
ニ曰ク劇盛病壯心藥ヲ行フノ法尤モ知リ難シ  
ト○妄医動モスレハ劇盛病ノ初發腦質強壓  
セラレテ精力虚僣スル者ヲ見テ是レ病ノ惡性ナ  
ル者ナリト称レ頻リニ刺戟衝動ノ功アル壯心  
ノ諸藥ヲ共ヘ其精カヲ挽回セシトシ斃ルニ  
至レトモ終ニ其非ナルヲ悟ラスメ以爲ヘラ  
ク術ヲ盡クメ死ス命ナリト病家見聞相習ヒ此

ノ如キ症ニ逢フ毎トニ曰クコレ病ノ惡性ナル  
者ナリ宜レク壯心藥ヲ以テ急ニコレヲ救フハ  
シト医コレヲ服セシムルヲ欲セスト雖凡衆  
口實ニ制止ス可カラス竟ニコレヲ以テ命期ヲ  
促カス或ハコレヲ以テ解毒ノ藥ト称シ此症ニ  
逢フ毎トニ必スコレヲ用フル者アリ此ノ如キ  
症ニメ医若シ壯心藥刺戟衝動ノ功アル者ヲ共ヘスメ患者  
死スルヲ有ル寸ハ病家曰クコレ初發速ニ壯心  
藥ヲ用ヒサルニ由テ死セリト終ニ其罪ヲ医者

ニ歸ス<sup>ハ</sup>豈ニ大息セサル可<sup>シ</sup>ヤ医ノ王公貴人ヲ  
ヲ療スル者尤モ常ニ心ヲ傷マシムル所ナリ故  
ニセイテンハム云ク惡性<sup>ノ</sup>見ノ説一タヒ出テ、人ヲ  
殺ス<sup>ル</sup>大弟ノ創メテ人間ニ出テシヨリ甚タシ  
何者衆人ノ惡性ト稱スル者ハ哥兒費ノ熾衝尤  
モ甚シキ者ナリ然ルニ是レニ興フルニ更ニ刺  
戟衝動ノ効有ル諸藥ヲ以テ是レ害ヲカル可  
カラサルナリト是ヲ以テセイテン公書中壯心  
藥ノ誤用ヲ論スル者甚タ多シ

○虚憊之於哥兒費<sup>本</sup>者時有不可治之症<sup>也</sup>虚憊  
ノ治ス可カラサル者トハ其原因ノ治ス可カラ  
サル者ヲ言フナリ蓋シ諸病中虚憊ノ因ノ治ス可  
カラサル者屢ニコレ有リ假令ハハ勞瘵ノ漸ク死  
路ニ迫ク者ノ漏汗下利止マスメ稍ニ虚憊シ  
幾多ノ壯心藥ヲ費ヤスト雖モ決メ精カシ補持  
スルニ足ラサル者劇盛熱ノ強キ運行ニ由テ血  
中ノ稀液耗散シ餘血稠厚ヲ為シ腦中ノ薄弱  
ナル血管ニ壅塞スル<sup>ル</sup>殊ニ牢固ニメ幾多ノ鮮凝

藥ヲ用フト雖其血質ヲ解釈スルヲ能ハス  
其因テ祭スル所ノ虚憊モ亦竟ニ治ス可カラザ  
ル者又劇盛熱ノ強キ運行ニ由テ脳中ノ細管竟  
ニ破裂シ其血腦中ニ溢流シ漸ク空窩ニ充盈  
シ腦質ヲ強壓シ血終ニ排除ス可カラズ其因  
テ祭スル所ノ虚憊モ亦終ニ治ス可カラザル者ノ  
如キ類是ナリ○凡ソ哥兒賞中鼻衄ヲ祭スル者甚  
タ多シ又時ニ吐血尿血ヲ得ル者有リ鼻衄スル  
者ハ鼻中ノ血管破裂スル者ナリ吐血尿血ハ肺

若クハ腎ノ血管破裂スル者ナリ右ノ諸部ニ循  
行スル血管ハ腦中ノ血管ニ比スレハ甚強厚ナ  
リ然ルニ尚哥兒賞ニ由テ破裂スル者有リ況ヤ  
腦管ノ薄弱ナル者ニ於テヤ故ニ吐血尿血ハ  
哥兒賞ニ在テ共ニ惡候トス○神經ノ起原腦中  
ノ血管ノ腫張セル者ニ強壓セラレ其中久シク  
靈液ヲ通セザル寸ハ管孔自ラ生着シ尔后哥兒  
賞既ニ治レ血管ノ腫張セル者全ク故ニ復スト  
蛭氏復タ再タヒ靈液ヲ通スルヲ能ハス故ニ衆人

劇盛ナル頭痛ヲ患フルノ後耳聾眼盲忘疾  
癡呆等終身治セサル者世間見ル所ナリ医  
シテ預レメ其始メテ於テ速ニコレヲ拒防スヘキ  
ナリ

蒲尔花歌内病論第一 斯微旬註

論哥兒賞之熱

坪井信道訳稿廿四

第六百七十三章

○表熱者以的兒没<sup>テ</sup>時的兒<sup>モ</sup>驗<sup>レ</sup>器<sup>ヲ</sup>知之裡熱者以患  
者所自覺其尿色知之

斯微旬曰ク熱ハ哥兒賞ニ在テ長ク稽留スル一  
症ナリ「カレニユス」及ヒ其他ノ昔医熱ヲ以テ哥兒賞  
ニ離レ可カラサルノ病本トスル者多シ是ニ  
亦熱ノ哥兒賞ニ於ケル多ク稽留スルナリ有レ

ハナリ平全健康ノ身躰モ自温煖ナリ温煖ハ熱  
ノ微ナル者ナリ温煖ノ常度ニ過クルコレヲ熱  
ト謂フ今マ此章ニ於テ熱ノ有無微甚ヲ知ル  
コトヲ論ス○凡ソ人ノ性命存在スルノ間ハ一身内  
外必ス温煖ナリ然レ外部ノ温煖ハ内部ヨリ微  
ナリ是レ外部ハ常ニ大氣ニ觸冒シ大氣ハ人身  
ニ比スレハ甚タ凉冷ナレハナリ○外部ノ熱ハ  
手ヲ以テ直チニコレニ觸レ即チ診知スルコトヲ  
得可シ然レ其輕重ノ差等ヲ并知セント欲スル

寸ハ測器ヲ用フルニ非サレハ其毫釐ノ違ヒヲ  
分晰スルコト能ハス何者我手若シ寒冷ナル寸ハ  
患者熱無レト雖レコレヲ診スルニ却テ熱有ル  
者ノ如シ我手若シ甚タ熱スル寸ハ患者微熱ア  
リト雖レコレヲ診知スルコト能ハサレハナリ測器  
ハ的兒没啼兒ニ若クハナシ其造製匠時甚タ  
精巧ヲ極ム「ハーレンヘイド」ノ創製スル所口薩  
葛<sup>カ</sup>的兒<sup>レ</sup>没<sup>モ</sup>啼<sup>テ</sup>的兒<sup>レ</sup>  
袖珍的兒没啼  
的兒ノ義ト名クル者ヲ尤  
モ妙トス○的兒没啼的兒ノ管中ニ内ルハニ諸



種ノ液ヲ以テス可ケレバ其感觸ノ精微ナルヲ  
 水銀ヲ以テスルニ若クハ無シ○的兒没時の兒ヲ  
 用フルノ法先ツ平和無病人ニ就テ其身躰  
 温煖ノ度ヲ測量シ常ニ其等級ヲ記認シ而後哥  
 兒貧ノ患者ニ値フ毎トニ患者シメ其球ヲ握ラ  
 シメ或ハコレヲ口内ニ啣マシメ或ハコレヲ胸上  
 ニ安ンセシメ或ハコレヲ腋下に挾マシムル  
 一ニ「ニユーテン」時<sup>而ニ十分</sup>一「ニユート」<sup>管</sup>  
 中ノ水銀ノ常度<sup>平人ノ温煖ニシテ升ル</sup>ヲ踏ヘテ升ル一ノ  
 多サニ由テ其熱ノ微甚ヲ細分スルヲ得ヘ  
 シ此測器ニ由テ測リ得ル所ノ熱度ハ唯々皮膚  
 ノ熱ト口内ノ熱トノミナリ口内ノ熱ハ皮膚ノ  
 熱ニ比スレハ稍々深シト雖<sup>凡是レ亦々常ニ外</sup>  
 氣ヲ通スルユヘニ内藏ノ熱ニ比スレハ甚々微  
 ナリトス○患者皮膚微冷メ内部ノ熱却テ灼ク  
 カ如キ者有リ依ト加刺得私コレヲ以テ熾盛熱  
 ノ凶候トス此ノ如キ内部ノ劇熱ハ患者唯々自  
 ラ覺フル所ニメ外部ヨリ候ヒ知ル可カラサ

ルナリ患者將サニ死セントスルノ時内部殊ニ  
心藏ノ部位ニ於テ堪フ可カラサルノ劇熱ヲ苦  
シニ皮膚却テ微冷スル者予常ニ多ク見所口ナ  
リ

○尿ノ赤色ニ由テ亦内部ノ熱ヲ察スルコトヲ得  
ヘシ是レ分齋術及ヒ究理説ニ於テ甚タ明ナリ  
尿ノ色アルハ尿中油質ノ物混スレハナリ故ニ  
油質尿ニ混スルコト愈々多キ寸ハ尿色愈々深赤  
ナリ故ニ常人枸櫞皮色ノ小便モコレヲ煎スル

ニ随テ漸ク赤色ト成リ竟ニ暗赤色ト成ルニ至  
ル是レ尿中ノ稀液漸ク消耗メ油質漸ク稠厚ヲ  
為ス者ナリ○尿ノ赤色ヲ為スヲ以テ裡熱有ル  
コトヲ證スルノ理具サニ第六百七十五章ニ記セ  
リ○且ツ日常目撃スル所トニ由テ躰熱ノ能ク  
小便ヲメ赤色ナラシムルコト昭々ナリ天質薄  
弱ナル人ハ身躰自ラ虚冷ナリ而メ其尿ヲ見レハ  
多ク清白ナリコレニ及メ天資強壯ニメ身躰多  
熱ノ人ハ尿色必ス深厚ナリ又平人多ク動作

スル寸ハ其尿必ス深厚色ヲ為ス而メ其身ノ温煖  
モ亦夕随テ増進ス○然レ尿色熱ニ由ルニ非ス  
メ自ラ深厚ヲ為ス者有リ強キ漏汗ヲ得若クハ  
飲料ヲ施スルニ由テ尿中稀澆ノ送輸液漸ク  
消耗シ其油質漸ク稠厚ヲ為ス者ノ如キ是ナリ油  
質稠厚ヲ為ス寸ハ尿ノ赤色ヲ為スト云ニ説ク  
所口ノ如シ○又シク飲食ヲ絶セル人ノ尿ハ甚  
タサシクメ其色深厚其性酷厲ナリ故ニ患者若シ  
赤尿ヲ得ハ右ノ如キ因ニ係在セサルヤ否ヤ

ヲ細ニ檢査スヘキナリ○又身見賞ニ在テ其熱  
勢殊ニ強盛ナレバ其尿色澆白ニメ其質モ亦  
稀薄ナル者有リ是レ亦知ラサル可カラサルナリ  
是患者大渴メ湯水ヲ飲テ太々多ク其湯水  
速ニ小便ト共ニ漏泄シ尿色質コレカ為メニ澆  
薄ヲ為ス者ナリ○又一種劇盛病熱勢殊ニ甚  
タシケレトモ患者多ク引飲セ又然ルニ尚其尿ノ  
色質共ニ甚澆薄ナル者有リ此症毎時必ス凶兆  
トス故ニ依ト加刺得私此病ニ於テ此ノ如キ尿

シ得ル者ヲ以テ常ニ死兆トス何者劇盛大渴引  
飲スルニ非スメ却テ此泣尿ヲ得ル者ハ血中ノ  
鹽油哥兒贊ノ強キ運行ニ由テ太夕酷厲ト為  
リ其質稠厚ニメ尿道ニ由テ分利漏泄スルヲ能  
ス唯ハ血中ノ稀液ノニ通泄シ上ニホメ如ク  
尿ノ色アル尿  
中油質ノ物混ス  
ルヲ以テナリ其酷厲ナル鹽油ハ久シク血中  
ニ留在シ其質漸ク益々稠厚ヲ為シ尔後多ク稀  
釈ノ切アル諸飲ヲ共フト雖比コレヲ溶解スル  
ヲ能ハス其服スル所口速ニ血ト分留シ其効ヲ

萎スルヲ無ク酷厲稠厚ノ血竟ニ諸部ノ細管ヲ  
流利スルヲ能ハサルニ至レハナリ其効ヲ  
第六百七十四章

○凡内外火氣增加處即為熱  
斯微旬曰ク熱ヲ以テ火ノ致ス所トスルノ衆人  
異論無シ是レ熱ト火トハ其状甚々等クメ火ノ  
在ル処口必ス熱有ルヲ以テナリ○凡ソ身躰内  
外火氣ノ増加スル所口ハ必ス熱ヲ發ス熱ヲ知  
ルニ二途有リ一ハ躰中知覺ヲ主ル神昏ノ常ヲ

変スルニ由テコレヲ知リ一ハ直チニ驗器的兒没  
ヲ云フ以テ明ニコレヲ測ル然レ其知覺ノ變ヲ  
以テコレヲ知ルハ其驗器ヲ以テコレヲ測ルノ  
切實ナルニ若カス何者知覺ヲ主ル神蓋ノ執狀  
ヲ知覺スルハ其在ル所ノ火氣ハ同一般ノ火  
氣ニメ其知覺スル所ノ執狀ハ各々自ラ異同  
アレハナリ假令ヘハ夏日炎熱烘クカ如キ時ニ  
當テ俄ニ電雷一奔暴雨飛雹游リニ臻ル寸ハ  
衆人忽チ冷氣雷ニ逼ルヲ覺テ是レ此時ト雖レ

氣中ノ炎威全ク銷盡スルニ非ス尚頗フル盛ニナ  
リ唯々大熱ノ後チ我身ノ知覺スル所ト獨リ此  
ノ如キナルノミ又隆冬ノ日凡寒ヲ冒カメ外ニ  
在ルチ多時忽チ暖室ニ入ル寸ハ衆人殆ント其  
暖氣ニ堪ヘサントス此暖室中ノ暖氣豈ニ向  
キノ熱日暴雨飛雹ノ後ノ餘熱ニ勝サルチ有ニ  
ヤ然ルニ大熱ノ後ニ在テハ冷氣雷ニ逼マルヲ  
覺ヘ大寒ノ後ニ在テハ却テ其暖氣ニ堪ヘサラ  
ントスコレ其同一般ノ火氣ニメ我身ノコレヲ

知覺スルコト大ニ差違有テ知覺ノ專ラ信スヘカ  
ラサル所以ニナリ○蓮羅的蒲尔花歌嘗テ講筵  
ニ在テ其弟子ニ語テ曰ク火ノ物タル我細カニ  
其質ヲ試驗スルコト能ハス然レ火ノ我躰中ニ在  
テ其何レノ部分ニ在テ方ニ増加スルカ其確微ハ  
知ラサル可カラサルナリ火氣ノ増加スル確微ハ  
身躰ノ腫起スル処口是ナリ或ハ一身ニ於  
テレ或ハ一部ニ於テス而メ其躰ノ重量ハ増加  
スルコト有ルコト無レコレニ由テ其部分幾何ノ火量

有ルコトヲ測知スルコト能ハスト雖レコレニ由テ  
能ク其増減ヲ的察スルコトヲ得可キナリ已上蒲  
花歌  
之其書中詳ニ凝流ニ躰ノ火氣ノ増減ヲ試驗  
スルコトヲ載ス *Wie Ilberkt. Chem. Zeil. 130. ev. K.*  
○右ニ説ク所ニ由テコレヲ觀ル寸ハ其温暖常  
度ニ過クル処ニ於テ火氣必ス増加スルコト有ル  
コト知ル可キナリ且ツ躰中何レノ部ニテモ的兒  
没呼的兒ヲ以テコレヲ測ル寸ハ其管中ノ液ノ  
升騰スル度ノ多サニ由テ細ニ火氣ノ増減スル

度ヲ識ルコトヲ得ヘキナリ假令ハハ燉衝ノ如キ  
第三百七十章ニ説ク如ク直チニ称メ火ト謂フ  
若シ此燉衝患者ノ手ニ灸スルコトハ患者即チ其  
手ノ烘クカ如クナルヲ覺フ若シ的兒没呼的兒  
ヲ其部ニ施コスオハ輒チ其管中ノ液ノ升騰ス  
ルニ由テ其部ノ火氣ノ大ニ他部ニ勝ルコトヲ知  
ル○猛厲ナル熾盛熱ニ在テ患者四肢厥冷シ唯  
心藏ノ部位ニ當テ一團ノ劇熱アル者的兒没  
呼的兒ヲ胸上ニ安ンシ以テ火氣ノ増加スル多

サヲ知ル此ノ如ク其熱内部ニ在テ的兒没呼的  
兒ヲ直チニ患部ニ接スルコト能ハサル者モ其外  
部ノ熱度ニ由テ準知スルコトヲ得ヘシ○以上説  
ク所ヲ熟讀スルオハ凡ソ身軀熱ヲ灸スル所以  
ノ理ハ其全軀ニ灸スルト一部ニ灸スルトヲ論  
セヌ必ス火氣ノ増加スルコト有ルニ由ルコトヲ知  
ル可キナリ然レ全軀若クハ一部ニ於テ火氣ノ  
増加スル者必ス其原因ナカル可カラサルナリ  
今具サニ下章ニ説ク就テ考フヘシ

象六百七十五章

○火氣增加有因血之球、相摩管之共血相激之勢過盛也

斯微旬曰ク衆人性命ヲ保持スルノ間ハ皆適宜ノ溫暖アリ一旦死セスル寸ハ其溫暖稍ヤク消滅メ其屍竟ニ冷徹スコレニ由テ之レヲ觀レハ其性命ヲ保持スルノ間ハ身况賞及ヒ其他ノ諸疾ニ罹ルコト無ク平全無恙ノ時ニ於テモ其身中必ス溫暖ヲ養作スルノ因無カル可カラサルナ

リ而メ溫暖ハ熱ノ微ナル者ナリ故ニ溫暖ヲ作コスノ因有ルハ即チ熱ヲ作コスノ因有ルナリ熱ヲ作コス者ハ即チ火氣增加スル者ナリ平全人身身躰適宜ノ溫暖有ルハ血液適宜ノ運行ヲ為スヲ以テナリ此理人死シ血液ノ運行絶スル寸ハ其身凝流ニ躰一モ消失スル所口無クメ速ニ冷徹スルヲ以テ見ルヘレ故ニ今コト人病ニ罹リ養熱スル者ハ血液過度ノ運行ヲ為ス者ナリ是ヲ以テ其過度ノ運行靜止スル寸ハ其熱即チ解散ス人疾ク走ル寸



ハ血液ノ運行増進スルヲ知ルヘシ而メ此時ニ  
於テ必ス奈熱ス其甚ル<sup>一</sup>愈<sup>一</sup>甚シク其運行ノ  
増進スル<sup>一</sup>愈<sup>一</sup>盛ナル寸ハ其奈スル所ノ熱モ  
勢愈<sup>一</sup>猛ナリ然<sup>レ</sup>ニ哉ハクモ亡<sup>+</sup>クメ其人休<sup>レ</sup>如ノ  
血液ノ運行靜止スル寸ハ其熱隨テ解ス熱ノ奈  
スル<sup>一</sup>血液ノ運行過度ナルニ由ル<sup>一</sup>益<sup>一</sup>明ナ  
リ

○人身温熱ノ理上古ニ在テハ正説有ル<sup>一</sup>ヲ聞  
カス然<sup>レ</sup>ニ「カレニユス」書中ニ云ク凡ソ我身<sup>一</sup>體温熱

ノ起原ハ心藏ト動脈ノ運動ニ在リト是ニ由テ  
コレヲ觀レハ人身ノ温熱ハ血液ノ運行ヨリ  
来ルトスルノ説尚<sup>ニ</sup>カラサルニ非ス

○今マニ箇ノ凝<sup>一</sup>解強ク相摩蕩スル寸ハ火氣相  
會<sup>レ</sup>即チ温熱ヲ生スル<sup>一</sup>眼前試驗スル所ニ由  
テ昭<sup>ニ</sup>タリ然<sup>レ</sup>ニ其<sup>一</sup>個ノ凝<sup>一</sup>解ノ間々油若クハ  
水若クハ其他ノ液汁ヲ置キコレヲ摩蕩スル寸  
ハ竟ニ温熱ヲ生スル<sup>一</sup>無<sup>レ</sup>シ候今ヒ生スルモ甚<sup>ニ</sup>タ  
微ナリ故ニ古人頗ル明哲ト雖<sup>レ</sup>ニ人身ノ温熱

Scpd pamen

ノ血ト管トノ相摩ヲ湯スルニ由テ生ストスルノ  
論ヲ信スルヲ無シ然レ亦他ノ確説ヲ得ルヲナ  
シ〇「シケルハメル」ハ甚タ高登ノ士ナリ其言ニ云  
ク人身ノ溫暖ヲ以テ固有ノ物トスルノ説ヲ看  
破スル人ハ具眼ノ士ナリ實ニ不易ノ論ト言フ  
ハシト此言頗フル理ヲ知ル者ノ如レ然レ又其  
書中ヲ見ルニ云ク予人身ノ溫暖ハ血液ノ運行  
ニ由ル者ナラシコトヲ思ヒ試ニ諸種ノ液汁ヲ取  
テ器内ニ於テ運旋震蕩スルヲ終日終夜ナルモ

竟ニ其液ノ微温ナルコトヲ見ス且ツ海ニ在テハ  
凡濤日夜相激シ川ニ在テハ急流常ニ乱礁ヲ打  
テ体ニス其相摩蕩スルコト此ヨリ甚シキハ無レ  
然ルニ千歳ヲ経歴スト雖レ未タ海川ノ水ニ  
レカ為メニ温カナルヲ聞カス此ニ由テコレヲ  
觀レハ血液平全ノ温暖ハ他ノ一個ノ固有テ能  
ク自ラ然ル者ニメ唯、其運行ニ由テ増加スル  
コト有ル者ノ如レト是レ其自ラ思フ所ヲ狂ケテ  
強ヒテ他説ヲ設クル者ナリ尤モ笑フ可レトス

○蓋シ諸液其運動ニ由テ溫暖ヲ為スト雖凡其  
大ニ集マレル者ノ大幹ヲ滾動攪擾スルニ由テ  
溫暖ヲ起スルヲ無シ唯シ其分子球ニ相摩ス  
ルニ由テ漸ク溫暖ヲ為ス者ナリ若シ其分子彈  
カヲ具有スル者ナルハ其溫暖ヲ為スルヲ尤モ  
速ナリ其然ラザル者ハコレニ及ス故ニ水ハ相  
ヒ摩蕩スト雖凡溫暖ヲ起スルヲ甚タ難シ  
乳汁ハ甚タ溫暖ヲ為シ易シ是レ民間乳酪ヲ  
製スル者明ニ知ル所ナリ○水ノ如キ彈カナキ液ト

雖凡凡シ毫髮ノ如キ微細ノ管中ヲ急劇ニ流射  
スルハ其分子自ラ相摩スルヲ急ナルヲ以テ  
即チ溫暖ヲ生ス若シ其細管彈カヲ具有スル  
ハ殊ニ大ニ溫暖ス蒲兒花  
歌ノ書見ユ○血中ニハ多ク四  
形ノ細球有テ盡ク弾カヲ具有スコレヲ赤血  
ト謂ク若シ此赤色ノ四球動脈ノ末梢毫髮ノ  
如キ處ニ至ルハ多球連結メ通スルヲ能ハス各  
球分析シ且ツ其四形ノ者却テ長形ヲ為ス困苦  
メ通射スルヲ得既ニ其狹隘ノ処ヲ徑テ再ヒ

廣処ニ出ツル寸ハ復タ忽チ初メノ凹形ニ復メ  
管中ヲ流轉スコレ諸ノ生類ノ躰中皮膜透明ナ  
ル部分ノ血管循行スル所ニ於テ顯微鏡ヲ用ヒ  
テコレヲ視ル寸ハ甚タ明ナリ是レニ由テ是ヲ觀  
レハ血質ノ彈カヲ具有スルヲ昭ニタリ且ツ血管  
ノ彈カアルヲモ亦人々共ニ疑ハサル所ナリ今テ  
マ此ノ如ク彈カヲ具有セル血ヲ以テ此ノ  
如ク彈カヲ具有セル血管ノ殊ニ至狹至細ニメ  
屈曲横斜ナル中ヲ急疾ニ流射ス其球々相摩シ

又血ト管ト相激搏スルノ盛ナルヲ知ル可キナ  
リ其コレニ由テ温熱ニ奈スヘキ復怪シムニ之  
ヲ示ルナリ

○血ト管トノ彈カニ由テ温熱ヲ奈スルヲ凝流  
ニ躰ノ諸病ニ由テ自ラ明ナリ若シ人強キ失血  
ニ由テ赤血赤血中ノヲ損スルヲ甚タ多キ寸ハ身  
躰ノ温煖随テ減衰ス又處女病ヲ患フル者ノ如  
キ其血管ヲ運行スルノ液赤色ノ血ニ非ス唯  
淡水若クハ帶綠色若クハ黄色ノ液ナリ且ツ其

凝滯ノ纖維モ甚々弛緩メ其管中ヲ流通スル液  
ト相激搏スルノ力無レ是レ血ト管ト共ニ其彈  
カヲ失フ者ナリ故ニ此症ニ在テハ身軀ノ溫暖  
甚々微ナリ○凡ソ躰中稀液細管ヲ流通スル部  
分ニハ必ス血管其間ニ錯綜スコレ温血ニ由テ  
其部ヲ煦温スルナリ故ニ腦ノ白髓ノ質中血管  
ノ頗フル大ナル者蔓延シ延髓モ亦血管細伏ヲ  
為メコレヲ圍繞ス○鳥獸ノ始メテ生下シ纖維  
未タ強固ナラスメ其諸管ノ質管中ヲ流通スル

血ト相激搏スルニ足ラサルノ間ハ其温暖十分  
ナラサルカユヘニ母躰ヲ以テコレヲ<sup>アタ</sup>温シ以テ  
其温暖ヲ助ク

○右ノ諸説ニ由テコレヲ考フル寸ハ凡ソ人身  
ノ温暖ハ血ノ球々相摩シ管ノ血ト相激搏スル  
ヲ以テ起原トスル者ニメ尋兎<sup>アタ</sup>賞ニ由テ<sup>アタ</sup>熱ス  
ル者ハ右ノ起原ノ過盛ナル者ナルヲ知ル可シ  
然レ右ノ起原何ニ由テカ過盛ナルヲ<sup>アタ</sup>為ス  
有ルカ次第ヲ見テ知ルヘシ

第六百七十六章

○血之球之相摩管之其血相激之勢過盛者出心之血動力強大而動脈拒妨之甚有力也

脈微旬回之心藏常之攷トメ收縮スル者ハ其囊中ニ於テ血ニ動カヲ付共ニ其血ヲ動脈ニ驅出シ其付共セル動カヲ以テ動脈ノ内面ヲ觸掩シ其方サニ收縮セル脈管ヲ潤滑シ其從前既ニ管中ニ元盈セル血ヲ推蕩シ管末ニ進輸セントスル者ナリ然ルニ動脈ハ收縮スル時ト其管中

動脈ノ閉張スル共纖維ノ延用スル者ニ其收縮スルハ其常ニ復スル者ナリ故ニ收縮スト雖其管孔全ク合閉スルニ非ス其中常ニ血ヲ以テ充盈ス

常ニ血ヲ以テ元盈スルユヘニ心藏ヨリ驅出シ来ル血ヲ拒防スルノ勢アリ故ニ心藏ト動脈トハ其勢常ニ相抵激ス是レ平人健康ノ時ニ在テ尚然リ若シ患者ニ在テ其血甚タ過多ナルカ或ハ血質ノ甚タ粗凝ニメ其管末微細ノ処ヲ流利スルヲ能ハサルニ由テ動脈管中多血益々元塞スル寸ハ其心藏ノ血ヲ拒妨スルヲ益々甚シク心藏モ亦カヲ極メテ其血ヲ進輸セントシ相抵激スルヲ平日ニ倍ス然レ心藏ノ操カハ尤モ強

烈ニメ且ワ静脈ノ血心室ニ還入メ休マサル工  
 へニ心ノ諸筋尚能ク大カヲ振テ其血ヲ驅逐シ  
 動脈管中ノ血ヲ推蕩進輸スルノ勢甚タ急劇ナ  
 リ此ニ於テ管中ノ血ノ相摩蕩シ血管ノ血ト相抵  
 激スルノ過盛ナラサルヲ得ス竟ニ壯熱發作スル  
 ナリ

第百六十七卷

○出心之血動力強大與否以血質之稀稠與血行  
 之疾徐知之

斯微旬曰ク *Die Gefäßina* *kecke* *war* *ka*  
凡ソ物幹ノ動ヲ各ケテカト  
謂フ此カヲ以テ其物幹他ノ静息セル物幹  
ten *ke* in *der* *top* *raum* *wand* *an* *angem*  
ヨリ分離セラレ又他ノコレノ障遮スル物幹  
ノ上ニ挿孔ス然レ凡ソ動幹ニ付スル所ノ  
カノ強弱ハ其幹ノ実質ノ多サト  
其動クノ疾徐ト由テ種々ノ區別  
シ為ス故ニ測算者此疾徐ト質ノ多  
サトヲ以テ諸物ニ付スル所ノカノ強弱ヲ  
*paal* *de* *menten* *Der* *de* *krayten*

比較スル通法ト為セリ 其言ニ云ク 元ノ  
 in de bevoege by hemm gelege, men  
 動躰ニ付スルカノ強弱ハ其躰ノ小大  
 schillen ten anpken van de toe  
 其四方ニ行ツコノ疾徐ト相合スルヲ  
 melpeel van stof, of voor de smelpeel,  
 ノ比例ニ由テコレヲ知ルト故ニコレヲ出ル血  
 Maar mede te voorst ge weeten vanden  
 ニコレヲ付共セル動カノ強弱モ亦此  
 Maar niet de schikking open een en alie,  
 法ヲ以テ測知スベキナリ ○諸大家  
 meeren regel om de kragt der  
 此一事ニ於テ論議行然トメ一定セス  
 men geleycen verbegeen het

然氏此例算者ノ所説以テ蒲尔花散  
 本文ノ説ヲ微スルニコレナリ ○但シ血ノ稀  
 bevoege egyptanmen open die een dan  
 稠ハ即血ノ實雙ノ多サナリ故ニコレヲ出ツル  
 en geteer eimenen of red den grooten  
 血ノ動カノ強弱ノ例ナリ故スル者ハ血質  
 en van de stein kanten den ineladen  
 稀稠ハ血行ノ疾徐ヲ明ニスルニ如シ  
 Drukken in pale de bevoeging van het  
 無レド igit het kant maar den het  
 den regel voor in afge mee ten. Wa  
 ut schoon de grootte afgegeven  
 ris ontrent orden elk eenden van



schillen, eyten team de waerheid  
van het geen men in den tekst fin,  
Dit is het ginselen van anderen eyen,  
en de verpleken worden. Maar de  
grootten of kleinen gepaktheid van  
het bloed vordert grootten of kleinen  
kerelheid van stof in het bloed  
Want de kerelheid van stof in een  
lyfman, aangevancet met betrekking.

tot den antley van een lyfman  
Dat is tot de hant, die het behaart,  
wordt gepaktheid van een liffman ge-  
wesen. denpalmen hal de verpleging van  
het dik het hart geoveren Goed pag,  
gemecten worden naon die twee din  
gen, namelijk de gyp oekt heid van het  
bloed, en de helen smekheid naon de  
vaten; en de hantien ook de gelyk

remek, maand over het verrot of de  
Hyden den pleghade van, en het bloed,  
Welk Darwin befaat word: 4 Welk tien  
mit de den den Wijnkeindigen moest staen  
geomen maken

第六百七十八章

○血質之稀稠 徑檢血之漏出者量稀液之消亡  
者切脉状之硬軟知之

斯微旬日ノ乳糜ハ血ヨリ稀薄ナリ故ニ  
食後二三時間タ刺絡メ其血ヲ見ル寸ハ  
乳糜漸ク其上面ニ浮フ 第百八十章ノ 若シ  
八九時ヲ歴ルノ後ナ更ニ其血ヲ浮メコ  
レヲ見ル寸ハ乳糜全ク其自己ノ質ヲ変  
メ ウエイ 洩乙若クハ血ト為ル故ニ其質始メテ稠

厚ナリ右ノ如ク液質ノ稠厚ヲ為スハ一ニ脈管  
ノ機能ニ繫在メ其時ヲ経ルテ愈々久シク其管  
中ヲ来往スルテ愈々多キニ随テ其質愈々稠厚  
ヲ為ス者ナリ今マ心藏血ヲ出ステ急劇ニ其  
管中ヲ来往スルテ疾速ナルハ其質ノ速ニ稠  
厚ヲ為ステ怪シムニ是ラサルナリ○故ニ平日  
強キ作業ヲ為メ身軀ヲ勞動スルテ甚シキ人ハ  
其血質安居弱幹ノ人ニ較ブレハ甚々稠厚ナリ  
故ニ又其幹質ヲ一望メ其血ノ稀稠ヲ知ル可キ

ナリ○刺絡若クハ失血ニ由テ出ル所ノ血ヲ見  
ルニ其凝塊小ナル者ハ其血稀薄ノ候トス凝塊  
大ナル者ハ其質稠厚トス故ニ佃漁等ノ強健  
ニメロクニ強キ動作ヲ為ス者ニ刺絡メ得ル所  
血ハ忽チ凝結メ一大堅塊ヲ為シサ時ヲ経ル  
後僅ニ沔乙状ノ液少許ヲ分離スルノミ此ニ及  
メ若シ薄弱ナル女児ニ刺絡メ得ル所ノ血速  
ニ凝固セス其後多キ沔乙状ノ液中ニ只赤色  
ノ一小塊スルノミナリ

○又小便汗下利等ニ由テ多ク血中ニ稀液ヲ  
消亡スル寸ハ餘血必ス稠厚ヲ為ス故ニ劇盛病ニ  
於テ右等ノ諸路ヨリ稀液ヲ誘泄スルヲ嚴  
禁ス 第百八十六章及ヒ第百九十章参考スヘシ

○脈状ニ由テ亦血ノ稀稠ヲ察ス可シ指ヲ以テ  
其脈状ヲ按スルニ其應スルヲ堅牢ナル者ハ其  
血稠厚ナリ故ニ壯人及ヒ強キ作業ヲ為ス人ハ  
其脈堅牢ニメ弱人ノ脈ハ柔軟ナリ○又堅実ノ  
脈ヲ以テ常ニ熾盛病ノ徵トス是レ熾盛病ニ在

テハ其血稠厚ナレハナリ  
第百六十七十九章

○血行之疾徐以心之動數之多少其脈形之小大  
知之

斯微旬曰ク血ノ脈管ヲ循行スルノ急疾ナル  
ハ血ヲ流動セシムル起原ノ操作スルノ急疾ニ  
メ又甚タカアルナリ而メ血ヲ流動セシムルノ  
起原トハ心藏ノ鼓動ナリ故ニ其動數ノ繁多  
ナルハ血行ノ急疾ナル徵トス然レモ尋兎賞惡寒

ノ時及ヒ諸物將サニ死セントスルノ時ニ方テモ  
亦心ノ鼓動甚々急疾ナリ而メ其血ノ運行ハ甚  
々遲弱ナリ是レ心ノ鼓動急疾ナリト雖モ其様  
カ甚々衰弱ノ其血ヲ駈出スルヲ却テ寡サナル  
者ナリ故ニ心動獨リ急疾ナリト雖モ極メテ血  
行急疾ナリト言フ可カラサルナリ心動急疾ニ  
メ兼テ強盛ナル者コレヲ血行急疾ナルノ確徵  
ト為ス可キナリ○血行ノ疾徐ヲ診セント欲セ  
ハ又宜シク脉形ノ小大ヲ參考スヘキナリ脉形

ノ大ナルハ心ノ一縮毎トニ動脈血ヲ受クルノ  
多キ候トス故ニ又コレヲ以テ血行急疾ナルノ  
徵トス脉形ノ大ナルトハ其一張一縮スルノ状  
態指頭ニ應スルヲ甚々分明ニメ供大ナル者ヲ  
言フ何者血行急疾ナラスト虽モ動脈ノ末梢壅  
塞メ其血速ニ靜脈ニ轉輸スルヲ能ハサル寸ハ  
其脉亦能ク充張ス然モ此症ニ在テハ脉管ノ收  
縮スルヲ甚々淺小ニメ指ニ應スルヲ細小ナリ  
故ニ脉形充張スト雖モ其一張一縮ノ搏度低

顯著ナルニ非サレハ脈形大ト称スルヲ無シ是ヲ以テ脈動ノ数急ナルハ即チ心ノ鼓動ノ数急ナル徴ニメ脈動ノ洪大ニメ数急ナルハ即チ血行ノ急疾ナル真徴ト為スヘキナリ

第六百八十章

○動脈妨拒心藏之血甚有力者見于第六百七十六章在液為過多重滯在管為缺少狹窄強拘

斯微旬曰夕心藏一縮メ一泓ノ血ヲ駈出スル寸ハ動脈コレカ為メニ一擊セラレテ其收縮セル

者弛然トメ閑濶レ且ツ其管中舊ト充實スル所ノ血推進セラレテ一泓ヲ靜脈ニ轉輸ス心藏收縮セルトスト雖也動脈若レ閑濶セス舊血轉輸セサルハ靜脈復其新血ヲ受容スルヲ能ハス然ルニ動脈新タニ心藏ノ血ヲ受クルノ時ニ方テハ其管新血ノ為メニ延閑セラルハカユヘニ自巳ノ彈カヲ以テ其血ヲ靜脈ニ控輸スルヲ能ス故ニ其一派ノ血ヲ靜脈ニ輸スル者ハ全ク心藏一縮ノカニ係ル是ヲ以テ動脈中ノ血愈々遍

多ナル寸ハ心藏ヨリ出ル血ヲ拒妨スル者愈々  
多シトス<sup>重過</sup>滞<sup>多</sup>○又一二ノ起因有テ動脈管狭窄  
ヲ為シ若クハ其細管閉塞メ其數缺少シ若クハ  
脈管ノ質強拘ニメ其細條及ヒ其屈曲盤回セル  
部分心藏ノ血ヲ受クト雖モ弛延スル<sup>ト</sup>無キ寸  
ハ<sup>狭窄</sup>拘<sup>缺</sup>能ク亦共ニ心藏ノ血ヲ拒妨スルノ因  
ヲメ大ニ増加セシムルニ足ル○若シ纖維薄弱  
ナル人ヲメ<sup>サ</sup>狭幅ノ衣服ヲ着テ<sup>強</sup>四支胸膜ヲ緊束  
セシムル寸ハ<sup>強</sup>須臾ニメ大ニ煩懣ヲ奈ス是レ緊  
束セララル、ニ由テ諸管狭窄ヲ為シ<sup>強</sup>緩弱ナル心  
藏ノ機カヲ以テ其血ヲ諸部ニ流達セシムル<sup>強</sup>  
能ハスメ其血漸ク心室ニ逼迫スル者ナリ故ニ  
其緊束セル衣服ヲ解キ去ル寸ハ煩懣即チ治ス  
○又重病新ニ愈ユル人縱食恣飲スル寸ハ<sup>強</sup>忽チ  
煩懣ヲ奈スル<sup>強</sup>有リ是レ俄ニ多量ノ乳摩ヲ生  
シ脈管中ノ液急ニ増加スルユヘニ心藏復タコ  
レヲ<sup>強</sup>緩ニ進輸スル<sup>強</sup>能ハサルナリ○然レ心藏  
ノ機カ強健ナル人ニ在テハ縱令セ尚、多食ス

ル<sub>1</sub>有リト雖心藏能ク其多量ノ乳摩ヲ驅逐  
催進メ四末ニ流達スルユヘニ竟ニ煩懣ヲ發ス  
ル<sub>1</sub>無ク唯<sub>1</sub>血球相摩ヲ湯スル<sub>1</sub>ノ急劇ナルニ  
由テ發熱スル<sub>1</sub>有ル<sub>1</sub>ニナリ又衣服ヲ以テ身  
躰ヲ緊束スルモ強人ニ在テハ亦唯<sub>1</sub>發熱スル  
ノ<sub>1</sub>故ニ強人ハ隆冬<sub>1</sub>沍寒ノ時ト雖心必シモ厚  
衣重被ヲ用ヒス單衣ヲ以テ其身ヲ緊束レ風霜  
ヲ冒メ操作スル心終ニ其身ヲ傷フル<sub>1</sub>無シ

第六百八十一章

多血之說  
見第一而  
六章

○動脈拒妨心藏之血之關係液之過多者見前以其  
人多血若惡液質若躰中多有脂肪及其他凝液之  
值哥兒質易崩解者知之若靜脈起脹動脈之動  
洪大而數急則其徵益著

斯微旬日ノ凡<sub>1</sub>靜脈ヨリ吸納メ心室ニ輸シ来  
リ動脈ニ由テ全身ニ流流スル者ハ共ニコレヲ  
動脈ノ液トシ心藏ノカヲ以テ必ス驅進セザル  
可カラサルノ者トス故ニ總令良性ノ血ト雖心  
稍<sub>1</sub>過多ナル寸ハ輒<sub>1</sub>能ク心藏ヨリ搾出スル



血ヲ拒妨スルヲ甚シ若シ其血漸ク増息スル寸  
ハ竟ニ堪フ可カラサルニ至ルコレヲ多血病ト  
言フ第一百六○多血質ハ皮膚ノ赤色ト一身ノ  
多熱ナルト第一九章第五條ニ掲クル所ノ諸  
證トニ由テコレヲ知ル○多血質ノ人身解常ニ  
多熱ナル者ハ心藏ヨリ排出スル血ヲ拒妨スル  
者多メ心藏又コレニ抵激スルヲ甚シク血ト管  
ト相摩蕩スルヲ劇盛ナレハナリ且ツ血中ノ赤  
球随テ饒多ナルユヘニ其發スル所ノ温熱久シ

ク保持セラレ、ナリ第六百七十五

○多血質ト称スル者ハ唯ニ良血ノ過多ナル者  
ニメ若シ其血性不良ナル寸ハ其血量増加スト  
血氏コレヲ称ス多血質トスルヲ無シ第一百六  
ノ注ニ見ユ若シ良血渝変メ悪性ト為ル者諸脉ニ充  
盈メ諸器ノ機能ヲ妨碍スル寸ハ則チコレヲ称  
メ惡液質ノ人トス假令ハハ処女病ヲ患フル者  
ノ如キ重滞粘稠ノ液血管ニ充盈シ一身コレカ  
為メニ膨然トメ腫起シサシク筋力ヲ勞スルヲ

有ル寸ハ息チ氣息短促メ殆ント絶セントス然  
凡其躰中良性ノ血ハ甚タサレ○惡液質ノ人ハ  
右ノ如ク良血鮮サナリト虽凡其重滯粘稠ノ液  
管中ニ充盈スルカユヘニ心藏血ヲ出スノ操カ  
ヲ拒妨スルノ甚シキヲ知ル可キナリ

○平日脉管中ノ血ノ消化シ去ル者ハ悉ク躰  
外ニ漏泄シ去ルニハ非サルナリ其血中ヨリ分  
利メ変メ諸液トナリ諸器ノ内ニ滯留メ各々其  
用ヲ供ツ者甚タ多シ此ノ如ク諸器ニ滯留スル

ノ液或ハ久シク其用ニ供スル時無キ寸ハ漸次  
ニ堆積メ其諸器ニ満チ却テ其身ヲ重怠ナラシ  
ムルニ至ル假令ハ脂肪ノ如キ膏ニ一身ノ筋  
肉ヲ周匝スルノミナラス悉ク筋肉ノ纖維ノ  
間ニ尚錯メ其部ニ充實メ其部ノ屈伸動作ヲ便  
シ又コレヲ包裹シ防護スルヲ主トル若シ人  
日ニ適宜ノ動作ヲ為メ諸筋ヲ使用スル寸ハ右  
ノ如ク諸部ニ滯留セル脂肪各々其用ニ供シ了  
テ自ラ稀薄ノ質トナリ其部ニ循行セル静脈ノ

未損ヨリ吸収シ血中ニ混シ終ニ汗小便等ニ由  
テ餘外ニ漏泄ス若シ人平居安息怠惰絶ヘテ  
筋力ヲ勞セス却テ飽食恣飲ヲ事トスル寸ハコレ  
ニ由テ脂肪漸ク増息シ諸部ニ堆積メ其近圍  
ノ諸管ヲ強壓メ狭窄ナラシメ多ク血液ヲメ流利  
シ易カラサラシムルニ至ル故ニ身軀肥大ニメ  
却テ良血之少ナル人多シ此ノ如キ人ハ其身肥  
盛ナリト雖凡脈動細小ニメ靜脈起張セス若シ  
此ノ如キ人一旦強キ身兒贊ニ罹リ運行増盛ス

ル寸ハ其濕熱ニ由テ諸部ニ堆積セル脂肪一齊  
ニ崩潰溶解シ靜脈ノ末梢ヨリ入り血中ニ混シ  
脈絡暴ニ憤滿シ動モスレハ其管卒然トメ破裂  
シ溢液内部ニ滲流メ死スル者屢ニコレ有り故  
ニ第百八十七章ニ云ク身兒贊ノ發作ニ由テ  
靜止セル者ヲ解救ストコレヲ謂フナリ○故ニ  
多脂肪肥盈セル人劇盛ナル稽留熱ニ係リ治セサ  
ルトニ七日ナル寸ハ其脂肪漸ク半ハツ失スル  
ニ至ル其羸瘦スルトモ亦殊ニ甚レ○右ノ所説

ヲ熟讀スル寸ハ脂肪質ノ人若シ尋兒貨ニ罹ル  
寸ハ其初血管中ニ於テ幾多ノ液ヲ増加シ心藏  
ノ筋力ニ於テ幾多ノ拒妨ヲ添フルカ想見スヘ  
キナリ而メ其殊ニ難治ノ症ナリト後ノ第六百  
九十三章説ク所ニ由テ自ラ昭々ナリ

○脈管中ノ血液ノ過多ナル確徴ト為スヘキハ  
脈動ノ數急ニメ洪大ナルト靜脈管ノ大ニ起張  
セル者ト是ナリ若シ血質稠厚ニメ動脈ノ末梢  
ニ至テ多ク壅塞メ流利シ易キカラサル寸其

血實ニ甚タ饒多ナルニ非スト雖凡其脈動急疾  
ニメ又頗フル大ナリ然レ此症ニ在テハ靜脈起  
張セスメ却テ陷落ス是レ其血動脈ノ末梢壅  
塞スル者多キカユヘニ其靜脈ニ轉輸スルト甚  
タサク全身ノ血殆ント動脈ニ歸シ盡セハナリ  
故ニ脈動數急ナリト雖凡靜脈起張スルニ非サ  
レハ極メテ血液過多ノ候ト為ス可カラサルナリ  
全身ノ血ノ動脈ニ歸スルト熾盛熱ニ由テ死  
セル人ノ屍ヲ患解視メ屢々見ル所ナリ

此ニ及メ長病ヲ患フル人ニ在テハ其血殆ント  
静脈ニ歸ス是レ静脈ノ纖維ハ脆弱ニメ弛延シ  
易ケレハナリ然レ此症ニ在テモ亦血極メテ鮮  
少ナリ故ニ静脈起張スル者ト雖レ亦持リコレ  
ヲ以テ多血ノ徴ト為ス可カラサルナリ是ヲ以  
テ動靜二脈共ニ盈張メ而後其果メ多血ナルト  
ヲ察スルトヲ得可レトス○縱令ヒ脈中ヲ運行  
スル液増加スト雖レ尚平常ト一般ノ時限ノ間  
タニ平常ト一般ノ脈管ヲ運行スルカユヘニ其

運行必ス數急ナラサル可カラサルナリ故ニ其  
脈動モ必ス數急ナリ  
○血液尤モ過多ナルトハ脈管十分ニ充張レ縱  
マ、ニ收縮スルト能ハス且ツ管末鬱塞スルカ  
ユヘニ其運行スルトモ亦急疾ナラス故ニ脈動  
モ小遲ニシテ勢モ亦甚微ナリ此症ニ於テ医者  
動モスレハ其多血充盛ナルトヲ察スルトヲ得  
スメ治ヲ誤ル者多シセイデン公曾テ一少年ノ劇  
盛熱ニ罹ル者ヲ療ス其症肌膚ノ温煖甚々常

度ニ踰ユルヲ無ク脈動モ甚較著ナラス然ルニ  
患者困苦殊ニ甚シク將サニ昏絶セントス傍人共  
ニ哥兒贊ナルヲ信セスセイテンハム即チ意ヲ決  
メコレニ施スニ刺絡ヲ以テシ大ニ其血ヲ瀉ス  
此ニ於テ哥兒贊ノ勢憤然トメ劇奈シ其強猛  
ナルヲセイテンハム末々曾テ見サル所ト云フ次テ刺  
絡スルヲ竟ニ三四回ニ至リ病勢始メテ緩除セ  
ルヲ得タリ一 身五章九十章 蓋シ此ノ如キ症ハ  
多血ノ最モ甚シキ者ナリ而メ良工ニ在テハ是

ヲ診知スルヲ甚タ難カラサルナリ

身六章八十二章

○動脈拒妨心藏之血之曰係管之缺少者見身六

章百八宜就閉塞篇及創傷篇所說考之閉塞篇自身一

百二十四章創傷篇自身一百四

斯微旬曰ク血管缺少スルニ二種ノ因有リ其管

ノ閉塞スルト其創傷ヲ受クルト是ナリ租

凝ノ血球有テ動脈狹隘ノ処ニ壅塞スル寸ハ其

後ヘヨリ来ル者縦令ニ粗凝ナラサル者ト雖氏

亦此に至リ前行スルヲ能ハス頻リニ其部ヲ衝  
撞シ其壅塞スル者益々固シ而メ其壅塞セル  
処ヨリ静脈ノ末梢ニ連ル処ニ至ルマテノ血ハ早  
ク既ニ静脈ニ轉輸シ其間全ク空管ト為リ幹  
中ニ於テ動脈一技ヲ缺サスルニ同シ若シ諸部ノ  
動脈此ノ如ク壅塞スル者多キ寸ハ血液ノ道路  
漸ク缺サシ其血諸部ニ留滯シテ前行スルヲ能  
ス此ニ於テカ必ス其源流ヲ沮壓シ心藏血ヲ出  
スノ機能ヲ拒妨セサルヲ無シ○此理宜シク閉

塞篇説ク所ヲ熟讀メ考究スヘシ殊ニ第一二二  
十章ノ註ニ於テ論スル所ハ尤モ詳ナリ又第三  
百八十二章第八條ノ註説ク所ヲ見ル寸ハ燧衝  
病ニ於テモ亦此ノ如キ原因ニ由テ心藏ノ血ヲ  
拒妨スルヲ有ルヲ知ルヘキナリ○又創傷ニ由  
テ多ク脈管ヲ切断スル者モ亦必ス右ノ理ヲ以  
テ心藏ノ機能ヲ拒妨スルヲ有リ殊ニ外科術ニ  
在テハ一手若クハ一脚ヲ切断メ其病ヲ治スル  
ヲ有リコレ固ヨリ已ムヲ得サルノ術ナリ此

術ニ由テハ其部ニ循行スル血管悉ク有  
ト為ル其血液ニ於テ幾多ノ通路ヲ缺サスルカ  
知ル可カラサルナリ其コレニ由テ心藏ノ血ヲ拒  
妨スヘキヲ復タ異レムニ是ラストス故ニ此ノ  
如キ術ヲ行ヒ其病治愈スルノ後其人竟ニ多血  
質ト為ルヲ有リ第百七十四章ニ記スル所ハ  
参考スヘシ

二旁松院

伐ノ岐のともあり留いふ不れ活婦  
きし乃始たり兼代うのえび市

何かし  
庭の松と  
ろこそ  
う  
柄  
か  
け  
い  
ろ  
成  
なる  
こ  
ね  
や  
す  
し  
の  
ろ  
う  
ま  
ん  
あ  
ま

松  
い  
ま  
い  
の  
こ  
う  
と  
い  
は  
の  
や  
存  
れ  
松  
え  
い  
ろ  
や  
清  
み  
ぬ  
る  
か  
け  
を  
あ  
ん  
ま  
ん



毎朝 ちよきまきとくしやのたねを  
折花 ちよきまきとくしやのたねを

いさむしや折とけ

馬後りつ書 ちよきまき

梅子

*Faint bleed-through text from the reverse side of the page.*

