



41- 8013



諸疾病用沃實鳥謨治驗

尼那別爾氏ノ經驗ニメ第十年三百三十四葉

ニ出

沃實鳥謨ハ巴麗私拂郎察ノ都府ノ醫格鳥爾多乙私千

八百十三年初テ之ヲ發明ス爾來舍家密益精工

ヲ盡其製法愈全備ニ至ル

此元素ハ謝當健ノ如キ諸種ノ海草殊ニ扶屈私

敬失屈魯手私實艾苔私薩加里扭私律行私加爾

負艾涅鳥私繇蒲刺那刷鳥私菲負福爾密私等之

ヲ含ム又鳥爾華類海綿海水硫黃水坑水等ニ亦



此元素ヲ有ス○後世之ヲ検査シ尚鑛屬海獸モ
此元素ヲ有スル丁ヲ發明セリ
沃實鳥謨ハ酸素水素ニ親和シ酸ヲ生スルノ性
ヲ有ス○其酸ヲ生スルヤ水素ト親和スル丁甚
キヲ以テナリ此ヲ亜失儒謨^ド魯沃實^ド屈謨^ト
名ク○此物諸元素ニ飽合スルキハナキ中和塩
トナル其灰汁塩ニ飽和スルモノヲ^ド魯沃^ト達
和剝多斯及ヒ遭達ト名ク專ラ医薬ニ供ス○水
銀。亜鉛。鉄等ニ混和スルモノ各其主用アリ

海綿霜及諸海草灰ハ瘰癧病瘰下妨碍症腺病等
ニ屢効ヲナスヲ歴驗セリ此ニ由テ之ヲ觀レハ
沃實鳥謨ノ此病ニ効ヲナス丁原ヨリ昭スタリ
即チ其効幾耶塩ノ間歇熱ヲ治スルト同一般ナ
リ○私^ド微^ト是^ル爾^レ國^ニノ医^ト格^ト卯^ト特^ト多^トナル者チ八百十
八年及十九年ニ方テ初テ此藥ヲ試用シ其土最
モ多キ瘰癧ニ用テ愈其効ヲ確定セリ○格卯特
多氏其後之ヲ擴施シテ腺腫眼焮衝皮病等ニ用
ユ
其療法ニ由テ此劑ノ初効力悞リナキヲ知リ各

國速ニ之ニ慣ヒ多クノ病疾ニ用ルニ至ル是レ
新ニ稱養スル薬剤ニ於テハ皆十以ノ如キ事件
毎ニ多シトス

此劑ヲ要スル疾病効害ノ有無用法ノ差異及ヒ
其法則ヲ説示ス終リニ余カ經驗ヲ載セ此藥ノ
當否ヲ詳悉ス故ニ學家者流ニ於テハ將ニ之ヲ
瘵セサルベシ如何トナレハ此經驗ニ基キ尚後
世其効ヲ精確スルノ裨益タラシクテ庶幾ス
瘵瘵病気管腺ニ在テ外圍ノ蜂窠膜以區別尤モ
貴重ナルヲ以テ福爾默之ヲ詳ニ説明スルニ在

ナルモノハ毎ク沃實鳥謨ヲ以テ治スル丁英尼
里亜ノ滿遜氏確證ス其之ニ羅ルモノ百十六人
ヲ瘵セシニ七十二人ハ全ク治シ十人ハ著シク
輕怪ヲセリト肇按スルニ其又獨乙都ノ拾爾列
他ハ皆死セリ
氏ハ諸腫腺病ニ或ハ之ヲ單用シ或ハ水銀劑或
ハ強壯劑刺戟劑ニ互用シ効驗ヲ著ス撒蒲氏律
我兒氏等ノ諸家モ亦諸種ノ腺病ニ用テ効アル
テヲ説明セリ
關節ノ海綿腫一名關節
白腫多ク瘵瘵性ナルモノ或
ハ腺病ヲ兼撰スル者又福弗獨刷兒肇按スルニ頸
瘵ノ瘵

肇訊スル所ノ模ニ備効アルヲ格爾氏魯刷氏ノ
私多ク出ス
二家已ニ之ヲ論示セリ○羸瘦病腸間膜腺ノ豊
大ヲ兼ル者肺ノ結節腫及旁瘵ニモ効アリ拔龍
氏云ク此劑旁瘵ニ効ヲナスモノハ初期ニアリ
既ニ時期漸ク進ムモノニ於テハ未ダ其効ヲ見
ズト乳癌及ビ他ノ頑固腫瘍癌兒様ノ潰瘍ニ之
ヲ用ヒ全効ヲ養スル者アリ或ハ唯快復ニ赴ク
者アリ麻健實氏云ク舌上羯漏爾様ノ潰瘍經久
治セス既ニ病院ニ於テ不治トナシタル患婦ニ
人ニ沃實鳥護ヲ用テ全ク治セリ○亞別氏舌癌

腫々之ヲ用テ治シタル説ニ曰ク一男子齡三十
九歳舌及ヒ下顎腺ノ頑硬腫々羅リ其舌既ニ豊
大ニメ平塌ナラバ切截術ニ由テ此々タルカ如
シ且ツ言語嚥下共ニ困難灼カ如ク酷厲液流出
シテ休時ナシ仍テ左ノ如ク沃實鳥護ヲ内服セ
シム

沃實鳥護下幾

橙皮下幾

酒石葉液 各三匙

薄荷水 二分半

右調勻シ二葉七ヲ共ルヲ日々四次或ハ六次又
頑硬ナル腺ニ沃實鳥護軟膏ヲ擦入シ又二三日

ヲ過ルノ後左ノ合漱劑ヲ與フ

歌獨魯沃柀剝篤斯^{トス}西半^キ支

黑櫻実水^ニヲ

酒石葉液 玫瑰蜜^{各半}ヲ

右調勻シ合漱劑トス

○右ノ方法ニ由テ頑硬ト疼痛着シク減シ舌軟

ニノ運轉シ易ク遂ニ四週ニメ快復シ病院ヲ辞

ニ去ル

麻兒蒲爾^ル侶ノ医鳥^ル爾爾^ル蒲^ル滿^ル谷^ルハ歌獨魯沃柀剝篤

匪私半^キニ家猪脂一^ヲ半ヲ和メ軟膏ヲ製シ羯

屈兒様ノ潰瘍他薬ノ絶テ効ナキ症ニ亦之ヲ稱

用セリ○子宮硬結腫及ヒ拱護ノ羯屈爾既ニ一

次膀胱截刺術ヲ行ヒシモノニ注射シ大効ヲ奏

セリ

次刺梅毒ニ用テ効アルト上症ニ異ナラス○撒

児氏ハ五罩丸ノ經久頑腫々用テ之ヲ治セリト

○淋病便毒ニ備効ヲ稱スル人アリ

白帶下或ハ月経ノ過閉ニ用テ備効アリ又蒲列

刺君ハ瘀血殊ニ月経過閉ヲ合効スルモノニ稱

美セリ○水腫麻疹輪蟲皮膚潰瘍等ニ亦効アリ

當今健多氏痛風症ニ之ヲ稱用セリ○蜜爾氏ハ

肝脾ノ肥大ニ稱譽ニ加爾氏ハ遺尿病二人ニ之
ヲ用テ効驗ヲ表ハセリト云フ
上ニ舉タル諸病ト決實烏護ノ効カトヲ熟考シ
又煉熟シタル諸家ノ如ク之ヲ適當ニ行片ハ瘰
瘻腫ヲ治スルト固ヨリ疑ナシ○爰ニ其効カヲ
論ルトヲ休止シ其害アルトヲ論示セントス蓋
シ其心ヲ用ルトヲ忽ニメ大量ニ之ヲ用ル片ハ
諸家ノ説ノ如ク毒ニ害ヲナシニメ効アルト
絶テコレナシ
此劑ニ由テ起ル所ノ害ヲ防カント欲セハ某劑

ノ人身ニ効ヲ為ス如何ト某劑ノ為メニ究スル
頭症如何ヲ知ルニアリ
余意ニ此劑ノ効カニ道アリ(第一)少量ニ用ル片
ハ消化機ヲ憤起メ食氣ヲ進メ大量ナル片ハ他
ノ酷屬毒ト一般ノ害ヲナス(第二)血液ノ運行ヲ
進メ身体ノ溫暖ヲ増ス○水脈諸系ニ一種ノ刺
戟ヲ施シテ其運営ヲ進メテ吸収カヲ増進セシ
ム○此劑濫用スル片ハ其効著シク神至ニ及ヒ
下ニ照明スル諸惡症ヲ発現ス然レモ細心シテ
之ヲ用ル片ハ其某毒頗ル著シカラズ

○其量ヲ次第ニ増加シ持重スルキニハ之ヲ休ムヘキノ景況ヲ察ス格即氏此景況ヲ飽過ト名ク○其景況ハ頓絶スルニアラズ漸ク次實鳥謨ヲ持重シ自家ノ諸症顯シテ後始メテ之ヲ察スルモノナリ
此劑ヲ用テ自家ノ諸症ヲ察スルハ注意ノ直ニ後服ヲ止メ水銀劑ノ膜眩ニ於ルカ如ク病状ニ從テ之ヲ用ヘシ
某劑大量ニ過若クハ長服スルノ後發スル所ノ諸症第一道中ニ起ルモノト諸液中ニ吸收セラ

テ初テ起ルモノトノ區別アリ第一ノモノハ惡心嘔吐胃痛腸痛下利頑固ノ便秘ナリ第二ノ者ハ疾脈心悸動眩暈視力衰耗多ノ乾咳不寐全身ノ急羸瘦乳房萎縮腕力脚腫戰振等ナリ全ク用法ヲ誤ルモノハ死地ニ陥ルナリ
○次實鳥謨服用ニ由テ發シタル上ノ諸症ノ例ヲ揭示スルニ雜カテズ雖余躬ヲコレヲ為スニ至テ少ナキガ故ニ爰ニコレヲ畧シ其害ヲ防ギ發シタル諸症ヲ鎮靜スルノ某劑ヲ説示スルモノナリ

沃実鳥護ノ消毒法ト唯糊類ヲ桶用ス〇毛
氏云ク一少年沃実鳥護謾用ニ由テ劇シキ胃痛
ヲ発シ恐憂煩悶セリ此症沃実鳥護謾用ニ出ル
ヲ注意セス仍茶利ヲ持重スルニ由テ患者羸瘦
シ腹痛嘔吐劇シク遂ニ血便ヲ下シ諸種ノ瘵寧
ヲ發シ脉小ニメ緊且ツ甚數顔色黧澹萎悴セリ
之ヲ以テ阿芙蓉ヲ配シタル吉利詞多兒ヲ行フ
ト亟ニ其症輕快セズ故ニ鎮瘵煎劑ヲ胃部ニ施
シ浴湯ヲ行ヒ終リニ阿芙蓉ヲ内服セシメテ漸
大量ノ阿芙蓉ヲ持重シ快復ニ至ルノ爾後患者

胃ノ衰弱ヲ覺ニ食毎ニ大ニ用心ヲ加フ然レモ
沃実鳥護ノ効ニ由テ瘰癧腫ヲ免レ健康ニ復セ
リト又云ク沃実鳥護ニ由テ発スル所ノ諸症ニ
ハ温浴阿芙蓉粘滑茶ヲ用フト
格印氏ハ上ノ諸症ニ乳汁珠ニ驢馬乳微温浴阿
芙蓉其他鎮瘵諸茶ヲ称羨セリ〇私^ス僣^ク密^シ吐^ト氏ハ
瀕草鹿角精菲沃私矢^ス亜^ス繆^ス私^スヲ與フト云
大量ノ沃実鳥護自体ニ如何ヲナス上説ニ因
テ彰明ナク矣劑大量ヲ頓服胃膜ニ害ヲナス其
ハ粘滑茶乳汁其他緩和ノ諸茶ヲ適當トス若シ

所謂飽過^上印氏^ニ説^テリ格ヨリノ神至症ヲ発スル
者ハ上ニ奉タル神至劑ヲ要ス
諸家沃実烏護ヲ用ルノ法差異アリ左ニ列举ス
ル如キハ其確キタルモノナリ
格印氏ノ用法二種アリ即チ内服外用是ナリ其
外用トナスモノハ之ヲ摩入シ胃ノ妨害ヲ防ク
ヲ要ス○内服劑ニハ歌獨魯沃柁私剝篤亜私ヲ
餉水ニ溶シタルモノ或ハ其効力ヲ増サシカタ
メニ其溶劑ニ沃実烏護一二分ヲ加エタルモノ
或ハ其溶劑沃実烏護ヲ亜爾箇兒ニ溶シタルモノ

ノヲ用テ喻ヘハ左ノ如シ

〔内服劑〕

第一方 單溶劑

歌獨里屋剝篤亜私 四十八分

遂餉水 一升

右混和劑凡ソ沃実烏護三十六分ヲ含ム

第二方 復溶劑

此溶劑ハ前劑ニ再ヒ沃実烏護ヲ加フルモノナリ
蒲魯烏^ウ微^ル爾^ル私^シ太^タ兒^エ偃^ン氏^シハ左ノ如ク之ヲ製

ス

歌獨魯屋 剥篤亜私 羊棧

沃突鳥護 六氏

蒸餾水 一斗

右混和

第三方 丁幾五甬

沃突鳥護 四十八氏

再餽燒酒 一斗

右混和

○諸女溶利格印氏ハ大人ニ於テ千滴ツ、日々
三次與エ初週ノ終リニ至リテ五滴ヲ倍加ス收

トノ其力ヲ増シハ二十滴ニ至ルヲアリト虽大
量ヲ要スルハ稀ナリ○此溶利ヲ舍利別或少許
ノ砂糖ヲ加エタル水ニ混シ用フ又亜刺比亜護
護漿ニ加工用ヒテ尤モ良ナリ

外用劑

歌獨魯屋剥篤亜私 半棧

家猪脂 一斗半

右混和為軟膏搽突大ヲ取リ朝夕患部ニ摩入
ス○此劑法ハ冒ノ知覺過敏ナル者或ハ内服
ニ堪ハサレ者殊ニ緊要ナリ

蒲列刺氏ハ上ノ方法ノ外ニ一方ヲ製セリ即チ
 沃実鳥謨六氏ヲ硫酸亜的兒一匙ニ溶ニ用フ其
 溶劑十滴餘ニ耐ル者稀ナリ又沃実鳥謨半氏ヲ
 一凡トヤニ朝夕之ヲ用フ又沃実鳥謨半氏ヲ家
 猪脂一兩半ニ和シ軟膏トナセリ○此溶劑ハ梅
 毒ヲ兼タル腺病ニ備病効アリ
 ○薩印魯乙私地病院ノ医律我兒氏千八百二十
 七年八月十日ヨリ同二十八年九月三十一日ニ
 至ルマテ腺病百餘人ニ此劑ヲ用ヒ良効ヲ奏セ
 リ製法即チ左ノ如シ

内服劑

第一 蒸餾水一セ沃実 羊乳 素魯律兒 素実計ニ
 第二 蒸餾水一セ沃実 三分ノ素魯律兒 素実計ニ
 第三 蒸餾水一セ沃実 一氏素魯律兒 素実計ニ
 右調勻十二時間ニ用フ○第一法ヲ常ニ用ヒ二
 ケ月前ニ第二法ヲ用フルヲ稀ナリ第三法ニ至
 テハ患者悉ク悪スルヲアラス殊ニ又其量ヲ増
 加スルヲ絶テ之アルヲナシ
 外用劑トシ縷官瘍ニ注射シ或ハ眼劑前ニ用フ
 ルハ左ノ如ク溶解ニ供用ス

第一 韶水 一 切 沃実 二 凡

第二 同 同 三 凡

第三 同 同 四 凡

頑固腫々摩入ニ或ハ潰瘍ニ敷スルニハ左ノ膏ヲ良トス

八 第一 家猪脂 二 切 沃實 剥篤亜私 四 凡

沃実 四 凡

八 第二 家猪脂 二 切 沃実 剥篤亜私 五 凡 沃実 十四 凡

第三 同 同 同 同 十六 凡

右混和膏ト十ニ摩入法外敷共ニ十二時ノ間ニ

一次行フ

沃実鳥謨製劑ハ上ニ揭示スル分量ヲ以テ確定スルカ故ニ余爰ニ多言ヲ贅セズ然レモ漸ク増量倍加スルニマテサレハ的効ヲ奏スル下註ハサルト云者アルヲ以テ再々默ニテ言サルトヲ得サルトナリ○余驗スル所ノ一病人アリ歇度魯沃朮私剥篤亜私ト幾ヨ三十滴ヲ服セシメホダ効アラサルヲ以テ漸ク増量ノ六十滴ヨリ其餘ニ至ル日々三次與テルニ惡症少シモ瘳セザル者アリ

余カ思考スル所ト衆医ノ説ト全ク差異アル
十三麻建^サ實^ダ氏ハ歌度魯沃枹私剝烏^サ私滯解^サ劑
ヲ毎日三錢ヲ用ヒン^トヲ說明シ特律^サ劑^サ爾氏ハ
一婦人乳癌ニ沃實烏護ヲ日セ三八ヨリ三十氏
マテ增量シニケ月ノ間ニ一十九氏マテ與
殊ニ三十氏ツ、八日間持重セシト虫氏飽過^シ
云ノ徵少モ顯ハレスト云フ
沃實烏護効カヲ現^ステ屢晚キカ故ニ數週數月
持重スルノ後始メテニ三日間之ヲ体止スヘキ
症ヲ發現ス○然ルニ格印特多氏ハ歌土魯沃枹

私剝烏^サ私滯劑^サ一男子ニ十滴ツ、日ニ三次
與ヘシニ五日ニノ既ニ効カヲ現^スハス者ヲ見ル
ト云フ
是ニ由テ之ヲ觀レハ人々感應機ノ異ナルニ由
テ茶劑ノ効カモ又差ヒアル^ト明ナリ故ニ其劑
ヲ用ニト欲セハ其効ヲ障礙スル諸事ニ注意シ
又患者ノ年齡性質兩儀等ノミナラス尚之ヲ用
ヒ難キ他病ノ合併ヲ第一ニ驅除スル^トヲ整ム
ヘシ其劑ヲ整止スヘキ諸症左ニ列奉スルカ如
シ

妊婦子宮出血ノ素因アル者胸痛ノ恐アルモノ
或ハ既ニ之ニ羅ル者消削病遷延抵骸格薄弱神
經性或ハ衰弱甚シキモノ皆之ニ屬ス○其劑ヲ
瘰癧ニ用ヒント欲セハ病管腺ニアリテ疼ナク
周縁ノ蜂窠質ニ在ラサルモノヲ撰ム可シ杖歌
蘭土氏ノ説ニ從フニ瘰癧腫疼アリテ脈管系
該ノ刺衝機高進ヲ兼ヌルモノハ其劑却テ害ア
リト云フ○余沃実鳥謨ノ説ヲ上ニ奉ケタル如
ク其劑收トシテ害ヲ免スルヲ明カナルヲ以テ
尙細心ニテ法則ヲ確定スルヲ贅言ナラズトス

沃実鳥謨ノ的症アリト云レ日々ニ診スルヲ能
ナルノ患者ハ必ラス之ヲ用ルヲナカレ○病
々ニ因リ日ニ診察ヲ要セザルモノアリト云レ
急テ診察ヲ延ス勿レ○既ニ茶劑ヲ與ル者ハ每
ニ沃実鳥謨ヨリ絶スル傍症ニ注意シ若シ飽
過ナルモノハ遷ニ後服ヲ止ムヘシ○余禁法ニ
説示スルノ事件殊ニ妊婦ニ在テハ細心ノ之ヲ
用ルヲ緊要トス○壯壞ニ在テハ極メテ已ムヲ
得サレニアラサレハ之ヲ用ルヲ禁止ス杖歌
蘭土氏ノ例ヲ左ニ掲示スル如ク沃実鳥謨ハ乳

房ヲ萎萃セシムルヲアルヲ以テナリ
扶歌蘭士氏云ク一女子二十歳体拾恰好瘰癧腫
ニ罹ルヲ以テ之ヲ消散セシメシカ為メニ沃実
下莖ヲ持重ムルヲ凡ソ六ヶ月ニシテ其症治スト
虫氏乳房萎萃ス○菜劑ヲ止シテ腹セスト虫氏
乳房日々ニ縮少シ二年ヲ過ルノ後乳腺少シモ
跡ナキニ至ル
女子沃利ヲ要スル片ハ歌士魯沃托私劑寫私ニ由
テ用ルニ優レリトス聖幾氏ハ劣劑寫私ニ由
テ乳房ヲ萎縮セルモノヲ驗セスト云フ

諸名哲沃実鳥謨ノ効害ヲ概論セシニ由テ余カ
実験ニ益アリ患者ヲ強健ニ復セシモノナリ毎ニ
大幸ナリトス下ニ其実験ヲ揚テ同志ニ示ス
ナリ

經驗第一

一業爾德爾蘭士洞ノ軍卒拔聯土漢特兒蒲ナル
者齡三十四歳身体強康ニメ胆液質少乾已表輕
易ノ兒病ニ罹ルノ外健康ニシテ病ム所ナシ○
其父ハ屢腺病ニ罹リ終ニ之カ為メニ早ク卒シ
母ハ未タ健康ナリ○十八百十四年拔聯土二十

歳ニノ騎馬兵ニ從シ翌年ニ至ルマテ徒康ナリ
シニ府松多里低多純ノ陣營ニ於テ黃疸ヲ患ヒ
其後三日熱ニ羅レリト云フ

間歇熱治スル後脾臟豊大硬結シ疼痛ナシトイ
エ凡次第ニ肥大リシテ少服ニ延暢シ腸骨上ニ
及ベリ○子八百二十六年列旬純ニ移リシ後劇
シキ吐血病ニ罹リ夥シク黒物ヲ吐出シ大ニ衰
弱ノ將ニ死ニ瀕セリ○同年他ノ軍卒俱ニ特仙
控見ノ陣營ニ入り漸ク前ノ疾患ヲ免ル然ルニ
其年ノ暮ニ及シテ不潔ノ房事ヲ行ヒ包皮ニ潰

運轉自由ナラス患者熱状ヲ覺エズ

此病痛風性ノ梅毒ナルヲ以テ直チニ水銀劑ヲ
要スヘシト虫尾既ニ用タル水銀劑如何ナル者
タルヲ知サルカ故ニ之ヲ與ルテ適當ナラスト
ス○是ヲ以テ斷提質安産ノ的列並硫黃花ノ膏
ヲ製シ關節ノ病処ニ貼ス此劑ハ斯ノ如キ症ニ
用テ屢良効ヲ奏セシモノナリ
○又日々ニ温浴ヲ施シ左ノ劑ヲ内服セシム

雙蘭菊越幾私一カ

安貨没扭酒一カ

右混和シ日ニ三次二十滴ツ、與ヘ漸ク増量ニ

至ル

○三月六日ニ至ルマテ輕快ヲ覺ニス患者若痛
スルヲ以テ余水銀劑ヲ試用セシテ決スルニ
至ル○温浴法關節ノ膏藥ヲ持重ニ每宵抱歌爾
私散ヲ一二丸ヲ飲服セシム○此症ニ丹朮屢備
効ヲ奏スルヲ驗スルカ故ニ獨^ド宋^{ソウ}實^{ジツ}ノ法ニ從ヒ
今日四丸ヲ服セシメ其他ノ方法ヲ兼行フ
○同八日六丸ヲ與ルニ皆吐出ス同十日又六丸
ヲ與ヘ後阿芙蓉ヲ服セシムルニ患者之ニ耐ル
下能ハス故ニ此方ヲ止メテ與ヘズ

瘍ヲ發シ續テ便毒ヲ患フ○三四週間治療ヲ加
エ疾全ク消散スルニ似タリ然ルニ數日ヲ過ク
ルノ後間骨痛ト全自僂疒負私痛トヲ兼發シ身
体強直トナルト甚タレク殆ニド動揺スルヲ能
ハサルニ至ル○諸種有カノ藥劑ヲ服スレテ皆
効ナク遂ニ其役ヲ辭シ千八百二十七年五月ニ
至リ軍卒象會ノ処ニ遷サル○其疼痛數日間耐
エ易キニ以レテ翌年ニ至リ骨痛漸次ニ増劇シ
其僂疒負私痛々風状ニ變シ諸關節殊ニ左膝ト
左豆ノ關節太ク腫脹セリ○水銀ノノ丸劑藥水

煎ヲ内服セシメノ水銀膏ヲ脛骨ニ摩入シ芫菁膏
 ヲ關節ニ貼シ又足ノ外踝ニ灸治ヲ行フ等ハ六
 六月ニ至レトモ已前ノ如ク効ヲ現サス
 ○病状此ノ如クナルヲ以テ千八百二十八年二
 月二十八日ニ至リ我カ羅寧健^カニ病院ニ来ル同
 三月朔日余之ヲ診スルニ諸症左ニ述ルカ如シ
 ○諸關節腫脹疼痛シテ彈カマリ殊ニ左足膝ノ
 節劇シク腫痛シ既ニ骨部ニ及然レモ手臂部劇
 シカラズ○右ノ外踝灸治ヲ行ヒシ処圓キ潰瘍
 ヲ發シ種々手ヲ觸ルニモ疼痛堪ヘ難ク自然ノ

○同十三日某木煎ヲ與ヘ温浴法ヲ施シ左ノ丸
 某ヲ服セシム

愈瘡木脂 一匁
 金硫黃 其永 各十二匁

雙蘭菊越幾斯 八匁
 竜胆 十二匁

蜀羊泉越幾斯 適宜

右調停ノ六十九丸ト為耳中ヲ衣トシ五九ツ、與フ
 ル下日々三次

○同二十五日ニ至ルニテ前法ヲ持重ニ唯劑中
 耳永双蘭菊越幾私四匁ヲ増加ス

○四月二日 病態大凡ノ前ニ異ナラス唯關節

ノ腫痛少く減シ灸治ヨリ發シタル潰瘍治スル
ノミ○其永ニハ双蘭菊越歳私三氏ヲ増加ス治
湯ヲ日々行ハス二日或ハ三日毎ニ之ヲ行フ
同十三日凡刺中尾刺負屋刺越歳私二月ヲ加エ
同十七日ニ至リ増量ノ三月ヲ加フ○同二十四
日前ノ煎液ニ代リテ左葉ヲ與フ
瑞香皮 半キ 撒爾薩根 愈瘡木
薩撒弗刺私 各一ツ 丹草 三毛
右水適宜ヲ以テ煮テ二封度口取り二日ニ與フ
○五月二日 今日ニ至ルマテ病輕ク快ヲ現ル

ハ故ニ關節腫痛ノ部ニ蟻嘔ヲ置キ左ノ方ヲ與
フ

列弗爾答刺安 四ツ

右一匙ツ、飲マシムル一日ニ三次○胃ノ運営
ヲ障礙セサルタメニ前葉ヲ服スル後薄荷水一
匙ヲ飲マシム患者以茶ニ耐ルヲ以テ六月十回
月迄持重ニ用フ
○五月十九日 膝骨腫張甚シキヲ以テ家猪脂
吐酒石ノ軟膏ヲ摩入セシムルニ疼痛少シク發
起シ其腫稍軟トナレリ

○六月十四日 列弗爾答刺安ヲ六週間持重ス
レ其効著シカラサルヲ以テ之ニ代テ復タ左
ノ丸ヲ與フ。双蘭菊越幾十九 蜀羊泉越幾私適宜
癒瘡木脂一錢 金硫黃 竜腦各十二分

右調停メ六十九ト十ニ五丸ツ、服スル日ニ
三次

○七月十日 病状少モ變セス却テ關節ノ腫張
日々増進ス是ヲ以テ某劑ヲ左ノ如ク轉シ與フ
癒瘡木脂 硫肝各一錢 双蘭菊越幾私計ニ
蜀羊泉越幾私適宜

右調勻六十九ト十ニ五丸ツ、與フル日ニ三
次
又

私百幾理偃訥兒 蘇木一 羊子 杜松子一

右水適宜ヲ以テ煎メ二封度ヲ取り二日ニ飲シ
ム○其方法ニ煎テ人エノ硫黃浴ヲ行ハシム
○二十七日 種々ノ方法ヲ行ストモ其効驗十
ク唯腕ノ疼痛減退メ運動ニ易シ膝且關節腫通
依然タリ○今日マテ試用ニタル某劑皆効十キ
ヨ以テ痛風ノ偉効アル決実烏護ヲ用ニテ判

決ス處方左ニ依ル

歌獨魯沃柁私剝寫面私 一錢 家猪脂 一錢

右混和メ軟膏トナス痛處ニ摩入スルヲ日ニ二
次

此膏ヲ入スルヲ二三日ニメ皮膚赤色疼痛ニ
之ヲ休止スルニ至ル

○八月六日 上肢ノ疼痛頗ル消散ス○前ノ丸
茶中硫肝一刃双蘭菊越幾私六ハヲ增加ニ與フ

○同十一日 膏ヲ入スルノ關節赤色疼痛甚
ニキヲ以テ休メテ行ハス菲沃私葉芻葵葉ニ亞

麻仁ノ蒸刺ヲ行フヲ二三日○患者ノ極膏ニ耐
ナルヲ以テ沃實烏護ヲ内服セラルヲ決シ
關節ヲ蠟布ニテ包裹シ諸葉ヲ休止シ月ノ十五
日ヨリ左ノ法ヲ處ス

歌獨魯剝寫面私 半錢 沃實 六分
再餉火酒 一錢

右混和シ亞刺比亞護謨漿半椀ニ十滴ツ、和シ
與フルヲ日々三次

○同二十五日患部ノ疼痛尚少シク減ジ右膝ノ
ノ腫脹最モ甚シク液ノ波動ヲ覺フ○是レヲ以

テ膝下ニ打膿法ヲ施シ前液ニ倍加ノ十五滴ニ至ル
○九月四日 前劑ノ量ヲ増メ二十滴ニ至ル是ヨリメ疼痛微シク減退スルヲ以テ月ノ十日ヨリ尚増量メ二十五滴ヅ、日ニ三次與フ○
汝眩已來腫脹益減退ス今ヤ沃実烏護ノ効ニ由テ脾ノ硬結腫大減スルヲ探索スルニ其腫半ハ
コ減セリ茶劑ノ眩眩少シモ之十キヲ以テ月ノ十七日至リ三十滴ヲ一晷ニ服セシム
○十月二日 關節ノ腫痛日々ニ減スルヲ以テ尚五滴ヲ増加ス今日ヨリ諸症益退散シテ容貌

華麗トナル

○十三日 某液ヲ服スルノ後胃中不和ヲ覺フルヲ訴フ故ニ其量ヲ二十滴ニ減シ火化ニキヲ持重ス○患者ヲ仔細ニ検査スルニ關節ノ腫痛全ク退キ脾ノ腫大ナル者亦全ク手ニ觸レス
○歌獨魯劑ヲ私下幾始メヨリ用ケル処ノ量ヲ概算スルニ六斗ニ至ル

○同廿六日 患者健康ニ復シ病院ヲ辭シ去ル
經驗第二

一男爾ナル者齡四十歳体格強健凡ソ一年ノ間

鼠蹊ノ腫脹硬結ニ罹ル其説ノ所ヲ聞クニ其腫
梅毒傳染ヨリ来ルニマラスト○適當ノ療法ヲ
精油ニ行フト虫氏治セズ遂ニ潰瘍状ニ變レ縷
管數箇ヲ遺セリ○千八百二十八年九月余ニ治
療ヲ乞フ之ヲ診スルニ諸症左件ノ如シ
兩鼠蹊腺頑固量大トナリ皮其硬種ニ穿着シ彼
次ノ部焮衝セリ且ツ兩鼠蹊トモ廣キ瘡根アリ
テ頑固ナリ皮下及ヒ腺体中ナリ縷管アリテ
管軟ニメ水様ノ液ヲ出ス
○水銀利金硫黃其他解凝劑ヲ内外用フト虫氏

皆知ナシ○是ヲ以テ余歐獨魯劑馬亞斯膏ヲ法
ノ如ク毎日二次テ入セシニ一二日ヲ過テ赤色
痛疼起ルニ故ニ之ヲ休メ緩和ノ温瑟布ヲ行フ
ニ至ル○其焮衝諸症鎮靜スルノ後鼠蹊腺ヲ探
索スルニ其腺軟ニメ且ツ小ナリ○焮衝症起
スルマテ前膏ヲ持重メテ入レ焮衝起スル片
ハ之ヲ休メテ緩和瑟布ヲ敷シ又赤色疼痛退ク
片ハ又前膏ヲテ入セリ此方法ヲ行フト六週ニ
テ硬結腫消散スルノミナラス縷管モ亦全治ニ
至レリ

經驗第三

一婦人偃偃ナルモノ齡二十六七歳少收ヨリ常ニ健康ナリ然ルニ千八百二十六年卧兒寧硬ニ於テ流行病ニ罹リ其後間歇熱ヲ患ルノ尚久シキ八百三十二年二月頰額ノ頑硬腫ニ罹リ余ニ治ヲ乞フ其腫既ニ三箇月ヲ經遂ニ豊大トナレリ○之ヲ診スルニ其頑硬腫左ノ口隅ヲ去ルノ僅ニメ大サ黎豆ノ如ク且ツ口内ヲ臨ムニ靜腫其腫ヲ纏絡ス之ヲ午ヲ綱ルニモ疼痛ヲ発セス○歌獨魯沃枹私剥萬亜和膏ヲ内外ニ入スル

七日ニ二次ニノ頑硬大ニ減シ一月ヲ出ツノ全ク消散シ少ニ蹤跡ヲ遺スナシ

經驗第四

一余カ小兒的屋抱ル者齡六歳千八百二十六年ニ至ルニ常ニ健康ナリ然ルニ我羅寧健ニ於テ昔輩ト俱ニ流行病ニ罹リ以來三日熱ヲ患フルノ已ニ久シ其熱治スルニ屢々再發ニ遂ニ脾臟腫大硬結ニテ外部ヨリ明ニ之ヲ知ル○千八百二十九年ニ至リ下頰腺刻ク腫脹硬結ス○是ヲ以テ余沃寔烏護ヲ用ルノヲ判決シ歌獨

魯刺馬私沃ヨキヨキ刺多下幾トヲ二滴ツ、日ニ三次共
ニ漸ク増加メハ滴ツハニ至ル〇之ヲ用フルノ
際ニ熱ノ發作ヲ減却シ腺腫消散ニ脾臟ノ硬結
ニ亦着ク減消シ時トメ熱ノ發作全ク体ムト虫
氏少シク撰生ヲ禁レハ又後テ再發シ〇五日初
ニ至リ下顎腺硬結腫退キ脾臟過半減少ス熱微
少ナリト虫三日毎ニ發作アリ是ヲ以テ同五日
ニ方テ硬酸規扭程ヲ用シニ凡天ヲ胃ニ食ヲ貪
ルト虫其熱全ク退再ニ發作セム〇脾臟殘遺ノ
硬結漸ク以テ全ク消除ス次ヲ以テ之ヲ觀ルニ

沃實馬護ハ他茶効ナキ病ヲ全治ニ至ラシムル
切實ナルモノナリ

經驗第五

一男子弗ナル者淋病ノ治療ヲ怠リ尿道陰囊ノ
前部ニ方テ積實大ナル結腫ヲ發シ疼痛劇ク粘
液夥ク流出シ且ツ毎ニ小便崩アリ多ク苦悩ス
〇千八百二十九年八月十九日未諸茶ヲ試用ス
レニ皆効ナシ是ヲ以テ十一月二十九日ニ至リ
前ノ下幾刺ヲ與フルト十一月ニ頑固腫消散
シ粘液ノ流出大ニ減少シ其後漸時ヲ経テ健康

二復ス

經驗第六

一 臥思羅寧硬分八隊ノ歩卒蒲蒲ナル者齡二十
 一 歳體格中等ニシテ多血質少時ヨリ重キ病ニ罹
 リテ嘗テ無シ然ルニ千八百二十五年三日熱ニ
 罹リ一年ヲ経テ快復ス○其後充瘡ヲ傳深シキ
 八百二十八年軍事ニ役シテ其病院ニ歸シ全治
 ス○又翌年九月麻疹ヲ患ト虫速ニ治セリ○同
 年十一月二十八日ニ方テ不意劇甚ノ吐血ヲ發
 シ大便ニ多ク血ヲ下スト虫病院ニ治ヲ乞幸ニ

治ス○脾臟膨張スルヲ甚ク脈緊ニシテ實ナリ刺
 絡ヲ行ヒ三二日間後下劑ヲ與レハ血様ノ物夥
 ク通セリ○刺絡後吐血再發セシト虫脾ノ腫張
 硬結甚ク外部ニ觸テ之ヲ知ル○之ヲ消散セシ
 メンテ方策リ同年十月六日前ノ下劑劑ヲ十滴
 ヲ重刺比血漿ニ和シ日ニ三次服セシム○月ノ
 十六日至リ十五滴ニ増加シ二十六日二十五滴
 ヲ一頓ニ服セシム○翌年正月三日二十五滴同
 十五日ニ三十滴同十四日三十五滴ニ増量シ二
 月八日ヲテ持重ニ與フ○之ヲ用フルノ際ニ脾

臟ノ硬結漸ク消散ニ面色灰白膨張ナルモノ常ニ変シ全ク健康ニ復シ月ノ十日病院ヲ辞去ル

經驗第七

微木^シ先^シ謨^地第八隊ノ歩卒布^ブ番^ルナル者齡三十二歳瘰癧質屢^レ廣^ク貧私性ノ腸助痛ニ罹^リ又慢性屢^ク貧私ニ冒^ル十月二十六日我羅寧健ノ病院ニ詣^ルル^ル病治スルヤ否ヤ左ノ頸腺兩鼠蹊腺甚ク腫張セリ然^レ死疼痛ナシ十一月二十六日歇獨魯^魯刺^馬斯私膏ヲ腺上ニ擦入セシムル七日ニ二次^ノ之ニ由^テ鼠蹊腺腫張速ニ分解ス

然^レ此頸ノ腺腫消散セス故ニ沃實鳥^鳥謨^ノ内服セシメシ^テヲ策^リ千八百三十年正月十七日ヨリ歇獨魯^魯刺^馬私沃^魯刺^多下^幾十五滴ヨリニ三次與^フ之ヨリ增量スル^テ二十滴餘ニ至^{ラス}三月朔日病治メ病院ヲ去ル

經驗第八

第八隊ノ歩卒係ナル者體格強剛ニメ多血質ナル梅毒潰瘍及^テ便毒膿潰ニ罹^リ千八百二十九年七月二十六日我羅寧健ノ病院ニ治ヲ乞^フ○便毒ノ膿潰ヲ促^{サシ}テ^テヲ求^メ丹^水ヲ内服セ

シム然ルニ六七日ヲ過クルノ後齒齦疼痛ヲ覺
スルニ由テ之ヲ休ク用ヒス

○八月十八日便毒惡性ノ潰瘍ニ変スルヲ以テ
再ニ身衣ヲ用ルヲ要ス但シ齒齦ノ感動ヲ防ク
カ為ニ金硫黃配伍ス

○九月三日包皮ノ潰瘍治スレバ鼠蹊ヲ部日ニ
延暢シ益惡性トナリ癌腫状ヲ為ス○水銀劑ヲ
用レバ潰瘍斯ノ如ク増進スルニ由テ後服ヲ止
メ菜水煎ニ硝石酸ヲ配シ與フ然レバ此劑モ亦
効ナク潰瘍巨々大々ナリ鼠蹊ヲ下リ陰囊ヲ過

ト肛門ニ及フ又潰瘍ノ外圍ニ新ニ發見スル者
其ト合セズメ摺立ニ或ハ相合ノ形ヲ変シ癌腫
状ヲナスモノナリ

○今日マテ用タル内外ノ菜劑快候ヲ現ガス且
ツ患者服スル所ノ水銀多量ナラサルヲ以テ十
月九日ニ至リ碩學獨寔案ノ法ニ習ヒ獨取丸ヲ
服セシム○猛系十八日ヲ用ルニ當テ法ノ如ク
齒齦腫脹シ始ムト魚潰瘍少モ變化セス是ヲ以
テ決實烏護ヲ用ルヲ決シ經驗第一ニ攀タル
下幾劑十滴ヲ日ニ三次服セシメ歇獨魯沃劑焉

亜私溶劑ヲ潰瘍ニ敷ス○一二日ヲ過ルノ後某
劑既ニ良効ヲ奏ス其外敷劑乾燥スルハ疼痛
ヲ起スニ由テ之ニ代テ歌柯魯剝馬軟膏ヲ貼ス
○丁幾劑八日毎ニ五滴ヲ増加シ遂ニ一次ノ量
三十五滴ニ至ル此療法ヲ行リ一月ニメ病治シ
容貌華麗トナル然レモ患者夜中屢病院ヲ出ル
等ニ由テ治療ヲ怠リ四月ニ至テ全ク健康ニ復
ス○三月十九日初メテ飽和ノ微候現レ殊ニ胃
痛惡心ヲ發故ニ後服ヲ休メ唯膏茶ノミヲ持重
セリ

○患者丁幾劑ヲ用ル丁十一号半ヲ至ルマテ之
カ為ニ少シモ惡症ヲ發セス又羸瘦スルヲナク
潰瘍癒着シ唯僅々タル潰瘍状ヲ遺スノミ

經驗第九

騎兵第八隊ノ歩卒格爾涅里私ナル者齡二十五
歳體格中等今八百二十九年五月軍事ニ役セラ
ル○是ヨリ以前慢性ノ傷ヲ負私及ヒ皮膚病ニ
罹リ然レモ其軍役ニ由自ラ治セリ○同年五月
四日左リ鼠蹊腺ニ輕腫ヲ發スルニ由テ病院ニ
歸ス○之ヲ診スルニ龜頭及包皮ニ潰瘍ノ跡ヲ

ニ又患者ノ説ク所ヲ聽クニ梅毒ニ感スルノ必
メニト云フ是ヲ以テ草法ニテ腺腫ヲ分鮮セシ
テヲ謀ル然ルニ常ノ効ナク遂ニ膿潰ニ変シ水
銀ヲ用テ健康ニ復シ年ノ八月始テ健康ニ復シ
病院ヲ辞ス

○然ルニ又鱗屑状ノ輪患ニ胃サレ上唇ノミナ
ラス鼻ノ内外ニ延満ニ其周囲赤色腫張スルヲ
以テ十月三日再ニ病院ニ來ル○患者梅毒ニ罹
リシヲナク偽ルカ故ニ之ヲ詳ニスルヲ能ハス
ト虫病目ヲ之ニ歸シ諸種ノ汞劑又獨來兀突ヲ

用ト雖ニ皆効ナシ

○千八百三十年二月三日療法ヲ轉シ沈実烏護
ヲ用テ即チ散獨魯沃他私剝寫亜私丁幾ヲ内服
セシメ又其膏ヲ外用ス其丁幾利ハ初メ十滴ヲ
三次毎ニ次第ニ増量シ四日ニ至テハ三十五滴
ツリテ服セシム是ニ由テ唇鼻ノ疹消散ス然レ
ニ其疹再ニ立頬ニ發ス次疹モ亦頸ノ髮部福帛
獨劑爾ヲ發スルニ由テ速ニ消散セリ○膏茶及
内服劑ヲ持重ニ遂ニ増量シテ五十滴マテ日ニ
三次用ヒシニ由テ六月朔日ニ至リテハ患者健

全ニ復シ病院ヲ辞去

以患者斯ノ如ク丁幾劑ヲ大量ニ久服スルト虫
少ニ惡症ヲ發セズ且ツ羸瘦ヲ現サズ

經驗第十

弗即私目騎兵第八隊ノ歩卒傑爾里多沃烏微私
十ル者齡十九歳身体強健糖様ノ輪蟲ヲ西聘ニ
發シ千八百三十年五月十六日病院ニ歸ス○余
内外ノ諸菜ヲ與レテ皆効ナシ故ニ四月七日敬
獨魯副官亞私膏ヲ日ニ二次擦入セシ二月ノ二
十一日ニ至リ其皮膚常ニ復シ病院ヲ辞ス

經驗第十一

我羅寧健ノ騎兵第八隊ノ歩卒扁特里幾乙蒲十
ルモノ齡二十一歳體格強硬便毒及ヒ陰莖ニ梅
毒ヲ發シ千八百三十年三月二十五日病院ニ歸
ス○患者胸膜炊衝ヲ兼發スルニ由テ初メ刺浴
ヲ施シ防炊劑ヲ與ヘ以症治スル後耳赤ヲ用フ
○其便毒始メ消散スルニ似タレテ遂ニ膿入ル
ヲ以テ五月二十二日刀ヲ以テ之ヲ破開ス○水
銀劑ヲ與ルテ多量ニメ齒齦腐乱ニ至レテ便毒
治癒セズ却テ甬蹊腺腫張硬結シ其内縷管種々

ニ通セリ又咽喉冒サレ巴旦杏腺腫張潰ス○再
ニ水銀劑ヲ用フルト適當ナラサルヲ以テ沃突
烏護ヲ試用セシテ判決シ同年六月十四日沃
突烏護下幾去痛五滴ヲ日ニ三次與ヘ漸ク増量
ノ十五滴ニ至ル又便毒硬結ノ部ニ散獨魯劑ヲ
亜私膏ヲ擦入ス○七月十二日ニ至リ患者胃痛
ヲ覺ルヲ訶ルニ由テ丁幾劑ノ量ヲ減シ十滴ヲ
、與フ然レモ尙未ダ胃痛ヲ發ス○決ノ如ク胃
痛ヲ發スル者ハ所謂飽過ナルトナ思フカ故ニ
全ク後服ヲ止ム○咽喉内ノ潰瘍ハ三四日已前

既ニ全治シ便毒ノ周回ノ便毒少シク増進シ管
孔頗ル愈着セリ○ナ擦劑ヲ持重玉ルニ由テ八
月朔日ニ至リ病全ク治シ家ニ歸ル

經驗第十三

我羅寧健ノ騎兵第ハ隊ノ歩卒歇爾ナ紐松屋十
ル者齡二十八歳體格強康十八百三十年梅毒ニ
罹リ肛門濁大ナル瘻肉状ノモノヲ發シ酷厲液
流出スルヲ夥シク六月二十日病院ニ歸ス○沃
突烏護ハ梅毒ニ搦奪アルヲ以テ殊症ノ如キモ
必ス効アリニテ謀ク左ノ丸ヲ與フ

沃実鳥護 六丸

巫刺比巫護護末

白糖 各十二丸

罌粟舍利別造宜

右調停十二丸トシ一粒ツ、共ル一日ニ三次

○八日毎ニ刺中沃実鳥護一丸ヲ増加シ與ヘ煎
テ茶木煎一切ヲ日々飲シム古ノ方法ヲ行フ
八日若クハ十日ノ後息肉状ノモノ半ハヲ減シ
酷后液ノ流出過止セリ○七月二十日月ノ十四
日已來息肉減少セヌ大便ノ通利漸少スルノ外
变化アルナシ○今ニ至ルマテ少モ外用法ヲ
行ハサレヲ以テ沃実鳥護溶劑ヲ以テ洗濯スル

トヲ始ム然レハ少モ効カヲ現サス○月ノ下院
ニ至リ大便通利ニ當テ劇痛ヲ發シ殊ニ顔色慘
騰羸瘦スルヲ以テ速ニ沃実鳥護ヲ止メテ用ヒ
ス二三日後和劑ヲ與フ後ナ得宋實丸ヲ與ヒテ
以テ全治ヲ策ル

經驗第十三

我羅寧健ノ騎兵第八隊ノ鼓士齡二十二歳陰莖
ニ大小瘰肉状ノモノヲ發ス余前章ノ如ク沃実
鳥護ヲ内外試用ス六月二十二日ヨリ七月下院
ニ至ルマテ沃実鳥護八十一丸ヲ用フト虫少モ

健康ヲ害セズ又前章ノ如ク効力ヲ見ルヲ十レ
是ヲ以テ八月ニ至リ獨來実丸ヲ用ルヲ四週ニ
メ全治ニ至ル

經驗第十四

菱歌連^シ烟ノ身八隊ノ歩卒^ヒ貯健^シ必^シ私^テ特^ニ屈^ル者
齡二十五歳体質良好三週前陰莖ニ梅毒ヲ受ケ
千八百三十年六月二十七日病院ニ歸ス○患者
説ク所ヲ聽ニ未夕水銀劑ヲ服セズ烟草灰ヲ用
ルノミト○其腫瘍清潔ニメ少ク延暢ス又咽喉
内焮^シ衝膿^シ潰^レメ脉肉状トナリ梅毒ニ異ナラス○

○經驗十二ニ舉タル左利ヲ與ス腫瘍ノ部ニ歌
獨魯^シ剝^レ寫^レ膏^ヲ敷^キニ微温浴ヲ以テ含漱セシム○
七月三日陰莖ノ潰瘍癒ヘ月ノ六日ニ至リ咽喉
内ノ疾患全ク除キ只僅カニ赤色ヲ遺スノミ○
左口角頰ノ内ニ於テ潤大ナル瘰肉状ヲ見ル然
レモ患者ノ言ニ批ルニ外傷ニ由テ齧齒頰内ニ
侵入スル丁巳ニ久シト○沃実鳥糞十レヲ十二
九マテ增量シ與ヘ瘰肉状ノモノ消散ス咽喉内
ノ赤色ハ猛赤玫瑰密ノ含漱劑ニ由テ二三日間
ニ全ク退ク八月六日健康ニ復シ辞メ家ニ歸ル

經驗第十五

一加刺私痛特列幾。屋欲十ル者我羅寧健ノ人ニ
ノ第八隊ノ歩卒ナリ。歳二十一年體格脆弱ニメ
良性七年左膝ヲ毀レリ。然ルニ七八ヶ月前ヨ
リ其膝新々ニ疼痛腫起メ行歩ニ難ニ至ル。一
医水蛭ヲ置キ次ニ流滴法ヲ行ヒ芫菁ヲ貼ス其
他諸腫ノ療法ヲ施セモ皆効ナシ。○病毒毎ニ増
進スルニ由テ千八百三十年五月四日我羅寧健
ノ病院ニ歸ス。○余之ヲ診スルニ左膝海綿腫各
一箇節ヲ發セリ。○沃突烏謨此症ニ補養スルコト

甚キヲ以テ好テコレヲ試ト欲シ歌獨魯剝耳垂
私沃儒刺多下幾ヲ常法ノ如ク十滴ツ。日ニ三
次與上漸ク增量メ六月十八日ニ至リテハ一時
ニ三十五滴ヲ服セシム。又膝ニ歌獨魯剝耳垂私
膏ヲ擦入シ蠟布ニテ之ヲ縛絶シ膝下ニ打膿ヲ
施シ斯ノ如ク方法ヲ行ト虫劇痛少シク減スル
ノミニメ病状少シクモ變化ナシ。○余ニ至ルマ
テ患者不快ノ症ヲ發セス。○然ルニ月ノ二十三
夜ニ至リ劇シキ咳血ヲ發シ故ニ刺給ヲ行ヒ清
涼包換刺ヲ與フ能ク効アリ。○患者ノ言ヲ聞ク

凡リ二年前故ナリ咳血ヲ發セリト○沃実湿劑
ヲ休止シ二三日ヲ過ルノ後唯外用劑ヲ特重ニ
シム○病状ホク著シキ佳候アラサレ氏七月二
十六日患者治療ヲ辞シ家ニ歸ル故ニ余敢テ之
ヲ顧ミズ

經驗第十六

一歩卒玉函湿粉納タル者找羅寧健ノ人ニメ
齡十九歳ナリ瘰癧質ナリ耳腺預腺ニ大ナル硬
結ヲ發シ或ハ潰瘍トナルアリ或ハ瘰癧管腺積ニ
達スルアリ○千八百三十五年五月朔日病院ニ

來ル余之ヲ療スルニ内外沃実烏護ヲ以テス○
歇獨魯剝馬下幾劑ヲ内服セレノ同膏ヲ患部ニ
擦ス其内服劑ハ患者始ヨリ能ク耐ス胃痛ヲ起
スカ故ニ六日ニメ後服ヲ止メ唯外用ノミヲ持
重シ又耳腺金硫黃失鳩各越幾私ノ散劑ヲ一二
週間服セシム○此方法ニ由テ病状頗ル佳候ヲ
アラハス耳腺ノ瘰癧管截割ノ後ニ勉メテ膏ヲ擦
セシニ由テ三日ヲ過ルノ後ニ其瘰癧管悉ク癒エ
硬結皆ク消散シ患者健全ニ復シ八月六日病院
ヲ辞シ去ル

經驗第十八

一軍卒傑爾多屈ナル者齡十九歲體格虛弱癩癧
質ナリ腺性眼焮衝ニ罹ルヲ既ニ久シキ八百三
十年五月十日遂ニ病院ニ來ル○是ヲ以テ丹朮
金硫黃失鳩峇越幾私ヲ内服セシム又極汞一氏
ヲ莖餽水ハフニ溶シ舎電阿美液（答）ヲ加ヘ眼水利
トス○六月十日ノ方法ヲ施スト虫氏今日マ
テ眼焮衝狀候アラサルニ由テ方ヲ轉メ沃実鳥
護ヲ用フ即チ歇獨魯剝馬沃儒刺丁幾ヲ常方ノ
如クナ滴ワハ日ニ三次與且又沃実鳥護四ハヲ

餽水一切ニ溶シ眼水利トナシ又之ヲ拾木布列
斯ニ蘸シ眼上ヲ濕ス○然ルニ此外用利眼ノ邊
縁ニ焮衝ヲ發起スルヲ以テ止メテ行ハス前ノ
眼水利ニ代サルトヲ得サレニ至ル○丁幾利ヲ
漸ク增量ノ三十五滴ニ至ル沃実鳥護ヲ用ヒシ
已來日々ニ快復ニ赴キ八月二十日健康ニ復シ
病院ヲ辞シ去ル

經驗第十九

一男子奈ナル者（經驗第十八）軍卒ノ弟ニ奉齡十七歲腺病
罹リ千八百三十年四月病院ニ來リ余ニ治ヲ乞

ノ○耳腺下顎腺頸項ノ諸線劇ク腫張シ硬キ
右ノ如ク左ノ耳下腺潰瘍トナリ兩眼焮衝シ○
前ノ丁幾劑ヲ與エ前膏ヲ擦入シ且ツ潰瘍ニ敷
シ○患者都外ニ居住スルヲ以テ加メ微量ヲ與
エ漸ク以テ増量シ六月七日ニ至リテ三十二滴
ヲ服セシム○同日患者ヲ診スルニ頗ル快復ニ
赴キ腺ノ硬結悉ク消散シ潰瘍全ク癒エ○前劑
ヲ尚持重シ且ツ一回余カ診ヲ受ヘキヲ命セン
ニ余旅行メ家ニアラス故ニ之ヲ診シ得サルナ
リ

一男子翁^{ヨシ}訥^{トシ}屋ナル者七歳午八二十六年我羅寧
健ノ流行病ニ罹リ是ヨリ午八三百年ニ至ル
マテ常ニ間歇熱ヲ患フ其症或ハ三日熱トナリ
或ハ日發熱トナリ或ハ一二週間歇熱^{発作}トナリ
ナリ之ニ兼テ大便下利スルナリ時トノ頑
固ニ便秘スルナリ○午八百二十八年百日咳
ニ罹リ翌年麻疹ヲ患ト魚皆幸ニ治セリ○諸藥
ヲ用レ正効ナリ遂ニ羸瘦ス○午八百三十年四
月病院ニ來リ余ニ治ヲ問フ諸症左ノ如ク顔色
黧澹トシテ甚ク羸瘦シ肛版劇シク膨脹シ脾臟

腸門膜腺肥大ニ著ク手ニ觸レ食慾頓正ナリ
或ハ進ミ或ハ廢ル○其下利ナル所ノモノ白
色ニシテ布ノ如シ

治法

歌獨魯刺第亞斯膏ヲ肛肛ニ擦入スルナリ日ニ二
次兼テ沙列布溶劑ニ砂糖ヲ加ヘ勉メテ飲シム
○此方法ニ由テ二三日ノ後下利休止ス是ヲ以
テ前章ニ挙タル下幾劑ヲ二滴ニ日ニ三次共
ニ漸ク増量ノ六滴ニ至リテ擦劑ニ亦勉メテ持
重ス○此療法ニ由テ患者日々ニ快復ニ赴キ食

慾頓正ナリ黧澹ナル顔色常赤ヲ得肛腹軟ニシ
脾臟腸間膜腺日ニ減少シ三月ヲ以テメ健康ニ
復セリ

羸瘦病斯ノ如キ症上ノ療法ニ由テ治スルナリ多
カ故ニ其症ヲ爰ニ附録セシト欲スレト同病ヲ
重復スルナリハ覽者ノ勞ヲ省ミナルニ以テリ且
各家ニ屢々此症ヲ説明スルニ由テ爰ニ之ヲ畧
ス沃実鳥護ハ諸種ノ頭瘡ニ用テ偉効アルナリ
稱羨セリ我羅寧健ノ病院ニ於テ疾病ニ罹ル壯
年ノ者數人ヲ毎歲實驗ス中ニ就テ八人ハ重症

ニメ全治ニ至ラス○又同病ニ罹ル一人アリ予
八百三十年五月四日之ヲ療スルニ先ツ頭髮ヲ
剪リ歇獨魯汰答私剃馬垂私膏ヲ擦入スルヲ日
ニ二次○瘡痂ヲ除キ且ツ擦劑ヲ能ク吸入セシ
メニカタメニ膏ヲ擦スルニ先ツテ刷子ニテ頭
ヲ掃刷ス○此法ニ由テ六月二十一日ニ至リ病
治スルヲ以テ擦劑ヲ休止ス然ルニ前症速ニ再
發スルカ故ニ未タ全治ニ至リ難キヲ計ル○七
月三日再ヒ前方ヲ行フノ外汰実下幾ヲ五滴ツ
、與フ漸ク二十滴ニ増量シ九月上院ニ至ルマ

テ持重スレニ患者佳候ヲ現サルニ由テ之ヲ休
シ他療法ヲ行フ
諸先哲ノ説ニ從テ汰実鳥護ノ効アル諸病ヲ上
ニ掲止スト魚今爰ニ之ヲ檢査シ余カ実験ヲ比
較シ愈汰実鳥護ノ効力卓偉ナルヲ説明ス○
療瘰腫ニ備効アルヲ論シタルカ故ニ此症ノ
經驗ヲ以テ始トスヘシ然ルニ此症ハ未タ經驗
セザルヲ以テ之ヲ奉ズ腺病ニ良効ヲ奏シタル
ヲ説示ス第十六第十七第十八ノ經驗ノ如キハ
實ニ其効力較著ナルモノナリ○第一關節白腫

ニ於テハ偉効ヲ奏ス第十五ノ關節白腫ニ於テ
ハ著シキ効カヲ見ズ余思ニ此症腺病ニ起目ハ
ルモノハ沃実烏護適當ナレ氏概ノ白腫ニ効ア
リト云難シトス諸種頭瘡ニ於ルモ之ト存シク
余八人ヲ療メ全治ニ至ラシメズ○小兒ノ羸露
ニ於テハ屢々効ヲ奏ス即チ第十九ノ經驗ニ奉
ルカ如シ然レ氏此症ニ於ルモ悉ク治スルニア
ラザルヲ諸家ノ説ト異ナラズ
○第二第第三第五第七ノ經驗ハ乳房其他ノ硬結
腫ニメ皆効ヲ奏セリ故ニ諸家ノ説ヲメ益確證

ス○羯屈兒性ノ潰瘍ニ於テハ其効未タ確定シ
難シ然レ氏第八ノ經驗ヲ歌屈兒潰瘍トナシ論
スルキハ其効力素ヨリ疑ヲ容レストス蓋シ此
症ニ於テハ羯屈兒狀ヲ現ワスト雖其性ヲ云ヘ
ハ水銀劑ニ由テ変シタル潰瘍ナルカ故ニ羯屈
兒性ト云ハニヨリ寧シ口梅毒性ノ潰瘍トナス
ヘシ○梅毒中等ノ症ニメ未タ水銀劑ヲ用サル
モノハ沃実烏護ノ効ナキヲ第十ニ第十三ノ經
驗ニ奉ルカ如然レ氏既ニ水銀劑多少ヲ用ヒタ
ル梅毒ニハ卓偉ノ効アルヲ第一第八第十一ノ

經驗ニ説示スカ如シノ第十四ノ經驗ニ於テノ
ミ未タ水銀劑ヲ服セズ殊ニ沃実鳥護ニ由リ全
治ス然レモ患者水銀劑ヲ服セスト云モ未タ
確證シ難キ処タリ○余經驗スルニ沃実鳥護ハ
尋常ノ梅毒ヨリモ假梅毒或ハ水銀病ニ効カヲ
アラハシ○其劑ノ慢性皮膚病ニ効アルヲ第九第
十ノ經驗ニ由テ明カナリ又脾臟ノ肥大ニ効ア
ルヲ八第一第一四第六ノ經驗ニ由テ尤モ彰明ナ
リ
沃実鳥護ノ効能ヲ知ント欲セハ余カ検査シタ

事件ニ就テ見ルベシ若シ之ヲ驗スルノ時ヲ得
益其良効ヲ確定セハ余經驗書ニ載セ世ニ傳播
セントヲ希フ

沃実鳥護治經久腺病ノ驗

一處女年十五歳其父母強健ナリ児タリシヨリ
全身瘰癧病ニ罹ルハ歳ニ至リテ右ノ小脾樞潰
瘍ヲ發ス其痛自然ニ破潰ノ惡性稀薄ノ液ヲ漏
泄ス○其父母諸茶ヲ求メテ之ヲ療スレモ少モ
効ヲ奏セス遂ニ治療ヲ瘥棄メ自然ノ自能ニ任

スルニ至ルノ千八百三十一年ニ當リテ其父母
間歇熱ニ罹リ之カ為メニ女之ヲ省侍メ神身ヲ
労働スル丁甚シク身体愈衰憊シ瘡口ヨリ惡液
ヲ漏泄シ遂ニ暫留熱ニ罹リ倍々衰弱ノ病蓐ニ
臥スルニ至ル〇既ニ死地ニ陥ントスルニ及ニ
テ同年十一月十六日余カ治ヲ乞フ其症衰弱劇
シク熱暫留シ人事不省脈小弱ニ便失禁生カ脱
シ經久ノ療歴諸症ヲ兼併ス故ニ左ノ方ヲ與フ
鹿角精半錢 福弗滿液一錢 舍利別六錢
苗香水 四勺

右混和シ半時毎ニ一食匙ヨ與ヘ之ニ兼テ引赤
膏ヲ貼ス〇今ヤ患衰弱スルニ由テ股ノ潰瘍ヲ
治スルニ暇アラス故ニ之ヲ施療セズ〇十七日
時々精神醒覺ス然レト灼熱ハ尚續テ暫留ス大
便不利小便赤瀉脈尚小〇今日ニ至テ仔細ニ診
察スルニ肛後硬結合縫腺腫起ス連珠ノ如ク股
ノ瘡口ヨリ薄キ臭液ヲ饒多ニ泄シ其周圍引縮
ミ小口ノ邊緣隆起ス消息子ニテ之ヲ探ルニ股
骨ノ粗糙ヲ覺フ又左ノ方ヲ處ス

顯草浸 三勺 スドル。カルク。セール。フ。ニ。キ。

忽布滿鎮

一毛

右混和一時毎一食セヲ與フ股部ノ潰瘍ニ素魯
林曹達ヲ敷マ○十八日病状愈佳候ヲ顯ハシ精
神ニ愈醒覺シ脈ニ亦興奮ニ故ニ幾那煎ヲ用テ
熱速ニ消除シ分泌排泄ニ從テ舊ニ復ス潰瘍候
候形狀ハ善以テ二十日幾那煎ヲ止スハキ症
テ之ヲ用フ汝日腸胃汚物ノ諸症ヲ瘳ス故ニ幾
那ヲ休止ス是食餌ノ誤用ヨリ來ルナラシ○疏
滌劑ヲ用ヒ外用ハ前ニ仍ル○二十七日大便不

不通ナルニ由テ前ノ飲劑ヲ持重ス○二十八日
大使二行通利シ愈輕快ヲ覺フ然レニ疔瘍口及ヒ
瘰癧ハ荏苒治セズ只其泄ス所ノ液良善トナル
ノミ○其潰瘍ヲ愈サントスルカタメニ沃実烏
護下幾七滴ツ、セシノ大麦煎ニ和シ用ル日
四次

沃實涅下幾法

沃實烏護

四十八瓦

火酒 一ツ

右漫ノ下幾劑トナス

○此劑液ヲ禁止スハキ症瘳見セサルヲ以テ前

ノ分量ニ一滴ツ、増加ニ用ヒテ遂ニ十二月ニ
至テ健全ニ復ス

○此潰瘍ハ七年ノ門荏苒贅留ノ漏膿セシモノ
此液劑ノ効ニ由テ十分愈治ニ腺ノ腫起モ從テ
消散セリ



